

திரவோயைப்
சிறிதெனினும்

தாலோபட்டா

பாசிகளும் பூஞ்சைகளும்

(பட்டிமயுச்சித்திரம் இறம்புழப்பாடல்)

ஆசிரியர்

டாக்டர் வே. கோ. சுந்தரலிங்கம், எம்.எஸ்ஸி., பிஎச்.டி.,
தாவரவியல் பேராசிரியர்,
தாவரவியல் மேல்திட்டைக் கல்வி மையம்,
சென்னைப் பல்கலைக்கழகம்,
சென்னை.



தமிழ்நாட்டுப் பாடநூல் நிறுவனம்

First Edition—December, 1970

Reprint—May, 1978

Number of copies—2000

T.N.T.B.S. (C.P.) No. 253

© Government of Tamilnadu

THALLOPHYTES (Algae and Fungi)—Major for B. Sc.,

DR. V. S. SUNDARALENGAM

Price Rs. 5-85

Published by the Tamilnadu Textbook Society under the Centrally Sponsored Scheme of Production of books and literature in regional languages at the University level, of the Government of India in the Ministry of Education and Social Welfare (Department of Culture), New Delhi.

This book has been printed on concessional paper made available by the Government of India.

Printed by
Giri Art Printers,
Madras—600 094.

அனித்துரை

(செ. அரங்கநாயகம், தமிழகக் கல்வி அமைச்சர்)

தமிழகக் கல்லூரிக் கல்வி மொழியாக ஆங்கிலம் பதினெட்டு ஆண்டுகள் ஆகியிருந்தன. குறிப்பிட்ட சில கல்லூரிகளில் மட்டும் படிப்பு வகுப்புவார மாணவர்கள் தங்கள் பாடங்கள் அனைத்தையும் தமிழிலேயே கற்று வருகின்றனர். நாடு முழுவதும் பரந்துள்ள மாணவர்களின் ஆர்வம், 'தமிழிலேயே படிப்போம்' என முன்வந்ததன் கல்லூரி ஆசிரியர்களின் கவகம், சிறு பல துறைகளிலும் தொண்டு செய்வோர் இதற் செனத் தந்த உதவிப்பு, தங்கள் சிறப்புத் துறைகளில் தங்கள் எழுதித் தர முயலுந்தள்ள ஸ்தாபிரிவர்கள் தொண்டுணர்ச்சி இவற்றின் காரணமாக இத் திட்டம் நம்மிடையே மகிழ்ச்சியும் மனநிறையும் தரத்தக்க வகையில் நடைபெற்று வருகிறது.

வரலாற்றியல், அரசியல், உளவியல், பொருளியல், புலியியல், புவியியல், மனிதவியல், மெய்ம்பொருளியல், கணிதவியல், இயற்பியல், வேதியியல், உயிரியல், காளியல், புவியியல், விலங்கியல், தாவரவியல், பொறியியல், சட்டவியல் ஆகிய எல்லாத் துறைகளிலும் ஸ்தாபிரிவர்கள், மொழிபெயர்ப்பு நூல்கள் என்று இரு வகைகளிலும் தமிழ்தாட்டுப் பாடநூல் நிறுவனம் தூக்கி வெளியிட்டு வருகிறது.

இவற்றுள் ஒன்றான தாவரவியல் என்னும் இத் தூல் தமிழ்தாட்டுப் பாடநூல் நிறுவனத்தின் சார்பில் வெளியான 253ஆவது வெளியீடாகும். தமிழ் மக்களின் பேராசை வினா தம்மிடையே பயிற்சி மொழியாகக் கொண்டுவரக்கூடிய நல்லாக்கத்திலும் இதன் முத்தவ பதிப்புப் படிக்க அனைத்தும் விதங்கியாகியிருந்தன. ஆதலின் இப்பொழுது இத்தூல் மீண்டும் வெளியாகுகிறது. இத்தூல் எம்மக அரசு, கல்வி, சமூக நல அமைச்சுத்தின் 'மாதிரி மொழியில் பக்கவாக்கற்ற தூல்கள் வெளியிடும் திட்ட'த்திற்கே வெளியிடப்படுகிறது.

தமிழில் பயிலும் மாணவர்கள் உமக மாணவர்களிடையே நெத்த இடம் பெற வேண்டும் என்பதே நம் குறிக்கோளாகும். கல்லூரிகளிலும் பக்கவாக்கற்றவர்களிலும் கலியியற் பாடங்களை யும், அறிவியற் பாடங்களையும், தொழில் துட்ப அறிவுப் பாடங் களையும் பயிலுகின்ற மாணவர்கள் அவற்றைத் தமிழில் பரிவ வேண்டும் என்பதை வலியுறுத்தி வருவதற்குக் காரணம் தமிழறிவு வார வேண்டும் என்பதனிட. தமிழ் மக்களின் அறிவு ஆற்றல் எளிதாக, விரைவாக வார வேண்டும் என்பதுதான். 'எதிலும் தமிழ்; எங்கும் தமிழ்' என்னும் குறிக்கோளை நிறைவேற்ற வேண்டிய கடப்பாடு தமிழகத்த ஆசிரியப் பெருமக்களையும் மாணவர்களையும் சார்ந்ததாகும். தமிழ்தாட்டுப் பக்கவாக்கற்றவர்களின் பல்வகை உதவிகளுக்கும் ஒத்துழைப்புக்கும் நம் மனம் கவந்த நன்றி உரித்தாகுக.

செ. அரங்கநாயகம்

பெருளடக்கம்

பக்கம்

தொழுவாய்	...	1
பாடிகள்		
1. தொகுதி : குளேரோபைட்டா	...	7
2. தொகுதி : கேரோபைட்டா	...	76
3. தொகுதி : ஸ்கீனோபைட்டா	...	85
4. தொகுதி : லேந்தோபைட்டா	...	87
5. தொகுதி : பேசிக்மேரியோபைட்டா	...	96
6. தொகுதி : கிரேசோபைட்டா	...	109
7. தொகுதி : பெயோபைட்டா	...	110
8. தொகுதி : ஸயனோபைட்டா	...	128
9. தொகுதி : ரோடோபைட்டா	...	141
10. பூஞ்சைகள்	...	171
11. தொகுதி : ஸைக்கோட்டா	...	177
12. சைக்கைகள்	...	237
13. பாசிமியா	...	285
14. ஸைரங்கள்	...	304
சைக்கோதிகள்	...	313

தோற்றுவாய் (Introduction)

தாவரவியல் வகித்துநர்கள் சுமார் 1880ஆம் ஆண்டில், முதன்முதலாகப் பூவாத் தாவரங்களைத் தாலோவைபட்டா (Thallophyta), பிறையோவைபட்டா (Bryophyta), பெரிடோவைபட்டா (Pteridophyta) என்ற மூன்று தொகுதிகளாக வகைப்படுத்தினர். 'தாவல்' (Thallus) என்ற சொல் முதன்முதலில் லின்னேயஸ் (Linnaeus) என்ற இயற்கைப் பேரறிஞரால் உருவாக்கப்பட்டது. இச் சொல் வேர், தண்டு, இலை என்ற வேறுபாடற்ற (undifferentiated) உடலத்தையே குறிக்கும். ஆகவே, எலிய உடலமைப்பைக் கொண்டு (தாவல்) பரிணாமப் போக்கில் முதற்கட்டத்தில் அமைந்துள்ள தாழ்த்த தாவரங்களே தாலோவைபட்டாவினுள் அடங்கும்.

தாலோவைபட்டா மற்றத் தாவரங்களினின்றும் இரு முக்கிய அம்சங்களில் வேறுபடுகின்றது. ஒன்று, தாலோவைபட்டாவின் இனப்பெருக்க உறுப்புகள் (ஸ்போராகம் அல்லது பாதுறுப்புகள் — sporangium or gametangium) ஒரே செவ்விலுமானவை (மற்றத் தாவரங்களில் அவ்வுறுப்புகள் பல் செவ்விலுமானவை). இரண்டு, தாலோவைபட்டாவின் கைகோட்டுகள் (zygotes) பெண் பாதுறுப்பினுள்ளே (female gametangium) இருக்கும்வரை, பல் செல் கருவாக (multicellular embryo) வளர்ச்சியடைவதில்லை. ஆனால் உயர் தாவரங்களில், பாதுறுப்பினுள்ளேயே கைகோட்டு பாகுபாடடைந்து பல்செல் கருவாக வளர்ச்சியடைகின்றது.

தாலோவைபட்டா என்னும் இத் தொகுதியில் அடங்கும் பேரினங்கள் பச்சையம் (chlorophyll) கொண்டிருப்பின் ஆகவே (algae) அவ்வுறுப்புகள் என்றும், பச்சையம் அற்ற பேரினங்கள் கிபஞ்சை (fungi) அவ்வுறுப்புகள் என்றும் வகைப்படுத்தப் பட்டுள்ளன.

பாசிகள்

இத் தாற்றுண்டிக் ஆரம்ப காலத்தில் பாசிகள், குளோரோவைசி (Chlorophyceae), பெயோவைசி (Phaeophyceae),

கைபிளேஸைசி (Cyanophyceae), ரோடோஸைசி (Rhodophyceae) என்ற நான்கு வகைகளாகவே பிரிக்கப்பட்டிருந்தன. தாளடைவில் ஆராய்ச்சிகள் மூலம், பாக்டீரியா துண் அமைப்பு வரலாறு, செவியியத்தன்மை (physiology) பற்றிய புதிய விவரங்களும் கருத்துகளும் அதிகரிக்க, பாக்டீரியா வகைப்பாட்டை மாற்றியமைக்க வேண்டிய நிலை ஏற்பட்டது. ஆகவே, தற் காலத்தில் பாக்டீரியா பிரிவுகளாக வகுக்கப்பட்டு, ஒவ்வொரு பிரிவும் தொகுதி (division or phylum) நிலைக்கு உயர்த்தப்பட வேண்டியதாயிற்று. அதாவது, தாவரவியலாளர்களின் அடங்கும் துணைத்தொகுதியான (sub-division) பாக்டீரியா இப்பொழுது 10 தனித் தொகுதிகளாகக் (divisions) கருதப்படுகின்றன.

இத் தொகுதிகளின் வகைப்பாடு, பாக்டீரியாவின் நிறமிகளின் தன்மை (pigmentation), சேமிப்புப் பொருளின் இயல்பு (storage-product), மற்றும் கசையிழைகளின் தன்மை (nature of flagella), அவைகளின் பொருத்தநிலை (method of insertion) ஆகிய வற்றின் அடிப்படையில் அமைந்துள்ளது. பாக்டீரியாவின் தொகுதி களாவன :

1. குளோரோஸைப்டா (Chlorophyta)

புக் பச்சை நிறம் கொண்டவை (grass green) ; சேமிப்புப் பொருள் தர்ப்பு (starch) நிலையில் உள்ளது ; கசையிழைகள் சம நிலமாகச் சாட்டைத் தன்மைக் (isoplasm type) கொண்டும், மூலப்பகுதியில் பொருத்தநிலை (anterior insertion) உள்ளன.

2. கிரோஸைப்டா (Charophyta)

நிறம், சேமிப்புப் பொருள்தன்மை முதலிய அம்சங்களில் குளோரோஸைப்டாவை ஒத்துள்ளபோதிலும், உடல் அமைப்பு (thallus structure), பாக்டீரியாப் பெருக்க உறுப்புகளின் சிக்கலான தன்மை, கசையிழைத் தன்மை, மூலப் படிவங்கள் (germination stages) ஆகியவற்றில் இவை வேறுபடுகின்றன.

3. யூக்ளிஹைப்டா (Euglenophyta)

புக் பச்சை நிறம் கொண்டவை ; சேமிப்புப் பொருள் பெரோமைலம் (paramylon) என்னும் கார்போஹைட்ரேட்டாகும் ; 1-3 கசையிழைகள் புல்சல் (insel) தன்மை கொண்டவை.

4. க்ஸாந்தோஸைப்டா (Xanthophyta)

குளோரோஸைப்டாவிலிருந்து இத் தொகுதி பிரிச் சிறிய அளவில் மாறுபடுகின்றது. செவ்வளவில் சேமிப்பு உணவாக

ஹுகோஸின் (leucosin), எண்ணெய் (oil) காணப்படுகின்றன. பளாஸ்டிடுகளில் பச்சையம் a, பச்சையம் b ஆகிய அனலிக் B-காரோட்டினும் (B-carotene) காணப்படுகின்றன. செங்கவர்கள் பெக்டிக் பொருள்களால் ஆனவை. பசு கணிகங்கள் ஒன்றுக்கு மேற்பட்ட எண்ணிக்கையிலுள்ளன. கனச இழைகள் சமநீளமற்றவை. இவற்றில் நீண்ட கனசயிழையில் நீளவாட்டத்தில் பல நுண்ணிய இழைகள் (mastigonemet) காணப்படுகின்றன. பாலினப் பெருக்கம் அரிதாகக் காணப்படும். சிலவற்றில் ஒத்த அமைப்பு கொண்ட (isogamous) கேமிட்டுகளால் தடைபெறுகிறது. வெளச்சீரீயா (Vaucheria) என்ற ஆங்காணிக் ஊகமியின் (oogamite) மூலம் பாலினப் பெருக்கம் தடைபெறுகிறது. பெரும்பாலும் பாலின இனப்பெருக்கமானது தூள்போர்கள், எப்போனோஸ்போர்கள் (aplanospores) மூலம் தடைபெறுகிறது. குளோராயீயா (chloroglaucoba) என்ற ஆங்காணிக் எளிய பகுப்பு ஏற்படுகிறது. ஹாலோஸ்பீரா (halosphaera), பாட்ரிடியம் (botrydium) என்ற ஆங்காக்களில் சிந்துகள் (cysts) தோன்றுகின்றன. இந்த ஆங்காக்கள் பெரும்பாலும் நன்னீரில் அல்லது மண்ணில் வாழ்பவை.

5. பேசிலிகேரியோஸபட்டா (Bacillariophyta)

இவைகளுக்கு டயாட்டம்சன் (Diatoms) என்று பெயர். இவை அனேகமாக நுண்ணிய மிதக்கும் பளாஸ்டான்களாக (planktonic forms) தன்னீரிலும் கடல் நீரிலும் வாழ்கின்றன. சில சிற்றினங்கள் ஒரு தளத்தைப் பற்றிக்கொண்டும் வாழ்கின்றன. சில டயாட்டம்சன் திவத்திலும் வாழ்கின்றன. கடலில் வாழ்பவை ரோடோப்சைசி (Rhodophyceae), பியோக்சைசி (Phaeophyceae) ஆங்காக்களினியு தோற்றுத் தாவரங்களாகவும் வாழ்கின்றன. இவைகளின் உடலம் ஒற்றைச் செல்லால் ஆனது. சில கூட்டுயிரிகளாகவும் (colony) காணப்படுகின்றன. இவை பெட்டி அமைப்பு (box-shaped) கொண்டு இரு பகுதிகளாலானது (valves).

6. கிரேனோஸபட்டா (Chrysophyta)

பசுமஞ்சள் (yellow-green) அல்லது பொன்னிறம் பழுப்பு (golden-brown) நிறம் கொண்டவை; சேமிப்புப் பொருள் ஹுகோஸின் (leucosin) என்றும் பொருளாகும். இரு கனச இழை கொண்டவை. கனசயிழைகள் சம நீளமற்றும், அவற்றில் ஒன்று சாட்டைத் தன்மையையும் மற்றொன்று டின்சல் (tinsel) தன்மையையும் கொண்டுள்ளது.

7. பிக்ரோஸைப்டா (Pyrrophyta)

பழம்பு திறம் கொண்டவை ; சேமிப்புப் பொருள் தரசு (starch) நிலையில் காணப்படும் ; இரு கணவியழைகளில் ஒன்று பட்டைவாழை ; மற்றொன்று சாட்டை போன்றது. இவை செவ்வின் மத்தியில் பொருத்தப்பட்டுள்ளன.

8. பெயோஸைப்டா (Phaeophyta)—பழம்புப் பாகிகள்

பழம்பு திறம் கொண்டவை ; சேமிப்புப்பொருள் லேமினேரின் (laminarin) என்ற நிலையில் காணப்படும் ; கணவியழைகள் சமநீளமற்றவை ; இனப்பெருக்கச் செவ்வின் பக்கவாட்டில் பொருத்தப்பட்டுள்ளன (lateral insertion) ; ஒன்று ஓர்சை தன்மைவையும், மற்றொன்று சாட்டைத் தன்மைவையும் கொண்டுள்ளது.

9. சைனோஸைப்டா (Cyanophyta)—பசுநீலப் பாகிகள்

பசுநீல திறம் கொண்டவை ; சேமிப்புப் பொருள் ஸயாநோஸைபியன் தரசும் (cyanophyccean starch) என்ற நிலையிலுள்ளது. கணவியழையிலுள்ள செவ்வின் அறவே காணப்படுவதில்லை ; பாகினைப் பெருக்கம் தடைபெறுவதில்லை.

10. ரோடோஸைப்டா (Rhodophyta)—சிவப்பும் பாகிகள்

சிவந்த திறம் கொண்டவை ; சேமிப்புப் பொருள் பீபினோரிடிசன் தரசு (Floridean starch) நிலையில் காணப்படும் ; இனப்பெருக்கச் செவ்வின் கணவியழை அற்றவை.

பூஞ்சைகள்

பூஞ்சைகள், மிக்ஸோமைக்கோஸைப்டா (Mycomycophyta) பூமைக்கோஸைப்டா (Eumycophyta) என்று இரு தொகுதிகளாக வேகுராட்களாக வகுக்கப்பட்டிருந்தன. மிக்ஸோமைக்கோஸைப்டா உறையற்ற பசைப் பூஞ்சைகளையும் (slime molds) பூமைக்கோஸைப்டா உறையுள்ள பூஞ்சைகளையும் குறித்தன. பூமைக்கோஸைப்டா, 'ஐபைக்கோமைஸிடிக்' (Phycomycetae), 'ஆஸ்கோமைஸிடிக்' (Ascomycetae), 'பேஸிடியோமைஸிடிக்' (Basidiomycetae), 'டிபூட்டெரோமைஸிடிக்' (Deuteromycetae) என்று 4 வகைகளாகப் பிரிக்கப்பட்டு வந்தன. அவ்நிலையில் பூஞ்சைகள் யாவும் மைக்கோட்டா (Mycota) என்றும் தொகுதியின் கீழ், 'மிக்ஸோமைக்கோடினா' (Mycomycotina), 'ஐபைக்கோடினா'

(Eumycotina) என்ற இரு துணைத்தொகுதிகளாகப் (sub-divisions) பிரிக்கப்பட்டுள்ளன.

பூமைக்கோட்டினு. இந்த வகைபாட்டின்படி பின்வரும் 9 வகைகளாகப் பிரிக்கப்பட்டுள்ளது :

1. கைட்டிரியோமைஸீடிஸ் (Chytridiomycetes)
2. ஹைபோகைட்டிரியோமைஸீடிஸ் (Hyphochytridiomycetes)
3. பிளாஸ்மோடிபோபோரோமைஸீடிஸ் (Plasmodiophoromycetes)
4. ஔமைஸீடிஸ் (Oomycetes)
5. ஸைக்கோமைஸீடிஸ் (Zygomycetes)
6. டிரைக்கோமைஸீடிஸ் (Trichomycetes)
7. ஆஸ்கோமைஸீடிஸ் (Ascomycetes)
8. பிஸிடியோமைஸீடிஸ் (Basidiomycetes)
9. டிப்டெரோமைஸீடிஸ் (Deuteromycetes).

பாசிகள்

1. தொகுதி : குளோரோபைட்டா

(Division : Chlorophyta)

பசும் பாசிகள்

(Green Algae)

இத் தொகுதியில் அடங்கும் பேரினங்கள் யாவும் பச்சை நிறமும்பவ கணிகங்கள் (chloroplast) கொண்ட பாசிகளாகும். கரோடின்கள் (carotin), ஊந்திதாயிக் (xanthophyll) நிறமி களைக் காட்டிலும், பச்சை நிறமிகள் (chlorophyll a and b) அதிகமாகக் கொண்டிருத்தலால் இவை ஒளிரும் பச்சை அல்லது புல் பச்சை (grass green) நிறமாகக் காணப்படுகின்றன. ஒளிச் சேர்க்கையினால் தயாரிக்கப்பட்ட கார்போஹைட்ரேட் பொருள் (carbohydrate) தரசு (starch) நிலையில் சேமிக்கப்படுகிறது. இந்தச் சேமிப்பு பசுக்கணிகத்தினால் அமைந்துள்ள பைரியோய்ட் (pyrenoid) என்ற ஓர் உறுப்புடன் நெருங்கிய தொடர்பு கொண்டது.

இப் பசும்பாசிகளில் காணப்படும் இவற்றும் தன்மைபுள்ள (mobile) செல்கள், 2, 4 அல்லது பல கணையிழைகளின் (flagella) கொண்டவையாகும். இந்தக் கணையிழைகள் ஒரே திசையிலேயேயாக, சாட்டை அமைப்பைக் கொண்டு (whip-lash type) செல்லின் முன் பாகத்தின் பொருத்தியுள்ளன.

ஊழிலும் பரவியிருத்தலும் (Occurrence and Distribution)

இப் பாசிகளால் 10 சதவிகிதம் கடலில் வாழ்வன. மற்றவை தன்னீரிலும், ஈர மண்ணிலும், ஈரச் சுவர்களிலும் காணப்படுகின்றன. சில சமயங்களில் மரப்பட்டைகளின் மீதும் மரீச்ச சாரங்களிலும் மற்றும் வெண்பனையிலும் இப் பாசிகளைக் காண இயலும்.

கடலில் வாலும் பேரினங்களில், சில தீவில் மிதப்பவை (plankton); மற்றவை கடற்கரைகளில் பாறைகளின்மேல் ஒட்டி வாழ்வன. இவற்றுள் ஒரேயே வேலி ஏற்ற (high tide) மட்டத்

திறகு மேலும் (supra tidal), பெரும்பாலானவை மேலி ஏற்ற-இறக்க மண்டலங்களிலும் (inter-tidal or littoral zone), மிதமான மேலி இறக்கத்திற்குக் கீழுள்ள மண்டலங்களிலும் (sub-tidal) (எப்பொழுதுமே நீரில் ஓழியும்) காணப்படும். ஒரு சில பாசிகள் கடல் தீரைக் காட்டிலும் அதிகமான உப்புக் கொண்ட குளங்களில் (saline pools) வரலும் திறல் கொண்டுள்ளன (உ-ம், ஹேலியக்ஸா சிலாஜா *Dunaliella salina*, பைரமிடோனாஸ்—*Pyramimonas*).

செல் அமைப்பு

ஒருசெல் பாசிகளிலிருந்து (unicellular algae) பலசெல்களிலும் ஆன இழைப்பாசிகள் (filamentous algae) வரை பல்வேறு வகையான உட்க அமைப்பை (thallus construction) இத் தொகுதியில் காணலாம்.

சில ஒருசெல் பேரினங்கள் உறைபற்றுள்ளன. ஆகவே, இவைகளில் புரோட்டோபிளாஸ்டிக் வெளிப்புறம் தடித்து, பெரிபிளாஸ்ட் (periplast) என்கிற துள்வாக வேறுபடுத்தப்பட்டுள்ளது (உ-ம், ஹேலியக்ஸா). ஆனும், பெரும்பாலான பசுப் பாசிகள் செல்லுலோசிலிருவான (cellulose) தனிப்பட்ட உறைபொருள் கொண்டுள்ளன. ஆனும் வைபிளேனில் (sphonomales) எஃது உறப்படும் பெரும் குடும்பத்தின் பேரினங்களில் மட்டும் செல்லுலாஸ் காலோஸ் (callose) என்னும் பொருளாக ஆகிப் பட்டுள்ளது. சில பேரினங்களில் செல்லுலோஸ் உறைக்கு வெளிப்புறத்தில் பெக்டேடாஸ் (pectose) என்னும் பொருளிலும் ஆன வழவழப்பான பசை உறைவும் காணப்படும். (உ-ம், வைக்ஸிலா—*Zygnema*).

முழுவளர்ச்சியடைந்த (mature) செல்லுக்குள் பொதுவாக ஒரு பேரிவ வாக்குவோல் (vacuole) கொண்ட புரோட்டோபிளாஸ்ட் அமைந்துள்ளது. செல்லுக்குள் ஒன்று அல்லது பல பசுக்கணிகங்கள் செல்லில் சுற்றுப் புறத்திலோ (parietal) அல்லது நடுவிலோ அமைத்திருப்பதைக் காணலாம். ஒரே பசுக்கணிக மாயிருப்பின் அது பிளவரும் வடிவங்களில் அமைத்திருக்கும். குவளை போன்றும் (cup shaped) (உ-ம், கிளாமிடோமோனாஸ்—*Chlamydomonas*), தகடு போன்றும் (laminar) (உ-ம், என்டிரோ மோர்ஃ—*Enteromorpha*), வரிசையம் போன்றும் (gravid-shaped) (உ-ம், யூலோத்ரிகா—*Ulothrix*), வலை போன்றும் (reticulate) (உ-ம், கிளாடோமோரா—*Cladophora*, கடலோலியம்—*Oedogonium*), முகடுகள் கொண்ட கோல்போன்றும் (rod-shaped

with ridges) (உ-ம். கிளாஸ்டீரியம்—Closterium) பலவிதங்களில் பசுங்கணிகங்கள் அமைந்து காணப்படுகின்றன.

இப் பசுங்கணிகங்கள் ஒன்றுக்கு மேற்பட்டிருப்பின், விண்மீன்கள் (stellate) போன்றும் (உ-ம். ஸைக்னீமா—Zygnema), தாடா வடிவம் (ribbon-shaped) கொண்டும் (உ-ம். ஸ்பைரோகிரா—Spirogyra), பல சிறு நீள்வட்டத் தகடுகள் (discoid) போன்றும் (உ-ம், காலீபா—Caulerpa) அமைந்துள்ளன.

இப் பசுங்கணிகங்களில் பல நிறமிகள் (pigments) காணப்படுகின்றன. அவையாவன: இரு வகைப் பச்சையங்கள் பச்சையம் a, பச்சையம் b (chlorophyll a, b), இரு வகை ஆரஞ்சு வண்ண கொராடின்கள் (carotin A and B), மற்றும் தாக்கு வகையான மஞ்சள்நிற ஊத்தோபிடுகளுமாகும் (xanthophyll). பச்சைய நிறமிகள் மிகுதியாக இருப்பதால், ஆரஞ்சு, மஞ்சள் நிறமிகள் மறைக்கப்பட்டு ஒளிர் பச்சை (bright green) நிறமாகவே இப் பாலிகள் காணப்படுகின்றன.

பல பசுப் பாலிகளில் பசுங்கணிகத்தில் பைரீனாய்ட் (pyrenoid) என்ற உறுப்பு அமைந்துள்ளது. இது ஒளிச்சேர்க்கையின்போது உண்டாகும் குளுகோஸைத் (glucose) தரசமாக (starch) மாற்றிறும் மையம் (center) என்று கருதப்படுகிறது. இதைச் சுற்றிச் சிறு தகடுகள்போல் அமைந்துள்ள தரசப் பொருள்களே இதற்குச் சான்றாகும்.

பொதுவாகச் செவ்விய நுக்கியல், நடுவினோ அல்லது ஓரத் திவோ வைட்டோபிளாசுத்தில் அமைந்துள்ளது. சில பெரும் குடும்பங்களில் (உ-ம், கிளாடோபொரேலிக் — Cladophorales, ஸைபினேலிக்—Siphonales) ஒவ்வொரு செவ்வுக்குள்ளும் ஒன்றுக்கு மேற்பட்ட பல நுக்கியல்கள் காணப்படும். இந்த நிலை ஸீனோசைட்டிக் (coenocytic) என்று குறிப்பிடப்படுகிறது.

இவற்றும் செவ்வியல் காணப்படும் கசையிழைகள் ஒரே நீளமுள்ளவை (isokonten). ஒவ்வொரு கசையிழையினுள்ளும் மையத்தில் இரண்டு கிணைப்பில்களும் (fibres), சுற்று வட்டத்தில் (periphery) ஒன்பது இரட்டை கிணைப்பில்களும் (வட்டமாக) அமைந்துள்ளன (8+2 அமைப்பு) (படம் 1). இந்த கிணைப்பில்களைச் சுற்றி அமைந்த செவ்விய உறை (sheath) கசையிழையின் அடிப்பாகத்தில் செவ்விய பிளாஸ்மா ஸ்ட்ரூடன் சுலந்து விடுகிறது.

பொதுவாக, இயங்கும் செல்களில் கசையிழைகளுக்குக் கீழே செவ்வியுள் இரு கருங்கி விரிவுப் துண்டுகளாக (contractile vacuoles) காணப்படுகின்றன. இவை ஒன்று மாற்றி ஒன்று விரிந்து கருங்கும் தன்மையுடையன. இவ்வித நிகழ்ச்சி



படம் 1

கிளாமிடோபிராஸ்க் கசையிழையின் குதக்குண்டிக்கு நேரத்தம்


பிளாஸ்ட் துண்மணிகளுக்கும் இடையே பேரோடெம்மோஸ் (parastome) என்ற இழை அமைந்துள்ளது. அதன் மத்தியிலிருந்து கரபோபிளாஸ்ட் (rhizoplast) என்று அழைக்கப்படும் மற்றோர் இழை கீழேநோக்கி நீண்டு தூக்கியனின்மேல் உள்ள சென்ட்ரியோல் (centriole) துண்மணிவுடன் தொடர்புகொண்டு உள்ளது. மேற்கூறப்பட்டவை வரவும் ஒரங்கே நியூரோமோட்டார்-அபரேடஸ் (neuromotor-apparatus) என்று குறிக்கப் படுகிறது (படம் 2).

கழிவுப்பொருளை வெளியேற்ற உதவுகின்றது என்று ஒரு கிராதுமும். செல்கின் நீர்ச் சமநிலையை நுழைப்படுத்த உதவுகின்றது என்று மற்ற வராதும் கருதப்படுகிறது.

ஒவ்வொரு கசையிழையின் அடிப்பாகத்திலும் பிளெபரோபிளாஸ்ட் (lepharoplast) அல்லது பேஸல் பாடி (basal body) என்றும் ஒரு துண்மணி (granule) அமைந்துள்ளது. இரு கசையிழைப் பேரின்ன்களில் இரு பிளெரோப

இயங்கும் பேரின்ன்களிலும், இனப்பெருக்கச் செல்களிலும் பொதுவாகக் கண் புள்ளி (eye spot) அல்லது ஸ்டிமா (stigma) என்ற ஓர் ஆரஞ்சு வண்ண உறுப்புக் காணப்படுகிறது. ஒளி ஏற்கும் (photo receptive) இவ்வுறுப்பு ஆரஞ்சு நிறமிகைக் கொண்ட குவளைபோன்ற பாகத்தையும், அதற்கு முன்புறத்தில் இருபுறக் குவிவெண்க (bi-convex lens) போன்ற பாகத்தையும் கொண்டுள்ளது. இந்த உறுப்பின் உதவியால், சூழ்நிலையில் உள்ள ஒளியின் அளவைத் தெரிந்து அதற்குத் தகுந்தபடி செல் இயங்க இயலுகின்றது. இயங்கும் கூட்டமைப்புப் (colonial) பேரின்ன்களில், முன்புறத்தில் (anterior side) உள்ள செல்களில் இத்தக் கண்புள்ளிகள் பெரிதாகவும், பின்புறச் செல்களில் (posterior side) சிறிதாகவும் அமைந்திருப்பது இதற்குத் தக்க சான்றாகும்.

இப் பாகிகளின் பேரினங்கள், ஒரு செல் (unicellular), கூட்டமைப்பு (colonial) அல்லது இழைபோன்ற (filamentous) உடனத்தைக் கொண்டுள்ளன. கனப்பெருவில் வந்த பெரும்



படம் 2
கனப்பெருகல் கிழிதல் கிழிதல்

குடும்பத்தில் அடங்கும் பேரினங்களில் குறுக்குச் சவர்கள் இல்லாத கிளைத்த குழாய்போன்றும் பழையபோன்றும் பேரின உடனங்கள் காணப்படுகின்றன.

கனப் பெருக்கம் (Vegetative multiplication)

ஒரு செல் பேரினங்களில் செம்பகுப்பினமும், இழை தாண்டுகளில் துண்டித்தல் (fragmentation) மூலமும் உடல் இனப்பெருக்கம் நடைபெறுகிறது.

பாலின இனப்பெருக்கம் (Asexual reproduction)

இப் பாகிகளில் பெரும்பாலும் 3, 4 அல்லது பல கனப் பெருக்கைக் கொண்ட ஜூஸ்போர்களால் பாலின இனப் பெருக்கம் நடைபெறுகிறது. சில பேரினங்களில் (உ.ம். யூரோத்ரிக்ஸ்—Uothrix) இவை சிறு ஜூஸ்போர் (micro-zoospore), பெரும் ஜூஸ்போர் (macro-zoospore) என்று இருவகைப்படும். ஜூஸ்போர்கள் சாதாரண உடலைச் செவ்வகவடிவிலோ (vegetative cell) அல்லது தனிப்பட்ட ஸ்போரங்களிலோ (sporangia)

தொற்றுவித்தன. இவைப் பேரினங்களில் இந்த ஜூன்போர் வெளியேறிய பின்னர் நீதி ஏதாவது ஓர் அடித்தளத்தில் அமைந்து இதைத்தாமவாக முனைக்கின்றது.

சில சமயங்களில் செவ்விய புரோட்டோபிளாண்ட் பல பாகங்களாகப் பிரிந்து ஜூன்போராக வளர்ச்சி அடைவதற்கும் பழிவாகக் கசையிழை அற்ற ஏப்ளேனோம்போர்களாக (aplano-sporae) மாற்றிடுகின்றன. மெல்லிய உறை கொண்டுவன ஒவ்வொரு ஏப்ளேனோம்போரும் புதிய தாவணாகப் பின்னர் முனைக்கிறது. இவை தவிர, ஏகைனிட் (akinetes) என்ற மத்தொரு வகை வப்போரும் சில பேரினங்களில் காணப்படுகின்றன. முழுச் செவ்வியம் (பாருபாட்டைவாயம்) ஒரு பருமனுடைய புதிய உறையைச் சுரப்பித்துக் கொண்டு ஏகைனிட்டாக மாற்றிடுகின்றது (உ-ம். பித்தாபோரா—Pithophora). இந்த வப்போர் கீழே அடித்தளத்தில் படிந்து பின்னர் முனைத்துப் புதிய உடலத்தைத் தொற்றுவிக்கிறது.

பாவினப் பெருக்கம்

இப் பாவினில் நடைபெறும் பாவினப் பெருக்கம் ஐசோகமீ (isogamy), அனீசோகமீ (anisogamy), ஊகமீ (oogamy) என்று மூன்று வகைப்படும்.

மூதம் வகையான ஐசோகமீ (isogamy) பரிணாமத்தில் தாழ்த்த நிலையாகக் கருதப்படுகின்றது. இம் முறையில், இரு கசையிழைகள் கொண்ட உருவத்திலும் அளவிலும் ஒத்த இரு காரீட்டுகள் ஒன்றையொன்று அணுகி, பின்னர் இணைந்து, ஊனிகோட்டை (zygote) உண்டாக்குகின்றன. ஊனிகோட் ஒரு பருமனுடைய உறையைச் சுரப்பித்துக் கொண்டு, ஒவ்வாநிலையை அடைத்து, அடுத்த மழைக்காலத்தில் முனைக்கின்றது. சில பேரினங்களில் (உ-ம். ஊனிக்மெஸ்டீஸ்—Zygomastales) தந்தி காரீட்டுகள் கசையிழைவின்றி அயிரா போன்று மெல்ல நகர்த்து ஒன்றுடன் ஒன்று இணைகின்றன. இந்த நிலம்ச்சி இணைப்பு முறைப் பாவினப் பெருக்கம் (conjugation) என்று குறிப்பிடப் படுகிறது.

இரண்டாம் முறையான அனீசோகமீயில் (anisogamy), இணையும் இரண்டு காரீட்டுகளில் ஒன்று சற்றுப் பெரிதாகவும், மத்தயாகவும் (isogamish), மத்தொன்று சிறிதாகவும், துரித இயக்கத்தைக் கொண்டும் (active) உண்ண, பெரிய காரீட் பொதுவாகப் பெண் காரீட்டாகவும், சிறிய காரீட் ஆண்

தொகுதி : குளோரோஸ்பட்டா

காமிட்டாகவும் கருதப்படுகின்றன. அதனும், பரிணாம வளர்ச்சியில் ஐசோகமியைவிட அனீசோகமி முன்னேற்றம் அடைந்த முறையாகும்.

மூன்றாவது முறையான ஊழியில் (oogamy) பெண் காமிட் கசையிழைகளை இழந்து, அணையும் நிலைபற்று, உருண்டை வடிவம் கொண்டு அண்டமாகச் செயல்படுகின்றது. இந்த அண்டத்தைக் கொண்டுள்ள செல்லுக்கு ஊகோனியம் (oogonium) என்று பெயர். ஆண் காமிட் கசையிழைகளைக் கொண்டு அணவில் மிகச் சிறிதாகவும், வேகமாக இயங்கும் ஆற்றலைப் பெற்றுமுள்ளது. இதற்கு ஆந்தரோஜாயிட் (antherozoid) என்று பெயர். இந்த ஆந்தரோஜாயிடு, ஊகோனியத்தினுள் சென்று அண்டத்துடன் கலந்து கருவுறச் செய்கிறது (fertilisation). இதன் விளைவாக உண்டாகும் கைகோட், உதறையைச் சுரப்பித்துக்கொண்டு மூவுயிழையை அடைகிறது. பரிணாம வளர்ச்சியில் இத்தகைய பாலினப் பெருக்கம் மிக உண்மையானது.

பசும்பாசிகளின் வாழ்க்கைச் சுழல் (life-cycle) இருவகைப் பட்டது. ஒன்று, ஒரு சத்ததிச்சுழல் அல்லது ஹெப்ளோபையான்டிச் (haplobiontic) அதாவது, ஒரே தன்மைவான உடலத்தின் (thallus) தொடக்க காலத்தில் பாலின இனப் பெருக்கமும், பின்னர் பாலினப் பெருக்கமும் நிகழ்கின்றன. இரண்டு, இரு சத்ததிச் சுழல் அல்லது டிப்ளோபையான்டிச் (diplobiontic) அதாவது, இரு மாறுபட்ட சத்ததிகள் ஒரேயகால முறையில் ஒன்றையொன்று அடுத்துத் தோன்றுகின்றன. இதற்குச் சத்ததி மாற்றம் (alteration of generations) என்று பெயர். பன பேரினங்களில் இரு சத்ததிகளும் புறத்தோற்றத்தில் ஒத்திருந்தபோதிலும், இனப்பெருக்கச் செய்களை உருவாக்குதலில் வேறுபடுகின்றன. ஒற்றைமயச் சத்ததி உடலம் (haploid thallus) காமிட்டுகளையும் (காமிட்டோஸ்பைட்—gametophyte), இரட்டைமயச் சத்ததி உடலம் ஸ்போர்க்களையும் (ஸ்போரோஸ்பைட்—sporophyte) தோற்றுவிக்கின்றன. ஆகவே, இச் சத்ததி மாற்றம், உருவமொத்த சத்ததி மாற்றம் (isomorphic alternation of generations) என்று குறிக்கப்படுகின்றது (உ-ம். என்டினோமார்ம்). ஒரு சில பேரினங்களில், காமிட்டோஸ்பைட்டும் ஸ்போரோஸ்பைட்டும், உருவத்திலும் அணவிலும் வேறுபட்டுக் காணப்படுகின்றன. இது உருவம் ஒன்றாத சத்ததி மாற்றம் (heteromorphic alternation of generations) என்று அழைக்கப்படுகின்றது.

சூளையோசைட்டாவின் வகைப்பாடு (Classification of Chlorophyta)

சூளையோசைட்டாவின் வகைப்பாட்டினைப் பற்றிப் பாரி யிவல் வந்துள்ள பண்புக்களைக் கருத்துக்களைக் கொண்டுள்ளனர். உடல் அமைப்பையும் (thallus structure), இனப்பெருக்கச் செய்களின் கண்காணிப்புகளையும் அடிப்படையாகக் கொண்டு, தொகுதி சூளையோசைட்டா, பல பெருங் குடும்பங்களாக (orders) வகுக்கப்பட்டுள்ளன.

1. பெருங்குடும்பம் : வால்வெள்ளி (Order : Volvocales)

இப் பேரினங்களின் உடலம் (thallus) விரைவாக இயங்கும் : கண்காணிப்புகளையுடைய ஒரு செல்லினாலோ அல்லது பல செல் கூட்டமொன்றினாலோ ஆனது (உ-ம். கிளாமிடோமோனா—*Diatomomona*, வால்வெள்ளி—*Volvax*).

2. பெருங்குடும்பம் : பெட்ரோஸ்போரேலியல் (Order : Tetrasporales)

இயங்கும் தன்மைவற்ற, போலிக் கண்காணிப்புகளையுடைய (Pseudo-cilia) செல்கள் பசைப்பொருளில் பதித்திருக்கும் உட வத்தைக் கொண்டவை (உ-ம். பெட்ரோஸ்போரா—*Tetraspora*).

3. பெருங்குடும்பம் : யூலோத்ரிகேலியல் (Order : Ulotrichales)

இனக்கும் தன்மைவற்ற (unbranched) மெல்லிய இழைக்களை உடையதாகக் கொண்டுள்ள பேரினங்கள் இதனுள் அடங்கும் (உ-ம். யூலோத்ரிக்ஸ்—*Ulothrix*).

4. பெருங்குடும்பம் : அல்வேலியல் (Order : Ulvales)

செல்கள் 1-2 அடுக்குகளாக (layers) அமைந்த பரந்த தட்டையான உடலங்களைக் கொண்டவை (உ-ம். என்டினோ மார்பா—*Ectocarpus*).

5. பெருங்குடும்பம் : கிளோஸ்போரேலியல் (Order : Chaetophorales)

இனத்த (branched) இழைக்களைப் பெற்றுள்ள உடலம் படரும் தொகுதி, செங்குத்தான தொகுதி என இரு தொகுதி களாக வளரும் இயல்பு கொண்டது (heterotrichous habit) (உ-ம், கிளோஸ்போரேட்டா—*Coleochaete*, கிளோஸ்போரா—*Chaetophora*).

6. பெருங்குடும்பம் : கிளாடோபொரேலிஸ் (Order : Cladophorales)

இதில் அடங்கும் பேரினங்களின் உடலம், கிளைத்த இழைகளால் ஆனவை. அவற்றின் ஒவ்வொரு செல்லும் சீனோகைட்டிக் (coenocytic) அமைப்பைப் கொண்டுள்ளது (உ-ம், கிளாடோபொரா-Cladophora).

7. பெருங்குடும்பம் : ஓடோனிமேலிஸ் (Order : Oedogoniales)

இத்தப் பெருங்குடும்பத்துள் அடங்கும் பேரினங்களில் செல் பாகுபாடு (cell division) தனித்தன்மை வாய்ந்தது. இனப் பெருக்கச் செல்களில் பல கணையிழைகள் குறுக்குச் சுற்றுவட்டத்தில் (transverse whorl) அமைந்துள்ளன. (உ-ம், ஓடோனிமேலம்—Oedogonium).

8. பெருங்குடும்பம் : ஸைக்ளிமேலிஸ் (Order : Zygnematales)

இப் பேரினங்களில் கணையிழைகளற்ற அமீபா போன்ற காரீட்டுகள் இணைவதால் (conjugation) மட்டுமே பாலினப் பெருக்கம் தடைபெறுகிறது. நீந்தும் இனப்பெருக்கச் செல்கள் அறவே காணப்படாதது. இப் பெருங்குடும்பத்தின் மற்றொரு சிறப்பியல்பாகும் (உ-ம், ஸைப்ரோகைரா—Spirogyra, ஸைக்ளீமா—Zygnema, டெஸிமிடேரா—Desmids).

9. பெருங்குடும்பம் : குளோரோகைக்கேலிஸ் (Order : Chlorococcales)

ஒரு செல்லிலோ அல்லது பலசெல் உட்டமைவிலுமோ ஆன உடலத்தைக் கொண்டது. இனப்பெருக்கத்தின்போது மட்டுமே செல் பிரிவினாவடைகிறது (உ-ம், குளோரெல்லா—Chlorella).

10. பெருங்குடும்பம் : ஸைபிஸேலிஸ் (Order : Siphonales)

கிளைத்த, குறுக்குச் சுவரற்ற குழிப்போன்ற (siphonous) சீனோகைட்டிக் உடலங்களைக் கொண்டுள்ள பேரினங்கள் இதில் அடங்கும். (உ-ம், காலர்பா—Caulerpa).

பெருங்குடும்பம் வால்வகேலிஸ்

(Order : Volvocales)


வால்வகேலிஸ் என்னும் பெருங்குடும்பம், பரிணாமத்தின் மூதற்படியில் இருக்கும் பேரினங்களைக் கொண்டுள்ளது. இப் பேரினங்களின் உடலம் கணையிழைகளைக் (flagella) கொண்ட

ஒரே செல்லினாலே (unicellular) அல்லது பல செல்களினால் ஆன கட்டமைவினாலே (colonial) ஆனது. ஒவ்வொரு கட்டமைவுப் பேரினத்திலும் ஒரு குறிப்பிட்ட எண்ணுள்ள செல்கள் குறிப்பிட்ட வகையில் அமைக்கப்பட்டுள்ளன. இவ்வித அமைப்பு ஸ்ரோபியம் (Coenobium) என வழங்கப்படுகிறது. உடல்கள் செல்களும் (vegetative) இனப்பெருக்கச் செல்களும் நீத்தும் திறனுடையவை. பாலியல் இனப்பெருக்கம் (asexual reproduction) ஒரு செல் பேரினங்களில் செல்க் கட்டமைவுகளாக (daughter colony) நிகழ்கிறது. பாலினப் பெருக்கம் (sexual reproduction) ஐசோகமீ (isogamy), அனீசோகமீ (anisogamy), அல்லது காகமீ (ogamy) முறையில் நடைபெறுகிறது. இப் பெருக் குடும்பத்தில் உள்ள பேரினங்கள் பெரும்பாலும் தண்ணீரிலேயே (fresh water) வாழ்வன.

குடும்பம் :

கிளாமிடோமோனாடேசை (Chlamydomonadales) — கிளாமிடோமோனா (Chlamydomonas)

இத்தப் பேரினம், மழை நீரிலும் ஈர மண்ணிலும் பொதுவாகக் காணப்படும். இது ஒரு செல் பாகியின்



படம் 3

கிளாமிடோமோனாஸ் அமைப்பு

உடனமைப்பு (படம் 1), முட்டை (ovoid), பேரி (pyriform), உருகை (cylindrical), அல்லது கோள (spherical) வடிவம் கொண்டுள்ளது. செல்லின் முன்பாகத்தில் (anterior) இரு கண்களினாலும் அமைந்துள்ளன. செல்கறை (cell wall) செத்துவோலினால் (cellulose) ஆனது. செல்லின் பின்பாகத்தில் குவளை போன்ற (cup shaped) பருமனுடைய (massive) பசுக்கனிசம் (chloroplast) ஒன்று உள்ளது. இப் பசுக்கனிசத்தினால் ஸ்பிரோட்ட் (pyrenoid) என்னும் உறுப்பு பொருத்தியுள்ளது.

செய்வின் மூலம் பாகத்தில் கரைவிறைகளின் அடிப்பாகத்துக்குக் கீழே கருக்கி விடவும் இரு நுண்குமிழிகள் (contractile vacuols) அமைந்துள்ளன. செய்வின் கடுவே (குவளை போன்ற பசுக்களின் கத்தில் உப்புறத்திலுள்ள) கைட்டோமோனாத்தில் நுக்கியவன் அமைந்துள்ளது. மற்றும் செய்வின் மூலப்பாகத்தில் ஒரு பக்கத்தில் செங்குதற்குக் கீழே ஆரஞ்சு நிறமான கம்புள்ளி அங்கத்து வடிக்கிர (eye spot or stigma) காணப்படுகிறது.

மாவிய இனப்பெருக்கம்

குழந்தைய் அதுகவமாக இருக்கும் போது கிளாமிடோ மோனாவின் மாவியரப் பெருக்கம் மட்டுமே நடைபெறுகிறது. இச் சமயம் கிளாமிடோமோனஸ் செய் ஒரீடத்தில் அகரவற்ற நிலையடைத்து நினவாட்டிக் பிரிவினையடைத்து 4, 8 அல்லது 16 பாகங்களாகப் பாகுபாடு அடைகிறது. ஒவ்வொரு பாகமும் கரைவிறைகள், குவளை உருவப் பசுக்களாகம், நுண்குமிழிகள், கம்புள்ளி முதலிய கிளாமிடோமோனஸ் அம்சங்கள் வரவற்றையும் பெறுகின்றது ; செய்லுமோனிலும் ஆன தாய்ச்செய்வின் உறை கரைவதன் மூலம் (gelatinisation) இச் சேய்ச்செய்கள் வெளி வருகின்றன. அனலில் கிரியவைவாக உள்ள இவற்றை ஸ்போர் போர்சன் (zoospores) என அழைக்கலாம். இவை வினரலில் வளர்ச்சியடைந்து செய்லுறை பெற்று கிளாமிடோமோனலின் தன்மையை அடைகின்றன.

மேல சமயங்களில், இச் சேய்ச்செய்களில் கரைவிறைகள் (flagella) உண்டாவதில்லை. ஆகவே, இவை நீத்தும் நிறன் அற்று, தாய்ச்செய் உறை கரைதலிலும் உண்டான பசைப் பொருளில்




படம் 4

கிளாமிடோமோனஸ் பாகப்பெயர்வப் படிவத் அடைதல் படித்திருக்கும்படியாக நோர்ந்து விடுகின்றது (படம் 4). இவ்விதமான படிவத்தைப் பார்மெல்லியப் படிவம் (palmella stage) என்று குறிப்பிடுகின்றோம். இந்தப் படிவம் பார்மெல்லா (palmella) தா — 2

கின்றன. மற்றொருவகை பகம்பாசிப் பேரினத்தில் நிலையை ஒத்திருப்பதால் பாக்மெல்லாப்படிவம் என்று அழைக்கப்படுகின்றது. இவ்விதப் படிவம் 8 ர ம ண் ன ி க் ளாழும்போதுதான் பெரும்பாலும் காணப்படுகிறது. ஆனால், பாக்மெல்லாப் படிவம் தற்காலிகமானதேயாகும். நீர்ப்பெருக்கம் ஏற்பட்டால் இந்தப் பாக்மெல்லாப் படிவச் செடிகள் உணர்ச்சியடைவோர் பெற்று, பகைப் பொருளினின்றும் நீத்தி வெளியேறி இயல்பான கிளாமிடோமோனாக மாற்றிவந்தன.

வளினப் பெருக்கம்

சில சிற்றினங்களில், செம்மூதலில் அசைவற்ற நிலையடைத்து பாதுபாடடைத்து 16, 32 அல்லது 64 இரகசாயிழை காரீட்டு



படம் 5

படம் 6

கிளாமிடோமோனஸ் இரு காரீட்டுகளின்
புரோட்டோமோனாடுகள் வெளிவந்து இணைதல்

களைத் தொடர்ந்துவிடுகின்றது. அவை தொடர்ந்ததில் ஜூம்போரை ஒத்திருந்த போதிலும் அளவில் சிறியனவாகும் (உ-ம். கிளாமிடோமோனஸ் திக்குலாயா—*Chlamydomonas gymnogameta*). சில சிற்றினங்களில் இரு வகைப்பட்ட காரீட்டுகள் (heterothallic) உண்டாகின்றன. வெவ்வேறானவற்றின் எதிர் அம்ச காரீட்டுகள் (opposite mating strains) ஒரேயே சேர தேவிய் பாலின இணைப்பு (sexual fusion) நிகழ்கிறது. இணைப்புக்கு முன் பகை (தூற்றுக்கும்

மேற்பட்ட) காமீட்டுகள் ஒன்று சேர்ந்து திரனாகக் (clamping) காணப்படுகின்றன. அவற்றில் எதிர்புரிசுவகை காமீட்டுகள் இரண்டின்மீடாகப் பிசுபிசுப்பான தங்கள் கணையிழைகளால் மூதனில் ஒன்றோடொன்று இணைக்கப்படுகின்றன. பிறகு இக் காமீட்டுகளின் புரோட்டோபிளாஸ்டுகளும் கலந்து ஸைகோட்டாக மாறுகிறது.




படம் 7
கனோபைட்டாவின்
4-கணையிழைகள்
கொண்ட கனோபைட்டா

8 அல்லது 16 செதில ஆன காமீட்டுகளை உருவாக்குகின்றது. மற்றொரு செல் 2 அல்லது 4 பெரிய பெண் காமீட்டுகளை அளவிதமே உருவாக்குகின்றது. இத் தகைய இரு காமீட்டுகளும் இணையும் போது தத்தம் செல் உறைகளை அகற்று வதில்கூட. காமீட்டுகள் தேர் எதிராக வந்து ஒன்றை யொன்று நெருக்க மூள் பாகத்தில் செல் உறை களையப் பெற்று இரு புரோட்டோபிளாஸ்டுகள்

மற்றும் சில செற்றினங்களில் காமீட்டுகள், உறுதியான செல் உறைமுடன் இருப்பதால், இணைவதற்கு இடைபூசுக உலளது. இங் வகை காமீட்டுகள் செல் உறைகளைப்பிள்ளே விடுத்து அமைவகளின் புரோட்டோபிளாஸ்டுகள் மட்டும் மூன்றோக்கி தகர்ந்து ஒன்றோடு ஒன்று இணைந்து ஸைகோட்டாக மாறு கின்றன. ((உ-ம். கி. ஸ்னோவி—C. snowink) (படம் 5-7) (மேற்கூறப்பட்ட நிகழ்ச்சிகளில் காமீட்டுகள் உருவத்திலும் அளவிலும் ஒத் திருப்பதால், இத்த இணைப்பிற்கு ஸுனோவி (isogamy) என்று பெயர்.


சில செற்றினங்களில் (உ-ம். கி. பிரான் —C. brauni) ஒரு செல்பாகுபாடடைந்து



படம் 8
கனோபைட்டாவின் இரு அளவோ காமீட்டுகள் அணுகி இணைதல்

கவந்து இரு உறைகளிலும் மத்தியில் ஊனகோட்டை உருவாக்கு கின்றன (படம் 8). இந்த நிலைச் சி அனசோகமி (anisogamy) என்று குறிப்பிடப்படுகின்றது.

மற்றும் சில நிற்றினங்களில் (உ-ம், சி, காக்ஸிபெரா—*C. coxifera*, சி, ஊனமம்—*C. oegmum*) ஒரு செல் பிரிவடைத்து 8, 16 அல்லது 32 நிற்றிய இரு கணாயினை ஆத்தரோஜாக்ம்களைத் (antherozooid) தோற்றுவிக்கின்றது. மற்றொரு செல் கணாயினைவிட விடுத்துச் செல்லின் புரோட்டோபிளாண்டு செல் உறைக்குள்ளேயே அகசவந்த நிலையில் ஓர் அண்டமாகச் (oöte) செயல்படுகிறது.



படம் 9
கிராமிடோமோனஸ் கணகமி ஓதறப்படி
உண்டாகும் ஆத்தரோஜாக்ம்கள் அண்டமும்

படம் 11
கிராமிடோமோனஸ் கணகோட்

ஆத்தரோஜாய்ஞகம், செவ்வினுட் சென்று அண்டத்தை அணுவி அதனுடன் கலந்து உருவறச் செய்து ஊனகோட்டை உருவாக்குகின்றது. (படங்கள் 9, 10) உடனே ஊனகோட் தன்னைச் சுற்றி ஓர் உறையை உருவாக்கிக் கொண்டு ஓய்வு நிலையை (resting stage) அடைகின்றது (படம் 11). ஊனகோட்டினுள் சேமித்து வைக்கப்பட்ட தரசம், பின்னர் கொழுப்புப் பொருளாக மாற்றமடைகின்றது.

மற்றும், ஹெமெடோகிரோம் (haematochrome) என்னும் நிறமி உண்டாகாத காரணமாக, ஊனகோட் ஆரஞ்சு வண்ணத்தைப் பெறுகின்றது.

அடுத்த மகழக்காலத்தில், ஊனகோட் முளைத்து (germinates) அகலது 8 பாகங்களாகப் பிரித்து ஒவ்வொன்றும் ஒரு



படம் 12

கொமிடோமோனஸ் ஊனகோட் முளைத்தல் (germinates)
ஜூம்போராக வெளிவருதல்

கொமிடோமோனஸ் செவ்வாக உருப்பெறுகின்றது. இத்தச் செவ்வன், ஊனகோட்டின் உறை கரைவதன்மூலம் வெளிவெறு கின்றன. ஊனகோட் முளைப்பதற்குமுன் அதன் இரட்டைமைய (diploid) நூக்கியல் மையானில் (meiosis) முறையில் பாகு பாடடைத்து 4 அகலது 8 ஒற்றைமைய நூக்கியல்களை உண்டாக்கு கிறது. ஒவ்வொரு ஒற்றைமைய நூக்கியலும் புரோட்டாபிளாசத் தினுள் சூழப்பட்டு (மற்ற அகலக்களையும் பெற்று) இளம் கொமிடோமோனஸ் செவ்வாக (ஜூம்போர்) உருவாகின்றது (படம் 12).


பெண்டோரைனா (Pandorina)

பெண்டோரைனா என்பது ஸ்ரீஜெரியம் (ecorobium) என்ற கூட்டமையுடைய பாக்டீ. இது வாக்ஸோகேனிகின் மற்றொரு

பேரினமாகும். இத்தப் பேரினத்தின் உடனம் நீள்வட்ட (ellipsoidal) அல்லது உருளை (cylindrical) வடிவத்தைக் கொண்டது. இத்தக் கூட்டமையில் 16 (-32) ஜினாமிட்டோமோனஸ் போன்ற செல்கள் பசைப்பொருளில் (gelatinous matrix) நெருக்கமாக அமைக்கப்பட்டுள்ளன (படம் 13). செல்கள் ஒன்றையொன்று அழுத்துவதன் காரணமாகப் பக்கங்களில் செல்கள் தட்டையாகக் (obovate) காணப்படுகின்றன. ஒவ்வொரு செல்லிலும் இரு கணையினங்களும், கணபுள்ளியும் செல்லின் பரந்த முன்பாகத்தில் அமைந்துள்ளன. மற்ற உறுப்புகள் எல்லாம் ஜினாமிட்டோமோனஸ் செல்லில் இருப்பதைப் போன்றே அமைந்துள்ளன.

ஸரீஸா இனப்பெருக்கம் (Asexual Reproduction)

செய்க் கூட்டமையுகள் (daughter colonies) உண்டாவதன் மூலம் தடைபெறுகின்றது. முதலில் இத்தப் பாகி நீர்த்திலையில்



படம் 13
பெண்டோனாரா கூட்டமையின்
(colony) தோற்றம்

தரைமட்டத்துக்கு ஒழிந்தி அசைவற்றிருக்கும். அப்போது பசைப் பொருள் சிறிது கரைத்து உப்புவின்றது. ஒவ்வொரு செல்லின் புறொட்டோபினாஸ்டும் 16 பாகங்களாகப் பகுபட்ட பின்னர் புதிய 16 செய்கூட்டமையாக உருவாகின்றது. இவ்விதமாக வளர்ச்சி பெற்ற ஒவ்வொரு செய்க்கூட்டமையும் (daughter colony) தாய்க் கூட்டமையினின்றும் பிரித்து நீர்த்த வெளியேறிப்பின்னர் மூலிர்த்து தனிக்கூட்டமையாகச் (adult colony) செயல்படுகின்றது.


ஸரீஸா பெருக்கம் (Sexual Reproduction)

பெண்டோனாரா வேற்றுடலத் தன்மை (heterothallic) கொண்டது. காமிட்டிகள் உருவாகும்போது ஏற்படும் செய்பகுப்புகள் பாகினாப் பெருக்கத்தின்போது நிகழ்ந்த வகை விவேசை தடைபெறுகின்றன. ஆனால், காமிட்டிகள் பசைப் பொருள் உதையில் (gelatinous matrix) நெருக்கி இவ்வாறாகப் பிரித்தவாறே அமைந்துள்ளன. இக் காமிட்டிகள் பின்னர் தனித்தனியே வெளியேறுகின்றன. இருவகைப்படும் இக்

கார்பீட்டுகளில் ஆண் கார்பீட்டுகள் பெண் கார்பீட்டுகளிலிடச் சிறியனவாகவும் (anisogametes), வேகமாக நீத்தக் கூடியனவாகவும் உள்ளன. ஆண், பெண் கார்பீட்டுகள் முறையே இணைத்து 4-கணையிழைகளைக் கொண்ட ஸைகோட்டுகளாக மாறுகின்றன. இவை, சற்று நேரம் நீத்திப் பிறகு கணையிழைகளை விடுத்து, உறையை உண்டாக்கிக்கொண்டு ஒய்வு நிலையை அடைகின்றன. ஆப்போது ஸைகோட், பழுப்பு வண்ணத்துடன் காணப்படுகிறது. இது முளைக்கும்போது டிரோட்டோபிளாண்டு ஒரு ஜூஸ்போராக மாறி, செம்மிய பையினும் சூழப்பட்டு செலிவருகிறது. இத்த ஜூஸ்போர் ஒரிடத்தில் நிலைத்துநிற்கு, செம்பழுப்பின் மூலம் (பாலிமா இனப்பெருக்கத்தின்போது நடைபெறுவதைப்போல) பெண்டோரைசு கூட்டமைவை உருவாக்குகின்றது.

யூடோரனா (Eudorina)

யூடோரனா என்னும் கூட்டமையப் பேரினம் பேண்டோரனானுவையிடச் சில அம்சங்களில் மூன்றேற்ற நிலையைக்



படம் 14

யூடோரனா எலிசுக் கூட்டமைய

படம் 15

யூ. இல்லிஜபென்ஸிஸ் கூட்டமைய (ஒவ்வொரு பாகத்தில் 4 செல்கள் சிறியனவாக இருத்திக் காண்க.)

காண்பிக்கின்றது. இப் பேரினத்தின் கூட்டமைய 32 அல்லது 64 செல்களாக கொண்ட உருளை அல்லது நீண்டபட்ட வடிவம் கொண்டிருக்கிறது. இதில், செல்கள் ஒன்றையொன்று தொடராமல் புரையப் பொருளின் (gelatinous matrix) தனித்தனியே அமைந்துள்ளன.

இக் கூட்டமையில் செங்கல், குறுக்கு (transverse) வரிசைகளில் அடுக்கப்பட்டுள்ளன. யூடோரைனா எலிங்கம் (E. elegans), யூ. இல்லினாயென்சு (E. illinoensis) (படங்கள் 14, 15) ஆகிய சிற்றினங்களில் 32 செங்கல் 5 வரிசைகளாகவும், யூ. இண்டிகா (E. indica) 64 செங்கல் 7 வரிசைகளாகவும் அமைக்கப்பட்டுள்ளது.

யூ. எலிங்கம், முதல், கடை (1, 5-வது வரிசைகள்) ஆகிய வரிசைகள் ஒவ்வொன்றிலும் 4 செங்கலும் மற்ற மூன்று வரிசைகளில் (2, 3, 4-வது வரிசைகள்) 8 செங்கலும் உள்ளன.

யூ. இண்டிகாவில், முதல், கடை ஆகிய வரிசைகள் ஒவ்வொன்றிலும் நான்கு செங்கலும், இரண்டாவது வரிசையில் 8 செங்கலும் மற்றைய நான்கு வரிசைகள் (3, 4, 5, 6-வது வரிசைகள்) ஒவ்வொன்றிலும் 12 செங்கலும் அமைந்திருக்கின்றன. ஒவ்வொரு செங்கலும் கிளாமிபோமோனாவின் செங்கல் போன்ற அமைப்பையும், உறுப்புகளையும் கொண்டுள்ளது.

பாலின இனப்பெருக்கம்

பொதுவாக, பேண்டோரைனாவில் தடைபெறுவது போலவே ஒவ்வொரு செங்கிலும் ஒரு செங்கல் காலனி உண்டாவதன்மூலம் தடைபெறுகின்றது.

பாலினப் பெருக்கம்

யூடோரைனா ஒத்த உடல (homothallic) அல்லது வேற்று உடல (heterothallic) தன்மைகொண்ட சிற்றினங்களைக் கொண்டுள்ளது. ஒத்த உடலச் சிற்றினங்களில் ஆண் காரீட்டுகளையும், மற்ற வரிசைகளிலுள்ள செங்கல் பெண் காரீட்டுகளையும் உருவாக்குகின்றன. அவ்வமயம் ஆண் காரீட்டுகளைத் தோற்றுவிக்கும் செங்கல் பாதுபாடடைந்து 64 அல்லது 128 கதிரவடிவம் கொண்ட (spindle shaped) இருகனையிழை காரீட்டுகளாக மாறுகின்றன. ஆனால், இந்த காரீட்டுகள் யாவும், ஒரே கற்றையாக (bundle) வெளியேறி பெண் கூட்டமையை (female colony) அடைந்ததும் தனித்தனியே பிரிகின்றன. பெண் காரீட்டாக உருவாகும் செல் ஒரு பாதுபாடும் அடையாமல் கூட்டமையை விட்டு வெளியேறாமல், இருக்குமிடத்திலேயே நினைத்து, சிற்றினமே அசையும் சக்திகொண்டு காணப்படுகிறது. இத்தகணம் ஆண் காரீட்டு, கற்றையுள்ள பசைப்பொருளுக்குள் (gelatinous matrix) நழுவத்து, பெண் காரீட்டுடன் இணைகிறது. கைகோட் கூட்டமடைக்குள்மேயே நினைத்திருந்து (கனையிழைகள் நீங்கப் பெற்று) ஓர் உறையை சுரப்பித்துக் கொள் கிறது.

கற்றியுள்ள பசைப்பொருள் அழித்தவுடன், இந்த மைகோட் தீசின் அடித்தளத்திற்கு மூழ்கிவிடுகின்றது. பின்னர் தீர் முழுவதும் கற்றிய பிரகு. அடித்தளத்தின் மண்ணினையே இந்த மைகோட் ஒய்வுநிலையைக் கழிக்கிறது. அடுத்த மைதரப் பருவத்தில் மைகோட் மூளைக்கின்றது. அப்போது அதன் உறை ஒரு பக்கத்தில் மிழித்து, அதன் கழிவாக ஒரு ஸ்பைன் மூலம், இருகசையிழை தூய்ப்போர் ஒன்று வெளிவருகிறது. இந்த தூய்ப்போர் சற்று நேரம் தீசில் நீதி அசைவற்ற நிலையை அடைத்து பின்னர் அடுத்தடுத்துப் பாகுபாடடைத்து ஒரு பூடோரைஞ் காலணியை உண்டாக்குகிறது. பூடோரைஞ் சிற்றினங்களில் செவ்வின் அமைப்பில் சில வேறுபாடுகள் காணப்படுகின்றன. இவ் வேறுபாடுகள் பரிணாமத்தின் ஒரு முக்கிய அம்சத்தை (evolutionary significance) வெளிப்படுத்துகின்றன.

பூ. எலிகன்சில் (*E. elegans*) [32 செக்கன் கொண்ட கூட்டமைவு (படம் 14)] எதிர்பாச் செக்களும் ஒரே அளவைக் கொண்டுள்ளதாகவும், ஒவ்வொரு செக்கும் இனப்பெருக்கத்தில் பங்கு கொள்ளும் ஆற்றல் பெற்றவைவாகவும் அமைந்துள்ளன. உதாரணமாக, பானியா இனப்பெருக்கத்தின்போது ஒவ்வொரு தாய்க் கூட்டமைவும் 32 சேய்க் கூட்டமைவுகளை உண்டாக்குகின்றன.

ஆனால், பூ. இல்லினொயென்சில் (*E. illinoensis*) [32 செக் கூட்டமைவு படம் 15] முன்வரிசையில் உள்ள 4 செக்கள் மற்ற செக்களைவிடச் சிறியவைவாகவும் இனப்பெருக்கச் சக்தி வற்றவைவாகவும் உள்ளன. ஆதலால், பானியா இனப்பெருக்கத்தின்போது 28 சேய்க் காலணிகளை உருவாக்கின்றன. முன் வரிசையில் உள்ள நான்கு செக்கள் உடனடி செக்களாகச் (vegetative cells) செயல்படுகின்றனவேவன்றி, இனப்பெருக்கத்தில் பங்கு கொள்வதில்லை.

இருதியில் மற்றச் செக்கள் சேய்க் காலணிகளாகவோ காயிட்டுகளாகவோ வெளியேறும்போது, இனப்பெருக்கச் சக்தியை இழத்ததால் இந்த நான்கு செக்கள் மடித்துவிடுகின்றன. இதையே 'மலடாக்கு முறை' (sterilization) என்று கூறுகிறோம். இவ்வாறே, பூ. இண்டிகாசில் (*E. indica*) (64 செக் கூட்டமைவு) முன் இரண்டு வரிசையில் உள்ள 12 செக்கள் (4+8) மலடாக்கின்றன. மற்ற 52 செக்கள் சேய்க் கூட்டமைவுகளை அல்லது காயிட்டுகளை உண்டாக்கும் நிறைக் கொண்டிருக்கின்றன. ஆகவே, மேற்கூறிய இரு சிற்றினங்களிலும் வேலைப் பங்கிடு (division of labour) என்ற ஒரு புதிய நிலை ஏற்படுகின்றது.

இது பரிணாமத்தில் மூக்கிய மூன்னேற்ற நிலையைக் காட்டுவதாகும். இத்தகைய நிலை, அடுத்ததையும் பேரினமான வால்வாக்களில் நன்கு நிலைநாட்டப்பட்டுள்ளது.

பீனியோடொரைனா (Pleodorina)

இது மழைநீர்க் குட்டைகளில் பொதுவாகக் காணப்படும் மற்ருளு கூட்டமையும் பேரினமாகும். இந்த நீள்வட்ட அகவது கோள வடிவங்கொண்ட கூட்டமையு, 128 இனாபிடோமோனல் போன்ற செல்களால் ஆனது. இதில் பூடோரைனாவில் அமைந்திருப்பதைப் போல, செல்கள் வரிசை முறையில் இவ்வமைல் ஒழுங்



படம் 16


பீனியோடொரைனா காலிபோர்னிகா கூட்டமையு

கற்ற முறையில் (irregular) அமைந்துள்ளன. பூடோரைனா நெற்றினங்களைக் காட்டிலும், இப் பேரினத்தில் மலட்டு உடவச் செல்கள் (somatic cells) அதிக எண்ணிக்கையில் உள்ளன. உதாரணமாக பீனியோடொரைனா காலிபோர்னிகா (*P. californica*) (படம் 16) என்னும் நெற்றினத்தில், மலட்டுச் செல்கள் மூன் பாகத்தில் அதிக எண்ணிக்கையில் (பூடோரைனா இண்டிகாவைவிட) காணப்படுகின்றன. பிண்டுதத்தில் உள்ள செல்கள் எல்லாம் இனப் பெருக்கச் சக்தி (germinal cells) கொண்டவை, மற்ருளு நெற்றினமான

பீனியோபொரைகு ஸ்பெரீக்காவியம் (*P. sphaerica*) (படம் 17) மூன் பாகத்தில் மட்டுமின்றிச் சிறு மலட்டு உடகச் செடிகள் பின் பாகத்திலும், இனப் பெருக்கச் செடிகளுடன் கலந்து காணப்படுகின்றன. எனவே, மலட்டுச் செடிகள் எண்ணிக்கை அதிகரிக்கிறது.

எனவே, இம்மிரு செறினங்களிலும் மலட்டுச் செடிகள் எண்ணிக்கையில் அதிகரிப்பதைக் காரணமாகக் காணலாம். எனவே, இத்தப் பேரினம் பரிணாமப் போக்கில் பூடோரைனாவைக் காட்டிலும் சிறிது உயர் நிலையில் உள்ளதாகக் கருதப்படுகிறது.

பாலினப் பெருக்கமும், பாலினா இனப்பெருக்கமும் பூடோரைனாவில் நிகழ்வதைப் போலவே இதில் நிகழ்கின்றது. பாலினாய்



படம் 17


பீ. ஸ்பெரீக்கா கூட்டமவு

பெருக்கம் செடிக் கூட்டமவு மூலமாகவும், பாலினப் பெருக்கம் (உயர்த்த) அனேசோகமி முறையிலும் நிகழ்கின்றது.

வால்வாக்ஸு (*Volvox*)

இது உருளை அல்லது கோள வடிவத்தைக் கொண்ட 500—60,000 செடிகளாலான கூட்டமவுப் பேரினமாகும். இது மழைக் காலத்தில் மழைநீர்க் குட்டைகளில் அதிகமாகக் காணப்படும். நீர் மூலதும் பச்சை வண்ணத்தை அடைய இவையே காரணமாகும்.

கட்டமைவில் உள்ள செல்கள் அனைத்தும் பசைப்பொருளின் புறப்பாகத்தில் (peripherally in gelatinous matrix) அமைந்துள்ளன (படம் 18). ஒவ்வொரு செல்லும் ஒரு பசையினால் ஆன செல்லுறையினால் சூழப்பட்டுள்ளது. அவ்வித உறை ஒவ்வொன்றும் பரம்பர அழுத்தத்தால் அறுகோண வடிவத்தை அடைகின்றது (படம் 19). இந்தக் கட்டமைவு முழுவதும் உள்ளீடற்று (hollow) நீர் போன்ற கழிப்பொருளைக் கொண்டுள்ளது. கட்டமைவில் பின்பாகத்தில் பிளாவோபோர் (phialopore) என்னும் மிக நுண்ணிய துவாரம் அமைந்துள்ளது. சில சிற்றினம்



படம் 18

செல்லுறையுள்ள கட்டமைவு

களில், செல்கள் சைட்டோபிளாசு நுண்ணீழைகளால் (cytoplasmic strands) (படம் 19) இணைக்கப்பட்டுள்ளன.

கட்டமைவில் உள்ள செல் ஒவ்வொன்றும் இரு கசையிழைகளால் கொண்டுவர, கசையிழைகளின் பீடத்தில் இரு (3-5 வரை) கரும்பி லிரியும் நுண் குமிழிகள் உள்ளன. செல்லின் பின் பக்கத்தில் பைரிலும்துடன் கூடிய சுவளை போன்ற பசை கணிகம் ஒன்று உள்ளது. இந்தக் கட்டமைவில் முன்பாகத்தில் உள்ள செல்களில் உள்ள கண் புள்ளிகள் (eye spot) பின்பாகத்தில் செல்களில் உள்ளவற்றைவிடப் பெரிதானவை. எனவே, ஒவ்வொரு செல்லும் கிளாமிடோமோனஸ் அம்சங்கள் அனைத்தையும் பெற்றிருப்பது நன்கு புலப்படும்.




படம் 19

வால்வாக்கை கூட்டமையின் ஒரு பாகத்தின் பரந்தோரத்தில் (பிரோட்டோரோன்களிலுள்ள செல்களுக்கு இடையே உள்ளதைக் காண்க).

தில், சிறு எண்ணிக்கையில் அமைந்த இனப்பெருக்கச் செல்கள் பாலிவாப் பெருக்கத்தையும், பருவ முடிவில் பாலினப் பெருக்கப் பணியையும் மேற்கொள்ளுகின்றன.

பாலின இனப்பெருக்கம்

கோனிடியா (gonidia) எனப்படும் இந்த இனப்பெருக்கச் செல்கள், அடுத்தடுத்து நீளவாட்டில் பாகுபாடடைந்து 8 செல் படிவத்தில் ஒரு தட்டையான பிளேகா (plate) என்ற நிலையை எடைகின்றது. பின்னர் இது 16 செல்-படிவம் அடைந்து, அடுத்த



படம் 20 21

தடுத்துச் செல்பிரிவினை ஏற்பட, பல ஆயிரக்கணக்கான செல்களைப் பெற்று, பிலாகோபோரை (துண்ணிய துவாரம்) மேற்புறம் கொண்டுள்ள உள்வீடற்ற கோளவடிவ நிலையை (hollow sphere) அடைகிறது. இந் நிலையில் ஒவ்வொரு செல்லின் முன்பாகமும் (anterior) கோளத்தின் மையத்தை நோக்கி


(உய்தோக்கி) அமைந்துள்ளது. ஆகவே, கசைவிகழைந்தோன்றும் போது செவ்வளில் மூன்பாகங்கள் வெளிதோக்கி இருத்தல் இன்றி வமைவாததாகும். எனவே, இந்தக் கோளநிலையில் அமைந்துள்ள



படம் 20

படம் 20, வகைவகை செவ்வளில் செல் பாதுமடவகை செல் உப்டவகை (daughter colony) உண்டாகும் படிக்கல்


செவ்வளில் உள்வெளித் திரும்புதல் (inversion or invagination) அவசியமாகும். இது எவ்வாறு நிகழ்கின்றதெனில், கோளத்தின்



படம் 21

(A, உள்வெளி மாற்றத்திற்கு முன் B, உள்வெளி மாற்றத்திற்குப் பின்) எவ்வாறு செல் உப்டவகை உள்வெளி மாற்றம் (invagination) அடைதல் அடிப்பாகம் முதலிலும், பிறகு ஏனைய பாகங்களும் பின் தொடர், மேலுள்ள துவாரத்தினால் புகுந்து சிறிது சிறிதாக வெளிவரு

கின்றன. (படங்கள் 21, 22). எனவே முழுக்கோளமும் உள் வெளித் திரும்பம் அடைகிறது. இதனால் செங்கனின் மூள் பாகங்கள் வெளிதோக்கி அமைப இயலுகின்றது. இதற்குப்



படம் 23

வாய்வாகக் குழியாகக் கூட்டமைவுகளுடன் காணப்படுக
முதிர்ந்த வாய்வாகக் கூட்டமைவு

ஆந்தரீபாயம்



படம் 24



படம் 25

பின்னர் மூள்பாகத்தின் கசையிழைகள் தோன்றுகின்றன. இவ்விதமாக வளர்ந்த செங்கக் கூட்டமைவு (படம் 23) மெதுவாக அசைத்து முடிவில் (முன்புறமுள்ள) பசைப்பொருளின் வாய்வாக வெளிவருகின்றது.

பாஸிஸம் பெருக்கல்

அண்டம் சஞ்ஞதம்மூலம் ஊகரி மூன்றாவின் தடைபெறு
கின்றது. சில சிற்றினங்கள் ஒத்த உடலத் தன்மையையும்


ஆத்தரோஜாய்ட்

கற்றை



படம் 26

படம் 24-25. ஊகலங்கள் ஆத்தரி
உயர் செவ்வியுள் ஆத்தரோ
ஜாய்ட் கற்றை (antherozoidal
bundle) உண்டாகும் படியங்கள்



ஆத்தரோஜாய்ட் கற்றை

படம் 27

ஊகலங்கள் ஆத்தரோஜாய்ட் கற்றையின்
முத்தொத்தம்




படம் 28

ஊகலங்கு ஊகலாய்ட் செவ்வியுள் உள்ள ஆண்டத்தின் தொத்தம்
ஊகலங்கள் ஊகலாய்டத்தின் முத்தொத்தம்

(homothallic), சில செத்துடலத் தன்மையையும் (heterothallic)
கொண்டுள்ளன. சில இனப்பெருக்கச் செல்கள் (ஆத்தரிபயச்
செல்கள்) பாகுபாடடைந்து 16, 32, 64, 128, 256, 512
நிலை, கதிப்போன்ற (spindle-shaped) இரு கலையினங்களைக்
கொண்ட ஆத்தரோஜாய்டுகளை (antherozoid) உருவாக்குகின்றன.

இவ்விதமாக ஆந்தரோஜாய்டுகள் உண்டாகும்போதும் பிளேகியா (plakoa) படிபடும், உன்வெனி மாற்றம் (invagination) ஆகிய நிகழ்ச்சிகள் நடைபெறு




ஆந்தரோஜாய்ட்

படம் 29

வாக்காகத் தண்டத்தைச் சுற்றி வரும் ஆந்தரோஜாய்டுகள்

கின்றன (படம் 25). இத்தக் கூட்டமைவு அமைப்பில் உள்ள ஆந்தரோஜாய்டுகள் (படம் 27) தனித்தனியே பிரிவடையாமல் வெளிவந்து நீதி (படம் 28) அண்டத்தின் அண்மையை அடைத்தவுடன் தான் தனித்தனியே பிரிகின்றன.

அண்டங்களை உண்டாக்கும் செல்கள் (ஊகோனியச் செல்கள்) அளவில் பெருகி, கலாவிழைகளை இழந்து, கோனிடிகாயைப் போல் காணப்படுகின்றன. (படங்கள் 28) ஒவ்வொரு ஊகோனியத்திலும் ஓர் அண்டம் உண்டாகின்றது.



படம் 30

படம் 30, வாக்காகத் ஊகோனியச் செல்களின் கலாவிழை, வாக்காகத் தண்டத்தின் கலாவிழைக் கூட்டமைவின் ஒரு பாகத்தின் புறத்தோற்றம்

இத்தருணம், ஆந்தரோஜாய்ட் ஒன்று பகை உறை வழியாக ஊகோனியத்துக்குள் புகுந்து அண்டத்தைச் சுற்றி நீதி முடிவில் அதனோடிணந்து கருவுறச் (fertilisation) செய்கின்றது (படம் 29). உடனே கருவுற்ற அண்டம் ஒரு செல் உறையை உண்டாக்கிக் கொண்டு கைகோட்டாக மாறுகிறது (படம் 30). இை சமயங்களில் கருவுறாமலேயே இத் நிகழ்ச்சி ஏற்படும். இது கலாவிழை இனப் பெருக்கம் அல்லது பார்த்தனோஜெனீஸிஸ் (parthenogenesis) எனப்படும். கைகோட்டின் உறை முன் அமைப்புச் (spiny) கொண்டதாக இருக்கும். மற்றும்,

அது ஹெமடோக்ரோம் என்ற வண்ணப் பொருளினால் ஆரஞ்சு நிறமடைகிறது. இவ்விதமாக உண்டாகும் கைகோட்டுகள் கட்டமைவு அழிவுறுதலால், நீர் வற்றும் போது தரைமட்டத்தில் அமிழ்ந்து ஒவ்வா நிலையை அடைகின்றன. கைகோட்டின் உறை (வெளிப்புற) எக்ஸோஸ்போர் (exospor), (கட்டப்புற) எண்டோஸ்போர் (endospor) என இரு படலப் பிரிவுகளைக் கொண்டது. அடுத்த மழைக்காலத்தில் கைகோட் மூளைக்கும்போது அதன் நுக்கியல் மையாலின் (miosis) முறைமிக் பாருபாடடைகின்றது. இத் தருணம் எக்ஸோஸ்போர் வெடித்து, எண்டோஸ்போர் ஒரு செவ்விய பைமைய் போல் வெடிப்பின் வழியாக வெளிவருகிறது. கைகோட்டின் புரோட்டோபிளாஸ்ட் அப்கைக்குள் நுழைந்து இருககை விசை ஜூஸ்போராக மாறுகிறது. இத்த ஜூஸ்போர் வெளிப்பெருமல் அப்கைக்குள்ளேயே அடுத்தடுத்துப் பாருபாடடைத்து (பாலிஸ்ஸாப் பெருக்கத்தில் போது உண்டான ஹெமோசைட்டுகள் போல) ஒரு புதிய கட்டமைப்பை உண்டாக்குகின்றது. நாளடைவில் இத்தப் புதிய கட்டமைப்பு வளர்ந்து அளவில் பெரிதாகி மூதிர்ந்த கட்டமைவாகச் செலப்படுகின்றது.



படம் 31

ஹெமோசைட்டுகள்—பற்றுச் செல்
மூலக் காலப்பகுதி இறை

பெருங்குடும்பம் : குளோரோகாக்டேலிக்

குடும்பம்—ஹாலிடேகி

இக் குடும்பத்தைச் சார்ந்த ஆங்காக்கள் உருளை அல்லது கோள வடிவம் கொண்டவை ; இவங்கும் தன்மையற்றவை ; தனித்தும் கட்டமாகவும் காணப்படுகின்றன. பைக்கனில்கள் கொண்டவை, இனப்பெருக்கத்தின்போது மட்டுமே செவ்வின் புரோட்டோபிளாஸ்டு 2,4,6,8 அல்லது ஏழ்வேனோஸ்போர் எனாக பகுப்படைகின்றது.

குளோரெல்லா (Chlorella)

இது ஒரு ஒற்றை (படம் 38) செல் ஆகலா. பண்பணங்கப்பட்ட சூழ்நிலைகளில் காணப்படுகிறது. ஏரி, குளங்களில் வாழ்கிறது. சில சிற்றிலங்குகள் இக்கல்களுடன் கலந்து கூட்டுயிர் வாழ்க்கை நடத்துகின்றன. சில ஹைட்ரா விரிவுகள் என்ற சிலண்டெரோட்டுடன் கூட்டுயிர் வாழ்க்கை புரிகின்றன. சில சாதுண்ணிகளாகவும் வாழ்கின்றன.

இதன் அமைப்பு மிகச் சிறிய கோளவடிவமாகும். செல் சுவர் மூன்றடுக்குகளால் ஆனது. வெளியுறை சவ்வரையும், நடு உறை பெக்டோஸாலும், உள்ஹைட்ரோசெல்லுலோசாலும் ஆனது. பசுக்கல்கம் கோப்பை வடிவம் கொண்டது. இயக்கம் ஆற்றவை. விரிந்து கருங்கும் துணுதுழிதிகள் இடையாது. எலக்ட்ரான் துணுதுழிதிகள் பசுக்கல்கம் 'C' வடிவம் பெற்ற சவ்வுகள் போன்று தோன்றுகிறது. திழுகளியல் ஈருறை கொண்ட துணுதுழிதிகள் காணப்படுகிறது. மைட்டோகாண்டிரியோம்கள், டிப்டிபோஸோம்கள், லைசோசோம்கள் உள்ளன.

இனப்பெருக்கம்

ஆட்டோஸ்போர் என்ற தனிச் சிறப்பு வாய்ந்த ஸ்போர்களின் மூலம் பானிய இனப்பெருக்கம் மட்டும் நடைபெறுகிறது. புரோட்டோபிளாஸ்ட்டு 2, 4, 6, 8, 16 பாகங்களாக பிரிவடைந்து ஒவ்வொன்றும் ஒவ்வொரு ஏப்ரேனோஸ்போராசு உருபெறுகின்றன. ஏப்ரேனோஸ்போர்கள் தாய்ச்செல் வடிவம் பெற்றதால் இவைகளுக்கு ஆட்டோஸ்போர்கள் என்று பெயர். இவை இயங்கும் தன்மைபற்றின. இரு செல் சுவர்களால் சூழப் பட்டவை. தாய்ச்செல் சிதைவடைந்து இவை வெளியேற்றப் படுகின்றன. ஒவ்வொரு செல்லும் பிறகு பெருகித் துழுவளர்ச்சி பெற்ற குளோரெல்லா செய்ளாகின்றன.

சிறப்பு பண்புகள்

இவைகளை எளிதில் குளுகோஸ்—அகார் செயற்கை வளர் தளத்தில் (culture) வளர்க்கலாம். சில சிற்றிலங்குகள் மரச் சாகு களிலும் வளரும் தன்மை பெற்றுள்ளன. குளோரெல்லா ரூப சென்சி (chlorella rubescens) என்ற சிற்றினம் ஜெலாட்டின நீர்மமாகவும் தன்மைபெற இலையில் இச் செல்களுக்கு அணங்கை கைட்டாஜன் அளித்தால், புரதசேர்க்கை புரிகிறது.

மேஸசூசெட்ஸ் சிறப்புகள்

அண்மை காலத்தில் குளோரெக்ஸா பொருளாதார சிறப்பில் மிக முக்கிய பங்கு வகித்துள்ளது. இதில் புரதம், கெளஸ்டியம், வைட்டமின் மற்றும் பல் வைட்டமின் பொருள்கள் அதிகமாகக் காணப்படுவதால் இது ஒரு முக்கியமான உணவாகிறது. இதனால் இதை அமெரிக்கா, ஐரோப்பா, ஹாலந்து, ஜெர்மனி, இங்கிலாந்து முதலிய நாடுகளில் பயிரிடுகின்றனர். இதற்கு அதிக அளவு நீர் தேவையாகும். வானவெளி கப்பலோட்டிகள், வானவெளி பயணங்களில் இதை பயிரிட்டு உணவாக எடுத்துக்கொள்ளலாம்.

சுழிவு நீரை சுத்தப்படுத்தவும் இது உபயோகமாகின்றது. இது ஒளிச்சேர்க்கையின்போது அதிக அளவு ஆக்ஸிஜன் வெளிவிடுவதால் இதை பாக்கிரியம்சம் ஏற்று அக்கக் சுழிவுப் பொருள் களை சிதைக்கின்றன. ஐக்கிய அமெரிக்க நாடுகள், நியூஜியாந்த்லாந்து ஆகிய நாடு முதலிய இடங்களில் சுழிவு நீரை சுத்தப்படுத்தி அதை மறுபடியும் பயிர்களுக்கு (oxidation ponds) பயன் படுத்துகின்றனர்.

மேஸசூசெட்ஸ் (massachusetts) நாட்டைச் சார்ந்த ஆர்தர்-டி-லிடில் (Arthur-D-Little) என்பவர் ஒரு தானில் ஒரு சதுர மீட்டர் அளவில் 20 கிராம் குளோரெக்ஸாவை உற்பத்தி செய்ய முடியும் என்று கூறுகிறார். ஐரோப்பா நாட்டில் குளோரெக்ஸா கேக் செய்து சாப்பிடுகின்றனர்.

ஒளிச்சேர்க்கை சோதனைகளில் இதை உபயோகிக்கின்றனர். இதை எந்த ஒழிநிலையிலும் வளர்க்க முடியும். இதில் தடைபெறும் ஒளிச்சேர்க்கை உயர்தாவரங்களில் தடைபெறும் ஒளிச்சேர்க்கைக்கு சமமானவாகும். இதன் புரத இருப்பு மிக அதிகம் (40%). பல் முக்கியமான அமினோ அமிலங்கள் இதில் அடங்கியுள்ளன. இதிலிருந்து தரகம், கற்றோம் என்ற சர்க்கரையும் கிடைக்கிறது. இதில் முக்கிய வைட்டமின்களான வைட்டமின், ரிபோகிமினோசின், நியாசின், மிரிடோகலின், பாக்ஸோதெனிக் அமிலம், எபயோடிக், வைட்டமின் B₁₂, மிபோலிக் அமிலம் முதலியவை அடங்கியுள்ளன. $\frac{1}{2}$ பவுண்டு குளோரெக்ஸாவில் அல்லார்பிக் அமிலத்தைத் தவிர மற்ற எல்லா வைட்டமின்களும் மனிதனுக்குத் தேவையான அளவு கிடைக்கின்றது. ஐக்கிய அமெரிக்க நாடுகளில் அணுநீர் மூழ்கி (atomic submarines) கப்பல்களில் ஆக்ஸிஜனை கட்டுப்படுத்த இதை உபயோகிக்கின்றனர்.

பெருங்குதும்பம் : யூலோட்ரிகேலிஸ்
(Order: Ulotrichales)

பல செடிகள் ஒன்றோடொன்று வரிசையாக இணைதலாக உண்டாகும் நுட்பமான இழைகளை உடலுமாக உடைய பாகிகளை இப் பெருங்குதும்பத்தில் அடக்கும்.

குதும்பம் : யூலோட்ரிகேசி (Ulotrichaceae)—யூலோத்ரிக்ஸ் (Ulothrix)

இது தன்னிச்சி வளரும் பச்சைஇழைப் பாகி (filamentous) ஆகும். இளம்பருவத்தில், நீரில் உள்ள கற்கள் அங்கு செடிகளின்மீது இதன் இழைகள் ஒட்டி வளர்கின்றன. கிணக்காத இழைகளைக் கொண்ட இத்தப் பாகி, உம்பு ஷட்பம் கொண்ட



படம் 32

யூலோத்ரிக்ஸ் செவிறுள் விரைப் போன்ற பாகிகளிலுள்ள நோற்றம்

பற்றுச்செவிலுள் (hapteron ; holdfast) கற்களின்மீதும் மற்றைய நீர்த்தாவரங்களின் மீதும் பொருத்தப்பட்டு வளர்கின்றன (படம் 31). இழைகளில் உள்ள செடிகள் சூட்டையானவை, அவை ஒவ்வொன்றிலும் செவ்விழைகளிலுள்ள உறைக்கு உட்புறத்தில் லைட்டோபார்ஸைம் ஒரு படலமாக (lining layer) உள்ளது. நடுவில் செல் ரசம் நிறைந்த வாக்குவெளிகள் (vacuole) உள்ளது. வளைவம்போன்ற (girdle shaped) ஒரு பெரிய பாகங்களிலும் லைட்டோபார்ஸைத்தில் பதிந்துள்ளது (படம் 32). அப்பாகங்களில் கத்தின்மேல், சிறு வெளிநுழைகள் (pyrenoid) காணப்படும், செடிகளின் நுட்பவியல் பாகங்களிலுக்கு உட்புறம் அமைந்துள்ளது.

அடிச்செல் தவிர மற்ற எல்லாச் செடிகளும் (மையடாஸ்கில் ஒழைகள்) பாகுபாடடைதலாக பல புதிய செடிகள்

தோற்றமளிக்கப்பட்டு இழைகள் நீள்கின்றன. இப்படி ஏற்படும் வளர்ச்சிக்கு இடைவாக்க வளர்ச்சி (intercalary growth) என்று பெயர். இவ்விதமாக மிகவும் நீண்டு வளர்ந்த இழைகள் அடித்தளத்திலிருந்து பெயர்ந்து நீர்மட்டத்தை அடைந்து மிதக்கும் நிலையைப் பெறுகின்றன.

உடனடி பெருக்கம் (Vegetative reproduction)

இத்தகைய பெருக்கம் சாதாரணமாக மிதக்கும் இழைகளில் தான் நடைபெறும். மிதக்கும் இழைகள் துண்டுதுண்டாகப் பிரிதலினாலும் இவ்விதப் பெருக்கமடைகிறது. நீரில் உள்ள சிறு துத்துகளில் கொரித்தலாலும் (nibbling) இழைகளின் இரு செவ்வாக்கு மத்தியிலுள்ள நடுப்பு இடைவாக்கு (middle lamella) களைத்து விடுவதாலும் இழைகள் தனித்தனியே பிரிய வழி ஏற்படுகின்றது. துண்டிக்கப்பட்ட இழைகள் பின்னர் வளர்ந்து தனித் தனி இழைகளாக முதிர்ச்சியடைகின்றன.

பாவினா இனப்பெருக்கம்

இப்பெருக்கம் பெரும்பாலும் சூழ்நிலை அனுகூலமாக இருக்கும் போது ஏற்படும். அப்போது பற்றுச்செல் தனி மற்ற ஒவ்வொரு செல்லும் ஒன்று அல்லது நான்கு கணையிறை ஜூஸ்போர்களைத் தோற்றுவிக்கிறது (படம் 33). இச் சமயத்தில் சில அகன்ற இழை கொண்ட சிற்றினங்களில் (broad species) குறைந்த அளவிலே (1,2,4) ஜூஸ்போர்கள் தோற்றுவிக்கப்படுகின்றன. அதன்




படம் 33

பூமோதிரிக் செல் பரோட்டோபிரோட்டோ மாகு

பாடகடத்து ஜூஸ்போர்கள் உண்டாகும்

காரணமாக அவை உருவத்தில் பெரியவனவாக இருக்கும். ஆதலின் அவை மேகரோ ஜூஸ்போர்கள் (macro zoospores) என வழங்கப் படுகின்றன (படம் 34). மற்றக் குறுகிய இழை (narrow species)

கொண்ட சிற்றினங்களில் ஜூஸ்போரிகள் சிறியனவாக இருத்தலால், அவை கைக்ரோ ஜூஸ்போரிகள் (micro zoospores) எனப்படும் (படம் 34). இந்த ஜூஸ்போரிகள் முழுணர்ச்சிவடைந்த ஆட்க் செல்லின் பக்க உறையில் (lateral wall) உண்டாகும். சில துவாரத்தின் வழியாக ஒரு செல்லிய அபயாக் சூழப்பட்டு



படம் 34

பூமேதரிகள்—4-கைச இழை மேக்ரோ ஜூஸ்போர்
பூமேதரிகள் 4-கைச இழை மைக்ரோ ஜூஸ்போர்

வெளியே வருகின்றன. சில விநாடிகளுக்குப் பிறகு அபயானது கரைத்து விடுதலால் ஜூஸ்போரிகள் பல திசைகளிலும் நீந்திப் பரவுகின்றன. நீரிழைகள் பொருளில்மீது (அல்லது தாவரங்களின்



படம் 35

பூமேதரிகள்—காமிடிகள்

மீது) ஜூஸ்போரின் கைசயிழை கொண்ட நுனிப்பாகம் முதலில் படிவிறது. பின்னர் கைசயிழைகளை விடுத்துச் செல்லின் அடிப்பாகம் அடித்தளத்தின்மீது உறுதியாகப் பற்றிக் கொள்கிறது.

யின்னர் குறுக்குவாட்டில் அச்செல் பாகுபாடடைகிறது. இவ்விதமாக உண்டாகும் இரு செல்களின் சிழ்ச்செல், பாகுபாடடையும் திறைத்து, பற்றுச் செல்லாக செயல் புரிகிறது. மற்றப் பாகுபாடுகள் யாவும், மேல் செல்லினும், அதனின்ற வரும் செய்ச் செல்களினுமே தொடர்ந்து தடைபெறுகின்றன. பாகுபாடுகள் யாவும் குறுக்குவாட்டிலேயே தடைபெறுவதாக, பூனோத்ரிக்ஸின் உடலம் எம்பொழுதும் ஓரடுக்கு இழைவாகியே (uniseriate filament) காணப்படுகிறது.

மாலினப் பெருக்கம்


நீர் வற்றும் சமயம் (கோடைகாலம்) நெருங்கும்போது மாலினப் பெருக்கம் நிகழ்கிறது. அண்மையம் இழையில் உள்ள செல்கள் (பற்றுச் செல் தவிர) 8, 16 அல்லது 32 இரு கணையிழை காரீட்டுகளைத் தோற்றுவிக்கின்றன (படம் 35).

இந்த காரீட்டுகள் தூவியோர் தோன்றும் முறையிலேயே உண்டாகின்றன. அதாவது, மேல்விய அபயித் அடக்கியபடியே துளாரத்தின் மூலம் காரீட்டுகள் வெளி வருகின்றன. (படம் 35). இந்த உறைவற்ற காரீட்டுகள் (naked gametes) அபயியின்றும் வெளியேறியவுடன் ஒன்றையொன்று அணுகிப் பக்கவாட்டில் ஜோடியாக இணைகின்றன (படம் 36). ஆனும், இவ்விதமாக இணையும் காரீட்டுகள் சாதாரணமாக வெவ்வேறு இழைகளினின்றும் தோன்றியவையே ஆகும். இந்த இணைப்பின் போது முதலில் இரு டிரோட்டோ

யினான்றனும் மின்னர் இரு நூக்கியல்களும் இணைகின்றன. ஆகவே, இந்த 4 கணையிழை கண்கோட்டுகள், சில மணி நேரம்



காரீட்



படம் 36

பூனோத்ரிக்ஸ்—இரு கண இழை காரீட்; பூனோத்ரிக்ஸ்—இரு காரீட்டுகள் இணைதல்; பூனோத்ரிக்ஸ்—4 கண இழை கண்கோட்; பூனோத்ரிக்ஸ்—ஒரு பெரும் கண்கோட்

நீரில் நீந்தி, முடிவில் நீரிலுள்ள அடித்தளங்களின்மீது படிபெற்றன. பின்னர், கசையிழைகள் நீங்கப்பெற்று, அவை சில படவங்கள் கொண்ட உறைவை உண்டாக்கிக் கொண்டு ஒவ்வொரு நிலை அடைபெற்றன. நீர்வற்றிய பிறகு சூரிய ஒளியால் பாதிக்கப்படாதவாறு, ஆரஞ்சு நிறமிக்கி உற்பத்தி செய்து கொண்டு ஸைகோட்டுகள், மண் துகள்களுக்கு இடையே ஒவ்வொரு நிலையில் அமைத்து விடுபெற்றன (படம் 36).

அடுத்த மழைக்காலத்தில் ஸைகோட்டு முளைக்கும்போது (மையானில் மூன்றா பாகுபாட்டிற்குப் பிறகு) 4, 8 அல்லது 16 நாளுக்கு கசையிழை ஜூன்போர்கள் உண்டாகி உறை மின்னிறும் வெளியேறிப் பாலினம் பெருக்கத்தின் போது நிகழ்ந்த வண்ணம் புதிய இழைகளை உண்டாக்குகின்றன.

பெருக்குடும்பம் : அல்வேலிசு (Order: Ulvales)


எண்டிரோமோர்பா (Enteromorpha)

இந்தப் பாசி உய்ப்புகழிகளினும் கடல்நீரிலும் பொதுவாகக் காணப்படும். இது இனப்பருவத்தில் நீண்ட, முறுக்கேறிய, குழல் போன்ற குடல் வடிவத்தைக் கொண்டுள்ளது. இதனால் தான் இந்தப் பேரினம் எண்டிரோமோர்பா எனப்படுகிறது. (படம் 37). (enteron-குடல் ; மார்பா-வடிவம்). இதன் உடலம், அடித்தளத்தில் வட்டத் தகடுவடிவமான பிடிப்பின் (hold-fast) மூலம் இணைக்கப்பட்டுள்ளது. குழல் வடிவமான உடலத்தின் (tubular thallus) குறுக்குவெட்டுத் தோற்றத்தில் செல்கள் ஓரடுக்கில் அமைந்திருப்பதைக் காணலாம் (படம் 38). சில சமயங்களில் உடலம் பிடிப்பைவிட்டுப் பிரிந்து பசுமையான ஏடுகளாக நீரில் மிதக்கும்.

உடலத்தின் செல்கள் புறத்தோற்றத்தில் பலகோண வடிவமாகக் (polygonal) காணப்படும் (படம் 39). ஒவ்வொரு செல்லிலும் ஒரு பரந்த தட்டையான (laminar) பசுக்கணிகம், ஒலிபடும் பக்கமாக அமைத்திருக்கிறது (படம் 38). பசுக்கணிகத்தின் மத்தியில் ஒரு கபரினாப்த் பொருத்தியுள்ளது (படம் 39). செல்லின் நுர்கியில் பசுக்கணிகத்துக்குக் கீழே செல்லின் உட்புறத்தில் உள்ளது.

உயிர் பெருக்கம்

தாவரவியலில் பல வளரிதல் (outgrowths) தோன்றித் தனி யாகப் பிரிந்து, அடித்தனத்தில் படிந்து, புதிய என்டிரோமார்பா வாத வளரிச்செயல்கள் நடைபெறுகின்றன.



படம் 37
என்டிரோமார்பா—வளரிதல்



படம் 38
என்டிரோமார்பா—உடலத்தின் (rhallus)
குறுக்குவெட்டுத் தோற்றம்



படம் 39
என்டிரோமார்பா—உடலத்தின்
ஒரு பாகத்தின் முதத்தோற்றம்

யானிஸா இனப்பெருக்கம்

ஐயோத்திரிக்ஸில் நிகழ்வதைப் போலவே, இந்தப் பாலியீழும் நான்கு கணையிறை ஜூல்போர்க்களால் ஏற்படுகின்றது. ஒவ்வொரு செல்லும் 4 அங்குது 8 ஜூல்போர்க்களைத் தோற்றுவிக்கின்றது. (படம் 40 ஆ) அவை புறச்சுவரில் உள்ள ஒரு சிறு பிளவின் (slit) வழியாக வெளியேறுகின்றன. இவ்வாறு வெளி வந்த ஒவ்வொரு ஜூல்போரும் அடித்தளத்தில் படந்து, ஐயோத்திரிக்ஸைப் போல், ஒற்றை வரிசை (uniseriate) இழை நிலையை அடைகின்றது. இந்த இழையில் பின்னர் இரு நீளவாட்டுத் தளங்களில் (2 planes at right angles to each other) செம்பாசுபாடு ஏற்படுகின்றது. அதன் காரணமாகப் பரந்த (expanded) இரு அடுக்குகளைக் கொண்ட (2 layered) உடவா வளர்ச்சியடைகின்றது. இவ்விரு படவக் கணுக்கு இடையே ஒரு பிளவு (spine) ஏற்படுகின்றதும் உள்வீடற்ற குழல் போன்ற என்டிரோமார்பா உடவம் உண்டாகிறது.


யானிஸா பெருக்கம்

இத்தப் புதிதாக உண்டான உடவத்தில் இனப்பெருக்கத்தில் போது, ஒவ்வொரு செல்லிலிருத்தும் இரு கணையிறை கொண்ட 16, 32 காமீட்டுகன் வெளியேறுகின்றன. இரு வேறு உடவங்களில் உண்டாகும் காமீட்டுகன் ஜோடியாக இணைந்து, 4 கணையிறை கணிகாட்டுகன் உண்டாக்குகின்றன. (படம் 40 ஈ, உ). இந்த 4 கணையிறை கணிகாட்டு சிறிது நேரம் நீரில் நீந்திக் கொண்டிருந்து பின்னர் அடித்தளத்தில் படந்து (படம் 40 ஊ) மூற்குறியவாறு படிப்படியாக என்டிரோமார்பாவின் குழல் உடவத்தை உண்டாக்குகிறது.

மேலே விவரிக்கப்பட்ட வாழ்க்கைச் சுழலில் (life cycle) ஒரு புதிய வகையான நிகழ்ச்சி ஏற்படுவதைக் காணலாம். என்டிரோமார்பா நிறப்பிளவுபுனை ஓர் உடவம் 4 கணையிறை ஜூல் போர்க்களை மாத்திரம் உண்டாக்குகிறது. இதற்கு 'ஸ்போரோஸ்பைட்டு' (sporophyte) என்று பெயரிடலாம். அடுத்தபடியாக அதே என்டிரோமார்பாவின் குணநிசயம் கொண்ட மற்றோர் உடவம் காமீட்டுகனை மாத்திரமே உண்டாக்குகிறது. இதற்கு 'காமீட்டோஸ்பைட்' (gametophyte) என்று பெயரிடலாம். ஆகவே ஒரு வாழ்க்கை சுழலில் இரு சந்ததிகள் காணப்படுகின்றன.

மற்றும் ஸ்போரோஸ்பைட் உடவத்தில் உண்டாகும் 4 கணையிறை ஜூல்போர் அடித்தளத்தில் படந்து மூளைக்கும் பொழுது காமீட்டை உண்டாக்கும் காமீட்டோஸ்பைட்டாகவே மூளைக்கிறது.

அது போலவே, காமீட்டுகள் இளைத்து ஊன்கோட் உண்டாகி, அது அடித்தளத்தின் படித்து முளைக்கும் போது ஸ்போரோபைட்டாகவே முளைக்கிறது.



படம் 40

ஊன்கோட்டின் வாழ்க்கைச் சுழற்சி: A, ஸ்போரோபைட்டம், B, காமீட்டோபைட்டம், C, காமீட்டோபைட்டம், D, ஊன்கோட், E, ஊன்கோட், F, ஊன்கோட், G, ஊன்கோட், H, ஊன்கோட்.

ஆகவே, இங் வாழ்க்கைச் சுழற்சி இரு சந்ததிகள். அதாவது ஸ்போரோபைட்டம், காமீட்டோபைட்டம் மாறிமாறி ஒன்றுக்குப்பின் ஒன்று அடுத்தடுத்துவருவதால் இந் திசுழ்ச்சிக்கும் சந்ததி மாற்றம் (alternation of generations) என்று பெயர் இடப்பட்டுள்ளது.

இந்த இரு சந்ததிகளும் ஒத்த புறத்தோற்றத்தை (morphologically similar) உடையன. ஆனால் செயல்படும்பொது (functionally)

ஃபோரோஸைட் சத்தி, ஜூஃபோரிக் மூலமாகப் பாலின இனப் பெருக்கத்தையும், காமீட்டோஸைட், காமீட்டுகளின் மூலமாகப் பாலினப் பெருக்கத்தையும் தடைபெறச் செய்கின்றன. ஆகவே, இத்தகைய சத்தி மாற்றம், உருவம் ஒத்த சத்தி மாற்றம் (isomorphic or homologous alternation of generations) என்று வழங்கப்படுகிறது. ஃபோரோஸைட் சத்தியில் ஒவ்வொரு உடலுச் செவினும் நூக்கியல் பாகு பாட்டையும் போது 20 குரோமோசோம்கள் (chromosomes) காணப்படுகின்றன. ஆனால், ஜூஃபோரிக் உண்டாகும் செக்களில் நூக்கியல் மையவளின் (meiosis) மூலையில் பாகு பாட்டையும் போது குரோமோசோம்கள் 10 ஆகக் குறைக்கப் படுகின்றன (படம் 40 அ, ஆ). ஆகவே, ஜூஃபோரிக் ஒத்தமய (haploid) நிலையடைத்து, காமீட்டோஸைட் சத்தியைத் தொற்றுவிக்கும்போது எவ்வாச் செக்களின் நூக்கியல்களும் ஒத்தமய நிலையடிக் பெற்றிருக்கின்றன (அதாவது, 10 குரோமோசோம்கள்). காமீட்டுகள் உண்டாகும் செக்களில் நூக்கியல் மையவளின் (mitosis) பாகுபாட்டையே கொண்டிருக்கலாம், ஒத்தமய நிலைய நீடிக்கக் காரணமாகிறது. இரு காமீட்டுகள் இணைந்து ஸைகோட்டாக மாறும் போது, இரு நூக்கியல்கள் இணைவதன் மூலம், இரட்டைய நிலை தோன்றி ஸைகோட்டிலிருந்து வரும் ஃபோரோஸைட்டும் இரட்டைய நிலைய (diploid) அடைகிறது. ஆகவே, நூக்கியலின் தன்மைமீறும் இரட்டையமம், ஒத்தமயமம் மாறி மாறி வருவதை இந்த வாழ்க்கைச் சுழலில் காணலாம்.

பெருக்குடும்பம் ஃபோரோலிஸ்

(Order : Chaetophorales)

இப் பெருக்குடும்பத்தின் உள்னடக்கிய பேரினங்கள் சிறுப் பாக இரு இயல்புகளைக் கொண்டுள்ளன. ஒன்று, இயற்றின் உடலம் சிறைட்டத்திக் படித்த தொகுதி (prostrate system) ; அதனின்றும் மேல்வளரும் செக்குத்தான தொகுதி (erect system) ஆகிய இரு பாகங்களைக் கொண்டுள்ளது. ஆகையால், இவை ஹெட்ரோட்ரிக்கஸ் வளநிலையம் (heterotrichous habit) கொண்டவை. மத்தென்று சில செக்களிலிருந்து செக்குத்தான ரோமம் போன்ற 'செட்' (seta) எனப்படும் உறுப்பைக் கொண்டுள்ளதாகும்.

கோலீயோகீட்டி (Coleochaete)

இது தண்ணீரில் காணப்படும் தொற்றிவாழ் (epiphytic) பசும் பாலியாகும். நீரில் மற்ற தாவரங்களின் மேலே அல்லது பெரிய பாசிகளில் மேலே காணப்படும். இதன் உடலம் இலைந்த இலைகளால் ஆக்கப்பட்டது. சில சிற்றினங்களில் (கோ-ஸ்கூட்டோ - *C. scutata*) இவ் விதமான இலைகள் பக்கங்களில் ஒன்றோ



படம் 41

Coleochaete scutata-ஸ்கூட்டோ-ஸ்கூட்டோகால்களால்
கூட்டப்பட்ட உடலத்தின் தோற்றம்

டொன்று இலைந்து வட்டத் தகடு போன்ற அமைப்பைப் (discoid) கொண்டுள்ளது (படம் 41). மற்றைய சிற்றினங்களில் (கோ-பல்லையோ-*C. pulvinata*) (படம் 44). இலைகள் இலைத்துத் தனித்தனியே அமைந்திருக்கின்றன. மற்றும் இவ்விதமான உடலத்தில் படித்த சில இலைகளும், செங்குத்தான சில இலைகளும் அமைந்து ஹெட்ரோடினரக்கல் வளர்வியல்பைக் காட்டுகின்றன.

செல் ஒவ்வொன்றிலும் தான் அல்லது தகடு (laminar) போன்ற பக்கங்களில் ஒன்று உள்ளது. அதன் நடுவே ஒரு ஸ்பைரோப்டு காணப்படும் (படம் 42). ஒவ்வொரு செல்லும் கனிகத்திற்கு உட்புறத்தில் ஒரு நுக்கியைக் உள்ளது. சில செல்களிலிருந்து நீண்ட ரோமம்போன்ற செங்குத்தான ஸீடா (seta) காணப்படுகிறது. இந்த ஸீடா முழுதும் ஸ்கூட்டோ பிளாசத்திலிருந்து செல்லுறையிலுள்ள ஒரு நுண்ணுரி வறியாக வெளி வருகிறது. இந்த ஸீடாவின் அடிப்பாகத்தில் ஓர்



படம் 42

Coleochaete ஒரு
புறத்தின் புறத்தோற்றம்

உறை (sheath) அமைந்திருக்கிறது. இந்த ஸீடாவின் பணி நீரில் உள்ள காயுக்களையும் உப்புச் சத்துக்களையும் கிரகித்தனெ என்று கருதப்படுகின்றது.

பாலின இனப்பெருக்கம்

இத்தப் பாலினில் பாலினா இனப் பெருக்கம் இரு கணவியை ஜூல்போர்சனிலும் நடைபெறுகின்றது. ஒரு செவ்விலிருந்து ஒரு ஜூல்போரே தோன்றி, ஒரு மூண்மைய துவாரத்தின் வழியாக



படம் 43

கோ, பக்வைனேட்டா—ஆந்தரிகியத்தின் தோற்றம்


கோ, பக்வைனேட்டா—கோலியத்தின் தோற்றம்

மெதுவாக வெளிவருகின்றது. இந்த ஜூல்போர் சிறிது நேரம் நீர்த்நீய் பிறகு அங்குள்ள ஏதாவது நீர்த் தாவரத்தின் மூழ்கிய பாகத்தில் படித்து முளைக்க ஆரம்பிக்கிறது. தொடர்ந்து செல் பாகுபாடு அடைவதன் காரணமாகப் பல செல் கொண்ட உடலம் தோன்றுகிறது.

பாலினப் பெருக்கம்

இத்தப் பாலினில் மேம்பட்ட கணவரி மூன்றலில் பாலினப் பெருக்கம் காணப்படுகிறது. ஆந்தரிகியமானது துணியற்ற கூம்பு போன்ற வடிவத்தைப் பெற்றுள்ளது. ஒவ்வொரு ஆந்தரிகியமும் (படம் 43) ஓர் இருகணவியை ஆந்தரோஜாய்க்குத் தோற்றுவிக்கிறது. ஊகோலியமானது கூம்புக் குவளை போன்ற (படம் 43) டிகைரக்கோவைகள் (trichogyae) என்ற குழல் போன்ற பாகத்தைக் கொண்டுள்ளது. கோ, பக்வைனேட்டாவின் (C. pulvinata) இந்த அமைப்புத் தெனியாகக் காணப்படுகிறது. ஆனால், சில

சிற்றிதழ்களில் (கோ. க்குட்பொ—C. scutata) டிரைக்கோமைகள் தங்குதலிட்டு வளராமல் இருத்தலால் தெளிவாகத் தெரிகிறதில்,




படம் 44

கோ. பல்பைகோட்டா-ஸ்பெர்மோகார்ப்
உண்டாகும் படிவங்கள்.

ஊகோலியத்தின் கீழ் அமைந்துள்ள செல்களிலிருந்து கிரேன்கள் மேல்நோக்கி வளர்ந்து ஊகோட்டை முற்றிலும் மூழ்த்து, பன

ஸ்பெர்மோகார்ப்



ஸ்பெர்மோ

படம் 45

கோ. பல்பைகோட்டா-ஸ்பெர்மோ
கார்ப் முளைத்துப் போது ஸ்பெர்மோ
கர் உண்டாகும் கிண.

ஊகோலியத்தின் அகன்ற அடிப்பாகத்தில் உள்ள ஊட்டப் பொருளாகச் செல் உறை யினின்றும் பிரித்து அண்ட மாகச் செயல்படுகின்றது. இத் தருணத்தில் டிரைக்கோமைகள் மூலி உறை கரைத்து அதன் மூலம் ஒருவித வேதிப் பொருள் (chemical substance) கிளிகின்றது. இந்தப் பொருள் நீர்த் திசுக் கொண்டிருக்கும் ஆத் தரோஜாய்வுகளை ஊகோலி யத்திற்கு எரிக்கிறது. ஓர் ஆத் தரோஜாய்வு டிரைக் கோமைக் குழாயில் புகுந்து உட்சென்று கிழே உள்ள அண்டத்துடன் இணைந்து, கருவுற் (fertilisation) செய்கிறது. இங் வாறு உண்டான ஊகோட், உடனே தனி உறைவைச் சுரப் பித்துக் கொண்டு பெரிதா கின்றது. அதே சமயம்

செல்களாலான உறைவை உண்டாக்குகின்றன (படம் 44). இங் விதமாக ஊகோட்டும் அதைச் சுற்றியுள்ள செல்களின் உறையும் சேர்ந்து 'ஸ்பெர்மோகார்ப்' (spermatocarp) என்ற கிழ்குட்பாடி ஒன்று உண்டாகிறது (படம் 41). இந்த ஸ்பெர்மோகார்ப் ஆரஞ்சுவண்ணம் கொண்டு தண்ணீர் வற்றிய காலத் தில் ஒவ்வா நிலைமை அடைகிறது. அடுத்த மழைக்காலத்தில் இந்த ஸ்பெர்மோகார்ப், மூலக்க ஆரம் பிக்கும் பொழுது இரட்டைமய மான ஊகோட் றுக்களியல், மையங்களில் மூலையில் பருபட்டுப்

பின்னர் 8, 16, 32 இரு கணயிதை ஜூல்போர்கள் உண்டா
கின்றன (படம் 45). இந்த ஜூல்போர்கள், கம்பெர்மோகார்ப்,
கனடோட் ஆகியவைகளின் உறைகள் பிளவுபடுவதன்மூலம்
வெளியேறி, அடித்தளத்தில் படித்து புதிய உடனத்தை (குறிப்
பிட்ட சிறப்பியல்புகளைப் பெற்ற சிற்றினத்தின் உடனத்தை)
உருவாக்குகின்றன.

பெரும்குடும்பம் : ஐனோபொரேலிஸ் (Order : Cladophorales)

ஐனோபொரா (Cladophora)

ஐனோபொரா, கிளைத்த (branched) இழை உடலம் கொண்ட
ஒரு பசும்பாசியாகும். இது நீரில் உள்ள கற்கள், நீர்த் தாவரங்கள்
மீதும், நத்தை ஒட்டின்மீதும் படித்து வளர்கிறது (படம் 46).
இந்தப் பாசியின் சில சிற்றினங்கள் நன்னீரிலும், சில சிற்
றினங்கள் கடலிலும் காணப்படுகின்றன.

இந்தப் பாசியின் இழைகள், பல நீண்ட கிளைத்த கரஜாய்டு
களால் அடித்தளத்தில் நிலைநிறுத்தப்பட்டிருக்கின்றன. ஒவ்
வொரு இழையும் ஒற்றை அடுக்கில் (uniseriate) அமைந்த பல
நீண்ட, உருளை வடிவம் கொண்ட செல்களால் ஆக்கப்பட்டுள்ளது
(படம் 46). இழைகள் பக்கங்களில் கிளைகளைக் கொண்டுள்ளன.
ஒவ்வொரு கிளையும் மூல இழையின் (axial filament) செல்களின்
மேல்பாகத்திலிருந்து ஒருபக்க வளர்வாகவே (out growth)
தோன்றுகிறது. இவ்விதமாக வளரும் நிலையில் முதல் குறுக்குச்
சுவர், அக் கிளையைத் தாங்கும் செல்களின் மேல் குறுக்குச் சுவருக்கு
வெகு அருகில் அமைகிறது. இத் தன்மை இந்தப் பாசியின் சிறப்
பியல்புகளில் ஒன்றாகும்.

செல்லின் உறை பருமனாக, பல படலங்கள் கொண்டது
(stratified). இவ்வுறை உட்புறத்தில் செல்லுலோஸாலும் (cellu-
lose), வெளிப்புறத்தில் கைட்டினாலும் (chitin), மத்தியில் பெக்
டிக் (pectic) பொருளாலும் ஆகிய மூன்று படலங்களைக் கொண்
டுள்ளது. செல்லின் உட்புறத்தில் வலையமைப்பைக் கொண்ட,
உருளைவடிவப் பசுக்களிகம் செல் முழுதும் பரவியுள்ளது. ஒவ்
வொரு பசுக்களிகத்திலும் பல அபரீணும்கள் (pyrenoids)
உள்ளன. பசுக்களிகத்துக்கு உட்புறத்திலுள்ள கைட்டோ
பிளாசத்தில் பல நூக்கியங்கள் அமைந்துள்ளன. ஆகவே,
நா-4

கிளாடாபோராவில் பல நுக்கலியல் (multinucleate) அமைப்பு அல்லது கெனோசைடிக் (coenocytic) நிலை காணப்படுகிறது.



படம் 46


கிளாடாபோரா—கனசியல்

கிளாடாபோரா—கிளத்த இயல்பின் தோற்றம்

பாலின இனப்பெருக்கம்

கிளாடாபோராவில், பாலின இனப்பெருக்கம், பூனோதிக்கலில் நிகழ்வதைப்போல 4 கணவிகழ ஜூல்போரிகளாக நிகழ்கிறது (படம் 47 இ). இவை பெரும்பாலும் கிளைகளின் துண்டுகளில் உள்ள செங்களில் முதலில் உண்டாகின்றன (படம் 47 ஆ). முதலில் செங்களில் உள்ள நுக்கலியல்கள் பாகுபாட்டின் மூலம் பனவாகப் பெருக, செல் புரொட்டோபிளாக்ட் ஒற்றை நுக்கலியல் பாகங்களாகப் பிரிவ அமை ஒவ்வொன்றும் ஒரு

ஜூன்போராக மாற்றம் அடைகின்றது. இத்தருணம், செவ்விய நுளி அகலது மேல்பாகத்தில் செல் உறைவிக் ஒரு சிறு துளாரம் தோன்றி அதன் வழியே ஜூன் போர்கள் தனித்தனியே ஒன்றன்பின் ஒன்றுக் கெவனிலு கின்றன. சிறிது நேரம் நீத்திச் சுற்றிய பிறகு ஜூன்போர் ஏதாவது ஓர் அடித்தளத்தில் கைசயிழை பாகத்தை முதலில் டடிவ வைத்து, ஒரு செல் துறைவையச்சுரப்பிக் கொண்டு முனைக்க ஆரம்பிக்கிறது. செவ்விய உள்ள நுளினியன் பாகு பாடடைத்து பன் நுளினியன் அமைப்பைக்கொண்டு மற்றும் குறுக்குப் பாகுபாட்டின்மூலம் கிளைத்த இழை உடவத்தை உண்டாக்குகிறது. கிளைபுண்டாகும் காலத்தில் முதலில் செவ்விய மேல் பாகத்தில் (அதாவது, மேல் குறுக்குச் சுவருக்குக் கீழே) ஒரு பாகத்தில் விளிம்பு ஏற்பட்டு, அது சிறிது வளர, அதன் அடிப்பாகத்தில் ஒரு குறுக்குச் சுவர் தோன்றி அக்கிளை மூல இழை செவ்வியிலிருந்து பருக்கப்படுகிறது.



படம் 47

கி. கிளாமேரேட்டா (C. glomerata) வாழ்க்கைச் சுழற்சி

- அ. உடம்பு, கி. ஜூன்போரம்
- இ. கிளை இழை ஜூன்போர்
- உ. கிளை இழை கிளைப்பதுகள்
- உ. கிளைப்பது

பாவினம் பெருக்கம்

308570

SUN 22

கிளைப்பது காலப்போகையில் தடைபெறுகின்றது. இந்த காலப்போகில் உண்டாவதும் வெளியேறுவதும், ஜூன்போர் உண்டாவதையும் வெளியேறுவதையும் போன்றதாகும். இந்த காலப்போகில் வெளியேறுதலின் ஜோடியாக இணைத்து கிளைக்கோட்டு கிளைத் தோற்றமிகின்றன. ஆனால், வெவ்வேறு உடவங்களில் (heterothallic) உற்பத்தியான காலப்போகில் ஒன்றையொன்று அணுகி இணைகின்றன.

கிளைப்போரா வாழ்க்கைச் சுழற்சி நன்னீர் (fresh water) சிற்றினங்களுக்கும், கடல்நீர் (marine) சிற்றினங்களுக்கும் வேறுபட்டு காணப்படுகிறது. இவ்வித வேறுபாட்டின் சிற்றினங்களின் உதாரணங்களைக் கொண்டு விளக்குவோம்.


கோடாபோரா கோமரோபா (*Cladophora glomerata*) என்னும் தன்விர்ச் சிற்றினத்தின் வாழ்க்கை வரலாற்றை முதலில் காண்போம். இத்தப் பாலியின் செவ்வில் ஒவ்வொரு நூக்கியலும் இரட்டைமயத் (diploid) தன்மையுடையது. ஆகவே, பாலினப் பெருக்கத்தின்போது முன்கூறிய முறைப்படி உண்டாகும் ஜூல் போர்கள் ஒவ்வொன்றும் ஒரே இரட்டைமய நூக்கியலையே கொண்டு அது புதிய இழையாக முளைக்கும்போது இரட்டைமயத் தன்மையுடைய உடலத்தையே உருவாக்குகிறது (படம் 47 அ-இ).

ஆனால், இதே இரட்டைமய உடலத்தில் பாலினப் பெருக்கத்தின்போது காரீட்டுகள் உண்டாகும்பொழுது செவ்வின் நூக்கியல்கள் மையவளில் முறைப்படி பாகுபாடடைகிறது. அதனால் புதிதாக உண்டாகும் நூக்கியல்கள் ஒற்றைமயமாகின்றன. இவ்விதமாக உண்டாகும் ஒற்றைமய காரீட்டுகள் முன்கூறியவாறு ஒன்றோடொன்று இணைந்து இரட்டைமய கணிகோட்டுகளை உண்டாக்குகின்றன. பிறகு கணிகோட் முளைக்கும்பொழுது இரட்டைமய, கோடாபோரா கோமரோபா உடலமாக வளர்ச்சி அடைகின்றது (படம் 47 அ, ஈ, உ).

ஆனால், கடல்வாழ் சிற்றினங்களான கோடாபோரா கிப்ளெக்ஸி காலிஸ் (*C. kippaxalis*), சி. சூரியாறு (*C. sibiriana*) முதலியவற்றில் எண்டிரோமார்பாலில் வாழ்க்கைச் சுழலில் காணப்படுவதைப் போல் ஒத்த உருவமைப்புள்ள சத்தநி மாற்றம் காணப்படுகிறது. ஆகவே, இரட்டைமய கிப்போரோபைட் சத்ததியும், ஒற்றைமய காரீட்டோபைட் சத்ததியும் அடுத்தடுத்து அமைந்து வாழ்க்கைச் சுழல் முற்றுப் பெறச் செய்கிறது. கிப்போரோபைட் சத்தநி ஜூல்போர் தோற்றத்திலும்போது மையவளில் முறையில் நூக்கியல்கள் பாகுபாடடைவதால் ஒவ்வொரு ஜூல்போரும் ஒற்றைமயத் தன்மையடைந்து அது முளைக்கும்பொழுது ஒற்றைமய காரீட்டோபைட் உடலமாகச் செயல்படுகிறது. இவ்வித உடல்களில் காரீட்டுகள் உண்டாகும்போது ஜெல் நூக்கியல் மையட்டாவில் முறையில் பாகுபாடடைகிறது. ஆகவே ஒற்றைமய காரீட்டுகள் இணைந்து இரட்டைமய கணிகோட்டுகள் உண்டாகின்றன. இவை முளைத்து இரட்டைமய கிப்போரோபைட்டாகச் செயல்படுகின்றன. கிப்போரோபைட்டும் காரீட்டோபைட்டும் புறத்தோற்றத்தில் ஒரே அமைப்பைக் கொண்டிருந்த போதிலும் செயல்படும்பொழுது வெவ்வேறு விதமான இனப் பெருக்கச் செய்களை உண்டாக்குகின்றன (படம் 48 அ-ஈ); ஆகவே, உருவத்தால் ஒத்தும் செயலில் வேறுபட்டும் காணப்படும்

தொகுதி : குளோரோஸ்பட்டா

இரு சந்ததிகள் (உருவம் ஒத்த சந்ததி மாதிரம்) இத்தவாழ்க்கைச் சுழலில் காணப்படுகின்றன.



படம் 48


- அ. கிளோரோஸ்பட்டா (C. Klamathia)
- ஆ. கிளோரோஸ்பட்டா உடமை
- இ. கிளோரோஸ்பட்டா உடமை
- உ. கிளோரோஸ்பட்டா உடமை
- ஈ. கிளோரோஸ்பட்டா உடமை
- ஊ. கிளோரோஸ்பட்டா உடமை
- ஐ. கிளோரோஸ்பட்டா உடமை
- ஐ. கிளோரோஸ்பட்டா உடமை

பெருங்குடும்பம் : கிளோனோமேலிஸ்
(Order : Oedogoniales)

கிளோனோமேலிஸ் (Oedogoniaceae)

கிளோனோமேலிஸ் நன்னீரில் வாழும், கிளோனோமேலிஸ் ஒற்றை வரிசை இறை உடமை கொண்ட பசும்பாசிவாகும். இத்தப் பாசி, நீரில் உள்ள பொருள்களின் மேலே அல்லது மற்றுமூள்ள தாவரங்களின்மேலே பற்றி வளர்கிறது. கிளோனோமேலிஸ் இரும்புமூலம்

போன, கூம்புபோன்ற பற்றுச் செவ்வியும் இழை அடித்தளத்தில் பொருத்தப்பட்டுள்ளது. இதன் இழை நீண்ட செவ்வளானவை. செவ்விகள் ஒவ்வொன்றும் மேல்பாகத்தில் செற்று விசித்தும், கீழ்ப்



படம் 49

உடனோலியம்—பற்றுச் செவ்வியின் அளவையும் உடனோலியம்—இழையில் உள்ள ஒரு செவ்வின் தோற்றம்

பாகத்தில் செற்று குறுகியும் இருப்பதனால் இழைகளில் அடி நுனி வேறுபாடு (apical-basal polarity) காணப்படுவது இத்தப்பாசியின் சிறப்பியல்பாகும் (படம் 49).


செல் செற்றினங்களில் செவ்விறை மேலித்தும், மற்றவைகளில் தடித்துப் படவங்கள் கொண்டும் (lanceolated) உள்ளது. செவ்விக் குள் புற கையட்டோயினாசத்தில் உருவான ஊவுத்துடன் வலை வலையப்பு (reticulate) கொண்ட ஒரு பக்கங்களிலும் பறித்துள்ளது. பக்கங்களிலும் பக்கவாட்டிலும் அமைந்திருக்கின்றன. செவ்வின் ஊவுத்துடன் பக்கவாட்டிலும் உட்புறத்தில் அமைந்திருக்கிறது (படம் 49).

உடல் பெருக்கம்

இழைகள் மிகுதியாக நீண்டு வளரும்போது அடித்தளத்திலிருந்து பெயர்த்து மிதக்க ஆரம்பிக்கின்றன. இத்தகைய நிலையில் இழைப்பெருக்கம், இழைகள் துண்டிப்பதனால் (fragmentation) உண்டாகிறது.

செய் பாகுபாடு

இழையானது நீண்டு வளர்வதற்குச் செய்களின் பாகுபாட்டே காரணமாகும். இத்தப் பாகுபாட்டையும் ஆற்றலை அடிச்செய்தவிர மற்ற எல்லாச் செய்களும் பெற்றுள்ளன. கடலோளியத்தின் செய் பாகுபாட்டையும் முறை வேறெந்தப் பாலியிலும் காணப்பெறுதலும் மிக அரிதானதும் ஆகும். செய் பாகுபாடு அடைவதற்குமுன், தூக்கியல் செய்கின் மேம்பாடுகளை




படம் 50

(அ-இ) கடலோளியம்—செய் பாகுபாட்டின் படிப்புகள்

அடைகிறது. செய்கின்மேல் குறுக்குச் சுருக்குச் சிறிது கீழே ஒரு வளைவம் போன்ற (ring-like) செத்துயோலினுடைய தடிப்பு (thickening) பக்கச் சுருக்குக்குட்படும் தோன்றுகிறது. (படம் 50அ, ஆ). பின்னர் இவ்வளைவத்திற்கு வெளிப்புறத்தில் ஒரு வட்டக் கீற்று (crack) ஏற்படுகின்றது (படம் 50அ, ஆ). மேற்கூறப்பட்ட வளைவத் தடிப்பு முழுமையும் ஏற்படுத்துவதற்கு முன்பு தூக்கியலின் மைட்டாரஸில் பாகுபாடு முடிவடைகின்றது. இது செய் தூக்கியல்களும் முழுமை பெற்றவுடன் செய் புரோட்டோபிளாஸ்ட் குறுக்குப் பாகுபாட்டில் பாகுபாட்டடைகிறது (படம் 50ஆ). பின்னர் ஒவ்வொரு செய்ப் புரோட்டோபிளாஸ்டும் தாமிச்

செயின் அளவிற்கு நீங்கிறது. அச்சமயம் சிறுச் செயிப் புரோட்டோபிளாஸ்ட் செல்லுலோஸ் வளையத்தில் அடித்தளம் வரை நீங்கின்றது. ஆகவே, இந்தச் செயிப் புரோட்டோபிளாஸ்டின் பக்கங்களில் உள்ள உறை தாய்ச்செயின் பழைய உறையேயாகும். இதற்குள் மேல் செயிப் புரோட்டோபிளாஸ்டும் சிறுச்செயின் அளவுக்கே நீங்கிறது. அதே சமயத்தில் செல்லுலோஸ் வளையம் சிறிது சிறிதாக நீங்கதால் மேல் செயிப் புரோட்டோபிளாஸ்டின் பக்க உறைவாக அமைகின்றது (படம் 50 இ). ஆனால், இந்தப் புதிய செயிச்செயின் மேல்பாகத்தில் சிறிதளவு தாய்ச்செயின் பழைய உறை பாகம் இருப்பதைக் காணலாம்.



படம் 51


செயின் மேல்பாகம்—செயின் மேல்பாகம் செல்லின் மேல்பாகம்

அத்தப் பாகத்திற்கு நுனி உறை (apical cap) என்ற பெயர் பொருத்தும். இந்த செயிச்செயின் நீளவாட்ட வளர்ச்சி முற்றிலும் முடிந்த பிறகு குறுக்குச் சுவர் இரு செயிப் புரோட்டோபிளாஸ்டுக்கும் இடையே தோற்றுவிக்கப்படுகின்றது. இவ்விதமாக உண்டாகும் இரு செயிச்செயின் மேல் செயிச்செயி நுனி உறைவுடனும் (apical cap), சிறு செயிச் செயி நுனி உறை வற்றும் இருப்பதைக் காணலாம். இவ்வித நுனி உறைகள் (apical caps) ஆங்காங்கே இழையின் செவ்வரின் மேல்பாகத்தில் காணப்படுவது செல்லியத்தில் சிறப்பியல்பாகும்.

பாஸிலை இணைப்புகள்

பாஸிலைப் பெருக்கம் பல கலையிலைகள் கொண்ட ஜூன் போர்களால் ஏற்படுகின்றது. ஜூன் போர்களின் கலையிலைகள் வட்டவடிவத்தில் அமைந்துள்ளன. பொதுவாக, எந்தச் செயிக்கும்

(பற்றுச்செல் தனிர்) ஜூல்போரைத் தொற்றுவிக்கும் ஆற்றல் பெற்றுள்ள போதியும் துளியில் உள்ள செல்களை பெரும் அளவில் ஜூல்போரிகளைத் தொற்றுவிக்கின்றன. அய்விதமாகச் செயல்படும் ஒவ்வொரு செல்லிலும் ஒரு ஜூல்போரை தொன்று வதால் அது மிகப் பருமனாக உள்ளது. ஜூல்போரைத் தொற்று விக்கும் செல்லின் ஒரு பக்கத்தில் பிளெபரோபிளாஸ்ட் (blepharoplast) நுண்மணிகள் வட்டமாக அமைந்து காணப்படுகின்றன (படம் 51). பின்னர் செல்லின் புரோட்டோபிளாஸ்ட் உறையிலிருந்து பிரிந்து ஒரே ஜூல்போராக மாறுகிறது. அந்தச் செல்லின் மேல்பாகத்தில் உறையின் ஒருக்குப் பிளவு ஏற்பட்டு இந்த நுளி மூடியைத் தள்ளித் திறந்துகொண்டு ஜூல்போரை சிறிது சிறிதாக, ஒரு மெல்லிய பைலால் சூழப்பட்டு வெளிவருகின்றது (படம் 51). சில விநாடிகளில் அப்பை மறைத்து விட்ட, ஜூல்போரின் தன்மை வெகு நன்றாகப் புலப்படுகின்றது.



படம் 52-53

உட்கோளியம்—ஜூல்போர் அடித்தளத்தில் படித்து முளைக்கும் படிவங்கள் ஜூல்போர் அண்ட வடிவத்துடன் ஒளி களியும் முன்பாகத்தை ஏழும், பச்சை வண்ணம் கொண்ட பின் பாகத்தையும் கொண்டு காணப்படுகிறது. இவ்விரு பாகங்களும் சந்திக்கும் இடத்தில் பல கசையிழைகள் சிறு வட்டமாகப் பொருத்தப்பட்டிருப்பதைக் காணலாம் (படம் 51).

இந்த ஜூல்போர் சிறிது நேரம் நீந்திப் பின்னர் நீரில் உள்ள ஏதாவது ஓர் அடித்தளத்தில் கசையிழைப் பாகத்தை முன்னே கொண்டு பழுத்து, முளைக்க ஆரம்பிக்கிறது (படம் 52).

கசையினுதல் மறைத்தவுடன் அது ஒரு செத்துறையை உண்டாக்கித் கொண்டு, செக்குத்தாக வளர ஆரம்பிக்கிறது (படம் 53). முதல் குறுக்குப் பாதுபாட்டிற்குப் பிறகு சிழ்ச்செல், அடித்தளத்தைப் பற்றி வளரும் பற்றுச் செக்காகச் செயல்படுகின்றது. (படம் 53). ஆனால், மேல் செல் அடுத்தடுத்துப் பிரிவடைந்து குறிப்பிட்ட இயல்புகளைக் கொண்ட ஈட்கோனியம் உடனடியாக வளர்கின்றது. சில சமயங்களில் ஈட்கோனிய இழையில் வரிசை வாகப் பல செக்கள் தடித்து புதிய உறைகளை உண்டாக்கிக் கொண்டு ஏகைனீட் (ekinoie) எனப்படும் பானிரை இனப் பெருக்கச் செக்களைத் தோற்றுவிக்கின்றன. ஆத்திரீடியம் ஏகைனீட்டுகள் தோரணமாகத் தோற்றுவிக்கின்றன உடனடியாக உண்டாக்குகின்றன.

பானிரைப் பெருக்கம்

ஈட்கோனியத்தில் பானிரைப் பெருக்கம் மிக உன்னத முறை வான வாகுமி (oogamy) முறையில் நடைபெறுகிறது. பல கசையினுதலைக் கொண்ட சிறிய ஆண்செல்



படம் 54

ஈட்கோனியம் — ஆத்திரீடியம்
கள் கொண்ட இழைபாகம்
யில் அமைந்துள்ளன. சில சிற்றினங்களில் அவை வெவ்வேறு இழைகளில் காணப்படும்.

அல்லது ஆத்திரோஜாய்ட் (antherozoid). அசைவற்ற நிலையில் உள்ள அண்டத்தை (egg) நாடிச் சென்று இணைந்து கருவுதல் செய்கின்றது (படம் 54). ஆண் செல் உண்டாகும் செல் ஆத்திரீடியம் என்றும், அண்ட செல்லைக் கொண்ட செல் ஈகோனியம் என்றும் குறிக்கப்படுகின்றன. ஆண் உறுப்பான ஆத்திரீடியம் குறுகிய தட்டு (discoid) வடிவமானது. பொதுவாகப் பல ஆத்திரீடியங்கள் இழையில் ஒரே வரிசையில் அடுத்தடுத்து அமைந்திருக்கும் (படம் 54). சில சிற்றினங்களில் ஈகோனியம், ஆத்திரீடியம் ஆகிய இருபாக் செல்களும் ஒரே இழையில் அமைந்துள்ளன.

ஆத்திரீடியத்தைத் தோற்றுவிக்கும் இழைகளின் தன்மையை அடிப்படையாகக் கொண்டு, இப் பானியில் சிற்றினங்களை இரு வகைகளாகப் பிரிக்கலாம்,

1. மாக்ரான்ட்ரஸ் வகை (Macrandrous type)

இச் சிற்றினங்களில் ஆந்தரீடியத்தைத் தொற்றுவிக்கும் இழைகள் ஊகோலியத்தைத் தொற்றுவிக்கும் இழைகளின் குறுக்களவையே (diameter) கொண்டுவன.

2. நானோன்ட்ரஸ் வகை (Nanandrous type)


அச் சிற்றினங்களில் 1—3 செக்கள் மட்டுமே கொண்ட குட்டையான (குறுக்களவில் குறுகிய) ஆண் இழைகள் (dwarf male filament) அமைந்துள்ளன (படம் 56). ஒரு நீண்ட கம்பு போன்ற பற்றுச்செய்யவும், இரு குறுகிய (தட்டு வடிவ) ஆந்தரீடியங்களையும் மட்டுமே பெற்றுள்ளன. இந்த ஆண்இழைக்கு நானோன்ட்ரியம் (nanandrium) என்று ஆந்தரீடியைப் பெயர். இந்தக் குட்டை ஆண் இழைகள் ஊகோலிய செக்கின்மேலோ, அல்லது அதன் மேல்பகுதியிலே அல்லது சபட்டரி (sufflatory) செக்கின்மீதோ காணப்படுகின்றன (படம் 56). இந்த நானோன்ட்ரியங்கள் ஆண்ட்ரோஸ்போர் (androspore) என்னும் ஸ்போர்களைவிடுத்துத் தொன்றுகின்றன. இந்த ஒருவகை ஆண்ட்ரோஸ்போர் தட்டையான ஆண்ட்ரோஸ்போரங்கள் எனப்படும் தனித் தன்மை வாய்ந்த ஸ்போரங்களில் (androsporangium) தொற்றுவிக்கப்படுகின்றன. இவையேனோ கூறப்பட்ட ஆந்தரீடியங்கள் களைப் புறத்தோற்றத்தில் ஒத்திருக்கின்றன. ஆந்தரீடியங்களின்போல், இந்த ஸ்போரங்களையும் ஒன்றன்மீது ஒன்றாக வரிசையாக அமைந்துள்ளன. ஆனால், ஒரு ஸ்போரத்தில் ஓர் ஆண்ட்ரோஸ்போர் மட்டும்தான் உண்டாகின்றது. இது மெல்லிய தையால் மூழ்ப்பட்டு வெளி வருகின்றது. இது அளவில் ஜூஸ்போரைவிடச் சிறியதாகவும், ஆந்தரோஜர்ப்படை விடப் பெரியதாகவும் உள்ளது. உருவத்தில் அவற்றை ஒத்துள்ள இந்த ஆண்ட்ரோஸ்போர், சபட்டரி செக்கின் மீதோ, அல்லது ஊகோலியச் செக்கின் மீதோ, படித்து, முளைத்துக் குட்டை ஆண் இழையை (dwarf male filament or nanandrium) தொற்றுவிக்கின்றது. (படம் 56). ஒவ்வொரு ஆந்தரீடியமும் பல கசையிழைகளைக் கொண்ட இரு ஆந்தரோஜர்ப்படைகளைத் தொற்றுவிக்கின்றது (படம் 55). இவை ஜூஸ்போரைக் காட்டிலும் பன்மடங்கு சிறியவையும் வட்ட அமைப்பில் பொருத்தப்பட்ட கசையிழைகளைக் கொண்டவையாகும். ஆனால், கசையிழைகளின் எண்ணிக்கை ஜூஸ்போரின் எண்ணிக்கையைவிட மிகக் குறைவு.



படம் 55

ஊகோலியம்-ஆந்தரோ
ஜர்ப்படை வெளிவருதல்
ஆந்தரீடியங்களின்போல், இந்த ஸ்போரங்களையும் ஒன்றன்மீது ஒன்றாக வரிசையாக அமைந்துள்ளன. ஆனால், ஒரு ஸ்போரத்தில் ஓர் ஆண்ட்ரோஸ்போர் மட்டும்தான் உண்டாகின்றது. இது மெல்லிய தையால் மூழ்ப்பட்டு வெளி வருகின்றது. இது அளவில் ஜூஸ்போரைவிடச் சிறியதாகவும், ஆந்தரோஜர்ப்படை விடப் பெரியதாகவும் உள்ளது. உருவத்தில் அவற்றை ஒத்துள்ள இந்த ஆண்ட்ரோஸ்போர், சபட்டரி செக்கின் மீதோ, அல்லது ஊகோலியச் செக்கின் மீதோ, படித்து, முளைத்துக் குட்டை ஆண் இழையை (dwarf male filament or nanandrium) தொற்றுவிக்கின்றது. (படம் 56). ஒவ்வொரு ஆந்தரீடியமும் பல கசையிழைகளைக் கொண்ட இரு ஆந்தரோஜர்ப்படைகளைத் தொற்றுவிக்கின்றது (படம் 55). இவை ஜூஸ்போரைக் காட்டிலும் பன்மடங்கு சிறியவையும் வட்ட அமைப்பில் பொருத்தப்பட்ட கசையிழைகளைக் கொண்டவையாகும். ஆனால், கசையிழைகளின் எண்ணிக்கை ஜூஸ்போரின் எண்ணிக்கையைவிட மிகக் குறைவு.

ஊகோனியம் ஒரு பருமனான கோணவடிவமான செல்லாகும். இவ்வியின் ஏதேனும் ஒரு செல்லில் குறுக்குப் பாகுபாட்டடைந்த பிறகு மேல் செல் ஊகோனியமாகவும் கீழ்ச்செல் சபுட்டரி (suffultory) செல்லாகவும் மாற்றம் அடைகின்றன. ஆனும், சில சிற்றினங்களில் ஊகோனியங்கள் ஒன்றன்மேல் ஒன்றாக வரிசைச் சிரமத்தில் அமைந்திருக்கின்றன. வளர்ச்சியடைந்த ஊகோனியத்தில் உள்ள புரோட்டோபிளாஸ்ட் செல் உறைவிலின்றும்



A. ஊகோனியம்—சுருஷுததக்போது ஊகோனியத்தை ஆந்தரோஜாய்ட் அணுகுதல்

B. ஊகோனியம்—ஊகோனியத்தின் மேல் படித்து வளரும் ஒரு ஊகோனியம் (குட்டை ஆண்) இழைகள் (gamandrious filaments)

சுருக்கி உருண்ட வடிவமடைந்து சேமித்தகனையும் பொருள் களை மிகுதியாகப்பெற்று அண்டமாக மாறுகின்றது. இவ்வண்டத்தின் ஒரு பாகத்தில் ஒரு சிறு கண்ணாடி போன்ற (hyaline) பரப்புக் காணப்படுகிறது. இப் பாகத்தில்தான் பின்னர் ஆந்தரோஜாய்ட் அண்டத்துடன் இணைந்து சுருஷுதச் செய்கிறது. எனவே இந்தப் பரப்பிற்கு 'ஏற்றுப்படியப்பு' (receptive spot) என்ற பெயர் பொருந்தும். இத் தருணத்தில் ஊகோனியச் செல்லின் உறைவின் ஏற்றும் பரப்பிற்கு எதிரில் சில சிற்றினங்களில் ஒரு கீறல் வெட்டியும் (transverse cleft), சில சிற்றினங்களில் துண்ணிய துவாரமும் (pore) (படம் 56) உண்டாகின்றன. அதன் வழியாக ஆந்தரோஜாய்ட் ஊகோனியத்துடன் சென்று, அண்டத்துடன் இணைந்து சுருஷுதச் செய்கிறது (fertilisation). சுருஷுதத்துக்குப் பின்னர், ஊகோட் தடித்த உறைவையத் தோற்றுவித்துக் கொள்கிறது. வறட்சிக் காலங்களில் இவ்வு அழிந்த பிறகு ஊகோட் அடித்

தளத்தில் பதித்து ஒழுகுதலை அடைகிறது. என்கோட் முனைக்கும் போது நுக்கியைக் கையாலில் முறையில் பாதுபாடடைந்து பின்னர் தான்கு ஜூன்போர்களை உருவாக்குகிறது. இவை என்கோட்டின் உறை மிழிதலால், மெல்லிய கையால் சூழப்பட்டு வெளியகுகின்றன. ஒவ்வொரு ஜூன்போரும் முனித்து (பாசிலா இனப் பெருக்கத்தின்போது நடத்த முறையில்) எட்கோனிய இறை உடனத்தை உண்டாக்குகிறது.

பெருங்குடும்பம் : ஸைக்னீமடேலிஸ் (Order : Zygnematales)


இப் பெருங்குடும்பம் மற்றப் பசும்பாசிகளினின்றும் இரு முக்கிய அம்சங்களில் வேறுபாடுடையது. ஒன்று, கசையிழை கொண்ட இனப்பெருக்கச் செல்கள் அறிய இயலாமைமும், இரண்டு, இணைப்பு முறை அல்லது காஞ்சுகேஷன் (conjugation) என்று அழைக்கப்படும் ஒரு தனிப்பட்ட முறையில் பாலினப் பெருக்கம் நிகழ்வதுமாகும். இப் பெருங்குடும்பத்தினும் அடங்கும் பேரினங்களின் உடமை தனிப்பட்ட செல்லானோ (unicellular) அல்லது பல செல்கள் இணைத்து இணக்காத இழைகளாலோ ஆக்கப்பட்டவை. ஆகவே, இழைஉடமை (filamentous thallus) கொண்ட பேரினங்கள் (1) ஸைக்னீமடேலி (Zygnemataceae) என்ற குடும்பத்தினும், ஒருசெல் உடமைப் பேரினங்களை மீசோடெலி யேலி (Mesotaeniaceae), டெஸ்மிடியேலி (Desmidiaceae) என்று இரு குடும்பங்களிலும் வகுக்கப்பட்டுள்ளன. பின் கூறப்பட்ட ஒற்றைச்செல் உடமை கொண்ட பேரினங்கள் மாலும் பொதுவாக டெஸ்மிடின் (desmids) என்று அழைக்கப்படுகின்றன.

ஸைக்னீமடேலி (Zygnemataceae)

இக் குடும்பத்தில் உள்ள பேரினங்கள் நன்னீரில் மிதந்து வாலும் இறை உடனத்தைக் கொண்டவையாகும். குளம், குட்டை, முதலிய நீர் நிலைகளில் இவை அதிகமாகக் காணப்படும். இவற்றுள் முக்கியமான பேரினங்களாவன : ஸ்பைரோகைரா (Spirogyra), ஸைக்னீமா (Zygnema), மொனஜீயோட்டியா (Mougeotia) முதலியன.

ஸைக்னீமா (Zygnema) : இது நன்னீரில் மிதந்து வாலும் இணையற்ற இறை உடமை கொண்ட பாலியாகும். இழைகள் உருவியவான செல்களால் ஆனவை. ஒவ்வொரு செல்லின் நீளம், அகலத்தைப் போல் 2 மடங்குதான் இருக்கும். செல் உறை,

இரு படவங்கள் கொண்டுள்ளது. உட்புறத்தில் செல்லுலோசம் (cellulose) வெளிப் புறத்தில் பெக்டினும் (pectin) அமைந்துள்ளது. ஆகவே, இவைகள் புறத்தே வழவழப்பான தன்மை கொண்டிருக்கும். ஆகவே, ஒவ்வொரு இழைவையும் சுற்றிப் பசைப் பொருளாக ஆன ஒரு மேலுறை (sheath) அமைந்திருக்கிறது. ஒவ்வொரு செல்லிலும் இரண்டு விண்மீன் போன்ற



படம் 37

நுரக்கிவம்—இழையின் நேரத்தல்
நுரக்கிவம்—சுருக்கிவம் இணைப்பு ஒன்றை
(scalariform connection) பாலிசம் பெருக்கம்

(stellate) பசைக்கணிகங்கள் செல்லின் நீளவாட்டில் அமைந்துள்ளன. ஒவ்வொரு பசைக்கணிகத்திலிலும் பை நுட்பமான (அல்லது பருமனான) ஐண்டோபிளாசம் இழைகள் மூன்று (அல்லது நான்கு) பரவியுள்ளன. ஒவ்வொரு பசைக்கணிகத்தின் நடுவிலும், ஒரு பெரிய செல்லுலோசம் அமைந்துள்ளது. செல்லின் நுரக்கிவம் இரு பசைக்கணிகங்களுக்கும் இடையேயுள்ள அகன்ற ஐண்டோபிளாச இணைப்பின் நடுவில் பொருத்தியுள்ளது (படம் 37).

செல் பாகுபாட்டின்போது ஒவ்வொரு செல் செல்லும் ஒரு பசைக்கணிகத்தைப் பெறுகின்றது. ஆகவே, இப் பசைக்கணிகம் இரட்டிக்க வேண்டிய நிலை ஏற்படுகிறது. அங்ஙனமே இப் பசைக்கணிகம் நீளவாட்டில் பாகுபாடடைவதற்கு இடையூறுக

இவ்வாய்வு புதிதாக உண்டான சேய் நூக்கியல் செல்லின் ஓர் ஓரத்தில் ஒதுக்கிவிடுகிறது. பாகுபாடு முடிந்தவுடன் இந்த நூக்கியல் இருபுறிய பக்கங்களிலுள்ளதும் இடையேதோன்றும் கைட்டோபிளாச இணைப்பின் மத்தியில் நகர்ந்து அமைகிறது.

உடன இணைப்பெடுக்கம்

அசைவற்ற நீர் நிலைகளில் வாழும் கைக்கிளிமா சிற்றினக் கலிம் சில சமயங்களில் தற்செயலாக மிக நீளமான இழைகள் பிளவுபடுவதன் காரணமாக இழைகளின் எண்ணிக்கை அதிகரிக்கின்றன. பெரும்பாலும், இது தடுப்பு இடையருக்கு (midrib lamella) கரைவதன் மூலம் நடைபெறுகிறது. ஒவ்வொரு தண்டமும் புதிய இழையாக வளர்ச்சியடைகிறது.

பாலினம் பெருக்கம்

சாதாரணமாக இப் பெருங்குடும்பத்தில் காணப்படுவதில்லை.

பாலினம் பெருக்கம்

உடயச் செல்கள் (vegetative cells) நேர் முறையில் காமிடாஸ்தியங்களைக் செயல்படுகின்றன. அவ்விதச் செல் ஒன் கொன்றிலும் (கலையிழையற்ற) அமிபா போன்ற (amphoid) ஒரு காமீட் உண்டாகிறது. இத்தருணம் அநேகமாக ஒர் இழையில் உள்ள எல்லாச் செல்களிலும் ஒரே சமயத்தில் இவ்வித காமீட்டுகள் உண்டாகின்றன. ஜோடியாக நெருக்கி அமைந்த இரு இழைகளிலும் எதிர் எதிரே உள்ள இரு செல்களிலின்றும், (என்பரோகைரா வில்குண்டாவதுபோல) குமிழ் போன்ற வளரிகள் தோன்றி ஒன்றோடொன்று இணைந்து கைட்டோபிளாசம் குறுக்கேயுள்ள உறைப்பாகக் கள் கரைவதன்மூலம் 'இணைப்புக் குழம்' இரு செல்களுக்கு மிடையே உண்டாகிறது. (படம் 57). இரு எதிர்ச் செல்களிலிருந்தும் அமிபா போன்ற கைக்கிளிமா—இணைப்புக்குழம்குண்டாகும் காமீட்டுகள் ஒன்றையொன்று கைட்டோபிளாசம் தோற்றம் அணுமி. இணைகுழம்கள் மத்தியில் இணைந்து கைட்டோபிளாசம் உண்டாகுகின்றன (படம் 58). நெருக்கிய இந்த இரு இழைகளின் பள செல்களும் இணைகுழம்களாக இணைக்கப்



படம் 58

படம் 58—இணைப்புக்குழம்குண்டாகும் கைட்டோபிளாசம் தோற்றம் அணுமி. இணைகுழம்கள் மத்தியில் இணைந்து கைட்டோபிளாசம் உண்டாகுகின்றன (படம் 58). நெருக்கிய இந்த இரு இழைகளின் பள செல்களும் இணைகுழம்களாக இணைக்கப்

பெறுதலால், ஏனி போன்ற தோற்றத்தைப் பெறுகிறது. இந்த இணப்பு, 'ஏனி இணப்பு' அல்லது 'ஸ்கேலரிஃபார்ம் இணப்பு' (scalariform conjugation) என அழைக்கப்படுகிறது.



படம் 59

ஊக்கலிமா—பக்க இணப்பு முறை (lateral conjugation) பாலிஸ்ப் பெறுதலால்

ஸ்கோட்டா (parthenospore) என்று பெயர் அளிக்கப்பட்டுள்ளது.

ஓய்வுநிலைக்குப் பிறகு, ஸைகோட்டு நேரிடையாக மூளாத்து ஒரு ஸைக்லிமா இழையைத் தோற்றுவிக்கிறது. இதற்கு மூன்றா ஸைகோட்டின் நூக்கியால் மையப்பில் முறைவில் பாகுபாட்டை கிறது. இதன் விளைவாகத் தோன்றும் நான்கு ஒற்றைமய நூக்கியல்களுள் மூன்று சிதைவுற, நான்காவது நூக்கியலே பிரிவினையில்மூலம் ஓர் இழைமடவத்தைத் தோற்றுவிக்கின்றது. இவ்விழை செல்லுறையின் இரு வெளிப்படலங்களைக் கிழித்துக் கொண்டு வெளிவருகிறது. மற்ற இழைமடவப் பாகிகளில் நிகழ் வதற்கு மாறாக, ஸைகோட் நேரடியாக இழைமடவத்தைத் தோற்றுவிப்பது, இப் பாகிகளின் கிறப்பியல்பாகும்.

மீசோடினியேசி (Mesotaeniaceae)

இந்தக் குடும்பத்தில் அடங்கும் பேரினங்கள் ஒருசெல் உடவத்தைக் கொண்டிருந்தாலும், இழைமடவத்தைக் கொண் டுள்ள ஸைக்லிமடேஷனின் பேரினங்களுடன் சில இயல்புகளில் நெருங்கிய தொடர்பைக் காட்டுகின்றன. இவை டெஸ்மிடியேசி

வினிலும் மூன்று அம்சங்களில் வேறுபடுகின்றது. மீசோடினி பேரினியின் பேரினங்களின் செத்துறைகள் ஒரே கூறு (one piece) அமைத்தும் செங்குறையில் நுண்ணுலாக்கள் அற்றும், செவ்வின் மத்தியில் வரிப்பள்ளம் (groove or constriction) அற்றதனாலும். ஆனால், டெட்ரபீடிபேரினியின் பேரினங்களின் செத்துறை இரு கூறுகளாலானதும் (two pieces), செத்துறை மிகுதியாகத் துவாரங்களைக் கொண்டும் செவ்வின் மத்தியில் வரிப்பள்ளம் கொண்டும் அமைத்துள்ளன. இக் குடும்பத்தில் உள்எடக்கிய பேரினங்களை செக்ஸோடேரியம் டெட்ரபீடுகள் (saccoderm desmids) என்றும் வழங்குவர். இத்துப் பாகிகள் மென்நீரில் (soft water) காணப்படும். முக்கியப் பேரினங்களான மீசோடினியம் (Mesotaenium) சிலிண்ட்ரோசிஸ்டிக்ஸ் (Cylindrocystis) ஸ்பைரோடினியம் (Spirotaenium) ஆகியவற்றின் செத்துறை, இரு படலம் கொண்டு உள் படலத்தில் செத்துறோனும் வெளிப்படலத்தில் பெக்டோனும் (pectose) கொண்டுள்ளது. மீசோடினிபேரினியின் பக்கங்களிலுள்ள னைக்னிமேடெரியல் காணப்படும் மூன்று பிரதான வகைகளைப் போலவே அமைத்துள்ளன.

அதாவது, பக்கங்களிலுள்ள திருகுகளுள் (spiral) போன்றும் [(உ-ம்.) ஸ்பைரோடினியம் (Spirotaenium) (படம் 60)], வினியின் போன்றும் [(உ-ம்.) சிலிண்ட்ரோசிஸ்டிக்ஸ் (Cylindrocystis) (படம் 61)] பட்டை அல்லது தகடு போன்றும் (band-shaped) [(உ-ம்.) மீசோடினியம் (Mesotaenium) (படம் 60)] அமைத்



படம் 60. மீசோடினியம்—செவ்வின் அமைப்பு; ஸ்பைரோடினியம்—செவ்வின் அமைப்பு; சிலிண்ட்ரோசிஸ்டிக்ஸ்—செவ்வின் அமைப்பு

துள்ளன. செவ் பாகுபாடும் னைக்னிமேடெரியல் தடைபெறு னைதப் போலவேவாகும். செவ் பாகுபாடு முடிவுற்றதும் இடை வடுக்கு (middle lamella) கரைத்து விடுவதால் இரு சேய்ச் செவ் களும் பிரித்து விடுகின்றன.

மயிளம் பெருக்கல் தடைபெறும்போது இரு செக்களும் நோடிவாகப் பகைப் பொருளாக (mycelia) குழம்பட்டு அமைத்து இடைவே இணைகுழாய்த் (conjugation tube) தோற்று வித்துக் கொள்கின்றன. இரு செக்களினின்றும் புரோட்டோ பிளாஸ்மடிக் ஆயிரா போன்ற கார்பீட்டுகளாக மாறி ஒன்றை மொன்று அணுகி இணைத்து இணைகுழாய்க் கண்கோட்டாக மாறுகிறது. இந்த கண்கோட், மூன்று படலங்கள் கொண்ட உறைவைச் சுரப்பித்துக் கொள்கிறது. ஆனால், இந்த உறையில் டெஸ்மிடியேஸிக் காணப்படும் துட்பமான சூழ்விடுகளும் (ornamentations) துண்முள்களும் (warts) காணப்படுவதில்லை.

இந்த கண்கோட் மூளைக்கும்போது இரட்டைமய தூக்கியல் மைவாஸிக் மூன்றய்க் பகுபட்ட பிறகு இரண்டு அகன்று நான்கு செய்ச் செக்கள் உருவாகி கண்கோட் உறை பிளவுபடுவதன்மூலம் வெளிவருகின்றன. செல்லுறைத் தன்மை, பக்கக்கவிசத்தின் அமைப்பு, இணைப்புமுறை ஆகிய இயல்புகளில் இப் பேரினங்கள் கைக்கனியபேசி பேரினக்களையே பெரிதும் ஒத்திருக்கின்றன.

டெஸ்மிடியேஸி (Desmidiaceae)

இவை மிகேகோடெர்ம் டெஸ்மிட்ஸ் (placoderm desmids) என்றும் அழைக்கப்படும் இதன் பேரினங்கள் மைக்ரோஸ்கோப்பின் மூலம் பார்க்கும்போது பாகிகளின் மிக நேர்த்தியானவை யாகவும், சமச்சீரமைப்பு உடையவைவாகவும் காணப்படும்.

இரு பேரினங்கள் தவிர, மற்ற எல்லாவற்றிலும் செக்கின் மத்திய பாகத்தில் ஒரு வரீப்பள்ளம் அமைந்துள்ளது. ஆகவே, இந்த டெஸ்மிட் வகை, வரீப்பள்ள டெஸ்மிட் (constricted desmids) என்றும் உறப்படுகின்றன. ஒவ்வொரு பேரினத்தின் உடனும் உருவிக் ஒத்த இரு ஸ்திரீசைக் (striae) கொண்ட தாலும், அகவிரண்டின் செல்லுறையும் மத்தியிக் இணைக்கப் பட்டுள்ளன. இந்த டெஸ்மிடுகளைப் பொட்டெஷ் காரத்தில் (potassium hydroxide) ஊறவைத்தாக், செல்லுறை இரு பாகம் களாகப் பிரிவதை எளிதிக் காணலாம். இரு செல்பகுதிகளும் இணைத்துள்ள மத்திய பாகத்துக்குக் குறுக்கிணைப்பு (isthmus) என்று பெயர். மூன்று படலக்களைக்கொண்ட செல்லுறை, உட்புறத்தில் செல்லுறோசாதும், மத்தியிக் செல்லுறோசம் பெக்கிலும் கலத்தும், வெளிப்புறத்தில் பெக்கிலுறும் ஆக்கப்பட்டிருக்கின்றது. உள் இருபடலக்களினும் மிகுதியாக ஒழுங்கு

முறையில் அமைக்கப்பெற்ற பல துண்டுகள் காணப் படுகின்றன. பெக்டினல் ஆன வெளிப்படைய் பசைப்பொருளாக அமைந்துள்ளது. சில மிதக்கும் சிற்றினங்களில் இப் பசைப் பொருள் மிகுதியாகச் சுரக்கப்பட்டு, மீதப்பதற்குப் பேருதவியாக இருக்கிறது. [இத்தப் பசைப்பொருளைக் காண வேண்டுமாயின், இவ்விதச் சிற்றினங்களை இந்தியன் மகியை (indian ink) வைத்து கைக்ராக்ஸ்கோப்பின் வழியாகப் பார்த்தாக, செக்கனை சுற்றி (வண்ணமற்ற) பசைப்பொருள் நன்கு புலப்படும்.] எடுத்துக் காட்டாக, இரு பேரினங்களின் அமைப்பைக் கவனிப்போம்.

காஸ்மோபம் (Cosmarium)

இத்தப் பேரினத்தின் உட்கம் இரு அரைவட்டப் பாகங்களின், ஸெமிசெல்கள் (semicells) கொண்டும் அய்விர்ண்டும் இடைமிக் குறுக்கிணைப்பால் (isthmus) பிணைக்கப்பட்டும் உள்ளன. ஒவ்வொரு பாதியும் ஒன்று அல்லது இரண்டு பசுங்கணிகங்களை தடுவிக் கொண்டுள்ளது (படம் 61). ஒவ்வொரு பசுங்கணிகத்திலும் ஒரு ஸ்பரினும் காணப்படும். செக்களின் நுக்கலியல் இடைப்பாகத்தில் உள்ள குறுக்கிணைப்பின் தடுவிக் அமைந்துள்ளது. இரு ஸெமிசெல்களிலும் உள்ள துண்டுகளின் வாயிலாகப் பசைப்பொருள் வெளிவருகின்றது.

இத்தப் பாகியின் செல் பாகுபாடு தனித்தன்மை வாய்ந்தது. நூக்கலியல் பாகுபாட்டையும்கொது குறுக்கிணைப்பு பாகம் முதலிக் நீண்டுப் பின்னர் இருசேய் நூக்கலியல்களுக்கும் இடையில் (குறுக்கிணைப்புப் பாகத்தின் மத்தியில்) சுவர் உண்டாகிறது [படம் 64]. இப்போது இரு சேய்ச் செல்களிலும் வெளிப்புறத்தில் பழைய ஸெமிசெல்களும் உட்புறத்தில் குறுக்கிணைப்பின் சிறிய பாதியும் காணப்படுகின்றது. குறுக்கிணைப்பும் பாகம் சிறிது சிறிதாக வளர்த்து பேரி தாமி (படம் 65) பழைய ஸெமிசெல்களின் இயல்புகளைப் பெற்று விடுகின்றது (படம் 66). பின்னர் இரு சேய் கால்மோரியல் செல்களும் தனித்தனியே பிசித்துவிடுகின்றன. இவ்விதமாகச் செல் பாகுபாட்டின்போது ஒவ்வொரு செலிலும் ஒரு புதிய ஸெமிசெல் தோன்றுவது டென்மீடியேசி குறும்பத்தின் ஒரு முக்கிய சிறப்பியல்பாகும். பாகிணப் பெருக்கம்



பசுங்கணிகம்

படம் 61

காஸ்மோபம் செலின் அமைப்பு

இணைப்பு முறையில் தடைபெறுகின்றது. ஆனால், இணைப்புக் குழல் (conjugation tube) உண்டாவதில்லை. முதலில் இரு செல்கள்



படம் 62

கலாபெரியம்-செல்லின் அமைப்பு




படம் 63. டெக்ஸ்டிரம்-இரை டெக்ஸ்டிரம் (Clostridium botulinum)-உட்குத் தொத்தல்

பைசப்பொருளாகக் குழப்படுகின்றன. பின்னர் ஒவ்வொரு செல்லிலும் குழல்களினப்புப் பாகம் மத்தியில் திறக்கப்படுகின்றது. ஒவ்வொரு செல்லின் உள்ள புரோட்டோபிளாஸ்டும் ஆயிபா போன்ற காரீட்டாக மாறி இரு செலி செல்களுக்கும் இடையே வெளிவந்து, எதிர்ச் செல்லிலிருந்து வெளிவரும் ஆயிபா போன்ற காரீட்டுடன் இணைத்து கைகோட்டைத் (செல்களுக்கு வெளியில்) தொற்றுவிக்கின்றது (படங்கள் 67, 68). சில சித்திரங்களில் ஒவ்வொரு செல்லும், இரு காரீட்டுகளைத் தொற்றுவிப்பதாக இணையும்போது இரட்டை கைகோட்டுகள் (twin zygotes) உண்டாகின்றன.

இந்த கைகோட் மூன்று படவங்களானவான குறியீடுகளையும், துண்டுகளையும் கொண்ட செல்லுறைவைச் சுரப்பித்துக் கொண்டு ஒவ்வறிவை அடைகின்றது. அது மூளக்கும்போது மையாலில் முறையில், நுக்கியல் பாகுபாட்டடைந்து, இரண்டு (அவ்வுறு 4) கால்மேரியல் செல்களை உண்டாக்குகின்றது.

கைகோட்டியம் (Clostridium) என்னும் மற்ருரு பேரினம் சாதாரணமாகப் பிதைச் சத்திரைப் போல் உருவ அமைப்பைக் கொண்டுள்ளது (படம் 62). சில சித்திரங்கள் கவிந்திராமல், நேரான செல் உருவத்தைக் கொண்டுள்ளன. இத்தப் பாசி கால்மேரியத்தின் அமைப்புக்கு மாறாக இடைவிடையே வரிப்

பன்னம் ஆற்றுகிறது. ஆனால், டென்மிடிபெசிஸில் காணப்படும் மற்றச் சிதப்பியங்கள் வானையும் கொண்டுள்ளது. ஒவ்வொரு செய்செக்ஸிலும் தடுவின் நீண்ட; பன அபரிநுய்டு களை வரிசைவாகக் கொண்டுள்ள ஒரு பக்கங்களிதத்தைக்



படம் 64



படம் 65




படம் 66

படம், 64-66 காண்டேரில்-செய்செக்ஸுடையது இரு செய்செக்ஸ்களை உண்டாக்கும் படின்கள்.

காணலாம். செக்ஸின் இரு துருவங்களிலும் நுண்குமிழிகள் உள்ளன. ஒவ்வொரு நுண்குமிழியிலும் சில ஜிப்ஸம் நுண்மணிகள் (zygospore granules) இங்குமங்கும் காணப்படுவதைக் காணலாம். செக்ஸு உயிருள்ளவரை இந்த நுண்மணிகள் எப்போதும் அசைந்து இயங்கிக் கொண்டே இருக்கும். இந்தப் பாகிமின் துருவங்களில் உள்ள நுண் துவாரங்களின் வழியாகப் பசைப்பொருள்

மிகுதியாகச் சுரப்பிக்கப்படுதல் காரணமாகச் சில சமயங்களில் துள்ளும் இடம்பெயர்ச்சி (jerky movements) இந்தப் பாகிவிக் காணப்படும்.

சில பேரினங்களில், பல செல்கள் நீளவாட்டில் வரிசையாகப் பகைப்பொருளாக இணைக்கப்பட்டுக் காணப்படுகின்றன. இவை



படம் 67

காம்பேலியம்-பாகிவிக் பெருக்கல்-இரு செல்கள் நீள்கு அபிபா போன்ற காமிட்டுகள் அடித்தளத்தில் வெளிவருதல்

படம் 68


காம்பேலியம்-இரு காமிட்டுகள் இணைத்தவன் உண்டாகிய கைனோகேட்டின் தொற்றம்

இனழ் டென்சியிகள் (filamentous desmids) என்று அழைக்கப்படுகின்றன (உ.ம்.) டென்சியுமம் (Desmadium).

பெருங்குடும்பம் : கைபனோலீஸ் (Order : Siphonales)

இந்தப் பெருங்குடும்பத்தினுள் வகுக்கப்பட்ட பேரினங்கள் பொதுவாகக் கிரீனத்த, குறுக்குச் சுவரற்ற குழாய்போன்ற (மைக்ரோஸ்கோபிக்) (microscopic) உதவியின்றிக் காணக்கூடிய பேரின உடலங்களாகக் கொண்டவை. இவற்றின் உடலம் பன ஹக்கீயங்கள் கொண்டும் (coenocytic), வரையற்ற வளர்ச்சியுறும் திறனைப் (indefinite growth) பெற்றும் உள்ளது. கிளாடாபோரா வைப் போன்ற ஒரு பாகிவிக் குறுக்குச் சுவரக்கள் உண்டாகாத ஒரு நிலையைக் கற்பனை செய்தோமானால் மேற்கூறப்பட்ட உடலத்தின் அமைப்பு நன்கு புலப்படும். இவ்விதமான குறுக்குச் சுவரற்ற பன ஹக்கீயங்கள் கொண்ட வரையறையற்ற வளர்ச்சி கொண்ட உடலம் கைபனோலீஸ் (siphonous) என்று குறிக்கப்படுகிறது.

இப் பேரினங்கள் மற்ற பசும்பாசிப் பேரினங்களினின்றும் இரு இயல்புகளில் வேறுபடுகின்றன. பசும்கனிசங்களில் பொதுவாக உள்ள நிறமிகளுடன் கூடுதலாக ஸைபனின் (siphonin)



படம் 69

ஸைபா க்னாக் பேரினத்தில்
உட்கைத்தின் தொற்றம்



படம் 70

ஸ. பேரினப்போலிய உட்கைத்தின் தொற்றம்

ஸைபனோக்சாந்தின் (siphonoxanthin) என்ற இரு சேத்தோபிக் (xanthophyll) நிறமிகள் அமைந்துள்ளன. மற்றொரு முக்கிய

அம்சம் உடலத்தில் உள்ள நூக்கியல் ஒவ்வொன்றும் இரட்டை (diploid) மயமானதாகும். இந்த நூக்கியல்கள் காமீட்டுகள் உண்டாகும் தருணம் (gametogenesis) மையானில் முறைப்படி பாகுபாடடைந்து, ஒற்றைமயமான நூக்கியல்களை உண்டாக்குகின்றன.

காலர்பா (Caulerpa)

காலர்பாவின் சிற்றினங்கள் எல்லாம் செடிக் மண்டலக் கடற் கரை ஓரங்களில் காணப்படுகின்றன. சில சிற்றினங்கள் கடலில் 80 மீட்டர் ஆகத்தில் வளர்கின்றன. தென்னிந்தியாவில் பாம்பன் (Pamban), குருண்டி தீவு (Krusadi Islands), கன்னியாகுமரி (Cape Comorin) முதலிய கரையோரங்களில் பல சிற்றினங்கள் காணப்படுகின்றன. இவற்றுள் சில கரையோரத்தில் மணல் அல்லது செவ்விய மண்ணின் மேல் படர்ந்து வளர்கின்றன. மற்றும் சில கடலில் உள்ள பாறைகளின் மேலும், பவழ நீரடிப் பாறைகளின் மேலும், (coral reefs) படர்ந்து வளர்கின்றன.


காலர்பாவின் உடலம் புறத் தோற்றத்திலும் அளவிலும் ஒரு படிகம் பூக்காவரச் செடியை ஒத்திருக்கிறது. அதாவது, படிந்து வளரும் ஒரு நில மட்டத்தண்டும் (rhizome), அத



படம் 71

களிலும் மேல் தோக்கி கா, செவ்வியமான்-உடலத்தின் தோற்றம் வளரும் பருமம் நிறம் கொண்ட பல அலிமினேடர்களும் (assimilators) சிறு தோக்கி வளரும் 'லோ' போன்ற கரையோர கணியம் (rhizoids) கொண்டுள்ளது (படம் 69-73). எல்லாச் சிற்றினங்களிலும், நிலமட்டத்தண்டும், கரையோரங்களும் ஒரே தன்மை கொண்டுள்ளன. ஆனால், அலிமினேடர்களோ, பரந்த இலை போன்றும் (கா. காலர்பாவெர்பா-*C. scalpelliformis*) (படம் 69), ஊலிமினேட்கள் போன்றும் (கா. குரண்டியுல் — *C. curvicaulis*) (படம் 73), உருண்டையால் பாகுக்களைக் கொண்டும் (கா. ரேசியேனா — *C. racemosa*) (படம் 72), புனல் வடிவமான பாகுக்களைக் கொண்டும் (கா. செவ்வியமான் — *C. chemnitzia*) (படம் 71) மற்றும் வேறு வடிவங்களைக் கொண்டும் (கா. டெக்ஸிலியோலா — *C. taxifolia*) (படம் 70) உள்ளன.

குறுக்குச் கவரே இவ்வாறு பெரிய அளவில் அமைந்த இத் தன்மையான உடலம் எப்படித் தன்னுடைய நிலையை முறிவுறு மல் பாதுகாத்துக் கொள்கிறது என்ற கேள்வி எழுகிறது. ஆகவே



படம் 72

அ. ரேஸினோனா—உடலத்தின் தோற்றம்

இவ்விதமான உடலம் மூன்று வழிகளில் பாதுகாத்துக் கொள் கிறது. ஒன்று, உடலத்தின் உறை மிகவும் பருமனாக உள்ளது:



படம் 73

அ. குப்ராவியுன்—உடலத்தின்

இரண்டு, 'டிராக்' (dragor) அழகத்து அதிகமாக இழப்பது; மூன்று, உடலம் மறுமையும்காரவோனாநும்க் (valirola) பெக்டினாநும்க் ஆன இரண்டுக் கம்பிகள் போன்ற அமைப்புகள் குறுக்கேயும் நீள வாட்டிலும் விவரப்படுத்தினும். இவற்றிற்கு இராபிடூலாக்கள் (trabeculae) என்று பெயர் (74).

கடனம் பெருக்கம்

கடனம் துண்டித்தல் மூலமும், பல பாகங்களில் தோன்றும் கனரிகள் தனியே பிரித்து, புதிய கடனத்தை உண்டாக்குதலின் மூலமும் நடைபெறுகிறது.

பாலினம் பெருக்கம்

அகிஸோகமி (anisogamy) மூலையில் நடைபெறும் பாலினப் பெருக்கத்தைப் பல சிற்றினங்களில் கண்டுள்ளனர். இப் பாலினப்



படம் 74

காம்பா—அகிஸோகின் குறுக்கு வெட்டுத்
தோற்றம் (பூராய்வுபாகங்களாக காண்க)

பெருக்கத்தின்போது அனிரியோடர்களின்மேல் பல ரோமம் போன்ற, குழல் வடிவ கனரிகள் தோன்றுகின்றன (படம் 75).




படம் 75

காம்பா—அனிரியோடரின்மேல் உண்டாகும் குழல்கள் வழியாக
காமிட்டுகள் வெளிவருதல்

இவற்றிற்குக் கீழே நூக்கினியங்களும் கைம்பாலின் மூலையில் பழுபட்டு, அதனுடன் கைட்டோபிளாசமும் பிரிவிடையடைத்து, பல இருகணையிழை காமிட்டுகள் உண்டாகின்றன. இவை

அனிரிஸ்டோக்குள் வலை போன்ற அமைப்பில் காணப்படுகின்றன, பின்னர் குழல்களிலுடைய (extrusion papillae) பசை



படம் 75

காமிட்—3 இது கரை இடை அனிரோ காமிட்டுகள் இணைதல்

காமிட்—4 கரை இடை வைகோட்

காமிட்—ஒய்வுகளை வைகோட்

படவமாக வெளிவருகின்றன. இவற்றிலுள்ள இருவகை காமிட் இகல் (amphogametes) ஒன்றோடொன்று இணைந்து வைகோட்டை உண்டாக்குகின்றன (படம் 76). வைகோட், உறைபைச் சுரப்பித்துக் கொண்டு பெரிதாகின்றது (படம் 78). வைகோட், ஓன் முனை வடிவங்களைப்பற்றி அறிவு இவனிலும்.



குளோபெல்லா

படம் 38A

(பக்கம் 354

ஒராவது)



ஆ. உடல் செல்,

ஆ. இ. ஆட்டோ

கபேர்தனின்

தொத்தம்

குளோபெல்லா

2. தொகுதி : கேரோபைட்டா (Division : Charophyta)

ஸ்டோன்வோர்ட்ஸ்
(Stoneworts)

இந்தப் பெரும் தொகுதியினுள் அடங்கிய பேரீனங்கள் மற்றப் பாலிகளினின்றும் வேறுபட்டும் அமைவனாடின் தொடர் புறவு எதுவும் புளப்படுத்தாமலும் அமைந்துள்ளன. மற்ற பகம் பாலிகளினின்றும் உட இத் தொகுதி உடல அமைப்பிலும் பாலினப் பெருக்க உறுப்புகளின் சிக்கலான அமைப்பிலும் மிகுதி யான வேறுபாட்டினால் காட்டுகின்றது.

கேரேசி (Characeae)

இந்தக் குடும்பத்தில் அடங்கும் பேரீனங்களுள் மூக்கிய மானவை கேரா (Chara), எறட்டம்மா (Nitella) என்பனவாகும். இவை மிகுதியாக அசைவற்றுள்ள நீர்நிலைகளிலும், மணல் அல்லது மெல்லிய மண்ணுள்ள அடித்தளத்திலும் காணப்படு கின்றன. உடலத்தின் வட்டாக்கு அமைப்பு இப் பேரீனங்களின் சிறப்பு அம்சமாகும்.

கேரா (Chara)

இந்தப் பேரீனம் குட்டை, இணறு, குளம் முதலிய நீர் நிலை களில் பெரும்பாலும் காணப்படும். இப் பாலியின் உடலும், மிகுது வான அடித்தளத்தில், நீரமற்ற, கிளைத்த, இழை போன்ற ஸ்தூலப்படுகளாகப் பொருத்தப்பட்டுள்ளது. செங்குத்தாக இருக்கும் உடலும் (20-30 செ. மீ. உயரம்) வட்டாக்கு அமைப்பைக் கொண்டுள்ளது (படம் 77).

உடலத்தின் அச்ச (axis) அல்லது "தண்டு" கணுக்களையும் (nodes) இடைக் கணுக்களையும் (internode) ஒன்று விட்டு ஒன்றாகக் கொண்டுள்ளது. ஒவ்வொரு கணுவிலிருத்தும் பல சிறு குழல் கிளைகள் (branchlets) கணுவைச் சுற்றித் தொழுகின்றன.

இத்தக்குறுங்கிளைகள் குறிப்பிட்ட எண்ணிக்கையில் சில கணுக்களையும் (nodes) இடைக்கணுக்களையும் ஒன்று விட்டு ஒன்றாகப்



படம் 77

கோரானப்பட்டா

பெற்றுள்ளன (branchlets or branches of limited growth). இவை இயைபு ஒத்துள்ளன. இக் குறுங்கிளைகளின் கணுக்களில் ஒரு செல் பிராக்குகள் (bracts) அட்டமாக அமைந்துள்ளன. பல சிற்றினங்களில், தண்டில் உள்ள ஒன்றொரு கணுனிதும் செதில்கள் அல்லது 'ஸ்டிபுலோட்கள்' (stipulodes) அட்டமாக அமைந்துள்ளன, மற்றும் தண்டின் இடைக்கணுக்கள் பெரும்பாலும் புறணி (cortex) அல்லது வெளி உறைகளால் சூழப்பட்டிருக்கின்றன.


தண்டின் கணுக்களிலிருந்து சாதாரணமாக நெடுங்கிளைகளும் (branch of unlimited growth) தோன்றுகிறது (படம் 77).

இது மூலத்தண்டின் அம்சங்களையும் வரையறைவற்று வளர்ச்சி பெறும் இயல்பையும் (indefinite growth) கொண்டுள்ளது.



உட்பகுதியில் வளர்ச்சி, துனியில் உள்ள ஓர் அரைக்கோண வடிவமான செல்லினால் ஏற்படுகின்றது (படம் 78) இந்த துனி செல் (apical cell) குறுக்கு வட்டத்தில் பிளவுபட்டு துண்டுகளை (segments) ஒன்றன்பின் ஒன்றாக உண்டாக்குகிறது. ஒவ்வொரு துண்டமும் குறுக்குப் பாகுபாட்டினால் இரு செல்களாக பிளவுபடுகின்றது. இங்கிருந்து செல்களில், சிழிச்செல் மீண்டும் பாகுபாடு அடைவாமை பரிமாடங்கு நீண்டு ஒரு செல் (one-celled) இடைக்கணுவாக (internode) மாற்றமடைகின்றது. (இந்த இடைக் கணுவின்மேல்தான் புறணி உறை அமைந்துள்ளது.) மேல் செல் தளவாட்டில் பாகுபாட்டடைந்து கணுவாக (node) செயல்படுகின்றது. இந்தக்கணுவில் உள்ள புறச்செல்களே (படம் 78). பின்னர் குறுங்கிளைகளாக வளர்ச்சியடைகின்றன. ஒவ்வொரு செல்லிலும் எண்ணற்ற நீள்வட்டத் தகடு போன்றன (எபிசுலாயிட்) அற்ற பக்கங்களிலிருந்து வளர்ச்சி பெறுகின்றன. மூலத்தில் செல்களில் எபிசுலாயிட் போன்றன செல்லுக்குள் கழன்று கொண்டிருப்பதைக் காணலாம் (cyclosis). தாவரத்தில் எபிசுலாயிட் போன்றன கழன்று மூலத்தண்டில் இந்த தோற்றமே தோன்றுகின்றதால் கண்டு பிடிக்கப்பட்டது. ஒவ்வொரு செல்லிலும் ஒரு தூக்கியல் எபிசுலாயிட் போன்றன தூக்கியல் எபிசுலாயிட் மூலத்தில் பாகுபாட்டடைகின்றது. ஆனால் மூலத்தில் பாகுபாட்டடையும் சக்தியை இழந்து இடைக்கணு கட்டிப்போட (stipulodes), பிராக்ட் (bract) முதலிய செல்களில் தூக்கியல் எபிசுலாயிட் மூலத்தில் வளர்வது, வேறுபட்ட வகையில் நேரடியில் பாகுபாட்டடைவதற்குப்

பிரிவைடைகின்றது. இத் துண்டுகள் உருளை, அண்டம், புழு போன்ற வடிவங்களை அடைகின்றன. இவ்விதமாக, நேரடியாக



படம் 79. செதோமைட்டா—குறுக்கினைவின் கணுநிலை நோக்கியுள்ள ஆந்தரியம்.

கோடு—ஆந்தரியத்தின் கீழ் செட்டுத்த நோக்கம்

நூக்கியல் மரபுபாடையும் இவக்கம் அமைட்டாவின் (Amitosis) என்று குறிக்கப்படுகிறது.

உடல் இனப்பெருக்கம்

சில சிற்றினங்களில் மண்ணில் பதித்த விண்மீன் (star-shaped) போன்ற பருமனான பல்பிக்கள் (bulbils) எனப்படும் உடல இனப் பெருக்க பாகங்கள் அடிச் சுணுக்களில் காணப் படுகின்றன. இவை சேமிப்புப் பொருள்களை தர சவடலில் மிகுதியாகக் கொண்டுள்ளன. இவை சாதகமான சூழ்நிலை ஏற்படும் புதிய கேரா உடலங்களைத் தோற்றுவிக்கின்றன. அடிச்சுணுக்களில் உள்ள குறுக்கினங்களில் வளர்ச்சி தடைப்பட்டதனால் தான் (arrested growth) இவ்வித பல்பிக்கள் விண்மீன் போன்ற தோற்றத்தை அளிக்கின்றன.



படம் 80

கேரா—ஆத்திரோ
கூப்பெனிடா கானப்
படும் கம்பெனிடா
நீளக் இனங்கள்

வானினப் பெருக்கம்

வானினப் பெருக்கம், ஊகமி என்ற உயர் தரமான முறையில் தடைபெறுகின்றது. ஆண் உறுப்புக்கு ஆந்தரிடியம் (antheridium) அல்லது 'கோர்ப்யூக்' (robore) என்றும் பெண் உறுப்புக்கு ஊகோனியம் அல்லது 'நியூக்லியூக்' (nucule) என்றும் பெயர். குறுக்கினங்களில் சுணுக்களில், மூல அச்சை தோக்கியுள்ள (அடிக்ஸரியல்—axial) பக்கத்தில் இப் பாதுறுப்புகள் அமைந்துள்ளன. எப்போதும் ஊகோனியம் ஆந்தரிடியத்துக்கு மேலே பொருத்தியிருப்பது (படம் 79) கேராவின் சிறப்பியல்பாகும். ஊகோனியத்தின் இரு பக்கங்களிலும் உள்ள நன்றாக வளர்ச்சி பெற்றுள்ள செதிக் சுணுக்கு (பிராக்டுகுசுக்கு) பிராக்டியோல்கள் (bracteoles) என்று பெயர்.

ஆந்தரிடியம்

ஆரஞ்சுவண்ணம் கொண்டு, பல செக்களாக ஆன உள்வீடற்ற கோள வடிவமான ஆண்பாதுறுப்பை ஆந்தரிடியம் எனப்படுவது. எட்டு மூக்கோண வடிவமான, (சிறிது வளைத்த) தசடு போன்ற பறத்த செக்களே ஒவ்வொன்றொன்று இணைக்கப்பட்டு ஆந்தரிடியத்தின் புற அமைப்பாக மேற்பார்வைவாகச் செயல்படுகின்றன. இவைகளுக்கு வீக்கு செக்கள் (shield cells) என்றபெயர் பொருத்தும். ஒவ்வொரு வீக்கு செக்கின் மத்தியிலிருத்தும் உட்புறத்தில் வீண்டு வளர்த்துள்ள மானியூபிரியம் (masubirium) என்ற செக் ஆந்தரிடியத்தின் நீள் வெட்டுத் தோற்றத்தில் வெகு நன்றாகக் காணப்படும் (படம் 79). ஒவ்வொரு மானியூபிரியத்தின்

துவியிலும் ஒரு கோணவடிவமான (angular) பிரதம கார்பிடுலார் செல் (primary capitular cell or head cell) அமைந்துள்ளது இவைகளின் பக்கங்களில் துணைக் கார்பிடுலார் செல்கள் (secondary capitular cells or secondary head cell) அமைந்துள்ளன. இந்தத் துணைக் கார்பிடுலார் செல் ஒவ்வொன்றிலிருந்தும் இரு இழைகள் தோன்றுகின்றன. ஒவ்வொரு இழையும் வண்ணமற்ற தசடு போன்ற (discolored) செல்களைக் (50-100) கொண்டுள்ளன. இந்த இழைகளுக்கு கம்பெர்மடாஜனஸ் (ஆத்தரீடியம்) இழைகள் (spermatogenous filaments) என்று பெயர். ஏனெனில், இழையின் ஒவ்வொரு செல்கிலிருந்தும் ஒரு பட்டை போன்ற (band shaped) கருண்ட (coiled) இரு கசையிழை (biflagellate) கொண்ட ஆத்தரோஜாயிட் தோன்றுகிறது (படம் 80). இவற்றின் உடலிலும் கசை இழைகளின் மேலும் கட்டைமண்டி வடிவ செதில்கள் (scales) காணப்படுகின்றன.

இந்த ஆத்தரீடியம் குறுக்கினை கணுவுடன் ஒரு கார்பு செல்கினால் (pericel cell) இணைக்கப்பட்டிருக்கிறது. ஆத்தரோஜாயிட்கள் முழு வளர்ச்சி அடைவதும்போது ஆத்தரீடியத்தில்விட்டு செல்கள் தனித்தனியே பிரிந்து விதறி விழ. கம்பெர்மடாஜனஸ் இழைகள் விடிகின்றன. அப்போது ஒவ்வொரு செல்கிலிருந்தும் ஓர் ஆத்தரோஜாயிட் பக்க உறை மிழிய அதன் மூலம் வெளியேறுகின்றது. ஆத்தரோஜாயிடின் உடலம் முழுதும் பிளேபரோபிளாஸ்டிக் (blepharoplast) ஆகிறது. பிளேபரோபிளாஸ்டிக். 3 பாகத்துடன் பட்டை போன்று தூக்ளியனும் கசை இழை இணைக்கப்பட்டுள்ளது (படம் 81). ஆத்தரோஜாயிடின் மூன் பாகத்தில் முன்க்குச் சிறிது தூரத்தில் இரு கசையிழைகள் (flagella) பொருத்தப்பட்டுள்ளன (படம் 81). ஆத்தரோஜாயிட் வெளி வத்தவுடன் சில வினாடிகள் அகாலவற்றிருந்தும் பின்னர் கசையிழைகளை வேகமாகச் சுழற்றிக் கொண்டு நீரில் காரிக் க்குரு (cork screw) போல் நீதி அகல்கொளியத்தை நாடிச் செல்கிறது.




படம் 81

சேரா—ஆத்தரோஜாயிட்

ஊகோனியம்

அண்ட வடிவம் கொண்ட (ovoid) ஊகோனியச் செல்லைச் சுற்றி, ஐந்து குழல் போன்ற செல்கள் (tubular cells) வலமிருந்து



படம் 82

கோ—ஊகோனியத்தின் கீழ்
கேட்டுத் தொற்றல்

ஒளி கிளையும் ஊட்டோபிளாசுமாக அமைந்து, ஏற்கும் பரப் பாகச் (receptive spot) செயல்படுகின்றது (படம் 82). கருவுறல் திகழ்ச்சிக்குமுன், கிரெனன் செல்களுக்கு அண்மையிலுள்ள குழாய் செல்களின் மேல் பாகம் நீண்டு வளர்கின்றன. அப்போது அவைகளுக்கு இடைமே இடைவெளிகள் உண்டாகின்றன. ஊகோனியத்தை அணுநிலையும் ஆந்தரோஜாய்டுகள் இந்த இடை வெளியில் வழியாக உள்ளே சென்று அண்ட செல்லின் ஏற்கும் பரப்புடன் இணைந்து அண்டத்தை கருவுறச் (fertilisation) செய்கிறது. ஆந்தரோஜாய்டுள் தூக்கியல் அண்டத்தின் தூக்கியலுடன் இணைந்தவுடன் அண்டம் ஊகோட் அல்லது ஊன்போராக (ovopore) மாறுகிறது. ஊன்போரின் உறை தடிக்கும் தருணத்தில் அதன்மேல் படித்திருக்கும் குழாய் செல்களின் வலிப்பள்ளங்கள் (pores) இருக்கும் இடங்களில் ஊன்போரின் உறையில் திருகு போன்ற விலிப்புகள் உண்டாகின்றன. (படம் 83).

பிறகு குழாய்ச் செல்களும், கிரெவன் செல்களும் கிடைக்கும் போது, ஊஸ்போர் அவற்றிலின்றும் பிரிந்து விழுந்து தண்ணீரின் அடி மட்டத்தை (bottom) அடைகின்றது. நீர் வற்றிய பிறகு, இந்த ஊஸ்போர்கள் மண் தரையில் பதிந்து ஓய்வு நிலைப் அடைகின்றன.


முளைத்தல் (Germination)

அடுத்த மனதாக்காலத்தில் இந்த ஊஸ்போர் முளைக்க ஆரம்பிக்கின்றது. இதற்கு முன்னமே இரட்டைமயமான ஊஸ்போரின் தூக்கியல் எமயாவின் முறையில் ஒத்தமயமாகின்றது. ஊஸ்போரின் முன்பாகத்தில் உறை பிளவுபட, உள்விழுந்து இரு குழாய் போன்ற உறுப்புக்கள் வளர்ந்து வெளிவருகின்றன. (படம் 84). அவற்றில் ஒன்று பச்சை நிறம் கொண்டு



படம் 83

Cystocarpus




படம் 84

Cystocarpus showing male and female gametes

மேல் தொக்கி வளர்கின்றது. இதற்குப் புரோட்டோனீமா (Protonema) என்று பெயர். மற்றொன்று நிறமற்றுக் கிழ்தொக்கி வளர்ந்து மண்ணுக்குள் புரந்து ஈரதூய்மடாகச் செயல் படுகிறது (படம் 84). புரோட்டோனீமா விரைவில் வளர்ந்து மதுபட்டு ஒன்றுவிட்ட ஒன்று முறையில் இரு கணுக்களையும், ஒன்று இடைக்

கணுக்களையும் தோற்றுவிக்கின்றது (படம் 85). சீழ்க் கணுவினிருந்து பல ஈரஜாப்புகள் தோன்றி, உடனத்தை அடித்

தளத்தில் உறுதியாக நிலை நிறுத்தி வைக்கின்றன. நிறகு மேல் கணு விவிவ்று குறுக்கிலேகன் சில வட்ட டுக்கு முறையில் தோற்றுவின்றன (படம் 85). அவைகளுள் முதன் முதலில் தோன்றிய குறுக்கிலேயின் கோணத்தில் ஓர் அரைவட்ட அடிவ துனிச் செல் (apical cell) தோன்றி அதனுடைய இயக்கத்தாக் கோர பேரினத்தின் இயல்புனைப் பெற்ற உடலம் (adult) வளர ஆரம்பித் தின்றது.



படம் 85

கோ—ஊப்போர் முன்படிக்கன்

ஆகவே, இந்தப் பாகியில் பல நிறப்பெய்க்புகள் காணப்படுகின்றன. அவையாவன :

1. உடலம் வட்டடுக்கு முறையில் குறுக்கிலேகளைக் கொண்டிருப்பது.
2. கணு, இடைக்கணு அமைப் பைப் பல உறுப்புகளிலும் கொண்டிருப்பது.
3. சிக்கலான அமைப்பைக் கொண்ட ஆண், பெண் பாலுறுப்புகள்.
4. ஊப்போர் முளைக்கும்போது புரோடோனியா என்ற இடைநிலைப் படிவத்தைக் கொண்டிருப்பது.

5. பட்டை போன்ற, சுருள் அடிவ ஆத்திரோஜாப்புகள் கொண்டிருப்பது.

இத்தகைய நிறப்பெய்க்புகளைப் பெற்றிருக்கும் பேரினங்கள் வரவும் குளோரோபட்டானினின்றும் அகற்றப்பட்டு கேரோ ஸ்டோ (Charophyta) என்னும் தனித் தொகுதியாக இப்போது கருதப்படுகின்றன.

3. தொகுதி : யூக்ளினோபைட்டா

(Division : Euglenophyta)

இத்தொகுதி கனச இழை மூலம் இயங்கும் ஒரு செல் பேரினங்களைக் கொண்டுள்ளது. டிஸ்கோயிட் (discoid) அல்லது பட்டை (band) வடிவமான பசுங்கனிங்களைக் கொண்டுள்ளது. குளோரோபைட்டாவில் காணப்படும் பச்சையங்கள் a, b- (Chlorophyll a and b)யுடன் B-காரோட்டினையும் (B-carotene), ஒருவித ஸெந்தோபினையும் (xanthophyll) கொண்டுள்ளது. பெராமைலம் (paramylum) எனப்படும் ஒருவித மாவுப் பொருளும் (carbohydrate) கொழுப்புப் (fats) பொருள்களும் இங் ஆங்காக்களின் சேமிப்புப் பொருள்களாவன. செம்களில் அனைக்காக கனச இழை ஒன்று (அல்லது 2, 3) காணப்படும். கனசயிழை, டின்னல் (tinell) தன்மை உடையது. இது செல்லின் மூன் பாகத்தில் உள்ள குடுவை (mask) வடிவில் அமைந்த பாகத்தின் அடிப்பாகமான ரீசர்வாயரின் (reservoir) அடி மட்டத்தில் பொருத்தப்பட்டு குழல் வடிவான கல்லட் (gullet) மூலம் வெளியே வந்து இயங்குகிறது. கருங்கி கிரீயும் குமிழிகள் (contractile vacuoles) ரீசர்வாயருக்கு (reservoir) அருகாமையில் அமைந்துள்ளன. மற்றும், ஒரு பக்கத்தில் பல சிறந்த நுண் மணிகள் கொண்ட கண்டுகளியும் (eyespot) அமைந்துள்ளது. செல்லின் மத்தியில் நுக்கியல் (nucleus) காணப்படுகிறது. கனச இழையின் அடிப்பாகத்தில் உள்ள பிணைப்பொருளினால் (blepharoplast) மற்ற இயங்கும் ஆங்காக்களில் உள்ளது போல, றைனோபிளாஸ்ட்டும் (rhizoplast), சென்ட்ரியோலு ட்டும் (centriole) தொடர்பு கொண்டுள்ளது. (sacro-motor apparatus) யூக்ளினோ போன்ற பேரினங்களில் அமுத்தமான செல் உறை (rigid cell wall) இல்லாததன் காரணமாக உடனத்தின் உருவம் அடிக்கடி மாறிக் கொண்டேயிருப்பது நன்கு புலப்படும்.

இத் தொகுதியின் பேரினங்கள் அங்கக (organic matter) பொருள்கள் அதிகமாக உள்ள குட்டைகளிலும் சிறிய நீர்த் தேக்கங்களிலும் மிகுதியாகக் காணப்படும். இதன் காரணமாக ஆந் நீர்கள் பசுமை வண்ணத்தை யும் பெறுகின்றன.

செயல் மண்டலம் மேலும் சில சித்திரங்கள் காட்டியுள்ளன. பூக்கி
நேரில் ஒரு சித்திரம் உரைத்த பனியிலும் (green saw)
காணப்படுகிறது.


மாவிலை இளம்பெருக்கம்

செயல் பாகுபாடு (cell division) மூலம் தடைபெறுகிறது.
பூக்கிநேரில் போன்ற பெரினங்களில், இப் பாகுபாடு செல்லின் முன்
பாகத்தில் தொடங்கி நீளவாட்டில் (longitudinally) சிறிது
சிறிதாக பின்பாகம் வரை நீடித்து இரு சேய்ச் செல்களை
உண்டாக்குகிறது. குறிப்பாக செல்கள் இயங்கும் போதே
(in mobile condition) இப்பாகுபாடு தடைபெறுகிறது.

சில சமயங்களில் இந்த ஆய்வுக்கள் தடித்த சுவர் கொண்ட
செயல் (cysts) எனக் காணப்படுகின்றன. பின்னர் இந்த செயல்
மூலித்த (germinate) அதனுள்ளிருந்து இயங்கும் செல் ஒன்று
வெளி வருகிறது.

மாவிலை பெருக்கம்

இதுவரை இத் தொகுதியில் மாவிலைப் பெருக்கம் கண்டறியப்
படவில்லை.



பூக்கிநேரில் படம் - 85A

உகந்த இரை, கல்-கல்
கட்ட, கண்-கண் முள்ளி,
தூ-தூக்கியல், பப்பகம்
கனியம், பிச்சுக்காய்.

4. தொகுதி : ஷேர்தோஸ்பட்டா (Division : Xanthophyta)

இந்த வகையில் வகுக்கப்பட்ட பேரினங்களில் காணப்படும் வட்ட அல்லது நீள்வட்டத் தகடு போன்ற (discoid) வண்ணக் கணிகங்கள் பச்சையம் *a* (chlorophyll *a*) பச்சையம் *c* (chlorophyll *c*), கேரோடின்கள் (carotin) ஷாத்தோபிக் (xanthophyll) ஆகிய நிறமிக்களைக் கொண்டவை. சேரிப்பூப் பொருள்கள் ஷாபோகிள் என்ற ஒரு விதத் தரசப்பொருளும், எண்ணெய்ச் சத்துமாகும். இதில் அடங்கும் ஒற்றைச் செல் பேரினங்களில், மூன் பாகத்தில் பொருத்தப்பட்டுள்ள கசையிழைகளில் ஒன்று நீளமாகவும், மற்றொன்று மிகவும் குட்டையாகவும் உள்ளன. நீண்ட கசையிழையின்மேல் (முழுமையும) நீளவாட்டில் சிறு ரோமம் போன்ற கைக்ரோசீலியா (microcilia) அல்லது மான்டி கோனிக்ஸ் (mastigonemes) இரு வரிசைகளில் அமைந்துள்ளன. இவ்விதமான கசையிழை, டிசைன் அமைப்பு (tinsel type) கசை இழை என்று குறிப்பிடப்படுகிறது. மூன்றே நீண்டமைந்துள்ள இத்தக் கசையிழையின் அசையிழைச் செல் நீந்திச் செல்ல இயலாது. மற்றொரு கசையிழை மிகவும் குட்டையாகவும், சற்றுப் பின்புறத்தில் வளைந்தும், சாட்டைத் தன்மை (whiplash type) பெற்றும் உள்ளது. இது, செல்லின் இடப்பெயர்ச்சிக்கு உதவுவதில்லை.


இந்த வகையுள் அடங்கிய பேரினங்களில் மிகவும் மூக்கியெத்துவம் வாய்ந்த இரண்டு பேரினங்களாவன (1) பாட்ரியடியம் (botrydium), (2) வொசீரியா (Vaucheria). இவற்றின் உடன அமைப்பைப் பற்றியும், இனப் பெருக்கத்தைப் பற்றியும் கவனிப்போம்.

பாட்ரியடியம் (Botrydium)

இப் பேரினம் சரமணிகளில் படித்து வாலும் (terrestrial), பறாண் போன்ற (haloon-shaped) பசுமஞ்சள் பாரியாகும் (படம் 86). இது அநேகமாக, சிறு குட்டை, குளம், ஏரிகளில், தண்ணீர் வற்றிக் கொண்டிருக்கும் சரமண் கொண்ட கரை, ஓரங்களில் மிகுந்த எண்ணிக்கையில் காணப்படும்.

இந்தப் பாகியின் உடலத்தை இரு பாகங்களாகப் பிரிக்கலாம். ஒன்று, நிலத்துக்கு மேல் (aerial) உள்ள பகுதிப் போன்ற மஞ்சள்

வண்ணக் கனிவம்



படம் 86

பாட்சீடியல்—உளர்வல்பு

பாலின இனப்பெருக்கம்

பாட்சீடியத்தில் பாலின இனப்பெருக்கம் இடப்பெயர்ச்சி ஆற்ற ஏப்பனேஜென்போரானோ (aplanosporae) அல்லது இரு கண்களிலுள்ள வளர்மரிகளானோ (saxanians) நடைபெறுகின்றது. ஏப்பனேஜென்போரிகள் அனேகமாக உளர்ந்த மண்ணில் காணப்படும் உடலங்களில் உண்டாகின்றன. அச்சமயம் பழுவைப் பாகத்தில் உள்ள புரோட்டோபிளாஸ்டு ஒரு நூக்கியல் பாகங்களாகவோ பல நூக்கியல் பாகங்களாகவோ பிரிவடைந்து கோள வடிவம் கொண்டு செவ்விய உறைவைச் சுரப்பித்துக் கொண்டு, ஏப்பனேஜென்போரிகளாகச் செயல்படுகின்றன. அதுகூடியான சூழ்நிலையில் ஏப்பனேஜென்போர் நேரடியாக

கவந்த பசுமையான கோள வடிவான பாகம் (2 மி.மீ); இரண்டு, நிலத்தின் அடியில் (subterranean) பதிந்துள்ள நிறமற்ற இருபாதக் கிளைந்த (dichotomously branched) ஊரூய்டு (rhizoid) பாகம் (படம் 86) ஆகும். இந்த உடலம் முழுமையும் ஒரு செவ்விய ஆனது. அதாவது குறுக்குச் சுருக்கம் இல்லாதது என்பதை (siphonous) அமைப்பைக் கொண்டது. செவ்வியைத் தடித்தும் செவ்வியோசாக ஆனதுமாகும். உட்புறத்தில் செவ்விய்; மேக்குயிலாகச் சுற்றி அமைந்த ஊட்டோபிளாசத்தில் பல சிறிய நீண்டபடத் தட்டு போன்ற பசுமஞ்சள் வண்ணக் கணிகங்கள் பதிக்கப்பட்டுள்ளன. மஞ்சள் நிற ஊர்த்தோயில் நிறவிகன் அதிக அளவில் இருப்பதால் கணிகங்கள் பசுமையாக இல்லாமல் மஞ்சள் கவந்த பசுமையாக இருக்கின்றன. மற்றும் ஊட்டோபிளாசத்தில் பல நூக்கியல்கள் உடனம் முழுதும் அமைந்துள்ளன (coenocytic).

முனைத்து மண்ணுக்குள் புதுத்த இரட்டைக் கொள்களாகப் பிரி
கின்றது (ரைஜாய்டு பாகம்). மேல் பாகம் மண்ணின் மேல்
விசித்து பழைப் போல் வளர்கின்றது. சில சமயங்களில் அடிப்
பாகத்தில் உண்டாகும் ஏப்ளேனோம்போர்கள் பருமனான



படம் 87

படம் 87 ம. கிரோனோடெம் நிப்போனோம்போர்கள் ரைஜாய்டுகளில்
உண்டாகும்

படம் 88

படம் 88 ம. பூபரோனம் நிப்போனோம்போர்கள் ரைஜாய்டுகளில்
துளிகளில் உண்டாகும்

உறைவைச் சுரப்பித்துக் கொள்கின்றன (படம், 87). அக்கித
கம்போர்கள் நிப்போனோம்போர்கள் (hyphogonores) என்று வழங்கப்
படுகின்றன. இக்கித நிப்போனோம்போர்கள் ஒரு சில செற்றினங்
களினையே காணப்படுகின்றன.

வறட்சிக் காலத்தில் மேல்பாகத்தில் உள்ள புரோட்டோ
பிளாய்டு முழுமையும் மண்ணுக்கு அடியில் உள்ள ரைஜாய்டு
களில் கடத்தப்பட்டு அங்கு சிறு பாகங்களாகப் பிரித்து
நிப்போனோம்போர்களாகின்றன. சில செற்றினங்களில் (உ-ம்.
ம. கிரோனோடெம்—*B. granulosum*). இத்த நிப்போனோம்போர்கள்
ரைஜாய்டுகளில் நீளவாட்டில் வரிசைக் கிரமமாக அமைத்
திருக்கும் (படம் 87). மற்றச் செற்றினங்களில் (உ-ம்.
ம. பூபரோனம்—*B. tuberosum*) ஒவ்வொரு ரைஜாய்டு கொள்கின்
துளியிலும் ஒரு நிப்போனோம்போர் அமைத்திருக்கும் (படம் 88).
இத்த நிப்போனோம்போர் ஒரு தூக்கியைக் கொண்டிருத்தால்
முனைத்து நேரடியாகப் புதிய உடத்தை உண்டாக்குகிறது.
பல தூக்கியைக்கள் கொண்டிருத்தால், அதுஉவமான குழந்தியைக்
கவசவிழைவுடைய கவசாயிகளை (swarmers) உண்டாக்கு
கின்றன.

மாலினஸ் பெருக்கம்

மழைக் காலங்களில், நிலம்ட்டத்திற்கு மேலுள்ள பாகத்தில்
சிறிய இரு கவசவிழை காயிட்டுகள் மிகுதியாகத் தொன்றி

உடலத்தில் உறை கரைந்துவிடுதலால் வெளிவந்து, ஜோடியாக இணைந்து ஊனோட்டுகளை உண்டாக்குகின்றன. இந்த இணையும் கரமிட்டுகள் சில சமயங்களில் ஒரே அளவுடைவன் (isogametes), மற்ற சமயங்களில் ஒன்று பெரிதாகவும் மற்றொன்று சிறிதாகவும் உள்ணை (heterogametes). ஊனோட்டானது வறட்சிக் காலத்தில் ஓய்வுப் பருவத்தைக் கழித்து, பிறகு மழைக்காலத்தில் தேரடிவாக உடனாக முளைக்கிறது. இதற்கு மூன், ஊனோட்டில் உள்ள இரட்டைமய நூக்கியல் மைவானில் முழுவதில் பாகுபாட்டை வதன் மூலம் 4 அல்லது 8 இரு கணவியை ஜூன்போர்களை உண்டாக்குகின்றன. இந்த ஜூன்போர் மண்ணில் படிந்து முளைத்து பாட்சிடியல் உடலத்தை உருவாக்குகிறது.

வெளிரியா (Vaucheria)


வெளிரியா ஊர்தோனபனி (Xanthophyceae) வகையைச் சேர்ந்த மற்றொரு பாலிவரதம். இது குளிர்ந்த பிரதேசங்களில் மிகுதியாகக் காணப்படும். இவை பெரும்பாலும் தண்ணீரிலும் நிலத்திலும் வாழ்கின்றன. சில சிற்றினங்கள் கடலில் வாழ்கின்றன. நிலவாழ் சிற்றினங்கள் கரமண்ணிலும், (உழுத) வயல்களிலும் பரவிக் காணப்படுகின்றன.

இதன் உடலம் பல செக்டுமீட்டர் நீளத்தில் ஒரு சில இலாகாவே கொண்ட நீண்ட குழாய் போன்ற (siphonous) அமைப்பைக் கொண்டுள்ளது (படம் 89). நிலவாழ் சிற்றினங்களில், சில இலாகை கீழ்தோக்கி மண்ணினுள் வளர்ந்து வரஜூய்ஞ் களாகச் செயல்படுகின்றன. உடலத்தின் வளர்ச்சி துணிப்பாகம் நீண்டு வளர்வதன் மூலமே ஏற்படுகிறது. செல் உறை பெரும்பாலும் பெக்டினல் ஆக்கப்பட்டுள்ளது. குழாய் போன்றதுள்ள உடலத்தின் முழுதும் கேக்குலோல் (vacuole) விநாபித்துள்ளது. ஊட்டோபிளாசத்தில் (lining layer of cytoplasm) வெளிப் பரப்பில் பல வண்ணக் கணிகளையும் உட்பரப்பில் பல சிறு நூக்கியல்களும் காணப்படுகின்றன (படம் 89). கணிகங்கள் வட்ட அல்லது நீண்ட வடிவம் கொண்டுள்ளன. ஆனால், ஸ்பரினய்ஞ் அணுகளின் மேல் காணப்படா. சில சமயங்களில் ஊட்டோபிளாசத்தில் சிறு எண்ணெய்த் துளிகள் காணப்படும்.

மாலினம் பெருக்கம்

ஜூன்போர், ஏப்ளோனோஸ்போர் (aplanospore) அல்லது ஹிப்னோஸ்போர் (hypnospore) மூலம் இது தடைபெறுகிறது.

நீர்வாழ் செறிநிலங்களில், சாதாரணமாகப் பல கணசெய்துகளை வுண்டவ ஒரு பெரிய, கோணவடிவ ஜூன் போர் மூலம் இது நடை.



படம் 89. வெளிவாழ் திணைத்த இறை உட்காத்திக் தோற்றம்


பெறுகிறது. நீர்வாழ் செறிநிலங்களிலும் மனழக் காவங்களில் இயலித மான ஜூன்போர்கள் உண்டான துண்டு. இந்த ஜூன்போர் கிளப்பாகங்களிதான் தோன்றும். இச் சமயங்களில் உடலத்தின் கிளைப்பாகம் பருமனடைவ அதனுள் மிகுதியாக வண்டிடோபிளாகமும், வண்ணக் கணிகளும், நுகர்வியல்களும் உடத்தப்பட்டுப் பிறகு அதன் அடிப்பாகத்தின் ஒரு குறுக்குச்சுவர் உண்டாகிறது (வண்பனக் உடலம் கொண்ட பாகிகளில் இனப்பெருக்க உறுப்புகள் தோன்றும்போதுதான் குறுக்குச்சுவர் உண்டாகிறது). மற்றப் பாகங்களினின்று பிரிக்கப்பட்ட இச்செய்துகள் ஜூன்போராகம் (zoogonophore) என்று அழைக்கலாம். இச் சமயம்,



படம் 90
வெளிவாழ் ஜூன் போரத்தி
லிருந்து உட்கு ஜூன்போர்
வெளிவருதல்

ஜூன்போரத்தின் புரோட்டோபிளாக்ட்டிக் உள்ள நீயு கிளியங்கள் நுள்புறமும், வண்ணக்கணிகள்கள் சற்றுப் பின்னும் நகர்த்துகின்றன. பிறகு மூல புரோட்டோபிளாக்ட்டிக் செவ் துவறியின்றி பிரித்து ஜூன்போரத்தின் நுனியில் உண்டாகும் ஒரு துவாரத்தின் வழியாக வெளிவருகின்றது (படம் 90). வெளி வந்ததும் இந்த ஜூன்போர் அளவில் மிகப் பெரிதாகவும் கோண வடிவம் கொண்டதாகவும் காணப்படுகின்றது (படம் 91).

பல நுக்கியங்கள் இந்த ஜூஸ்போரின் புறப்பரகத்தில் வட்டமாக அமைந்துள்ளன. ஒவ்வொரு நுக்கியனின் எதிர்ப்புறத்திலும் ஒரு ஜோடி கசையிழைகள் அமைந்துள்ளன (படம் 91). அவற்றுள் ஒன்று மற்றொன்றை விட மிகவும் நீண்டுள்ளது. இவ்விதமான ஜூஸ்போர் பாசிலினங்களுக்குள் மிகவும் முக்கியத்துவம் வாய்ந்தது. ஒவ்வொரு நுக்கியனுக்கு முன்னால் ஒரு ஜோடி கசையிழைகள் இருப்பதால், பல சிறு இரு-கசையிழை ஜூஸ்போர்கள் ஒருங்கே சேர்த்திருத்தமீன் காரணமாக இவ்விதமான பெரிய ஜூஸ்போர் உண்டாகி இருக்கிறதென்று கருதப்படுகிறது.




படம் 91

கேசரியா கூட்டு ஜூஸ்போர்

கேசரியா கூட்டு ஜூஸ்போரின் ஒரு பாகம் (கசை இழைகள் ஜோடி கசை நுக்கியங்களுக்கு எதிரே அமைந்திருப்பதைக் காண்க)

ஜூஸ்போரகத்திலுள் புரோட்டோபிளாஸ்ட் மற்ற பாசிலனில் பாகுபாட்டை வகைப்போல் இங்கு பாகுபாடு அடைவாததே இதற்குக் காரணம். எனவே, இந்த ஜூஸ்போர் ஒரு கூட்டு



படம் 92

கேசரியா இள ஆத்திரியமும் இள கேசரியமும்

கேசரியா முதுவளர்ச்சி அடைந்த ஆத்திரியமும் கேசரியமும்

ஜூஸ்போரே (compound zoospore or synzoospore) என்று சிலர் கருதுகின்றனர். வெளி வந்த ஜூஸ்போர் சிதிலிடு தேரம் நீந்திய

பிறகு ஒலிடத்தில் திசுத்துக் கசையிழைகளை உள்ளிழுத்துக் கொண்டு உறையை உண்டாக்கிக் கொள்கிறது. பிறகு (1-3) குழாய்கள் போன்ற வளிக்கிறத் தொற்றுவித்து நீண்டு வெளியேயா உடலமாக முளைத்து விடுகின்றது. திசுவாழ் சிற்றினங்களில் சில சமயங்களில் இந்த ஜூஸ்போரகத்தினுள் இருக்கும் மூழு புரோட்டோபிளாஸ்டம் மெக்லிய உறையுடைய ஒரு பெரிய ஏப்பனேஜோஸ்போராகவோ (aplano-spore) அல்லது பிரித்து பல சிறு ஏப்பனேஜோஸ்போராகவோ மாற்றிவிடுகின்றது.



படம் 93

வெளியேயா பல அகோலியங்களுக்கு இடையே காணப்படும் ஆத்தரிடியம்

வறட்சிக் காலங்களில் உடலம் முழுமையுமே புரோட்டோபிளாஸ்டம் சிறு பாகங்களாகப் பிரித்து, தடித்த உறையுடைய ஹிப்போஜோஸ்போராகவோ (hyphospores) மாற்றிவிடுகின்றன.

பாலினப் பெருக்கம்

இந்த வகைப் பாகியில் பாலினப் பெருக்கம், உயர்ந்த கசையிழைகளில் தடைபெறும். நன்னீரிலும், சரமண்ணிலும் வாரும் சிற்றினங்களில் இரு பாதுறுப்புகளும் ஒரே உடலத்தில் உள்ளன (படம் 92). கடல் வரழ் சிற்றினங்களில் சிலவற்றின் உடலத்தில் அவை ஒரங்கே அமைந்திருப்பதில்லை. மூதனில் குறிப்பிட்ட சிற்றினங்களில் ஆத்தரிடியமும் கனகோலியமும், அடுத்தடுத்து ஒரு கிளைவிலோ அல்லது மூல உடலத்திலோ (main filament) (படம் 92) அமைந்துள்ளன. சில சிற்றினங்களில்,

ஆத்தரிடியத்தில் கீழுள்ள காம்புப் பாகத்தைச் சுற்றி, ஒன்றுக்கு மேற்பட்ட காம்புடன் கூடிய ஊகோலியங்கள் ஒரே அடுக்கில் அமைந்துள்ளன (படம் 93).

ஆத்தரிடியம், (ஒரு பக்கச்) இனியின் நுனிப்பாகத்தில் வளர்ந்து ஒரு கொக்கி போன்ற வடிவத்தைப் பெற்றுள்ளது. ஜூன்போரகத்தில் காணப்படுவதுபோல், இந்த ஆத்தரிடியம் மற்ற பாகத்தினின்றும் ஒரு குறுக்குச் கவரால் பிரிக்கப்பட்டுள்ளது. இந்த ஆத்தரிடியத்தின் வளர்ச்சியின்போது பல நூக்கியங்கள் கொண்ட புரோட்டோபிளாண்டு, ஒரு நூக்கியம் பாகங்களாகப் பிரிந்து, 2 கணசுவிழை ஆத்தரோஜாய்டுகளாக மாற்றம் அடைகின்றது (படம் 92). ஆத்தரிடியத்தின் நுனியில் ஒரு துவாரம் உண்டாகி, அதன் வழியே ஆத்தரோஜாய்டுகள் வெளிவருகின்றன. ஆத்தரோஜாய்டின் மூன் பாகத்தில் அமைந்துள்ள இரு கணசுவிழைகளும் சமநீளமற்றவை (unequal in length). மற்றும் நீளமான கணசுவிழை டிஞ்சல் வகையையும் மற்றொன்று சாட்டை வகையைச் சார்ந்ததுமாகும்.

ஊகோலியம்

அரைக்கோள வடிவம் கொண்டுள்ளது. உட்கத்தில் ஆத்தரிடியத்தின், அடுகில் உள்ள பாகம், சிறிது சிறிதாக உப்பி, அரைக்கோள வடிவம் அடைத்து, குறுக்குச் கவரால் பிற பாகத்தினின்றும் பிரிக்கப்பட்டு, ஊகோலியமாக உருவாகிறது. இளம் ஊகோலியத்தில் பல நூக்கியங்கள் கொண்ட புரோட்டோபிளாண்டு அதிகச் சேமிப்புப் பொருள்களுடன் காணப்படும் (படம் 92).

முழு வளர்ச்சி அடைந்த அண்டத்திலுள்ள ஒரே ஒரு நூக்கியம் தான் காணப்படுகிறது (படம் 92). ஆரம்பகாலத்தில் ஊகோலியத்தில் பல நூக்கியங்கள் காணப்பட்டபோதிலும், அண்டத்தில் கருவுறும் நிலையில் ஒரே நூக்கியம் இருப்பதன் காரணம் சரிவாகப் புளப்படவில்லை. ஊகோலியத்தின் அடிப்பாகத்தில் குறுக்குச் கவர் உண்டாவதற்கு மூன் ஒரு நூக்கியம் தவிர மற்றவை யாவும் ஊகோலியத்தினின்றும் வெளியேறுகின்றன எனச் சிலர் கருதுகின்றனர். மற்றவர், ஊகோலியத்தின் குறுக்குச் கவர் உண்டான பிறகு ஒரு நூக்கியம் தவிர மற்றவைபோதிலும் கிடைத்து விடுகின்றன என்று கருவர். அண்டம் முழுவளர்ச்சி அடைந்ததும் ஊகோலியத்தின் மேல்பாகத்தில் ஒரு சிறு துவாரம் உண்டாகிறது (படம் 92). ஆகவே, ஆத்தரோஜாய்டுகள் வெளிவந்தவுடன் ஊகோலியத்தை தாடி, துவாரத்தில் வழியாக உள்

சென்று அண்டத்துடன் இணை, பின்னர் இரு நுக்கியங்களும் இணைந்து அண்டத்தைக் கருவுறச் செய்கின்றன. ஊனகோட் அல்லது ஊம்போர் (oospore) 3-7 படலங்கள் கொண்ட பருமனுள்ள உறையை உருவாக்கிக்கொள்கிறது. இவ்வாயை, ஊனகோட்டினுள் எண்ணெய்ப் பொருள் (சேமிப்புப் பொருள்) மிகுதியாகத் தோன்றுகிறது. இத்தீவியில் ஊனகோட் ஒவ்வொரு தீவியடைகிறது. சிவமாதங்களிக்குப் பிறகு, தகுந்த சூழ்நிலையில் இத்த ஊனகோட் முளைத்து, புதிய உடலத்தைத் தோற்றுவிக்கிறது.

1945ஆம் ஆண்டு வரை வெளியீயா குளோரோபைட்டாவில் (chlorophyta), ஊனகோடிகள் (siphonales) பெருங்குடும்பத்தில் வகுக்கப்பட்டிருந்தது. 1945-ல் இந்தப் பேரினம், கீழ்க்கண்ட காரணங்களின்படி, தொகுதி கிரைஸோபைட்டாவில் (chrysophyta) வகை வாத்தொடையலில் (class : Xanthophyceae) மாற்றி அமைக்கப்பட்டது. (1) வண்ணக் கனிகைத்தின் திறம் மஞ்சள் கலந்த பச்சையாகியிருத்தல், (2) சேமிப்புப் பொருள் ஸ்டார்ச்சாக இவ்வாயிலிருத்தல், (3) ஊனகோடிகளில் உள்ள ஊனகோடிகள்—siphonoxanthin), ஊனகோடிகள் (siphonocin) என்று இரு மஞ்சள் திறமிகள் இந்தப் பாலியில் இவ்வாயை, (4) ஆத்திரோஜாஸ்டிரா கலசலிசுடிகளில் சம தீவியற்று ஒன்று திண்ணை (tinsel type) அமைப்பைக் கொண்டும், மற்றொன்று சாட்டை (whiplash type) அமைப்பைக் கொண்டும் இருத்தலாகும்.


5. தொகுதி : பேசில்லேரியோஸபட்டா (Division : Bacillariophyta)

பேசில்லேரியோஸபட்டாவில் அடங்கும் பேரீனங்கள் யாவும் டைபாடம்சுள் (diatoms) என்று குறிப்பிடப்படுகின்றன. அவை மற்றப் பாகெனிகளிலும் பல இயல்புகளில் வேறுபாடுடையன. சிறப்பாக, அவை ஒரு செல்லாவான (அல்லது பல செல்கள் கூட்டமாவதன் ஆன) உடனத்தை உடையன. இந்த டைபாடம்சுளில் செல் உறை ஒன்றன்மேல் ஒன்று பொருத்திய (overlapping) இரு பாதிகளாக (valves) ஆனதும், மிகுதியாக சிலிகா கூட்டுப்பொருளை (silicified) கொண்டதுமாகும். செல்லின் இரு பாதிகளும் பெட்ரி தட்டு (petri dish) அல்லது பேனா (box) போன்று ஒன்றன்மேல் ஒன்று பொருத்தப்பட்டிருக்கின்றன. செல்லுக்குள், ஒன்றிலிருந்து பல மஞ்சள் அல்லது பழுப்பு வண்ணக் கணிகள்கள் காணப்படும். இவற்றில் உள்ள திறமிகள் பச்சையம் a , பச்சையம் c , இருவகை கேரோடின்கள், மற்றும் ஐந்து விதமான ஸாந்தோபீக்ஸனுமாகும். இவற்றுள் டைபாடோஸாந்தின் (diatoxanthin) என்னும் திறமி சிறப்பாக டைபாடம்சுளில்தான் காணப்படும்.

சில பேரீனங்கள் நன்னீரிலும், சில கடலிலும், சில சுரமணிலும், சில பாறைகளின் மேலும், கவர்களின் மேலும், மரப்பட்டைகளின் மேலும், காணப்படும். சில தண்ணீரில் மீதத்து வாரும் (planktonic), பல சிற்றீனங்கள், சில பருவகாலங்களில் மட்டும் (வசந்தகாலம், இலையுதிர்காலம்) மிகுதியாகக் காணப்படுகின்றன.

டைபாடம் செல்லுக்கு, பிரண்டிசுல் (frustule) என்று பெயர். ஒன்றன்மேல் ஒன்று அமைந்த செல்லின் இரு பாதிகளில் (valves) வெளியில் அமைந்த பாதிக்கு எபிதீகா (epitheca) என்றும், உள்சே அமைந்த பாதிக்கு ஹைபோதீகா (hypotheca) என்றும் பெயர் வழங்கப்படுகிறது. எபிதீகாவும் ஹைபோதீகாவும் ஒன்றை யொன்று சேர்க்கும் பட்டைகளாக (connecting bands) இணைக்கப் பட்டுள்ளன. டைபாடம்சுளை எமக்ரால்கோப்பிக் பாகர்க்கும் பொழுது, இரு வால்வுகளில் ஒத்தேனும் ஒன்றுமட்டும்

காணப்படி அந்த "வால்வத் தோற்றம்" (valve view) என்றும் (படம் 94-95), இரு வால்வகளும் (இணக்கப்பட்ட இடத்தடன்) காணப்பெறின் "வலையத் தோற்றம்" (girdle view) (படம் 97)



படம் 94



படம் 95

படம் 94, செவ்வால்வ செவ்வால்வத் தோற்றம் (valve view)

படம் 95, செவ்வால்வ செவ்வால்வத் தோற்றம் (valve view)

என்றும் வழங்கப்படுகின்றன. டயாடத்தில் செவ்வால்வயின் வேதித்தன்மை (chemical nature) பல வகுப்புகளாகப் பல நிபுணர்களால் பரிசோதிக்கப்பட்டதன் காரணமாக இப்போது சிறிது புலனுபிழ்ந்து, செவ்வால்வயில், பெக்டின் என்ற அடிப்படைப் பொருளில், அதிகப்படியான சதவீதத்தில் (87%) சிலிகா (silica) பொருள் அமைந்துள்ளது. இந்த சிலிகா பொருள் குவார்ட்சின் (quartz) நிலையில் அமைந்துள்ளது. இதனுடன் சிறிதளவு அக்கைப் பொருளும் கலந்திருப்பதாகக் கூறப்படுகிறது. இந்த சிலிகா பொருள் தண்ணீரில் கிடைக்கும் சித்திரினங்களில் குறைவாகவும், நீரின் அடி (நீர்) மட்டத்தில் வாரும் சித்திரினங்களில் அதிகமாகவும் அமைந்துள்ளது. ஆகவே, இந்த டயாடம் செவ்வால்வயிழைத்தபின்னர் அதனுள்ளிருக்கும்



படம் 96

செவ்வால்வ செவ்வால்வத் தோற்றம் (valve view)

அங்கம் பொருள் அழித்த போதிலும் பிரஸ்புலுக்கள் (frustules) உயதன்மை மாறாமலும், உருமாறாமலும், அப்படியே பல்லாவிட வறுடங்களாக நிலைதிருக்க வல்லன.

இந்த சிலிகா பொருள், வாய்புகளில் ஒரே சீராக அமைவாமல், வரி (striae) அமைப்புகளாகவோ அல்லது வட்ட (areolae) அமைப்புகளாகவோ காணப்படுகின்றன. ஆகவே, இவ்வித அணி அமைப்புகள் (ornamentation) பேரினங்களையும் சிற்றினங்களையும் கண்டறிவப் பெரிதும் உதவுகின்றன. இவ்விதமான அணி அமைப்புகள் இரு வகைப்படும். ஒன்று, இருசமச்சீர் அமைப்புகள் (bilateral symmetry), இரண்டு, ஆர அமைப்புச்சீர் (radial symmetry). முதலில் கூறிய சீரமைப்பு 'பென்னேட்' (Pennate) அல்லது பென்னேசின் (Pennales) என்ற பெரும் குடும்பத்திலுள்ள பேரினங்களில் காணப்படும் (படங்கள் 94, 95). ஆர அமைப்பு உடைய பேரினங்கள் (படம் 96) சென்ட்ரேசின் (Centricae) அல்லது சென்ட்ரேசின் (Centrales) என்ற பெரும் குடும்பத்துள் அடங்கும். பென்னேட் டயாடங்களில் வாய்க்கித் தட்டையான பாகத்தில் இரு பக்கங்களிலும் ஒரே மாநிலீயான மெல்லிய கோடுகள் (striae) எதிரெதிரே காணப்படும். கோடு ஒவ்வொன்றும் உண்மையில், ஒன்று அல்லது இரண்டு வரிசைகளில் அமைந்துள்ள பனபுள்ளிகளாகும் (punctae). எலெக்ட்ரான் மைக்ரோஸ்கோப் மூலம் பார்த்தால் இந்தப் புள்ளி ஒவ்வொன்றும் செவ்வகவழியில் உள்ள சிறு துவாரமாகும் (pore). துவாரங்களின் உட்புறம் பளாஸ்மா ஜில்லா (plasma membrane) மூடப்பட்டுள்ளது. இவற்றின் மூலம் நீர்விரிந்து உப்புச் சத்துக்களை mineral nutrients) கிரகித்துக் கொள்ள இயலும்.

சென்ட்ரிக் டயாடங்களின் சீரமைப்புகள் 'பென்னேட்' டயாடங்களில் உள்ளதின்விடிலும் மாறுபடுகின்றன. 'ஏரியோலா' (areola) என்று குறிக்கப்படும் பல்கோண வடிவ (polygonal areas) பரப்புகள் ஆர வடிவில் (radiating) அமைந்துள்ளன. ஒவ்வொரு ஏரியோலாவும், மலில் போன்ற தடிப்புகளாக (ridges) சூழப்பெற்றுள்ளது. இப் பரப்பில், சிலிகா உறை மெல்லியதாக அமைந்திருப்பதற்கினால், பல நுண்ணுவாரங்களையும் கொண்டுள்ளது. துவாரங்களின் உட்புறத்திலுள்ள பளாஸ்மா ஜில்லின் மூலம், சுற்றிப்புள்ள நீரிலிந்து சத்துப் பொருள்களைக் கிரகிக்க இயலும், மற்றும் பென்னேட் (Pennate) டயாடங்களுள்ளபேரினங்களில் ஒருவாக்கிலிமட்டும் அல்லது இருவாக்கிலும் தட்டையான பாகத்தின் மத்தியில், நீளவாட்டில், ஒரு கோடு காணப்படுகிறது. இந்தக் கோடு உண்மையில் ஒரு சிறிய வரிப் பள்ளமாகும்

(groove). இதற்கு 'ரேபி' (raphe) என்று பெயர் (படம் 94, 95). இந்த ரேபி (raphe) உள்ள பேசின்னங்கம்தான் இடம் பெயரும் திறனைப்பெற்றுள்ளன. இந்த ரேபியானது, வாக்ஸின் ஒரு முனையிலிருந்து எதிர் முனை வரையில் நீண்டுள்ளது. இதன் அடிப்பாகத்தில் அதாவது செல்லுறையின் உட்பாகத்தில் இதைப் பேர்வறே

எபிதீகா



ஹெர்போதீகா

படம் 97



படம் 98



படம் 99

படம் 97—99. பேசிலேரியா செல் பாகுபாட்டைத்து இரு சேய்ச் செல்கள் உண்டாகும் படிவங்கள்


மற்றொரு வரிப்பள்ளம் அமைத்திருக்கிறது. இந்த ரேபியின் மத்தியிலும் இரு கோடிகளிலும் (ends), சிறிய முண்டுகள் (nodules) காணப்படுகின்றன. டயாடம் செல்லின் இடப் பெயர்ச்சிக்குக் காரணம் இந்த ரேபியில் ஸைட்டோபிளாசம் ஓடுவதேயாகும் (cytoplasmic streaming) என்று முல்வர் (Muller) என்பவர் நிரூபித்துள்ளார். எபிதீகா, ஹெர்போதீகா ஆகிய இரு வாக்ஸுகளிலும் உள்ள வரிப்பள்ளங்களில் ஒரே திசையில் இந்த ஸைட்டோபிளாசம் ஓட்டம் நிகழ்கிறது. இந்த ஓடும் ஸைட்டோபிளாசம், வரிப்பள்ளத்திற்கு வெளிப்புறத்தில் உள்ள நீருடன் தொடர்பு (contact) கொண்டிருத்தலால், அந்த நீரும் அதே திசையில் தள்ளப்படுகிறது. இதன் விளைவாக டயாடம் செல்

அதற்கு எதிர்த்திசையில் (பாடிலின்போல்) நகர்ந்து. இவ்வாறு நிறுதுதாரம் சென்றபிறகு டயாடம் செல், மிகச்சொற்பகாரம் அசைவற்றிருந்து, பின்னர் நகர்ந்து வந்த பாதையிலேயே பின் நோக்கிச் செல்கின்றது. இவ்விதத் திசைமாற்றத்திற்குக் காரணம் வரப்பெய்தத்தில் ஓடும் ஸைட்டோபிளாசத்தின் திசையும் மாற்றப்படுவதேயாகும் என்று கண்டுகொள்ளனர். செல்லுறைக்குக் கீழேயுள்ள தடித்த ஸைட்டோபிளாசப் படிவத்தின் (layer) வண்ணக்கணிகைகள் (chromatophores) பதிக்கப் பெற்றுள்ளன (படம் 97).

சென்னை டயாடங்களில் வேக்குபோலுக்குக் (vacuole) குறுக்கே (பாலம்போலமைத்த) ஒரு தடித்த ஸைட்டோபிளாசப் பட்டையினால் செல்லின் நுக்கலியல் அமைந்துள்ளது. மற்றும், ஒன்று அல்லது இரண்டு தகடு போன்ற (laminate) வண்ணக்கணிகைகள் ஒரு பக்கத்திலேயும் அல்லது எதிரீ எதிராக இரு வாக்வுகளின் உட்புறத்திலேயும் அமைந்துள்ளன.


சென்டரிக் டயாடங்களில் பல சிறிய வட்ட அல்லது நீள் வட்ட வடிவத் தட்டையான (discoid) வண்ணக்கணிகைகள் செல்லில் பல இடங்களில் அமைந்துள்ளன. செல் நுக்கலியல் செல்லுறைக்கு அண்மையில் ஒரு பக்கத்தில் அமைந்துள்ளது.

டயாடம் செல்லின் நுக்கலியல் உடனடி செல்லில் இரட்டையவ நிலையில்தான் காணப்படுகிறது. சில சமயங்களில் இருரோமோடோபோரிக்ஸேல் ஒன்று அல்லது அதற்கு மேற்பட்ட வயரிலும்




படம் 100. ஸ்டிரெக்லா இனம் ஒன்றின் பாலிஸப் பெருக்கப் படிவங்கள் போன்ற அமைப்புகள் காணப்படுகின்றன. ஆனால், இவை தரக உறைவற்றுள்ளன (starch sheath). ஆகவே, இவ்விதமான

அமைப்புகள் எண்ணெய்த் சத்துச் சேமிப்புப் பொருள்கூண்டாக்கு வதற்குக் காரணமாகவுள்ளன என்றும் அவை எலையோபினாண்டு கள் (elaioplast) என்றும் நெராக் கருதப்படுகின்றன. ஆகவே கொழுப்புப் பொருள்களை டயாடத்தில் முக்கிய சேமிப்புப் பொருளாகும். இவை வண்ணக்களிகளின் மேலோ அல்லது



படம் - 101



படம் - 102

படம் 101—102, சிம்பெக்ன இம்னாளுதரிக் பாலினப் பெருக்கப் படிவங்கள் ஊட்டோபினாசத்திலோ பனபனக்கும் எண்ணெய்த் துளிகளாகக் காணப்படுகின்றன. லூபெக்சின் (leucosin) என்ற ஒரு கிதத் தரசம் பொருளும் இவ் டயாடங்களில் காணப்படுகின்றது.

செய்பாதுபாடு


செக் பாகுபாட்டின் மூலம் செக் எண்ணிக்கை அதிகரிக்கின்றது. இங்மையம், செக்கின் புரோட்டோபிளாஸ்டு சற்றுப் பெரிதாகின்றது. இரு வாக்வுகளும் தனித்தனியே சிறிது விசைகின்றன (படம் 97). நூக்கியல் கைட்டானில் மூன்றாம் (படம் 97, 98) பாகுபட்டின் செக்கின் புரோட்டோபிளாஸ்டு நீளவாட்டில் (longitudinal) இரண்டு சம பாகங்களாகப் பிரிக்கப்படுகின்றது (படம் 99). இந்த இரண்டு பாகங்களுக்கும் இடையில் இரு புதிய வாக்வுகள் உருவாக்கப்படுகின்றன. இவ்விதமாக உண்டாகும் புதியவாக்வு எப்போதும் கைரோபோதிகாவாகியே அமைகின்றது (படம் 99). ஆகவே, செக் பாகுபாட்டிற்குப் பிறகு ஒரு சேம்ச் செக்கின் அளவு தாய்ச் செக்கின் அளவையே கொண்டிருக்கும். ஏனெனில் அந்தச் செக்கின் எபிதீகா தாய்ச் செக்கின் எபிதீகாவாகும். (புதியதாகத் தோற்றுவிக்கப்பட்ட கைரோபோதிக் அதைவிடச் சற்றுச் சிறிதாக இருக்கும்.) ஆனால், மற்றொரு சேம்ச் செக்கின் எபிதீகா, தாய்ச் செக்கின் கைரோபோதிகாவேவானதால் (புதிதாகச் சுரப்பிக்கப்பட்ட வாக்வு எப்போதும் கைரோபோதிகாவாகும்.) இந்தச் சேம்ச் செக், மற்றச் சேம்ச் செக்கைவிடச் சற்றுச் சிறிய அளவைக் கொண்டுள்ளது. இங்மையம் செக் பாகுபாட்டினால் உண்டாகும் ஒவ்வொரு சத்தவியிலும் 50 சதவீதம் சிறிது அளவில் குறைந்த டயாடம் செக்கள் உண்டாகின்றன. இப்படிப் பல சத்தவிகளுக்குப் பிறகு பார்ப்போமானால், ஒரே ஒரு செக் தொடக்கத்தில் காணப்பட்ட அளவுடனும், மற்றச் செக்கள் சிறிது சிறிதாக அளவில் குறைந்தும் காணப்படுகின்றன. இவ்விதமாகப் பல சத்தவிகளுக்குப் பிறகு செக்கள் மிகமிகச் சிறியதாக அளவுடன் அதன் கைட்ட வேலைகளும் வளர்சிதை மாற்ற வேலைகளும் பாதிக்கப்படுகின்றன. இதை நிவர்த்திக்க ஒருவிதமான புத்துக்கு நிகழ்ச்சி (rejuvenation process) நடைபெறுகின்றது. அதாவது ஆக்ஸோஸ்போர் (auxospore) என்ற ஒருவிதமான கீபோர்திக் உண்டாகி அதன் மூலம் அந்தச் சிற்றினத்தின் பூர்வாங்க (original) உச்ச வரம்பு அளவை (maximum size) அடைய இயலுகின்றது (படம் 102). இந்த ஆக்ஸோஸ்போர் உண்டாகும் விதம், ஒருவிதப் பானில் வாய் பெருக்கலாக என்ற தவறான எண்ணம், முதல் மூதனில் இருந்து வந்தது. ஆனால், சமீபகால ஆராய்ச்சிகளில்மூலம், இம்மூன்றாம் பானைப் பெருக்கத்தில் ஒரு படிவமே என்று நியமநிரூபிக்கப்பட்டுள்ளது. இதன்படி, ஆக்ஸோஸ்போர் என்பது அளவில் பெருகிய கைகோட்டே ஆக்தி, வேறு இனப் பெருக்க உறுப்பு ஆன்று என்பதும் தெரியவந்தது.

பாலினப் பெருக்கம்

மொதுவாக டயாடம் செட்கள் குறிப்பிட்ட மிகக் குறைந்த அளவை (minimal size) அடைந்த பிறகே பாலினப் பெருக்கத்தில் ஈடுபடுகின்றன. இரு அயீபா போன்ற காரீட்டுகள் இன்னவதன் மூலமர்களவும் ஊகரி மூன்றினும் பாலினப் பெருக்கம் நிகழ்ந்திருந்தன. டயாடம் செட்கின் தூக்கியல் இரட்டை மலமானது (diploidy). ஆகவே, காரீட்டுகள் தோன்றும்போது தூக்கியல், மையாலில் (meiosis) மூன்றயில் பாகுபாடடைந்து, காரீட்டுகள் ஒற்றைமல நிலையை அடைய ஒதுவாகின்றது. இரு காரீட்டுகள் இன்னத்த வுடன், ஊகோட் அளவில் பெரிதாமி ஒரு மெக்லிய உதறையைச் சுரப்பித்துக்கொண்டு ஆக்ஸோஸ்போராக மாறுகிறது. பின்னர் இத்த ஆக்ஸோஸ்போருக்குள் ஒன்று (அல்லது இரண்டு) புதிய டயாடம் செட் உண்டாகிப் பின்னர் வெளிவருகின்றது. இவ்வாறு புதிதாக உண்டாகும் டயாடம் செட்கள் பூர்வாமிச அளவையும் (original size) வடிவத்தையும் பெற்றுக் காணப்படுகின்றன.

பெண்ணே டயாடங்களில் பாலினப் பெருக்கமுறை (இன்னதன் மூன்ற—Conjugation)

(1) இரு செட்கள் முதலில் பணைப்பொருள்களால் (nematode) குழப்பப்பட்டுப் பிறகு ஒவ்வொரு செட்கிலிருத்தும் இரு வாக்வுகளும் விதை ஒர் அயீபா போன்ற காரீட்டு வெளிவருகின்றது. இரு காரீட்டுகளும் ஒன்றையொன்று அணுமி இன்னத்து ஒரு ஊகோட்டை உண்டாக்குகின்றன. ஊகோட், உடனே தீன



படம் 103

வாட்டில் பணைப்பொருள் பெரிதாமி, ஒரு மெக்லிய உதறையைச் சுரத்து கொண்டு ஆக்ஸோஸ்போராக (axogone) மாற்றமடைகிறது. ஆக்ஸோஸ்போருக்குள், பின்னர் பூர்வாமிச (original) அளவான செட் உண்டாகி வெளிவருகின்றது (உ-ம். ஸிரேலிக் செட் செனிகா—*Surirella saxonica*) (படம் 103).

(2) பக்குகொள்ளும் (இரு) செக்கள் ஒவ்வொன்றிலிருந்தும் இரு அம்பா போன்ற காயிட்டுகள் உண்டாகி அவை ஜோடிகளாக இணைந்து, இரு ஊன்கொட்டுகளைத் தோற்றுவித்து, அவை மூன்றையே இரு ஆக்னோம்போர்களாக மாற்றுகின்றன (உ-ம், சிம்பெல்லா லாங்குலேட்டா—*Cymbella lanceolata*) (படங்கள் 101, 102).

(3) மேற்கூறியவாறு பக்குகொள்ளும் செக்கள் ஒவ்வொன்றிலும் இரு காயிட்டுகள் தோன்றுகின்றன. ஆனால், ஒரு செக்கில் இரு காயிட்டுகளும் நிலைத்திருக்க (stationary) எதிர்ச் செக்கிலிருந்து இரு காயிட்டுகளும் நகர்ந்து, நிலைத்திருக்கும் காயிட்டு களுடன் இணைகின்றன. (உ-ம், ஹாலிபிலா ஹேலோபிலா *Navicula halophila*) (படங்கள் 103, 104). ஆகவே, ஒரு செக்கிலேயே இரு ஊன்கொட்டுகளும் காணப்படுகின்றன. ஊன்கொட்டுகள் பின்னர் அவைப் பெருகி இரு ஆக்னோம்போர்களாகின்றன (படம் 104).

சில சமயங்களில் ஒவ்வொரு செக்கிலும் தோன்றும் இரு காயிட்டுகளில் ஒன்று நிலைத்திருக்கும். மற்றொன்று நகர்ந்து செக்கும். நகர்ந்து செக்கும் காயிட், எதிர்ச் செக்கிலுள்ள நிலையான காயிட்டுடன் இணைகிறது. இணைப்பின் பிறகு ஒவ்வொரு செக்கிலும் ஒரு ஊன்கொட்டு மட்டுமே காணப்படும்.


(4) ஒவ்வொரு செக்கிலும் ஒரு காயிட்டு உண்டாகிறது. ஆனால், இரு காயிட்டுகளும் செக்கிலின்றி வெளிவந்த பிறகு



படம் 104

படம் 103-104, ஹேலிபிலா இணைதல் மூலதனிக் பாலினப் பெருக்கப் படிமங்கள்

ஒன்றையொன்று அணுகாமல் இணையாமல் தனித்தனியே ஊனகோட்டாக மாற்றம் அடைகின்றன (படம் 105). இவ்வித நிகழ்ச்சிக்கு அப்போகமி அல்லது பாரத்தினோஜெனிசிஸ் (apogamy or parthenogenesis) என்ற பெயர் பொருத்தும். இத்திகழ்ச்சியில் காமீட்டுகள் உண்டாகும் போது நூக்கியலின் மையாலின் மூறை பாகுபாடு தடைபெறுவதில்லை. ஆகவே, புதிதாகத் தோன்றும் டயாடம் செல் இரட்டைமைய நூக்கியலையே பெற்றுள்ளது (உ-ம். கோக்கோனின் மினாசென்டிரா வெ. லினீயோ — *Cocconia placentula* var. *lineata*).



படம் 105

கோக்கோனின் (*Cocconia placentula* var. *lineata*) இரு ஆக்ஸோகமிகள் பாரத்தினோஜெனிசிஸ் (parthenogenesis) மூலத்தில் உண்டாகும்.

சென்ட்ரிக் டயாடம்களின் மாலினஸ் பெருக்க முறை

(1) ஆட்டோகமி முறை : சில சென்ட்ரிக் டயாடம்களில் (உ-ம். மெலோசைரா — *Melosira*, கைக்ஸோடெக்ஸா மென்கிலியானா — *Cyclotella meneghiniana*) ஆக்ஸோகமி போல் உண்டாகும் மூறை மேற்கூறிய நிகழ்ச்சிகளினின்றும் வேறுபட்டதாகும். அதாவது இத்திகழ்ச்சியில் ஒரே ஒரு செல் பங்கெடுத்துக் கொள்கிறது. அப்போது இரு வால்வுகளும் பிரிக் கப்பட்டுப் புரோட்டோபிளாண்டு நேரடியாக ஊனகோட்டாக மாற்றமடைகின்றது. புறத்தோற்றத்தில் அப்போகமியைப் (apogamy) போல் இத்திகழ்ச்சி காணப்பட்டாலும், ஊனகோட்ட உண்டாவதற்குமுன் இரட்டை மையமான நூக்கியலின் மையாலின் (macula) மூறையில் பாகுபாடடைந்து நான்கு ஒற்றைமைய நூக்கியல்களை உண்டாக்குகின்றது (படம் 106). அவற்றுள் இரண்டு சிதைவுற, மற்ற இரண்டும் இணைந்து, 'தன்சேர்க்கை' ஆட்டோகமி (autogamy) முறையாக இரட்டைமையமான (diploid) நூக்கியலை உண்டாக்குகிறது (படம் 107). ஆகவே இவ்விதமாக உண்டான ஊனகோட்டின் வெனித்தோற்றத்தில் மாற்றம் ஏதும் புலனாகாவிடினும், உள்சே (அகத்தே) காமீட் நூக்கியல்கள் இணைவதைக் (மைக்ரோஸ்கோப்பின் மூலம்) காணலாம்.

(2) கையி முறை : இம் முறையில் உண்டாகும் ஆக்ஸோன்மோர் சில உடல்வாழ் பேரினங்களில் (உ-ம். ரிடெல்மோ -



படம் 106



ஆக்ஸோன்மோர்

படம் 107

படம் 106-107. கைகோடுகோ (cyclotella meneghiniana) இனத்தைச் சேர்ந்த ஆக்ஸோன்மோர் முறையில் ஆக்ஸோன்மோர் உண்டாகும் படங்கள்

Biddulphia, டீட்போசிரஸ் - chaetoceros, மெலோசிரா-Melosira, கைகோடுகோ-Cyclotella, இஸ்த்மியா-Isthmia) உயர்த்த



ஆத்திரேஜியம்



படம் 108

முதலான கசையி முகையில் பாலினப் பெருக்கம் நிகழ்வதைச் சமீப காலத்தில் பலர் விவரித்துள்ளனர். இவற்றில், ஒரு செய்கிள் (ஆண்) புரோட்டோபிளாண்டு பாகு பாட்டைத்து 4, 8, 16, 32 அல்லது 64 ஒற்றைக் கசையிழை கொண்ட (uniflagellate tinsel type) ஆண் கசையிடுகள் (antherozoid or microspore) (படம் 109) தோற்றுவிக்கின்றது. (படம் 108) இவை உண்டாவதற்கு முன், செய்கிள் இரட்டைமய றூக்னியல் மையரஸில் முதலில் பாகு பாட்டைவதாம் ஆண் கசையிடுகள் ஒற்றைமய நிலையைக் கொள்கின்றன. மற்றொரு செய்கிள் (பெண்) புரோட்டோபிளாண்டு முழுதும் மையரஸில் முதலில் றூக்னியல் பாகுபட்ட பிறகு ஓர் அண்டமாகச் செயல்படுகின்றது. ஆந்திரோஜாமீடுகள் வெளிவந்த பிறகு இந்த அண்டத்தைத்தேடி நீத்தி இரு வால்வுகளுக்கும் இடையே (அல்லது துவாரங்களின் வழியாகவாவது) உட்புகுகின்றன. அண்டத்துடன் இணைந்து கரு வுதச் செய்கிறது. எனகோட் (படம் 110) முன்கூறிய முறைப்படி ஆக்னோஸ்போராகப் பின்னர் வளர்ச்சி அடைகிறது.



ஆந்திரோஜாமீட

படம் 109

சில கடல்வாழ், மீதக்கும் சிற்றினங்களிலும், ஒரு சில தண்ணீர்வாழ் சிற்றினங்களிலும் (உ-ம், செனட்ரோசென்—centro-



படம் 110

மெலோசென் (melosira varians) கசையி முதலில் பாலினப் பெருக்கம் உடையெழும் படிவங்கள்

ceros, மெலோசென்—Melosira, ரைனோசெனிலீனா—rhizosolenia) செய்கிள் புரோட்டோபிளாண்டு கருக்கி, இருபாலியாக அமைந்த உதையாகக் குழப்பப்பட்டு எட்டெட்டோகப்போர்

(statospore) என்ற ஓர் ஓய்வுநிலை உயிர்வரை (resting spore) உண்டாக்குகிறது. இந்தநிலை, அவை குளிர் அல்லது வறட்சிக் காலங்களில் கடக்க உதவுகிறது.

டயாடம் மண் (Diatomaceous earth)

டயாடம் செல் இறந்து அழிவுற்ற பிறகும் கலிகாலினிலும் ஆக்கப்பட்ட செல் உறை ப்ரண்டியூல் (frustule) அழிவடைவ நிலை. இத்தக் காலியான (empty) செல்லுறைகள் மூழ்ந்தி, நீரின் தரைமட்டத்தில் தேங்கிப் பருமனான படுகைகளை (deposits) உண்டாக்குகின்றன. இதற்கு டயாடம் மண் என்று பெயர். இத்தப் படிபொருள் உலகத்தின் பல்வேறு பாகங்களில் காணப் படுகின்றது. இத்தப் புதை படிவமாக அமைந்த டயாடம் சித்திரைக்கல் கிரீடேஷியல் பருவத்திற்கு (cretaceous period) மூன் இருத்ததாகத் தெரிகின்றன.

டயாடம் மண், தன்னீர்லாவது, கடல் நீர்லாவது அமைத் திருக்கக் கூடும். கடலில் உண்டான இத்தப் படிவங்கள் பூகர்ப்ப (geological) மாலுதல் காரணமாகப் பல்லாசிரக் கணக்கான ஆண்டுகளுக்குப் பிறகு நிலத்தின் மேலே தள்ளப்பட்டுக் காணப் படுகின்றன. கலிபோர்னியாவில் (California) உள்ள சாண்டா மாரியா (Santa Maria) என்ற எண்ணெய் வயல்களில் (oil fields) 3000 அடி ஆழத்துக்கு இப் படிபொருள் அமைந்துள்ளது. அம்மிதமே லாம்பாக் (Lampoc) என்ற வெனீஸிலும் பூமிக்கு மேலே 700 அடி உயரத்திற்குப் பன டெனாமீட்டர் நீளத்தில் இத்தகைய படிபொருள் அமைந்துள்ளது. இம்மிதப் படிபொருள் இத்தியாவில் காஷ்மீரத்தில் காணப்படுகின்றது.

இத்த டயாடம் மண் (diatomaceous earth) பல விதங்களில் பயன்படுகின்றது. உலகில் ஹெட்டி எடுக்கும் டயாடம் மண்ணில் பெரும்பகுதி சர்க்கரை தயாரிக்கும் ஆலைகளில், கருப்பஞ்சாத்தி வின்று கரைவாத அகத்தங்களை (suspended impurities) வடிவட்ட உபயோகப்படுகின்றது. பிளாஸ்டிக் (plastic) தொழி லிலும், வர்ணம் தயாரிக்கும் தொழிலிலும் மிகுதியாக இம்மண் உபயோகிக்கப்படுகின்றது. மற்றும் அநி உயர்ந்த உஷ்ணநிலை வுடைப (over 1000° C) னது உலைகளில் (blast furnace) உஷ்ணப் பாதுகாப்பிற்கும் (insulation) இது கைவான்படுகிறது. மற்றும் கைக்கிராஸ்கோப்பின் லென்ஸ்களின் திறனைச் சோதித்ததிலையும் இம் மண் மிகுதியாக உதவுகின்றது.

6. தொகுதி : கிரேஸேபைட்டா (Division: Chrysophyta)

இந்தப் பெரும் தொகுதியினுள் அடங்கும் பேரினங்கள் பொன் - பழுப்பு (golden brown) நிற வேறுபாட்டைக் கொண்ட வண்ணக் கணிகங்கள் (chromatophores) உடலத்தில் கொண்ட பாகங்களாகும். இவ்வித வண்ணங்களுக்குக் காரணம் கேரோட்டின் (carotin), ஊந்தோயில் (xanthophyll) ஆகிய நிறமிகள் மிகுதியாகக் கணிகங்களில் அமைந்திருப்பதேயாகும். மற்றும் இந்தப் பாகங்களில் சேமிப்புப் பொருள்கள், லூகோசின் (leucosin) என்ற ஒருவிதத் தரசப் பொருளும், எண்ணெய் (oil) சத்துகளாகும்.

7. தொகுதி: பெயோஸைட்டா

(Division : Phaeophyta)

பழுப்புப் பாலிகள்

(Brown Algae)

இப் பாலிகளில் மஞ்சள் கலந்த பழுப்பு நிற (yellowish brown) வண்ணக் கணிகங்கள் (chromatophores) காணப்படுகின்றன. பச்சையத்தையிட அதிகமாக ஊர்த்தோபிள் (xanthophyll) நிறமிசம் இருப்பதே இதற்குக் காரணம். இப் பாலிகளில் லேமினேரின் (laminarin) என்ற கார்போஹைட்ரேட்டும் மெனிடாச் (mannitol) என்றும் சாராயப் பொருளும் சேமிப்பும் பொருள்சகாகும். இது பழுப்பு வண்ணப் பாலிகளில் மாதிரியே காணப்படும். பழுப்புப் பாலிகளின் உடலம் யாவுகப் பல செல்களாலானவை (multicellular). நீத்தக் கூடிய இனப்பெருக்கச் செல்கள் பசும்பாலிகளினின்றும் வேறுபட்டும் பேரீ வாழ்வம் (pyriform) கொண்ட போதிலும் இரு கணையிழைகளைப் பக்க ஊட்டிப் (laterally biflagellate) கொண்டுவன. கணையிழை களுள் ஒன்று நீண்டது : திசைச் (tinsel type) வகையானது. மற்றொன்று குட்டையானது : சாட்டை (whip-lash type) வகையானது.

மூன்று நன்னீர்ப் பேரீனங்களைத் தவிர, மற்ற எல்லாப் பேரீனங்களும் கடல் வாழ்வன. இவை குவிர்ந்த நீரில் செழிப் பாக வளரக்கூடியன. சிறப்பாக ஆர்க்டிக் கடல், அண்டார்டிக் கடல் கரையோரப் பகுதிகளில் இவற்றின் உச்ச வளர்ச்சி நிலையைக் காணலாம். பேரீய உடலம் கொண்டுவன கடல்வாழ் பேரீனங்களுக்கு 'கெல்ப்ஸ்' (kelps) என்று பெயர். எனினும் டிக்டயோட்டா (Dictyota), சர்க்காசம் (Sargassum) போன்ற பாலிகள், வெப்ப மண்டலங்களிலும் மிகுதியாகக் காணப்படுகின்றன. கடல்வாழ் பேரீனங்கள், பாதைகளின் மேலாகவது அங்னது மற்ற கடல் பாலிகளின் (sea weeds) மேலாவது ஒட்டி (epiphytes) வளர்கின்றன. அவற்றுள் பெரியவைவான (100 மீட்டருக்கு மேல் நீளமுள்ள) மெக்ரோசிஸ்டிஸ் (Macrocystis), நிரோசுசிஸ்டிஸ் (Nereocystis) போன்ற பேரீனங்கள் மிக ஆழத்திலும் வளர் கின்றன. அவை அகர செல்ப்கள் (giant kelps) என்று அழைக்கப் படுகின்றன.

உடலத்தின் வளர்ச்சி மூன்று வகைப்படும். ஒன்று, இடைத்திசு வளர்ச்சியுள்ள (intercalary growth) ஒரே வரிசை இடை உடலப் பெரினங்கள். அதாவது, இழையில் எந்தச் செல்லும் பாகுபாடடையும் திறன் பெற்றிருக்கும் (உ-ம்.) எக்ஸ்கார்பஸ் (exocarpus), இரண்டு உடல நுனியில் உள்ள ஒரு நுனிச் செல் பாகுபாடடையதாக ஏற்படும் வளர்ச்சி (apical growth) (உ-ம்.) டிக்டயோட்டா (Dictyota). மூன்று, உடலத்தின் ஒரு பகுதியில் அமைந்துள்ள ஆக்கத்திசுவிலும் (intercalary meristem) ஏற்படும் வளர்ச்சியாகும் (உ-ம்.) லேமினேரியா (lamnaria), மேக்ரோசிஸ்டிசு (macrocystis), நேரேகிஸ்டிசு (Nereocystis).

செல் அமைப்பு

செல்லுறை இரு படலங்களைக் கொண்டது. கெட்டியான உட்படலம் செல்லுறையினாலும், பசைப் பொருளைக் கொண்ட மிருதுவான வெளிப்படலம் ஆகத்தேனும் ஆனது. ஆகத்தின் என்பது ஆகத்தினிச் சுழிவத்தின் கால்கியம் உப்பாகும் (calcium alginate). செல் புரோட்டாபிளாண்டு பொதுவாக ஒரு பெரிய வேக்குயோடிக் கொண்டுள்ளது. நூக்லியஸ் செல்லுறைக்கு அடியில் உள்ள லைட்டோபிளாஸ்ட் படலத்தில் அமைந்துள்ளது. சில பேரினங்களில் நூக்லியஸ் பாகுபாடடையும் பொது சென்ட்ரோசோம்கள் (centrosomes) காணப்படுகின்றன. செவ்விலுள், சில சிற்றினங்களில் பட்டை போன்றும், சில சிற்றினங்களில் நீள்வட்டத் தட்டு போன்றும், லைனியம் அற்ற வண்ணக் கனிகைகள் அமைந்துள்ளன. இவைகளில் உள்ள நிறமிகள் பச்சையம் a, பச்சையம் c, கேரோடின தவிர மற்றும் ஆறுவித ஸாந்தோபிச்கள் ஆகும். வியோலாக்ஸாந்தின் (violaxanthin) பியோலோக்ஸாந்தின் (flavoxanthin), நியோலாக்ஸாந்தின் (neoxanthin) என்னும் மூன்று நிறமிகள் பழுப்புப் பாகிவிலுள் தாள் காணப்படுகின்றன.

பாலின இனப்பெருக்கம்

ஜூன்போர் மூலமாவது அகன்று ஏப்ரெனோகம்போர் அகன்று டெட்ராஸ்போர் (tetraspore or tetraspore) மூலமாவது நடைபெறுகின்றது. பாலினப்பெருக்கம், மூன்று முறைகளான ஐசோகமி, அஹீசோகமி, ஹெமி முறைகளில் நிகழ்கின்றது. பல்பேரினங்களில் வரழ்க்கைச் சுழலில் ஒத்த அகன்று ஒவ்வாத சத்ததி மாற்றம் (isomorphic or heteromorphic alternation of generations) காணப்படுகின்றது.

கிப்புகளில் பெருங்குடும்பத்தில் (Order Fucales) அடங்கும். பேரினங்கள் தவிர, மற்ற எல்லாவற்றின் வாழ்க்கைச் சுழலிலும் காயிட்டோமைட்டும், கிப்போரோமைட்டும் தனித்தனியே வாழ்கின்றன. அவற்றுள் சிலவற்றில் இரு சத்தினங்களும் வெளித் தோற்றத்தில் ஒத்துள்ளன (ஒத்த சத்தி மாற்றம்). மற்றவையில் கிப்போரோமைட் மிகப் பெரியதாகவும் (25—30 மீட்டர்), காயிட்டோமைட் மிகமிகச் சிறியதாக (மைக்ரோஸ்கோப் மூலம் மீறியே புலப்படாதது) ஒரு சில செங்கனாக ஆனதுமாகும். ஆகவே, தோற்றத்தில் வேறுபட்ட சத்தினங்களைக் கொண்டிருத்தலால் அப் பேரினங்களின் வாழ்க்கைச் சுழலில் உருவம் ஒவ்வாத சத்தி மாற்றம் காணப்படுகின்றது (உ-ம். லேமினேரியா—Laminaria).

இத்தப் பெருந்தொகுதியை வாழ்க்கைச் சுழலின் அம்சங்களை அடிப்படையாகக் கொண்டு மூன்று வகைகளாகப் பிரிக்கலாம்:

- (1) ஐசோஜெனரேடி (Isogeneratae) உருவம் ஒத்த சத்தி மாற்றம் காணப்படுவது (உ-ம். எக்டோகார்பஸ்—Ectocarpus)
- (2) ஹெடெரோஜெனரேடி (Heterogeneratae) உருவம் ஒவ்வாத சத்தி மாற்றம் காணப்படுவது (உ-ம். லேமினேரியா—Laminaria)
- (3) கைக்ஸோஸ்போரி (Cyclosporeae) சத்தி மாற்றம் அற்ற வாழ்க்கைச் சுழல் காணப்படுவது (உ-ம். சர்க்காசம்—Sargassum).

வகை : ஐசோஜெனரேடி

(Class : Isogeneratae)

பெருங்குடும்பம் : எக்டோகார்பேசியஸ்

(Order : Ectocarpales)

குடும்பம் : எக்டோகார்பேசி

(Family : Ectocarpaceae)

எக்டோகார்பஸ்

(Ectocarpus)

எக்டோகார்பஸ் பழுப்புநிறப் பாகிகளுக்குள் மிக எளிமை வாய்ந்த உடல அமைப்பைக் கொண்ட பேரினமாகும். அது தமிழ் நாட்டின் கிழக்குக்கரைப் பகுதிகளில் முக்கியமாகச் சென்னைத் துறைமுகத்துக்கு வடக்கேயும் (சாவபுரம்), மாமல்லபுரம் (Mahabalipuram), பாம்பன் (Pamban), குருளாடித் தீவுகள் (Krusadi island), கன்னியாகுமரி ஆகிய இடங்களில் மிகுதியாகக் காணப்படும். இது குஞ்சங்கள் போல் பாதைகளின் மேலும்

(படம் 111), பெரிய உடற்பாகவளின் மேலும் பொதுவாகக் காணப்படும். இத்தப் பாகியின் உடலம் கிளைத்த ஒற்றையடுக்கு இனழகனாக (uniseriate filament) ஆக்கப்பட்டு, மற்றும்



படம் 111

சுப்போரோசைட்டஸ்
வளியல்பு



வளியல்பு கணிகம்

படம் 112

சுப்போரோசைட்டஸ் இனழகின் இரு
செய்களின் தோற்றம்

தேடாரோடினரக்கள் வளர் இயல்பைக் காணப்பெறாதும். ஒவ்வொரு செய்கிலும் சில பட்டை (band shaped) அல்லது தட்டு போன்ற (discoid) வண்ணக்களிகள்கள் காணப்படுகின்றன.

வாழ்க்கை சுழல்

இத்தப் பாகியில் வாழ்க்கைச்சுழலில் ஒத்த உருவச் சத்தி மாற்றம் காணப்படுகிறது. இதன் ஒரு சிற்றினமான எ. விலிகுளோன்கலின் (*E. viliculosus*) வாழ்க்கை வரலாறு நன்கு ஆராய்ந்து அறியப்பட்டுள்ளது. இவ் வரலாற்றை இப்போது கவனிப்போம்.

இத்தச் சிற்றினத்தின் சுப்போரோசைட் சத்தி (sporophyte) இருவிதமான சுப்போரகங்களைத் தோற்றுவிக்கின்றது (படம் 113, 115 அ). ஒன்று, கோளம் அல்லது மூட்டை வடிவம் கொண்ட ஓர் அறை சுப்போரகம் (unilocular sporangium), மற்றொன்று கூம்பு போன்றபடி அறை சுப்போரகம் (plurilocular sporangium) ஆகும். இத்த சுப்போரகங்கள் கிளைகளின் மேல் காணப்படும். ஓரறை சுப்போரகத்தில் 32 அல்லது 64 பக்க இரு கைசியிறை கொண்ட (laterally biflagellate) ஜூஸ்போரிகள் தோற்றுவிக்கப்படுகின்றன. சுப்போரோசைட் இரட்டை மயமானதால்,

ஜூம்போர் உண்டாவதற்கு முன் ஓரளவு ஜம்போரகத்தில் நூக்லியஸ் கையாளில் மூன்றயில் பாகுபாடடைகின்றது. ஆகவே ஜூம்போர்கள் ஒத்தமைய நூக்லியஸ்களையே கொண்டுள்ளன. இவை



படம் 113

கம்போகைர்ப்பல் ஒரு செல் கம்போகைர்ப்பல் உண்டாவதும் கம்போகைர்ப்பல் உடனடி

ஒரு சிறு துவாரத்தில் வழியே ஒன்றன்பின் ஒன்றாக வெளிவந்து சிறிது நேரம் நீதி நக்க அடித்தளத்தில் படித்து முடிந்தது ஒரு புதிய கம்போகைர்ப்பல் உடனடித்தை உருவாக்குகிறது (படம் 113 அ, இ). ஆனால், இந்த ஒத்தமைய உடனடி கையிட்டோகைபட்டாகச் செயல்படுகின்றது (படம் 115 இ).

கம்போகைர்ப்பல் உடனடித்தின்மேல் காணப்படும் பல அறை கம்போரகத்தில், திளவாட்டிலும் குறுக்குவாட்டிலும் அமைந்த பல கணசுதர (vibrio) வடிவச் செல்கள் உள்ளன. அவை ஒவ்வொன்றிலிருந்து (பக்க இருகணசுதர) கொண்டு

ஜூன்போர்கள் உண்டாகி நுனியிலுண்டாகும் துவாரத்தின் வழியாக வெளியாகின்றன. ஆனால், இந்தப் பல அறை ஜூன்போர்கள் தம் ஜூன்போர்கள் உண்டாகும் முன் மையாலில் தடைபெறு



படம் 114


கேமிட்டேஞ்சியம் பல கேம் கேமிட்டேஞ்சியங்களால் காணப்படும்
கேமிட்டேஞ்சியம் உடமை

வதில்லை (மைட்டாவில் பிரிவுதான் தடைபெறுகிறது). ஆகவே, இந்த ஜூன்போர்கள் இரட்டைமய நுக்கியில் கொண்டவை.

இந்த ஜூஸ்போர்கன் வெளிவந்து இரட்டைமய எக்டோகார்ப்பஸ் உடன்களையே (ஃபோரோஸ்பைட்) உண்டாக்குகின்றன (படம் 115 அ-ஆ). ஆதலால் இரண்டாவது கூறப்பட்ட ஜூஸ்போர்கன் ஃபோரோஸ்பைட்டையே திரும்பவும் உண்டாக்கும் ஆமிரல் (reduplication) உடைவன. இருமிதமான ஜூஸ்போர்கனின் தன்மையையும் வேறுபடுத்திக் குறுப்பிததைத் தடுக்க, ஸ்வீடெலியஸ் (Svedelius) என்னும் பாக்டிரியல் நிபுணர், இரட்டைமய ஜூஸ்போர்களுக்கு நியூட்ரல்ஸ்போர் (neutral spore) என்றும், அவைகளைத் தோற்றுவிக்கும் ஃபோரகத்துக்கு நியூட்ரல் ஃபோரகம் (neutral sporangium) என்றும் பெயரை அளித்தார்.

ஒத்தநமய ஜூஸ்போர்கனின் மூலம் உண்டான உடலம் காமிட்டோஸ்பைட்டாகச் செயல்படுகின்றது. அதன் கிளைகளின் மேல் கம்பு போன்ற பல கணசதுரச் செல்கள் கொண்ட காமிட்டேஞ்சியம் (gametangium) உண்டாகின்றன. (புறத் தோற்றத்தில் இவை நியூட்ரல் ஃபோரகத்தை ஒத்துள்ளன). இந்த காமிட்டேஞ்சியத்தினின்றும் பல சிறிய காமிட்டுகள் (பக்கவாட்டில் இருகணசையிழைகள் கொண்ட) வெளி வந்து ஜோடியாக இணைந்து னைகோட்டை உண்டாக்குகின்றன. இணையும் இரு காமிட்டுகள் பொதுவாக வெய்வேறு உடலங்களாகச் சார்ந்ததாகும். இரட்டைமய னைகோட் ஒவ்வொரு கொள்ளை மல் உடனே முனைத்து ஃபோரோஸ்பைட் உடலத்தை உருவாக்குகிறது. (படம் 115 அ-இ). இந்தப் புதிய ஃபோரோஸ்பைட் உடலம் முன்புபோல் ஓர் அறை ஃபோரகத்தையும் பல அறை ஃபோரகத்தையும் கொண்டதாகும். ஆகவே, எ.கஸிசுமேஸஸ் வாழ்க்கைச் சுழலில் உருவமொத்த சந்ததி மாற்றம் தன்கு காணப்படுகின்றது.

இவ் சமயங்களில் எக்டோகார்ப்பஸ் வாழ்க்கைச் சுழலில் மேல் விவரிக்கப்பட்ட நிகழ்ச்சிகளினின்றும் இரு மாற்றங்கள் காண முடியும்: (1) ஓரளவு ஃபோரகத்தில் உண்டாகும் (ஒத்தநமய ஜூஸ்போர்கன் (காமிட்டோஸ்பைட்) சந்ததியைத் தோற்றுவிப்பதற்குப் பதிலாக) ஜோடியாக ஒன்றோடொன்று இணைத்து, அதாவது, காமிட்டுகள் போகச் செயல்பட்டு, னைகோட்டை உண்டாக்குகின்றன. (2) காமிட்டோஸ்பைட் உடலத்தில் தோன்றும் காமிட்டேஞ்சியத்திலிருந்து வெளிவரும் (ஒத்தநமய) காமிட்டுகள் ஒன்றோடு ஒன்று இணையாமல் தனித்து முனைத்து காமிட்டோஸ்பைட் உடலத்தை மறுபடியும் உண்டாக்குவதாகும். (ஜூஸ்போர் போல் செயல்படுகின்றன.) இவ்வாறு ஏற்படும் மாற்றங்களிலிருந்து காமிட்டோஸ்பைட் ஜூஸ்போர்களும்



படம் 115

படம் 111-115 எக்டோகார்பைல்

அ. விவித்தென்கை வந்தோர் அழை

அ. ஒரு செல் உயிரினம் பனசெல் பிழைகள் உயிரினத்தை ஒருக்கே
தொண்ட உயிரினம் உடமை

ஆ. உத்தமைய துன்பை, இ. காலிடெருள்வந்தோர் காலிடெருள்


அ. இது காலிடெருள் இனம், ஆ. காலிடெருள், ஏ. பிழைகள் உயிரினம்

ஏ. பிழைகள் உயிரினம் (இரட்டையர் செல்), இ. பிழைகள் உயிரினம் படித்து
குறிப்பிட்டு ஒன்.

ஒரே இயல்புடையன என்றும் கார்ப்டுகள் முதல் முதலில் தூண் போகியிருந்துதான் தோன்றி, பின் தக்கனது இயல்புகளாக வேறுபட்டிருக்கின்றன என்றும் துரைட்டமான் (Hartmann) போன்ற பாலி வய்ஸுநர்கள் கருதுகின்றனர்.

பெருக்குடும்பம் : டிக்டியோடேலிஸ்
(Order : Dictyotales)

இப் பெருக்குடும்பத்தில் கூடங்கும் பேரினங்கள் இகதிகு மூன் விவரிக்கப்பட்ட எக்டோகார்ப்பேனில் பெருக்குடும்பத்தினின்றும்



படம் 116

டிக்டியோட்டா அலாட்டா

சில முக்கிய வேறுபாடுகளைக் கொண்டுள்ளன, ஒன்று, கூடலத்தில் வளர்த்தி துளிக்கெல் (கெல்கள்) மூலம் நிகழ்வது ; இரண்டாவது, பாலிமரப் பெருக்கத்தின் போது கைசயற்ற ஏப்ளோஸ்போர் போன்ற டெட்ரோஸ்போர்கள் (tetraspore) தோன்றுவது ;

மூன்றாவது, பானிஸ்ப் பெருக்கம் உயர்ந்த ஊசலி முறையில் திகழ்வது : நான்காவது, பாதுறுப்புடன் (ஆத்தரிடியம், ஊசோனியம்) கூட்டமாக (sours) அமைத்திருக்கும் தன்மைவாகும்.

டிக்குயோட்டா (Dictyota)

இத்தப் பேரினம் மிகுதியாக வெப்பநிலைக் கடல்பகுதிகளில் காணப்படுகின்றது. தமிழ்நாட்டில் பரம்பன் (Pamban), குருணாடி தீவுகள் (Kurusadi islands), தாத்துக்குடி (Taticoria) ஆகிய கரைகளில் இது நீரில் அமிழ்த்த பாதைகளின்மேல் வளர்ந்து காணப்படும்.

இது நிமிர்ந்து வாலும் ரிப்பன் போன்ற கிளைத்த பட்டை வான உடவத்தைக் கொண்டது. இருசம பக்கங்களில் தொடர்ந்து கிளைத்திரும் உடவம் (dichotomous) தட்டுப்போன்ற பிடிப்பு



படம் 117

டிக்குயோட்டா நுனிச்செல்லுடன் காணப்படும் உடவத்தில் (கிளைகளின்) நுனிப்பாகம்

பாகத்தின் மூலம் அடித்தளத்துடன் பிரிக்கப்பட்டுள்ளது. (படம் 116). உடவத்தின் வளர்ச்சி ஒவ்வொரு கிளையின் நுனிப் பகுதியில் அமைந்துள்ள ஒரு வெண் வடிவம் கொண்ட நுனிச் செல்லின் (lens-shaped apical cells) மூலம் நடைபெறுகின்றது (படம் 117). இந்த நுனிச்செல் பாகுபாடடைந்து அடிப்பகுதியில் புதியசெல்களை ஒன்றன்பின் ஒன்றாகத் தோற்றுவிக்கின்றது. இத்தப் புதிய செல் ஒவ்வொன்றும் நீளவாட்டில் இரு பாகுபாடுகளின் மூலம் மூன்று செல்களாகப் பிரிவடைகின்றன. இம்மூன்று செல்களில் இரு புறச்செல்களும் (marginal cell) சிறியதாகவும், நடுச் செல் (middle cell) பெரியதாகவும் காணப்படுகின்றன. இந்தச் செல்கள் பின்னர் குறுக்குத் தளத்தில் மாதிரியே பாகுபாடடைகின்ற காரணத்தால் உடவம் முழுமைவும் மூன்றுக்கு (three layered) மூன்று செல் கனம் கொண்டதாகக் காணப்படுகிறது (படம் 118). மத்திய அடுக்கில் உள்ள செல்கள் பெரியனவாகவும் திறமற்றும், சேயிப்புப் பொருள்களைக் கொண்டும், புற அடுக்குச்

செய்கள் சிறியனவாகவும், வண்ணக்கனிகங்கள் (chromatophores) மிகுதியாகக் கொண்டும் காணப்படுகின்றன. ஆகவே, மத்திய அடுக்குச் செயிப்புகளும், புற அடுக்குகள் ஒளிச்செய்க்கைகளும்



படம் 118

புஷ்பியோட்டா உடலத்தின் குறுக்குமேட்டுத் தோற்றம்

பயன்படுகின்றன. சில சமயங்களில் நுனிச்செய் செய்குத்தான மூன்றயில் பாகுபாடடைத்து இரு தனி நுனிச்செய்க்களாகச் செயல்படுகின்றது. இந்த நிகழ்ச்சியே இருசமபாகக் கிளைத்தலுக்குக் காரணம். உடல இனப்பெருக்கம் சில சிற்றினங்களில் உடலத்தின் புறத்திலின்று பல வளரிகள் (out-growths) தோன்றிப் பின் பிரிந்து ஏதாவது அடித்தளத்தில் ஈடித்து புதிய உடலத்தை உண்டாக்குகின்றன. இந்த வளரிகளில் தோற்றமூலக்கப்படும் நுனிச்செய் (apical cell) ஒன்றின் மூலம் புதிய உடலத்தின் வளர்ச்சி நிகழ்கின்றது.


வாழ்க்கைச் சுழற்சி

புஷ்பியோட்டா வாழ்க்கைச் சுழற்சியில் உருவம் ஒத்த சத்தநி யாத்றம் தெனிகளாகக் காணப்படுகின்றது.

பாலின இனப்பெருக்கம்

புஷ்பியோட்டாவில் பாலின இனப்பெருக்கம் இயங்கும் சத்தியத்த (zoanthozyl) டெட்ராஸ்போரிக் (tetraspore) மூலம் நிகழ்கின்றது. டெட்ராஸ்போரிகள் கோளவடிவமான டெட்ராஸ்போரங்களில் (tetrasporangia) உண்டாகின்றன. இந்த டெட்ராஸ்போரங்கள் உடலத்தின் பரப்பில் பொதுவாகத் தனித்தனியாக அமைந்துள்ளன. புற அடுக்கிலுள்ள (marginal layer) செய் பெரிதாகி, குறுக்குத் தளத்தில் பாகுபாடடைத்த பிறகு மேலே உள்ள செய் பன மடங்கு பெரிதாகி, கோளவடிவக் கொண்டு டெட்ராஸ்போரமாக மாற்றம் அடைகிறது. கீழே உள்ள செய் அதன் காய்புச் செய்வாக அமைகிறது. தொடக்கத்தில் டெட்ராஸ்போரத்திலும் உள்ள நூக்கியல் இரட்டைமையமானதாக அது மையானில் மூன்றயில் பாகுபாடடைத்து தான்கு ஒத்தமைய

நுக்கிவங்களைத் தொற்றுவித்த பிறகு அவைகளைச் சுற்றி நான்கு நான்முக (tetrahedral) அல்லது பிரமிட் (pyramid) போன்ற ஸ்போர்கள் உருவாகின்றன (படம் 119). முழுவளர்ச்சியடைந்தவுடன் டெட்ராஸ்போரகத்தின் உறை கிழிய, இந்த டெட்ராஸ்போர்கள் சுற்றியுள்ள நீரில் விடுவிக்கப்படுகின்றன. அவற்றுள் இரண்டு ஆண் காமிட்டோஸைட் உடலங்களாகவும், மற்ற இரண்டு



படம் 119

ஃக்டியோட்டா டெட்ராஸ்போரகங்களுடன் காணப்படும் ஸ்போரோஸைட் உடலத்தின் குறுக்குவெட்டுத் தோற்றம்

ஃக்டியோட்டா ஊனோஸைட்டைகளுடன் காணப்படும் பெண்காமிட்டோஸைட்டின் குறுக்குவெட்டுத் தோற்றம்

பெண் காமிட்டோஸைட்டாகவும் வளர்ச்சி பெறுகின்றன. ஆண்கள் புறத்தோற்றத்தில் ஸ்போரோஸைட்டிற்கும் காமிட்டோஸைட், புறத்தும் வேறுபாடு இல்லை.

மாலினஸ் பெருக்கம்

பாலினப் பெருக்கம் ஊகமி முறையில் நடைபெறுகிறது. ஆந்தரீடியமற்றும், ஊனோஸீயமற்ற முறையே ஆண்காமிட்டோஸைட், பெண் காமிட்டோஸைட் உடலத்தின் இரு புறங்களிலும் திரளாகக் காணப்படுகின்றன. ஆந்தரீடியத் திரள் (antheridial sorus) உடலத்தின் மேல் வெண்மைமயான பளபளப்புள்ள பரப்புளதாகக்

காணப்படும். ஒவ்வொரு திரளிலும் 100—200 ஆத்தரிடியங்கள் உள்ளன. ஆத்தரிடியம் ஒவ்வொன்றும் பல அடுக்குகளாக அமைந்த நிறமற்ற கனசதுரச் செங்களைக் கொண்டு சுமார் 1500 ஆத்தரோஜாங்குகளைத் தோற்றுவிக்கின்றது. இந்த ஆத்தரிடியத் திரளின் சில மலட்டு ஆத்தரிடியச் செங்கள் பாகுபடாமல் பழுப்பிற் றிடம் கொண்டு இன்வதுக்கர் (involute) என்ற பாதுகாப்பு



படம் 120

அக்ஷரோட்டா ஆத்தரிடியங்களுடன் காணப்படும் ஆண் காமிட்டோஸ்பட்டா குறுக்குவெட்டுத் தோற்றம்

உறையாக அமைந்துள்ளது (படம் 120). ஆத்தரிடியத்திலுள்ள செல்லுறைகள் கரைத்தவுடன் ஆத்தரோஜாங்குகள் வெளிவேறு கின்றன. இவை பேரி (pyriform) வடிவம் கொண்டு பழுப்புப் பாகியின் இயல்பிற்கு மாறாக ஒரே டிக்கை கனசரிமையுள்ள தாசும் (uniflagellate). ஆனால், மற்றொரு மிகமிகச் சிறிய கனச யும் புலப்படாமல் அமைந்துள்ளது என்றும் சிலர் கருதுகின்றனர்.

பெண் காமிட்டோஸ்பட்டின் மேல் ஊகோலியத் திரள்கள் (oogonial sorus) பழுப்பு வண்ணப் பரப்புகளாகத் காணப்படும். அவை ஒவ்வொன்றிலும் 25—50 ஊகோலியங்கள் உள்ளன. அவைகளைச் சுற்றி இன்வதுக்கர் பாதுகாப்புச் சட்டையாறு. ஊகோலியம் ஒவ்வொன்றும் ஒரு செங்கை ஆனது. இந்த ஊகோலியத்தின் உள்புற புரோட்டோபிராஸ்ட் முழுவதும் ஓர் அண்டமாகச் செயல்படுகிறது (படம் 119). அது முழு வளர்ச்சி அடைந்தவுடன் ஊகோலிய உறை சிழியவும் வெளியே வந்து நீரில் மிதக்கிறது.

இய்விதமாக, அண்டங்களும், ஆத்தரோஜாங்குகளும் கலகலையில் வெளிவருகின்றன. ஆத்தரோஜாங்குகள் அண்டத்தை அணுகும்போது அவைகளில் ஒன்று அதனுடன் இணைந்து கருவுறச் (fertilize) செய்கிறது. இய்விதமாக உண்டான ஊகோட் ஓர் உறையைச் சுரப்பித்துக்கொண்டு, உடனே ஒவ்வொரு கொள்ளாயில் கிபொரோஸ்பட்ட் உடலமாக முளைக்கிறது. இய் விதமாக இப்பாகியின் வாழ்க்கைச் சுழல் உருவமொத்த சத்ததி மாற்றத்தைக் காட்டுகிறது.

வகை : சைக்ஸோஸ்போரி
(Class : Cyclosporeae)

இந்த வகையில் அடங்கும் பேரினங்களில் வாழ்க்கைச் சுழலில் சத்ததி மாற்றம் ஆறவே காணப்படுவதில்லை. இதுவே, இதன் மூக்கியச் சிறப்பியல்பாகும். மற்றும் உடலும் தரையில் இரட்டைமலத் தன்மை கொண்டது. ஆனால், பாலிவா இனப் பேருக்கம் தடைபெறுவதில்லை. பாலினப் பேருக்கம் உயர்ந்த வகையிழைதலில் தடைபெறுகின்றது. ஆந்தடிரியம், ஊகோனியம் ஆகிய பால் உறுப்புகள் காண்செப்டெயில் (conopseaides) என்று கூறப்படும் குடுவை போன்ற குவித்த பாக்கங்களில் காணப்படுகின்றன. மற்றும் ஆந்தரோஜாக்கும் அண்டமும் உண்டாகும் போது தூக்கியலில் மையாலில் முறை பாகுபாடு நிகழ்கின்றது. உடலத்தின் வளர்ச்சியும் நுனிச்செய்மூலவளாக தடைபெறுகின்றது.

பெருங்குடும்பம் : பூபேசிலீஸ் (Order : Fucales)

இவை வட தென் கோளப் பகுதிகளில் உள்ள குவித்த கடல்களில் மிகுதியாகக் காணப்படுகின்றன. இவை கரையோரங்களில் 5 மீட்டர் ஆழம்வரை பாறைகளின் மேல் வளர்கின்றன. பேரினங்களுள் மூக்கியமான 'சார்காஸம்' என்னும் பாலினைப் பற்றி இப்போது கவனிப்போம்.

சார்காஸம் (Sargassum)

சார்காஸம் என்னும் பழப்பு நிதப் பாலி தமிழ்தாட்டில் பாம்பன், குருளாடித்திவுகள், கன்னியாகுமரி ஆகிய பகுதிகளில் மிகுதியாகக் காணப்படும். சார்காஸம் 'டிக்டிரோயோட்டா'வைப் (dictyota) போலவே வெப்பக்கடல் பகுதிகளில் மிகுதியாகக் காணப்படும். ஒரு மீட்டருக்கு மேலும் சில சமயங்களில் நீண்டு காணப்படும் இந்தப்பாலி "கூல்ப் ஸ்ட்ரீம்" (gulf stream) என்னும் வெப்பநீர் ஓட்டத்தின் பாதையில் மிகுதியாகக் காணப்படுவதால் "கூல்ப் பூரி" (gulf weed) என்றும் இதை அழைப்பர். மேற்கு இந்தியத் தீவுகளின் அருகிலும், ஆஸ்திரேலியாவின் அருகிலும், சில கடல்களில் மிகுத்து வரலும் 'சார்காஸம்'த்தின் சில சிற்றினங்கள் (உ-ம், ஸா. நேடன்ஸ் - Sargassum natans) எங்கும் நிறைந்திருப்பதால் அத்தக்கடல்கள், 'சார்காஸோ கடல்' (sargasso sea) என்று பெயரிடப்பட்டுள்ளன.

பொதுவாக, இந்தப் பாலியின் உடலும் நீரில் அமிழ்ந்து பாறைவின்மேல் ஓர் அகன்ற தட்டுப் போன்ற (disc-like) அமைப்பிலும் பற்றிக் கொண்டு வாழ்கிறது.

உடலம் புறத்தோற்றத்தினும் (படம் 121), அக அமைப்பினும் டிக்டியோடாமைசிட் அதிக சிக்கலான அமைப்புக் கொண்டுள்ளது. உடலம் மிகுதியாகக் கிளைத்துத் தன்ரு இலைகள் போன்ற பாகங்களாகக் கொண்டுள்ளது. இலைகளின் கீழிம்புகள் பற்களுடனே அம்வறு பற்கள் ஆற்றே உள்ளன. சில சிற்றினம்




படம் 121

சாக்காஸ் வளர்ப்பு

களில் 'இலைகளில்' தடுதரம்பு போன்று காணப்படும், 'இலைகளில்' கொண்களில் அம்வறு இலைக்கொண்களில் (axil) காம்புடன் சேர்த்த காற்றுப்பாகள் அமைந்துள்ளன. இவை இத்தப் பாசியின் மேல்பாகம் நீசில் மிதப்பதற்கு உதவியாக இருக்கின்றன. இனப்பெருக்கக் காலங்களில் இலைக் கொண்களில் மிகவும் சிறுத்த 'ரிசெப்டகிள்' (receptacle) என்று குறிப்பிடப்படும் இனப்பெருக்கக் (fertile) கிளைகள் காணப்படுகின்றன (படம் 121).

உடலத்தின் வளர்ச்சி பெரும்பாலும் மூலத்தன்ருப் பாகத்தினும் கிளைகளினும் உள்ள நுனிச் செவ்வின் இயக்கத்தினும் (activity) ஏற்படுகிறது. இத்த நுனிச்செவ் குவித்த இடத்தில் தான்கு பக்கங்கள் கொண்டும் (tetrahedral), பக்கவாட்டின் 3 வெட்டு மூலங்களாகக் கொண்டும் உள்ளது. புதிதாக உண்டாகும் தண்டங்கள் மேலும் பிரிவடைத்து இரண்டு வகைகளில்

அமைந்துள்ளன. ஆகவே, உடலத்தில் மத்தியில் 'மெட்யுலா' என்ற பாகமும், புறத்தில் 'கார்டெக்ஸ்' என்ற பாகமும் காணப்படும் (படம் 122). 'மெட்யுலா' பாகத்திலுள்ள செல்கள்



படம் 122

கார்டெக்ஸ் தண்டின் குறுக்குவெட்டுத் தோற்றமும்
கார்டெக்ஸ் இனின் குறுக்குவெட்டுத் தோற்றமும்

மிகுதியாக நீண்டும், குறுக்குவாட்டில் குறுகியும், செல் உறை தடித்தும் அமைந்துள்ளன. இச் செல்கள் 'கடத்தும்' (conduction) தொழிலைச் செய்கின்றன என்று கருதப்படுகிறது. புறனில் பாகத்தில் உள்ள செல்கள் சமஸ்திடம் உடைவனவாகவும், மெல்லிய செல் உறை உடைவனவாகவும், மிகுதியான வண்ணக் கணிகங்கள் கொண்டனவாகவும் காணப்படும். இவை ஒளிச் செர்க்கைக்கு உதவுகின்றன. புறனிலே வெளிப்புறத்தில் உள்ள செல் அடுக்கு, பாதுகாப்பிற்குப் பயன்படுகிறது. ஆகவே கார்டெக்ஸில் டிக்டயோட்டானவை அடிகற்படிபாகத் திக வேறுபாடு காணப்படுகிறது.

இனப் பெருக்கம்

உடலப் பெருக்கம்: இவ்விதக்கும் சிற்றினங்களில் (வா. நெடெக்ஸ்) உடலம் பிளவுபட்டு, ஒவ்வொரு பிரிவுற்ற பாகமும் தனியே வளர்ச்சியடைவதன்மூலம் உடலத்தின் எண்ணிக்கை பன்மடங்கு அதிகரிக்கின்றது.

பாலிஸப் பெருக்க முறை

ஊயி முறையில் தடைபெறுகிறது. பாலுறுப்புகள் வெளிப் புறத்தே அமைவதால் தனிப்பட்ட இனங்களான சிஸெப்டினிக் பதித்திருக்கும் குடுவை போன்ற குவித்த பாகத்தில் தோன்றுகிறது. இத்தக குவித்த பாகத்திற்கு கான்செப்டின் என்று பெயர். இது வெளிப்பாகத்தில் ஒரு நுண்ணிய துவாரம் (ostiole) கொண்டுள்ளது. சிஸெப்டினிக் மேற்பரப்பில் பல கான்செப்டினிக் துவாரங்கள் புள்ளிகள் போல் காணப்படுகின்றன.

ஆண்மாத் கான்செப்டின்

இக் கான்செப்டினிக் அடித்தளத்திலிருந்து சிறு இனிகள் கொண்ட ரோமங்கள் (பாராபெய்சிஸ்—paraphysis) உற்பத்தியாகின்றன. பாராபெய்சிஸ் அடிக்கிளையில் முட்டை வடிவமான பல ஆத்திரிடியங்கள் உண்டாகின்றன (படம் 123). ஒவ்வோர் ஆத்திரிடியத்திலும் 64 ஆத்திரோஜாய்டுகள் தோன்றுகின்றன.




படம் 123

சுரணை ஆண் கான்செப்டினிக்முடன் காணப்படும் சிஸெப்டினிக் குறுக்குவெட்டுத் தோற்றம்

இத்த ஆத்திரிடியம் இரட்டைமலத் துகளினின்றும் உண்டாவதால் ஆத்திரோஜாய்டுகள் தோன்றுவதற்கு முன் அச்செய்களின் தூக்கியின் மையாலின் முறையில் பகுபட்டு 64 ஒற்றைமல தூக்கியங்களாகப் பிரிந்து ஒவ்வொன்றையும் சுற்றிப் பக்க இரு கணையுடைய ஆத்திரோஜாய்டு உருவாக்கப்படுகின்றது. இத்த ஆத்திரோஜாய்டின் இரு கணையிறுகளில் மூன்று உள்ளது குட்டைவாகவும் (சாட்டை போன்றும்), பின்னுள்ளது நீண்டும் டிண்டல் அமைப்பும் கொண்டுள்ளன. ஆகவே, மற்ற பழுப்புப் பாலிகளில் காணப்படும் கணையிறு அமைப்புக்கு எதிர்தாளுக இப் என்டொகைட் (exochite, endochite) என்று இரு படவங்கள்


கொண்டுள்ளது. ஆத்தரோஜாய்டு, மூழு வளர்ச்சியடைந்தவுடன் பாலிகளில் காணப்படுகின்றது. ஆத்தரிடிபயம் உறை எக்ஸோகைட்,



படம் 124

சாக்கைம் பெண் காஸ்பெட்டினுடன் காணப்படும் கிசெப்டினின் குறுக்குவெட்டுத் தோற்றம்

எக்ஸோகைட் கனரயவும் எண்டோகைட் 64 ஆத்தரோஜாய்டு கிளத் தன்னைத்தே அடக்கித் கொண்ட வண்ணம் ஆஸ்புபயாக்



படம் 125

சாக்கைம் பெண் காஸ்பெட்டினிலிருந்து அண்டங்கள் வெளிவருதல் (ostiole) வாயிலாக வெளிவருகிறது. பின்னர் எண்டோகைட்டும் கனரத்தவுடன் ஆத்தரோஜாய்டுகள் வெளியேறுகின்றன.

பெண்பால் காஸ்பெட்டின்

ஆத்தரிடிபயம் அமைந்திருக்கும் மூன்றகி மாராகப்பெண்பால் காஸ்பெட்டினில் ஊகோனியம் (பாராஸ்பெயிம்மோனியம்)

அடித்தளத்தினின்றும் நேராக உள்வாங்கின்றது (படம் 124). ஊகோலியத்தில் சிழ் காம்புச் செல் ஒன்று உண்டு. இந்த ஊகோலியத்தில் வளர்ச்சியின்போது இரட்டைமய நூக்கியல் மையரலில் முதற்ப் பாகுபாட்டைத்து 8 ஒற்றைமய நூக்கியலாக மாற்றம் அடைந்த பிறகு அவற்றுள் 7 சிதைவடைந்து விடுகின்றன. ஊகோலியத்தில் உள்ள 'புரோட்டோபிளாஸ்ட்' எஞ்சிய ஒற்றைமய நூக்கியலுடன் ஒர் அண்டமாகச் செயல்படுகிறது. ஊகோலியத்தில் உறை எக்ஸோகைட், மீசோகைட் (mesochite), எண்டோகைட் ஆகிய மூன்று படலங்களைக் கொண்டுள்ளது. அண்டம் முழுவளர்ச்சியடைந்தவுடன் எக்ஸோகைட் கரைவதும், மீசோகைட் எண்டோகைட்டாகக் குழம்பிட்டு, அண்டம் மெதுவாக ஆண்டியோல் வழியாக வெளிவரும்போது மீசோகைட் ஆண்டியோலுடன் இணைந்து நீளக்கார்பாக நின்று விடுகிறது (படம் 125). இயக்கம் வெளிவரும்போது ஆண்டியோலிச் சுற்றியுள்ள 'பெரியைஸிஸ்' (periphyxis) எனப்படும் மலட்டு ரோமங்கள் பெரிதும் உதவுகின்றன. எனவே, எண்டோகைட்டிலும் குழம்பிட்ட அண்டம், முழுதும் விடுவிக்கப்படாமல் கருவுறும் சமயத்திலும், மீசோகைட் கார்பினுக் ஆண்டியோலுடன் இணைக்கப்பட்டுள்ளது. இம்மமயம் ஆத்தரோஜாமிட் அண்டத்தை அணுகி இணைந்து கருவுறச் செய்கிறது. பின்னர் ஊகோட் அடித்தளத்தில் படித்து இரட்டைமய சார்க்கால உடமயாக வளர்ச்சியடைகிறது. எனவே, சார்க்காலத்தில் வாழ்க்கைச் சுழலில் சத்தி மாற்றம் நிகழ்வதில்லை. மற்றும் மையரலில் காமிட்டுகள் உருவாகும்போது (gametogonesis) நிகழ்கின்றது.

பழப்புப்பாசிகளில் பல மிகவும் பவனுடையன. சென்ற நூற்றாண்டில் செல்ப் (cell) என்று கூறப்படும் இப் பழப்புக் கடல் பாசிகளை எரித்துக்கிடைத்த சாம்பல் (ash), அலோஜின், பொரடாசியம் அயோடைட் முதலிய வேதிப்பொருள்களைத் தயாரிக்க உபயோகப்பட்டு வந்தது. இரண்டாவதாக ஏலேரியா (Alaria), லேமினேரியா (Laminaria), மேக்ரோசின்டிஸ் (Macrosystis), நீசியோசின்டிஸ் (Nereocystis) ஆகிய செல்ப் (cell) களினின்று ஆல்ஜின் (algin) என்ற கூழ்மப் பொருள் (colloid) தயாரிக்கப்படுகிறது. இந்த ஆல்ஜின் ஐஸ்ரீர் தயாரித்தல், ரொட்டித் தொழில், ரப்பர் தொழில், வர்ணத் தொழில், மருத்து முதலியவைகளில் மிகுதியாக உபயோகப்படுகிறது. மூன்றாவதாகச் சிதைவுகளில் (தூப்பாள்) லேமினேரியா, எலேரியாமுதலிய செல்புகளிலிருந்தது எடுக்கும் விளைவுப்பொருள்களை (products) உணவாக உட்கொள்கிறார்கள்.

8. தொகுதி : ஸயனோபைட்டா

(Division : Cyanophyta)

மசுநீலப் பாகிகள்

(Blue - green Algae)

இந்தத் தொகுதியில் அடங்கும் பாகிகள், மற்றப் பாகிகளினின்றும் பல விதங்களில் வேறுபட்டுள்ளன. மூக்கியமாக, செல் அமைப்பு மிகவும் எளிதமையான நிலையைக் கொண்டுள்ளது. இத்தப் பாகிகளில் கலையினமுடிதல இனப்பெருக்கத் செல் களோ அல்லது பாலினப் பெருக்கமோ அறியக் காணப்படுவதில்லை. பச்சையத்திதத் தவிர மூக்கியமாக பைத்தோஸைலின் (Phycocyanin) என்ற நீல நிறமி இருப்பதால் இப் பாகிகளின் செல்கள் பசுநீல நிறமாகக் காணப்படுகின்றன.

இத்தப் பாகிகள் நன்னீரிலும், உவர் நீரிலும், கடலிலும், வேகமாக ஓடும் ஆறுகளிலும், உறைத்த நீரைக் கொண்ட ஆர்க்டிக் (frigid seas of the Arctic) கடலிலும், வெப்பநீர் சுற்று களிலும் (hot springs), 85° செ.வரை சுரக்கவரிலும், சுரமண்ணிலும் பொதுவாகக் காணப்படுகின்றன. மற்றும் சில பேரினங்கள் ஆந்தோசிராஸ் (Anthoceros), அஜோலியா (Azolla), சிகஸ் (Cycas) முதலிய உவர் தாவரங்களின் இலக்கனாகியவையே வாழ்கின்றன. எரிமலைத் தீவுகளில், அங்குள்ள தாவரங்கள் எல்லாம் வெப்பமான லாவாக்களில் (molten lava) அழிவுற நேரிட்டால், பின்னர் முதன் முதலாகத் தீவுகளில் குடியேறும் தாவரங்கள் இத்தப் பசுநீலப் பாகிகளையாகும். சில பருவ காலங்களில் பரந்த நன்னீர் நிலங்களிலோ அல்லது கடலிலோ ஒன்று அல்லது இரண்டு செற்றினங்கள் மிகுதியாகப் பெருக்கமடைந்து அத்தீர் முழுவதும் பசுமை வண்ணமாகக் காணமாகின்றன. இத்த நிலை "நீர் மலர்ச்சி" (water bloom) என்று குறிப்பிடப்படுகின்றது. இவ்வித நிலையைக் கோவில் குளங்களில் கைகிரோஸீஷஸ் (Microcystis) என்னும் பேரினம் ஏற்படுத்துவதைச் சாதாரணமாகக் காணலாம். செங்கடலின் சிலப்பு நிறத்திற்கு அளவுக்கிடையிலும் (Trichodesmium) என்னும் பசுநீலப்பாகியே காரணம். சில சமயங்களில் கால்தடைகள் இவ்விதமாக 'நீர்மலர்ச்சி'யினால் வண்ணமடைந்த நீரைப் பருகினும் இறக்க நேரிடுகிறது.

இந்தப் பாகுகளின் உடல அமைப்பு பொதுவாக இருவகைப் படும். ஒன்று, இழைத்தன்மைவற்றது. மற்றொன்று, இழைத்தன்மை உடையது. சில பேரினங்களின் உடலம் ஒரே ஒரு செல்லாக (மொனம் அல்லது அண்ட வடிவமான) ஆனதும், சிலவற்றில் பல செல்கள் சேர்த்த கூட்டமைவாகவும், மற்றும் சிலவற்றில் இழைகளாகவும் அமைந்துள்ளன. பசுநீர்ப் பாகிகளில் காணப்படும் இழை உடலத்திற்கு டிரைக்கோம் (Trichome) என்று பெயர். இந்த டிரைக்கோம் நேராக நீண்டோ அல்லது கருள் வடிவத்திலோ இருக்கும். சிலவற்றில் இழைகளில் சில உண்டாதக் இருவகைப்படும்: (1) இயல்பாகக் கிளைத்தல் (normal branching) (உ-ம், ஸ்கைபோனீமா stigonema); (2) இயல்பற்ற கிளைத்தல் (false branching) (உ-ம், ஸ்கைபோனீமா-Scytonema). சில பேரினங்களில் டிரைக்கோமின் துளிப்பாகம் ஒரு நீண்ட ரோமமாக அமைந்துள்ளது (உ-ம், ரிவுலேரியா Rivularia).

பசுநீர்ப் பாகிகள் எல்லாவற்றிலும் செல்களைச் சுற்றிப் பசை உறை (mucilage sheath) அமைத்திருக்கும். இந்த உறை வலிப்போல் பின்னி அமைந்த மெல்லிய நாரீகளால் (microfibrils) ஆக்கப் பட்டிருப்பதாக எலக்ட்ரான் மைக்ரோஸ்கோப்பின் மூலம் அறியப் படுகிறது. மற்றும், இந்த உறை பொதுவாக நிறமற்றது. ஆனால், சில பேரினங்களில் இது மஞ்சள், பழுப்பு, சிவப்பு, ஊதா நிறமாகவும் இருக்கலாம். [உ-ம், கிளோசோகாபா—Gloeocapsa]

உடலத்தின் வளர்ச்சி பாகுபாட்டின் மூலம் நிகழ்கின்றது. இந்தப் பாகுபாடு பெரும்பாலும் எந்தச் செல்களிலும் தடைபெறாது. ஆனால், ஒரு சில பேரினங்களில் இழையின் வளர்ச்சி ஒரு துளிச் செல்களுக்கு மட்டுமே (apical cell) தடைபெறுகிறது. (உ-ம், ஸ்கைபோனீமா). மற்றும் சில டிரைக்கோம்களில் ஓர் ஆக்கத் திசை (polarity) இழையின் பின் பாகத்தின் காணப்படுகிறது. (உ-ம், ரிவுலேரியாவில் வாக் போன்ற குறுகிய பாகத்திற்கு முன்பு அமைந்துள்ளது).

செல் அமைப்பு

செல்லுறை, இரு படலங்களால் ஆனது. மெல்லிய உட்படலம் செல்லுலோசையும் (cellulose), பசைப்பொருள் போன்ற பருமனுள்ள ஹைட்ரோபலம் பெக்டிக் (pectic) பொருளையும் கொண்டுள்ளது. மற்ற வகைப் பாகித்தொகுதிகளுக்கு மாறாக இங்குச் செல்களின் புரோட்டோபிளாச்ட், ஹைட்ரோபலத்துச் (without sap vacuole) செல்களின் முழு இடத்திலும் விரிபித்துள்ளது.

இத்தப் புரோட்டோபிளாஸ்டை இரு பாகங்களாகப் பிரிக்கலாம். (1) நிறமூட்டைய குரோமேட்டோபிளாஸ்டம் (Chromatoplasm) என்று கூறப்படும் புறப்பாகம். (2) நிறமற்ற மத்திய சென்ட்ரோபிளாஸ்டம் (Centrophlam) அல்லது சென்ட்ரல்பாடி (Central body) என்று கூறப்படும் அகப்பாகம். மற்றத் தொகுதிகளில் காணப் படுவது போன்ற இரு துள்வாக் சூழப்பட்ட (enclosed by double membrane) குரோமேட்டோபிளாஸ்டங்கள் இத்தப் பாகிகளில் காணப் படுவதில்லை. ஆனால், குரோமேட்டோபிளாஸ்டத்தில் நிறமிகள் பல தட்டையான அடுக்குகளுள் (lamellae) அமைக்கப்பட்டுள்ளன. இத்த அடுக்குகளில் உள்ள நிறமிகள் பச்சையம் (Chlorophyll) கேரோடின்கள் (Carotin) மஞ்சள் நிறமி வர்தோபிக் (Xanthophyll), நீலநிறமி ஐபுகோஸயனின் (Phycocyanin), சிவப்புநிறமி (ஐபிகோஸரித்ரின் - Phycocerythrin) ஆகன. நீலநிற ஐபுகோஸயனின், பச்சையத்தின் பசுமை வண்ணத்துடன் சேர்ந்து பசுநீல வண்ணத்தை இத்தப் பாகிகளுக்கு அளிக்கின்றது. ஆனால், ஆழ்ந்த நீர் மட்டத்தில் வளரும் சில பசுநீயப் பாகிகள் சிவந்து காணப்படுகின்றன. ஏனெனில் அவைகளில் ஐபிகோஸரித்ரின் என்ற சிவப்பு நிறமியின் சதவீதமும் அதிகப்படியாக உயர்ந்துள்ளது. இத்த தொகுதியில் அடங்கும் பல பாகிகளில், தன் மேல் விரும் ஒளியின் நிறத்துக்குத் தகுந்தாற்போல் பாகியின் நிறம் மாற்றமடைவதை பலர் கண்டுள்ளார்கள். இத்த நிகழ்ச்சிக்கு வண்ணத்தக அமைவு அல்லது 'காம்பிளிமெண்டரி குரோமேட்டிக் அடாப்டேஷன்' (Complementary chromatic adaptation) மற்றும் கைடுக்ஷன் நிகழ்ச்சி (Gaidukov phenomenon) என்றும் பெயரிட்டுள்ளனர். உதாரணமாக ஆஸில்லேரியா (Oscillatoria) என்னும் பேரினம் சிவப்பு ஒளியின்கீழ் வளர்க்கப்பட்டால் பசுமை நிறத்தையும், மஞ்சள் நிற ஒளியின்கீழ் வளர்க்கப்பட்டால் பசுநீல வண்ணத்தையும், பசுமை ஒளியில் சிவப்பு வண்ணத்தையும் அடைகிறது. இத்த மாற்றங்களுக்கு ஐபுகோஸயனின், ஐபிகோஸரித்ரின் ஆகிய இரு நிறமிகளும் இருப்பதே காரணம் என்று ஸ்கியின் (Kyllin) என்ற பாகியியல் வகைநாற் (algologist) கூறியுள்ளார்.

சென்ட்ரோபிளாஸ்டம் (centrophlam) பல நுண்மணிகளுடன் (granules) காணப்படுகின்றது. இத்த மணிகள் பாகிகள் மூலையில் (foulgen test) பரிசோதிக்கப்பட்டால் டி ஆக்ஸிசியோ நியூக்லிக் அமிலத்தாக (deoxyribonucleic acid-D.N.A) ஆக்கப்பட்டிருப்பது தன்கு புறப்படும். ஆகவே, இத்த நுண்மணிகள் மற்றத் தாவரங்களில் நூக்லியஸின் குரோமேட்டின்கள் நுண்மணிகளை ஒத்திருக்கின்றன. ஆனால், மற்ற உயிரினங்களில் காணப்படும் நூக்லியஸ்

துவடி (nuclear membrane) இங்கு இல்லை. ஆசவே, பகநீர்ப்பாசிகளின் செல்லில் நூக்கியல்பாகம் (மைட்டோபிளாஸ்தின்) இல்லாமல் திறந்தபடியிலுப்பது (open nucleus) ஒரு முக்கியச் சிறப்பியல்பாகும். இத்தகைய நியூக்லியஸ் பரிணாமத்தின் கீற்றினையைக் காட்டுகிறது. ஆசவே, இதை இன்ஸிபிபெண்டு நூக்கியல் (incipient nucleus) அல்லது குடிமென்ட்ரி நூக்கியல் (rudimentary nucleus) என்றும் வழங்குவர். இவ்விதமான நூக்கியலின் அமைப்பு தாவரங்களில் மற்றபடி பெருமையில்கனித்தால் காணப்படும். சேமிப்புப் பொருள் நுண்மணிகளாக குரோமேட்டோபிளாஸ்தினும் சென்ட்ரோபிளாஸ்தின் புறப்பாகத்தினும் காணப்படுகின்றன. குரோமேட்டோபிளாஸ்தின் காணப்படும் பொருள் கிளிகோஜன் (glycogen) என்ற ஒரு வித கார்போஹைட்ரேட்டாகும். சென்ட்ரோபிளாஸ்தின்காணப்படும் சேமிப்புப்பொருள் புரதப் பொருள் வகையைச் சார்ந்தது. அவைகளுக்கு எய்னோபளியன் நுண்மணிகள் (cyanophyccean granules) என்று பெயர்.

மற்றொரு முக்கிய அம்சமானது, இத்தப் பாசிகளின் மைட்டோகாண்டிரியா (mitochondria) கிடையாது. (இத்தன்மை பெருமையில்கனிதும் காணப்படுகின்றது). ஆசவே, இத்தமைட்டோகாண்டிரியா அற்ற செல்தன்மையும் பரிணாமத்தின் கீற்றினையின் இத்தப் பாசிகள் இருப்பதைக் காட்டுகின்றது.

சில மீதக்கும் பகநீர்ப் பாசிகளின், (planktonic forms) குரோமோபிளாஸ்தின் வாயு நிறைந்த நுண்குமிழிகள் (gas-vacuoles or pseudo-vacuoles) காணப்படும். இவை இப் பாசிகள் மிதப்பதற்கு பெரிதும் உதவுகின்றன. உதாரணமாக ட்ரைக்கோம் உள்ள பேரினங்களில் குறுக்குச் சவருக்கு இரு பக்கத்தினும் வரிசையாக இத்த நுண்குமிழிகள் அமைந்துள்ளன.

பகநீர்ப் பாசிகளின் மற்றொரு முக்கியமான இயல்பு வாதெனில் ட்ரைக்கோம் அமைப்பைக் கொண்ட பல (ஆஸிலேரிசேரி—Oscillatoriaceae குடும்பம் தவிர) சிற்றினங்களில் (தெட்டரோசிட்—Heterocyst) என்ற ஒரு வகையான செல், இழைகளில் இங்கு மிகவும் காணப்படுவதாகும். நுணியில் அமைத்திருத்தால் நுனி தெட்டரோசிட் (terminal heterocyst) (உ.ம். கிபுலேரியா—Rivularia) என்றும் இறை செல்களுக்குக்கிடையே இருத்தால் இடைவணர் தெட்டரோசிட் (intercalary heterocyst) (உ.ம். அனபீனா—Anabaena, நாக்பாக்—Nostoc) என்றும் குறிப்பிடப்படுகின்றன. இத்த தெட்டரோசிட்களின் செல்துறை இரு

படவக்களைக் கொண்டுள்ளது. மற்றும் செல்லின் புரோட்டோ பிளாஸ்ட் வெளிசிய மஞ்சள் நிறத்தைப் பெறுகிறது. இந்தச் செல் உண்டாவதற்கு முன் ஒரு பக்கத்திலோ (நுனி நெறடரோ லிஸ்டாயிருந்தால்) அல்லது இரு பக்கங்களிலோ, (இடை நெறட ரோலிஸ்டாயிருந்தால்) அடுத்ததுள்ள செல்லினும் நுண் துவாரத் தின் (pores) வழியே தொடர்பு கொண்டுள்ளது.

சில சமயங்களில் இந்த நுண்துளைகள் மூலம் புரோட்டோ பிளாஸ்ட் இழைகள் (protoplasmic connections) காணப்படும். ஆனால், நெறடரோலிஸ்ட் முழு வளர்ச்சி அடைந்தவுடன் இந்த நுண்துளைகள் அடைக்கப்பட்டு அல்லிடங்களில் சற்றுப் பெரிய நுண்மணிகள் (polar nodules) காணப்படுகின்றன. நெறடரோ லிஸ்டுடன் பணி (function) என்னவென்று வெகு நாட்களாக விவாதிக்கப்பட்டு வந்தது. எப்போதாவது (அரிதாக) நெறட ரோலிஸ்டுக்குள் 2-3 செல்கள் கொண்ட சிறு இழை தோன்று வதால் இந்த நெறடரோலிஸ்ட் ஓர் இனப்பெருக்கச் செல்வாகும் என்று எப்பிரட் (Spratt), கெய்ட்லர் (Geitler) முதலானவர்கள் கருதுகிறார்கள். பண்டைக் காலத்தில் இது இனப்பெருக்கச் செல்வாக இருந்திருக்க வேண்டும், இப்போது அப்பணியை விட்டு ஒரு செயலற்ற உறுப்பாக (vestigial organ) மாற்றம் அடைந்து விட்டது என்பது அவர்கள் கருத்து. சில பேரினங் களில் நெறடரோலிஸ்டுக்கு அடுத்து எப்போர் அல்லது "ஏகைல்ட்" (akinetes) உண்டாவதால் எப்போரை உண்டாக்கும் பணியில் நெறடரோலிஸ்ட் பங்கு கொண்டுள்ளது என்றும் கருத இடம் இருந்தது. ஆனால் சமீபகாலத்தில் ஃபாக் (Fogg) முதலான வர்கள் பசுநீர்ப் பாகெனிக் கைட்டரஜன் நிகழ்ந்துத்தது (nitrogen fixation) நிகழ்ச்சி இந்த நெறடரோலிஸ்டுதான் தடை பெறுகிறது என்று நிரூபித்துள்ளார்கள். ஆகவே, கைட்டரஜன் நிகழ்ந்துத்தது நெறடரோலிஸ்டின் பணியாக இருக்கலாம் என்ற புதிய கொள்கை இப்போது வலுவடைந்து வருகின்றது.

உடன இனப்பெருக்கம்

பல பேரினங்களில் ப்ரைக்கோம்கள் சிறு துண்டுகளாகப் பிளவுபட்டுத் தனித்தனியே வளர ஆரம்பிக்கின்றன, மெல்லிய பசை உதறலால் குழப்பப்பட்ட இந்தச் சிறு துண்டுகள் (ஒரு செல் முதல் பல செல்கள் கொண்டவை) வேகமாக நகரும் (actively mobile) ஆற்றம் பெற்றவை. இவற்றிற்கு ஹார்மோனோன்கள் (hormones) என்று பெயர் (உ-ம். ஆலிக்ஸ்பெரினா)

மனிதன் இனப்பெருக்கம்

சில பேரினங்களில் (நாஸ்டாக்—Nostoc, ரிவூலாரியா—Rivularia, ஸைடானெமா—Scytonema, ஸைடோனெமா—Sizigonia) ஓய்வு ஸ்போர்ஸ்கள் (resting spores) காணப்படுகின்றன. அவை களுக்கு ஏககலீட்டுகள் (skins) என்று பெயர். இவை உடலச் செல்களைவிடப் பேரிதானவும் தடித்த செல் உறைவைக் கொண்டும் காணப்படும். செல்லினுள் சேமிப்புப் பொருளான சைடோபைசின் (cyanophycin) நுண்மணிகள் மிகுதியாகக் காணப்படும். இவ்விதமாக உண்டான ஏககலீட்டுகள் தவித்தும் ஜோடிவாகவும் அல்லது வரிசைவாகவும் டிரைக்கோம்களில் அமைந்திருக்கும். இந்த ஸ்போர்ஸ்கள் வறட்சி நிலைமையும் அதிக வெப்ப நிலைமையும் தாக்கக்கூடிய சக்தி வாய்ந்துள்ளன. சிறிது கால இடைவெளிக்குப் பிறகாவது, அவை நீண்ட ஓய்வுக்குப் பிறகாவது இது முளைக்கிறது (germinates). இந்த நிலைநிலை டியூபரி (de Bary), பிரிட்சு (Fritsch), கெய்ட்லர் (Geltner) முதலானவர்கள் விவரித்துள்ளார்கள். முளைக்கும் போது புரோட்டோ பிளாஸ்ட் இரண்டு அவை நுழைந்த மேற்பட்ட செல்களாகப் பாகுபட்டு ஒரு சிறு ஹார்ம்கோனாக உருவாகிறது. முதலில் ஏககலீட்டின் உறைவின் உட்படலம் கரைந்து விடுகிறது. பிறகு, புறப் படலத்தில் ஒரு பக்கத்தில் சிறுபாகம் கரைய அந்த இடைவெளியில் வழியாகத் துரிதமாக நகர்ந்து இந்த ஹார்ம்கோன் வெளியேறி மூல வளர்ச்சி பெற்று ஒரு புதிய ஹார்ம்கோமாகிறது.

நைட்ரஜன் நிலைநிறுத்துதல் (Nitrogen fixation)

பரிசீலிப்பாளிகளுள் சில நைட்ரஜனைச் சேமித்து நைட்ரஜன் உட்குப் பொருள்களை உண்டாக்க வல்லன என்று உண்மையை முதன் முதலில் அறித்து உலகிற்கு அறிவித்தவர் பிராங்க் (Frank, 1889) என்பவரும், பெலுரீன்க் (Belgerinck, 1901) என்பவருமாவர். ஆனால், அப்போது நம்பப்படவில்லை. ஏனெனில் இப் பாகிகளின் மேதுள்ள பசைப்பொருளில் வாரும் பாக்டீரியைகளே நைட்ரஜன் நிலைநிறுத்தும் நிலைநிலையில் பங்கு கொள்வின்றன என்று கருதப்பட்டது. பின்னர் பசைப் பொருளில் வாரும் பாக்டீரியாவைக் கொண்டு அப்பறப்படுத்த புற வளர்ச்சி (ultraviolet rays) உபயோகப்படுத்தி மறுபடியும் பரிசீலிப்பாளிகளைக் கொண்டு இச் சோதனைகள் நடத்தப் பெற்றன.

1942—43 ஆம் ஆண்டுகளில் பரிசீல் (Burris), வில்சன் (Wilson) முதலானவர்கள், கனத்த நைட்ரஜன் 15 (heavy nitrogen, N^{15}) ஐயோடோபை உபயோகித்து, சில பரிசீலி

பாசிகள் உண்மையில் கைடரஜன் நிலைநிறுத்தும் நிகழ்ச்சியில் தனித்துப் பங்கு கொள்கின்றன என்று நிரூபித்துள்ளார்கள். [இதற்கு ட்ரேஸர் டெக்னிக் (tracer technique) என்று பெயர்.] ஆகவே, இப்போது இந்த உண்மையை யாவரும் ஒத்துக் கொண்டுக் கிறார்கள். இதுவரை சோதனையின் மூலமாக நூஸ்பாக் (Nostoc), அனபீகு (Anabaena), அனாபீனோஸிஸ் (Anabaenopsis), சைலிண்ட்ரோஸ்பெர்மம் (Cylindrospermum), ஆலோசிரா (Aulosira), மெஸ்டிகோக்ளாடஸ் (Mastigocladus), கலோத்ரிக்ஸ் (Calothrix) போலியோத்ரிக்ஸ் (Tolypothrix) முதலிய பேரினங்கள் கைடரஜனை நிலைநிறுத்த (Nitrogen fixation) வல்லன என்று நிரூபிக்கப் பட்டன.

இந்தப் பாசிகளின் கைடரஜன் நிலைநிறுத்தும் திறன், நெல் வயல்களில் சாகுபடியை அதிகப்படுத்துவதற்குப் பெரிதும் உதவுகின்றது. தமியா (Tania) என்ற ஐப்பாளிய தாவர இயல் திபுணர் ஓர் ஏக்கர் நிலத்தில் பசுநீரைப் பாசியின் உதவியால் 780 பவுண்டிற்கு அதிகமாக கைடரஜன் சத்ததப் பெருக்கலாம் என்று சோதனையின் மூலம் கணக்கெடுத்துக் கூறியுள்ளார்.

ஸயனோஸ்பட்டாவின் வகைபாடு

ஸயனோஸ்பட்டா தொகுதியின் கீழ் பிர்க்ஸோனாவனி (Class :— Myxophyceae) என்ற ஒரு வகையே உண்டு. இந்த வகை (1) குரோகோகாக்கேலிஸ் (Chroococcales), (2) செரிஸைபாஸேலிஸ் (Charesiphonales), (3) புனூரோகேப்சலிஸ் (Pleurocapsales), (4) நூஸ்பாக்கேலிஸ் (Nostocales), (5) ஸ்டைகோமேட்டலிஸ் (Stigonematales) என்று ஐம்பெரும் குடும்பங்களாக வகுக்கப்பட்டுள்ளது. இவற்றுள் முதல் மூன்றும் ஒரு செல் அல்லது கூட்டமைய (colony) உடனத்தை உடையன. பின் இரு பெருக்குடும்பங்களும் இறை அல்லது ட்ரைக்கோம் உடனத்தைக் கொண்டன. நூஸ்பாக்கேலிஸில் சில பேரினங்கள் இயல்பற்ற கிளைத்தல் (false-branching) முறையைக் கொண்டுள்ளன. ஆனால், ஸ்டைகோமேட்டலிஸின் பேரினங்களில் இயல்பான முறையில் ட்ரைக்கோம்களில் கிளைகள் (true-branching) உண்டாகின்றன.

குரோகோகரக்கேலிஸ் (Chroococcales)

குடும்பம் : குரோகோகரக்கேலி

கிரீயெகேப்சா (Gloeocapsa) கூட்டமைய உடலம் கொண்டுள்ளது ; ஒவ்வொன்றிலும் 2—8 செல்களுடையது ; செல்கள் கோள வடிவம் உடையவை ; பெருக்கம் செல் பாகுபாட்டின்

மூலம் 3 தளங்களிலும் நிகழ்க்கடும். செய்மீசு சுற்றிய் பை போன்ற பசை உறை உள்ளது. கூட்டமையில் ஒவ்வொரு சந்த திகிலும் ஒரு புதிய பசைஉறை உண்டாவதைக் காணலாம். இவ்வுறை, மஞ்சள், பழுப்பு, சிவப்பு அல்லது ஊதாநிறம் கொண்டிருக்கிறது. எப்போதாவது செல்லுக்குள் பவ, மிகச் சிறிய தடித்த உறை கிப்போர்கள் அல்லது நேஜோண்டஸ் (nematocysts) காணப்படும்.

வாழிடம்: ஈரமண், ஈரம் படித்த பாதைகள், மணல் வடிகட்டிகள் (sand-filters in water works), ஈரச் சுவர்கள், நீர்க் குழாய்களுக்கு அடியிலும் காணப்படும்.

மைக்ரோசிஸ்டிஸ் (Microcystis) செல்கள் கோள அல்லது நீண்ட வட்ட வடிவம் கொண்டவை ; செல்களுக்குத் தனிப்பட்ட



படம் 126

மைக்ரோசிஸ்டிஸ் செல் கூட்டமடிபசைபுடன் காணப்படுதல்

பசை உறை இடையாது : பவ செல்கள் ஒரு பரந்த பசை உறையில் படிந்துள்ளன (படம் 126) ; செல் பாகுபாடு எல்லாத் தளத்திலும் ஏற்படுகிறது ; வாயு நுண்குமிழிகள் (gas vacuoles) அதிகமாகக் காணப்படுகின்றன.

வாழிடம் : கோடில் குளங்கள், குட்டைகள் போன்ற நீர் நிலைகளில் மிகத்து காலும் (planktonic) இச் சிற்றினங்கள் நீர் வற்றிய

காலங்களிலும், வடபிரதேசம் சத்து நீரில் அதிகமாகவுள்ள நிலையிலும், வெப்பநிலை அதிகமான காலத்திலும் அதிகரித்து நீர் மலர்ச்சியை, (water bloom) உண்டாக்குகின்றன.

நாண்டாகேலிய (Nostocales)

குடும்பம் : ஆஸ்கிலேரியேசிய (Oscillatoriaceae)

ஆஸ்கிலேரியா (Oscillatoria): (படம் 127) டிரைக்கோம்கள் நேரானவை; பலச உறை அற்றது (அல்லது காணப்படாதது); டிரைக்கோம்களில் இளைக்காதது. குறுகிய உடத்தை உடைய சிற்றினங்கள் நீண்ட உருளை வடிவான செய்க்கள் கொண்டவை; பரந்த உடத்தை உடைய சிற்றினங்களில் செய்க்கள் அகன்று வட்டத்தாகப் போன்றவை. டிரைக்கோமில் துணிச் செய் அரைக்கோண வடிவிலோ அல்லது தொம்பி போன்றோ (calyptra) உள்ளன. செய்களில் லாபுக் குமிழிகள் அதிகமாகக் காணப்படும்.

உயிர் பெருக்கல் (Vegetative multiplication).

டிரைக்கோம்களில் பலசப்பொருளான தட்டு (disc) தோன்றுவதாலும் (படம் 127), சில சமயங்களில் இடைச் செய்க்கள் இறந்துவிடுவதாலும், டிரைக்கோம்கள் பல துண்டங்களாகின்றன, இவை ஒவ்வொன்றும் பிரிவினையடைந்து திராசுமோன்களாகச் செயல்பட்டு புதிய உடல்களை உண்டாக்குகின்றன.

வாழிடம்: குட்டை, குளம்போன்ற நீர்நிலைகள்; ஈரமண். இத்தப் பெரினத்தின் சிறப்பியல்பாவது இவைகள் மூன்றும் பின்னும் மெதுவாக (வழக்கி—gliding) நகர்வதும், அதே சமயம் பக்கங்களில் (வலம் இடப்புறங்களில்) அசைவதுமாகும் (oscillate). இதனால் தான் இத்தப் பாகிக்கு ஆஸ்கிலேரியோ என்ற பெயர் கொடுக்கப்பட்டது. இவ்வித அசைவுக்கு



படம் 127
ஆஸ்கிலேரியா
டிரைக்கோம் (இழை)

காரணம் (1) பசைப் பொருள்கள் சுரந்து வெளியிடுதல், (2) செவ்வின் புரோட்டோபிளாசுட் ஹைதரவாக மாறி மாறி (மிதிதளவு) விரிவதும் பின்னர் கருங்குவதும்மாகும். மற்றும் இந்த நிகழ்ச்சி, டிரைக்கோமிக் ஒரு துளியிலிருந்து மற்றொரு துளிக்கு அனைத்துப் போல ஒன்றன்பின் ஒன்றாகச் செத்துவதும் அசைவுக்குக் காரணமாகும்.



படம் 128

வலிதாச் இரு ஹைட்ரோசிஸ்டுகளுடன் காணப்படும் ஒரு டிரைக்கோமிக்

குடும்பம் : நாக்டாகேசி (Nostocaceae)

நாக்டாகி (Nostoc): உட்பட்டமைவு உடலும் கொண்டது. பசைப் பொருளாக ஆன இக்கூட்டமைவு கோளம், நீர்சதுரம் ஆகியது தான் போன்று காணப்படும். புறப் பாகத்தில் நூற்றுக் கணக்கான, வளைந்த (contorted) சுருள் போன்ற டிரைக்கோமிக் கள் பதிந்து அமைந்துள்ளன (படம் 128). உடலில் செவ்வின் கோளம்ஆகியது நீர்சதுரவடிவம்கொண்டவை, ஹைட்ரோசிஸ்ட் இடை நிலையில் உள்வது (intercalary heterocyst) (படம் 128), ஏகைலிட்டுகள் (akinetes) பொதுவாகக் கோளம் ஆகியது நீர் சதுர வடிவமானவை. இரு ஹைட்ரோசிஸ்டுகளுக்கு இடையே இவை வரிசையாகச் சில சமயங்களில் அமைந்திருக்கும்.

வாரும் இடம் : குட்டைகள், தெல்வயில்கள், ஈரப் பரதரங்கள் முதலிய இடங்களிலும், நீர்த் தாவரங்களின் மேலும், ஆந்தோசிரான், அபுஜாக்கா என்னும் தாவரங்களின் செல் களுக்கிடையிலும், மீன்கள் உடலத்தினுள்ளும் காணப்படும்.

ஸைடோநீமியேசி (Scytonemataceae)

ஸைடோநீமா (Scytonema) : டிரைக்கோம்களில் இயல்பற்ற வகையில் கிளைகள் (false branchings) தோன்றுகின்றன. பொதுவாக ஒரு கிளைகளும் ஒரே பக்கத்தில் வெளிவரும்: ஒவ்வொரு கிளையிலும் பசை உறை உண்டு (படம் 129). இவ்விதக் கிளைகள் உண்டாகும்போது செம்பாருபாட்டினால் பக்கங்களில் வளரும் கிளைகள் போல அங்ஙனம் இழைகள் நேரடியாகப் பசை உறையைத் கிழித்துக் கொண்டு பக்கவாட்டில் வெளிவருகின்றன. பின்னர் இவை பசை உறையைத் தோற்றுவித்துக் கொண்டு, ஹார்ம்கோங்களை உண்டாக்குகின்றன.



படம் 129

ஸைடோநீமா ஒரு போலிக் கிளைகளால் காணப்படும் உடமை

வாழிடம் : நீர் சொட்டும் பாறைகளின் மேலும், மரப்பட்டைகளின் மேலும், ஈரமண்ணிலும் பொதுவாகக் காணப்படும்.

குதியம் : ரிவுலாரியேசி (Rivulariaceae)

ரிவுலாரியா (Rivularia) : சிறு கோள அடிவரண பசைக் கூட்டமைவாக, நீர்த்தாவரங்களின்மேல் ஒட்டிக் காணப்படும், ஒவ்வொரு பசைப் பகுதியும் நூற்றுக் கணக்கான இழைகள் ஒரு மையத்திலிருந்து எல்லாப் பக்கங்களிலும் நோக்கிக் கதிர் போன்று அமைந்துள்ளன. சில சிற்றினங்களில் பசைப் பொருளில் கால்சியம் கார்பனேட் (calcium carbonate) உள்ளதால் இக்கூட்டமைவு உறுதியாகவும் கெட்டியாகவும் காணப்படுகிறது. ஒவ்வொரு டிரைக்கோமும் அடிமீசு, ஒரு துண்டரோசின் டைக் (basal heterocyst) கொண்டுள்ளது. டிரைக்கோம்களில்

உள்ள செங்கள் ஒரே அளவில்களாமல் ஆடியில் (தெறுடரோசில் டிற்று அருகே) பருமனாகவும், மேலே செங்கல் செங்கல் குறுகிலும் உள்ளன. குறுகிய மேற்பாகம், சில சிற்றினங்களில் மெல்லிய ரோமம் போல் (whiplike) நீண்டுள்ளது. மேற்பாகத்தில் சில செங்கள் ஆக்கத் திசுக்களாக (nerveless) செயல்படுகின்றன. ஒவ்வொரு டிரைக்கோமியின் அடிப்பாகத்திலும் பசைப் பொருளினின்றும் வெறுப்பட்ட ஒரு தனி உறை நன்கு காணப்படுகிறது.

வாழிடம் : நன்னீரில் மிதநத் தாவரங்களின் மேல் படித்து கொள் ஊடிவமான பசைப் பந்து போல் காணப்படும்.

9. தொகுதி: ரோடோமைட்டா (Division: Rhodophyta)

வெர்புப் பாலிகள்
(Red Algae)

இத்தத் தொகுதியில் அடங்கும் வெர்புப் பாலிகள் மற்றப் பாலித் தொகுதிகளிலிலும் இரு விதங்களில் வேறுபடுகின்றன. ஒன்று, பாலினப் பெருக்கத்தில் போது சிக்கலான பல படிவங்களைக் கொண்டிருப்பது; இரண்டு, செல்களில் உள்ள வண்ணக்களிகள்களில் மற்ற நிறமிசைவுடன், ஸ்பைரோசரீதின் (phycocerythrin) என்ற வெர்புநிறமி மிகுதியாக இருப்பதன் காரணமாக மற்ற நிறமிகள் மறைக்கப்பட்டுச் சிவந்த வண்ணமே இத்தப்பாலிகளில் காணப்படுவதாகும். மற்றும் பசுநீர்ப் பாலியைப் போல் இவைகளில் கணசரிமையுள்ள இனப்பெருக்கச் செல்கள் அறவே கிடையாது.

ஒருசில பேரினங்கள் (18 பேரினங்கள்) தவிர மற்ற வெர்புப் பாலிகள் எல்லாம் கடலில் வாழ்வன. நன்னீரில் சுமார் 50 சிற்றினங்கள் நீர் விழ்ச்சிகளிலும், குவிர்ந்த மலை அருகிலிலும், ஓடைகளிலும் காணப்படும் (உ-ம். பேட்ராகஸ்பெர்மம்—Batrachospermum). கடல்வாழ் பேரினங்கள் பெரும்பாலும் பாறைகளின் மேலும், மற்றக் கடல் தாவரங்களின் மேலும் காணப்படுகின்றன. எல்லாக் கடல்களிலும் காணப்பட்ட போதிலும் இவைகளின் பரப்பீடு (distribution) நீரின் வெப்ப நிலையைப் பொறுத்துள்ளது. உலகிலுள்ள மொத்த எண்ணிக்கையில் இவை 22 சதவிகிதம் வெப்ப மண்டலக் கடல்களிலும் (tropical seas), 78 சதவிகிதம் மற்றைய கடல்களிலும் (temperate seas and polar seas) காணப்படுகின்றன. இன்னிடமாகமே வெவ்வேறு ஆழங்களிலும் இத்தப் பாலிகளின் பரப்பீடு (distribution in depth) வேறுபட்டுக் காணப்படுகிறது. இது நீர் மட்டத்தின் ஏற்ற—இறக்க நிலையைப் (tides) பொருத்திருக்கின்றது. மற்றும், நீரில் எவ்வளவு ஆழத்துக்கு ஒளி புகுந்து செல்வக் கடும் என்பதும் இத்த ஆழப்பரப்பீட்டினைக்கு ஒரு முக்கியக் காரணமாகும்.

ஆகவே, கலங்கலில்லாத தெளிந்த நீரைக் கொண்ட உடல்களில் (உ-ம், பிளாசிடாமியும், மத்திய தரைக்கடலிலும்) இப் பாகிகள் 75—90 மீட்டர் ஆழத்தில் மிகுதியாகக் காணப்படுகின்றன.

உடல் அமைப்பு : இப் பாகிகளின் இரண்டு பேரினங்களே ஒரு செல்லாவானவை; மற்றவைவேறாகப் பல செல் கொண்ட கிளைத்த இழை உடலம் கொண்டவையாகும். சில பாகிகளின் உடலம் தனித்தனியே உள்ள இழைகளால் ஆக்கப்பட்டும்உள்ளன. ஆனால், பல பேரினங்களில் இழைகள் ஒன்றுடன் ஒன்று இணைந்து பண்சமரம் (matrix) சூழப்பட்டு எளிதில் காணக்கூடிய பெரிய (macroscopic) உடலையாக அமைந்துள்ளன. சில சமயங்களில், இந்த இழைகளின் இணைப்பு மிகவும் தெருக்கிரிப்புடன் காரணமாக உயர் தாவரங்களில் காணப்படும் பாரங்கைமா (parenchyma) போலப் புலப்படும். ஆனால் இவை உண்மையில் போலி பாரங்கைமாவையாகும் (pseudo-parenchyma).

உடலுத்தின் வளர்ச்சி ஒரு சில பேரினங்களில் (பெங்கியாம்புடி - bangioideae) இடைநிலைச் செல்களின் பாகுபாட்டின் (intercalary growth) மூலம் நடைபெறுகிறது. ஆனால், பெரும்பாலான பாகி விலங்களில் இது இழைவின் துனியில் உள்ள துனிச் செல்லின் (apical cell) மூலம்தான் நடைபெறுகிறது. இந்தப் பாகிகளும், துனி (செல்) அமைப்பு இருவகைப்படும். ஒன்று ஒரே செல் இழை (monaxial) : சில பேரினங்களில் உடலம் ஒரே ஒரு மூல (அச்ச) இழையைக் கொண்டு பக்கங்களில் கிளைகளைத் தோற்றுவிக்கின்றன (உ-ம், பெட்ரகாஸ்பெர்மம்). இரண்டு, பல மூல (அச்ச) இழைகள் மத்தியில் ஒருங்கே அமைந்து பல அச்ச அமைப்பு (multiaxial) அல்லது நீர் ஊற்று (fountain type) அமைப்பைக் கொண்டுள்ளது. இந்த இழைகள் ஒவ்வொன்றும் வெளிப் புறத்தில் கிளைகளைக் கொண்டுள்ளன.

செல்லமைப்பு : செத்துறை செத்துயோனையும் பெக்டிக் பொருள்களையும் கொண்டுள்ளது. பரிணாம முறையில் மேல் படியில் உள்ள பேரினங்களில் அடுத்தடுத்துள்ள செல்களுக்கு இடைவெளிச் செத்துறையில் ஓர் அகன்ற துளை வழியாக ஒரு தடித்த புரோட்டோபிளாசு இழை (protoplasmic strand) காணப்படும். செல்லினுள்ள புற ஊட்டோபிளாசுத்தில் நூக்கியல் பதித்துள்ளது. சில பரிணாமத்தில் சிழ் நிலையிலுள்ள பேரினங்களில் செல்லின் மத்தியில் ஒரு விண்மீன் (stellate) போன்ற பெரிய வண்ணக் கணிகம் (chromatophore) உள்ளது. இதன் நடுவில் ஓர் உறைபுற்ற பைரோயிட் (naked pyrenoid) உள்ளது.

(ஃபரிலியூமிடெச் சுற்றித் தரச் உறை டெடபாது.) ஆனால், முற் போக்கான (glucanoid) பேரினங்களின் செவ்வில் பனசிறிய நீள் வட்டத்தட்டு போன்ற (discoid) ஃபரிலியூமிட் அற்ற வண்ணக் கணிகங்கள் காணப்படும். வண்ணக் கணிகங்களில் காணப்படும் நிறமிகள் பச்சையம் α , பச்சையம் β , கோரோடின (carotin) ணாந்தோயில் (xanthophyll) ஃபுகோஎரித்ரின், (phycoerythrin), ஃபுகோஸைலின் (phycosyanin) ஆகியன. இந்த நிறமிகள் வெவ் வேறு விதங்களில் காணப்படுவதால், அவற்றிற்குத் தகுந்தார் போல் பல்வேறு நிறங்கள் இத்தப் பாகிகளில் காணப்படுகின்றன. அதிக ஒளி இரப்பின், ஃபுகோசலின் அதிகப்படியாக உண்டாகிறது. ஆகவே, நீர்மட்டத்தில் உள்ள பாகிகளில் சிவந்த நிறம் தெளிவாகக் காணப்படுவதில்லை. ஆனால் அதிக ஆழமான இடங்களில் வாரும் பாகிகளில் ஃபுகோஎரித்ரின் அதிகமாக உண்டாவதால் அவை ரோஜாவண்ணம் அங்கு பகட்டான சிவப்பு நிறத்துடன் காணப்படுகின்றன. ஒளி கடத்தில் சிறு தோக்கிப் பிரவேசிக்கும் போது நீலம் தவிர மற்ற எல்லாக் கதிர்களும் சிறிது சிறிதாக வடிசட்டப்படுகின்றன. ஆகவே அதிக ஆழமான இடங்களில் வாரும் பாகிகளுக்கு நீலக்கதிர்களே டெடக்கின்றன. இவ்விதமான நீலக்கதிர்களை முழுதும் பிரித்து ஒளிச்சேர்க்கைக்குப் பயன்படுத்திக்கொள்ளும் வகையில் ஃபுகோ எரித்ரின் ஒரு சிறந்த சாதனமாக அமைந்துள்ளது. இதனால்தான் சிவப்புப் பாகிகளைத் தவிர மற்றப் பாகிகள் ஆழம் மிகுந்த அடித் தளங்களில் வளர்வதில்லை.

கார்போஹைட்ரேட் செமிப்புப் பொருள்கள் துண்டணி களாக ஃபுகோஸைலின் சத்தியில் காணப்படுகின்றன. இவை பகம் பாகிகளில் காணப்படும் தரசத்திலின்றும் வேறுபட்டுள்ளன. ஏனெனில், அவை பொட்டாசியம் அயோடைடுடன் நீல நிறத்துக்குப் பதிலாகச் சிவப்பு கலந்த கலா நிறத்தை (reddish violet or wine red) கொடுக்கின்றன. ஆகவே இவ்விதமான வேறு பட்ட கார்போஹைட்ரேட் கிபுனோசிடயன் தரசம் (floridexan starch) என்று குறிப்பிடப்படுகின்றது. பன சிவந்த பாகிகள் கிபுனோசிடோனைட் (floridoside) என்னும் கரைவக்கடிய சர்க்கரைப் பொருளையும் சேமித்து வைக்கின்றன.

இனப்பெருக்கம்

உடன இனப்பெருக்கம் அரிதாகவே நடைபெறுகிறது. சில பேரினங்களில் ஒரே சத்தியில் பாலினப் பெருக்கமும், பாலினப் பெருக்கமும், (haplobiontic) நிகழ்கின்றது. ஆனால், பன பேரினங்களில் உருவம் ஒத்த சத்திமாற்றம் (isomorphic alternation) கொண்ட வார்த்தைச் சுழல் காணப்படுகிறது.

பாலினா இனப் பெருக்கம் கசையிழையற்ற (non-flagellated) மோனோஸ்போர் (monospore), டெட்ராஸ்போர் (tetraspore) முதலியவைகளால் தடைபெறுகின்றது. பாலினப் பெருக்கம் ஊகமி முறையில் நிகழ்கின்றது. பெண்பால் உறுப்பான கார்ப்புகோனியம் கூம்பு வடிவக் குடுவை போன்றுள்ளது. அதன் மேல் உள்ள நீண்ட குழாய் வடிவான பாகத்துக்கு டிரைக்கோகைன் (trichogyne) என்று பெயர். இந்த கார்ப்புகோனியம் சாரதரணக் கிளைவின் நுனிகளினோ அல்லது தனிப்பட்ட கார்ப்புகோனிய இழையில் (carpogonial filament) நுனியினோ அமைந்துள்ளது. இந்த கார்ப்புகோனிய இழை மற்ற உடல இழைகளினின்றும் (vegetative filaments) வேறுபட்டுள்ளது. அதாவது, அதன் செல்களில் வண்ணக்கணிகங்கள் இடைபடா. கார்ப்புகோனியத்தின் அகன்ற கீழ்ப்பாகத்தில் நூக்கியல் கொண்ட அண்டம் அமைந்துள்ளது.

ஆண்பால் உறுப்பு ஸ்பெர்மடோசூயம் அல்லது ஆந்திரீடியம் (spermatangium or antheridium) என்று அழைக்கப்படுகிறது. ஸ்பெர்மடோசூயத்தில் உள்ள புரோட்டோபிளாஸ்ட் ஜுவ்வாக் குழப்பப்பட்டு ஒரு சிறிய நுண் வழியாக வெளிவந்து நீரில் அடித்துச் செல்லப்படுகிறது. இதற்கு ஸ்பெர்மோஸியம் (spermatium) என்று பெயர். இதனுள் இருக்கும் நூக்கியல் ஆண் நூக்கியலாகச் செயல்படுகிறது.

ஸ்பெர்மோஸியம் மிதந்து கொண்டே கார்ப்புகோனியத்தின் டிரைக்கோகைன்மேல் மோதி அதனுடன் ஒட்டிக்கொள்கிறது. அந்த இடத்தில் ஸ்பெர்மோஸியத்தின் ஜுவ்வக் டிரைக்கோகைனில் உறையும் கரைத்து ஸ்பெர்மோஸியத்தின் நூக்கியலும்தான் டைட்டோபிளாஸ்டமும் டிரைக்கோகைனுக்கும் புருத்து கீழ்தோக்கி நகர்ந்து, பின்னர் அண்டத்துடன் இணைந்து கருவுறச் செய்கிறது (fertilized). சில பேரினங்களில் கருவுற்ற கார்ப்புகோனியத்தின் அடிப்பாகத்திலிருந்து பண கோனியோபிளாஸ்ட் (gonimoblast) என்ற இழைகள் தோன்றுகின்றன. இந்த இழைகளின் நுனியில் கார்ப்போஸ்போரகம் (carposporangium) என்ற உறுப்பு உண்டாகிறது. இந்த ஸ்போரகத்தில் உள்கிருக்கும் புரோட்டோபிளாஸ்ட் கார்ப்போஸ்போர் (carpospore) என்று குறிக்கப்படும் ஸ்போராக வெளிவந்து அடித்தளத்தில் படித்து முளைக்க ஆரம்பிக்கிறது. இயற்கையாக உண்டாகும் கிப்ரூட் பாடிக்கு (கோனியோபிளாஸ்ட் கார்ப்போஸ்போரகம், அவற்றைச் சூழ்ந்துள்ள மயட்டு இழைகள் முதலிய வாகவற்றிற்கும்) ஒரூக்கே கிஸ்டோகார்ப் (cystocarp)

என்று பெயர் (உ-ம். பேட்ராக்ஸ்பெர்னம்—*Batrachospermum*). சில பேரினங்களில் கருவுறுதலுக்குப் பிறகு, கார்ப்பிகோனியத்திலுள்ள இரட்டைமய நூக்கியல் ஒரு குழல்மூலம் அருகிலுள்ள ஒரு செல்லுக்கும் நகர்த்து செங்கிறது. இத்தச் செல்லுக்குத் துணைச்செல் அல்லது ஆக்ஸிலியரி செல் (auxiliary cell) என்று பெயர். பிறகு இரட்டைமய நூக்கியலைத் தன்பால் கொண்டும் ஆக்ஸிலியரி செல் (துணைச்செல்) கோனிமோபிளாஸ்டுகளைத் (gonimoblast) தோற்றுவித்து அவைகளின் மூலியில் கார்ப்போஸ்போரகங்களை (carposporangia) உண்டாக்குவதன்மூலம் விஸ்டாகார்ப்பு உருவாகிறது. இத்தத் துணைச்செல் சில பேரினங்களில் கருவுறுவதற்கு முன்பே (before fertilization) உண்டாகிறது (உ-ம். கிரேசிலேரியா—*Gracilaria*). ஆகும், சில மூலசேறிய உயர்ந்த (advanced) பேரினங்களில் துணைச்செல் கருவுறுதலுக்குப் பின்னரே (after fertilization) (உ-ம். பாலிஸ்போனியா—*Polysiphonia*) தோற்றுவிக்கப்படுகிறது.

சில பேரினங்களில் (உ-ம். பேட்ராக்ஸ்பெர்னம்) கருவுற்றவுடன் உண்டாத்திலுள்ள இரட்டைமய நூக்கியல் மையானில் முறைமில் பாகுபாடடைந்த பின்னரே கார்ப்பிகோனியத்திலிருந்து கோனிமோபிளாஸ்டுகளையும், கார்ப்போஸ்போரகங்களையும், கார்ப்போஸ்போரிகளையும் உண்டாக்குகிறது. ஆகவே, மேற் கூறப்பட்ட செல்கள் வாயும் ஒற்றைமய நூக்கியலையே பெற்றுள்ளன. ஆகவே, கார்ப்போஸ்போர் மூளைக்கும்போது ஒற்றைமய உடலத்தையே உண்டாக்குகிறது. அதனும் இய்விதமான வாழ்க்கைச்சழுவைக் கொண்ட பேரினங்களில் ஒரே சத்ததி (haplobontic) காணப்படும்.

ஆகும், பல பேரினங்களில் (உ-ம். கிரேசிலேரியா, பாலிஸ்போனியா) கருவுறுதலுக்குப் பிறகு இரட்டைமய நூக்கியல், மையானில் முறைமில் பாகுபாடடைவதால், மையட்டானில் முறைமிலுமேயே பாகுபாடடைவதால், கோனிமோபிளாஸ்டும் கார்ப்போஸ்போரமும் இரட்டைமய நூக்கியலையே கொண்டுள்ளன. கார்ப்போஸ்போர் மூளைக்கும்போது இரட்டைமய ஸ்போரோஸ்பட்டையே (sporophyte) தோற்றுவிக்கிறது. இன்னொரு சத்ததி, அதாவது ஸ்போரோஸ்பட் சத்ததி உருவாக இதனும் வழி ஏற்படுகின்றது. ஆகவே, சத்ததி மாற்றம் காணப்படுகிறது. இய்விதமாக உண்டாகும் ஸ்போரோஸ்பட் சத்ததி டெட்ராஸ்போரிக் (tetraspore) மூலம் பாலினா இனப்பெருக்கம் கொள்வதால் டெட்ராஸ்போரோஸ்பட் (tetrasporophyte) என்று அழைக்கப்படுகிறது. சில பேரினங்களில் விஸ்டாகார்ப்பைச்

சுற்றி உறை உண்டாவதில்லை (உ-ம். பெட்ரகாஸ்பெர்மம்). பரிணாமத்தில் மேல் நிலையிலுள்ள பேரினங்களில் கிண்டோகார்ப்பைசு சுற்றிப் பாதுகாப்பிற்காக ஓர் உறை (pericarp) உண்டாகிறது (உ-ம். கிரேசினேரியா, பாஸிசைமோனியா).

ரோடோஸ்பட்டரின் வகைகள்

இதன் கீழ் அடங்கும் ரோடோஸ்பட்டரி (Class : Rhodophycene) துணை வகை பேங்கியோய்டி (Subclass: Bangioideae) என்றும், துணை வகை ஃபிரிடேயி (Subclass : Florideae) என்றும் இரு பிரிவுகளாக வகுக்கப்பட்டுள்ளது. பேங்கியோய்டியினுள் (Bangioideae) அடங்கும் பேரினங்கள் பரிணாம முறையில் கீழ்த்நிலையில் உள்ளவை. செங்களுக்கு இடையில் புரோட்டோபிரோஸ்பட்டர் இனங்கள் கிடையா. மத்தியம், செவ்விக் ஒரு பேரிய வின்மீன் வடிவம் கொண்ட (உறைவற்ற ஸ்பிரோப்டுடன் கூடிய) வண்ணக்கணிகம் உள்ளது. இனப்பெருக்கம் எவிய முறையில் நடைபெறுகின்றது (உ-ம். பேங்கியா—Bangia).

ஃபிரிடேயினுள் (Florideae) அடங்கும் பேரினங்கள் பரிணாம முறையில் மூன்றாம் அடைந்தவை. செங்களுக்கிடையே புரோட்டோபிரோசை இனத்தைப் கொண்டுள்ளவை. செவ்விக் பன சிறிய (ஸ்பிரோப்டற்ற) தட்டுவடிவ வண்ணக்கணிகங்கள் கொண்டுள்ளன. வாழ்க்கைச் சுழலில் பெரும்பாலும் உருவம் ஒத்த சத்தி மாற்றம் காணப்படும் (isomorphic alternation). ஃபிரிடேயினுள் அடங்கும் பெருங்குடும்பங்களாவன :

1. நியெலியோனேலிஸ் (Nemalionales) (உ-ம். பெட்ரகாஸ்பெர்மம்—Batrachospermum)
2. கிரார்டினாலிஸ் (Gigartinales) (உ-ம். கிரேசினேரியா—Gracilaria)
3. செரேமியேலிஸ் (Ceramiales) (உ-ம். பாஸிசைமோனியா—Polysiphonia)
4. ஜெலிடேயேலிஸ் (Gelidiales)
5. கிரிப்டோனேமியேலிஸ் (Cryptonemiales)
6. ரோடியமேனியேலிஸ் (Rhodymeniales).

பெருங்குடும்பம் : நிமேலியோனேலிக்
(Order : Nemalionales)

பேட்ரகாஸ்பேர்மம் (Batrachospermum)

இந்தப் பாசி (படம் 130) தன்னிச் ஒடைகளிலும் குளிர்ந்த மலையகுளிகளிலும் மிகுதியாகக் காணப்படும். இந்தப் பாசி தமிழ் நாட்டில் கம்பாக்கம் (Kambakkam), தேக்கடி (Thekkadi), கம்பம் (Cumbam) முதலிய மலைப்பிரதேசங்களில் உள்ள ஒடைகளிலும் அருளிகளிலும் காணப்படும். இப் பாசி கருநீலம் அல்லது ஊதா நிறத்துடன் (30-செ.மீ. நீளம் வரை) ஒடையில் சிறு சுற்களின் மேல் ஒட்டி வளர்வதைக் காணலாம். இது தவளை மூட்டைத் திரைப்போலிருந்த வாய் "தவளை" என்பான் பாசி (frog-spawn alga) என்று அழைக்கப்படுகிறது. இந்தப் பாசியின் உடலம் நீண்ட செடிகள் கொண்ட ஓர் அடுக்கு இழையால் ஆனது (monoaxial). இந்த மூல அச்சின் நுனியில் உள்ள நுனிச் செல்லின் பாகுபாட்டின்மூலம் வளர்ச்சி ஏற்படுகிறது. இந்த மூல இழையில் குறுக்குச்சுவர் பாகங்களில் (கணுக்களில்) கிளைகள் வட்டாடுக்கு முறையில் (whorled) அமைந்துள்ளன (படம் 131). இக் கிளைகள் ஒரு குறிப்பிட்ட அளவே வளரும் ஆற்றல் பெற்றுள்ளன (குறுக்கிளைகள்-branches of limited growth). கிளைகள் நீள்வட்ட வடிவம் கொண்ட செடிகளால் ஆனவை. கிளை ஒவ்வொன்றின் அடிச் செல்லிலிருந்தும் மற்றும் சில கிளைகள் தோன்றி மூல அச்சின் மேல் படர்ந்து வளர்ந்து ஒரு போலிப் புறனியாக (pseudo-cortex) அமைந்திருக்கிறது (படம் 131). இக் குறுக்கிளைகளைத் தவிர மூல அச்சைப் போன்று, நுனிச்செல் கொண்ட நெடுக்கிளைகளும் கணுக்களில் காணப்படுகின்றன.




படம் 130

பேட்ரகாஸ்பேர்மம் வளர்வது

யானைப் பெருக்கம்

யானைப் பெருக்கம் ஊகரி நுண்ணில் ஸ்பெர்மடோசியம், கார்ப்பகோனியம் மூலமாக தடைபெறுகின்றது. பேட்ரகாஸ் பெர்மத்தின் சிற்றினங்களும் சில வேற்றுடனத்தன்மை (heterothallic) உடையன. மற்றவை ஒத்த உடனத்தன்மை (homothallic) உடையன.

கோள வடிவம் கொண்டு ஸ்பெர்மடோசியங்கள் தனித்து அல்லது ஜோடியாகக் குறுக்கின்களின் துளியில் தொன்றுகின்றன (படம் 131). அவைகளினின்றும் ஸ்பெர்மேஷியம் ஒரு துண்டினையின்வழி வெளிவந்து நீரில் மிதந்து கொண்டிருக்கும். கார்ப்பகோனியம், இனையின்மேல் தனித்து அமைத்திருக்கும் (படம் 132).



படம் 131

பேட்ரகாஸ்பெர்மம் உடனத்தின் ஒரு பாகத்தின் தொற்றம்

அது குறுவைபோன்று நீண்ட முனரக்கோணகளைக்கொண்டுள்ளது. ஸ்பெர்மேஷியம் முனரக்கோணகன்மேல் மோதி அதன்மேல் ஓட்டிக் கொண்டிருக்கிறது (படம் 132). பின்னர், செல் உறைவும் ஸ்பெர்மேஷியத்தின் சல்லும் கரைந்தவுடன் ஸ்பெர்மேஷியத்தின் நூக்கலியல் முனரக்கோணகல் வழியாகச் சென்று அண்டத்தின் நூக்கலியலுடன் இணைத்து கருவுறச் (fertilization) செய்கிறது. உடனே இந்த இரட்டைய நூக்கலியல் மையங்களில் நுண்ணில் பாகுபாடு அடைந்து, ஒற்றைமய நூக்கலியல்கள் உண்டாகின்றன. பின்னர், கார்ப்பகோனியத்தின் அடிப்பாகத்திலிருந்து பல் இழை போன்ற

வளரிகன் தோன்றுகின்றன (படம் 133). இவற்றிற்குக் கோலிமோபிளாஸ்ட் இழை (gonimoblast filament) என்று பெயர். பின்னர், கமடானில் பிளிகினைப்படி பல தூக்ளியங்கள் தோன்ற இச் சேய் தூக்ளியங்கள் கோலிமோபிளாஸ்டுகளுக்கும் துழை கின்றன. பின்னர் ஒவ்வொரு கோலிமோபிளாஸ்ட் இழையின் நுனியிலும் ஒரு கார்ப்போஸ்போரகம் தோன்றுகிறது (படம் 133).

ஸ்பேர் மோஷியம்



படம் 132

பேட்டாகாஸ்பெர்மம் கார்ப்போகோளியம் (கார்ப்போகோளியம்மேல் ஸ்பேர் மோஷியம் படித்திருப்பதைக் காண்க)

கார்ப்போ
ஸ்போரகம்




படம் 133

பேட்டாகாஸ்பெர்மம் கருவுற்ற கார்ப்போகோளியம் கோலிமோபிளாஸ்டுகளையும் கார்ப்போஸ்போரகங்களையும் தோற்றுவிக்கும் படிவம்

இதன் புரோட்டோபிளாஸ்டு பின்னர் (உதாரணத்து) ஒரு கார்ப்போஸ்போரகம் வெளியாகுகின்றது. இந்தப் படிவத்தில் கருவுற்ற கார்ப்போகோளியத்தைச் சுற்றி, பல கோலிமோபிளாஸ்டுகளும் ஒரு சுற்றையாக அதனைச் சூழ்ந்திருப்பதைக் காணலாம். இந்த கிப்பூட் பாடிக்கு (fruit body) சிஸ்டோகார்ப் (cystocarp) என்று பெயர் (படம் 131). சிஸ்டோகார்ப்பின் பாத கார்ப்பு (உறை) அற்ற தன்மை இந்தப் பாகியின் பரிணாமக் கிழ்-நிலையைத் தெளிவாகக் காட்டுகிறது.

கார்ப்போஸ்போர் அடித்தளத்தில் படித்து, மூளைத்து ஒரு சிறிய கிளைத்த இழை உடலத்தை உண்டாக்குகிறது (படம் 134). இது மூலிக்ந்த (myli) பேட்டாகாஸ்பெர்மம் உடலத்தைப் போல

அன்னாயில் ஓர் எலிய கிளைத்த இழைபோன்ற உடலத்தை மட்டுமே உண்டாக்குகிறது. இது சாண்ட்ராண்டியா (Chamtrandia) என்ற ஓர் எலிய சிவப்புப் பாகிலை உருவத்தில் ஒத்துள்ளது. ஆனால், இது பேட்ரகாஸ்பெர்மத்தில் வாழக்கூடிய சழலில் ஒரு படிவமேயாகும். ஆதலால் இதற்கு சாண்ட்ராண்டியா படிவம் (chamtrandia stage) என்று பெயர். இந்தப் படிவத்தில் இழைகளின்மேல் பன மாணோஸ் போரகங்கள் (monosporangia) தோன்றுகின்றன (படம் 134). இந்த ஸ்போரகத்திலுள்ள மாணோஸ்போர் (monospore) வெளி வந்து, முதிர்ந்து மறுபடியும் சாண்ட்ராண்டியா போன்ற இழை களை உண்டாக்குகிறது (படம் 134). இவ்விதமாகப் பன சாண்ட்ராண்டியா இழைகள் உண்டாக முடியும்.



படம் 134

பேட்ரகாஸ்பெர்மம் சாண்ட்ராண்டியா படிவம் (இடப்பக்கக் கிளையிலுள்ள முதிர்ந்த பேட்ரகாஸ்பெர்மம் உடலம் தோன்றுவதைக் காண்க)

மேலும், ஒவ்வொரு சாண்ட்ராண்டியா போன்ற இழை உடலத்தினின்றும் முதிர்ந்த பேட்ரகாஸ்பெர்மத்தில் சிறப்பியல்பு கள் அனைத்தையும் கொண்ட உடலம் ஒன்று வளர்கின்றது (படம் 134 இடது). பேட்ரகாஸ்பெர்மம் உடலங்கள் எண்ணிக் கையில் பெருகுவதற்கு இந்த சாண்ட்ராண்டியா படிவமே சிறந்த வழியாகும்.

பேட்ரகாஸ்பெர்மத்தில் உடலம், கோலிமோனோஸ் இழைகள், கார்ப்போஸ்போரகங்கள், கார்ப்போஸ்போரிகள், சாண்ட்ராண்டியா இழைகள் ஆகிய எண்ணப் படியங்களும்

ஒற்றையடி தூக்கியனையே கொண்டிருத்தலாலும், கருவுற்ற கார்ப்பு கொளியம் ஒன்றே இரட்டையடி நிலையைக் காட்டுவதாலும், இதன் வாழ்க்கைச் சுழலில் ஒரே சத்தி (haplobiontic) காணப்படுகிறது.

பெருக்குடும்பம் : கிளார்க்ஜிஜினேலிஸ்
(Order: Gigartinales)

கிரேசிலேரியா (Gracilariis)

இந்தக் கடல்வாழ் பாசி உடலமைப்பிலும் வாழ்க்கை வரலாற்றிலும் பேட்ரகாஸ்பெர்மத்தைவிடச் சில அம்சங்களில் மேம்பாட்டடைந்து காணப்படுகிறது. இது தமிழகத்தில் மாயமல்லு புரம் (Mahabalipuram), கருசாடி (Karasadi), பாம்பன் (Pamban), கன்னியாகுமரி (Cape Comorin) ஆகிய கடற்கரைகளில் மிகுதிமாகக் காணப்படும். புறத் தொற்றத்தில் இதனுடைய சிற்றினங்கள் இரு வகைப்படும், ஒரு வகையில் உடலம் ஒழுங்கற்ற




(படம் 135)

கிரேசிலேரியா கம்பிரெக்ஸா (தட்டையான உடலம்) வளையடி

முறையில் கிளைத்தும், உருள் வடிவமாகவும், கருஞ்செம்பு நிறம் கொண்டும் அமைந்துள்ளது (உ.ம். கிரேசிலேரியா G. lichenoides) (படம் 136). மற்றொரு வகையில் உடலம் இருசுமமாகக் கிளைத்தும் (dichotomously branched), தட்டையாகவும், வெள்ளிய செம்பு

நிறத்துடனும் காணப்படும் (உ.ம். கீயம்புள்ளி-*C. compressa*) (படம் 135). இத்தப் பாகிகள் ஒரு தட்டையான வட்டப் பிடிப் பினும் பாரை அடித்தலத்தில் ஒட்டிவாழ்னன. குறுக்கு வெட்டுத் தோற்றத்தில் அகன்ற விட்டத்துடன் காணப்படும். செவ்விகத்




படம் 136

கி. கிண்டி கார் (கிண்டி கார்) காணப்படும்

கொண்ட மெடுள்ளா (*medulla*) என்ற மத்திய பாகமும் குறுகிய விட்டத்தைக் கொண்ட செவ்விக் அமைந்த புறணிவாகவும் (*cortex*) காணப்படும் (படம் 137). ஆனால், இத்த அமைப்பு போலி பாரங்கையாகவாகும் (*pseudo-parenchyma*). தோற்றத்தில் பாரங்கையானவப்போல் காணப்படும், உண்மையில் பாரங்கையா அன்று. ஏனெனில், பல இழைகள் நெருக்கமாக அமைந்த காரணத்தால் இத் தோற்றம் ஏற்படுகிறது. புறணியின் வெளிப்பாகத்திலின்று ரோமங்களும் காணப்படுகின்றன. உடனத்தின் வளர்ச்சி ஒரு துளிச் செவ்விக் பாகுபாட்டினால் (*apical growth*) ஏற்படுகிறது. ஆகவே, உடனம் ஓரச்ச (*monoxylal*) அமைப்பைக் கொண்டுள்ளது.

இரெசிவேரியாவின் வாழ்க்கைச் சுழலில் உருவம் ஒத்த சத்தி மாற்றம் (isomorphic alternation) காணப்படுகிறது. இரட்டை மயச் செல்களைக் கொண்ட ஸ்போரோஸ்பட், டெட்ராஸ்போர்களைத் (tetraspores) தோற்றுவிக்கிறது. இந்த ஸ்போர்களைக் கொண்ட டெட்ராஸ்போரகம் (tetrasporangium) நீள் வட்டமானது (படம் 138). அது சிறு செல்கள் கொண்ட புறணிப் பாகத்தில் தோன்றுகின்றது.

டெட்ராஸ்போரகத்தில், டெட்ராஸ்போர்க்கள் உண்டாவ தற்குமுன், இரட்டைமய நூக்கியல், மையங்களில் முறையில் பாகுபட்டு, நான்கு ஒற்றைமய நூக்கியல்களாக மாறியவுடன் ஸ்போரகத்தின் புரோட்டோ பிளாஸ்டு குறுக்கு நெடுக்காகப் (cruciate) பிளவுபட்டு நான்கு ஸ்போர்களை உருவாக்குகின்றது (படம் 138). இந்த ஸ்போர்கள் முழு வளர்ச்சி அடைந்தவுடன் ஸ்போரகத்தின் உறை கரைந்து அதற்கு மேலுள்ள புறணிச் செல்கள் அழிவடைய, இந்த டெட்ராஸ்போர்கள் வெளியேறி அடித்தளத்தில் படித்து, ஒற்றைமய காமிட்டோஸ்பட்டுகளாக முளைக்கின்றன. அந் நாளிலுள், இரண்டு பெண் காமிட்டோஸ்பட்டுகளாகவும் மற்ற இரண்டும் ஆண் காமிட்டோஸ்பட்டுகளாகவும் செயல்படுகின்றன.



படம் 137

இரெசிவேரியா—உடல் அச் சின் குறுக்குமேட்டுத் தோற்றம்




படம் 138

இரெசிவேரியா—டெட்ராஸ்போரகத்துடன் காணப்படும் உட்கம் (குறுக்குமேட்டு)

ஆண் காமிட்டோஸ்பட்டில் கிளைத்த இளம் பாகங்களில் புறணியில், சிறு குழிகள் (pits) தோன்றுகின்றன (படம் 139). அவற்றிலுள் ஆண்பாதுறுப்புகளான ஸ்பெர்மடோசியங்கள்

(உட்புறப் பாகத்தில்) உண்டாகின்றன (படம் 139). மூதற்ப்படி இத்த ஸ்பெர்மடெஞ்சியங்களிலிருந்து ஸ்பெர்மேஷியங்கள் வெளி வந்து நீரில் மிதக்கின்றன. இதற்குள் பெண் காமிடோசு



படம் 139

அர்த்தினேரியா—ஸ்பெர்மடெஞ்சிய ஒழிகளுடன் காணப்படும் உடமை (குறுக்குவெட்டு)



படம் 140


அர்த்தினேரியா—தாக்குசெல்களையும், இனம் தாக்கு செல்களையும் (குறுக்குவெட்டு)

அர்த்தினேரியா—தாக்குசெல்களையும் இனத்தின் தோற்றம் (குறுக்குவெட்டு)

படத்தில் இனம் பாகங்களில் புறணியில் காணப்படுகின்றன. மூதலில் ஒரு தாக்கு செலின் மீது (supporting cell) சற்று வளைந்த இருசெல் காணப்படுகின்றன இனம் (2-celled

carpogonial filament) உண்டாகி அதன் துண்செயல் கார்ப்பு கோனியமாக உருவடைகின்றது (படம் 140). குடுவைபோன்ற இந்த கார்ப்புகோனியத்தின் நீண்ட டிரைக்கோமைகள் (புறணி யின் வழியே) உடனத்திற்கு வெளியே நீட்டிக் கொண்டிருக்கிறது. மற்றும், தாக்கு செல்லிக்குத்து பக்கங்களில் சேமிப்புப் பொருள் கள் மிகுதியாகக் கொண்ட பல செல் இழைகளும் வளர்கின்றன (படம் 140). இவற்றை ஊட்டச் சத்துச் செல்கள் (nurse-cells) என்று குறிப்பிடுகிறார்கள்.

உயெர்மேஷியம் டிரைக்கோமைகள்மேல் மோதி அதனுடன் ஒட்டிக் கொள்கிறது. மூல் உறிவனாறு உறையும் சங்கும் கரைய உயெர்மேஷிய நூக்கியல் அண்ட நூக்கியலுடன் இணைத்து கருவுறச் செய்கிறது. பின்னர், கார்ப்புகோனியத்தின் அடிப் பாகம் தாக்கும் செல்லுடன் ஒரு குழாய்மூலம் இணை, இந்த



படம் 141
கிரேஸியேலா—கிரேஸியேலா கிரேஸியேலா கிரேஸியேலா

கைகோட் நூக்கியல் (பகுபடாமல்) தாக்கும் செல்லுக்குள் (supporting cell) பிரவேசிக்கிறது. எனவே, தாக்கும் செல்வே இத்தப் பாகிலிக் துணைச்செய்களாக (auxiliary cell) செயல் படுகின்றது. அநேகமயத்தில் கற்றிபுள்ள ஊட்டச் சத்துச்

செய்கள் (ovum-cells) சகலாம் இத்தத் தாக்கும் செய்துடன் இணைகின்றன (படம் 140). இய்விதமான இணைப்பாக் ஒரு பெரிய ஒழுங்கற்ற யோசெண்டல் செல் (irregular placental cell) உண்டாக (படம் 140) அதன் மேல் பாகத்திலின்று பன கோனி மோபிளாக்கு இழைகள் தொன்றுகின்றன. இத்த கோனி மோபிளாக்குகளின் நுளிகளில் கார்ப்போல்போரகங்களும், அவற்றினுள் கார்ப்போல்போரகனும் முறைப்படி தொன்று கின்றன. ஆறும், னைகோட் தூக்ளியல் மைடாஸிஸ் (mitosis) முறைப்பினேயே பகுப்படைதனாக் கார்ப்போல்போரின் தூக்ளியனும் இரட்டைய நியைப்பினேயே உள்ளது. இய்விதமாக வளர்ச்சியடையும் சிண்டோகார்ப்புக்கு (cystocarp) மேதுள்ள புறனிலின் செய்கள் வேகமாகப் பாகுபாட்டடைந்து, சிறிது சிறிதாக, ஒர் அகரக்கோளம் (அகனது பீப்பாய்) வடிவமான சிண்டோகார்ப் உதையைத் (pericarp) தொற்றுவிக்கிறது (படம் 141). இய்வுதையின் நுளியில் ஆண்டியோல் (ostiole) என்ற ஒரு துவாரமும் ஏற்படுகின்றது. இத்த சிண்டோகார்ப் உதைய பன அடுக்குகளைக் கொண்டது (படம் 141). ஆகவே, கிரெசினேரி வாலின் சிண்டோகார்ப், பாதுகாப்பு உதையுடன் காணப் படுகிறது. இத் தருணத்திலே பெண் காமிட்டோமைட், உடனத்தின் புறத்திலே ஆங்காங்கே இத்த சிண்டோகார்ப்புகள் பன சிறு குமிழிகள்போல் காணப்படும் (படம் 138). (இவற்றில்குறும் பெண் காமிட்டோமைட் உடனத்ததைச் சுலபமாகக் கண்டறிய வாம்.) கார்ப்போல்போரகத்திலிருந்து கார்ப்போல்போரிகள் ஒன்றன்பின் ஒன்றாக வரிசையாக வெளிவருவதைக் காணலாம் (படம் 141). சில சிற்றினங்களில் கோனியோபிளாக்கு திரைகளிலிருந்து மெல்லிய இழைகள் சிண்டோகார்ப் உதையிக்குள் (pericarp) நீண்டு வளர்ந்து உதையச் செல்களிலின்று சத்துப் பொருள்களைக் கிரகித்து, வளரும் கார்ப்போல்போரகளுக்கு அளிக்கின்றன. கார்ப்போல்போரிகள் ஆண்டியோல் வழியாக வெளிவந்து அடித்தனத்தையடைந்தவுடன் இரட்டையல் ம்போரோமைட்டுகளாக வளர்கின்றன.


பெருங்குடும்பம் : செரேமியேலிஸ் (Order : Ceramiales)

பாலிசைபோனியா (Polyisiphonia)

பாலிசைபோனியா, சிவப்புப் பாகிகளால் பரிணாம முறையில் அடி உன்னத (advanced) நிலையடைந்துள்ள பாலியாகும். ஆகவே, பன சிறப்பியல்புகளை இத்தப் பாகிலின் வாழ்க்கை வரலாற்றில்

காணலாம். இது சென்னையில் எண்ணூர் உப்பங்கழியிலும் (backwaters of Ennore), அடையாறு ஆற்றில் (Adyar river) மூகத் துவாரத்திலும் (estuary), பாம்பர், குருமாபுத் தீவுகளின் கடற் கரைவிலும் காணப்படும். பொதுவாக இது கடல் தாவரங்களின் இலைகளின்மேல் [(உ.ம.) ஹெலோபைலா - *Holophila*, என்துலாஸா - *Enhalus*] ஏரணப்படுகளிலுமாம் பற்றி வாழ்கின்றன. இதன் உடலம் கிளைத்துச் சிவந்து ரோமங்களைப்போல் காணப்படும் (படம் 142). மூல அச்ச தீளவாட்டில் பல வரிசைகளில் குழல் களைப் போன்ற செங்களைக் (polyphloous) கொண்டிருத்தலால் இத்தப் பாகிக்கு பரணைப்போலியா (poly-பல, siphon-குழல்) என்று பெயர் இடப்பட்டது (படம் 142). உடலத்தின் துவிப் பாகங்களில் இரு சமபாகக் கிளைத்த (dichotomously branched) திறமற்ற டிகரகோபினாண்டு (trichoblast) என்ற ரோமங்கள் காணப்படுகின்றன (படம் 142). அவரக்கோள வடிவம் கொண்ட துவிச் செல்லின் (apical cell) பாதுபாட்டினால் உடலத்தின் வளர்ச்சி ஏற்படுகின்றது. துவிச் செல்லிலிருந்து துண்டிக்கப்பட்ட ஒவ்வொரு செல்லும் தீளவாட்டில் பாகு பாடடைந்து மத்திய செல் (central cell) ஒன்றையும் தான்கு (அல்லது தாங்குக்கு மேற்பட்ட) சுற்றி அமைந்த (pericentral) செங்களைபும் தொற்றுகின்றது. எண்ணப் புதிய செங்களும் தீள வாட்டில் வளர்ந்து உடலத்தின் பல வரிசை அமைப்பை அளிக் கின்றன. ஆயினும், மூல அச்சில் துவிச்செல் ஒன்றே இருத்தலால் உடலம் ஓரச்ச (monoraxial) அமைப்பையே கொண்டுள்ளது. உடலத்தின் துவிப் பாகத்தின் மேற்கூறப்பட்ட துண்டங்கள் பாதுபாடடைவதற்குள் ஒரு மூலையில் ஒரு செல் பருக்கப்பட்டு அது பின்னர் டிகரகோபினாண்டு ஆக வளர்ச்சியடைகிறது. பக்கக் கிளைகள் உண்டாகும்பொழுதும் இதே திகழ்ச்சி காணப் படுகின்றது. ஆனால், டிகரகோபினாண்டுக்கும் கிளைக்கும் உள்ள வேறுபாடுள்ளவெளில் டிகரகோபினாண்டு ஓரடுக்கில் (uniseriate) செங்களைக் கொண்டுள்ளது. ஆனால், கிளைகள் மூல இழைமையப் போல் பல அடுக்குகளைக் கொண்ட (polyphloous) செல் அமைப்பைக் கொண்டது. செங்களுக்குமிடையில் புரோட்டோ பினாண்டியிக் இழைகள் தெனீவாகக் காணப்படுகின்றன (படம் 142). செங்களுக்குள் பல சிறு தீளவாட்டத் தட்டு போன்ற (disoid) வண்ணக் கணிகங்கள் அமைந்துள்ளன (படம் 142).

வாழ்க்கை வரலாறு : பரணைப்போலியா, இரேசினேரி வானவப்போல் உருவம் ஒத்த சத்ததி மாற்றத்தகைத் தன் வாழ்க்கையில் கொண்டுள்ளது. ஆகவே, மூன்று விதமான




படம் 142

பாவிசைபோனியா—வளியற்பு உடலத்தின் மேல் பாகத்தின் தோற்றம்;
வண்ணக் கணிகைகளுடன் காணப்படும் செல்கள்

உடவக்களைக் காணலாம். அவை ஸ்போரோஸ்பைட் சத்ததியான டெட்ராஸ்போரோஸ்பைட் (tetrasporangiate), ஆண் காமிட்டோஸ்பைட், பெண் காமிட்டோஸ்பைட் ஆகன.

பாலினப் பெருக்கம் : ஸ்போரோஸ்பைட் உடவத்தில் இளம் பாகங்களில் கோணவுடையான டெட்ராஸ்போரகங்கள் (tetrasporangia) ஒன்றாகித் ஒன்றாக வரிசையாகக் காணப்படும். ஒவ்வொரு டெட்ராஸ்போரகமும் நான்கு பிரமிட் (pyramidal) போன்ற டெட்ராஸ்போரகளை உண்டாக்குகிறது. முதலில் இந்த டெட்ராஸ்போரகம் ஒரு பக்கத்தில் உள்ள பெரிய மத்திய செவ்விய குறுக்குப் பாகுபாட்டினால் உண்டாகிறது. அது பெரிதாக வளர்ச்சியடைவதும்போது அதன் இரட்டைமையான தூக்கியல், மையாலின் முனையில் மறுபட்டு நான்கு ஒற்றையடி தூக்கி வக்களாகப் பெருகியவுடன் ஸ்போரகத்தில் புரோட்டோபிளாஸ்ட் நான் காணப் பிடித்து டெட்ராஸ்போரகமாக வளர்ச்சியடைகின்றன (படம் 143). இந்த 4 ஸ்போரகள் அமைந்துள்ள விதம் கிரேசியேலியாவில் டெட்ராஸ்போர அமைந்துள்ள விதத்தினின்றும் வேறுபட்டுள்ளது. இங்கு இந்த அமைப்பு டெட்ராஹிட்ரல் - டெட்ரேட் (tetrahedral-tetrad) எனப்படும். இந்த டெட்ராஸ்போரகள் உடவத்தினின்றும் விடுவிக்கப்பட்டவுடன் படித்து, காமிட்டோஸ்பைட்டுகளாக வளரின் தன். நான்கு டெட்ராஸ்போரகளில் இரண்டு ஆண் காமிட்டோஸ்பைட்டுகளைவும், இரண்டு பெண் காமிட்டோஸ்பைட்டுகளைவும் தோற்றுவிக்கின்றன.




படம் 143

பாலினஸ்போரியா-ஸ்போரோஸ்பைட் உடவத்தில் காணப்படும் டெட்ராஸ்போரகங்கள்


பாலினப் பெருக்கம் : ஆண் காமிட்டோஸ்பைட்டின் துளிப் பாகங்களிலுள்ள டிகரகோபிளாஸ்டுகள், ஸ்பெர்மடோகுதியைக் களைத் (spermatangia) திரளாகத் தாங்கி நித்திகின்றன (படம் 144). இந்த ஸ்பெர்மடோகுதியங்கள், அமைப்பில் திராட்சைக் கொத்து களைப்போலுள்ளன. டிகரகோபிளாஸ்டுள் இருகிளைகளுள் ஒன்றே ஸ்பெர்மடோகுதியைத் திரளைத் தாங்கிநிற்கிறது (படம் 144). இந்த ஒவ்வொரு ஸ்பெர்மடோகுதியத்தினின்றும் ஒரு ஸ்பெர்மோஸியம் வெளிவந்து நீரில் மிதக்கிறது.

இதுபோலவே, பெண் காயிட்டோமைட்டின் உடலத்தின் உச்சியிலுள்ள டிரைகோனியம் கார்ப்பிகோனியத்தைத்



படம் 144

பாலிகோனியம்—ஆண் காயிட்டோமைட்டின் உடலத்தின் துளியில் காணப்படும் கார்ப்பிகோனியத் திரம்




படம் 145

பெண் காயிட்டோமைட்டின் உடலத்தின் துளியில் காணப்படும் பெண் கார்ப்பிகோனிய இரவு



படம் 146

பாலிகோனியம்—கார்ப்பிகோனிய இரவுகளின் மற்றொரு தோற்றம்



படம் 147

கருவுறுதலுக்குப் பிறகு உண்டாகும் புதிய செல்களுடன் கார்ப்பிகோனிய இரவுகளின் தோற்றம்

தாங்கி நிற்றதது. இத்தக கார்ப்பிகோனியம் தாங்கு செல் காண்ட (4 celled) தனிப்பட்ட இனோசை (specialised branch)


தொகுதி: ரோபோவைட்டா

மேல் தோன்றுகிறது. வண்ணக் கணிகங்கள் அற்ற செக்களைக் கொண்ட இத்தச் சிறப்பு இழைக்கு கார்ப்பிகோனிய இழை (carpagonal filament) என்று பெயர் (படம் 145).

கார்ப்பிகோனிய இழையைத் தாங்கிவிடுக்கும் செக்கைத் தாங்கு செக் (supporting cell) என்று அழைக்கலாம். கார்ப்பிகோனிய இழையில் உள்ள நுளிக்கெல்லே கார்ப்பிகோனியமாக வளர்ச்சியடைகின்றது. இந்தக் கார்ப்பிகோனிய இழை வளைந்து அமைந்திருத்தலால், கார்ப்பிகோனியத்தின் அடிப்பாகம் தாங்கு செக்குக்குமேல் வெகு அருகில் அமைந்திருத்தலாகக் காணலாம் (படம் 145). மற்றும் இந்தத் தாங்கும் செக், சிறப்புறத்தில் ஒரு செக்கையும், பக்கத்தில் இரு செக்களையும் தோற்றுகின்றது (படம் 146). குறிப்பிட்ட முறையில் கருவுறுதல் நிகழ்ந்த பின்னர் பின்வரும் நிகழ்ச்சிகள் தடைபெறுகின்றன (படம் 147).

(1) தாங்கும் செக் தனக்கு மேல் பக்கத்தில் ஒரு புதிய நுண்கெல்லை (auxiliary cell) தோற்றுகின்றது (படம் 147).

(2) கார்ப்பிகோனியத்திலுள்ள இரட்டைமய நுக்கியால் ஆக்கியவரி செக்குக்குள் ஒரு சிறு குழாய் மூலம் பிரவேசிக்கின்றது (படம் 147).



படம் 148

பாவிசைபோனிய—இதன் கிளப்போவார்ப்பின் கிளக்கெட்டுத் தோற்றம்

(3) தாங்கு செக்குக்குக் கீழுள்ள ஊட்டச் சத்துச் செல் இரண்டாகப் பிரிகின்றது. பக்கங்களிலுள்ள ஊட்டச் சத்துச் செக்கள் பன செக்களாகப் (4—10) பெருகுகின்றன. அதிகமாக சேமிப்புப் பொருள்களைக் கொண்டிருத்தலால் இவை சத்துச் செக்கள் (nurse cells) என்று அழைக்கப்படுகின்றன.

(4) ஆக்ஸிலியரி செல்லும், தாங்கு செல்லும் மற்றும் எக்ஸ்ச்சுத் செல்களும் ஒன்றோடொன்று இணைந்து ஒரு பெரிய ஒழுங்கற்ற பிளாசென்டம் செல்லாக மாறுகின்றது (படம் 148). இத்தப் பெரிய செல்லினின்று மேல் பாகத்தில் பல கோலியோ பிளாஸ்டு இழைகள் தோன்றி (படம் 148, 149) அவற்றின் துளிகளில் கார்ப்போஸ்போரகங்கள் தோன்றுகின்றன. கருவுறுதலுக்குப் பின்பு எக்ஸ்ச்சுப் பாகுபாடும் மைட்டாஸிஸ் முறையில் நடைபெறுவதால் கார்ப்போஸ்போரகங்களில் உண்டாகும் ஸ்போர் களும் இரட்டைமயமானது.

(5) இவ்வாறு உண்டாகும் சிஸ்டோகார்ப்பைச் சுற்றி மனட்டு இழைகள் (sterile cells) வளர்ந்து பீப்பாய் போன்ற இரு அடுக்குப் பாகுபாட்டைக் கொண்ட (2 layered pericarp) தோற்றுவிக்கிறது (படம் 149). உதறலின் மேல்பாகத்தில் ஆண்டியோல் துளை உண்டாக அதன்மூலம் கார்ப்போஸ்போரகம் பின்னர் வெளிவருகின்றன. இத்தக் கார்ப்போஸ்போரகம் இரட்டைமய நூக்கியவளைக் கொண்டிருத்தலால் அவை முளைக்கும்போது டெட்ராஸ்போரோமைட் உடனத்தை (tetrasporophyte) உண்டாக்குகிறது.



படம் 149

பாஸிஸ்போனியா—முதிர்ந்த சிஸ்டோகார்ப்பின் சீரமைப்புத் தோற்றம்

கிராஸிஸ்போனியாவிற்கும் பாஸிஸ்போனியாவிற்குமுள்ள முக்கிய வேறுபாடு யாதெனிக், பாஸிஸ்போனியாவில் ஆக்ஸிலியரி செல் கருவுறுதலுக்குப் பின்னர் தோன்றுகின்றது. ஆனால், கிராஸிஸ்போனியாவில் தாங்கு செல்வே (supporting cell) ஆக்ஸிலியரி செல்லாகச் செயல்படுகின்றது.

சிவந்த பாசிலனின் பொருளாதா மூலவீர்த்துவம்

ஜப்பான் முதலிய நாடுகளில் சிவந்த பாசிலனில் சில உணவாகப் பயன்படுத்தப்படுகின்றன (உ-ம்.) பார்யைரா (Porphyra), ஜப்பானில் கடலில் மிகுதியாக இப்பாசி பனீர் செய்கப்பட்டு வருகிறது. கிரேவிலேரியா (Gracilaria), ஜெலிடியம் (Gelidium) ஆகிய பாசிலனிலிருந்து எகாரீ-எகாரீ (Agar-Agar) என்ற ஒருவித கூழ்ப்பொருள் வடித்தெடுக்கப்படுகின்றது. இத்தகைய எகாரை அளக்கும் பாசிலனை எகாரோனபட்டுகள் (Agarophytes) என்று குறிப்பிடுகிறார்கள். இந்த எகாரீ பாக்டீரியா, பூஞ்சை, பாசி முதலியவற்றைச் செய்முறையில் வளர்க்கும் சாதனமாகப் (culture medium) பயன்படுத்தப்படுகிறது. மற்றும் இந்த எகாரீ மீட்டாயம், ரொட்டி, இறைச்சி முதலியவைகளைப் பக்குவப்படுத்துவதற்கும், சில மருத்துவன்களை தயாரிப்பதற்கும் உபயோகப்படுகிறது.

கடல்வாழ் ஆங்காக்கள் (Marine Algae)

கடல்வாழ் ஆங்காக்கள் தெளிவாக மண்டல அமைப்பும் பாறைகளிடையே கடலோரங்களில் அமைந்துள்ளன. பெரும்பாலும் இவை சிடிப்பாங்கன் (holdfasts) கொண்டவை. இவற்றின் உதவியால் ஆங்காக்கள் பவத்த அலைகளின் செயலினைத் தாங்க வல்லவை. இந்த ஆங்காக்களின் இளம் கம்போர் மூளைகளுக்கும் (sporolings) இத்திறன் உண்டு. மேலும் இவற்றின் னைகோட்டுகள் பாறைகளின்மீது பிணக்கும் (attachment) செயலும் வெகு வேகமாக நடைபெறுகிறது. அவ்வீழ் செயலானது ஆங்காக்களில் மண்டலங்களை (zonation) வகிக்கின்றது. இது அவைகளின் உயரம், வேலியேற்றம், சுரத்திவலை, காற்றின் வேகம் முதலியவைகளைப் பொறுத்துள்ளது. கடல் வாழ் ஆங்காக்களில் சில இடங்களில் தீரோட்டங்கள் வேகமாக (tidal currents) இருக்கலாம். உப்பு சதுப்பு தாழ்நிலங்கள், உவர் சதுப்புநில கடற்கழிகள், ஓடும் தீரோட்டத்தின் வேகம், உன்னிப்பு அளவை நிர்ணயிக்கின்றதாலும், அதைத் துணைக்கொண்டு ஒரு கடற் கழியின் காணப்படும் ஆங்காக்கள் குழுமத்தின் (algal community) வளர்ச்சியின் அளவைக் கண்டறிவலாம். செய்களில் உப்புத் தன்மையைப் பொறுத்து நீர்க்காப்பு அமைந்துள்ளது. சுரப் பசையைமும் இது பொறுத்துள்ளது. கடல்வாழ் ஆங்காக்கள் அவைகள் வாழும் மண்டலங்களைத் தவிர மற்ற இடங்களில் காண்பதரிது. அவை எளிதில் உலர்த்தும் விடுகின்றன. ஒரு நாளைளில் செய்கப்படுகின்ற வெப்பநிலை மாற்றங்கள் ஆங்காக்களின் வளர்ச்சிதை மாற்ற

வளர்த்து அனை உயர் தாவரங்களுக்கு மூன்றோடிகளாகவும் வழி காட்டிகளாகவும் உள்ளன. புத்தரைகள், உப்பங்கழிகள் முதலிய இடங்களில் இவை அதிக அளவு காணப்படுகின்றன. சரமன் இவைகளின் வளர்ச்சிக்கு மிக சாதகமாக உள்ளது. டயாட்டம் கள் மண்ணில் பரப்பேட்டுகளும், கைட்ரேட்டுகளும் அதிக அளவிலிருப்பின் வளருகின்றன. செயற்கை எரு நிலவாழ் ஆக்காக்களை எளிதில் வளரச் செய்கின்றன. இவைகளின் வளர்ச்சி மண்ணின் தன்மையையும், ஆழத்தையும் பொறுத் துள்ளது. கைட்ரஜனை நிரைநாட்டும் ஆக்காக்களான நாட்டாகி, சிலிண்ட்ரோஸ்பெர்மம் முதலிய பசுநீர் ஆக்காக்கள் நிலத்தின் கைட்ரஜன் சத்தை அதிகப்படுத்துகிறது.

தண்ணீர் ஆயுதங்கள் (Fresh water Algae)

இவை குளம், குட்டை, ஏரி, நீர்வீழ்ச்சிகளில் காணப்படு கின்றன (உ-ம்.) ரோடோஸ்பட்டாவைச் சார்ந்த லிமனியே (Lemanea), காம்போனோபோகான் (compsopegan), பேட்ரகான் பெர்மம் (batrachospermum), முதலிய ஆக்காக்களும் குளோரோ ஸ்பட்டாவைச் சார்ந்த கிளாடோபோரா (chlorodophora), என்டிசோமார்பா (euteromorpha), கைட்ரோடிக்டியான் (hydra dictyon), மடகோனியம் (oedogonium), கிளையோஸ்கிரா (spirogyra), றைசோகிளோனியம் (rhizoglonium) முதலிய ஆக்காக்களும், பேசுமீவெரியோஸ்பட்டா, ஸாந்தோஸ்பட்டா, ஸையோஸ்பட்டா முதலிய வகுப்பைச் சார்ந்த ஆக்காக்களும் இதற்கு உதாரணமாகும். இவைகளின் வளர்ச்சி நீரின் தன்மை யையும், உவரும் காலத்தையும், நிலத்தின் மட்டத்தையும் பொறுத்துள்ளது. வெப்பப் பாய்வுகளில் (hot springs) ஸையோ ஸ்பட்டா அதிகமாகக் காணப்படுகிறது. இவைகளின் செல் கவர், கண்ணாம்பு, சிலிகா முதலியவைகளை சுரக்கும் தன்மையைப் பெற்றவை. மேல்யுகோளோடம் மேஸிஜோஸஸ் (mastigocladus laminosus) என்ற ஆக்கா காற்றிழுவன் கைட்ரஜனை நிரை நிறுத்தும் (nitrogen fixation) தன்மை பெற்றது. மலேவிலிருந்து பாயும் ஓடைகள் தரை மட்டத்தில் தடுகளாக ஓடும் பொழுது அவைகளில் ஆக்கா மண்டலங்களைத் தோற்றுவிக்கின்றன. வசந்த காலங்களில் டயாட்டம்களும், பூலோத்திரீக்னும் கோடை காலங்களில் குளோரோஸ்பாஸி, டெய்மிடுகளும் காணப் படுகின்றன. நீரின் தட்பவெப்ப நிலை, வேதியியல் தன்மை, ஆக்காக்களின் வளர்ச்சியைப் பாதிக்கின்றது. நீரில் கால்சியம் மத்திருத்தால் அதிக அளவு ஸையோஸ்பட்டாவும், ஒலியின் தீவிரம் பிராணவாயுவின் ஆடர்த்தி ஏற்பட்ட பொழுது அதிகமாக குளோரோஸ்பட்டாவும் வாழ்கின்றன.

ஆய்வகங்களில் பொருளாதாரச் சிறப்புகள்

தண்ணீர்வாழ் ஆய்காக்களும், கடந்தீர்வாழ் ஆய்காக்களும் பவனககளில் பயன்படுகின்றன.

1. உணவு—குளோரெல்லா (Chlorella)

சமீபகாலத்தில் இது மிகவும் இன்றியமையாத ஆய்காவாக பயன்பட்டு வருகிறது. இது 40% புரதமும், மந்தும் கொழுப்பு, வைட்டமின்கள் முதலியவை இருப்பதால் இதை உணவாக உபயோகிக்கிறார்கள். அமெரிக்கா, ஜப்பான், தாய்லாந்து, நேதர்லாண்ட் இன்றோம் முதலிய நாடுகளில் இது பயன்படுத்தப் படுகிறது. இதை எளிதில் எலிபழையத்தில் அதிக அளவிற்கு தோற்றுவிக்க முடிவதால் இதை விண்வெளிக் கப்பல்களில் உணவுக்காக வளர்த்து உபயோகப்படுத்தலாம்.

பாஃபையா (porphyra) என்னும் செத்திற ஆய்கா ஜப்பான் நாட்டில் ஸூப் (soup) செய்ய உபயோகப்படுத்தப்படுகிறது. இதற்கென்றே தொழிற்சாலைகள் நிறுவப்பட்டுள்ளது. நதியின் உற்பத்திக்குத் தானங்களிலும், ஆழமற்ற விரிசுடாக்களிலும், லாங்கில் சுழிவோப் புதைத்து பாஃபையா டெனரா (p. tenera) என்ற சிற்றினத்தைப் பயிரிட்டு வருகின்றனர். மேலும் ஜப்பான் நாட்டில் வேயிசெனரியா, ஏலேரியா (alaria) முதலிய பாசிகளிலிருந்து கொம்பு (kombu) என்ற உணவு தயாரிக்கப்படுகிறது. ஆக்ஜின் (algin) என்ற பொருள் பழுப்பு ஆய்காக்களிலிருந்து (brown algae) காங்கியம் ஆக்ஜினேட் நிலையில் பிரித்தெடுக்கப் படுகின்றது. ஆகவே மெக்ரோசைட்டஸ் (macrocytids), நிரோசெட்டஸ் (nereocytids), லேமினேரியா (laminaria) முதலிய ஆய்காக்களிலிருந்து ஆக்ஜினிக் அமினோ உப்பு எடுக்கப்பட்டு வருகின்றது.

ஆக்ஜினேட்டுகள் : கடற்பாசிகளிலிருந்து கிடைக்கும் உப்பு களுக்கு ஆக்ஜினேட்டுகள் என்று பெயர். இது குருதியை கெட்டிப்படுத்தும். இதை சோடியம் ஆக்ஜினேட் என்ற வேதிப்பொருளாக பிரித்தெடுப்பார்கள். இது ரப்பர் தொழிற்சாலைகளில் நிலைப்படுத்தும் கருவியாக (stabilizing agent) உபயோகப்பட்டு வருகின்றது. மேலும் மருத்துவக் தயாரிப்பதற்கும் இது பயன்பட்டு வருகின்றது. இது டி. மானுரோனிக் அமினத்தின் பாலிமர்களாகும் (polymers of D-mannuronic acid). இவை கணுக்காக இரு ஆராய்ச்சி நிலையங்கள் நிறுவப்பட்டுள்ளன.

1. கடற்பாசி ஆராய்ச்சி நிலையம் (Sea weed research station).

2. உப்பு ஆராய்ச்சி நிலையம், பாந்தகர், குஜராத் (Salt Research Centre, Baw Nagar, Gujarat.)

குளிர்ந்த பானங்கள், ஐக்கிரீம், சர்பத்துகள் செய்வதற்கும் அவைகளை நிலைப்படுத்தும் பொருளாகவும் உபயோகிக்கிறார்கள். கற்கண்டு, இனிப்பழது முதலியவைகளைத் தயாரிப்பதற்கும் இது உபயோகமாகின்றது.

அகார்-அகார் (Agar-Agar) : சிவப்பு ஆங்காக்களாகிய கிராஸி ஸேலா (Gracilaria), ஜெலீடியம் (Gelidium), ஹிப்ஸிா (hypnea) முதலிய கடத்தீர் ஆங்காக்களிலிருந்து இது பெறப்படுகின்றது. பூஞ்சைகளையும், பாக்கிரீயங்களையும் வளர்ப்பதற்கு இந்த அகார் ஆராய்ச்சி கடக்களில் மிகுதியாக பயன்படுத்தப்படுகிறது. பல் கடற்பாசிகளின் பேரினங்களும், சிற்றினங்களும் அகார் செய்வதற்கு உபயோகமாகாவதால் அவைகளை அகரோமைட்டுகள் (agarophytes) என அழைக்கின்றனர். மேலும் இக் கடற்பாசிகளிலிருந்து ஒரு பசுசுவை எடுக்கிறார்கள். இதற்கு 'ஜெல்மோஸ்' (gelose) என்று பெயர். அகாரானது காகிதத் தொழிற்சாலைகளில் காகிதத்திற்கு பளபளப்பு அளிப்பதற்கும், வயிற்றுக் கழிவு மருந்துகளிலும், அழகு சாதனப் பொருள்களிலும் (cosmetics), ஐக்கிரீம், சர்பத் போன்றவற்றைக் கெட்டியுப் படுத்துவதற்கும், தோலை சுண்ணமாக்குவதற்கும் உபயோகமாகிறது.

காரஜின் என்ற அகார் பொருளை பற்பசை (toothpaste) செய்வதற்கும், தோல் பதனிடும் தொழிற்சாலைகளிலும், சாராயப் பொருள்கள், பீர், சர்க்கரை முதலிய தொழிற்சாலைகளில் கத்தம் செய்யும் பொருளாகவும் உபயோகிக்கின்றனர். கிப்புகன் (fucus), ஆஸ்கோபியல்ம் (ascophyllum), லேமினேரியா (lamnaria) முதலிய பாசிகள் காக்தடை தீவனமாகவும், உரமாகவும் பயன்படுகின்றன.

அண்டேரியா பின்னேட்டிரிகாவிக் (undaria pinnatifida) இருத்து வகை (wakane) என்ற உணவும், வெல்னீயா எபசைலீனிலிருந்து (eckena bicyclis), அரமா (aranea) என்ற உணவும், பசுமை கோடியம் (codium) வகைகளிலிருந்து மீரு (miru) என்ற உணவும் தயாரித்து வருகின்றனர். உண்ணப்பட்டு வரும் கடற்பாசிகளை ஹவாய் தாட்டில் 'நீரு' என அழைக்கின்றனர். சினுலிக் நாக்டாக் (nastoc) என்ற ஆங்காளிலும், ஜப்பானில் பாஸ்பரா என்ற ஆங்காளிலும் கார்போஹைடிரேட்டுகளும், அயோடிலும் அதிகமாகத் காணப்படுகிறது. கடற்பாசிகளில் கலட்டியின் B₁₂ அதிகமாக உள்ளது. இது நோயாளிகளுக்கு

உணவாகிறது. மீன், ஆர்பி சாப்பிடும் மீன்கள் தோய்வாய்ப் பட்டால் உணவிற்கு சர்க்கரை தன்மை அளிக்க உபயோகமாகிறது (roughage in food). காய்டர் (gull) தோய்வானது கடித்திடுகின்ற தைராய்டு சுரப்பியின் வீக்கத்தால் உண்டாகிறது. இது அயோடின் குறைவால் உண்டாகிறது. ஆனால் இவைகளை உட்கொள்ளு மிடங்களில் இத்தோய் வருவது கிடையாது.

கடற்பாசி : கடற்பாசி தாட்டில் கிளோபெல்டிஸ் பிளிகேட்டா (Gloeopectis furcata) என்ற பாசியிலிருந்து பிப்பிளோனா (pinnori) என்ற கொத்தை தயாரிக்கிறார்கள். ஆயிரக்கணக்கான கெத்தியில் கரைவதைத் தடுக்கிறதும் கிடைக்கும் பொருளை இந்தக் கொத்தாகிறது. இதை பிப்பிளோ கொணாங்குகள் (phyllor collorids) என்றழைக்கின்றனர்.

வடிசாறு : கடற்பாசிகளின் செக்கவலிலிருந்து எடுக்கப் படும் வடிசாறுகளை கொணங்குகளாகும். இவை அகர் அகராய்டுகள் ஆகியனெட்டுகள் என்ற கொணங்குகள். செக்கின் உட்பொருளிலிருந்து எடுக்கப்படும் பொருள்கள் லேமினேயின், மானிடால் (manitol) முதலியவைகளாகும்.

அயோடின் : கடற்பாசிகளிலிருந்து அயோடின் பெறப் படுகிறது. பிப்பிளா (pinnus), அக்சோபிலம் (axorophyllum), லேமினேயா (laminaria) முதலிய ஆயிரக்கணக்கிலிருந்து இது கிடைக்கிறது.

டயாட்டம்களின் (Diatoms) மண்கள் : இவை மிக நுண்ணிய ஒற்றை செல் கொண்ட ஆயிரக்கணக்கான இவைகளின் செல் சுவர்களில் கண்ணப் பொருள்கள் உள்ளன. டயாட்டம்களை கொண்டு நீரை சுத்தம் செய்து பிராண வாழ்வை வெளியேற்றுவதற்கும் கடற் பிராணிகளுக்கு உணவாகவும் உபயோகப்படுகிறது. டயாட்டம் மண் (diatomaceous earth) என்கிற திற மூடையவை. இம்மண் கொடிக்கணக்கான டயாட்டம் செல்கள் இறந்தபின் கடல்களில் படிக்கின்றன அமைத்து இம்மண்ணாகிறது. பூமியில் மரத்தடிகளால் இம்மண்ணாகிறது தரைமட்டத்திற்கு உடனடித்தலிலிருந்து கொண்டு வரப்படுகிறது. இவைகளிலிருந்து பெட்ரோலியம் தோன்றியிருக்கலாமென்றும் எழுதப்பட்டு வருகிறது. டிரிப்போலி என்ற இடத்தில் டயாட்டம் மண்ணைக் கொண்டு டிரிப்போலி பொடி (tripoli powder) செய்கிறார்கள். இவைகளை கனிமப் பொருள் பசுக்களோடு கலந்து சோம்பு கழுடனும், மரம், உயிரகம், ஒரு முதலியவைகளை பண்பண்பு செய்வதற்கும், மேலும் நீர் வெளியேற்றும் குழாய்கள், எலும்பு,

பதக்கலிங்கன், வெள்ளை சயம், கவர் சித்ப பூச்சு, அரைச் சாந்து, கிபோர்சலின் மென்செடுகள், செவ்வக கற்கள், பற் பொருள்கள், பற்பவை, நில உரம் முதலியவை செய்வதற்கும் பயன்பட்டு வருகின்றது. கெங்கர் (kankar) அகத்த டயாட்டோமைட் (dyatomite), டைனமைட் (dynomite) என்ற வேடி பொருள்களை எடுத்துச் செத்தும்பொழுது வேடிக்காமலிருக்க உபயோகிக்கின்றனர். கெங்க தொழிற்சாலைகளில் அவைகளின் தாதுத ஆறியவும், பண்பண்பான கர்ணக்கன் செய்வதற்கும், பிளாங்க்டிக் தொழிற்சாலைகளும் இது உபயோகமாகிறது. மேலும் முத்திரையீறும் மேலுருகன், இரப்பர் துடைப்பாக்கன், பன கொழுப்பு வகைகள், அமிலப் பொருள்கள் தயாரிப்பதில் நீர்க்கும் பொருளாகவும் உபயோகப்படுகிறது. வேதி உரங்கள் செய்முறையில் இதை சர்க்கும் பொருளாக உபயோகிக்கிறார்கள். இதை நீர், எண்ணெய், இனிப்பொழுது (syrup), நீர்ம அமிலங்கள், ஊர்சுகள் (acids) முதலியவைகளுக்கு வடிக்கும் (distillation of liquids) சாதனமாக உபயோகப்படுத்துகிறார்கள். இதை வெப்பத்தைத் தடுக்கவல்ல கருவிவாகவும் மின்சாரம் பாயாமல் தடுக்கும் கருவிவாகவும் (insulator) உபயோகிக்கிறார்கள். அடுப்புடன் கட்டுவதற்கு கண்ணாடும், ஒளி துறைவதை தடுக்க தடுப்புக்களாகவும், உரைவாகவும் கூட இது உபயோகமாகிறது. மின்சாரக் கருவிகளைப் பொருத்தும் உறைவாகவும், குளிரகாப்புப் பெட்டிகள் (Refrigerator), இயந்திர வேதி கலக்கன், நீராவிக்குழாய்கள் முதலியவைகளில் அடைப்புப் பொருளாக உபயோகமாகிறது. ப்ளூரோஸ்கிங்ஸ் (pleurosingness), நேவிகுலா (navicula) மேற்கூறிய பயன்களுக்கு டயாட்டம்சலின் பண்புகளான சரிப்புத்தன்மை, ஆக்கலிசலிங்கனையும் தன்மை, குறைந்த வீத எடைமான் (low specific gravity), தேய்தல் தன்மை (abrasion), ஊடுகடத்தும் ஆற்றல் இல்லாத தன்மை (non-conductivity), சாதாரண தட்பவெப்ப நிலையிலும் உருக்க முடியாத தன்மை ஆகியவைகளில் உபயோகமாகின்றன. டயாட்டம் மண்ணில் காற்று இடைவெளிகள் அதிகமாக இருப்பதால் இவை நீர்மங்களை சர்ப்பதற்கு எளிதாகிறது.

கெனிடென்கன் (Scenedesmus), குளோரெல்லா (Chlorella) : இவைகள் கிடைப்போபிளாக்டாக்கன் என்றதழக்கப்படுகிறது. வின்வெலிப் பயணங்களில் பிராணவாயு அளிப்பதற்கு கலக்கலில் இவைகளைப் பயிற்சிட்டு வருகின்றனர். வின்வெலிச் சுப்புகளிலும் பெரிதளவில் உபயோகிக்கின்றனர். அமெரிக்காவில் கழிவுநீரை சுத்தம் செய்வ குளோரெல்லாவையும் கெனிடென் மணையும் பயிற்சிட்டு வருகின்றனர். இக் குளங்களுக்கு ஆக்ஸிஜனைக் குளங்கள் (oxygenating ponds) என்று பெயர்.

சமீபத்தில் நெல்வயல்களில், நெல்லின் ஊட்டத்தை அதிகப் படுத்துவதற்கு பல நீலப் பசுப்பாசிகளை வயல்களில் வளர்த்து வருகின்றார்கள். இவைகளிலுள்ள நெறப்பேராகிண்டு (heterocyst) எதிர்த்துள்ள நிலப்படுத்துதிமணலின் வளத்தை அதிகரித்து இதன் வழியாக நெற்பயிர்களில் அதிக அளவு விளைச்சல் ஏற்படுவதாக கண்டுபிடித்துள்ளார்கள்.

10. பூஞ்சைகள்

(Fungic)

பச்சையம் (chlorophyll) அறவே அற்ற சிற்றிலித் தாவர இனங்களே பூஞ்சைகள் என அழைக்கப்படுகின்றன. ஆகவே, அவை கார்போஹைட்ரேட் உணவைத் தாமதமே தயாரிக்கும் திறனற்ற மற்ற உயிரினங்களையாவது அல்லது உயிரற்ற அக்கப் பொருள்களையாவது சார்ந்திருக்கின்றன. (பர ணட்டம்—hetero-trophic nutrition) இத்தப் பூஞ்சைகள் யாவும் தாவரத் தின் ஒரு பெருத் தொகுதியான மைகோபூனியினம் (Division : Mycotina) அடங்கும். மோக்ஞ (Mold), மின்படி (Mildew), ரண்ட் (Rust), கிமட்க் (Smuts), காண்ட்கள் (Mushrooms) என்று பூஞ்சை வகைகள் பலவிதமாக அழைக்கப்படுகின்றன. பூஞ்சை களைப் பற்றி விளக்கும் நூலுக்குப் 'பூஞ்சை இயல்' அல்லது 'மைகாலஜி' (Mycology) என்று பெயர்.

உயிருள்ள தாவரங்களையும் பிராணிகளையும் தாக்கும் பூஞ்சை கள் ஒட்டுண்ணிகள் (parasites) எனப்படுகின்றன. மற்ற உயிரற்ற அனுகும் அக்கப் பொருளினமேல் சார்ந்திருக்கும் பூஞ்சைகளைச் சாறுண்ணிகள் (saprophytes) எனலாம். ஒட்டுண்ணிகள் உயிரினம் கட்டுப் பலவித நோய்களை உண்டாக்குகின்றன. சாறுண்ணிகள் அக்கப் பொருள்களின் கிடைவுக்கு காரணமாகின்றன. ஆனும், இவ்விரு வகைகளுக்கும் இடைப்பட்ட தன்மைமைக் கொண்ட பூஞ்சைகளும் பல உள்ளன.

சில பூஞ்சைகள் ஒட்டுண்ணிகளாகவோ, சாறுண்ணிகளாக வோ மாத்திரம் வளரக்கூடியன. அதாவது அவை தம் ஊட்ட மூலையை மாற்றிக் கொள்ளும் சக்தியற்றவை. இவைகள் நிலை மாறு வகைகள் (obligate forms) என்று குறிப்பிடப்படுகின்றன. (உ-ம்.) பக்ஸீலியா (Puccinia). வேறோர் ஊட்ட நிலைக்கு மாற்றிக் கொள்ளவல்ல பூஞ்சைகளுக்கு 'நிலைமாறும் வகைகள்' (facultative forms) என்று பெயர். ஒட்டுண்ணியாக இருக்கும் ஒலினம், ஆதாரத் தாவரம் (host plant) இரத்த மேரு, அதன் மேல் சாறுண்ணியாக உயிர் வாழலாம் (உ-ம்.) ஃபூசேரியம் (Fusarium).

உடல் அமைப்பு (Thallus structure)

ஒரு சில பூஞ்சைகளில் உடலம் பல நுட்களியங்கள் (nuclei) கொண்ட உறைவற்ற புரோட்டோபிளாஸ்டாக (naked protoplast) காணப்படும் (உ-ம்.) ப்ளாசுமோடியோபோரா (Plasmodiophora) (படம் 162 எ). சிங்கைட்டியம் (Synchytrium) (படம் 161 இ), ஸ்ட்ரீ (Vesal) (படம் 166) போன்ற பூஞ்சைகளில் உடலம் ஒரு செல்லினால் ஆனது. ஆனால், பெரும்பாலான பூஞ்சைகளில் உடலம் செல்லிய நிறமற்ற, பன்முகை கிளைத்த, குழல் போன்ற உறைவுள்ள இழைகளால் ஆக்கப்பட்டுள்ளது. இந்தப் பூஞ்சை இழை ஒவ்வொன்றிற்கும் 'தையா' (hypha) என்று பெயர்.

பன் தையாக்கள் சேர்த்த ஓர் அமைப்பிற்கு மைசீலியம் (mycelium) என்று பெயர். சிவ்வகைப் பூஞ்சைகளில் தையாக்கள் குறுக்குச் சுவரற்று (aseptate) மிகுதியாகக் கிளைத்து, குழல் போன்று பல நுட்களியங்கள் கொண்டு அமைந்துள்ளன (உ-ம்.) ஸைக்கோமமீடிக்ஸ் (Phycomycetes). மற்றப் பூஞ்சைகளில் தையாக்கள் குறுக்குச் சுவர்கள் கொண்டிருத்தலால் பல செல் பகுப்புகளாகக் (septate) காணப்படுகின்றன. ஆனால், இவ் வகை களில் குறுக்குச் சுவர் ஒவ்வொன்றிலும் மத்தியில் ஒரு நுண் துவாரம் (perforation) காணப்படும். இந்தத் துவாரத்தின் மூலமாக ஒவ்வொரு செல்லின் புரோட்டோபிளாஸ்டும், அடுத்த செல்லின் புரோட்டோபிளாஸ்டுடன் தொடர்பு கொண்டுள்ளன (உ-ம்.) ஆக்ஸோமமீடிக்ஸ் (Ascomycetes), பேஸிடியோமமீடிக்ஸ் (Basidiomycetes).

பூஞ்சைகளின் செல்-உறைவின் (cell-wall) நுண் அமைப்பும் (physical structure), வேதித் தன்மையும் (chemical nature) நவீன மூலங்களால் ஆராயப்பட்டு வருகின்றன. பூஞ்சைகளில் செல் உறைகள் தாச் போன்ற (fibrous structure) தன்மையையும், ஓர் அடுக்குக்கு மேற்பட்ட (more than one layer) அமைப்பும் கொண்டுள்ளதாக அறிவிக்கப்பட்டுள்ளன. சில பூஞ்சைகளில் உறைகள் முற்றிலும் செல்லுமோலாகும், சிலவற்றின் உறைகள் முற்றிலும் கைடின் (chitin) எனப்படும் பொருளாலும் ஆனதாகக் கருதப்பட்டு வந்தது. ஆயினும் தற்போதைய ஆராய்ச்சியினால் பூஞ்சைகளின் செல் உறை செல்லுமோல், கைடின் (chitin) ஆகிய இரண்டு பொருள்களாலுமே ஆக்கப்பட்டவை என்று கண்டு பிடிக்கப்பட்டுள்ளது. அவற்றின் விசித்தர்தான் வேறுபடுகிற தென்றும், அவை இரண்டினால் அதிக சதவிகிதத்தில் உள்ள பொருள் மந்தைய பொருளை மறைத்து விடுகிறதென்றும் கருதப்

படுகிறது. மற்றும் இந்த செல்-உறை ஒரு கர்ப்புப் போர்வைவாக மட்டுமீன்றிப் பல ஞாந்நியல் பணிகளிலும் (physiological functions) ஈடுபட்டுள்ளது.

செல்லின் புரோட்டோபிளாஸ்டு வாக்ஞயோல் (vacuole) கொண்டுள்ளதால், ஸைட்டோபிளாஸம், செல் உறைக்கு உட்புறத்தில் ஒரு மெல்லிய படிமவாக அமைந்துள்ளது (lining layer).

சில பேரினங்களின் ஞாந்பாக்களில், இந்த ஸைட்டோபிளாஸம், சுதந்ரி இவங்கும் (streaming) தன்மை பெற்றுள்ளது. குறுக்குச் சுவரற்ற (unseptate) ஞாந்பாக்களில் பல நூக்லியஸ்கள் ஸைட்டோபிளாஸத்தில் அமைத்து சிஞ்ஞெவைபுக் (coenocytic) தன்மையை அளிக்கிறது (உ-ம். ஸப்கோமைஸீட்ஸ்). ஆனால், குறுக்குச் சுவர் கொண்ட ஞாந்பாக்களில் (septate hypha) ஒல்வொரு செல்லிலும் ஒன்று, இரண்டு அல்லது பல நூக்லியஸ்கள் (uninucleate, bi-nucleate or multi nucleate) காணப்படும். (உ-ம்.) ஆஸ்கோமைஸீட்ஸ் (Ascomycetes), பேஸிடியோமைஸீட்ஸ் (Basidiomycetes).

பூஞ்சையின் நூக்லியஸ், நூக்லியஸ் ஐவ்வு (membrane), நூக்லியோமைஸ் (nucleolus) முதலியவற்றைப் பெற்று மற்றத் தாவரங்களின் நூக்லியஸைப்போலவே காணப்படுகிறது. செல்லில் சேமிப்புப் பொருள்கள், எண்ணெய் அல்லது கிளைகோஜன் (glycogen) என்னும் ஒருவிதத் தரசப் பொருள் வடிவத்தில் காணப்படுகின்றன. ஆதாரத் தாவரத்தின் (host) வெளிப்புறத்தில் மட்டுமே பரவியுள்ள ஞாந்பாக்களைக் கொண்டவை புற ஒட்டுண்ணிகள் (ectoparasite) என்றும், அவற்றின் உடல் திசுக்களினுள்ளே பரவியுள்ளவை அக ஒட்டுண்ணிகள் (endoparasite) என்றும் குறிப்பிடலாம்.

புற ஒட்டுண்ணிகள் ஞாந்பாக்களிலிருந்து சிறு கிளைகள் ஆதாரத் தாவரத்தின் புறத்தோல்செல்களுக்குள் (epidermal cell) ஊடுருவிச் சென்று உணவை உறிஞ்சுகின்றன.

இந்தக் கிளைகள் உறிஞ்சுறுப்புடன் (haustoria) என்று குறிப்பிடப்படுகின்றன. அக ஒட்டுண்ணிகளின் ஞாந்பாக்கள் ஆதாரத் தாவரத்தின் செல் இடைவெளிகளினாவது (inter-cellular) அல்லது செல்களுக்குள்ளேயாவது (intra-cellular) அமைந்துள்ளன. முதலில் உறப்பட்ட வகைகளில் (inter-cellular) ஆங்காங்கே ஞாந்பாக்களிலிருந்து உறிஞ்சுறுப்புடன் வளர்ந்து ஆதாரத் தாவரத்தின் செல்லுக்குள் புகுத்து உணவை உறிஞ்சுகின்றன.

இரண்டாவது கூறப்பட்ட வகைகளில் ஹாஸ்டோரியங்கள் உண்டாவதில்லை. ஏனெனில், ஆதாரச் செல்லுக்குள்ளேயே ஹைபாக்கள் இருப்பதால், ஊடுருவல் (diffusion) மூலம் நேராகவே உணவை கிரமிக்க இயலுகின்றது. ஹைபாக்களோ, ஹாஸ்டோரியங்களோ ஆதாரச் செல்லை ஊடுருவிச் செல்லும் பொழுது செல்லுலோஸ் (cellulose) என்ற தொதியின் (enzyme) உதவியைக் கொண்டு ஆதாரச் செல்லின் உறையைக் கரையச் செய்து உட்புகின்றது. சில சமயங்களில் அந்த ஹைபாக்களில் சவ்வுடு பரவும் அழுத்தம் சுமார் ஏழு வாயு மண்டல அழுக்கம் (atmospheres) வரை உள்ளது என்று ஆராய்ச்சிகளின் மூலம் தெரியவருகின்றது.

ஒட்டுண்ணிகள் இய்விதமாகத் தாக்குவதன் காரணமாக ஆதாரத் தாவரங்கள் நோய்வாய்ப்படுகின்றன. சிலவித நோய்களில் விரிய ஒட்டுண்ணிகள் (hyper-parasite) தாக்குதலின் வேகத்தைத் தாங்க இயலாமல் ஆதாரத் தாவரங்கள் இறந்து விடுகின்றன. ஆகவே, பெரும்பாலான நோய்களில் ஆதாரத் தாவரங்கள் பல மாறுதல்களை அடைகின்றன. இந்த மாறுதல்களை நோய்களின் அறிகுறிகள் (symptoms) எனக் கருதப்படுகின்றன. ஆகவே, நோயின் அறிகுறிகளிலிருந்து ஒட்டுண்ணிகளின் வகையைச் சார்ந்தது என்றும், எந்தப் பூஞ்சைக் குடும்பத்தைச் சேர்ந்தது என்றும் ஒருவாறு அறிய இயலுகின்றது.

இந்த நோய் அறிகுறிகளில் முக்கியமான சிலவற்றை இப்போது கவனிப்போம்.

பொதுவாகக் காணப்படும் அறிகுறி இலைகளின்மேல் உண்டாகும் பழுப்பு வண்ணப் புள்ளிகளாகும் (leafspots). (உ-ம்.) வெள்ளை ரஸ்ட் நோய்.

ஒட்டுண்ணிகளால் கொல்லப்பட்ட திசுக்களே இய்விதப் பழுப்பு வண்ணத்துடன் காணப்படுகின்றன. திசுக்களைக் கொல்லும் திசுநீர்சி 'நெக்ராலிஸ்' என்றும், (necrosis) கொல்லப்பட்ட திசுக்கள் 'லீஷன்' (lesion) என்றும் குறிப்பிடப்படுகின்றன.

இரண்டாவது, 'அழுகல்' (rot) அறிகுறியாகும். இவை 'தண்டு அழுகல்' (stem rot), 'வேர் அழுகல்' (root rot), 'மொட்டு அழுகல்' (bud rot), 'தண்டடி அழுகல்' (foot rot), 'நாற்றுக்ள் பட்டுப் போதல்' அல்லது நனைந்து நசித்தல் (damping-off) என்று பலவகைப்படும்.

சில சமயங்களில் நிலத்திலிருந்து கிரமித்த நீர் இலைகளுக்குச் செலுத்தப்படுதலும் பாதிக்கப்படலாம். இதன் விளைவாக சில வகை நோய்களில் ஆதாரத் தாவரத்தின் நிரந்தர வாடுதல்(wilt) ஓர் அறிகுறியாகக் கருதப்படுகிறது. ஆதாரத் தாவரத்தின் குறுகிய வளர்ச்சியும் (dwarfing) மலட்டுத் தன்மைபும் (sterility) சில நோய்களில் அறிகுறிகளாகும். சிலவகை நோய்களில், இதற்கு நேர் எதிராக ஆதாரத் தாவரங்கள் மிகைபட வளர்த்தும், பெரிய 'கால்' (gall) அல்லது உப்பிய முடிச்சுகளைத் (tumors) கொண்டும் காணப்படுகின்றன.

ஒட்டுண்ணிகளின் தாக்குதலால் அத்த உறுப்பில் உள்ள திசுக்கள் பெரிதாக வளர்ந்தோ (hypertrophy) அல்லது வேகமாக அடுத்தடுத்தும் பாகுபாடடைந்தோ (hyperplasia), 'கால்' (gall) அல்லது முடிச்சாக (tumor) புறத்தே காணப்படும். மற்றும் சில நோய்களில் அறிகுறி, இலைகளெல்லாம் மிகவும் குறைத்து குறுகி இலைக்கோணத்திலுள்ள எய்வா மொட்டுகளும் வளர ஆரம்பித்து அவையாவும் துடைப்பத்தைப் போல் காணப்படுவதும் (witch's broom), தாக்கப்பட்ட இடத்திலிருந்து பிசின் கசிதலும் (gummosis) ஆகும்.

இனப்பெருக்கம் : பாலின இனப்பெருக்கம், பாலினப் பெருக்கம், உடலப் பெருக்கம் என மூவகைப்படும்.

உடல இனப்பெருக்கம்

ஒரு செல் பூஞ்சைகள் சிலவற்றில் செல் பிரிவினையாலும் சிலவற்றில் எதிர்பாக்கள் துண்டித்தலாலும் இது நடைபெறுகிறது.

பாலின இனப்பெருக்கம்

பெரும்பாலான பூஞ்சைகளில் ஸ்போர்கள் (spores) மூலம் பாலின இனப்பெருக்கம் நடைபெறுகிறது. இத்த ஸ்போர்கள் பல வகைப்படும்.

(1) நீர்வாழ் பூஞ்சைகளில் காணப்படும் ஸ்போர்கள் ஒன்று அல்லது இரண்டு கணையிழைகள் கொண்டு ஜூஸ்போரகத்தினால் (zoosporangium) தோற்றுவிக்கப்படுகின்றன. (உ-ம்) கரிசுனைட்டியம் (Synchytrium), சேப்ரோலெக்னியா (Saprolegnia). (2) நிலம் வாழ் அல்லது தாவரங்களில் மேல் வாரும் பூஞ்சைகளில், கணையிழை வற்ற (non-flagellate) காற்றினால் பரவும் (wind-disseminated), இசைவான (light), உலர்ந்த (dry), நுண்ணிய ஸ்போர்கள்

மித்ரதிராகத் தொற்றுவிக்கப்படுகின்றன. இவை ஸ்போரசத்தி னுள்ளாவது (sporangium) அல்லது ஹைபாக்கிளியில் துளி யிலாவது உண்டாகின்றன. முக்கூறுப்பட்ட வகை ஸ்போரச ஸ்போர் (sporangiospore) என்றும், இரண்டாவது கூறுப்பட்ட வகை கோனீடியா (conidia) அல்லது கோனீடியோஸ்போர் (conidiospore) என்றும் அழைக்கப்படும். இவை ஹைபாக்கிளி களின் துளியில் ஒன்றன் பிற் ஒன்றாக சங்கிலி போல் (chains) உற்பத்தியாகி முழுவுணர்ச்சி அடைந்தவுடன் தனித்தனியே பிரிந்து காற்றினால் பரவுகின்றன. சில சமயங்களில் ஹைபாக்களில் உள்ள சில செல்கள், ஒரு புதிய தடித்த உறையை உருவாக்கிக் கொண்டு விளாமிடோஸ்போர் என்ற ஒலிவு நிலை ஸ்போர் (resting spore) ஆக மாறுதல் அடைகின்றன. மேல் கூறப்பட்ட ஸ்போர்கள் அணுகுமையான சூழ்நிலையை அடைவும் போது மூளித்துப் புதிய மைனீஸியங்களை உண்டாக்குகின்றன.

பாஸிஸப் பெருக்கம்

பூஞ்சைகள் சிலவற்றில் [(உ-ம்.) ஸைக்னோமைட்டைஸ்—Phycomycetes, ஆஸ்கோமைட்டைஸ்—Ascomycetes]] பாஸிஸப்பெருக்கம், இணைப்பு (conjugation) மூலமாகவோ, ஐசோகாமியி (isogamy) அநீசோகாமியி (anisogamy) அல்லது ஹகாமியி (ogamy) மூலமாகவோ தடைபெறுகின்றது. பரிணாமத்தின் உச்சநிலையில் உள்ளதாகக் கருதப்படும் சில பூஞ்சைகளில் (உ-ம். பேசிடியோமைட்டைஸ்—Basidiomycetes) பாஸிஸங்கள் வேற்றுமை புறத்தே காணப் படாமல் பாஸிஸ உறுப்புக்கள் அறவே அற்று நூக்கிலங்களின் இணைப்பினாலும், மையாலின் (meloids) பாசுபாட்டினாலுமே வெளிப்படுகின்றது. இவைகளைப் பற்றிப் பின்னர் கவனிப்போம்.

பூஞ்சைகளின் வகைபாடு

பெருத் தொகுதியான மைக்கோட்டானில் (phylum Mycota) ஊங்கும் பூஞ்சைகள் யாவற்றையும் இரு வகைப்படுத்தலாம்.

(1) உறையற்ற பூஞ்சைகள்—மிக்னோமைக்கோடினா (Myxomycotina)

(2) உறையுள்ள பூஞ்சைகள்—பூமைக்கோடினா (Eumycotina) அல்லது உண்மைப் பூஞ்சைகள் (true fungi), முதலில் மிக்னோ மைக்கோடினாவின் சிறப்பியல்புகளைக் கவனிப்போம்.

11. தொகுதி: மைக்கோட்டா

துணைத்தொகுதி : மிக்ஸோமைகோட்டினா

(Myxomycotina)

வகை : மிக்ஸோமைகோட்டீஸ்

(Class: Myxomycetes)


மகரப் பூஞ்சைகள் (Slime mold)

இத்தப் பூஞ்சைகள் குளிர்ந்த திறலில் உள்ள 8-9 மண்ணிலும் அழுகும் தண்டு, இலைகளின் மேலும் மிகுதியாகக் காணப்படுகின்றன. இவை மேற்கூறப்பட்ட அடித்தனத்தின் மீது ஊர்ந்து செல்லும் ஆற்றலைப் பெற்றுள்ளன. இவற்றின் உடனம் (thallus) மிளகாய்மோடியம் என்று கூறப்படும் உறைவற்ற (naked) பன றாக்கியலங்கள் கொண்ட புரோட்டோமிகோட்டேயாகும் (உ-ம்.) பைசேரம் (physarum) (படம் 150 எ).

இப் பூஞ்சைகள் பாக்டீரியா, புரோட்டோமிகோட்டா (protozoa) மற்றும் பூஞ்சைகளின் ஸ்போர்கள், மற்றும் துண் உயிர்கள், அக்கைப் பொருள்கள் ஆகியவைகளை உணவாகக் கொண்டு வளர்க்கி பெறுகின்றன. வளர் பருவம் முடிந்தவுடன் மிளகாய்மோடியம் றற்றும் சேர்த்து ஒரு பெரிய அல்லது பன சிறிய நேர்த்தியான, பெரும்பாலும் காய்புடன் கொண்ட ஸ்போரகங்களைத் தோற்றுவிக்கின்றன (படம் 150-ஏ).

இங்வித ஸ்போரகங்களில் எண்ணற்ற 'உறைவுள்ள ஸ்போர்கள்' (படம் 150 ஆ) உண்டாகி, கேபிலிஷியம் (capillitium) என்ற வலை போன்ற இழைகளாக குழப்படுகின்றன. ஸ்போரகத்தில் உறை சிறித்தவுடன் ஸ்போர்கள் வெளியிற் பரவுகின்றன. இந்த ஸ்போர்கள் செல்லுமேல் உறைவைக் கொண்டுள்ளன. சில பேரீனங்களில் கேபிலிஷியம் சுரம் பட்டவுடன், இயங்குவதன் (hygroscopic movement) காரணமாக ஸ்போர்கள் வெளியேற்றப்படுகின்றன, ஸ்போர் முளைக்கும்போது

(germination) ஒன்று அல்லது மேற்பட்ட எண்ணிக்கையில் இரு கலையினங்கள் கொண்ட உதையற்ற செல்கள் உண்டாகின்றன. இயல்பிலான செல்கள் கார்பீட்டுகளாகச் (படம் 150 ஈ) செயல் புரிகின்றன. இவை பின்புறத்தில் ஜோடியாக இணைந்து



படம் 150

ஒரு பித்தோ கலையினம் (கலையினம்—Physarum) வாழ்க்கைச் சுழல்
அ. கலையினம்—கலையினம் இ. கலையினம் ஊ. கலையினம் உ. கலையினம்
ஈ. கலையினம் கலையினம் கலையினம் கலையினம் கலையினம் கலையினம்
கலையினம் கலையினம் கலையினம் கலையினம் கலையினம் கலையினம்

(fusion) பின் வளர்ச்சியடைந்து (இரட்டைமய) உதையற்ற பிளாஸ்மோடிய உடனடி உண்டாக்குகின்றன (படம் 150 ஊ).

புனைத்தொகுதி: யூமைகோடினா (Eumycotina)

யூமைகோடினா சிறிது காலத்திற்கு முன்பு 4 வகைகளாக (classes) வகுக்கப்பட்டிருந்தன. அவையாவன: (1) பைக் கோமைஸீட்டி (Phycomycetes), (2) ஆஸ்கோமைஸீட்டி (Ascomycetes), (3) பேசிடோமைஸீட்டி (Basidiomycetes),

(4) டிப்டெரோமைஸீட்டி. (Deuteromycetae). வைக்கோமைஸீட்டி பிரிவினையை ஸ்பைரோ (Sparrow, 1943) என்பவரும் 'அலெக்ஸோபொளஸஸ் (Alexopoulos, 1952) என்பவரும், அவற்றுள் அடங்கும் பேரினங்களில் இனப்பெருக்க முறைகளின் கசையிழைத்தன்மையை ஆதாரமாகக் கொண்டு மூன்று வகைகளாகப் பிரித்தனர். அவையாவன : (1) பூனிக்பினஜெக்ஸேடி (ஒரு கசையிழையன்—uniflagellatae), (2) வைப்பினஜெக்ஸேடி (biflagellatae—இரு கசையிழையன்), (3) ஏபினேஜேடி (aplanae) ஆகியன. ஏபினேஜேடி (aplanae) - கசையிழையினிகள்), பின்னர் அவர்களை மேற்கூறப்பட்ட பிரிவினாகள் ஒவ்வொன்றையும் இரண்டாக வகுத்தனர். அவையாவன : பூனிக்பினஜெக்ஸேடியைக் கைட்சிடியோமைஸீட்டிஸ் (Chytridiomycetes) (உ-ம்.) ஸிங்கைட்சியம் (Synchytrium), கைடியோமைஸீட்டிடியோமைஸீட்டிஸ் என்றும், வைப்பினஜெக்ஸேடியை பிளாஸ்மோடியோமோரோமைஸீட்டிஸ் (plasmodiophoromycetes) (உ-ம்.) பிளாஸ்மோடியோமோரோமைஸீட்டிஸ் (Oomycetes), (உ-ம்.) சேப்ரோஜெக்ஸிஸ் (Saprolegnia), பீதியம் (Pythium), ஆல்புகோ (Albugo), பெரெனோஸ்போரா (Peronospora) என்றும் ஏபினேஜேடியை (ஏபினேஜேடி) ஸைகோமைஸீட்டிஸ் (zygomycetes) (உ-ம். மிக்ஸா—Mucor, ரைஜோபஸ்—Rhizopus), டிரிகோமைஸீட்டிஸ் (Trichomycetes) என்றும் பிரித்துள்ளனர்.

வகை : கைட்சிடியோமைஸீட்டிஸ்

(Class : Chytridiomycetes)

பெருக்குறும்பம் : கைட்சிடியேலிஸ்

(Order : Chytridiales)

குறும்பம் : ஸிங்கைட்சியேலி

(Family : Synchytriaceae)


அல்லோமைஸிஸ்

(Allomyces)

இது கீழ்தியை பூஞ்சைகளில், பிளாஸ்டோடிரெடியேலிஸ் (Blastocladales) என்ற வகுப்பைச் சார்ந்தது. அல்லோமைஸிஸ் 1911ஆம் ஆண்டு, இ. ஜே. பட்டர் (E. J. Butler) என்பவரால் முதன்முதலில் இந்தியாவில் கண்டுபிடிக்கப்பட்டது. இது ஒரு சாறுண்ணியாக வாரும் (Saprophyte) காளாக்.

இப்பஞ்சையானது உலகம் முழுதும் பரவியுள்ளது. பெரும்பாலும் வெப்பமண்டலங்களில் வாழ்கின்றது. 1941ஆம் ஆண்டு எமர்சன் (Emerson) என்பவர் இப் பஞ்சையில் மூன்று வகைப்பட்ட

அவ்வோவைட்டா ஆகியவை



படம் 150 A

அவ்வோவைட்டா ஆகியவை

அ. அ. இ. ர. மையோ கம்போக்கள் காமிட்டோதாலை உடன்களாக ஓடுகளும் படிவங்கள் உ. பாதுகாப்புகளுடன் காணப்படும் முதிர்ந்த காமிட்டோதாலை ஊ. கம்போக்களுடன் காணப்படும் கம்போதாலை (ம.ம.மையோகம்போக்கள்)

வாழ்க்கைச் சுழல்கள் இருப்பதாக கண்டுபிடித்தார். அவை ஒவ்வொன்றையும் ஒரு துணைப் பேரினமாகப் (Sub-species) பிரித்தார்.

1. யூ-அல்லோமைஸிஸ் (Eu-Allomyces)

இதில் உருவொத்த சத்ததி மாற்றம் காணப்படுகிறது. (isomorphic alternation of generations). (உ-ம்.) அ. மாக்ரோமைசஸ் (Allomyces Macrogyrus)

2. கிஸ்டோஜீனஸ் (Cyst-genes)

இதில் உருவம் ஒவ்வாத சத்ததி மாற்றம் காணப்படுகின்றது. (heteromorphic alternation of generations) (உ-ம்.) அ. கிஸ்டோஜீனஸ், அ. மானிபீரி மானிபீரி (A. cystogenes, A. Moniliformis)

3. பிராச்சி அல்லோமைஸிஸ் (Brachy allomyces)

இதில் சத்ததி மாற்றம் கிடையாது (A. anomalous).

துணைப்பேரின் யூ. அல்லோமைஸிஸின் வரங்குகக்கொழி

அல்லோமைஸிஸ் உடலம் இழைகளால் ஆனது. யூ. அல்லோமைஸிஸ் என்ற துணைப்பேரின் சத்ததிமாற்றம் ஒத்தமைய (haploid) காமிட்டோதாஸஸ்டனும் (gametothallus), இரட்டைமைய (diploid) ஸ்போரோதாஸஸ்டனும் (sporothallus) தடைபெறுகிறது. இதன் கதறபாக்கள் இரு சமபக்க கிளைத்தல் கொண்டவை. செல்கள் கசட்டமனும் (chitin) ஆனது. அல்லோமைஸிஸ் உடலமானது ஒரு மேலீந்த கதறபாக்களாலான கரணாங்கு தொகுப்பிவிருத்து நேர் செங்குத்தாக வளருகின்றது.

ஒவ்வொரு இரு சமபக்கக்கிளையின் ஆரம்பத்திலும் ஒரு முழுமைபெருத குறுக்குச் சுவர் (incomplete septum) காணப்படுகின்றது. முதிர்ச்சி பெற்ற காமிட்டோதாஸஸிஸ் துணைப்பாக்களில் வண்ணமற்ற பெண் காமிட்டாஞ்சியங்களும், ஆரங்க வண்ணம் பெற்ற ஆண் காமிட்டாஞ்சியங்களும் மேலும் மேலமாக நோக்குகின்றன. கைட்டோபிளாஸ்திஸ் காணப்படும் ஆரங்க வண்ணமானது, Y-காரோட்டினும் நோற்றுகிக்கப்படுகின்றது. ஆண் காமிட்டாஞ்சியம், பெண் காமிட்டாஞ்சியத்தைக் காட்டிலும் சிறியது. சில சிற்றினங்களில் ஆண் காமிட்டாஞ்சியம் பெண் காமிட்டாஞ்சியத்தின் மேலும் (உ-ம். அ. மாக்ரோமைசஸ்) சில சிற்றினங்களில் பெண் காமிட்டாஞ்சியத்திற்கு கீழேயும் அமைந்துள்ளது (உ-ம். அ. ஆர்பஸ்கூலா - A. Arbuscula) காமிட்டாக்கள் நீரில் கிடுகிக்கப்படுகின்றன. இவை பின்புறத்தில் அமைந்த ஒற்றை கைசரினழையுடையவை. இவைகளில் நுக்கலியல் தொப்பி ஒன்று காணப்படுகின்றது. இது கரபோ நுக்கலியக் அபிவித்தானானது (nuclearcap with R.N.A.). இதை துரிலன் என்பவர் 1953-57ம் ஆண்டு கண்டுபிடித்தார், பெண்காமிட்டாக்கள்

ஸைரனின் (Sirenia) என்ற பாலின தாவியோஸின் வெவ்விரு கின்றன. இந்த தாவியோஸினும் ஆண் காமீட்டு கவரப்பட்டு பெண் காமீட்டுடன் இணைகின்றது. முதலில் புரோட்டோ பிளாசம் இணைந்து, பின்னர் நூக்கியலங்கள் இணைந்து ஸைகோட் தொன்றுகிறது. கணசரிதழகன் இழக்கப்படுகின்றன. சிறிது காலம் ஓய்வு பெற்று ஸைகோட் முனைக்க ஆரம்பிக்கின்றது. முதலில் முனைமூலம் வெளியிட்டு பிறகு ஸைகோட்டுகணசரிதழகன் இடுகின்றது நேர்செங்குத்தாக மூலம் வடிவம் பெற்ற தைரபா தொன்றி அது இருசம கம்போரோதாவணாக செயல்படுகின்றது. ஆயினும் இது புறத்தொற்றத்தாக காமீட்டோதாவணை ஏற்றுள்ளது. கம்போரோதாவணை இரண்டு கணகைப்பட்ட கம்போரகங்களைத் தொற்றுவிக்கின்றது.

1. மைட்டோஸ்போரோஞ்சியம் (Mitosporangium)

இந்த கம்போரகம் வெகித்த ஸெல்கவர் கொண்டது. வண்ணமற்றது.

2. மையோஸ்போரோஞ்சியம் (Meiosporangium)

இந்த கம்போரகம் கனத்த ஸெல் கவர் கொண்டது. பழுப்பு நிறத்துடன் காணப்படும் ஸெல்கவரில் குழிகள் (pits) காணப்படு கின்றன. இவை பாதகமான சூழ்நிலையை எதிர்க்கும் ஆற்றல் பெற்ற கம்போரகங்கள் (Resistant sporangia). இவைகளில் மெலனின் நிறமி (Melanin pigment) சிவப்பு, பழுப்பு வண்ணத்தை அளிக்கிறது. மைட்டோஸ்போரகங்கள் இரட்டை மய (diploid) மைட்டோஸ்போர்களை (Mitospores) தொற்றுவிக்கி திறது. கம்போர் மீண்டும் கம்போரோதாவணாகவே முனைகிறது. ஆகவே இவை தொடர்ந்து இரட்டைமய சத்தநிலையே தொற்று விக்கின்றது. மையோஸ்போரகங்கள் ஒவ்வொன்றிலும் 2 முதல் 8 வாரகங்களுக்கு பின்பு நியூக்கியல்களில் குன்றல் பகுப்பு (Reduction Division) கடைபெற்றது. பல மையோஸ்போர்கள் (Meiospores) தொற்றுவிக்கப்படுகின்றன. இவை இரட்டைமய ஜூஸ்போர்களைக் காட்டிலும் சிறியவை. இவை முனைத்து காமீட்டோதாவண்களைத் தொற்றுவிக்கின்றன. இதிலிருந்து காமீட்டகங்கள் (Gametangium) மூலம் உதயது போல் தொன்று கின்றன. ஆகவே யூ. அக்னோமைஸஸில் வாழ்க்கைச் சுழல் உரு ஒத்த சத்தநிலைமற்ற கணகையைச் சார்ந்தது.

தூய்ஸ்பேரினம் சிஸ்டோஜினம் : (Sub-genus—Cystogenes)

சிஸ்டோஜினஸின் கம்போரோதாவணை யூ. அக்னோமைஸஸின் கம்போரோதாவணைப்போல எதிர்க்கும் கம்போரகங்கள் (resistant sporangia) மூலம் ஜூஸ்போர்களைத் தொற்றுவிக்கின்றது. இந்த

ஜூஸ்போர்கள் ஒவ்வொன்றும் (இரு கிளைத்த காமிட்டோ தாவணை தோற்றுவியப்பதற்கு பதிலாக) சிறிய கோளவடிவான காமிட்டோதாவணை, தோற்றுவிகின்றது. இந்த காமிட்டோ தாவணையிலிருந்து நான்கு காமிட்டோகளை உருவாக்கின்றன. ஒரே தோற்றமுள்ள இருகாமிட்டோகள் இணையணைகோட் தோற்றுவிகின்றது. இந்த ணைகோட் இருபக்க கிளைத்த ஸ்போரோ தாவணை வளர்ச்சி அடைகிறது. இந்த வாழ்க்கைச் சுழலில் காமிட்டோதாவணை தோற்றத்தில் ஸ்போரோதாவணைப் போலக்லாமல் மாறுபட்டு சிறிய கோளவடிவ காமிட்டோ தாவணை காணப்படுவதால் இந்த வாழ்க்கைச் சுழல் உருவம் ஒவ்வாத சந்ததி மாற்றமாக கருதப்படுகிறது (heteromorphic alternation of generations).

பிராசி அல்லோமைஸிஸ் (Brachy Allomyces)

இந்த துணைப்பேரினத்தில் சந்ததி மாற்றமே காணப்படுவ தில்லை. மைட்டோஸ்போராஞ்சியம், மையோஸ்போராஞ்சியம் ஆகிய இருவகை ஸ்போரகங்களிலும் உண்டாகும் ஜூஸ்போர்கள் முளைத்து மறுபடியும் ஸ்போரோதாவணையே தோற்றுவிகின்றன. இந்த ஸ்போரோதாவணை இறுகித் ஸ்போரகங்களை கொண்டு உள்ளது.

ஸின்கைட்ரியம் (Synchytrium)

ஸின்கைட்ரியம், பூக்குத் தாவரங்களின் புறத்தோல் செல்களில் அக ஒட்டுண்ணியாக வாழும் ஒரு பூஞ்சையாகும். அதன் தாக்குதலின் காரணமாக, ஆதாரத் தாவரத்தின் மேல் பல பரு போன்ற 'காக்கள்' (galls) உண்டாகின்றன. ஸின்கைட்ரியம் என்டோபையாடிக்கம் (S. endobioticum) என்னும் சிற்றினத்தின் வாழ்க்கைச் சுழல் நன்றாக ஆராயப்பட்டுள்ளது. இது உருளைக் கிழங்குச் செடியின் தண்டுக் கிழங்கைத் (stem tuber of potato) தாக்கி கருப்பரு நோயை (black wart disease) உண்டாக்கிக் கிழங்கின் தரத்தைக் குறைத்துவிடுகிறது.

பொதுவாக வசந்த காலத்தில்தான் (spring) புதிதாக உண்டாகும் கிழங்குகள் இந்த நோயால் பாதிக்கப்படுகின்றன. இச் சமயத்தில், முன்னரே நோயினால் சிதைவுண்ட கிழங்குகளிலிருந்து வெளிவந்த ஒற்றைக் கசையிழை (uniflagellate) ஜூஸ்போர்கள் நீந்திப் புதிதாக வளரும் தண்டுக்கிழங்குகளை அணுமி, புறத்தோல் செல்களுக்குள் நுழைகின்றன. இந்த ஜூஸ்போர்கள் புறத்தோல்

பெரிதானதென. தன்னைச் சுற்றி ஒரு பருமனான பொன்விற வண்ணம் கொண்ட உறையைச் சுரந்து கொண்டு கோடை ஸ்போராக்க (summer spore) மாற்றமடைகிறது (படம் 150 ஈ).

இதற்குள் ஆதாரச்செல் (host cell) மிகப் பெரிதாகி (hyper-trophy) 'பேரி' வடிவத்தை அடைகின்றது. அன்றியும் சுற்றியுள்ள புறத்தோல், புறணிசெல்களும் தூண்டப்பட்டு, பாசுபாடடைத்து கடினமாகி, ஒரு பரு பொன்ற அமைப்பைக் கிழக்கின் புறத்தில் உண்டாக்குகிறது. ஆகவேதான் இத்த நோய் பருநோய் என்று குறிக்கப்படுகிறது. இங்கித நீகழ்ச்சிகள் முடிவடைவதற்குள் ஆதாரச் செல் இறக்கின்றது. பின்னர் ஒவ்வ நியை இது வரை இருந்த கோடை ஸ்போர் (summer spore) முளைக்க ஆரம் பிக்கிறது. அப்போது ஸ்போரின் உறை மேல்பாகத்தில் கிழித்து உள்நுழைந்த புரோட்டோபிளாஸ்ட் சங்கிலியும் சூழப்பெற்று ஆதாரச் செலின் மேல்பாகத்திற்கு வருகின்றது. இந்த ஸ்போரின் ஹக்ஸியல் 32 ஹக்ஸியல்களாகப் பகுப்படுகின்றது. இத்தப் புரோட்டோபிளாஸ்ட் தூண்டமடைந்து (4-5 பாகங்கள்) ஒவ்வொரு பாகத்திலும் ஹக்ஸியல்கள் 200-300 ஹக்ஸியல்களாக அதிகரிக்கின்றன. ஒவ்வொரு பாகமும் புரோசோரஸ் (prosorius) என்று அழைக்கப்படுகிறது (படம் 151 ஊ).

இப் புரோசோரஸ் சூழ்நிலையைப் பொறுத்து ஸ்போராக மாறவோ அல்லது காயிட்டாஞ்சிவமாகவோ செயல்படுகிறது. உடனடியாக நீர் மிகுநிலாகக் கிடைப்பதாயிருந்தால், ஒவ்வொரு பாகமும் ஸ்போராகமாகச் செயல்பட்டுப் பன (பின்புற ஒற்றைக் கசையினறு) ஜூக்போரிகளைத் தோற்றுவிக்கின்றது. ஆனால், உடனடியாக நீர் கிடைக்காமல் சிற்று காலத்திற்குப் பிறகே நீர் கிடைக்குமானால், ஒவ்வொரு பாகமும் காயிட்டாஞ்சிவ மாகச் செயல்பட்டுப் பன (பின்புற ஒற்றைக் கசையினறு) காயிட்டாகளைத் தோற்றுவிக்கின்றது (படம் 151 ஏ). ஆகவே, இத்திசுழ்ச்சி சூழ்நிலையின் முக்கியத்துவத்தைக் காட்டுகிறது.

மற்றும் ஓர் உறுப்பின் செயலை (physiology) சூழ்நிலைதான் நிர்ணயிக்கிறது என்பதற்கு இது ஒரு சிறந்த எடுத்துக்காட்டாகும். ஆகவே, காயிட்டாகள் உண்டாவதற்கு நீரற்ற நிலை துவக்கத்தில் இன்றியமையாதது எனத் தெரிகிறது. அதற்கு மாறாக உடனே நீர் வசதி கிடைக்கப் பெறின், இவை ஜூக்போர் களாகவே செயல்படுகின்றன.

ஜூக்போர்கள் உண்டானால், அவை சுற்றியுள்ள செல்கள் சிதைவுற்றவுடன் வெளிவந்து, புதிதாக வளரும் கிழக்குகளை மேற்கூறியவாறு தாக்கி, தோலைய உண்டாக்குகின்றன

(படம் 150 ஈ). ஆனால் காயீட்டுகள் தோன்றினால் அவை ஜோடி வாக இணைந்து கைபோட்டாக மாறி, நீத்தி மந்தக் கிழங்குகளை அணுமி, கிழங்குகளைத் (ஜூம்போர் தாக்கிப் அதே முறையில்) தாக்கிப் புறத்தோல் செக்களுக்குள் நுழைத்து விடுகின்றது. ஆதாரச் செவ்வின் அடிப்பாகத்தில் அமிழ்ந்து, பின்னர் ஒரு பருமனான பழுப்பு வண்ண உதையை கரப்பித்துக் கொண்டு கம்போராக மாறி விடுகிறது. இத்தகழ்ச்சி குவிர்கால ஆரம் பத்தில் நடைபெறுவதால் இந்த கம்போரைக் குவிர்கால கம்போர் (winter spore) என்றும் சிலர் குறிப்பிடுகின்றனர் (படம் 150 ஐ.ஓஎ). அடுத்த வரத்த காலத்தில் இந்தக் குவிர்கால கம்போரிலிருந்து பல ஜூம்போர்கள் தோன்றி, வெளிவந்து புதிதாக வளரும் கிழங்குகளைத் தாக்கி, புறத்தோல் செக்களுக்குள் நுழைகின்றன. இயல்பிதமாக வாழ்க்கைச்சழல் பூரித்தி அடைகிறது.

வகை: பிளாஸ்மோடியோபோரோமைட்டா

(Class : Plasmodiophoromycetes)

பிளாஸ்மோடியோபோரா (Plasmodiophora)

இந்தப் பூஞ்சைகளுக்குக் குடும்பத்தைச் சார்ந்த (cruciferae) சில தாவரங்களின்மேல் அடி ஒட்டுண்ணிவாக (obligate endoparasitic) வாழ்கிறது. பி. பிராசிசி (P. brassicae) என்னும் சிற்றினம் மூட்டைக்கோல் (cabbage) செடியின் வேர்ப்பாகத்தைத் தாக்கி மூண்டுவேர் (club-root) என்னும் நோயை உண்டாக்குகிறது (படம் 152, 153). இந்தப் பூஞ்சையின் தாக்குதலால் செடியின் வேர் ஒழுங்கற்ற முறையில் பருத்து விடுவதனால் இந்த நோய் மூண்டுவேர் என வழங்கப்படுகின்றது. பி. பிராசிசி (P. brassicae) தன் வாழ்க்கைச்சழலின் பெரும்பாகத்தை ஆதாரத் தாவரத்தின் வேர் திசுக்களில் செழிக்கின்றது. வேர் சிதைவுறும்போது பூஞ்சையின் (ஒய்வு நிலை) கம்போர்கள் சுற்றிவுள்ள மண்ணுடன் கலந்துவிடுகின்றன. இந்த கம்போர்கள் நுண்ணிவனவாகவும், கோளவடிவம் கொண்டும், வழமையான கைட்டின் உறை போன்றும் (படம் 154 அ) உள்ளன. ஒவ்வொரு கம்போரினும் ஒத்தநமைய தூக்கியல் ஒன்று உள்ளது. இந்தக் கைட்டின் உறை கம்போரைப் பல வருடங்களுக்கு (7 ஆகியது 8) சாதகமாற்ற நிலைகளிலின்றும் பாதுகாக்கிறது.

அடுத்த வசத்த பருவத்தில் (spring) கம்போரினிலுந்து ஒரு பேரிவடிவ இரு கசையிழை ஜூம்போர் வெளிவருகிறது. பின்னர்



படம் 152

கோம்போடியோபோரா —கோலின் (varibaga) தாக்கப்பட்ட வேர்



கோம்போடியோபோரா

படம் 153

கோம்போடியோபோரா—வேர் மாகத்தின் குறுக்குவெட்டுத் தோற்றம் (பெரிதாக்கப்பட்ட செல்களில் காணப்படும் கோம்போடியோபோரா)


அது நீர்த் திவடிகளில் நீத்தி நாத்நின் வேர்த்துளிகளை அணுகுகின்றது. தனது கசையிழையை வெளியே விடுத்து சிறு

துவாரத்தை ஏற்படுத்தி அதன் வழியாக வேர்த்தாவிக்குள் இது பிரவேசிக்கிறது. இத்தப் படிவத்திற்கு மிகையிபா படிவம் (nyxanoeba) என்று பெயர்.

வேர்த்தாவியின் உள்னே இருந்துகொண்டு இந்த மிகையிபா உணவைக் கிரமித்துப் பெரிதாக வளர்கிறது. அப்போது தூக்கியல் மட்டுமே பகுபடுவதன் மூலம் பன தூக்கியல்கள் கொண்ட உறைபற்ற (ஒற்றைமய) (haploid) புரோட்டோ பிளாண்டாக மாறுகின்றது (படம் 154 ஈ). இத்தப் படிவம்தான் பிளான்மோடியம் (planodiyam) என்று குறிக்கப்படுகிறது. பின்னர் இப் பிளான்மோடியம் பன ஒற்றைமய தூக்கியல் பாகங்களாகப் பிரிந்து ஒவ்வொரு பாகமும் ஒரு மெல்லிய உறை வுடன் கூடிய காமிட்டேஞ்சியமாகச் செயல்படுகிறது. காமிட்டேஞ்சியம் ஒவ்வொன்றிலிருத்தும் 4 அல்லது 8 பேரி வடிவ (நீளத்தில் வேறுபட்ட) சாட்டைத் (whip-lash) தன்மை கொண்ட இரு கசையிறை காமிட்டுகள் வெளியாகின்றன. வெவ்வேறு காமிட்டேஞ்சியங்களிலிருத்து வரும் காமிட்டுகள் இணை வைகொட்டு உருவாகிறது (படம் 154 உ, ஊ). இவ் விதமாக உண்டான வைகொட்டின் தூக்கியல் மைடானில் பிரீகிசைவடைகின்றது. இதன் விளைவாகப் பன தூக்கியல் கொண்ட இரட்டைமய பிளான்மோடியம் தோன்றுகிறது. இது வசந்த காலத்தில் வேர்த்தாவிகளிலிருந்து புறணித் திசுக்களுக்குள் பரவி கேம்பியம் வரை விவாபிக்கிறது. இதனும் புறணி செல்கள் விரைவாக பாதுபாடடைத்து பிளான்மோடியம் கொண்ட செல்களின் எண்ணிக்கை அதிகரிக்க, பாதிக்கப்பட்ட செல்கள் பன்மடங்கு பெரிதாகி அதனுள்ளிருக்கும் பிளான்மோடியங்களும் அளவில் பெரிதாகின்றன (படம் 154 ஏ). ஆகவே, இவ்விதம் பாதிக்கப்பட்ட வேர்பாகம் ஒழுங்கற்ற முறையில் வீக்கமடைவதால் மூண்டுவேர் (club-root) போன்று தோற்றமளிக்கின்றது (படம் 152).

கோடைகாலம் முடிவடைவும் சமயத்தில் ஒவ்வொரு பிளான்மோடியத்திலும் தூக்கியல்கள் அடுத்தடுத்துப் பாதுபாடடைகின்றன. இவற்றுள் கடைசி இரண்டு பாதுபாடுகள் மைடானில் முறைபிறும், மற்றவை யாகும் மைடானில் முறைபிறும் திசு கின்றன. ஆகவே, இறுதியில் தோன்றிய என்னா தூக்கியல்களும் ஒற்றைமய நிலை (haploid) அடைகின்றன, அச்சமயம் சிறு துள் குமிழிகள் பன உண்டாவதால் பிளான்மோடியம் பன ஒற்றை தூக்கியல் கொண்ட, பாகங்களாகப் பிரிகிறது. அவை

இவ்வோன்றும் ஒரு கைட்டன் உதையாகக் குழப்பட்டு விபேரமாக மாற்றமடைகிறது. இவ்விதமாக எண்ணற்ற விபேரங்கள் பேர்



பிரதானமந்திரி, மூலமந்திரி—ஆந்திரம், கர்நாடகம்

[illegible]

செங்கனித் தோன்றி (படம் 154 ஐ) சுற்ற வேர் சிதைவுகளையும் போது மண்ணுடன் கலந்து விடுகின்றன. இந்த வர்போர்தல்

இனையுதிர்காணம் முடிவடைபயிவரை ஒவ்வ நினையிடுத்து வசந்த காலத்தில் மூல்குறியவாறு முனைத்துப் புதிய தாற்றுக்கின் வேர்த் துளைகளைத் தாக்குகின்றன.

வகைப்படுத்தி நிலை (Systematic position)

பினாஸ்மோடியோபோரா பல் காலமாக மிக்ஸோமைட்டிஸ் என்னும் வகையின் கீழ் சேர்க்கப்பட்டிருந்தது. இதற்குக் காரணம் கனாவன :

1. உடகம் உறைபதற் பினாஸ்மோடியமாக இருத்தல்.
2. காமீட்டுகள் இரு கணயிக்குகளை மூன்புறத்தில் கொண்டு இருத்தல்.
3. கணயிக்குகள் சாட்டைத் தன்மை கொண்டு நீளத்தில் வேறுபட்டிருத்தல்.

ஆனால், மிக்ஸோமைட்டிடுகளினின்றும் சில முக்கிய வேறுபாடுகளையும் பினாஸ்மோடியோபோரா கொண்டுள்ளது. அவையாவன :

1. அக ஒட்டுண்ணி இயல்பு (endoparasitic habit).
2. ஸ்போர் உறை கைட்டினுவானது (மிக்ஸோமைட்டிடுச் செத்துலோஸாக ஆனது).
3. காமீட்டுகள் மூன்புறத்தில் இணைவது மிக்ஸோமைட்டிடுகள் காமீட்டுகள் பின்புறத்தில் இணைகின்றன.
4. ஸ்போர்கள் உண்டாகும்போது ஸ்போரகங்கள் (sporangia) உண்டாவதில்லை. (மிக்ஸோமைட்டிடுக் அத்தகைய ஸ்போரகங்கள் உண்டாகின்றன).

ஆகவே, ஃபிட்ஸ்பேட்ரிக், 1930 (Fitzpatrick), ஸ்போரோ 1943, 59 (Sparrow), எய்ன்ஸ்வொர்த்தும், பின்பியும், 1950 (Ainsworth and Bisby), மார்ட்டின், 1953 (Martin), அலெக்சேலோபொலஸின் (Alexopoulos, 1962) முதலான பூஞ்சைவியல் நிபுணர்கள் பினாஸ்மோடியோபோராவை மிக்ஸோமைட்டிடுகளினின்றும் அகத்திப் பினாஸ்மோடியோபோராமைட்டிஸ் என்னும் தனிப் பிரிவாக ஆக்கியுள்ளார்கள்.

வகை : ஊனமலரீட்சு
(Class : Oomycetes)

இப் பூஞ்சைகளுக்கே உரித்தான முக்கிய நிறப்பெய்வு
கனாவன் : செல் உறை செல்லுமோனாக் ஆக்கப்பட்டதும்,
ஐயப்போர்கள் இரண்டு கணவிகழகன் கொண்டதும், பாலினப்
பெருக்கம் எனப் பழையவிக் தடைபெறுவதும் ஆகும்.

பெரும் குடும்பம் : பெரோனோஸ்போரேலிஸ்
(Order : Peronosporales)
குடும்பம் : பிதிபேசி
(Family : Pythiaceae)

பிதியம் (Pythium)

இப் பேசினம் பெரும்பாலும் கரமண்ணிலும் நீரிலும் சாறுகள்
விடமாக வாலும் பூஞ்சையாகும். மண்ணில் வாலும் சில நெற்றினங்
கள் பின்னர் ஒட்டுண்ணிகளாக மாறி, செடிகளுக்கு மிகுதியான
கேடு விளைவிக்கின்றன. இவை நூற்றுக்கணக்கில் (seedling) தவிர்த்து
தடுத்தல் (damping-off) என்னும் நோய்க்கும், முதிர்ந்த செடி
களின் அழகம் நோய்க்கும் காரணமாக உள்ளன.

இந்தப் பூஞ்சையின் சில நெற்றினங்கள் பருத்து, கத்தரி,
தக்காளி, புதுகையின் முதலிலவற்றை நூற்றுப் பருவத்தின், விதை
விலைக் கீழ்த்தண்டைத் தரைமட்டத்தின் தாக்கி, நூற்று தலை
சாய்ந்து விடுகின்றன. இந்த அறிகுறியைப்பெய்க்கப்பிசு
ஆகிப் (damping-off) என்று குறிப்பிடுகிறோம். நூற்றுக்க
மாக அமைத்திருந்தாலும், நீர்த்தெக்கம் கொண்ட கார்பொட்ட
மான பாத்திரங்களும் அழகும் (தாவர) அக்கைப் பொருள் மிகுதியாக
வுள்ளதும் இந்த நோய் விரைவில் பரவுவதற்கு அனுகூலமாக
இருக்கிறது.

சில நெற்றினங்கள் இஞ்சிச் செடியின் நிலைமட்டத் தண்டைத்
தாக்கி அழகம் நோயை (rhizome rot) உண்டாக்குகிறது. மற்றும்
பப்பாய் (Carica papaya) மரத்தண்டு அழகாக்கும் (stem rot).
பிசின் அகவது பாக் வடிவத்திலும் காரணமாக உள்ளன. மற்றும்
சில நெற்றினங்கள் வெண்டைக்காய் அழகாவியும் ஏற்படுத்து
கின்றன.

இப் பூஞ்சையின் மைஸீலியம், ஆதாரத் தாரவத்தின் நிகக்
களில், செல் இடைவெளிகளில் பரவிக்க காணப்படும். குமிழ்
போன்ற உறிஞ்சுதலுப்புகளின் மூலம் சத்துப் பொருளை இவை

கிரகித்துக் கொள்கின்றன. ஹைபாக்கள் குறுக்குச் சுரந்து, பல தூக்கியல்கள் கொண்ட மெல்லிய கிளைத்த குழல் போன்ற அமைப்பைக் கொண்டும்ள்ள.

பாவினா இனப்பெருக்கம் : பாவினா இனப்பெருக்கத்தில் போது சில ஹைபாக்கள் வெளிவந்து இருவிதமான ஜூஸ்போர கங்களைத் தோற்றுவிக்கின்றன. சில சிற்றினங்களில் இந்த கம்போரகம் கோளவடிவம் கொண்டும் மற்றவைகளில் நீண்ட கதை போன்றும் (club-shaped) கிளைத்தும் காணப்படுகின்றன. இந்த சிறப்பியல்பு யாதெனில் இந்த கம்போரகம் முழுவதும் பிடி அடைத்தவுடன் ஒரு சிறு குழல் (exit-tube) மூலம் புரோட்டோ பிளாஸம் மெல்லிய துக்கால் குழப்பப்பட்டு வெளிவருகின்றது பிறகு இது பாகுபாடடைந்து பல ஜூஸ்போர்களை உற்பத்தி செய்து துக்க சுரத்தவுடன் ஜூஸ்போர்கள் நீதிச் செல்கின்றன (படம் 155 ஆ - ஈ). இந்த ஜூஸ்போர்கள் அவரை (கிதை) வடிவம் (bean-shaped) கொண்டவை. குழித்த பாகத்தில் இரு கண்பிழை களைப் (laterally biapiculate) பெற்றுள்ளன. அவைகளுள் ஒன்று டிண்டல் (tinsel-types) வகையும், மற்றொன்று சாட்டை வகையும் ஆகும் (whip-lash type). இந்த ஜூஸ்போர்கள் நீதி, பின்னர் அதனின்றி ஒரு முகை-குழல் (germ-tube) வளர்ந்து புறத்தோலின் துளைவின் (stoma) மூலம் உட்சென்று, ஒரு புதிய மைஸீலியத்தைத் தோற்றுவிக்கிறது.

பாவினப் பெருக்கம் : பாவினப் பெருக்கம் கனகமி முறையில் தடைபெறுகின்றது ஆனால் பாவின உறுப்புகள் ஆதாரத்தவரால் இறத்த பிறகே உண்டாகின்றன. இவ்வகையில் பிதியம் தீர்மானமற்ற சாறுண்ணியாகத் (facultative saprophyte) தன் வாழ்க்கையை அமைத்துக் கொள்கிறது. ஆன்பாறுறுப்பான ஆத்தரிடயம் கதை போன்றும் (club shaped), பெண்பாறுறுப்பான ஊகோஸியம் கோளவடிவம் கொண்டும் உள்ளன. அவை ஹைபா கிளைகளின் துவியில் தோன்றி மற்றப் பாகத்திலின்று குறுக்குச் சுரரால் பிரிக்கப்படுகின்றன. துவக்கத்தில் ஊகோஸியத்திலும் ஆத்தரிடயத்திலும் பல தூக்கியல்கள் காணப்படும் (படம் 155 ஏ). பின்னர் ஊகோஸியத்தில் உள்ள ஸைட்டோ பிளாஸம் நடுவில் ஒரு கோளவடிவில் இரண்டு ஓர் அண்டத்தைப் போல் உருவாகிறது. இது ஊபிளாஸம் (oo plasam) என்று பெயரிடப்பட்டுள்ளது. இந்த ஊபிளாஸத்தைச் சுற்றி அமைந்துள்ள துண்குமிழிகள் திறந்த மிகக் குறைவான ஸைட்டோ பிளாஸ பாகத்தைப் பெரிபிளாஸம் (periplasam) என்று குறிப்பிடுவர். துவக்கத்தில் இனம் ஊகோஸியத்தில் பல தூக்கியல்கள்

காணப்பட்ட போதிலும் அது வளர்ச்சி அடைவும்போது ஊயினா னத்தில் ஒரு நூக்கியினை நிலைநிறுக்க மற்ற நூக்கியல்கள் எல்லாம் பெரிபினாஸத்துக்கும் தகர்த்து சென்று, பின்னர் சிதைவுறுகின்றன. ஆகவே, முழுவளர்ச்சியடைந்த ஊயினோலிபத் தின் நடுவில் ஒரு நூக்கியல் கொண்ட ஊயினாஸம் அண்டமாகச் செயல்படுகிறது (படம் 155 ஏ).

இதற்குள் ஆத்தரிடபத்தில் ஒன்று தவிர மற்றெல்லா நூக்ளியல்களும் சிதைவடைகின்றன. ஆகவே, முழுவளர்ச்சியடைந்த ஆத்தரிடபத்தில் சிறிது கசட்டோபினாஸத்திலும் மட்டுமே குழம்பு பட்ட ஒரு நூக்கியல் ஆன் நூக்கியலாகச் செயல்படுகின்றது (இப் பூர்வகாலத்தில் கலாவிழை கொண்ட ஆன் கார்பீட்டுகள் உண்டாவதில்லை).

இந்த ஆத்தரிடபம் துவக்கத்திலிருந்தே ஊயினோலிபத்துடன் ஒட்டி வளர்ந்து வருகின்றது. ஆகவே, கருவுறும் தருணத்தில் ஆத்தரிடபத்திலிருந்து, ஒரு மேக்ளிய குழம் (tube) வளர்ந்து ஊயினோலிபத்தின் உறைவை அடருவிச் சென்று ஊயினா னத்தை அடைகிறது. இந்தக் குழவிற்கு கருவுறு குழம் (fertilization tube) என்று பெயர். ஏனெனில், இந்தக் குழம் மூலம் தான் ஆன் நூக்கியல் ஆத்தரிடபத்திலிருந்து ஊயினோலிபத்திற்குள் புகுந்து ஊயினாஸத்துடன் இணர்ந்து கருவுறச் செய்கிறது.

இவ்விதமாக நடைபெறும் நிகழ்ச்சி வைபடுகோமி (syngony) அதாவது குழம்மூலம் கருவுறல் என்று அழைக்கப்படு கிறது. இந்த நிகழ்ச்சி கைமஸ்டீட்டின் ஒரு சிறப்பியல்பாகும். கருவுற்ற ஊயினாஸம் ஓர் உறைவால் குழப்பட்டு கைகோட் டாக மாறி ஒலுவுநிலை அடைகிறது. பின்னர் நீர் மிகுதியாகக் கிடைக்கும் சமயத்தில் கைகோட் முடைக்கிறது (பாவினா இனப் பெருக்கத்தில் போது நிகழ்ந்தபடி). ஒரு சிறிய குழம் மூலம் கைட்டோபினாஸம் ஐவ்வால் குழப்பட்டு வெளிவந்து ஜூம்போர் களாக மாறுகின்றது. பின்னர் புதிதாக வளரும் செடிக்கி இவை தாக்க ஆரம்பிக்கின்றன. இந்த கைகோட் ஜூம்போர்க்கு உண்டாவதற்குமுன் கைமஸ்டீட்டின் வழி பாகுபாடடைகிறது.

தோண்டித் தடுக்கும் முறைகள்

(1) நூற்றுப் பருவத்தில் செடிகள் தெருக்கமாக அமை வதைத் தவிர்த்தல், (2) பாத்தில்களில் நீர் தேங்காவண்ணம் கவனித்துக் கொள்ளல், (3) செடிகளின் மேல் தெரடியாக நீர்

விழாமல், வடிவாக வசதிகளைப் பெருக்கி நீர் தேங்குதலுத் தடுத்தல் வேண்டும். (4) பாத்திகளில் முன்னமேயே கப்போர்கள் இருப்பின் வேதிப் பொருள்களினாலோ அல்லது நீராவியின் உதவி கொண்டுதான் கொன்று மண்ணைச் சீர்ப்படுத்தலாம்.

குடும்பம் : ஆல்புஜினேசி

(Family : Albuginaceae)

ஆல்புஜோ = சைபோபஸ்

(Albugo = Cystopus)

இப் பேரினம் கடுகுக் குடும்பத்தைச் (Cruciferae) சார்ந்த முள்ளகி, கோஸ், கடுகு, கேபன்கா (Capsella) முதலிய தாவரங்களின் மேலும் [அமரேந்தேரி (Amaranthaceae) குடும்பம்] கிரகனின் மேலும், வள்ளிக்கிழங்கு இவாக்குலஸ் (Evolvulus), கன்வால்வுலேசி (Convolvulaceae) மற்றும் போர்டுலாகா (Portulaca) முதலிய தாவரங்களின் மேலும், நினைமாசு ஒட்டுண்ணியாகப் (obligate parasite) பொதுவாகக் காணப்படும். இக்கப் பூஞ்சை, தண்டு, இலை, பூ, கனி (வேர் பாகத்தைத் தவிர) எல்லா பாகங்களிலும் பாதித்து

வெள்ளை ரஸ்ட், (white rust) என்றும் தோயை உண்டாக்குகிறது.

இத்த நோயின் அறிகுறிகளாவன :

(1) பண்பிதமான வெண்மைமையான பஞ்சு போன்ற திட்டுகள் ஆதாரத் தாவரத்தின் இலைகளின் அடிப்புறத்தில் காணப்படுவது (படம் 156).

(2) பாதிக்கப்பட்ட பாகங்கள் வீக்க மடைத்து (swelling) பண மாறுபாடுகளை (malformation) கொண்டிருப்பது (3) இலைகள் பருமனடைத்தும், கனடகாணப்படுகின்றன.

வெளிரலாகவும் (pallid), கருண்டும் இலைகள் அடிப்புறத் தோற்றம் காணப்படுவது. (4) இலை கட்டகத்தில் உள்ள எகலா மொட்டுகளும் வளர்ச்சி பெற்று அடர்த்தியான அமைப்பைக் (bushy growth) காணப்படுவது. (5) மஞ்சரித் தண்டு (perennial) மிகுதியாக வீக்கம் கொள்ளுதல், (6) பாதிக்கப்பட்ட பூக்கள் கய வண்ணத்தை நீத்துப் பண மாறுதல்களை அடைதல்; அதாவது

(a) அல்லி இதழ்கள் பூவிலி இதழ்களாக மாறுவது. (b) மகரந்தத் தாள் இலை போல் மாற்றம் அடைவது. (c) சூவகம் ஒரு பெரிய



படம் 156

ஆல்புஜோ—வெள்ளைப் பூவிலி

வைபோல் அகலது இலைபோல் மாற்றமடைவது முதலியன வாகும். (7) மிகவும் பாதிக்கப்பட்ட (ஆதார) தாவரங்கள் மூலமையும் குட்டையாகி வளர்ச்சிக்குத் தீர்த்தோன்றும் (dwarfing). இப் பூஞ்சையின் மைளீசியம் குறுக்குச் சவரத்தறும் பன நூக்கி வகைகளைக் கொண்டதுமான ஹைபாக்களால் ஆனது. இவை செக்களின் இடைவெளிகளில் பரவி ஆங்காங்கே கோளவடிவ மான உறிஞ்சி உறுப்புகளின் மூலம் (haustoria) உணவை கிரமிக்கின்றன.

பாலின இனப்பெருக்கம்: பாதிக்கப்பட்ட இடத்தைச் சுற்றி பரவி வளர்ந்த பிறகு, இப் பூஞ்சை இலைகளின் அடிப் புறத் தோலின் (lower epidermis) உட்புறத்தில் (சில சமயங்களில் இனம் தண்டுகளின் புறத்தோலின் கீழ்), குண்டாக்கடி போன்ற பனகொண்டியோபோரகளை (conidiophores) உண்டாக்குகின்றது. கிட்ட ஹைபாக்களின் மூலியில் அமைந்துள்ள இந்த கொண்டியோபோரகள் (conidiophores) புறத்தோலின் கீழ் தெருக்க



படம் 157


ஆஸ்பிரோ-பாலின இனப் பெருக்கப் படகம்—கொண்டியங்கள்

மாக ஒன்றுக்கொன்று இணையாக (parallel to each other) அமைந்துள்ளன. இவை தம் மூலியாகத்தில், ஒன்றன்மீது ஒன்றாக (ஒரு வரிசையில்) பன கொண்டியோபோரகங்களை (conidiopores) தோற்றுவிக்கின்றன. இவையாலும் மேலுள்ள புறத் தோலை அழுத்துவதன் காரணமாக, புறத்தோல் கிழிந்து விடுகிறது (படம் 157). ஆகவே, நிரம்பற்ற கொண்டியோ போரங்கள் பச்சைநிற இலைப்பரப்புகளில் வெண்மையான நிட்டுகளாக வெளிப்படுகின்றன. இவ் வெண்மையான நிட்டிற்குக் கொப்புளம் (pustule) என்று பெயர். இந்த அறிஞரியே இத் தோலுக்கு 'வெள்ளை ரகட்டி' என்ற பெயரைக் கொடுத்துள்ளது.

ஜூக்ஸோகு கொனீடியோல்போரகமும் பல நூர்லியங்கள் கொண்டுள்ளது. கொனீடியோல்போரகங்கள் தனித்தனியே பிரித்து காற்றினால் அடித்துச் செல்லப்படுகின்றன. அவை மற்ற (பாதிக்கப்படாத) தாவரங்களின் இலைகளின்மேல் படித்தவுடன் மூளைக்க ஆரம்பிக்கின்றன. வெப்பநிலை குறைவாக இருந்து, அந்த இலைகளின்மேல் நீர் மிகுதியாகக் கிடைக்குமாயின், கொனீடியோல்போரகம் ஒரு சிறு குழல் மூலம் (exit tube) 4-12 ஜூக்ஸோர்களை வெளியேற்றுகிறது.

இந்த ஜூக்ஸோர் நீந்தி மூளைத்து, இளைத்துளியின் (stomata) மூலம், இளையிலும் புகுத்து புதிய எமஸீனியத்தை உண்டாக்குகிறது. ஆனால், வெப்பநிலை அதிகரித்து நீந்துவதற்கு நீர் கிடைப்பது அரிதாகவுள்ளபோது, கொனீடியோல்போரகம் ஜூக்ஸோரை உண்டாக்காமல் நேராகவே மூளைத்து (direct germination) மூளைகுழல் மூலம் இளைத்துளைக்குள் பிரவேசிக்கிறது.

பாலினம் பெருக்கம் : ஊள் பருவம் முடித்தவுடன் இப் பூஞ்சை ஊகமி முறையில் பாலினப் பெருக்கத்தை மேற்கொள்கிறது. பாதுறுப்புக்களான ஆத்தரிடியமும் ஊகோனியமும், பித்தியம் பூஞ்சையில் காணப்படுவது போலவே அமைந்துள்ளன.



படம் 158

ஆடிபொ—பாலினப் பெருக்கம்—ஊகோனியமும் ஆத்தரிடியமும்

ஆனால், இவ்வுறுப்புகள் ஆதாரத் தாவரத்தின் உட்புறத்தில் அமைந்த திசுக்களுக்கிடையே பதிந்து காணப்படும். பொதுவாக இவை மஞ்சரித் தண்டின் உற்பாகங்களின் மிகுதியாகக் காணப்படும். இவ்வுறுப்புகளின் ஊடிவம், அமைப்பு, குழல் மூலம் கருவுறல் (spermatogony) ஆகிய யாவும் பித்தியம் பூஞ்சையில் காணப்படுவதைப் போலவே அமைந்துள்ளன (படம் 158). ஆனால், சில சிற்றினங்களில் வேறுபாடு காணப்படுகிறது.

சிற்றினங்கள் ஆ. இலாங்குலி (A. evolvuli), ஆ. காண்டிபா (A. candida) முதலியவற்றில் சித்திரத்தின் திசுப்பகு போல் ஊயினாலும் கருவுறும்போது, ஒரே (அண்ட) நூக்லியஸைக் கொண்டும் ஆந்தரீடியமும் ஒரே ஆண் நூக்லியஸுடனும் உள்ளன. ஆகவே, கருவுறுதலுக்குப்பின் ஒரே ஸைகோட் நூக்லியஸ் காணப்படும். ஆனால், மற்றச் சிற்றினங்களில் (ஆ. பிளிடா - A. bliti, ஆ. போர்டுலாகா - A. portulacae) கருவுறுதலுக்கு முன் ஊயினாசத்திலும் ஆந்தரீடியத்திலும் பல நூக்லியஸ்கள் காணப்படும். அவைகளும் கருவுறும்போது அவைகளுக்குப் பல ஜோடி இணைப்புகள் திகழ்ந்து பல ஸைகோட் நூக்லியஸ்கள் தோன்றுகின்றன. ஆகவே, பல இரட்டைமைய நூக்லியஸைக் கொண்ட இத்த ஸைகோட் கூட்டு ஸைகோட் (compound zygote) என்று பெயரிடப்பட்டுள்ளது. ஸைகோட் ஒரு பருமனுடன் உறையைத் தவிர்த்துக் கொண்டு ஒப்பு நிலையை அடைகின்றது. அடுத்த பருவத்தில் நீர் மிகுதியாகக் கிடைக்கும்போது 40-50 ஜூன்போர் களைத் தோற்றவித்து அவைகளின் மூலம் புதிதாக வளரும் தாவரங்களைத் தாக்குகின்றன.

நோயைத் தடுக்கும் முறைகள்: (28)

- (1) நீர் தேங்குதலைத் தடுத்தல்;
- (2) தாக்கப்பட்ட பாகங்களில் ஊன்போர்கள் இருப்பதாக அப் பாகங்களை நீக்கி எரித்து விடுதல்;
- (3) பூஞ்சைக் கொல்லிகளைத் தெவித்து நோய் பரவா வண்ணம் தடுத்தல்.

வகை: ஸைகோமைஸிடீஸ்

(Class: Zygomycetes)

இவ் வகையில் அடங்கும் பூஞ்சைகள் பெரும்பாலும் சாறுண்ணிகளாகும். இவை பின்னரும் இரு முக்கியச் சிறப்பு வியப்புகளைக் கொண்டவை: (1) கசையிழை கொண்ட ஜூன்போர்கள் அறவே கிடைவாது. ஆனால், பாலியா இனப்பெருக்கம் ஸ்போரங்கங்களில் உண்டாகிக் காற்றினால் பரவும் ஸ்போர்களால் (sporangiopores) திசுப்பெய்து: (2) பாலினப் பெருக்கம் களமிட்டேஜிய இணைப்பு முறையில் மட்டுமே (conjugation) நடைபெறுகின்றது.

பெருங்குடும்பம் : மிசுலாரேலிய
(Order : Mucorales)

மிசுகாரும் ஹைஸோபம்
(Mucor and Rhizopus)

ரோட்டிப் பூஞ்சைகள் (Bread Mold)

இங்கிரு பெரினங்களும் நெருங்கிய தொடர்புடையவை யானதால் அவை இரண்டின் அக ப்பையும், காழிக்கை வரலாற்றையும் ஒரேயே கணிப்போம்.

இத்தப் பூஞ்சைகள், தரகம், சர்க்கரை மிதும்பான அங்கம் போருங்கள், நாட்பட்ட உணவுப் போருங்கள் (உ-ம். ரோட்டி—bread, சோறு—cooked rice) முதலியவை மேலும் வளருவதை வேக சாதாரணமாகக் காணலாம். இவற்றின் ஸ்போர்க்கள் காற்றில் எப்போதும் பரவியிருப்பதால் ஓர் சுரமான ரோட்டித் தாண்டை மணிராடியாக மூடிவைத்தால் 2-3 தினங்களில் இப் பூஞ்சையின் பஞ்சு போன்ற மைஸீலியம் ரோட்டியின்மேல் வளர்த்துக்கொண்டதால் எளிதில் காணலாம். மைஸீலியம் குறுக்குச் சுவரற்ற, வண்ணமற்ற, கிளைத்த, பல நியூக்லியஸ் கொண்ட ஹைபாக்களால் ஆனது. ஹைபாக்களில் கிளைகள் (ஹைஜாய்டுகள்—rhizoids)யில், உணவுப்பொருளின் அடித்தளத்தில் புகுத்து உணவை உறிஞ்சி மைஸீலியத்துக்கு அளித்தின்றன.



பாலின இனப்பெருக்கம் : இத்தப் பூஞ்சையின் ஸ்போர்க்கள் உண்டாவதில்லை. அடித்தளத்தில் படித்துள்ள ஹைபாக்களினின்றும் செங்குத்தான

கிளைகள் ஸ்போரகக் காம்பு (sporangiophore) வளர்த்து அவைகளில் நுளிகளில் கொள்வனவு ஸ்போரகங்கள் தோன்றுகின்றன. ஒவ்வொரு ஸ்போரகத்திலும் எண்ணற்ற நெரிய ஸ்போர்க்கள் உண்டாகி, ஸ்போரக உறை கிழியும்போது காற்றிலும் எடுத்துச் செல்லப்படுகின்றன.


படம் 159
ஹைஸோபம்—பாலின இனப் பெருக்கம்



தொடக்கத்தில் இவ் விலைந்தம் எண்ணற்ற நூக்கியல் களுடன் காணப்படும். பின்னர் ஸ்போரகத்தில் அடிப்பாகத்தில்



ஸ்போரோகம்



படம் 160, 161

தானோபட்டா பாலினப் பெருக்கல்
படிவங்கள்

உள்ளன. காமிட்டேட்ரூசியங்களுக்கு இடையே உள்ள உறைகள் கரைந்தவுடன் இரு காமிட்டேட்ரூசியங்களின் புரோட்டோ

அகரக்கோள வடிவில் உண்டாகும் குறுக்குச் சவருக்குக் காதுமேல்வா (columella) என்று பெயர். இது ஸ்போரைத் தாங்கும் பாகத்தை ஸ்போரகக் காய்ப்பினின்றும் பிரிக் கின்றது. பிழுகாரிக் ஸ்போரகக் காய்புகள் (sporangiophore) தனித் தனியே (ஒற்றையாக) காணப்படு கின்றன. ஆனால், ஈரஜோபனில் ஸ்போரகக் காய்புகள் கற்றையாகவும் (clusters) அதற்கு நேர்நேர ஈரஜோப்டுகள் கொண்டும் அமைந் திருக்கும். எனவே, ஸ்போரகக் காய்புக் கற்றைகளுக்கு இடையே 'ஒடு தண்டு' (runner or stolon) போன்ற கற்றை அமைப்புகளும் காணப்படும் (படம் 159).

பாலினப்பெருக்கம் : இப்பூஞ்சைகளின் பாலினப்பெருக்கம், இணைப்பு முறையில், (conjugation) தடைபெறுகின்றது. இரு கற்றைபாக்கள் சுடுக்கடுத்து அமைந்திருப்பதால் அவைகளினின்றும் எதிர்முகமாக கற்றைபா கிளைகள் தோன்றி ஒன்றை யொன்று நேரக்கிவையடிவன்கின்றன (படம் 160). ஊட்டோபிளாசுளும் நூக்கியல்களும் பிழுகியாக உள்ள இக்கிளைகளின் துளிப்பாக்கங்கள்குறுக்குச் சவரால் பிரிக்கப்பட்டு காமிட்டேட்ரூசியங்களாகச் செயல்படுகின்றன (படம் 160). [இத்த காமிட்டேட்ரூசியத்தைத் தாங்கும் கிளையின் கீழ்ப் பாகத்திற்கு ஸம்பெண்டார் (suspended) என்று பெயர்.] ஒவ்வொரு காமிட்டேட்ரூசியத்திலும் கமார் சூயீரம் நூக்கியல்கள்

பிளாஸ்டம் கலக்கின்றன. நூக்கியல்களும் ஒன்றையொன்று அணுகி தோடியாக இணைந்து பல இரட்டைமய னைகோட் நூக்கியல்களை உண்டாக்குகின்றன. இதன் விளைவாகத் தோன்றும் கூட்டு னைகோட் (coenogyote) ஒரு பருமனான முட்டைக் கொண்ட உதறையை உண்டாக்கிக் கொண்டு ஒவ்வு நிலையை அடைவிறது (படம் 160). பின்னர் னைகோட் உதற ஒரு புறம் பிழிய, இடைவெளியில் வழியாக ஒரு னுறபா செங்குத்தாக வளர்ந்து அதன் முனியில் ஒரு கம்போரகம் உண்டாவிறது. இதற்கு முனை கம்போரகம் என்று பெயர் (படம் 161.) இந்த கம்போரகத்தில் (germ sporangium) பாலினா இனப்பெருக்கத்தின்போது நடைபெற்ற முறைகளில் கம்போரகம் உண்டாகி, அவை வெளியேறிப் புதிய மைஸீசியங்களைத் தோற்றுவிக்கின்றன.

ஹெடரோதாலிஸம் (Heterothallism)

மேற்கூறப்பட்ட பாலினப்பெருக்க முறை இப் பூஞ்சைகளில் வெகு அரிதாகவே காணப்படுகிறது. இதன் காரணத்தை முதன் முதலில் பிளேக்ஸிஸ் (Blakeslee, 1904) என்னும் அறிவியலறிஞர் ஆராய்ந்து எடுத்துரைத்தார். அது என்னவென்றால் இத்தப் பூஞ்சைகளில் சிற்றினங்கள் இருவகைப்படும். ஒரு வகையில், ஒரு கம்போர் முனைந்து, அதனின்றி உண்டான மைஸீசியத்தில் இரு னுறபாக்கள் பாலினப்பெருக்கத்தில் ஈடுபட்டு னைகோட்டு களை உண்டாக்கவல்லன. இவ்விதச் சிற்றினங்களை ஒத்த உடலம் கொண்டவை (homothallic) என்று குறிப்பிடலாம். (உ-ம், மிழுக கார் னுறமோக்ஸ்—*M. bisporalis*). மற்றொரு வகையில் பாலின இணைப்பில் ஈடுபடும் னுறபாக்கள் இரு வேறுபட்ட மைஸீசியங்களைச் சார்ந்திருத்தாலொழிய, இணைப்பு நடைபெறுது. ஒரே தன்மை வாய்ந்த மைஸீசியத்திலிருந்து வரும் இரு னுறபாக்கள் எவ்விதச் சூழ்நிலையிலும் இணையாது.

ஆகவே, புறத்தே பால் வேற்றுமை அற்றபோதிலும் இணைப்பில் ஈடுபடும் இரு னுறபாக்கள் வெவ்வேறு பாரம்பரிய அமைப்பைத் (genetic constitution) தன் நூக்கியல்களில் கொண்டிருத்தல் இச் சிற்றினங்களில் னைகோட் உண்டாவதற்கு இன்றியமையாததாகும். இவ்விதச் சிற்றினங்கள் (+), மைனஸ் (—) என்று இரு வகைகளாக அகலது ஸ்டிரேயின்களாகக் (strains) கருதப்படுகின்றன. ஆகவே, மைஸீசியத்தைத் தோற்றுவிக்கும் கம்போர் + அல்லது — ஸ்டிரேயின்கு இருத்தால், முறையே + அல்லது — மைஸீசியத்தைத்தான் உண்டாக்குகிறது. பாலினப்

பெருக்கத்தில் போது இரு வேறுபட்ட (எஃசுரேயின்) வகைகளில் வகைகள் அடுத்தடுத்து வளர நேரிட்டால் இருவகை ஊறுபாக்களாகும். இவையே வகைகாட்டுகள் மிகுதியாக உண்டாகும். இவ்விதச் சிறப்புத்தன்மை பல பூஞ்சைகளில் காணப்படுகின்றது. இந்த நிகழ்ச்சி (phenomenon) ஹெட்டெரோதாலிஸம் (heterothallism) என்று குறிப்பிடப்படுகின்றது.

வகை : ஆஸ்கோமைஸிடீஸ் (Class : Ascomycetes)

ஆஸ்கோமைஸிடீஸ் என்று அழைக்கப்படும் பூஞ்சைகள் வகைக்கோமைஸிடீஸைக் காட்டிலும் பரிணாம நிலையில் உயர்த்தவையாகக் கருதப்படுகின்றன. [ஆஸ்கோமைஸிடீஸும் பெசிடியோமைஸிடீஸும் உயர் பூஞ்சைகள் (higher fungi) ஆனன]. இப் பூஞ்சைகள் ஆங்கன் (Ascoms) என்ற தனித்தன்மை பொருத்திய வ்யோரகத்தைப் பாலினப் பெருக்கத்திற்குப்பின் உண்டாக்க வகை, ஒவ்வொரு ஆங்கனிலும் பொதுவாக எட்டு ஆஸ்கோஸ்போர்சுகள் (ascospores) உண்டாகின்றன. ஒரு சில பேரினங்களில் 4 ஆஸ்கோஸ்போர்சுகளே தோன்றுவதும் உண்டு.


இப் பூஞ்சைகளில் பல விவசாயத்திலும், மருத்துவத்திலும், ஆகத் தொழில்களிலும் பயன்படுத்தப்படுகின்றன. பல தாவர நோய்களுக்கும் இப் பூஞ்சைகளே காரணம். சான்று, திபுரோ வ்யோரா போன்ற பேரினங்கள் பாரம்பரிய இயல் ஆராய்ச்சியில் பெரிதும் உதவியுள்ளன.

இப் பூஞ்சைகளின் உடலம் ஒரு சில பேரினங்களைத் (உ.ம். சான்று—yeast) தவிர மற்றெல்லாவற்றிலும் ஊறுபாக்களைக் கொண்ட அமைனியமாகும். இந்த ஊறுபாக்கள் குறுக்குச் சுருட்டல் அடியதால் (வகைக்கோமைஸிடீஸைப் போல் அல்லாமல்) பல செவ்வகவடிவப் பிரிக்கப்பட்டுள்ளன. ஆனால், குறுக்குச் சுவர் ஒவ்வொன்றிலும் ஒரு சிறு துவாரம் இருப்பதால் எல்லாச் செவ்வகமும் ஒன்றுடன் ஒன்று சேர்த்தோடுகின்றன. ஒவ்வொரு தோடர்பு கொண்டுள்ளன. செவ்வகம் ஒரு தூக்கியால் கொண்டே காணப்படும். பாலின இனப்பெருக்கம் இப் பூஞ்சைகளில் பெரும்பாலும் செவ்வகப்பாடு, மொட்டுவடிவம் (budding) அல்லது கொண்டியோஸ்போர் (conidiospore), கிளாமிடோஸ்போர் (chlamydospore) மூலம் நடைபெறுகிறது.

பாஸிஸப் பெருக்கம் : இப் பூந்தாசனஞ் சிவவற்றிக் (உம். சண்டு) பாஸிஸப் பெருக்கம் இணைப்பு முறையில் (conjugation) நடைபெறுகின்றது. ஆனால், பெரும்பாலானவற்றில் 'கைகமி' முறையில் பாஸிஸப் பெருக்கம் ஏற்படும். ஆஸ்பாக் உறுப்பான ஆத்தரிடியமும் பெண்பாதுறுப்பான ஆஸ்கொகோனியமும் (ascogonium) சுற்றுபாக்களில் துளியிக் தொன்றுகின்றன. சிவ பேரினங்களில் ஆஸ்கொகோனியத்தின் மேல்பாகத்தில் டிகரை கோணகம் (trichogyne) என்ற குழல் போன்ற வளரி அமைந்திருக்கிறது. இப் பூந்தாசனிக் கருவுறுதலின் முக்கிய அம்சம் யாதெனில், ஆண் நூக்கியல்கள் ஆஸ்கொகோனியத்துக்குள் (டிகரைகோணகம் மூலம்) பிரவேசித்தவுடன் பெண் நூக்கியல்களுடன் ஒன்றுடன் ஒன்று சேராமல் இணையாக (தோடியாக—in pairs) அமைகின்றன. ஆனால், ஆத்தரிடியத்தின் ஸைட்டோபிளாசத்துடன் களக்கிறது. எனவே, இந்தப் பூந்தாசனிக் புரோட்டோபிளாஸ்ருகனே முதலில் இணைகின்றனவேயன்றி (plasmogamy) நூக்கியல்கள் இணையதில்லை (karyogamy). எனவே பிளாஸ்மோகமி நடைபெறுகின்றதே தவிர கேரியோகமி ஆஸ்கொகோனியத்தில் நடைபெறுவதில்லை.

பின்னர் ஆஸ்கொகோனியத்தின் மேல்பாகத்திலிருந்து பல இனங்கள் (filaments) தொன்றுகின்றன. இவற்றிற்கு ஆஸ்கோஜீனல் இனழகன் என்று பெயர். இந்த இனழ ஒவ்வொன்றும் கொக்கி போன்ற (hook shaped) மேல்பாகத்தை உடையது. ஒவ்வொரு இனழமீறும் ஒரு தோடி நூக்கியல் (ஒரு பெண், ஒரு ஆண் நூக்கியல்) ஆஸ்கொகோனியத்திலிருந்து நகர்ந்த பிறகு குறுக்குச் சுவர் தொன்றுகிறது. ஆகவே, வளைந்த பாகத்தில் (arc) இரு நூக்கியல்கள் கொண்ட நுனிச் செத்துக்கு அடுத்த செல்வாக (sub-terminal or penultimate cell) ஒரு செல் காணப்படும். இதனே, பின்னர் ஆஸ்கல் (ascus) என்ற ஸ்போர சுத்தை உண்டாக்குகின்றது. இந்தச் செத்துக்கு ஆஸ்கல் தாய்ச் செல் (ascus mother cell or ascus initial) என்று பெயர் (படம் 162 உ.). ஆஸ்கல் உண்டாவதற்குமுன் இரு நூக்கியல்களும் (ஆண் நூக்கியலும் பெண் நூக்கியலும்) (syngamy) இரட்டைமய கலையோட் நூக்கியலாக மாறுகின்றன. இந்த நிலச்சீரிலே ஆஸ்கோகமஸீட்டின் பாஸிஸப் பெருக்கத்தில் முக்கியப் படிவமாகும் (கருவுறல் படிவம்). பின்னர் இந்த இரட்டைமய நூக்கியல் தொடர்ந்து மூன்று முறை (சிவ் சித்திரங்களில் இரண்டு முறை) பகுபடுகின்றது (படம் 163 ஊ, எ). அவற்றுள் முதலாவது பாதுபாடு கையாலின் முறையில் நடைபெறுகின்றது. இரண்டாவது, மூன்றாவது பகுபடுதல்

'கைடாஸிஸ்' முகையில் நடைபெறுகின்றது. ஆகவே, பின்னர் உண்டாகும் 8 நூக்கியங்கள் (ஆகஸ்து 4 நூக்கியங்கள்) ஒன்றை மயமானவை (free nuclear division). நீண்டு வளர்ந்த பைபோன்ற ஆஸ்கஸிஸ், ஒன்றாகித் துள்ளுக இவை வரிசையாக



படம் 162

ஆஸ்கஸிஸ் ஆஸ்கஸிஸ்களும் உண்டாகும் படிக்கை

ஆஸ்கஸிஸ். இந்த எட்டு நூக்கியங்கள் கைட்டோபிளாசத்திலும் குழம்பட்டு, நீள் வட்டவடிவ (ellipsoidal) உறையுள்ள ஆஸ்கோஸ்போர்களைக் மாற்றுகின்றன. (படம் 162 ஏ). இந்த ஆஸ்கோஸ்போர்கள் நொன்றிய பிறகு நிரிதளவு (ஆஸ்கஸிஸ்) கைட்டோபிளாசம் எஞ்சியுள்ளது, இதற்கு 'எபிபிளாசம்'

(epiplasm) என்று பெயர். இது சர்க்கரைப் பொருள்களைக் கொண்டிருத்தலால் காற்றின் சரத்தைக் கிரகித்துக் கன அளவில் பெருகக் கூடும். அப்பொழுது இவை ஆஸ்கோஸ்போர்ஸ்களின் மேல் அழுத்துவதால் ஆஸ்கஸின் உச்சிப் பாகத்தில் உறை கிழித்து ஆஸ்கோஸ்போர்ஸ்கள் வேகமாக லீசி எழியப்படுகின்றன (explosive discharges). இதனால் ஆஸ்கோஸ்போர்ஸ்கள் நெடுந் தூரம் பரவ ஏதுவாகுள்ளது. இவ்விதமாக உண்டாகும் ஆஸ்கஸ்கள் (asci) சில பேரீனங்களில் போர்வை (cover) இன்றி இருத்தலால் பாதுகாப்பு அற்றவைவாக உள்ளன (உ-ம். சன்ட்). ஆனால் பெரும்பாலான பேரீனங்களில் இந்த ஆஸ்கஸ்கள் உண்டாகும்போதே கீழ்க்கண்ட ஹைபாக்களினின்றும் கிண்கள் தோன்றி ஆஸ்கஸ்களைச் சுற்றிப் பாதுகாப்புக்காகப் போர்வைவை அமைத்துக் கொள்கின்றன. இந்தப் போர்வைக்குப் (கனித் தோலுக்கு) பெரிடியம் (peridium) என்று பெயர். ஆகவே, போர்வைவுடன் கூடிய ஆஸ்கஸ்கள் கொண்ட கனிக்கு (fruit body) ஆஸ்கோகார்ப் (ascocarp) என்று பெயர். ஆஸ்கோகார்ப் மூன்று வகைப்படும் :

(1) கிளீஸ்தேசியம் (Cleistothecium) : பெரிடியம் ஆஸ்கஸ்களை முழுதும் மூடியுள்ள காரணத்தால் பெரிடியம் தாமதமே கிடைவடைந்த பிறகே ஆஸ்கோஸ்போர்ஸ்கள் பரவ இயலும் (உ-ம். பெனிகிலிஸியம்).

(2) பெரிதேசியம் (Perithecium) : பெரிடியம் ஆஸ்கஸ்களை மூடியிருந்த போதினும் மேல் பாகத்தில் ஆஸ்டியோல் (ostiole) என்ற ஒரு துண்டுவாரத்தைக் கொண்டிருத்தலால் அதன் மூலம் ஆஸ்கோஸ்போர்ஸ்கள் வெளியேற இயலும். (உ-ம்.) கிளேவிசெப்சு (Claviceps).

(3) அபோதேசியம் (Apothecium) : பெரிடியம் குவளை (cup shaped) அல்லது தட்டுப் போன்று அமைத்து அதன் மேல் பாகத்தில் நூற்றுக்கணக்கான ஆஸ்கஸ்கள் ஒரே சமதளத்தில் அமைத்திருப்பது (உ-ம். பைரோனீமா -Pyronema, பெனெட்டா Peziza).

ஆஸ்கோஸ்போரீடியஸ் வகையாடு : ஆஸ்கோஸ்போரீட்டில் தெறமி ஆஸ்கோஸ்போரீட்டிடி (Hemiascomycetidae) என்றும், ஐ-ஆஸ்கோஸ்போரீட்டிடி (Eu-ascomycetidae) என்றும் இரு துணை வகைகளாகப் பிரிக்கப்பட்டுள்ளன. முதலில் கூறப்பட்ட வகையின் குணநிசயங்களாவன : (1) இணைப்புமுறைப் பானிணப்பெருக்கம் (conjugation). (2) ஊனகோட் நேரடியாக ஆஸ்கஸாகச் செயல்

படுவது (ஆன்கோஜீனம் கைறபா உண்டாவதிலும்). (3) ஆன்குக்கம் பாலுக்காப்பற்றன. அதாவது, ஆன்கோகார்ப் என்னும் கனி உண்டாவதிலும் (உ-ம். சஸ்ட் குடும்பம்). அதற்கு எதிர் மாறாக ஐ ஆன்கோமைஸிடீடியில் ஊசுமி முகையின் பாலினம் பெருக்கம் நடைபெற்று ஆன்கோஜீனம் கைறபாக்களில்மேல் ஆன்குக்கம் உண்டாகின்றன. இவை பெரிடிவத்தால் சூழப்பட்ட ஆன்கோகார்ப்புகளை உண்டாக்க வல்லன. ஆன்கோகார்ப்பின் அமைப்பை அடிப்படையாகக் கொண்டு இந்தத் துணைவகை மூன்று வரிசைகளாக (series) வகைப்படுத்தப்பட்டுள்ளது.

(1) பிளாக்டோமைஸிடீஸ் (Plectomycetes): ஆன்கோகார்ப் மூத்திலும் மூடப்பட்ட சென்டோஜீனியம் உள்ளது (உ-ம். பெனீசீலியம்—*Penicillium*).

(2) பைரோமைஸிடீஸ் (Pyrenomycetes): ஆன்கோகார்ப் ஆழ்புறமான கடிவ பெரிஜீனியமாக உள்ளது (உ-ம். கிளேவீ செம்—*Claviceps*).

(3) டிஸ்கோமைஸிடீஸ் (Discomycetes): ஆன்கோகார்ப் குவளை போன்ற நிறத்த அபொஜீனியமாக உள்ளது (உ-ம். பைரோனீஸ், பெனெஜா—*Pyronema, Penzsa*).

துணைவகை : ஹெமி ஆன்கோமைஸிடீடி
(Sub class Hemiascomycetidae)

பெருங்குடும்பம் : என்டோமைஸிடீடேனிஸ்
(Order: Endomycetales)


குடும்பம் : சேக்கரோமைஸிடீடேனிஸ்
(Saccharomycetaceae)
(சஸ்ட்-Yeast)

சேக்கரோமைஸிடீஸ்

சஸ்ட் குடும்பத்தைச் சேர்ந்த இப் பேரினம் பெரும்பாலும் சர்க்கரைக் கரைசல் கொண்ட பொருள்களில்மீது காணப்படும். உதாரணமாகப் பூக்களின் தேன் சுரப்பிகளிலும் (nectaries) பழங்களின் தோக்களின் மேலும், மரங்களிலிருந்து வடியும் சர்க்கரைக் கரைசல் பொருள்களிலும் சாதாரணமாகக் காணப்படும்.

இதன் உடம்பம் (மைஸீனியம் ஆற்று) ஒரு செக்ஸாங்கானது (படம் 183). நீள்வட்டம் ஆகிறது முட்டை வடிவமான இத்தச் செக் பெரும்பான்மை கைட்டினிகுக் (elastic) ஆன உறை மூடையது. புரோட்டோபிளாஸ்டின் தடுவின் ஒரு பெரிய துண்

குமிழி உள்வது. அதன் துருவத்தில் ஓர் உருண்டையான அமைப்பும் காணப்படும். சமீப காலம் வரை சிலர் வேக்குழல் போன்ற அமைப்பை நூக்லியஸ் என்றும், உருண்டையான அமைப்பை சென்ட்ரோசோம் (centrosome) என்றும் மிவர் நூக்லியோலஸ் (nucleolus) என்றும் கருதி வந்தனர். ஆனால் கைக்ட்ரான் மைக்ரோஸ்கோப்பின் உதவியால் செயல்பட்ட ஆராய்ச்சி களிலின்றும் உருண்டையான அமைப்பு நூக்லியஸ் என்றும்,



படம் 163


சேக்ரோமைன்—உடகச் செல்

சேக்ரோமைன்—உடகச் செல் மொட்டு விடுதல்

அதை அடுத்துள்ள வேக்குழல் போன்ற அமைப்பு சேப் வேக்குழல் (sap vacuole) என்றும் திர்ணயிக்கப்பட்டுள்ளது. மற்றும் அங்விரு அமைப்புகளுக்கும் தனித்தனி ஜங்ஷன் அமைத்திருப்பதும் இந்தக் கொள்கையை ஊர்ஜிதப்படுத்துகிறது. செல்லின் னைட்டோபிளாஸ்திக் கிளோசோஜன் (glycogen), காகிபூபிக் (calium) முதலான சேமிப்புப் பொருள்கள் காணப்படுகின்றன.

பாஸிங் இன்பெருக்கம் : இப் பூஞ்சையில் பாஸிங் இன்ப் பெருக்கம் மொட்டுகளிடம் (budding) மூலம் நடைபெறுகின்றது. அதாவது முதலில் செல்லின் ஒரு பக்கத்தில் ஒரு சிறு வளர் (outgrowth) அங்ஊறு மொட்டு (bud) தோன்றுகிறது. அப்போது செல்லின் நூக்லியஸ் மைடாஸிஸ் வழி பாகுபாடடைகிறது. ஒரு சேப் நூக்லியஸ் அந்த மொட்டுக்குள் பிரவேசிக்கின்றது. அந்த மொட்டு பெரிதானபின் பின்னர் தாய்ச் செல்லிலின்றும்

பிரித்து மற்ருஞ் தனிச்செய்கைச் செயல்படுகிறது. இவ் சமயம் கனிக் கூந்த மொட்டு தனியே பிரிவதற்குமுன் மற்ருஞ் மொட்டு ஐந்தே தோற்றுவிக்கின்றது (படம் 163). ஆகவே, பன செக்கன் கொண்டு, சிறு சக்திவி போன்ற அமைப்புகள் தோன்றுகின்றன. இதைப் பொய் அமலீலியம் (pseudo-mycelium) என்று சூழிப் பிடுவர். ஆகும், இதிலுள்ள செக்கன் எனில் தனித்தனியே பிரிவவல்லன.



படம் 164

செக்கரோமைஸஸ் வாழ்க்கைச் சுழல்

அ, உடகச் செக், ஆ, மொட்டு விடுதல், இ, இரு ஒற்றைமய செக்கன் இணைதல், எ, கனிகோட், உ, இரட்டைமய செக் (கனிகோட்) மொட்டுவிடுதல், ஈ, இரட்டைமய செக்கிலித் ஆக்ஸிகோட்போட்கள் உண்டாதல், ஈ, வெவ்வேறு ஒற்றைமய ஆக்ஸிகோட்போட்.

யானினப் பேருக்கம் : யானினப் பேருக்கம் இணைப்பு (conjugation) முறையில் தடைபெறுகின்றது. இப் பூஞ்சையின் செக்கன் சாதாரணமாக ஒற்றைமய நூக்கலியனுடையது (haploid) ஆகவது இரட்டைமய நூக்கலியனுடையது (diploid) காணப்படும்.

ஆனால், இருவகைச் செய்களும் (haploid and diploid) மொட்டு விடுதல் (budding) மூலம் தாமதமே பல செய்களை உண்டாக்க வல்லன (படம் 164 ஆ, உ).

அதாவது முறையே ஒற்றைமய அல்லது இரட்டைமயச் செய்களையே உண்டாக்கவல்லன. உகந்த (compatible) இரு ஒற்றைமய செய்கள் (haploid cells) அண்மையில் அமைந்தால் சிறு வளரிகள் மூலம் முதலில் இணைந்து, பின்னர் இரு செய்களும் முழுதும் ஒன்றோடொன்று இணைகின்றன. இரு புரோட்டோபிளாஸ்டுகளும் நூக்கியல்களும் இணைந்தபின் இரட்டைமய மைக்கோட்டா உண்டாகிறது (படம் 164 இ, ஈ).

பின்னர் இந்த மைக்கோட்டின் நூக்கியல் மையரளவில் முறையில் பிரிவடைந்து ஒற்றைமய ஆஸ்கோஸ்போர்களைத் தோற்றுவிக்கின்றது. இரண்டு பீரிக்ஸைகள் மட்டுமே தடைபெறுவதால் 4 ஒற்றைமய நூக்கியல்களே தோற்றுவிக்கின்றன. இவை மைட்டோபிளாஸ்தினால் குழப்பப்பட்டு, 4 நீள்வட்ட வடிவ ஆஸ்கோஸ்போர்களாக மாறுகின்றன (படம் 164ஊ).

ஆகவே, மைக்கோட் நேரடியாக 'ஆஸ்கஸா'கச் செயல்படுகின்றது. இந்த ஆஸ்கோஸ்போர்கள் மைக்கோட் உதறலினின்றும் வெளிவந்த பிறகு மொட்டு விடுதல் மூலம் பல ஒற்றைமயச் செய்களை உண்டாக்குகின்றன (படம் 164எ). சில சமயங்களில் மைக்கோட் செய் ஆஸ்கோபோர்களைத் தோற்றுவிக்காமல் மொட்டு விடுதல் மூலமே பல இரட்டைமயச் செய்களை உண்டாக்குகின்றது (படம் 164 ஈ, உ). அப்படிப்பட்ட செய்கள் சில சமயங்களில் மையரளவில் முறையில் பாதுபாடடைந்து மூன்று கூறியவாறு 4 ஆஸ்கோஸ்போர்களைத் தோற்றுவிக்கின்றன (படம் 165ஊ).

இந்த நிகழ்ச்சி, பாலிவா இனப்பெருக்கத்தின் படிவம் என்று நிகழ்த்தல் தவறு. பூஞ்சைகள், தொழித்தல் (fermentation) மூலம் சாராயம் (alcoholic fermentation) தயாரிப்பதற்கு காரணமாகவுள்ளன. முக்கியமாக நெகிரோமைஸிஸ் செரேவினி (*S. cerevisiae*), சே. எலிப்சோய்டியஸ் (*S. ellipsoideus*) முதலிய சிற்றினங்கள் சாராய ஆலைத்தொழில்களில் பெருவாரியாகப் பயன்படுத்தப்படுகின்றன. ரொட்டித் தொழிலிலும் (baking industry) இந்த சே. செரேவினி உபயோகப்படுகிறது. மற்றும் பொதுவாக 'B' வகை வைட்டரின் உற்பத்தியிலும் இப் பூஞ்சைகள் ஈடுபட்டுள்ளன.

வரிசை : பீனெக்டோமைசிடீஸ்

(Series: Plectomycetes)

பெருங்குடும்பம் : யுரோஷியேலீஸ்

(Order: Eurotiales)

குடும்பம் : யுரோஷியேலீ

(Family: Eurotiaceae)

ஆஸ்பெர்ஜிலீஸ்

(Aspergillus)

இது யுரோஷியேலீஸ் (Eurotiales) என்ற துணை வகுப்பைச் சார்ந்தது. இதன் பொதுப்பெயர் பசுமைக்காளானாகும் (green mold). இது ஒரு சாறுண்ணி, உணவுப் பொருள்கள், ரொட்டி, அழுகும் காய்கறி வகைகள், சரப்பதை கொண்ட தோல், துணி



படம் 163

அ—கொளிடய கார்பின் பழுத்த நிலைக் கிழங்குடன் தொடர்பு

ஆ—கொளிடய கார்பின் துளியில் கொளிடயம்டன் தொடர்பு

இ. கிழங்குடன் ஆ. கொளிடயம் இ. ஆஸ்பெர்ஜிலீஸ் ஆகும்
 க. ஆஸ்பெர்ஜிலீஸ் - பச்சைத்தோற்றம் உ. ஆஸ்பெர்ஜிலீஸ் - பழுத்ததோற்றம்

மூலவியைகளில் காணப்படுகிறது. இது பறவை விலங்கினங்களில் நோயைவா, ஆந்தமா போன்ற நோய்களை விளைவிக்கின்றது. அப்பொழுது இதன் இலக்டு ஒட்டுண்ணியாகும். கொழி வகைகளில் ஆஸ்பெர்ஜிலீஸினால் (Aspergilliosis) என்ற நோயை விளைவிக்கின்றது. இவை மற்றும் காய்கறி, கனி வகைகளில் அழுகலுக்கு காரணமாகின்றது. சில சிற்றினங்கள் தொழிற்பேட்டைகளில் சிட்ரிக் அமிலம் (Citric acid), குளுகோமிக் அமிலம் (Glucamic acid) கிளைசிரால் (Glycerol) முதலிய

அயிலங்களைத் தயாரிக்கப் பயன்படுகின்றன. பெரும்பாலாள் சிற்றினங்கள் சேமித்து வைக்கப்பட்ட தானிய வகைகளில் அழுகை ஏற்படுத்துகின்றன. அத் தானியங்களை உட்கொண்டால் சில சமயங்களில் நஞ்சாக (food poisoning) செயல்படுகின்றது.

இதன் மைஸீலியம் ஒன்றோடொன்று சின்னிக் கிடக்கும் பன ஹைபாக்கிசுக் கொண்டது. இவை அடித்தளத்தின் மேலே அகலது உள்ளை படருகின்றன. ஒவ்வொரு செல்லும் பன நியூக்லியஸ்கள் கொண்டது.

யானின் இனப்பெருக்கம் : கொலீடியங்களால் தடைபெறு கிறது. மைஸீலியத்திலிருந்து கிளைகளற்ற பன ஹைபாக்கன் செக்குத்தாக வளர்கின்றன. இவை குறுக்குச் சுவரற்றவை. இவைகளுக்கு கொலீடியக் காய்புகள் எனப்பெயர். கொலீடியக் காய்புகளை உருவாக்கும் ஹைபாஸிஸ் செல் அடிச்செல் (foot cell) எனப்படும். ஒவ்வொரு கொலீடியக் காய்பும் மேற்புறமாக கோள வடிவம் பெற்று ஒரு சிறு குமிழி போல் தோன்றுகிறது. இந்த கோள வடிவமான பாகத்தின் சுற்றுப் புறத்திலிருந்து ஒரே சமயத்தில் பன பிலைடுகள் (phalides) தோன்றுகின்றன. இவை ஒவ்வொன்றிலும் பன நியூக்லியஸ்கள் உள்ளன. பிலைடு களின் உள்ளிருந்து (endogenous) கொலீடியாக்கள் மணியோல் தோன்றி மேலிருந்து கீழ் வரிசையில் (basipetal) ஒவ்வொன்றாக வெளியிட்டு சகலியோல் காணப்படுகின்றன. ஒவ்வொரு கொலீடியத்திலும் பன நியூக்லியஸ்கள் உள்ளன. கொலீடியாக்க ள் நீள்வட்ட வடிவத்துடன் பசுமை நிறமாக காணப்படும். இவை காற்றின் மூலம் பரவுவதால் காய்கறி, மூதகாள் பொருள்களெல்லாம் எளிதில் இப் பூஞ்சையால் தாக்கப் படுகின்றன.

யானின் பெருக்கம் : கொலீடியங்களைத் தோற்றுவித்த ஹைபா பாதுறுப்புகளையும் தோற்றுவிக்கிறது. பெண் உறுப்பிற்கு ஆஸ்கோகோனியம் (Ascoconium) என்றும், ஆண் உறுப்பிற்கு ஆந்தரிடியம் (Anthridium) என்றும் பெயர்.

ஆஸ்கோகோனியம் : ஒரு ஹைபாஸிஸ் துனியானது கருண்டு பன செல் கொண்டு ஆஸ்கோகோனியத்தை தோற்றுவிக்கின்றது. இதன் துனி பாகம் ஏற்புக் குழல் போன்ற டிரைக்கோகைன் (Trichogyne) ஆகும்.

ஆந்தரிடியம் : மைசீலியத்திலிருந்து ஆஸ்கோகோனியத் தினருகே மத்தொரு ஹைபா வளர்ந்து ஆந்தரிடியத்தை துனியாகத் திக் தோற்றுவிக்கின்றது. ஆந்தரிடியம் டிரைக்கோகைனுடன்

இனிவந்து காணப்பட்டபோதிலும், இதுவரை கார்பீட்டுகள் இன்னவற்ற வாரும் கண்டதில்லை. சில சிற்றினங்களில் ஆந்தரிடியமே தோன்றுவது கிடையாது. சில சிற்றினங்களில் ஆஸ்கோகோனியத்தின் நியூக்லியஸ்கள் தாமே ஜோடியாக இன்னவது கண்டறியப்பட்டுள்ளது. பின்னர் பல மலட்டு ஹைபாக்கள் (Sterile hypha) பாலின் உறுப்புக்களில் காம்புகளிலிருந்து தோன்றி ஆஸ்கோகோனியத்தை சுற்றி மூடி இரண்டு அடுக்கு களைக் கொண்ட பெரிடியம் (Peridium) என்னும் கவராக மாறுகிறது. இவ்வாறு முழுவதும் மூடிவுள்ள புழுப்பாடி (Fruit body)க்கு கிளைஸ்டோதீசியம் (Cleistothecium) எனப்பெயர். இதன் உள் அடுக்கு உணவு ஊட்டத்தில் பங்கு கொள்கிறது. வெளி அடுக்கு வ்போர்களுக்கு பாதுகாப்பளிக்கிறது. ஆஸ்கோகோனியம் கருவுறுதல் நடைபெற்ற பின்னர் இரு நியூக்லியஸ்கள் கொண்ட செக்கனாகப் பிரிகின்றது. இவைகளிலிருந்து பல கிளைத்த ஆஸ்கோஜீனஸ் ஹைபாக்கள் (Ascogonous hypha) தோன்றி துளிகளில் ஆஸ்கஸ்களை (Asci) தோற்றுவிக்கின்றன. ஒவ்வொரு ஆஸ்கஸிலும் 8 ஆஸ்கோஸ்போர்கள் உண்டாகின்றன. இந்த ஆஸ்கஸ்கள் கிளைஸ்டோதீசியத்தின் ஒழுங்கற்ற முறையில் (Irregular arrangement) பரவிக்கிடக்கின்றன. கிளைஸ்டோதீசியம் கோள வடிவம் பெற்றது. கிளைஸ்டோதீசியம் முதிர்ச்சியடைந்த பிறகு ஆஸ்கஸின் கவர் சிதைவடைவதாலும் மலட்டு ஹைபாக்கள் சிதைவடைவதாலும், ஆஸ்கஸ் கவர்கள் கரைந்து போவதாலும் ஆஸ்கோஸ்போர்கள் சிதறிக்கிடக்கின்றன. வ்போர்கள் தக்க சூழ்நிலை கிடைத்த பொழுது மூளைத்து புதிய கைமலீரியங்களைத் தோற்றுவிக்கின்றன. ஆஸ்பெர்ஜியஸ்களில் சில சிற்றினங்களில் பாலினப்பெருக்க கிளைஸ்டோதீசியத்தின் அமைப்பிலும், முறையிலும் சிறு வேறுபாடுகள் காணப்படுவதால் பூஞ்சை வக்துரை இத்தகைய வேறுபாட்டின் அடிப்படையாகக் கொண்டு ஆஸ்பெர்ஜியஸ்களின் பாலினப்பெருக்க நிலையை (perfect stage) 3 வகையாகப் பிரிக்கின்றார். இவை 1. யூரோஷியம் (Eurotium) 2. எமெரிசெல்லா (Emmericella) 3. ஸார்பெரியா (Sartoriya) என்பனவாகும். சிறப்பாக, எமெரிசெல்லாவின் பண்டுகளான :

(1) பாதுறுப்புக்ள் மூன்கூறப்பட்ட அமைப்புடன் காணப்படுவதில்லை.

(2) பெரிடியம் பல படிவங்களை கொண்டுள்ளது. அத்துடன் குவளைபோல் தடித்த கவர்கள்கொண்ட துள் (Hülle cells) செல்களையும் கொண்டுள்ளது.

பெனிலிலினியம்

(Penicillium)

(பச்சை அல்லது நீலப் பூஞ்சைகள்)


பெனிலிலினியம் என்னும் பூஞ்சை அழகமான காய்கறிகள் (decaying vegetables), ஜாம் (jam), ஊறுகாய் (pickles), இறைச்சி (meat), பானாடைக்கட்டி (cheese) முதலிய உணவுப் பொருள் களின்மேல் பொதுவாகச் சாறுண்ணியாக உணவுவதைக் காணலாம். காற்றில் பரவியுள்ள கம்போர்கள் உணவுப் பொருள் களின்மேல் படித்து, முடிந்தது, இப் பூஞ்சையின் மயசிலியத்தைத் தொற்றுவிக்கின்றன.

மயசிலியம், மெல்லிய உறை கொண்ட ஹைபாக்களால் ஆனது. செடிகள் ஒவ்வொன்றிலும் இரண்டு அல்லது அதற்கு மேற்பட்ட ஹைபைக்கள் காணப்படும். வறட்சிக் காலங்களில் சில சிற்றினங்களில் மயசிலியத்தின் ஹைபாக்கள் எல்லாம் ஒருங்கே சேர்ந்து ஹைபாக்களாக ஆன போர்வைவையப் பெற்று ஓர்வு நிலைபை அடைகின்றன. இந்த அமைப்புக்கு கம்பெனே ரோஷியம் (scalerosium) என்று பெயர். அனுகூலமான காலம் களில் இந்த கம்பெனேரோஷியத்திலிருந்து இயல்பான மயசிலியம் தோன்றுகிறது.

பாலின பெருக்கம் : பாலினா இனப்பெருக்கம் கொனி டியா (conidia) மூலம் நடைபெறுகின்றது. இந்த கொனிடயங்கள் புருக (brush) போன்ற கிளைத்த பல செல் கொண்ட கொனி டியோல்போர்களின் நுனியில் உண்டாகின்றன. கொனிடியோ ல்போர் மயசிலியத்திலிருந்து செக்குத்தாக வளர்ந்து நுனியில் 1-3 முறை அடுத்தடுத்துக் கிளைக்கின்றது. இந்தக் கிளைகள் இணையாக அமைந்திருப்பதாக கொனிடியோல்போர் புருக போன்ற (brush like) அமைப்பைக் கொண்டுள்ளது (படம் 166). கொனிடியோல்போரின் நுனிக்கிளைகளில் தனித்தன்மை வாய்ந்த, குடுவை போன்ற (phialides) செடிகள் உண்டாகின்றன. இவற்றி னின்றும் பல கொனிடயங்கள் சக்திவி போல் வரிசையாகத் தோன்றி பின்னர் காற்றினால் அடித்துச் செல்லப்படுகின்றன. இப் பூஞ்சையில், பச்சை, நீல நிறத்திற்குக் கொனிடயங்களின் உறையிலுள்ள நிறமிடனே காரணமாகும்.

பாலினப் பெருக்கம் : இப் பூஞ்சையில் பல சிற்றினங்களில், பாலினப் பெருக்கம் அறவே காணப்படுவதில்லை. (இக் காரணத் தைக் கொண்டு) சில பூஞ்சை வகையுறிகள் பெனிலிலினியத்தை

புதுடெரோமைஸிட்டிக் சிற் வகைப்படுத்துகிறார்கள். பெனிகிலியம் வெர்மிகுலேட்டதின் (*Penicillium vermiculatum*) பாலினப் பெருக்க நிலையைத் தற்போழுது டெலரோமைஸிடிக் வெர்மிகுலேட்டஸ் (*Talaromyces vermiculatus*) என்று பூஞ்சையியல்



படம் 165 A

பெனிகிலியம் - பாலின இனப்பெருக்கப் படிவம்

வந்துதர்கள் அழைக்கின்றனர். இந்தச் சிற்றினம் ஒன்றில்தான் பாலினப் பெருக்கமுதலின் சில அம்சங்கள் தெரிய வந்தன. அவையாவன :

ஊசலியத்திலிருந்து ஒரு செக்குத்தான ஹைபா இன் ஆஸ்கோஸ்போராகச் செயல்படுகின்றது. இதனால் 32 அல்லது 64 நூக்கலியங்கள் காணப்படும். ஆஸ்கோஸ்போரத்தைச் சுற்றி, மற்ருரு ஹைபா வளர்ந்து நுனியில் ஓர் ஆத்தரிடிவத்தைத்

(படம் 165) தொற்றுக்கின்று. ஆத்தரிடியத்திலிருந்து நூக்கியல் ஆஸ்கோனியத்துக்குள் பிரவேசிக்கும் வடிவத்தை எவரும் கண்டதில்லை. ஆனால் ஆஸ்கோனியத்துக்குள் பல குறுக்குச் சுவர்கள் தொன்றி ஆஸ்கோனியம் இரட்டை நூக்கியல்கொண்ட பல செக்கனாக (bivaccate cell) பிரிக்கப்படுவதைத்தான் காண இயன்றது. இரட்டை நூக்கியல் செக்கன் மெய்தற்றிலிருந்து ஆஸ்கோஜீனல் கறுபாக்கல் பல தொன்றி (படம் 166) முன்




படம் 166

பெரிளிக்கியம் - ஆத்தரிடியமும் ஆஸ்கோனியமும்
ஆஸ்கோனியம் இரட்டை நூக்கியல் கொண்ட செக்கனாகப் பிரிதல்

உறப்பட்ட முறைகளில் அவைகளினின்றும் ஆஸ்கஸ்கள் தொன்று கின்றன. இந்த ஆஸ்கோஜீனல் கறுபாக்கல் வெவ்வேறு மட்டங்களில் தொன்றுவதால் அவைகளினின்றும் தொன்றும் ஆஸ்கஸ்களும் பலமட்டங்களில் அமைந்துள்ளன. இதற்குள் ஆஸ்கோனியத்தைச் சுற்றி கறுபாக்கல் (பெரிடியம்) வளர்த்து ஆஸ்கஸ்களை முற்றிலும் சூழ்ந்து கிளெய்ஸ்டோநீஸியத்தை உண்டாக்குகிறது. (படம் 167). பின்னர் இந்த கிளெய்ஸ்டோநீஸியத்தினுள்ளே ஆஸ்கஸ்கள் கொள வடிவத்துடனும் 4 அல்லது 6 ஆஸ்கோஸ்போர்கள் கொண்டும் காணப்படுகின்றன. பின்னர் ஆஸ்கஸ்களின் உறைகளும் கரைத்து எல்லா ஆஸ்கோஸ்போர்களும் கிளெய்ஸ்டோநீஸியத்திற்குள் பரவலாக அமைந்துள்ளன. பின்னர் கிளெய்ஸ்டோநீஸியத்தின் பெரிடியம் சிதிலிசிதிராகல்

செதவடைத்த பிறகே ஆக்ஸோம்போரிகல் வெனிபேற இயலும். பின்னர் இவை முளைத்துப் புதிய கைசீலியங்களைத் தோற்றுகின்றன. பெயிசிலியத்தின் சிற்றினங்களில் சில, தோல், ஆடை, முதலியவற்றின்மேல் வளர்த்து, அவற்றைச் செதவுறச் செய்கின்றன. ஆனால், சில நன்மை பயக்கும் சிற்றினங்களும் உண்டு. சான்றாக, அங்கக அமிலங்களான சிட்ரிக் (citric), சீரியுமேரிக் (fumaric), ஆக்ஸேலிக் (oxalic), குளுகோனிக் (gluconic) முதலிய அமிலங்களை வர்த்தக முறையில் தயாரிக்கும் தொழிலகங்களில் இவை பெரிதும் பயன்படுத்தப்படுகின்றன. மற்றும் சில,



படம் 167

பெயிசிலியம் - கிசெய்க்டோரிலிபத்தின் குறுக்குவெட்டுத் தோற்றம்

பாலாடைக்கட்டியின் தனிப்பட்ட மணத்திற்கும் காரணமாக உள்ளன. எல்லாவற்றிற்கும் மேலாகப் பெயிசிலியமும் தோட்டேடம் (P. notatum), பெ. கிரைசெனம் (P. chrysogenum) சிற்றினங்களிலிருந்து பெனிலீனை (penicillin) என்ற நுண்ணுயிர் முரண்பொருள் (antibiotic) பிரித்தெடுக்கப்படுகின்றது. இது முதன் முதலில் அவுக்ஸாண்டர் ஃப்ளெயிங் (Alexander Fleming) என்ற ஆக்ஸிசெல விஞ்ஞானியால் 1929ஆம் ஆண்டு கண்டு பிடிக்கப்பட்டது. இந்தப் பெனிலீனின் மருத்துவத் துறையில் தனிமொத்த மருந்தாகும். இக் கண்டுபிடிப்பின் பயனாகச் சென்ற உலகப் போரின் போதும் அதன் பின்னரும் பல கோடி மக்களின் உயிர்கள் காக்கப்பட்டது என்பது யாவரும் மறுக்க முடியாத உண்மை. இனி வரும்காலத்திலும் இது சில பாக்டீரியா தோல் கனுக்கு அருமருத்தாகத் திகழ்வென்பதில் ஐயமில்லை.

தொகுதி : ஆஸ்கோமைஸிட்டு

(Division : Ascomycetes)

வரிசை : ஸபரினோமைஸிட்டு

(Series : Pyrenomycoetes)

பெருக்குடும்பம் : சுப்.நிரியோலீஸ்

(Order : Suphiriales)

நியூரோஸ்போரா

(Neurospora)

இந்த பூஞ்சைக்கு "நியூரோஸ்போரா" என்ற பெயர், இதன் ஆஸ்கோஸ்போராவின் வெளிப்புறத்தில் நரம்பு போன்ற மேடுகள் காணப்படுவதால் இடப்பட்டது. இது முதன் முதலில் 1843-ம் ஆண்டு கண்டுபிடிக்கப்பட்டது. 1917-ம் ஆண்டு வரை இதை இம்பெரீக்பெக்ட் (Imperfectae) பூஞ்சை தொகுப்பில் "மொனிலியா" (Monilia) என்ற பெயருடன் விளக்கிற்று. அப்போது இதில் பானிஸ்ப் பெருக்கம் கண்டுபிடிக்கப்படவில்லை. 1917-ம் ஆண்டு, F.O. டாட்டி (F. O. Dodge) என்பவர் இதில் பானிஸ்ப் பெருக்கத்தையும், அதில் ஆஸ்கோஸ்போராவும், கனி உடலும், ஸபர்கோஸ்கோனிடிகளின் முதலியவை காணப்பட்டதால் இதை ஆஸ்கோமைஸிட்டுகள் என்ற தொகுப்பில் இடின்தார்.

இப் பூஞ்சைக்கு 'வெம்பு காளாக்' என்று பெயர் (red mold). இப் பூஞ்சை ரொட்டியிலும், செயற்கை வளர் தனத்திலும் எளிதாக வளரக்கூடியது. இது ரொட்டி மிடக்கு கலில் சேதாரம் விளைப்பதால் இதற்கு "பேக்கரி மோல்ட்" (bakery mold) என்றும் பெயர். இதில் சுமார் மூன்று சிற்றினங்கள் உள்ளன, அவை


நி. சைட்டோபிலீஸ் (N. Sitophilla)

நி. கிராஸா (N. Crassa)

நி. டெட்ராஸ்பெர்மா (N. Tetrasperma)

இதன் மைனீஸியங்கள் தனத்திற்கு புறம்பே படருகின்றன. இவைகள் கொண்டவை. எதுபாக்களில் தடுப்புச்சுவர் உண்டு. ஒவ்வொரு செவ்விலும் சுமார் 12 அல்லது அதற்கு மேல் எண்ணிக்கையில் நூக்கலியங்கள் உள்ளன.

திரெளகம்பேரர்



படம் 167 A திரெளகம்பேரர்

அ. கனிவாய்வு ஆ. உடலம் இ. கனுவாக்களில் மேக்ரோகோனிட்யங்கள்
தோன்றல் எ. கனுவாக்களில் மைக்ரோகோனிட்யங்கள் தோன்றல் உ. ஆக்
கோலாப் (கனிவுடலம்) ஊ. 5 ஆக்சோம்பேரர்களைக் கொண்ட ஆக்கல்
எ. ஆக்சோம்பேரர்கள்

மாதிரி இளம்பெருக்கம் : கானிட்யங்கள் மிகவும் நடைபெறு
இறது. பல தூக்கியங்கள் கொண்ட பெரிய ஆக்கது "மேக்ரோ
கோனிட்யங்கள்" (macroconidia) தோற்றுவிக்கப்படுகின்றது.

தற்பாக்களிலிருந்து நேர் செங்குத்தான கொனிடியோகாம்புகள் தோன்றுகின்றன. இதில் ஒன்றன்மீது ஒன்றாக இந்த ஸ்போர்களை உருவாக்கின்றன.

மணியைப் பெருக்கம் : மணியைத் தீயிடுகின்ற நேரான உறுப்புகள் தோன்றுகின்றன. இதன் பக்கவாட்டிலிருந்து ஒன்றை நூக்கியல் கொண்ட ஸ்போர்களை மோட்டு விடுகின்றன. இவைகளுக்கு "மைக்ரோ கொனிட்யங்கள்" என்று பெயர். இவை மிக நுண்ணியவை. இவை ஆண் ஸ்போர்களுடனான ஸ்பெர்மோஸியங்களுக்கும், ஸ்பெர்மோஸியங்கள் சில சமயங்களில் முனைந்து மைனியைக்கொண்டும் தோற்றுவிக்கின்றன. எல்லா சிற்றினங்களும் ஆண்கொனியம், ஸ்பெர்மோஸியம், கொனிட்யம் முதலியவைகளைத் தோற்றுவிக்கின்றன. ஆனால் பாலினத் தன்மையில் மாறுபடுகின்றன.

தி. டெட்ராஸ்பெர்மா — தோமோதாலிக் (Homothallic)
(ஒத்த உடலம்)

தி. ஹெட்டோபீயிகா } —தெட்ரோதாலிக் (Heterothallic)
தி. கிராஸ்கா } (மாறுபட்ட உடலம்)

ஆண்கொனியம் : இது தற்பாலிலிருந்து பக்க வளர்ப்பாக தோன்றுகிறது. இது சுருண்ட அமைப்புடையது. பல நூக்கியல்கள் கொண்டது. சில ஆண்கொனியங்களில் குறுக்குச் சுவர் அமைந்து 5-10 செங்கனாக உள்ளன. இவை பல நூக்கியல்கள் கொண்ட செட்கள். இதன் அடி செல்லிலிருந்து பல மைட்டு (sterile) தற்பாக்கள் எழும்பி ஆண்கொனியத்தைச் சுற்றி ஒரு அடர்த்தியான உருளை நிறளாக அமைகின்றன. ஆண்கொனியத்தின் பல செட்களிலிருந்து டிரைக்கோகைக்கள் (trichogyae) உதிக்கின்றன. ஆனால், சில குறிப்பிட்ட வகைகளில் நுனி செல் மட்டும் டிரைக்கோகைகள் தோற்றுவிக்கின்றது. டிரைக்கோகைக்கள் ஆண்கொனிய உறைபின் வெளியே வந்த பிறகு அவை கிடைக்கின்றன. இவ்வாறு உருப்பெற்ற உடலத்திற்கு "புரோட்டோ பெரிதீசியம்" (protopenthecium) என்று பெயர். தக்க ஸ்பெர்மோஸியங்கள், கொனிட்யங்கள் கிடைக்காவிடில் இது மேலும் வளருவதில்லை. ஆனால் உகந்த ஸ்பெர்மோஸியங்கள் அல்லது கொனிட்யங்கள் கிடைத்த போது டிரைக்கோகைகள் ஆனது, அதை நோக்கி வளர்ந்து அதனுடன் இணைகிறது. இந்த வளர்ச்சி ஒரு வேதி நாட்டமாக (chemotropism). இருக்கலாம் என்று கருதப்படுகின்றது. ஸ்பெர்மோஸியம் அல்லது கொனிட்யத்தின் நூக்கியல் ஆனது டிரைக்கோகைகளால் செல்கின்றது. நூக்கியல்கள் இணையாமல்

பக்கவாட்டில் (pairing) அமருகின்றன. இதைத் தொடர்ந்து ஆஸ்கோகோனியம் நெருக்கமான ஒழுங்கற்ற உருவம் கொண்ட பல நூக்கியங்கள் உடைய ஆஸ்கோஜினம் கற்றுப்பாவாவின்றது. இவற்றில் சில செங்கள் இரு நூக்கியங்கள் உடைய குரோஸ்டியர்களாகும் (croziers). இவைகளில் இணைப்பு ஏற்பட்டு தொடர்ந்து மைல் பகுப்பு உண்டாகின்றது. முதலில் செல் வானது ஒரு ஆஸ்கஸ் (ascus) ஆக உருபெருகின்றது. இந்த செல் ஹெடரோகாரியாடிக் (heterokaryotic). ஒவ்வொரு ஆஸ்கஸ் உள்லும் 8 ஆஸ்கோஸ்போர்கன் தோன்றுகின்றன. ஆனும் தி. டெட்ராஸ்பெர்மாவின் ஆஸ்கஸ்களில் நான்கே ஆஸ்கோஸ்போர்கன் உள்ளன. இதனால்தான் இச்சிற்றினத்திற்கு இப் பெயர் வந்தது. இந்த ஆஸ்கோஸ்போர் ஒவ்வொன்றிலும் இரு நூக்கியங்கள் உள்ளன. திபூரோஸ்போராவின் எக்ஸாசிற்றினங்களின் ஆஸ்கோஸ்போரிலும் அவை வெளியேற்றப்படுவதற்கு முன்பு நூக்கியவரின் எண்ணிக்கை அதிகரிக்கின்றது.

ஆஸ்போகாரிம் : ஸ்பெர்மடைஸேஷன் (Spermatisation) முடிந்த பிறகு, புரோட்டோ பெரிதீசியத்தின் ஆஸ்கோகோனியம் அல்லாத ஒரு பாகம் பெரிதீசியத்தின் மூல்டு பாகமாகிறது. இதன் உடலம் கருத்த வண்ணம் கொண்டது. போலிபாரைபஸிகள் (pseudoparasphysis), பெரிடியம் (Peridium) முதலிய பாகங்களைக் கொண்டது. பெரிடியத்தின் மேல்பாகம் நீண்டு கழுத்து போன்று அமைந்து அதன் நுனியில் ஒரு ஸ்ட்மமான நுண்ணுளை கொண்டுள்ளது. இத்தலைக்கு ஆஸ்டியோஸ் (ostiole) என்று பெயர். கழுத்தின் உட்புற கூவரிக் பாரைபஸிகள் உள்ளன. பாரைபஸிகள் உள்ளே ஆஸ்கஸ்களுடன் கனத்தும் காணப்படுகின்றன. ஆஸ்கஸ்களில் 8 ஆஸ்கோஸ்போர்கன் உள்ளன. முதிர்த்த பெரிதீசியங்கள் பேரி வடிவம் கொண்டவை. இவைகளில் பாரைபஸிகள் கிடையாது. ஆஸ்கோஸ்போர்களின் வெளிப்புற கூவரின்மீது தரம்பு போன்ற மேடுகள் உள்ளன. முதல் முதலில் ஒவ்வொரு ஆஸ்கோஸ்போரும் ஒற்றை நூக்கியம் கொண்டவை. பிறகு அவைகளில் இரண்டு ஒற்றைமய (diploid) நூக்கியங்கள் தோன்றுகின்றன. ஆஸ்கஸ்க்கில் உள்ள 8 ஆஸ்கோஸ்போர்களில் நான்கு ஒரு அம்சத்தைச் சார்ந்தவை. மற்ற நான்கு வேறொரு அம்சத்தைச் (strain) சார்ந்தவை.

திபூரோஸ்போரா—ஒரு மரபியல் கருவி

சமீபத்தில் திபூரோஸ்போராவை ஒரு மரபியல் கருவியாக உபயோகிக்கின்றனர். இதன் வாழ்நாள் பத்து. இது ஒரு ஒற்றைமய உயிர். இதில் ஒரே வகை குரோசோமோம்கள்

உள்ளன. இதனும் ஒரே வகை பண்புதான் தோன்றும். அது ஒன்று விஞ்சு தன்மை (dominant) பெற்றுவது அம்மை பின்னடையும் (recessive) இயல்புள்ள தன்மை பெற்றுவது விளங்கும். மேற்கூறிய இப்பண்புகளினும் இது மரபியல் கருவி வாக ஏற்கப்பட்டுள்ளது.

1930ஆம் ஆண்டு நியூயார்க் தாட்டைச் சார்ந்த (Botanical Garden, New York) F.O. டாட்ஜ் (F.O. Dodge) என்பவரின் மேற்கூறிய பண்புகளினாலும், எட்டு ஆல்கோல்போர்கள் ஒன்றன்பின் ஒன்றாக அமைத்திருந்த தன்மையாலும் இதை மரபியல் கருவி வாக உபயோகிக்கவானார். பிறகு 1940ஆம் ஆண்டு ஜார்ஜ் பீட்டர், எட்வர்ட் டாடும் (George Beadle and Edward Tatum) என்னும் மரபியல் நிபுணர்கள், இதில் 8 ஆல்கோல்போர்கள் கோர்வை மூன்றாவில் அமைந்தமையால் எளிதில் ஆல்களிலிருந்து ஒன்றன்பின் ஒன்றாக ஸ்போர்களை அகர் பிளாக்கில் எடுத்து அவைகளை செயற்கை வளர் தளத்தில் முளைக்கச் செய்து மரபியல் ஆராய்ச்சி செய்தனர். இவர்களுக்கு இதனும் நோபெல் பரிசும் வழங்கப் பட்டது. இந்த ஸ்போர்கள் முளைத்து இரண்டு வண்ணங்களாகக் கொண்டவைகளிலியத்ததைத் தோற்றுவித்தன. ஒரு வகை வெள்ளை நிறத்ததையும், மற்றொரு வகை மஞ்சள் நிறத்ததையும் பெற்றிருத்தது. நியூரோல்போராவில் +, - என்ற இருவகை அம்சங்கள் இருத்தன. இதில் A+ என்ற அம்சம் (strain) ஆர்ஜினை என்ற வேதியியல் பொருளை எளிதில் கட்டுகின்றது. ஆனால், A- என்ற அம்சம் இதை கட்டமுடியவில்லை. செயற்கை வளர்தளங்களில் வைட்டமின் B பொருட்கள், குளுகோஸ், தாதுப் பொருள்கள், வளர்ச்சியை ஊக்குவிக்கும் பொருள்கள் இவைகளை இணைத்து, இதில் நியூரோல்போராவை வளர்த்தால் அவை எளிதில் அமினோ அமிலங்களை கட்ட முடிவிறது. மேலும் A+, A- அம்சங்களை இணைக்க வைத்து, அதன் மூலம் ஆல்க் கோளியத்தைத் தோற்றுவித்து, அதில் ஆல்கங்கள் தோன்றினால் இவைகளில் உள்ள 8 ஆல்கோல்போர்களில் 4 ஸ்போர்கள் A+ அம்சமாகவும், 4 ஸ்போர்கள் A- அம்சமாகவும் அமைந்தன. பிறகு 4 A- ஸ்போர்களை செயற்கை தளத்தில் ஆர்ஜினை என்ற வேதியியல் பொருளைச் சேர்த்து வளர்த்ததால் அவை முளைத்தன.

இந்த ஆராய்ச்சியின் மூலம் நிற்கக்கூடா மரபியல் பண்புகளை எளிதில் நிரூபித்தார்கள் :-

(1) ஒவ்வொரு குரோமோசோமிலும் உள்ள வெண்புரோமோமெரானது (centromere) குரோமோசோமின் உருவத்தை நிர்ணயிக்கின்றது.

(2) உருவம் ஒத்த குரோமோனோம்கள் மையங்களில் (metacosis) பகுப்பின் போது 2 குரோமோனோம்களாக பகுக்கப்படுகின்றது.

(3) குறுக்கெதிர் மாற்றம் நடைபெறாமல் போனால் ஒரு ஆங்குலிக் உயிரி 3 கம்போன்களில், 4 கம்போன்கள் ஒரு வண்ணத்தைக் கொண்டும், மற்ற 4 கம்போன்கள் வண்ணமற்றும் காணப்படுகின்றன. இவற்றில் A— கம்போன்களானவை ஆர்ஜினின் (Arginine) என்ற வேதியியல் பொருளின் குறைபாட்டினால் மேலும் முதிர்ந்தாலும் வளர்வதில்லை.

குறுக்கெதிர் மாற்றம் நடைபெற்றுக் A +, A — கம்போன்கள் மாற்றமடைந்ததில் ஆங்குலிக் அடுக்கப்பட்டுள்ளன. இதில் ஒவ்வொரு ஆங்குலிக் கம்போனும் ஒரு குறிப்பிட்ட ஜீன் பெற்றுள்ளதாக, அவை ஒரு குறிப்பிட்ட நொதியைக் கட்டுகின்றன. இதற்கு இதற்கு 'ஒரு ஜீன் ஒரு நொதி கொள்கை' (one gene, one enzyme hypothesis) என்ற பெயர் வந்தது. 'இதன் மூலம் ஒரு ஜீன் எந்த மரபியல் பண்பு அதனுடன் கூடியதெனக் கண்டுபிடித்தார்கள். மரபியல் ஆராய்ச்சிகளில் பொதுவாக ஜீன்களில் பன் நொதிகள் வரிசைக்கிரமமாக சுரக்கப்படுகின்றன. அப்பொழுது ஒரு ஜினானது செயல்படாவிட்டால், பன் நொதிகள் பாதிக்கப்பட்டு உயிரினங்களில் வளர்ச்சி தடைப்படுகின்றதென்று தன்ருக நிரூபிக்கப்பட்டது.

இந்த மரபியல் ஆராய்ச்சிக்கு நி. கிராஸ்ஸா பெரிதும் பங்களித்தது. X-கதிர்களுக்கும், அக்டிரா ணதா கதிர்களுக்கும் கூட உபயோகித்தனர் (ultra violet rays).

ஜீன் செயல்படுதல் (gene action) முதல் முதலில் பீடனும் டாட்டும் செய்த ஆராய்ச்சியினால்தான் நிர்ணயிக்கப்பட்டது.

வரிசை : வைரோமீசைட்டீசு
(Series : Pyrenomycetes)

பெருக்குரும்பம் : கிளேவீசெப்டீடிலிசு
(Order : Claviceptales)

கிளேவீசெப்டீசு (Claviceps)

எர்காட் பூஞ்சை (Ergot fungus) : கிளேவீசெப்டீசு என்னும் பூஞ்சை பொதுவாகப் புல் (Gramineae) குடும்பத்தைச் சார்ந்த தாவரங்களின் மேல் ஒட்டுண்ணியாகக் காணப்படும். இது

சூலகத்தைத் தாக்கிப் பின்னர் அதை ஒரு கருவிறம் கொண்ட ஸ்கெலெரோஸியமாக (sclerotium) மாற்றி விடுகின்றது. இந்த ஸ்கெலெரோஸியத்திற்கு எர்காட் (Ergot) என்று பெயர். ஆகவே இக்கப் பூஞ்சைக்கு எர்காட் பூஞ்சை என்று மற்றொரு பெயரும் உண்டு.

இரோஸிசெப்ஸின் அதிகுக்கிய சிற்றினமான டி. பர்புரிவா (C. purpurea), ரை (Rye-Secaleceae) என்னும் தானியப்பயிரின் மேலும், பல புற்களின் மேலும் ஒட்டுண்ணியாக வாழ்கின்றது. அது ரை பயிருக்கு அதிகப்படியாகச் சேதம் ஏதும் விளைக்காமல் போனாலும், அறுவடைக்காவதில், தானியத்துக்குப் பதமாக உண்டாகும் சில எர்காட்டுகள் தானியங்களுடன் கலந்து விடுகின்றன. ஆகவே, இவற்றை உண்பவர்கள் 'எர்காடிஸம்' (Ergotism) என்ற ஒரு விதமான நரம்பு நோயால் பீடிக்கப்பட்டு இறக்கவும் தேரிகிறதது. இதற்குக் காரணம் அந்த எர்காட்டில் காணப்படும் ஒருவித ஆல்கலாய்டாகும் (alkaloid). ஆனால் அதே 'எர்காட்' மருத்துவத் துறையில் பிரசவத்தானும், இரத்த நாள வெடிப்பானும் தேரிடும் இரத்த இழப்பைக் குறைக்கவும் மிகவும் பயன்படுகிறது.

இந்தச் சிற்றினத்தின் வாழ்க்கைச் சுழலிக் கவனிப்போம். நூல் போன்ற ஆஸ்கோஸ்போர்களின் மூலத்தான் முதன்முதலில் ரை பயிர் பாதிக்கப்படுகின்றது. மற்றும் இக்கப் பூஞ்சை சூலகத் தையே தாக்கி இருப்பிடமாகக் கொண்டிருக்கலால் பூக்கும் காலத்திலேயே நோய் அறிகுறி உண்டாகின்றது. குஞ்சம் போன்ற சூலக முடிகளில் ஆஸ்கோஸ்போர்கள் அகப்பட்டிருக்கொள்கின்றன. பின்னர் இந்த ஆஸ்கோஸ்போர் மூளைத்து இதை கற்றபாக்கள் சூலகத்திற்கும் பிரவேசித்துப் புதிய எமனேசியத்தைத் தோற்றுவிக்கின்றது. நானுக்கு நான் இந்த எமனேசியம் வளர்த்து சூலகம் முழுவதும் பரவிவிடுகின்றன.

பாலின இனப்பெருக்கம் : வெகு சாதகமான சூழ்நிலையில் இப் பூஞ்சை பாலின இனப்பெருக்கத்தைத் தொடக்குகின்றது. அப்போது சூலகத்தின் வெளிப்புறத்தில் ஆயிரக்கணக்கில் குறுகிய கற்றபா செண்கள் இளைவாக அமைந்து கொண்டிருக்க காய்பு களாகச் (conidiophore) செயல்படுகின்றன. இவ்விதமாக வகிணையாக அமைந்துள்ள கொனீடியோஸ்போர் அமைப்பு எனோடினம் (acervulus) என்னும் உற்பத்தும். அதை ஒவ்வொன்றும் பல மூட்டை வடிவக் கொனீடியங்களின் மூலையில் தோற்றுவிக்கின்றன. இச் சமையம் இனிப்பான ஒருவித ரசம் (honary dew) வெளிவருகின்றது. இதனால் கவரப்பட்ட பூச்சிகள் சூலகங்களின் மேல்

நிறம் கொண்ட) நீண்ட ஸ்கெலெரோஷியமாக மாற்றமடைகின்றது (படம் 168உ). சூலங்கள் கருவூற்றுத் தானியங்களாக மாறும் சமயத்தில் இந்த ஸ்கெலெரோஷியமும் முழுவனர்த்தி அடைந்து தரையில் விழுந்துவிடலாம். ஆனால் சில அறுவடைக் காலங்களில் தானியங்களோடு கலந்து அடுத்த விதை விதைக்கும் காலத்தில் தரையில் விழுந்துவிடுகின்றன. (தானியங்களோடு கலந்த ஸ்கெலெரோஷியம் எர்காட்டுகளை உட்கொண்டால் மேல் கூறியவாறு எர்காட்டினம் என்ற நோயால் பாதிக்கப்படுவர்.)

தரையில் வீழ்ந்துள்ள ஸ்கெலெரோஷியங்கள் மழைக்காலம் முழுவதையும் ஒவ்வா நிலையில் கழித்து அடுத்த வசந்த காலத்தில் முளைக்க (germination) ஆரம்பிக்கின்றன. அதற்கு மேற்பாகத்தில் காம்புடன் கூடிய சிரம் போன்ற ஸ்டிரோமாக்கள் (Stem-tillars) சில தோன்றுகின்றன (படம் 168ஈ). ஒவ்வொரு ஸ்டிரோமாகும் பல கைப்பாக்களினாலானது. சிரம் போன்ற பாகத்தில் பின்னர் பல பெரிதீனியங்கள் தோன்றுகின்றன. (படம் 168 ஏ). சிரம் போன்ற பாகத்தில் புறப்பாகத்தில் பல இடங்களில் பாலின உறுப்புகள் ஜோடியாகக் காணப்படுகின்றன. ஆத்தரிடியத்தைவிட ஆஸ்கோனியம் ஆகன்றும் டிகரக்கோகைன் கொண்டும் உள்ளது. இரு பாதுறுப்புகளும் பல நுக்கனியங்களைக் கொண்டுள்ளன. டிகரக்கோகைன் வளைந்து ஆத்தரிடியத்தின்மேல் படிந்தவுடன் (உறைகள் கரைந்தவுடன்) ஆண் நுக்கனியங்களை டிகரக்கோகைன் மூலம் ஆண் கோனியத்துக்குள் பிரவேசித்து பெண் நுக்கனியங்களுடன் ஜோடியாக இணைந்து அமைகின்றன. (ஆஸ்கோமைஸிட்டிஸ் ஆண் கோனியத்தில் ஆண் பெண் நியூக்லியஸ்கள் புணர்வதில்லை.) பின்னர் ஆஸ்கோனியம் பல ஆஸ்கோஜினன் கைப்பாக்களைத் தோற்றுவிக்கிறது. அவைகளினின்றும் முன்கூறிய முறையில் ஆஸ்கஸ்கள் தோன்றி அவை ஒவ்வொன்றிலும் 8 நுள் போன்ற ஆஸ்கோஸ்போர்கள் உருவாகின்றன. இதற்குள் யாவற்றையும் சற்றி கைப்பாக்கள் ஒரு பெரிடியத்தை உண்டாக்குகின்றன. ஆனால், இந்த பெரிடியம் மேல்பாகத்தில் ஒரு சிறு துவாரத்தை (ஆஸ்பியோல்) கொண்டுள்ளது (படம் 168 ஏ). ஆகவே, இந்த கிபுட்டப்படி (fruit-body) பெரிதீனியம் ஆகும். பெரிதீனியத்தில் உட்புறத்தில் பல நீண்ட உருளை வடிவான ஆஸ்கஸ்கள் அமைந்துள்ளன. ஒவ்வொரு ஆஸ்கஸிலும் 8 ஆஸ்கோஸ்போர்களும் ஒரு கற்றையாக நீளவாட்டில் அமைந்துள்ளன (படம் 168 ஐ). முழு வனர்த்தியடைந்தவுடன் இந்த ஆஸ்கோஸ்போர்கள் வெளியே வீசி எறியப்படுகின்றன. ஆனால், இந்நிகழ்ச்சி ஒவ்வொரு பெரிதீனியமும் செங்குத்தான நிலையில்

இருத்தாகத்தான் தடைபெறக் கூடும். ஆகவே, ஒவ்வொரு பெரிதிலியளும் இத்திலியில் சிறிது காலம் நிலைத்து இருக்க வேண்டி, ஸ்டிரோமாவின் கம்பு (stalk) மேதுவாகச் சுழன்று சுழன்று திரும்புகிறது. ஒவ்வொரு பெரிதிலியளும் செக்குத்தான நிலையை அடைவும்போது தூம்போன்ற ஆங்கோஸ்போர்கன் ஆம்புலோக் வழியாக வெளியே எழியப்படுகின்றன. ஆங்கோஸ்போர்கன் காற்றிலும் எடுத்துச் செல்லப்பட்டும் பின்னர் மூல்குழியவாறு குறுக்காகவே அடைகின்றன.

சரிசை : ஆங்கோமைசைட்டீஸ்

(Series : Discomycetos)

(குவீஸ்ப் பூஞ்சைகள்—Cup Fungi)

பெருக்குடும்பம் : பெஸிஸ்டேலிசு

(Order : Pezizales)

குடும்பம் : பெஸிஸ்டேலிசு

(Family : Pezizaceae)

ஸ்பிரோஸிமா (Pyrenopeziza)

ஸ்பிரோஸிமா மண்ணில் வாரும் ஒரு சாறுண்ணிப் பூஞ்சை வாகும். நெற்பாக நீராவியாக தரிசாக்கப்பட்ட பாத்திகளிலும் தெருப்பிக் வெந்த மண்ணிலும், எறித்து கருவிய மரத்தண்டு களின் மேலும் மிகுதியாக இப் பூஞ்சை காணப்படுகின்றது.

ஸமூஸீலியம் அடித்தளத்தில்கேமல் (மண்ணின் மேல்) பரவி பஞ்சுபோலக் காணப்படுகிறது. மிகுதியாகக் கிளைத்த இதன் ஹைபாக்கள் 5-12 நுக்கியங்கள் கொண்ட சிறு செங்களை காணவை. பாலினா இனப்பெருக்கம் அரிதாகவே தடைபெறு கின்றது. அப்போது ஹைபாக்கள் தனித்தனி செங்களை ஆம்புலா (oidia) பிரித்து புதிய ஸமூஸீலியங்களைத் தோற்றுவிக்கின்றன.

பாலினப் பெருக்கம் : ஸ்பிரோஸிமா கான்ஸ்புரூயன்ஸ் (P. con-
fusa) என்ற சிற்றினத்தின் பாலினப் பெருக்கப் படிவங்களைப்
புது பூஞ்சையியல் நிபுணர்கள் ஆராய்ந்து எடுத்துக்கூறியுள்ளனர்.
இந்தச் சிற்றினத்தின் ஸமூஸீலியம் ஒத்த கூடமை (homothallic)
வகையைச் சார்ந்தது. (அதாவது ஒரே ஸமூஸீலியத்தில்

ஆத்தரீடியுமாம் ஆன்கோனோனியமும் தோன்றுகின்றன). தொடக்கத்தில் மைக்கோனோனியத்தில் மேற்பரப்பில் அங்கங்கே குட்டைவாண 2-3 செங்குன் கொண்ட கைறுபாக்கிலேகன், ஜோடியாக மேல்தோக்கி



படம் 169

மைக்கோனோனியம்—ஆத்தரீடியுமாம் ஆன்கோனோனியமும்


ஆத்தரீடியுமத்திலிருந்து ஆன்கோனோனியமும் ஆன்கோனோனியமும்

பிரவேசித்தல்

மேற்பரக்கில் ஆன்கோனோனியத்தின்மேல் தோன்றும் ஆன்கோனோனியம் கைறுபாக்கன்

வளர்ந்துகொண்டே, பின்னர் இந்தக் கிளைகளில் நுழைச்செங்குன் அகன்று ஆத்தரீடியுமாகவும், ஆன்கோனோனியமாகவும் மாறியிருக்கின்றன. ஆத்தரீடியுமத்தின் நூக்கலியங்கள் பாதுகாடடைந்து எண்ணிக்கையில் நூற்றுக்கு மேலாகின்றன. ஆன்கோனோனியமும் நூற்றுக்கு மேலாக நூக்கலியங்களை உண்டாக்கிக்கொண்டு உருண்டை வடிவத்தை அடைகின்றது (படம் 169). ஆன்கோனோனியத்தின் மேல் பாகத்திலிருந்து டிராக்கோனோனியம் வளர்ந்து ஆத்தரீடியுமத்தின் மேல் வளர்ந்து படிக்கின்றது (படம் 169). இவ்விரண்டிற்கும் இடையிலுள்ள செம் உறைகள் கரைந்து ஆத்தரீடியுமத்தின் நூக்கலியங்கள் டிராக்கோனோனியம் மூலம் ஆன்கோனோனியத்துடன் பிரவேசித்துப் பெண் நூக்கலியங்களின் அண்மையில் இரண்டாக அமைகின்றன. மூலக்கூறுப்பட்டபடி பன ஆன்கோனோனியம் கைறுபாக்கன் தோன்றி நூக்கலியம் ஜோடியாக அவற்றுடன் பிரவேசித்து, பின்னர் ஆன்கோனோனியத் தோன்றுகின்றன. இவ்விதமாக ஆன்கோனோனியத்தின் மேற்பரப்பில் அமைந்துள்ள பன ஆன்கோனோனியங்களிலிருந்து ஆன்கோனோனியம் கைறுபாக்களும் (படம் 169) ஆன்கோனோனியம் உண்டாகின்றன. ஆகவே, நூற்றுக்கணக்கான ஆன்கோனோனியம் ஒரே மட்டத்தில் வரிசையாக அமைகின்றன. இதற்கும் இவை யாவற்றையும் பாதுகாக்கும் வகையில் கீழ்க்கண்ட கைறுபாக்கன் இவைகளைச் சுற்றி வளர்ந்து பெரிடியுமத்தை

உண்டாக்குகின்றன. இயல்விதமாக உண்டாகும் சீபுருட்டாடி (fly body) தொடக்கத்தில் கொளையடிமை கொண்டிருந்த போதிலும் பின்னர் விரிந்து குவியை போன்ற அபோதிலியமாக மாறிவிடுகின்றது. இந்த அபோதிலியம் 3 மி.மீ. விட்டம் கொண்டிருக்கிறது.



படம் 170

ஸ்பிரோகிமா—அபோதிலியத்தின் ஒரு பாகம்

சிவப்பு வண்ணத்துடன் காணப்படும். அபோதிலியம் ஒரு கூட்டு சீபுருட்ட பாகியேயாகும். ஏனெனில், பல ஆஸ்கோஸ்போரிகளிலிருந்தும் உண்டான ஆஸ்கஸ்கள் எல்லாம் ஒன்று சேர்க்கப்பட்டே இந்த அபோதிலியம் உண்டாகின்றது. அபோதிலியத்தின் உருவியான ஆஸ்கஸ்கள், பாராபைசஸ் (paraphyses) எனப்படும் மனட்டு ஹைபாக்களினிடையே அமைந்துள்ளன. ஆஸ்கஸ் ஒவ்வொன்றிலும் 8 தீர் வட்டவடிவ ஆஸ்கோஸ்போரிகள் உள்ளன (படம் 170). இவை மூல வளர்த்தி அடைந்தவுடன் ஆஸ்கஸ்களின் நுனிய்பாகம் குறுக்கே பிளவுபட்டு ஒரு முடிபோல் (operulum) ஒரு பக்கம் திறக்கிறது. அத்தருணம் ஆஸ்கோஸ்போரிகள் வேகமாக விரி எழப்படுகின்றன. அனுகூலமான இடத்தில் ஆஸ்கோஸ்போர் விழுமானால், அது மூலத்து ஒரு புதிய மைஸீலியத்தை உண்டாக்குகிறது.

ஸ்பிரோகிமாவின் மற்றச் சிற்றினங்களில் (ஸ்ப. ஒம்பெலோடிக் (P. omphalodica), ஸ்ப. டொமெஸ்டிகம் (P. domesticum)) அபோதிலியம் இயல்பான முறையில் தோன்றியபோதிலும் பாதுறுப்புகள் செயலாற்றும் தன்மையைப் படிப்படியாக இழந்து விடுவதைக் காணலாம். இறுதியில் பாதுறுப்புகள் முறைப்படி

உண்டாகாமல் மாற்றமடையாத, இரு ஹைபாக்களே பாதுறுப் புகளாகச் செயல்பட்டு இணைத்து, ஆஸ்கஸ்கள் தொற்றுகிறதுப் பின்னர் கீழ்க் பாகங்களையும் உண்டாக்குகின்றன. பரிணாம வளர்ச்சியில் உயர்த்த நிலைமைக்காட்டும் இந்தப் பாதுறுப்புக் குறைவு (reduction of sex organ) அடுத்து வரும் பெண்கூறு என்னும் சுவளைப் பூஞ்சையில் நன்கு நிலைநாட்டப்பட்டுள்ளது.

பெண்கூறு (Peziza)

இப் பூஞ்சை பொதுவாக மாட்டுச்சாணம், எருச்சுவல்கள், அழுகும் இலைகள் முதலியவற்றின் மேலும் எரு அதிகமாகப் போடப்பட்ட பாத்திகளிலும் காணப்படும். இந்தப் பூஞ்சை இருக்கும் இடத்தை அது உண்டாக்கும் மிகப் பெரிய அபோதினி யங்களிலிருந்தே கண்டு கொள்ளலாம். ஹைபாக்கள் பல



படம் 171

பெண்கூறு—அபோதினியக் குயில்கள்

தூக்கியல்கள் கொண்ட குறுவிய செக்களாயிரவை. பாலிவா இனப் பெருக்கம் அரிதாக கொள்கலா மூலமாவது கிளேமிடோ கப்போர் மூலமாவது தடைபெறுகின்றது. பாலினப் பெருக்கத்தில் மூலம் அபோதினியம் உண்டானபோதிலும், மேல் கூறப்பட்டபடி பாதுறுப்புகள் செயலாற்றும் தன்மையை இழந்துவிடுகின்றன. சில சிற்றினங்களில் ஆந்தரிடியம் செயல்படுவதில்லை ; சிலவற்றில் டிகரக்கோவைக்கள் உண்டாவதில்லை; சிலவற்றில் ஆந்தரிடியமும் ஆஸ்கோஸியமும் உண்டாகாமல், அவைகளுக்குப் பதிலாகச் சில ஹைபாக்களே ஒன்றுடொன்று இணைகின்றன. அவற்றின் தூக்கியல்கள் ஜோடிகளாக அமைக்கப்பெற்று, பின்னர் ஆஸ்கோ தீனஸ் ஹைபாக்களையும், ஆஸ்கஸ்களையும் உண்டாக்குகின்றன. இவ்விதமாக உண்டாகும் அபோதினியக் குயில்கள் பெரிதாகவும் (2-30 செ.மீ. விட்டத்துடன்) ஆரஞ்சு அல்லது பசும் மஞ்சள் வண்ணத்துடனும், ஒழுங்கற்ற விலிம்புகளுடனும் காணப்படும்

(படம் 171). அபோதீஸியத்தின் மேல்பகுதியில் ஸ்போரோனீமா வில் உள்வளையப் போல் நூற்றுக்கணக்கான ஆஸ்கஸ்கள் பாரா ஸ்போனீஸ்களுக்கு இடையில் அமைந்து காணப்படும். படம்



படம் 172

பொதுஜனா—அபோதீஸியத்தின் நீள்வெட்டுத் தோற்றம்

ஒஸ்போர் ஆஸ்கஸிலும் தீன வட்டவடிவமான 8 ஆஸ்கோ ஸ்போர்கள் உள்ளன. அவை ஆஸ்கஸின் நுனிப்பாகம் மூடி போனத் திறப்பதன் மூலம் வெளியே வீசி எறியப்படுகின்றன.

வகை : பேஸிடியோமைஸிடீசி

(Class : Basidiomycetes)

இவ்வகையில் அடங்கும் பூஞ்சைகள் . வெளிப்புறத்தே (exogenous) உண்டாக்கப்படும் பேஸிடியோஸ்போர் (basidio-spores) என்ற ஒருவித ஸ்போர்களைத் தோற்றுவிக்கும் இவ்வுடையன. இந்த பேஸிடியோஸ்போர்கள் பேஸிடியம் என்ற ஒரு தனிப்பட்ட உறுப்பின் மேல் ஸ்டெரிக்கமா (sterigma) என்ற பெயர் கொண்ட ஸ்போர் காம்புகளின் நுனியின் தோன்றுகின்றன. பொதுவாக ஒரு பேஸிடியத்திலின்று 4 பேஸிடியோ ஸ்போர்களை உண்டாக்கின்றன.

தீன பேரினங்களில் இந்த பேஸிடியம் (குறுக்குச் சுருள் மூலம்) 4 செங்கனாக ஆன இறை போன்ற தன்மையை உடையது. இத்தகைய பேஸிடியத்திற்குக் குறுக்குச் சுருள்கள் (septate basidium) அல்லது பிளேக்மோ பேஸிடியம் (phragmo-basidium) என்று பெயர். பிளேக்மோ பேஸிடியம் கொண்ட

எவ்வாறு பேரினங்களும் தோடோமோபேனிடியோமைனிட்டுள் என்னும் துணை வகைக்குள் அடங்கும். (உ-ம்.) அஸ்பிரேனோ (Ustilago), பக்வினியா (Puccinia).

மற்றப் பேரினங்களில், பேனிடியம் குறுக்குச் சுவர் அற்று (unseptate) குண்டாத்தடி போன்ற (club-shaped) அமைப்பைக் கொண்டுள்ளது. அதன் உச்சியில் 4 மட்டுமேயுட்பட்டாக்களின் (ஸ்போர் உய்ப்பின்) மேல் பேனிடியோம்போரிகள் காணப்படும். இத்தகைய பேனிடியத்திற்குக் குறுக்குச் சுவரற்ற தோலோ பேனிடியம் (holobasidium) என்று பெயர். தோலோபேனிடியம் கொண்ட பேரினங்கள் தோலோமோபேனிடியோமைனிட்டுள் (homobasidiomycetes) என்ற துணைவகையில் அடங்கும். (உ-ம்.) அகேரிஸ் (Agaricus), பாலியோரஸ் (Polyporus), லிகோபெர்டான் (Lycoperdon).

இப் பூஞ்சைகளின் மைனீலியம் நுண்ணுயிரங்கள் உள்ள குறுக்குச் சுவர் கொண்ட வடிவாக்கனாவானது. கைகோமை சிட்டம், ஆஸ்கோமைசிட்டம் பூஞ்சைகளின் நிகைக்கு மாறாக இத்தப் பூஞ்சைகளில் பால் உறுப்புகள் உண்டாவதில்லை. ஆகும், வாய்க்கைச் சுழலின் இரு பருவங்கள் (phases) எப்போதும் அடுத்தடுத்துக் காணப்படும்.

(1) ஒற்றை நூக்லியஸ் செங்களைக் கொண்ட பருவம் (monokaryophase or primary mycelium).


(2) இரட்டை நூக்லியஸ் செங்களைக் கொண்ட பருவம் (dikaryophase or secondary mycelium).

ஒற்றை நூக்லியஸ் பருவம், இரட்டை நூக்லியஸ் பருவமாகக் குறிப்பிட்ட படிவத்தில் மாறுபாடு அடைகிறது. இந்நிகழ்ச்சிக்கு இரு நூக்லியஸ் நிலை அடைதல் (dikaryotisation) என்று பெயர். இரட்டை நூக்லியஸ் பருவ மைனீலியம், பேனிடியம் (basidium) என்ற தனிப்பட்ட உறுப்பின் மூலம், ஒற்றை நூக்லியஸ் மைனீலியத்தைப் பின்வரும் முறையில் தோற்றமளிக்கிறது. பேனிடியம் உண்டாகும் தருணத்தில் இரு நூக்லியஸ்களும் இணைந்து பின்னர் மையவாலில் முறையில் பாகுபாடு அடைகிறது.

பிரேக்மோபேனிடிய வகையைச் சார்ந்திருந்தால், இந்த 4 ஒற்றை நூக்லியஸ்களும் பேனிடியத்துக்குள் சென்று ஒன்றன் சிற்றொன்று அமைந்து குறுக்குச் சுவர்கள் உண்டாகி, 4 செங்கள்

கொண்ட பிழைக்கோபேலிடியமாக வளர்ச்சியடைகின்றது. ஒவ்வொரு செல்லின் பக்கவாட்டிலும் ஒரு ஸ்டெரிக்மா அல்லது கரம்பு தோன்றி, அதன் நுனியில் ஒரு பேலிடியோஸ்போர் உண்டாகிறது.

செல்லில் உள்ள நூக்கியல் இரண்டாகப் பிரிந்து அவற்றும் ஒன்று ஸ்டெரிக்மாவுடனும் பேலிடியோஸ்போருக்கும் செல்கிறது. ஆனால், பேலிடியம் ஹாஸோபேலிடியமாக இருந்தால் நான்கு நூக்கியல்களும் பேலிடியத்தில் மேலப்பாகத்திற்கு தளர்த்து செல்கின்றன. அப்பொழுது பேலிடியத்தில் உச்சியில் மேலினதும்



படம் 173

பேலிடியோஸ்போர் வளர்ச்சியின் வடிவங்கள்


நான்கு ஸ்டெரிக்மாக்கள் தோன்றி அவற்றின் நுனிகளில் நான்கு பேலிடியோஸ்போர்கள் உருவாகின்றன. இந்த பேலிடியோஸ்போர்களுக்குள் பின்னர் நான்கு நூக்கியல்களும் செல்கின்றன.

பேலிடியோஸ்போர்கள் சில பேரினங்களில் ஸ்டெரிக்மாக்களினின்றும் பெவர்த்து வேகமாக விளி எழியப்படுகின்றன. அனைத்திலும் ஒற்றை நூக்கியல் பருவ (monokaryotic) கைளரீலியத்தை உண்டாக்குகின்றன (படம் 173).

பெரும்குடும்பம் : அஸ்டிரேஜினைசிஸ்
(Order : Ustilaginales—Smuts)

Andropogon (Ustilago)

அவ்வுயிரினங்களை என்னும் பூஞ்சை மக்காச்சோளம் (அ. மேயுல்—*U. maydis*), கோதுமை (அ. டிரிதிகம்—*U. tritici*), ஓட்ஸ் (அ. அவெனா—*U. avenae*), பார்சுலி (அ. துராக்ஸும—*U. bordii*), கரும்பு (அ. கஸ்டாபீனே—*U. scitamiaca*) முதலிய பயிர்களின் மேல் ஒட்டுண்ணியாக வளர்ந்து மிகுதியாகச் சேதத்தை விளைவிக்கிறது. ஆதாரத்தாலரத்தின்மேல் இத்தப் பூஞ்சை கவித்துணுக்குகள் போன்ற உயிரினங்களைத் தோற்றுவிப்பதால் இவை உண்டாகத்தும் தோய்களுக்கு உமடல் (smoke) என்று பெயர். பூச்சுகளின் மூலமே இத்தப் பூஞ்சை பயிர்களைத் தாக்குவதால், பயிர்களின் கதிர்கள் உண்டாகும் வரை இத் தோய் புலப்படவருவதில்லை.



174

doi:10.1017/S0022292412001619

வினாக்கள்: கோவில் அழித்ததற்கானவரை

- (1) பாதிக்கப்பட்ட தாவரத்தின் இலைகள் மஞ்சளாதல்
- (2) பாதிக்கப்பட்ட பாகங்களும் (தெக்கைகளும்) ஒழுக்கற்ற

மூலையில் பெரிதாதி (hypertrophy) 'கால்' (gall) அகன்று முடிக்க கணாக (tumor) வளர்வது சில சமயங்களில் இவை முதலிய பாகங்களில் புறத்தோல் வெடித்தவால் கொப்புளங்களாக (pusules) பூஞ்சை வெளியில் தெரிவதும் உண்டு. இந்த 'கால்கள்' முதலில் வெண்மையாகவும் பின்னர் கருத்தும் தோன்றும். (கருத்த தோற்றம் ஸ்போரிகள் உண்டாகிவிடுத்தலைக் குறிக்கும்.) பின்னர் புறத்தோல் வெடித்துக் கசிந்துகள் போன்ற ஸ்போரிகள் (ஸ்பட். ஸ்போரிகள்—spore spores) காற்றினால் எடுத்துச் செல்லப்படுகின்றன. (3) இப் பூஞ்சை முதிர்ச்சியடைந்த பாகங்களிலிருந்து இனம் பாகங்களுக்குள் தொடர்ந்து தகர்த்து கொண்டே இருத்தவால் ஆதாரத் தாவரம் குட்டையாகவும் குன்றிய வளர்ச்சி புடனும் காணப்படுகிறது. கைஸீரியம் ஆதாரத்தாவரத்தின் செல் இடைவெளியில் பரவி உறிஞ்ச உறுப்புகளின் மூலம் உணவை கிரமிக்கின்றது.

ஆம்பிலேகோஷிஸ் கரமுத்தசு சுறாவில் இரட்டை நூக்கியல் நிலை (di-karyophase) மிகவும் நீடித்து ஒற்றை நூக்கியல் நிலை (mono karyophase) குறுகியும் காணப்படும். ஆதாரத் தாவரத்தின் திசுக்களிடையே பரவும் இரட்டை நூக்கியல் கொண்ட கருபாக்கள் முதிர்ந்த பாகங்களிலிருந்து முடிவில் புதிதாக உண்டாகும் இனம் பாகங்களுக்குள் தகர்த்து செல்கின்றன. மூக்கியலாக, மஞ்சரிகளுக்குள்ளும் கதிரிகளுக்குள்ளும் பிரவேசித்து இதன் விளைவாகத் திசுக்கள் ஒழுங்கற்ற மூலையில் பெரிதாதி வீக்கங்களாகவும், கால்களாகவும், முடிக்ககளாகவும் (runners) வெளிப்படுகின்றன. இவற்றினால் உள்ள ஒவ்வொரு இரட்டை நூக்கியல் செல்லும் ஒரு தடித்த உறைவை உண்டாக்கிக் கொண்டு, ஸ்பட் கருத்த ஸ்போராக மாறுகின்றது. ஆகவே, அறுவடைக் காலத்தில் பாதிக்கப்பட்ட பயிர்களில் கதிரிகளின் இயல்பான தானியங்களுக்குப் பதிலாக ஸ்பட் ஸ்போரிகள் திரம்பிய தானியங்களை காணப்படுகின்றன. மேலுள்ள புறத்தோல் சிதைவுண்டவுடன் இந்த ஸ்பட் ஸ்போரிகள் காற்றினால் எடுத்துச் செல்லப்படுகின்றன. சாதகமான இடத்தில் விழ தேரிட்டால் இந்த ஸ்பட் ஸ்போர் மூளைக்க ஆரம்பிக்கிறது.

ஒவ்வொரு ஸ்பட் ஸ்போரினும் இருக்கும் இரு நூக்கியல்களும் இணைந்து கைமலாஸிஸ் மூலையில் பாகுபாட்டடைந்து தான்கு ஒற்றைய நூக்கியல்களை உண்டாக்குகின்றது. இப்போது ஸ்போர் உறை ஒரு பக்கத்தில் சிழித்து அதன் வழியாக ஒரு இழை தோன்றுகிறது. தான்கு நூக்கியல்களும் அதனால் பிரவேசித்துக் குறுக்குச் சுவர்கள் தோன்றுவதன் மூலம் 4-செல் பிரேக்கிமோ

பேலிடிபாயாச (4 celled phragmobasidium) மாற்றமடைகின்றது. இந்த பேலிடிபயத்தில் பக்கங்களில் பேலிடியோஸ்போர்கள் நேரடியாகத் தோன்றுகின்றன. (எம்டெசிக்மா அல்லது ஸ்போர் காய்பு காணப்படுவதில்லை.)

சிலர் எம்ட் ஸ்போர் பாகத்தை ஹைபோபேலிடியம் (hypobasidium) என்றும் பேலிடியோ ஸ்போர்கள் கொண்ட இறை போன்ற பாகத்தை எபிபேலிடியம் (epibasidium) என்றும் அழைக்கின்றனர் (படம் 175).

அண்டிஸ்கோனின் ஒரு முக்கிய அம்சம் பேலிடியோ ஸ்போர்கள் மொட்டுவிறும் (bursting) ஆகிறபோது பெற்றுள்ளதால் பேலிடிபயத்தில் மேல் இருக்கும் போதோ அல்லது பிசித்து அதனின்ற தனித்திருக்கும் போதோ இந்த மொட்டுவிறும் நிகழ்ச்சி நடைபெறு கின்றது. மொட்டு விறுதலாக உண்டான ஸ்போர்களுக்கு ஸ்பிரோனட் (sprout) ஸ்போர் என்று பெயர் இந்த நிகழ்ச்சி ஸ்பிரோனட் ஸ்போர் களின் எண்ணிக்கை அதிகரித்து, பூஞ்சை மேலும் பரவுவதற்கு உதவு கின்றது.



படம் 175

அண்டிஸ்கோ-எம்ட் ஸ்போர்
எம்ட் ஸ்போரிலிருந்து
பேலிடியம் முளைத்தல்


அண்டிஸ்கோனின் மற்றொரு சிறப்பியல்பு யாதெனில், பேலிடியத் தில் உண்டாகும் 4 பேலிடியோ ஸ்போர்களில் இரண்டு ஒரு ஸ்ட்ரே யின் அல்லது வகையாகவும் மற்ற இரண்டும் அதற்கு நேர்மானுன ஸ்ட்ரேயின் அல்லது வகையாகவும் அமைகின்றன இதன்படியே அமைவகையின்றும் தோன்றும் ஸ்போர் ஸ்போர்களும் அதே வகை களாக அமைகின்றன.

இவ்விதம் உண்டாகும் பேலிடியோஸ்போர்களினோ அல்லது ஸ்பிரோனட் ஸ்போர்களினோ காற்றினால் எடுத்துச் செல்லப்பட்டு மதறப் பசிக்களின் மேல் படிவின்றன.

இந்தப் பூஞ்சையில் ஒற்றை நூக்கியல் (பேலிடியோ ஸ்போர்) படிவத்திலிருந்து இரட்டை நூக்கியல் படிவத்திற்கு

எப்படி மாற்றும் நிபந்திதது (dikaryotisation) என்று இம் பொழுது கவனிட்போம். இந்த நிபந்தி மூன்று விதங்களில் நடைபெறுவதைக் கண்டறிந்துள்ளனர்.

(1) அ. கார்போ (U. carbo), அ. நியூடா (U. nuda) என்ற சிற்றினங்களில் பேனிடியோகம்போர்கல் தோன்றுவதற்கு முன்பே பேனிடியத்தில் உள்ள செல்களில் அடுத்தடுத்துள்ள இரு செல்கள் இணைந்து இரு நூக்கியங்களும் ஒரேசே அமைத்து இரட்டை நூக்கியம் படிவத்தை அடைகின்றன (படம் 176). இவ்விரு நூக்கியங்களும் ஒரே சமயத்தில் பாகுபாடடைந்து நூக்கியம் ஜோடிகளைத் தோற்றுவிக்கின்றன. இவ்வித நிபந்திக்கு இணை அல்லது ஏக காலம் பகுப்பு (conjugate or synchronous division) என்று பெயர். இந்த நூக்கியம் ஜோடிகளுக்கு இடையே



படம் 176


அனடினேசோ—கார்போ இனம் பேனிடியத்துக்குள் குறுக்குச் சுவர் கலந்து இரட்டை நூக்கியம் கிடை அடைதல்

குறுக்குச் சுவர் உண்டானால் இரட்டை நூக்கியம் செல்கள் கொண்ட ஹெபாக்கள் உண்டாகின்றன. அவைகளுக்கு உகந்த ஆதாரத் தாவரங்கள் அண்மையில் கிடைத்தால் அவற்றைத் தாக்குகின்றன. ஆகவே, இரட்டை நூக்கியம் பருமம் தொடங்குகிறது.

(2) அ. ஆந்திராரம் (U. anthracinum), அ. வியோலேசே (U. violacea) முதலிய சிற்றினங்களில் இரு பேனிடியோ கம்போர்கல் இணைப்பின் மூலம் இரட்டை நூக்கியம் படிவம் தோன்றுகிறது (படம் 177). ஆதாரத் தாவரத்தின்மேல் விழும் இரு கம்போர் கள் எதிர்பாடுகை கட்டுவதற்கு இருந்து அண்மையில் விழ தேரின் அவை இரண்டும் இணைகின்றன. இரு கம்போர்களின் கைவட்டொலிணைகளும் (plexanogony) கலக்கின்றன. ஆகவே, இரு நூக்கியங்களும் ஜோடியாக அமைந்த இணைபகுப்பு முறையில்

இரட்டை நூக்கியல் செங்களைக் கொண்ட ஹைபாமை உண்டாக்குகின்றன. இந்த ஹைபா இனத்துவியின் மூலம் உட்சென்று இரட்டை நூக்கியல் பருவத்தைத் தொடங்குகிறது.

(3) மக்காக் சோனத்தைப்பாதிக்கும் அ.மேயுக் (U. maydis) என்னும் சிற்றினத்தில் பேஸிடியோஸ்போர் புறத்தோலின்கேக் படித்தவுடன் மூளிக்க ஆரம்பிக்கிறது. இனத்துவியின் வழியாக உட்செல்லும் மூளைகுழல் (germ-tube) ஒற்றை நூக்கியல் செங்களை ஆனது. இந்த ஹைபாவிற்கு புரோமைஸீலியம் (proamycelium) என்று பெயர். இதைப்போலவே பன பேஸிடியோஸ்போர்கள் மூளித்துப் பன புரோமைஸீலியங்களை உண்டாக்கக் கூடும். ஆதாரத் தாவரத்தின் திசுக்களுக்கு இடைபே பரவும் போது இரு புரோமைஸீலியங்கள் மாறுபட்ட ஸ்ட்ரெபிலோ இருத்தால், அவைகளின் செங்கள் ஒன்றை ஒன்று அணுகி



அ.மேயுக் ஆத்திரம்—இரு பேஸிடியோஸ்போர்கள் இனத்து இரட்டை நூக்கியல் கிளை அடைதல்

அ.மேயுக் மேயுக்—புரோமைஸீலியங்கள் இனத்து இரட்டை நூக்கியல் பருவத்தை அடைதல்

இனத்து (zoostogony) இரட்டை நூக்கியல் நிலைபை அடைகின்றன (படம் 178). இது இனபாகுபாட்டின் மூலம் இரட்டை நூக்கியல் பருவத்தைத் தொடங்குகிறது.

மேற்கூறிய மூன்று விதங்களில் இரட்டை நூக்கியல் செங்கள் கொண்ட மைஸீலியம் ஆதாரத்தாவரத்தின் திசுக்களுக்குள் பரவிப் பின்னர் கடுங்கியைடைத்து ஸ்பைட் ஸ்போர்களை உண்டாக்குகின்றன. இந்த ஸ்பைட் தோய் இரு விதங்களில் பரவக்கூடும்.

ஒன்று தானியங்களிலேயே மட்டுமே உயிர்ப்பெருக்கம் கொள்ள முடிந்ததில் (externally seed-borne), அவை முளைக்கும் பொழுது உயிர்ப்பெருக்கம் முளைத்து வளரும் பயிர்களை தாக்கும் முறை அல்லது தானியங்களின் திசுக்களுக்கும் மேல் பூஞ்சையின் தைரபாக்கள் உறங்கும் நிலையில் இருந்து (internally seed-borne) தானியங்கள் முளைக்கும் பொழுது நோயை உண்டாக்கலாம்.

முன்கூறப்பட்ட வகையில் பரவும் நோயைத் தடுக்க, தானியங்களை விதைப்பதற்கு முன் சுத்தகம் அல்லது பூஞ்சை கொல்லிகளைத் (dusting) தூவலாம். பின் கூறப்பட்ட வகையில் பரவும் நோயைத் தடுக்க வெத்தீரில் ($54^{\circ}\text{C}.$) சில காலம் வைத் திருத்தல். (உறங்கு நிலையிலுள்ள தைரபாக்களைக் கொல்லுவது சாத்தியமற்றது ஆதலால் இம்முறை அந்த தைரபாக்களை வளரச் செய்து, பின் அந்த உஞ்சைநிலையில் தைரபாக்களைக் கொல்லு வின்றது. ஆயின் விதைகளின் ஒரு தாக்கப்பாடாமல் இருக்க, உஞ்சைநிலை $53-54^{\circ}\text{C}.$ க்கு மேல்செய்யாமல் தடுக்க, எச்சரிக்கை யாக இருத்தல் அவசியம்.)

மற்றும், மாற்றுச் சாகுபடி முறையிலும், நோயை எதிர்த்து திற்கும் திறம் பெற்ற பயிர்களை வளர்த்தும் இத் நோயைத் தடுக்கலாம்.

பெரும்பாலும் : பூஞ்சைகளில்— rust

(Order : Uredinales — Rust)

குடும்பம் : பக்ஸினியேசி


(Family : Pucciniaceae)

பக்ஸினியா (Puccinia)

பக்ஸினியா என்னும் பூஞ்சை ஒரு தனிச் செட்பு வாய்ந்த நிலையான ஒட்டுண்ணியாகும் (obligate parasite). இது கோதுமை பானி, ஓடல், ஈர முதலிய தானியப் பயிர்களையும், தாவி தாவி (Hollyhock), ஆஸ்பிரேசஸ் (Asparagus), பானிகோனம் (Polygonum), ஜஸ்டீசியா (Justicia) முதலிய தாவரங்களையும் தாக்கி அவைகளின் இலைகளின்மேல் 'துரு' (rust) போன்ற பழுப்பு வண்ணத் திட்டுகளை (patches) உண்டாக்குகின்றன. ஆகவே, இயற்கையான அறிகுறிகளைத் தோற்றுவிக்கும் 'பூஞ்சை கள்' சக்டுகள் (rusts) என்று அழைக்கப்படுகின்றன.

இதன் செற்றினங்களால் மிகவும் முக்கியத்துவம் வாய்ந்தது ப. கிராமினிஸ் (P. graminis) என்னும் செற்றினம் ஆகும். இது கோதுமை, பானி, ஓடல், ஈர ஆகிய தானியப் பயிர்களை

பாதிக்கின்றது. சிறப்பாக இது கோதுமைப் பயிரைத் தாக்கி 'கோதுமை கரும் ரஸ்ட்' (black rust of wheat) அகலது



படம் 179

பக்கிரீயா கிராமினா—கரும் ரஸ்ட் கரும்

அ. கோதுமைப் பயிர் ஆரம்பம் (இரட்டை துகில்களாக) இ. சிவப்பு ரஸ்ட் படியும் உ. பூசிடோக்டோசு உ. கரும் ரஸ்ட் படியும் ஊ. டெனாடோக்டோசு உ. டெனாடோக்டோசு உ. டெனாடோக்டோசு முளைத்து போனியும், போனியோக்டோசு உ. பாதிக்கப்பட்ட பார்பரி இலை (மாற்று ஆதாரத்தாலும்) உ. கபெர்மோனியம் கிளையும் கசிடியம் கிளையும் காட்டும் பார்பரி இலைக் குறுக்கு வெட்டுத் தோற்றம் உ. கபெர்மோனியம் எதிரும் கதிராடியும் இளைதல் உ. கசிடியோக்டோசு முளைத்தல்.

கோதுமைப் பயிர் தண்டு ரஸ்ட் (stem rust of wheat) என்ற கொடிய நோயை உண்டாக்குகிறது. இந்த ரஸ்ட் நோயின் ஆறிலொன்றாக :

(1) வசந்த காலத்தின் பின்பாகத்தில் (அல்லது மூல் கோடைமீல்) இலைகளின்மேல் நீண்ட பழுப்பு வண்ணத் திட்டுகள் தோன்றுகின்றன. இது வெந்த ரன்ட் படிவம் (red rust stage) என்று குறிப்பிடப்படுகிறது படம் (177இ).

(2) பின்னர் சில வாரங்களுக்குப் பிறகு நீண்ட கருத்த திட்டுகள், தண்டு, கதிரின் காம்புகளின் மேலும் காணப்படும். இத்தநோயினால் பாதிக்கப்பட்ட பயிர்கள் குன்றிய வளர்ச்சியைக் காண்பிப்பதன்மூலம் தானியங்களில் சேமிப்புப் பொருள்களில் குறைத்தும், பிஞ்சிவேயே முதிர்ந்தும் (ripening prematurely) காணப்படும். இவ்விதமான 'ரன்ட் கொள்ள நோய்' (rust epiphytotic) ஆண்டுதோறும் நம் நாட்டில் குறிப்பிட்ட காலங்களில் தோன்றிப் பெருஞ் சேதத்தை விளைவிக்கிறது.

இந்தச் சிற்றினத்தின் வாழ்க்கைச் சுழலில் ஐந்து விதமான ஸ்போர்கள் காணப்படுகின்றன. இவ்வாறு பல ஸ்போர்கள் கொண்டிருத்தல், 'பல வடிவத் தன்மை' அல்லது பாலிமார்பிசம் (polymorphism) என்று குறிப்பிடப்படுகின்றது. இந்தப் பூஞ்சை தன்னுடைய வாழ்க்கைச் சுழலை இரு ஆதாரத்தாவரங்களின்மேல் சுழிக்கின்றது. கோதுமைப் பயிரின் மேல் சில படிவங்களையும், பின்னர் பார்பரி (barbery) என்றும் தாவரத்தின் மேல் மற்றப் படிவங்களையும் சுழிக்கிறது. குறிப்பாக கோதுமைப் பயிரின்மேல் இரட்டை நுக்கியல் பருவத்தையும் (dikaryophase) பார்பரி செடியின்மேல் ஒற்றை நுக்கியல் பருவத்தையும் (monokaryophase) காணலாம். ஆகவே, கோதுமைப் பயிரைப் பிரதம ஆதாரத்தாவரம் (primary host) என்றும், பார்பரியை துணை அல்லது மாற்று ஆதாரத் தாவரம் (secondary or alternate host) என்றும் கூறுவர். இவ்வாறு இரு ஆதாரத் தாவரங்களின் மூலம் தன் வாழ்க்கையை நடத்தும் தன்மைக்குப் 'பல் இயல்வம் கொண்டிருத்தல்' (Heterocicism) என்று பெயர்.

இத்தகைய தன்மை வாய்ந்த ப. கிராமின்னின் வாழ்க்கைச் சுழலை இப்போது கவனிப்போம். இப் பூஞ்சையின் மைசீனியம் பிரதம ஆதாரத்தாவரமான கோதுமைப் பயிரின் செவ்வளின் இடைவெளிகளில் (intercellular) பரவி, கிளைத்த உறிஞ்சுறுப்புகள் மூலம், உணவைக் கிரமிக்கின்றது. வசந்த காலம் முடிவுறும் சமயம் (பிப்ரவரி, மார்ச், ஏப்ரல் மாதங்களில்), இப் பூஞ்சை முதலாவது வகை ஸ்போர்களைத் தோற்றுவிக்கின்றது. இது நுக்கியல்கள் கொண்ட பல கதறபாக்கள் இலைின் புறத் தோலுக்குச் சிற் இணையாக அமைகின்றன. தங்கள் நுளிகளில்

ஆரஞ்சு வண்ணம் யூரிடோஸ்போர் (uredospore) என்ற ஒரு செல் (இரு நூக்கியல்) ஸ்போர்களை உண்டாக்குகின்றன (படம் 179a). இந்த யூரிடோஸ்போர்களைக் அழுத்தத்தினால் புறத்தோல் மிழிந்து ஆரஞ்சு (அல்லது) பழுப்பு வண்ணத்திட்டுகள் (patches) இவைகளின்மேல் உண்டாகின்றன. இது 'சிவந்த ரண்ட் படிவம்' (red rust stage) என்று குறிப்பிடப்படுகின்றது. யூரிடோஸ்போர்கள் கொண்ட இத்தத் திட்டு யூரிடினியம் (uredinium) என்றும், யூரிடோஸ்போரம் (urediosorus) என்றும் அழைக்கப்படுகிறது.

யூரிடோஸ்போர் ஆரஞ்சு-பழுப்பு வண்ணத்துடன், —இரு நூக்கியல்களுடன் (dikaryon) மெல்லிய உறைகளையும் கொண்டுள்ளது. இவை கோடைக் காலத்தில் பொதுவாகக் காணப்படுவதால் கோடை ஸ்போர்கள் (summer spore) என்றும் குறிப்பிடப்படுகின்றன.

இந்த யூரிடோஸ்போர் கைரபானினிருந்து பிசிந்து காற்றினால் எடுத்துச் செல்லப்பட்டு மற்ற வயல்களிலுள்ள கோதுமைப் பயிர் இலைகளின்மேல் வீழ்கின்றன. சாதகமான சூழ்நிலை அமைந்தவுடன் அது முளைக்க ஆரம்பிக்கிறது. அப்போது ஒரு மெல்லிய முளைகுழல் (germ tube) வளர்ந்து, இதை நுனியின் வழியாக உள்பேர் பிரவேசிக்கின்றது. ஸ்போரின் உள்ள இரு நூக்கியல் களும் முளை குழலுக்குள் சென்று பின்னர் இளைப்பாடுபின் மூலம் இரட்டை நூக்கியல் செல்கள் கொண்ட கைரபாக்களை (dikaryon) உண்டாக்குகின்றது. இந்த கைரபாக்கள் தன்ரூக வளர்ச் சிவடைத்து சிவ தாட்களுக்கெல்லாம் மூல் கூறப்பட்ட முறைகளில் புதிய யூரிடோஸ்போர்களை உண்டாக்குகின்றன. இவ்விதமாக பல யூரிடோஸ்போர் சத்தினால் தோன்றி எண்ணற்ற பயிர்களைத் தாக்குகின்றன. ஆகவே, யூரிடோஸ்போரின் பணி பல பயிர்களைத் தாக்கி, இப் பூஞ்சை மென்மேலும் பரவுவதற்கு உதவுவதே யாகும்.

கோடைக்காலம் முடிந்தவுடன் மைலீனியம், டெலூடோஸ்போர் (teliospore) அல்லது டீலியோஸ்போர் (teliospore), எனும் இரண்டாவது வகை ஸ்போரைத் தோற்றுவிக்கிறது (படம் 179b). இந்த ஸ்போர் யூரிடோஸ்போரைப் போலவே புறத்தோல் மிழிந்தவுடன் டெலூடோஸ்போராக (teliospore) தோன்றுகிறது. கருத்திருத்தவால் அவை தோன்றும் பாகங்களில் (இவை அல்லது தண்டு) கருத்திட்டுகள் காணப்படுகின்றன (படம் 179c). இதுவே 'கருத்த ரண்ட் படிவம்' (black rust stage) என்று குறிப்பிடப்படுகிறது.

டெலுடோல்போர்கள் காணப்படும் இடங்களுக்கு டெலுடோனோரஸ் (telonosorus) அல்லது மலியம் (telium) என்று பெயர். ஒவ்வொரு டெலுடோல்போரும், நீள் வட்ட வடிவத்துடன் (ellipsoidal), சுருத்த இரு செங்களாக ஆனது. இதன் முகவெ அம்சம் மிகக் கெட்டியான உறைபைக் கொண்டுள்ளதெயராகும். ஒவ்வொரு செவிலியும் ஒரு ஜோடி நுக்கியங்கள் காணப்படும்.

இந்த டெலுடோல்போர்கள் முழுவளர்ச்சி அடைந்தவுடன் நிகத்திய விழுத்துவிடுகின்றன. பின்னர் தொடர்ந்து வரும் குளிர் காலம் முழுவதையும் இந்த டெலுடோல்போர் மஞ்சளிக் ஒய்வு நிலையில் கழிக்கிறது. அதன் கெட்டியான உறை பாதகமான சூழ்நிலையினின்றும் செங்களைப் பாதுகாக்கின்றது.

இச்சமயம் டெலுடோல்போரின் செங்கள் ஒவ்வொன்றிலும் உள்ள இரு நுக்கியங்களும் இளைகின்றன. சுருத்த வசந்த காலத்தில் இந்த டெலுடோல்போர் மூளைக்க ஆரம்பிக்கிறது. ஒவ்வொரு செவிலிக்குத்தும் ஒரு 4-செல் கிபிரேக்மோ பேனிட்யம் (4-celled rhizogonobasidium) தோன்றுகிறது. அதன் செல் ஒவ்வொன்றிலிருத்தும் ஒரு க்டெரீக்மா வளர்ந்து அதன் நுனியில் ஒரு பேனிட்யோல்போர் உண்டாகிறது (படம் 179a, ஏ).

இந்த தாக்கு பேனிட்யோல்போர்களில் இரண்டு + ஸ்ட்ரெபி ஐசையும் மற்ற இரண்டு - ஸ்ட்ரெபிஐசையும் அமைகின்றன. இந்த ஸ்போர்சளுக்கு மொட்டுநிலும் ஆற்றல் இல்லை. இந்த பேனிட்யோல்போர் மாற்று ஆதாரத் தாவரமான (alternate host) பார்பரீச் செடியின் (Berberis vulgaris) இலைகளிலுள்ள தாண்மைவிலிபத்தை உருவாக்க வல்லது. பேனிட்யோல்போர் மூளைக்கும்பொழுது மூளைகுழல் புறத்தோலை ஊடுருவி உட் சென்று ஒற்றை நுக்கியல் ஊறுபாக்களை (monokaryotic hyphae) உண்டாக்குகின்றது. இவ்விதமாகப் பல பேனிட்யோல்போர்கள் அதே இளைபைத் தாக்கினால் அந்த இலைக்குள் இருவித (+, -) மைஸீவிலங்கள் உண்டாகக்கூடும்.

சில நாட்களுக்குக்கெல்லாம் பார்பரி இலையின் மேல்புறத் தோலின்சிறு ஆங்காங்கே குடுவை போன்ற அமைப்புகள் தோன்றுகின்றன. இவை ஒவ்வொன்றிற்கும் க்டெர்மகோனியம் (spermatogonium) அல்லது மிக்னியம் (pycnium) என்று பெயர். இது மேல்பாகத்தில் ஒரு நிற துவாரத்தைக் (ostiole) கொண்டுள்ளது. ஒவ்வொரு க்டெர்மகோனியத்துக்குள்ளும் பல ஊறுபாக்கள் துறைத்து தங்கள் நுனிகளினின்றும் க்டெர்மகோனியம்

(spermatium) என்று கூறப்படும் கம்பெர் போன்ற செவ்வளைத் தோற்றமிக்கின்றன. மற்றும் கம்பெர்மகோனியத்தில் அடிப் பாகத்திலிருந்து சில தனிப்பட்ட ஹைபாக்கள் மேல் தொக்கி வளர்ந்து ஆண்டியோக் வழியாக வெளியே நீட்டிக்கொண்டு காணப்படுகின்றன. இவைகள் ஏற்கும் ஹைபாக்கள் (receptive hyae) என்று குறிப்பிடப்படுகின்றன (படம் 179g).

ஒரு கம்பெர்மகோனியத்தில் உள்ள கம்பெர்மேஷியங்களும், ஏற்கும் ஹைபாக்களும் ஒரே நிலையை அதாவது + அம்வது — நிலையைச் சார்ந்துள்ளன. கம்பெர்மகோனியம் ஒவ்வொன்றின் மீதும், தேன் போன்ற இனிப்பான நிரவம் சுரந்து, ஆண்டியோக் வழியாக வெளியே வருகின்றது. அந்த நிரவம், கம்பெர்மேஷியம் களைவும் உட்கொண்டு வெளியே செல்லுகின்றது. அடுத்தடுத்த துளிகள் இரு கம்பெர்மகோனியங்கள் ஒன்றுக்கொன்று மாறுபட்ட கட்டரெயின் ஹைபாக்களைக் கொண்டிருந்தால், அந்த தேன் துளிகள் வெளியிட்டு பரவும்போது, கம்பெர்மேஷியங்கள், ஏற்கும் ஹைபாக்களின்மேல் பட்டுத் தொடர்பு கொள்ளும் வாய்ப்புக் கிடைக்கிறது. இதுவல்லாமல் இத்தத் தேன் துளி போன்ற நிரவத்தால் பூச்சிகள் (insects) இலைப்பரப்பின்மேல் சுஞ்சரிக்கும் சமயங்களிலும் தற்செயலாக, கம்பெர்மேஷியம் ஏற்கும் ஹைபாவுடன் சேர நேரிடுகின்றது. இவ்விதம் நடக்கும் சம்பவத்துக்கு கம்பெர்மடைனேஷன் (spermatisation) என்று பெயர் (படம் 179g).

கம்பெர்மேஷியம் ஏற்கும் ஹைபாவிடமிருந்து படித்தவுடன் இடையில் உள்ள உறைகள் கரைந்து கம்பெர்மேஷியத்தின் நுக்கியல் ஏற்கும் ஹைபாவினுள் செல்லுகின்றது. பின்னர் அந்த நுக்கியல் குறுக்குச் சுவரின் மத்தியில் உள்ள துவாரத்தின் வழியாக ஒரு செவ்வளை இருந்து மற்றொரு செவ்வுக்குள் பிரவேசித்து முடிவில் ஏற்கும் ஹைபாவின் அடி முனைச் செவ்வுக்குள் சென்று அந்த செவ்வளை இரட்டை-நுக்கியல் நிலை அடைவர் செவ்வளை (dikaryotise). இவ்விதமாக இரட்டை நுக்கியல் நிலை அடைவும் ஏற்கும் ஹைபாக்கள் பல கீழ்ப்புறம் தீண்டு பார்பரி இலைவின் அடியுப் பாகத்தில் ஒருங்கே சேர்கின்றன. இவை ஒவ்வொன்றிலும் நுனிச்செம் இரட்டை நுக்கியல் நிலையை (dikaryon) அடைத் திருப்பதை எளிதில் காணலாம்.

இச் சமயத்தில் பார்பரி இலைவின் கீழ்ப்புறத் தோளின் உட் புறத்தில் குவளை வடிவம் கொண்ட அமைப்புகள் காணப்படும். இவற்றிற்கு ஏனிடயா (aecidia) அல்லது இரள் குவளைகள் (cluster cups) என்று பெயர். இந்த ஏனிடயாக்கள் சுற்றிப் பக்கங்களில்

மலட்டு ஹைபாக்கள் பெரிசுயப் போர்வையை உண்டாக்குகின்றன. அவை ஒவ்வொன்றின் அடிமட்டத்தில் ஏற்றும் ஹைபாக்களின் (இரட்டை நூக்கியல் கொண்ட) நுனிச் செவ்விகள் ஒவ்வொன்றும் ஒற்றை வரிசைக் கிரமத்தில் பல மஞ்சள் திரும் கொண்ட உப்போர்களைச் சக்திப் போலி (chain-like) ஒன்றன்பின் ஒன்றாகத் தோற்றுகின்றன. இந்த உப்போர்களுக்கு 'ஏலிடியோ உப்போர்கள்' (aecidiospores) என்று பெயர். இந்த உப்போர் ஒவ்வொன்றும், ஒரு ஜோடி நூக்கியல்களை (dikaryon) கொண்டுள்ளது. 'ஏலிடியோ உப்போர்' காற்றிலும் எடுத்துச் செல்லப் பட்டுத் கோதுமைப் பயிரில்மேல் கிற தேரிட்டாகம், முளைத்து உகளை சென்று இரட்டை நூக்கியல் கொண்ட ஹைபாக்களைத் தோற்றுகின்றது. ஆகவே, மறுபடியும் கோதுமைப் பயிரிலும் இரட்டை நூக்கியல் பருகம் (dikaryophase) தொடங்குகிறது (படம் 179 ஓ, ஒள, அ). ஆகும், இந்த ஏலிடியோ உப்போர் மறுபடியும் பார்பரிச் செவ்விக்மேல் கிற தேரிட்டாகம் அது முளைப்பதில்லை.

இந்தப் பூஞ்சை பிரதம ஆதாரத்தாவரமான கோதுமைப் பயிரில்மேல் இருவகை உப்போர்களையும் (ஸ்பிரிடோஸுப்போர், டெலூடோஸுப்போர்), திவத்தில் ஒருவகை உப்போரையும் (பேலிடியோஸுப்போர்) மாற்று ஆதாரத் தாவரமான பார்பரிச்செவ்விக்மேல் இருவகை உப்போர்களையும் (உப்பெர்மேஷியம் அல்லது உப்பெர்மேஷியோஸுப்போர்—permatiospore, ஏலிடியோஸுப்போர்) உண்டாக்குகின்றது. ஆகவே, இந்தப் பூஞ்சையை நீண்ட காலங்களைச் சுழல் கொண்ட ரக்ட் பூஞ்சை (macrocyclic rust) என்று அழைக்கலாம்.

இதற்கு மாறாக வெண்ணடைக் குடும்பத்தைச் (Malvaceae) சேர்ந்த ஆல்தியா (Althaea) செடியைத் தாக்கும் ப. மாக்வேலி மேரம் என்னும் சிற்றினம் டெலூடோஸுப்போர், பேலிடியோஸுப்போர் ஆகிய இருவகை உப்போர்களையே தோற்றுகிறது, ஒரே ஆதாரத் தாவரத்தின்மேல் தன் வாழ்க்கையைக் கழிக்கின்றது. ஆகவே, இந்தச் சிற்றினம் குறுகிய வாழ்க்கைச் சுழல் கொண்ட ரக்ட் பூஞ்சை (microcyclic rust) என்று குறிப்பிடப்படுகிறது.

பச்சிலியா கிராமியினில் நிறம்புத் தன்மை

பச்சிலியா கிராமியினில் என்னும் சிற்றினத்தினும், செயலியத் தன்மையில் (physiology) வேறுபடும் பல கூட்டுரையின்கள் (strains) உள்ளன. இந்த கூட்டுரையின்கள் புறத்தோற்றத்தில் ப. கிராமியினை ஒத்தபோதிலும், தாக்கும் தன்மையில் வேறுபடுகின்றன.

சான்றாகக் கோதுமையைத்தாக்கும் கூட்டுரெயின் மற்ற பயிர்த்துகில் ரகம். தோமைய உண்டாக்குவதில்லை. அதுபோல் பார்லி, ஓட்டலின் ரகம் தோமைய உண்டாக்கும் கூட்டுரெயின் கோதுமைக்கு தாசம் விளைவிப்பதில்லை. இவ்வாறு ஒவ்வொரு பயிரையும் தாக்க, குறித்த அம்சங்கள் கொண்ட கூட்டுரெயின்கள் பண்புநிறம் பெற்றிருப்பதால், பச்சிலியா ரொயினினையிதத் தனித்தன்மை வாய்ந்த (biological specialization) சிற்றினமாகக் கருதப்படுகிறது.

ஒரு சிற்றினத்திலேயே பல கூட்டுரெயின்கள் காணப்படுவதால், குறிப்பிட்ட கூட்டுரெயின் ஒன்றைக் கட்டிக் காட்ட, சிற்றினத்தின் பெயரைத்தவிர, அதனாக் தாக்கப்படும் பயிரின் பெயரையும் குறிப்பிட வேண்டிய நிலை ஏற்படுகிறது. எனவே இத்தகைய பெயர், மரபிற்கு மாறாக மூன்று வார்த்தைகளாகக் கொண்டுள்ளது (Trinomial Nomenclature). (உ-ம்.) கோதுமையைத் தாக்கும் கூட்டுரெயின் பக்ரீனியா ரொயினின் துரியசு (P. graminis tritici) என்றும், ஓட்டலினத் தாக்குவது பக்ரீனியா ரொயினின் அவினே (P. graminis avenae) என்றும், பார்லியைத் தாக்குவது பக்ரீனியா ரொயினின் ஹார்டுஸ் (P. graminis hardi) என்றும் பயன்படுகின்றது.

இச் செறப்புத் தன்மையைப் பெற்றிருப்பதால் இப் பூஞ்சைகளில் ஏற்படும் தோமைய நீக்குவது மிகவும் கடினமாக உள்ளது. இத்தோமைய எதிர்த்த திற்கும் திறன் பெற்ற பயிர்களை வளர்க்கும் போது (breeding for resistance) இப் பூஞ்சையின் செறப்புத் தன்மையைக் கருத்திற் கொள்ள வேண்டியது இன்றியமையாததாகும்.

‘என்’ பிரச்சனை.

எனவே, கோதுமையின் ஒரு பருவம் முடித்து, மறுபருவம் தொடங்கும்வரை (ஏப்ரல்—செப்டம்பர்) இப் பூஞ்சை தன்னைக் கோட்டயின் அதிக உஞ்சைநிலையிலிருந்து எந்த நிலையில், எப்படித் தாத்துக்கொண்டு, பின் மறுபடியும் அடுத்த கோதுமைப் பயிரைத் தாக்குகிறது என்பது ஒரு புதிதாக இருந்தது. இதைக் கண்டறிய முற்பட்ட திபுணர்கள் மேல் தாடுகளின் இப் பூஞ்சையின் வாழ்க்கைக் கழுவின் மூக்கியமான படிவங்கள், பார்பரிச் செடி, விசேடவியை கழிக்கப்படுவதால், இச்செடிகளைக் களைத்ததற் றி வாழ்க்கைக்கழுவைத் துண்டிப்பதால் தோமையத் தடுத்தாவிடவாம் என்று கருதினர். ஆயின், இச் செடிகள் அகற்றப்பட்ட பின்னும் தோயின் கடுமை குறைவவில்லை.

நம் நாட்டில் கறுப்பு ரஸ்ட் நோய் பரவுதலில், மாற்று ஆதாரத்தாலவரமான பார்பசிச் செடிகளின் பங்கு மிகவும் குறைவு என்று பேராசிரியர் மேத்தா (Prof. Mehta) என்னும் பூஞ்சைவியல் அறிஞர் கண்டறிந்தார். மேலும், மண்ப்பகுதிகளிலிருந்து பிச் கொடைக்காமக் கோதுமைப்பயிர்களில் உள்ள பூஞ்சையின் ஐரிடோஸ்போர்களை, சிறிது சிறிதாகச் சமவெளியை அடைத்து, மறுபடியும் கோதுமைப் பயிரைத் தாக்குகின்றது என்றும் ஆராய்ந்தறிந்தார். இந்நோய் கடுமையாகச் சமவெளிகளில் பரவி, பயிர்ச் செடிகளைத் தாக்குவதற்கு மண்ப்பகுதிகளில் உள்ள கோதுமைப் பயிரே காரணமாக இருப்பதால் அப்பகுதிகளில் கோதுமை பயிர் செய்யப்படுவதை அறவே நிறுத்திவிட்டல் வேண்டும் என்று கேட்டுக் கொண்டார். இதைத் தொடர்ந்து செய்யப்பட்ட ஆராய்ச்சிகள், கோதுமைப் பயிர் மட்டுமன்றி அதையொத்த (தொடர்புறவு கொண்டுள்ள) பூச் செடிகளும் ஆதாரத்தாலவர்கள் களாக இருக்கக்கூடும் என்று காட்டின. எனவே, இந்நோய் பரவுதலைத் தடுக்க பூஞ்சைக் கொல்லிகளைத் (fungicides) தெளிப்பதும் (spraying) தோண்டி எதிர்த்து நிற்கும் திறன் பெற்ற பயிர்களை வளர்த்ததும் தவிர வேறு வழிகள் இன்றுவரை ஏதும் புலப்படவில்லை.

துணைவகை : நோமோ பேஸிடியோமைரைட்டிஸ்

(Sub-class : Homobasidiomycetes)

இந்தத் துணைவகையில் அடங்கும் பூஞ்சைகள், நெடரோ பேஸிடியோமைரைட்டிகளிலின்றும் சீழ்க்கண்ட அம்சங்களில் வேறுபடுகின்றன.

(1) இவை இனப்பெருக்கத்தின்போது பொதுவாக பேஸிடியோகார்ப் (Basidiocarp) என்று கூறப்படும் பெரிய கிப்பூட் பாடிகளை (fruit-bodies) கண்டாக்குகின்றன.

(2) இவற்றின் குறுக்குச் சுவரற்ற பேஸிடியபம் குண்டாத்தடி போன்று உச்சியில் 4 பேஸிடியோஸ்போர்களை கொண்டுள்ளது.

(3) பேஸிடியபம் நேரடியாக ஒரு ஸ்போரிலிருந்து வளருவதில்லை. (பச்சிலியானிலும் அக்டிமேகானிலும் முறையே டெனூடோஸ்போர், ஸ்மடஸ்போர் நேரடியாக பேஸிடியத்தைத் தோற்றுவிக்கிறது.) ஆனால், இந்தத் துணை வகையின் ஸ்போரிலிருந்து ஒரு பரவலான மைரீனியம் கண்டாகிப் பின்னர் இனப்பெருக்கக் காலத்தின் ஊறுபாக்களின் மூலியில் பேஸிடியபம் தோன்றுகிறது.

(4) பேலிடிபங்கள் தனித்தனியாக இல்லாமல் எப்போதும் வரிசையாக அமைந்து ஓர் அடுக்கின் (hymenial layer) உண்டாக்கின்றன.

(5) ஒத்த நூக்லியஸ் செல் சுற்றுபாக்கள் (monokaryotic hyphae) இரட்டை நூக்லியஸ் செல் சுற்றுபாக்களாக மாற்றம் அடையும்போது 'கிளம்பு' இணைப்பு (clamp-connection) மூலம் நடைபெறுகின்றது. பாகுபாட்டையும் நுனிச் செல்லின் இரு நூக்லியஸ்களும் பகுபடுகள் தொடக்கத்தில், தீவிரப்பட்டதில் ஒன்றன்பிற ஒன்றாக அமைந்துள்ளதைக் காணலாம். இவை மையலில் முதலில் பாகுபாட்டடைகின்றன. அத்தருணத்தில் செல்லின் மேல்பாகத்தில், ஒரு பக்கத்தில் (laterally) வளைந்த கொக்கிபோன்ற குழம் உண்டாகிக் கீழ்ப்பாகத்துடன் தொடர்பு கொள்கிறது. இக் குழம்மூலம், மேல் உள்ள நூக்லியஸின் செல் நூக்லியஸ், கீழ்ப்பாகத்திற்கு நகர்ந்து அங்குள்ள நூக்லியஸுடன் இணைகிறது. மேல்பாகத்திலுள்ள ஜோடி நூக்லியஸுக்கும் கீழே உள்ள நூக்லியஸுக்குமிடையே குறுக்குச் சுவர் உண்டாகி, அக் கிளம்பு இணைப்பு, பின்னர் விரிம்பு போல் இரு செல்களுக்கும் ஒரு பக்கத்தில் அமைந்து விடுகிறது (படம் 171).

(6) பொதுவாக, எம்மாப் பேலிஸ்களும் சாறுண்ணிகளே யாகும். இந்த தோறமா பேலிடியோமைஸீட்ஸ், (1) சுற்றமடுகு மைஸீட்ஸ் (Hymenomycetes), (2) காண்டிரோமைஸீட்ஸ் (Gasteromycetes) என்ற இரு வரிசைகளாகப் பிரிக்கப்பட்டுள்ளது.

சுற்றமடுகுமைஸீட்டிக் பேலிடிய அடுக்குகள் தொடக்கத்தில் விஞ்ஞே வெளிப்படுத்தப்பட்டிருக்கின்றன. ஆனால், காண்டிரோமைஸீட்டிக் பேலிடிய அடுக்குகள் பேலிடியோகார்ப்பியூஸ் மறைத்திருந்து, முதிர்ச்சியடைந்த பின்னரே வெளியே காணப்படுகின்றன.

வரிசை : சுற்றமடுகுமைஸீட்ஸ்
(Hymenomycetes)


பெருங்குடும்பம் : அகேரிகேலிஸ்
(Order : Agaricales)

குடும்பம் : அகேரிகேசை
(Family : Agaricaceae)

அகேரிகஸ் (Agaricus) (குடைக்காளான்—Mush room)


அகேரிகஸ் அங்கம் பொருள் அநிமமாகக் கொண்டுள்ள ஈர மண்ணிலும், அருகும் மரக்கட்டைகளின் மேலும் சாறுண்ணியாக வளரும் ஒரு காளானாகும். இதன் மைஸீடியம் அடித்தளத்துக்குள்

பரவிப் புதைந்து விடக்கும். சில சமயங்களில் பல இனங்கள் இணைந்து வெண்மையான கவிழ போன்று தோன்றும். இதற்கு ஊரஜோமார்ப் (rhizomorph) என்று பெயர்.



படம் 180

அகிலிகை—பெரிய யோகார்ப்பின் கவிழ்ப்பு



படம் 181


அகிலிகை—கவிழ்ப்பின் ஒரு பாகத்தின் குறுக்குவெட்டுத் தோற்றம்

இனப்பெருக்கத்தின்போது, பெரிய குடைபோன்ற ஒரு பெரிய யோகார்ப் பூமிக்குமேல் அடித்தளத்திற்கு வெளியில் தோன்றுகிறது (படம் 180). இது முழுமையும் இரட்டை நுரகிலியல்

ஹைபாக்களால் ஆனது. அவற்றில் ஆங்காங்கே இனாம்பு இணைப்புகள் காணப்படும். அடித்தளத்திலுள்ள ஹைபாக்களுக்கு இடையே இணைப்புகள் ஏற்பட்டு இரட்டை நூக்கியல் நிலை உண்டாகி, அவற்றின்மூலம் இரட்டை நூக்கியல் ஹைபாக்கள் மிகுதியாகத் தோன்றி, இப் பேஸிடியோகார்ப்பை உண்டாக்குகின்றன.

இத்தக் குடைபோன்ற கிப்ரூட் பாடி, மனறக்காலங்களில் குறுகிய காலத்தில் (ஒர் இரவுக்குள்) பூமிக்குமேல் வளர்ந்து காணப்படுகின்றது. இதன் தண்டிற்கு க்ஸ்டைப் (stipe) என்றும், குடை போன்ற அரைக்கோள வடிவப்பாகத்திற்கு கபலியல் (pileus) என்றும் பெயர். இப் கபலியலின் அடிப்பாகத்தில் பல தகடு போன்ற (prae) பாகங்கள் ஆரவளைவுகள் போல் அலைவலைமாக அமைந்துள்ளன. ஒவ்வொன்றிற்கும் கில் (gill) அல்லது லேமெல்லா (lamella) என்று பெயர். இத்த கித்தான் பின்னர் பேஸிடியல்களை உண்டாக்குகின்றது.

இத்த கில்லின் குறுக்குவெட்டுத் தோற்றம் (படம் 181) அதன் அமைப்பை நன்கு வெளிப்படுத்தும். அதன் மத்தியில்



படம் 181

அகேரீகல் - ஒரு கில்லின் கிள்வெட்டுத் தோற்றம்

செங்குத்தாகவும் கச்சிதமாகவும் அமைந்த ஹைபாக்கள் காணப்படுகின்றன. இத்தப் பாகத்திற்கு டிராமா (trama) என்று பெயர். கில்லின் இரு பக்கங்களிலும் எண்ணற்ற பேஸிடியல்கள்

அடுக்குகளாக அமைந்திருப்பது புளனாகும் (படம் 181, 182). இந்த பேலிடிபயங்களுக்கு இடையே ஆங்காங்கே, மலட்டு பேலிடிபயங்களும் காணப்படும். ஒவ்வொரு பேலிடியையும் உச்சியில் 4 பேலிடியோல்போர்களை உண்டாக்குகின்றது. பேலிடியத்திற்குள் உள்ள இரு தூக்கியல்கள் முறைப்படி இணைந்து மையவானின் முறைமையில் பகுப்பட்டு, உண்டாகும் 4 ஒற்றைமய தூக்கியல்களும் பேலிடியத்தின் உச்சியில் தோன்றும் 4 பேலிடியோல்போர்களுக்குள் சென்றுகின்றன.

பேலிடியோல்போர்கள் ஸ்டெரீக்மாக்களின்மேல் செங்குத்தாக அமைவாமல் சாயத்து (oblique) அமைந்துள்ளன. பேலிடியோல்போர் முழுவளர்ச்சி அடைந்தவுடன் அதன்மேல் ஒரு நீர்த்துளி தோன்றிப் பெரிதாகும். அந் நீர்த்துளியும் ஸ்போரம் ஒரங்கே விசைவுடன் எழியப்படுகின்றன. இந்த ஸ்போர் சாதகமான இடத்தில் விழுமானால், அது முளைத்து மைஸீவியத்தை உண்டாக்குகின்றது.

விவகமாக அகேரீகஸ்களின் பேலிடியோகார்ப்புகள் உண்ணக்கூடியன. ஆகவே, மேலை நாடுகளிலும், மலேசியா, பர்மா முதலிய நாடுகளிலும், நம் நாட்டிலும் இந்த அகேரீகஸ்கள் மக்கள் விருப்பம் உண்டவுப் பொருளாக மூக்கியத்துவம் அடைந்து வருகின்றன. ஆனால், சில 'அகேரீகஸ்' இனங்கள் விஷப்பொருளான 'மயங்காரின்' (muscavine) என்ற ஆங்ககாய்க்கை (alkaloid) மிகுதியாகக் கொண்டிருத்தலால், எச்சரிக்கையுடன் இவைகளைப் பொறுக்கி எடுத்து உண்ண வேண்டிய நிர்வபந்தம் ஏற்படுகின்றது.

பாலிபோரஸ்


(Polyporus)

பிராக்ட் காளான்

(Bracket Fungus)

பாலிபோரஸ் என்னும் காளான் பொதுவாக காடுகளிலுள்ள மரங்களிற் தாக்கி அடிமரத்தின்மேலும், கிளைகளின்மேலும் மிகப் பெரிய பேலிடியோகார்ப்புகளைத் தோற்றுவிக்கின்றது (படம் 183). இதன் செற்றினங்களில் சில ஒட்டுண்ணியாகவும் சில சாறுண்ணியாகவும் வாழ்கின்றன. ஒட்டுண்ணிகள் உயர்ந்ததாக மரங்களான கருங்காணி (Rose wood), ஒக் (Oak) முதலியவைகளையும், மூங்கில் (Bamboo) மதறும் ஆப்பிள் முதலியவற்றைத் தாக்கிச் சேதத்தை விளைவிக்கின்றது.

இத்தக் காளாவின் எமனீயியம் ஆகாரத் தாவரத்தின் துகக்கன்குக்குள் முதலில் மறைத்து வளர்த்து, பின்னர் பட்டை வயப் பிளந்து அதன் வழியாகப் பெரிய பேனிகியோகாசும்பை



படம் 183

பேனிகியோகாசும்பை—பேனிகியோகாசும்பை மெய்யுதத் தோத்தம்




படம் 184

பேனிகியோகாசும்பை மெய்யுதத் தோத்தம்

வெளிப்படுத்துகிறது. இத்த கிழங்குப்பாடி அகன்று மரத்தைச் சுற்றி வளர்த்து தட்டையாகவும், அரைவட்ட வடிவத்திலும்

காணப்படுகின்றது. மரத்தைச் சுற்றி வளர்வதால் அது பிராக்டிட் கானால் (Bracket fungus) என்று அழைக்கப்படுகிறது.

இப் புழுட்பாடியில், ஹைபாக்கள் நெருங்கி ஒன்றுடன் ஒன்று இணைந்து அமைந்திருப்பதால் பாரங்கைமார்போம் தோற்ற மளிக்கின்றன. ஆயின், இது ஒரு போலி பாரங்கைமார்போம் (pseudo-parenchyma). புழுட்பாடியின் மேல்பக்கம் மரப்பட்டை போன்றும், வளர்ச்சியைக் காட்டும் பல வரிக்கோடுகளைக் (growth lines) கொண்டும் உள்ளது (படம் 183). கீழ்ப்புறத்தில் தேங்கு போன்று எண்ணற்ற துவாரங்கள் இருப்பது புலப்படும் (படம் 184). இதனாலேயே இத்தக் கானானிற்குப் பானியோரல் (Poly-பல : porous-துவாரங்களுடைய) என்ற பெயர் கொடுக்கப் பட்டது. இத்தத் துவாரம் (pore) ஒவ்வொன்றும் உட்புறத்தில்



படம் 185

பானியோரல்—பேலியோரல்களால் ஒரு பாகத்தில் குறுக்குவெட்டுத் தோற்றம் உள்ள குழல் போன்ற (tube) வெற்றிடத்தின் மூடியே ஆகும். இத்தக் குழல் போன்ற வெற்றிடத்தைச் சுற்றிலும் எண்ணற்ற பேலியோல்கள் (வெற்றிடத்தைத் தோக்கி) ஓர் அடுக்காக (hymenial layer) அமைந்துள்ளது. பேலியோல்களால் குழப்பட்ட சமதர வட்ட வெற்றிடங்கள் குறுக்கு வெட்டுத் தோற்றத்தில் காணப்படுகின்றன. இவற்றினின்று பேலியோ அமைப்பை நன்கு அறியலாம் (படம் 185).

ஸ்போர் வெளியேற்றத்தில் போது, பேலியோரல்களால் புக்கள் ஆதாரத்தாவரத்தினின்றும் நீரினை மிகுதியாக உறிஞ்சுகின்றன. குழல்கள் மூலம் நீர் சொட்டும்பொழுது, ஸ்போரையப்படுக ஸ்போர்கள் கீழே விழுகின்றன.

பா. பிளீயிடஸ் (P. hispidus), பா. ஹெமென்டேரியஸ் (P. foenicularius) ஆகிய சிற்றினங்கள் ஆப்பிரி, பேரி, பனம் (plum) முதலிய பழமரங்களைத் தாக்கி 'கெலிகை இருதயக் கட்டைதோய்' (white heart-rot) என்னும் நோயை உண்டாக்குகிறது.

இந்த ஸ்போரங்கள், மரங்களின் உடைத்த பாகம், காயங்கள் முதலியவைமேல் படிந்தால் முளைத்து மெடல்ஸரி கதிர்ச் செடிகள் வழியாக உட்சொற்றினை (pith) அடைத்து இருதயக் கட்டையைச் சிதைவடையச் செய்கிறது. இதன் காரணமாக மரத்தில் கெலிப் புறத்தில் பிளவுகள் ஏற்படுகின்றன. இப் பிளவில் வழியாக பேஸிடியோகார்ப்புகள் வெளியே தள்ளப்படுகின்றன.

வரிசை : காண்டிசுரோமைசிடீஸ்
(Series : Gasteromycetes)

ஸைக்கோபர்டன்
(Lycoperdon)

பூப் மந்து (Puff ball): பேஸிடியோமைசிடீஸ் பூஞ்சைகளுள் மண்ணில் காறுண்ணியாக வளரும் மற்றொரு பேரினம் ஸைக்கோபர்டான். இவை மட்டில் வளர்ந்து பின்னர் தரைமீன்மேல்



பேஸிடியோ கார்ப்

படம் 186

ஸைக்கோபர்டான்—பேஸிடி
யோகார்ப்



படம் 187

இதன் பேஸிடியோகார்ப்புகள்
கிடைக்கத்தொத்தம்

கோள அணுறு பேரி வடிவ பேஸிடியோகார்ப்புகளைத் தோற்று விக்கின்றன (படம் 188).

தரைமட்டத்தில் வீழ்ந்த ஹைபாக்கன் பல தீனவாட்டிக் ஒரூக்கே இணைதலால், கவிழ போன்ற ஹர்தோமார்ப் (rhizomorph) உண்டாகி, பின் தோன்றும் கீழ்குட்பாடிகளை மண்ணில் திசைநிழத்துகின்றன.

தொடக்கத்தில், இனம் பேலிடியோமார்ப்பிக் ஒரேகிதமான ஹைபாக்கன் பின்னிக்கிடக்கின்றன. சில காலத்திற்குப் பின்னர், இப்பேலிடியோமார்ப்பிக் பெரிடியம் (peridium) என்னும் மண்டூப் புறப்பாகம், கிள்பா (gleba) என்னும் இனப்பெருக்க அகப்பாகம் என இரு வேறுபட்ட பாகங்கள் தோன்றுகின்றன (படம் 187). போலி பாரங்கைமாரினால் ஆன வெளிப் பெரிடியம் என்றும், பாலிசேட் போல் அமைப்பினைக் கொண்ட உட் பெரிடியம் என்றும், பெரிடியத்தை இருவகைப்படுத்தலாம். பின்னர் கிள்பாவில், சில இடங்களில் உள் வாக்குதலால் குவித்த வெற்றிடங்கள் தோன்றுகின்றன. புதிதாக உண்டாகும் வேறு சில ஹைபாக்கன் இவ் வெற்றிடங்களால் நுழைந்து, பாலிசேட் செங்கல் போன்ற பேலிடியங்களைத் தோற்றுவிக்கின்றன (படம் 188).



படம் 188

தாவோவைட்டா - கிள்பாவின் ஒரு பாகம்

பத்து போன்ற கீழ்குட்பாடி பெரிதாகப் பெரிதாக புதுப்புது வெற்றிடங்களும் பேலிடியங்களும் அதிகரிக்கின்றன. வெற்றிடத் திற்குள் நுழையும் புதிய ஹைபாக்கன் நீண்டு அளவில் பெரிதாகி அவற்றின் நுவிப்பாகம் விரித்து பேலிடியமாக மாறுகின்றது. பேலிடியங்களில் 4 பேலிடியோமார்ப்போர்கள் கீட்டெரிக்கமாவின் மேல் நேராக அமைந்து வெற்றிடங்களுக்கு விசெயெறியப்படுகின்றன. சிறிது சிறிதாக சிறு வெற்றிடங்கள் பல இணைந்து ஒன்று சேர்ந்து ஒரு பெரிய வெற்றிடமாகின்றது. இப் பெரிய

வெற்றிடத்தினால் காணப்படும் ஹைபாக்கள் பேஸிடியங்கள். பேஸிடியோஸ்போர்கள் முறித்த ஹைபாக்கள் மாலும் ஒருங்கே 'காப்பிலிஷம்' (capillitium) என்று குறிக்கப்படுகின்றன.

பிறகு, எக்ஸோபெரிடியம் முறித்து, சிறு துகள்களாக உசி கிளர்ந்து (flakes off). என்டோபெரிடியத்தில் மேல் பாகத்தில் ஹைபாக்கள் சிதைவடைவதால் ஒரு துளிரம் உண்டாகி அதன் வழியாக இன்பாலிக் நிறைந்திருக்கும் மாவு போன்ற கம்போர்கள் வெளிவர இயலும்.

துருத்திவாய் போன்றவை (bellows) கீழ்குட்பாடி ஏதேனும் ஒரு பக்கத்தில் அபிந்தப்பெறின் அழுத்த, உள்ளே உள்ள கம்போர்கள் படலமாகத் துளிரத்தின்வழி வெளிவருகின்றன (புப்பி போல் (puff like)).

மழைக்காலங்களில் மரத்திலிருந்து சொட்டும் நீர்த்துளிகள் இப் பத்திக்குமேல் பட்டால் கூட கம்போர்கள் படலமாக வெளி யேற்றப்படுகின்றன.

எனவே, லைக்கோபர்டானிக், கம்போர்கள் வெளியேற்றப் படும்வரை, பேஸிடியங்கள் மூடப்பட்டிருப்பதைக் காணலாம். இந்த இயல்பில் இது, அகேரிகல் பாலிபோரஸ் பூஞ்சை களினிலும் முற்றிலும் வேறுபட்டுள்ளது.

எனவே, லைக்கோபர்டானிக், கம்போர்கள் வெளியேற்றப் படும்வரை, பேஸிடியங்கள் மூடப்பட்டிருப்பதைக் காணலாம். இந்த இயல்பில் இது, அகேரிகல் பாலிபோரஸ் பூஞ்சை களினிலும் முற்றிலும் வேறுபட்டுள்ளது.

வகை : டிபுட்டெரோமைஸிடீஸ்

(Class : Deuteromycetes)

குறைப்பூஞ்சைகள்
(Imperfect fungi)

இப்பூஞ்சைகளின் எம்ப்னீஷியம் குறுக்குச் சவருள்ள ஹைபாக் களைக் கொண்டவை. ஆனால், இவற்றில் சாதாரணமாக கொளி டியம் மூலம் தவிர வேறெந்த முறையிலும் இனப் பெருக்கம் நடைபெறுவதில்லை. இவைகளில் பாலிஸ்பெருக்கம் காணப்படு வதே இல்லை. இதில் அடங்கும் பேரீனங்கள் சாறுண்ணிகளாகவும் ஒட்டுண்ணிகளாகவும் காழ்கின்றன. சாறுண்ணிகள், பெரும் பாலும் மண்ணிலுள்ள அங்ககப் பொருள்கள் சிதைவுறும் நிகழ்ச்சியில் பெரிதும் ஈடுபட்டுள்ளன. ஒட்டுண்ணிகள் தாவரம்,

விவக்து, மற்றும் மனிதன் ஆகிய உயிரினங்கள் அநீதத்தையும் பாதித்துப் பல நோய்களை உண்டாக்குகின்றன. மனிதனின் பல சகும் விபாதிக்குக்கு (skin diseases) இவையே பெரும்பாலும் காரணமாக உள்ளன.

பல பேரினங்களின் கொளிடய படிவங்கள் ஆன்கோமைஸீட்டிசு கொளிடய படிவங்களை ஒத்துள்ளன, ஆகவே, இவை சில ஆன்கோமைஸீட் பூஞ்சைகளின் கொளிடய படிவங்களாக இருக்கலாம் என்று கருதப்படுகின்றன. அதாவது, இந்த ஆன்கோமைஸீட்டுகள் பரிணாமப் போக்கில், பானிஸப் பெருக்கத்ததத் தம் வாழ்க்கைச் சுழலினிருத்து நீக்கிப் பானிஸ இஸப் பெருக்கம் ஒன்றையே கொண்டுவிட்டன எனக் கருதப்படுகிறது.

சில சமயங்களில் செம்முறை வனர்த்தியில் (in culture) இத்தப் பூஞ்சைகளின் பானிஸப் பெருக்கப் படிவங்கள் (sexual stages) காணப்படுகின்றன. இப் படிவங்களை அடிப்படையாகக்கொண்டு முறைப்படி ஆன்கோமைஸீட்டுகளுடனேயேபெளிடயோமைஸீட்டுகளுடனே இப் பூஞ்சைகள் சேர்க்கப்படுகின்றன. ஆகவே, இப் பூஞ்சைகள் பெரும்பாலும் ஆன்கோமைஸீட்டுகளினுடைய (அல்லது சிறுபான்மை போளிடயோமைஸீட்டுகளின்) கொளிடய படிவங்களே என்றாலும் இவைகளின் பானிஸப்பெருக்கப் படிவங்கள் இதுவரை கண்டுபிடிக்கப்படவில்லை; அன்றா முற்றிலும் அறியப்படவில்லை என்று சிலர் எண்ணுகின்றனர்.

இப் பூஞ்சைகளின் உடமை, குறுக்குச் கவர் கொண்ட கிளைத்த ஹெர்பாக்களாக ஆனது. செக்கன் பொதுவாகப் பல நூக்கியங்கள் கொண்டவை. குறுக்குச் கவர்கள் மத்தியில் துவாரம் கொண்டவை. ஆகவே, கைட்டோபிரிஸாசகும் நூக்கியங்களும் ஒரு செக்கிலிருந்து அடுத்த செக்குக்குச் செல்ல வாய்ப்பு உள்ளது.

இப் பூஞ்சைகள் கொளிடயங்களின் உருவம், திறம், குறுக்குச் கவர், அமைப்பு, மற்றும் கீழ்குட் பாடியின் தன்மை ஆகிய வற்றை அடிப்படையாகக் கொண்டு (1) ஸ்பீரோஸைடிக் (Sphaeropsidales), மென்கோனியெலிக் (Melanconiales) (உ-ம்.) காலெட்ரிகம் (Colletotricum), (2) மானிலியெலிக் (Moniliiales) (உ-ம்.) ஃபுசேரியம் (Fusarium), (3) கைல்ஸீயா ஸ்டெரிலிஸா (Mycelia sterilia) (உ-ம்.) கைக்கோஸைஜா (Mycorrhiza) என்று நான்கு பெருக்குறும்பங்களாகப் பிரிக்கப்பட்டுள்ளன.

மான்னிலியேலிக்

(Moniliales)

பூஞ்சேரிடம்

(Fusarium)


இப் பூஞ்சையின் 400 சிற்றினங்களுள் பெரும்பாலானவை சாற்றுண்ணிகளாக (மட்டுண்ணிகளாக) மண்ணிலும் அங்கம் பொருள்களில் மேலும் வாழ்கின்றன. ஆனும், சில சமயங்களில் அவை ஒட்டுண்ணிகளாக மாறும் (facultative form) பயிர்களை அழிக்கின்றன. சில சிற்றினங்கள் பருத்தி, தக்காளி, வெள்ளரி, துவரை, வாழை, முதலிய பயிர்களைத் தாக்கி, 'வாடுதல்' (wilting) நோயை உண்டாக்குகின்றன. மற்றும் சில சிற்றினங்கள் சேமித்து வைக்கப்பட்டுள்ள உருளைக்கிழங்கு, சேம்பப்பிழங்கு, இஞ்சி முதலியவைகளைத் தாக்கி அழுகல் நோயை (rots) உண்டாக்குகின்றன.

வாடுதல் நோய்க்கு இரு காரணங்கள் உண்டு. ஒன்று, பூஞ்சையின் ஹைபாக்கள் சாற்றுக்குழாயிற் திரைகளில் (சைலம்) அடைத்துக்கொண்டு மேல் செல்லும் ஊட்டக் கரைசல் செல்ல வொட்டாமல் தடுப்பதாகும். பூஞ்சை சில தசைப் பொருள்களைத் தோற்றுவித்துச் சாற்றுக் குழாய்களைச் சுற்றியுள்ள திசுக்கள் பாதிக்கப்படுவதாலும் வாடுதல் ஏற்படலாம். இன்னொரு மனற்பாக்கான, நீர் மிகுதியாகக் கொண்ட மண்ணிலும், கலிமங்கள் குறைவாகவுள்ள நிலையிலும் நன்றாக வளர்ந்து பரவுகின்றது.

இத்தப் பூஞ்சையின் மைனீலியம் வெனிதிய ரோஜா (pink) கருநீலச் சிவப்பு (purple), மஞ்சள் முதலிய நிறங்களை உண்டாக்குவதால் அய்வண்ணங்களில் காணப்படுகின்றன. ஆகவே, இவ் வண்ணங்களிலிதே சில சிற்றினங்களை நினைவிடலாம்.

மான்ன இனப்பெருக்கம்: மேக்ரோகொனீடியா, மைக்ரோகொனீடியா, கெனமிடோஸ்போர் என்ற மூன்று வகையான கிபோர்சுக்களும் தடைபெறுகின்றது. கொனீடியாகக் காய்புகள் மெல்லியனவாகவும் கிளைக்காமலும் காணப்படும். சில சமயங்களில் பல கொனீடியாகக் காய்புகள், ஒரு மெத்தை போன்ற ஹைபா அமைப்பின்மேல் ஒருங்கே நின்று, ஸ்போரோடோமியம் (sporodochium) என்ற மான்ன இனப்பெருக்க கீற்றுப்பாடிையைத் (fruit body) தோற்றுவிக்கின்றன (படம் 187). இத்த கீற்றுப்பாடி உண்டாகும் இடம் பசையாக உள்ளது. கொனீடியாகக் காய்பின்

துளிகளில் தோன்றும் மேக்ரோகொனிடியம் பிறைச் சந்திர வடிவத்துடன் 2-3 குறுக்குச் சுவர்களுடன் (multicellular) காணப்படுகின்றன (படம் 188). இவற்றை கிப்ரேக்மோ டிரோமோச்போர் (Phragmo phialospore) என்றும் சிலர் அழைக்கின்றனர். மைக்ரோ கொனிடியம் (micro-conidia) கொனிடியமாக



படம் 189

பெரோசேயம் — பாசிலா இனப்பெருக்கம் மிகவும்
மேக்ரோகொனிடியம், மைக்ரோகொனிடியம்


காம்புகளின் துளியில் உண்டான போதிலும் அது எப்போதும் ஒரு செல்லாக ஆனதும் கொள் வடிவத்தைக் கொண்டதுமாகும் (படம் 189).

ஒன்றாவது வகை கிப்ரோசேய இனாமிடோச்போர் ஐதர்ப்ஸ் லிக் எந்தப் பாகத்திலும் தனிவே அல்லது வரிசையாக அமைந்துள்ளது. அவை, கெட்டியான உறைவாகக் கொண்ட செல்லாகாகும் (படம் 190).

மேக்ரோகொனிலியாவும், ஸைக்ரோகொனிலியாவும் புதிய ஸைனிலியாக்களை உண்டாக்குகின்றன. கிளாமிடோஸ்போர் மூலமாகத்தான் இப் பூஞ்சை வறுட்சிக் காலத்தைக் கடக்கின்றது. அனுகூலமான பருவத்தில் இந்த கிளாமிடோஸ்போர் மூளைத்து ஒரு புதிய ஸைனிலியத்தைத் தோற்றுவிக்கிறது. இந்த கம்போர் கள் காற்று, நீர், கிணங்குகள், மற்றும் தோட்டவேளை ஆபுதங்கள் மூலம் பரவுகின்றன.

எதையும் ஒரு சமயத்தில் இப் பூஞ்சையின் பானிஸ்ப்பெருக்க நிலை அரிதாகக் காணப்படுகிறது. எடுத்துக்காட்டாகப் பருத்திச் செடியின் வரலுதல் தோய்க்குக் காரணமாகும். பிப்லுசேரியம் வானிஸ்பெகம் (*Fusarium vasinfectum*) என்னும் சிற்றினத்தின் பானிஸ்ப்பெருக்க நிலை நிர்ப்பாகஸ்கொஸ்போரா வானிஸ்பெகா (*Neovossospora vasinfecta*) என்று விவரிக்கப்படும் ஒரு பூஞ்சையின் அமைப்பைக் கொண்டுள்ளது.

ஆகவே, பிப்லுசேரியம் மாக்ஸ்போர் வானிஸ்பெக்டாவும், பிப்லுசேரியம் வானிஸ்பெக்டாவும் ஒரே பூஞ்சையின் இரு இனப்பெருக்க (பானிஸ்ப்பெருக்க, பானிஸா இனப்பெருக்க) நிலைகள் என்று பல பூஞ்சையியல் வல்லுநர்கள் கருதுகின்றனர். அம் வண்ணமே நெற் பயிவரத் தாக்கும் (foot rot of paddy) பி. மானிலி மாக்ஸி (*P. Moniliforme*) என்னும் சிற்றினத்தின் பானிஸ்ப்பெருக்கநிலை ஜிபெரெல்லா பிப்லுஜிதா (*Gibberella fujikuroi*) என்ற மற்றொரு பெயரால் அழைக்கப்பட்டு வந்தது. ஆகவே, பிப்லுசேரியம் வானிஸ்பெக்டாவின் சில சிற்றினங்கள் எப்போதாவது பானிஸ்ப்பெருக்க நிலையைக் காட்டுகிறது என்றும் ஒரே பூஞ்சையின் இரு இனப்பெருக்க நிலைகள் இரு வேறு பேரினங்களாகப் பரிசீலிக்கப்பட்டு வந்திருக்கின்றன என்றும் தெரிய வருகிறது.



படம் 190

பிப்லுசேரியம்—கிளாமிடோஸ்போர் கள்

பெருங்குடும்பம் : வெவன்கோனிபேஸிஸ்

(Order : Melanconiales)

காலிடோடிகுளரக்கம்

(Colletotrichum)

இப் பூஞ்சை பெங்களுர் அவரை, தர்பூம், கரும்பு முதலிய தாவரங்களில் பெரிதும் பாதிக்கிறது. சிறப்பாக காலிடோடிகுளரக்கம் கிளாங்கேபம் (C. fabryana) என்னும் சிற்றினம் கரும்பைத் தாக்கிச் செவ்வழுக்கம் (red rot) என்ற நோயை உண்டாக்குகிறது. செவ்வழுக்கம் நோய் வட இந்தியாவிலும், பீதூர், உத்தரப்பிரதேசத்திலும் அதிக நாசத்தை விளைவிக்கிறது. 1946-47 ஆம் ஆண்டில் இது ஒரு கொங்கை நோயாக மாறி (epiphytotic) சர்க்கரை ஆலைத் தொழிலிற்கே பேராபத்தை விளைவித்தது.


தரைக்குமேல் தோன்றும் எண்ணப்பாகங்களும் இந்நோயால் எதிர்க்கப்படுகின்றன. மிகவும் பாதிக்கப்பட்ட நிலையிலேயே இந்நோயின் சின்னங்கள் வெளிப்படையாகத் தெரிகின்றன. இந்நிலையில் இலைகள் முதலில் புறத்திலிருந்து நடுப்பாகம் நோக்கிப் பச்சை நிறத்தை இழக்கின்றன, மேலும் இலைகள் பச்சை நிறத்தை இழந்து, வெளியில் சரிகின்றன. இந்த அறுகல், இலை நுனியிலிருந்து நடுப்பாகத்திற்குப் பரவி, சிறிது சிறிதாக முழு இலையும் வாடிச் சாய்கின்றன.

உட்சின்னங்கள் : தாக்கப்பட்ட தண்டின் நீள்வெட்டுத் தொற்றத்தை ஆராயின், செத்திறக் சேற்றுக்கள் (red streaks) நீள வட்டில் இருப்பதைக் காணலாம் (படம் 191). சாற்றுக் குழாய்த் திசுக்களை மைஸீலியம் தாக்கி உட்புகுகின்றது. இக் தாக்குதலுக்கு எதிர்வினையாகச் சிதைவடைதல் திசுக்கள் செத்திறக் சேற்றுக்களாகத் தோன்றுகின்றன. இவை இடைக்கண முழுவதும் பரவி, கணுக்களின் இரு பக்கங்களில் அதிகச் செத்திறத் துடன் அமைந்துள்ளன. பூஞ்சையின் தாக்குதலினால் கரும்பின் சர்க்கரைப் பொருளின் (sacrose) வீதித் குறைகிறது.

இப் பூஞ்சையின் மைஸீலியம் குறுக்குச் கவருள்ள மெல்லிய நறுபாக்களாகவானது. கணுக்களில் இருபக்கங்களில் உள்ள சிறு பள்ளங்களில் எஸ்பேஷியோ (acervuli) எனப்படும் பாவின இனப் பெருக்க அமைப்புகள் உள்ளன. மெத்தை போன்ற அடிப்பாகத் தினின்றும் கொளிடிகுளரக் காய்களின் வரிசை வரிசையாக மேல்

தோக்கி வளர்த்திருக்கும். இக் காய்பின் நுலியில் தோன்றும் கொலிடியம் அரிவாள் போன்று சிதறு வளைந்த ஒரு செக்கா வானது (படம் 191).

காலிடோபுராக்ம் சிபாக்கேட்டதின் (*C. falcatum*) பாலினப் பெருக்கதிலே வைஸ்கோஸ்போரா இலாஸென்ஸில் (*Physalospora wissmannii*) என்னும் ஆய்லோமைனிட் பூஞ்சையை ஒத்துள்ளது. எனவே, ஒரே பூஞ்சையின் பாலினப் பெருக்கதிலே



படம் 191

காலிடோபுராக்ம்—பாதிக்கப்பட்ட கரும்பின் கீசுமெட்டுத் தோற்றம்
அளவியுலையில் கீசுமெட்டுத் தோற்றம்

கா. சிபாக்கேட்டம் என்றும், பாலினப் பெருக்கதிலே வை. இலாஸென்ஸில் என்ற இரு வேறு பேரினங்களாக, இதுதான்வரை பரிகரிப்பட்டு வந்திருக்கிறது என்று பூஞ்சையினம் வந்துதரர்கள் கருதுகின்றனர்.

தொகுப்பு : டிப்டெரோமைட்டீஸ்
(Class : Deuteromycetes)

பெருக்குடும்பம் : மானிலியேலிஸ்
(Order : Moniliales)

குடும்பம் : டிமேடியேசி
(Family : Dematiaceae)

இப் பூஞ்சை நிகக்கடலை, மீட்டூட், புதைபிண, செவரி வானை முதலிய தாவரங்களைத் தாக்கி இலைப் புள்ளி நோயை உண்டாக்குகின்றது. இப்பேரினத்தில் சுமார் 3500 சிற்றினங்கள் உள்ளன. குறிப்பாக, நிகக்கடலை பயிரில் இதன் சிற்றினங்கள், செர்கோஸ்போரா பெர்சனேடா, செ. அரகிடிகோலா (*Cercospora personata*, *C. archidicola*) மிகுதியாக சேதாரத்தை விளைவிக்கின்றது. இந்த நோய்க்கு 'டிக்கா நோய்' (Tikka disease) என்று பெயர்.

இப் பூஞ்சையின் ஊறுபாடுகள் செவ்வின் இடைவெளிகளில் காணப்படும். விளைந்து உழிந்துகொள் (*haying*) கொண்டுள்ளன. கொளிகுயாக்கள் புறத்தோலை மிழித்துக் கொண்டு வெளியில் காணப்படும். கொளிகுயாக்கள் நன் உருளை வடிவமாகவும், 5-6 குறுக்குச் சுவர்கள் கொண்டும் உள்ளன. கொளிகுயாக்கள் காற்றினால் பரவுகின்றன. இப் பூஞ்சை பொதுவாக இலைத் துளைகள் மூலம் புதிய ஒட்டுத் தாவரத்தினால் பிரவேசிக்கின்றது.

நிகக்கடலை 'டிக்கா' நோய் (Tikka disease of groundnut)

இந்தோயில் காரணமாக நிகக்கடலை இலைகளில்மேல் புள்ளிகள் அதிகப்படியாகவும் இலைபுதிர் தலும் (*defoliation*) அதிகமாக காணப்படுவதாக உறப்படுகிறது. இந்த நோய் இரண்டு சிற்றினங்களால் தோற்றுவிக்கப்படுகிறது.


1. செ. பெர்சனேடா.
2. செ. அரகிடிகோலா.

நோய் சின்னங்கள் இரண்டிலும், மாறுபடுகின்றன.

நோய் அறிகுறிகள் : தரைமேல் தாவர பாகங்கள் தாக்கப் படுகின்றன.

செ. பெர்சோனா (C. Personata)

1. இலைப்புள்ளிகள் வட்டமாக 1-8 மி.மீ. குறுக்கு அளவு கொண்டுள்ளன. இலைகள் இருபுறமும் அழுகல் (necrotic lesions) ஏற்படுகின்றன. முதலில் புள்ளிகள் பழுப்பு நிறம் பெற்று பிறகு



செபெர்சோனா (பெர்சோனா) மடல் 191A

2. இலைப்புள்ளிகளால் காணப்படும் செம்மையான வட்ட விலக்கான இலைகளின் தொகுதி 3. ஒரு இலை புள்ளி பெற்றிருக்க காட்டப்பட்டுள்ள தொகுதி 4. பழுவையின் கீழே 5. செவிடியோ போன்றும் அழகற்ற தளிகளில் காணப்படும் செவிடியோவிற்கும் 6. பன செவ்வ செவ்வ. பனவிற்பன செவிடியோவின்.

கருத்த வண்ணம் பெறுகின்றன. இளம் புள்ளிகளைச் சுற்றி ஒளி வட்டம் தோன்றுகிறது. ஆனால் முதிர்ச்சியடைந்த புள்ளிகளைச் சுற்றி ஒளி வட்டம் காணப்படுகின்றது. இதன் மேற்புறம் மட்டும் மஞ்சள் நிறம் கொண்ட ஒளி வட்டம் தோன்றுகின்றது. கைலேரியம் செல் இடுக்குகளில் கிளைத்து காணப்படுகின்றது. உறிஞ்சு உறுப்பு பேலினைட் திசு, கம்பான்றி திசுக்களில் காணப்படுகின்றது. கொலிடியலங்கள் முதலில் 24-54μ, நீளம் 5-8μ அகலமுள்ள கொலிடிய கார்புகளைத் தோற்றுவிக்கின்றது. இவை 1-2 குறுக்குச் சுவர் தோன்றலாம். இவைபுறத்தோகை கிழித்துக் கொண்டு. கொத்துக் கொத்தாக கொலிடியலங்கள் வெளிப்படுகின்றன. கொலிடியலங்கள் நீள் உருவை வடிவம் பெற்றவை. இவை 18-60μ நீளமும் 6-11μ அகலமும் கொண்டவை. 1-7 குறுக்குச் சுவர் கொண்டவை.

மேல், அரபிகோலா (C. arachidicola)

இதன் இலைப்புள்ளிகள் ஒழுங்கற்ற வடிவம் கொண்டவை. பெரியவை 4-10மி.மீ. குறுக்களவுடையவை. ஆரம்பத்திலிருந்தே இலைப்புள்ளிகள் மஞ்சள் நிற ஒளிவட்டத்தை (hallo) கொண்டுள்ளன. கைலேரியம் உட்புறம் வெளிப்புறங்களில் உள்ளன. செல் இடுக்குகளிலும் செல்லினுள்ளும் பரவுகின்றன. ஆனால், உறிஞ்சு உறுப்புகள் கிடையாது. இலைகளின் மேல் காணப்படும் மஞ்சள் பறப்பு புள்ளிகளில் கொலிடியலங்கள் காணப்படுகின்றன. கொலிடி கார்புகள் கொலிடியலங்கள் உதிர்ந்த பிறகு மீண்டும் வளர்ந்து தோள் (shouldered-gonoclate) வடிவத்தை கொண்டுள்ளது. இக் கொலிடியலகார்புகள் 22-41μ நீளமும், 3-5μ அகலமும் கொண்டவை. 1-2 குறுக்குச்சுவர் கொண்டவை. கொலிடியலங்கள் வெளிர்மஞ்சள் நிறம் அல்லது பச்சை நிறத்துடன் 38-108μ நீளமும் 3.7μ அகலமும் கொண்டுள்ளன.

மரவுதல் : இப் பூஞ்சை கார்பின் மூலமாக இலைக்கு இலை பரவுகிறது. செல்மயங்களில் புதிய பசுரங்களை மண்ணில் உள்ள ஃபோரிகள் தாக்குகின்றன. இத் தோல் விதை மூலமும், கால் உறை மூலமும் கூட பரவலாம்.

துறப்பு முறை : (1) விதைகளை பூஞ்சையின் ஃபோர் மையலியம் முதலியவைகளிலிருந்து சுத்தம் படுத்துதல். (2) பூஞ்சை கொல்லியை பசுரங்களின் மேல் தெளித்தல். (3) போர்டோ கரைசலை தெளித்தல். இதை தவிர இலைகளின் மேற்புற, கீழ் புறங்களிலும் படுப்படி தெளித்தல் வேண்டும். (4) மாற்று பயிரிடுதல் (rotation of crops) மூலமும் தோயைத்

தடுக்கலாம். (5) தாக்கப்பட்ட பயிர்களை நாசம் செய்தல் (destruction of infected plants) (6) தடுப்பு ஆற்றல் உள்ள (resistant varieties) வகைகளைப் பயிக்குதல்.

நிலம் வாழ் பூஞ்சைகள் (Soil Fungi)

வாழ்நளத்தின் அடிப்படையைக் கொண்டு பூஞ்சைகளை நிலம்வாழ் பூஞ்சைகள் (Terrestrial Fungi), நீர்வாழ் பூஞ்சைகள் (Aquatic Fungi) என பாகுபடுத்தலாம்.

நிலம்வாழ் பூஞ்சைகள் எண்ணிக்கையில் அதிகம் உள்ளன. இவை தண்ணீர்ப்பிசுறுடன் வாழ்கின்றன. அவைகளுடன் உணவித்காகப் போட்டிகொடுக்கின்றன. இப் பூஞ்சைகள் சில உயிர் எதிர்ப்புப் பொருள்களைச் (antibiotics) சுரக்கின்றன. இது மற்றப் பூஞ்சைகளைக் கொன்றுகொடுக்கிறது. (உ-ம்.) விரிடின் (Viridin) கிளைமோடாக்சின் (Gliotoxin). அதே போன்று கிட்டுமோமியம் (Chaetomium) என்ற பூஞ்சை காணப்படும். நிலத்தில் நெருக்கியத் தொல்போசியம் (Helminthosporium) வளர்வதுண்டு. உயர் தாவரங்களில் வேரிலிருந்து ஒரு பொருள் சுரக்கப்படுகின்றது. இது வேரைச் சுற்றி படலம் போல் அமைகிறது. இப்பொருள் சில பூஞ்சைகளின் வளர்ச்சியை ஊக்குவிக்கின்றன. வேரின் இப் பகுதியின் வேர் மண்டலம் (Rhizosphere) என்றழைக்கிறார்கள்.

நிலப் பூஞ்சைகள் நிலத்தில் காணப்படும் அங்ககப் பொருள்களை அழுக வைத்து மடிக் செய்கின்றன. இப் பூஞ்சைகள் அவைகளின் வாழ்கிறதத் தேவையான ஊட்டப் பொருள்களை வெவ்வேறு தொடர்புகளின் மூலம் பெறுகின்றன. அதாவது இவை உயர் தாவரங்கள், மற்றப் பூஞ்சைகள், பிராணிகள் முதலியவைகளின் ஒட்டுண்ணியாக வாழ்கின்றன. சில உயர் தாவர வேர் தொகுதிகளில் கூட்டுயிர் வாழ்க்கை நடக்கின்றன. (உ-ம்.) வேர்க்காளான் (Mycorrhiza). பூஞ்சைத் தாவர வளம் இவை மட்டிலிருந்து பெரிதும் அடையப் படுகிறது. பிதியம் (Pythium), கிண்பட்டாசிப்போரா (Pytophthora) முதலிய பூஞ்சைகள் உயர் தாவரங்களில் ஒட்டுண்ணியாக வளர்கிறது. அழுகல் நோயை ஏற்படுத்தி ஒம்புவிடிகளை அழிக்கின்றன. அதேபோன்று (Fusarium) கிப்பூசேரியம் எனும் குறைப் பூஞ்சை (Imperfect Fungia) வாடல் நோயின் உண்டாக்குகிறது. இவையுதிர் காலத்தில் நிலம்வாழ் பூஞ்சைகளின் மூலம் வளர்ச்சி நோன்றுகிறது. பெரும்பாலும் இவை சாறுண்ணிகளாகவும், வேர்க்காளான்களாகவும், சில மரங்களில் ஒட்டுண்ணிகளாகவும் காணப்படுகின்றன. காட்டுத்

தரையில் அழுகிப் பிடிக்கும் இனங்களினிடையே மமரீலியத்தைத் தொற்றுவித்து, உணவை ஈர்த்து உயிர் வாழ்கின்றன. சில தாவரங்களுக்கு, சில திற்பிட்டகு நிலப் பூஞ்சைகள் அதனுடயில் வளர்கின்றன. (உ-ம்.) பெட்டுலா (Beetula) தாவரத்தினடியில் பொலிடஸ் (Boletus), அயானிடா (Amanita), லைப் மரத் தடியில் லெக்டேரியஸ் (Lectarius) முதலியவை காணப்படுகின்றன. மரத்துண்டுகளிலும் பூஞ்சைகள் குடிவேறுகின்றன. இது மரப்பட்டையின் காணப்படும் ஊட்டப் பொருளைப் பொறுத்துள்ளது. ஆடர்த்தியான கட்டையினைத் துளைத்துச் சென்று அதனைத் தாக்கும் நிறன் உயிர் பூஞ்சைகளில் காணப்படுகிறது. (உ-ம்.) பேலிடியோமேரிட்டுகள், கட்டையினுள்ள செத்து மோக்னினின் முதலியவற்றை பயன்படுத்துகின்றன. இதனால் 'பழுப்பு' அழுகல் தோய் (brown rot), வெண்மை அழுகல் தோய், (white rot) முதலிய தோய்கள் தோன்றுகின்றன. இவைகளின் மமரீலியம் கட்டையினுள் எங்காப் பக்கங்களிலும் புருத்து தாருக்கு தார் துளைத்துச் சில குறிப்பிட்ட இடங்களில் கனி உடன்களைத் (fruit bodies) தோற்றுவிக்கின்றன. காட்டுத் தீயினால் அழிக்கப்பட்ட பகுதிகளில் குறிப்பிட்ட பூஞ்சைகளில் வளர்கின்றன. கட்டைகள் எரித்த பின்னர் அதன் சாம்பல் காரத்தன்மை (alkaline condition) பொருத்தியதாகிறது. இங்கு வளரும் பூஞ்சைகள் காரத் தன்மையுடன் தொடர்பு கொண்டு உள்ளது. (உ-ம்.) பெரோனியா (Pyrenoma), ஒம்பிப்பேலியா (Omphalia). இது போன்றே புல்வெளிகளிலும் குறிப்பிட்ட பூஞ்சைகளே வளர்கின்றன. (உ-ம்.) ஹைட்ரோக்போரஸ் (Hygrophorus), கிளாவுசீலா இன்னெக்வாலிஸ் (Clavaria inaequalis), அகாசிகஸ் கம்பஸ்ட்ரீஸ் (Agaricus campestris) புல்வெளிகளில் பூஞ்சைகள் வளர்வது அவற்றின் சேர்க்கப்படும் சாணத்தின் அளவைப் பொறுத்துள்ளது.

கரும்புல் வட்டம் (Fairy Rings)

லிகோபர்டான் (Lycoperdon) என்னும் பூஞ்சைகளின் மமரீலியமானது புல்வெளிகளில் எங்கா பாகங்களிலும் ஊட்டமாகப் பரவுகின்றது. இவற்றைக் 'கரும்புல் வட்டம்' என்று அழைப்பார்கள். இங்கு மமரீலியத்தின் பக்கத்தில் வளரும் புல் செடிகள் ஊக்குவிக்கப்பட்டு மற்றப் பகுதிகளில் வளரும் புற்களைக் காட்டிலும் உயரமாக வளர்கின்றன. வளரும் ஹைபாக்கள் நிலத்தில் காணப்படும் பொருள்களைச் சிறை வட்டையச் செய்து அமோனியா கூட்டுப் பொருள்களைத் தோற்றுவிக்கின்றன. இது பூஞ்சையின் தேவைக்குமேல் தோற்றுவிக்கப் படுவதால் புற்செடிகள் அதை ஈர்த்துக் கொண்டு மிகவும்

பசுமையாக வளர்வதன். இதிலே தனிப்பட்ட அமைப்புக்கு காரணமாகிறது. மேலும், இல் வட்டத்தில் உட்புறத்தில் மைசீரியமானது இடத்தை அடைத்துக் கொள்வதால் இம் விடத்தில் புற்களின் வளர்ச்சி குன்றி காணப்படுகிறது. இங்கு தான் கவி உடலுக்கல் தோன்றுகிறது.

காணம் வாழ் பூஞ்சைகள் (Coprophilous Fungi)

புல்வெளிகளில் காணம் மட்டுமே இடங்களில் அதிக எண்ணிக்கையில் பூஞ்சைகளும், மேலும் சாணத்திலேயே ஏராளமான பூஞ்சைகளும் வாழ்கின்றன. இவற்றில் பெரும்பாலானவை தழை உண்ணும் மிருகங்களின் சாணத்தில் வாழ்கின்றன. மாமிசம் உண்ணும் மிருகங்களின் சாணத்திலும், ரெப்கட்டங்களின் சாணத்திலும்கூட பூஞ்சை சிற்றினங்கள் வாழ்கின்றன. காணம் வாழ் பூஞ்சைகள் பெரிய வண்ணமுடைய ஸ்போர்களைப் பெற்று உண்ண. ஆஸ்கஸ்களில் (Ascus) ஆஸ்கோஸ்போர்களைச் சுற்றி பசை காணப்படுகின்றது. காணம் வாழ் பூஞ்சைகளின் ஸ்போர்கள் மிருகங்களின் உணவுப்பானை வழியாக புகுந்து வெளியேறியவுடன் நிரூபிப்பது கடினம். (உ-ம்.) ஸ்கார்டோரியேனி (Sordariaceae), ஆஸ்கோபோலஸ் (Ascombolus), மிஸ்கார் (Mucor), கோப்ரினஸ் (Coprinus). எருக்குவியல்களிலும் தினம் வாழ் பூஞ்சைகள் வளர்கின்றன. இவை அதிக வெப்பத்திலும் வரமும் (thermophilic) திறமை பெற்றுள்ளன.

நீர்வாழ் பூஞ்சைகள் (Aquatic Fungi): இவைகளின் எண்ணிக்கை மொத்தப் பூஞ்சைச் சிற்றினங்களில் 2% ஆகும். பெரும்பாலும் ஸ்போர்களைக் மூலமே இனப்பெருக்கம் செய்கின்றன. இவை குட்டை, வாய்க்காக், நதிகள் போன்றவற்றில் கிடைக்கும் இதர உயிரிகளின் உடலிலும் வளருகின்றன. (உ-ம்.) ஸாப்ரோனெக்ஸியேரி (Saprolegniaceae), மூழிய அக்கப்பி பொருள்களின் மீது அக்கியா (Achlya) என்ற பூஞ்சை வாழ் கிறது. ஆப்பிள், தக்காளி முதலிய கனிகளை நீரில் அமிழும்படி வைத்திருந்தால் பிளாஸ்டோகிளாடியா (Blastocladi) முதலிய பூஞ்சைகள் தோன்றுகின்றன. இவ் நீர் வாழ் பூஞ்சைகள் திகத்திலும் வரமும் திறன் பெற்றவை. ஒடை, நதிகளில் காணப்படும் அழுகும் இடங்களில் ஹைபோமைசீட்டஸ் (Hyphomycetes) என்ற குறைபு பூஞ்சை வகுப்பைச் சார்ந்த பூஞ்சைகளும், ஏரிகளில் மூழ்கியிருக்கும் சூசிகளிலும், சகதி திகத் தாவரங்களின் அழுகும் தண்டுப் பகுதிகளிலும் ஆஸ்கோமைசீட்டஸ் பூஞ்சைகள் வாழ்கின்றன. ஆனால் பேஸிடியோமைசீட்டஸ் என்ற பூஞ்சைகளில் நீர்வாழ் பூஞ்சைகள் கிடையாது.

கடல்வாழ் பூஞ்சைகள் : (உ-ம்-) கைட்சிட்டுகள், தைத்யோமைட்டிகள், கைசிபெனெமைட்டிகள் திரெனக்டோ (Thraustotheca) என்னும் பூஞ்சை பிரைலாப்டினிசு (Bryopsis) என்னும் கடற்பாசியின்மீது ஒட்டுண்ணியாக வாழ்கிறது. கடலில் காணப்படும் பெரும் ஆங்காக்களின் மீது ஒட்டுண்ணிகளாகவோ, அல்லது சாறுண்ணிகளாகவோ வாழ்கின்றன (உ-ம்-) கைட்சிடியம் (Chytridium), கோடியம் (Codium) என்னும் பாசித் தாவரத்தின் மீது கரோஃபிடியம் (Rhizophidium) என்னும் பாசி வளருகின்றது. பாலினைபோனியா, செராமியம் முதலிய பாசிகளின் மீது கைட்சிடியம் (Chytridium) என்ற பூஞ்சை வளருகின்றது. இக்தியோஃபோனஸ் (Ichthyophonus) என்னும் பூஞ்சை கடல் வாழ் மீன்களைத் தாக்கிப் பெரும் சேதம் விளைவிக்கின்றன. கடல் வாழ் ஆங்கோமைட்டி பூஞ்சைகள் கடலில் வாரும் தாவரங்கள் மற்றும் கடல்வாழ் பிராணிகளின்மீது வாழ்கின்றன. ஜோல்டிரா மேரைனா (Zostera marina) என்ற ஒற்றை விதை மரிக் கடல் தாவரத்தில் ஒட்டுண்ணியாக ஒப்பியோபோலஸ் (Ophiobolus) என்ற ஆங்கோமைட்டி நெற்றினம் ஒட்டுண்ணியாகக் காணப்படுகின்றது. இப் பூஞ்சை கொடிய நோய்களை விளைவித்து இத் தாவரங்களை அழித்து விடுகிறது. மேலும் பாசிகளுடன் கூட்டுயிர் வாழ்க்கை நடத்தும் பூஞ்சைகளும் உள்வன. இவை தீவம் வாழ் மீன்கள் போன்ற உறவு கொள்கின்றன. மொலஸ்க்குகள் (Molluscs), பார்னக்கின்கள் (Barnacles), முதலிய கடல்வாழ் பிராணிகளின் ஓடுகளிலுள்ள காஷியத்தை நீக்கிவிட்டு டிடயமெலிசா (Didymella) என்னும் பூஞ்சை ஒட்டுண்ணியாக வாழ்கின்றது. கடல்வாழ் பூஞ்சைகளில் பல குறைப் பூஞ்சைகளும் காணப்படுகின்றன. இவை சாறுண்ணிகளாக அழுகும் பாசிகளில் வளர்கின்றன. (உ-ம்-) ஆக்டினேரியா மேரைட்டைமா (Alternaria maritima), கிளாடோஸ்போரியம் (cladosporium), செர்கோஸ்போரா சலினா (Cercospora salina) முதலியனவாகும். சில மிக்ஸோமைட்டிடு வகையைச் சார்ந்த பூஞ்சைகள் கடலில் வாழ்கின்றன. இவை வலி போன்ற பிராணியோடியத்திற்குக் கொண்டு பூஞ்சை ஒம்புயிரியின் இலைகளையும், வேர்களையும் அழுகச் செய்கின்றன. (உ-ம்-) லேபிரிந்துலா மெக்ரோசிஸ்ட்ஸ் (Labyrinthula macrocysts)

வேர்க் காணான்கள் (Mycorrhiza)

எல்லாத் தாவரங்களிலும் வேர்த் துளிகள் உறிஞ்ச உறிப்பு களாக உள்ளன. ஆனால் சில தாவரங்களில் இவை கிடையாது. இத் தாவரங்களில் வேர் துளிகளின் மேல் சிலவகை பூஞ்சை

இவைகள் வளர்த்து வேர்த் துளிகளின் உறிஞ்சு வேலைமைப் புரிகின்றன. இவைகளின் ஹைபாவானது துளைத்து உட்புறமாகிய அப்போழுது வேர்களுக்கும், பூஞ்சைக்கும் ஒரு இணைத்த தொடர்பு ஏற்படுகிறது. இவ்விதமான வேர்ப்பூஞ்சை கூட்டு வளர்ச்சியை வேர்க்காளான்கள் அகலது மைக்கோரைசா என்று அழைக்கப்படுகின்றது. இவை எம்மாவியித் தாவரங்களிலும் காணப்படுகின்றன. பூண்டுகளில் (Herbs), மரங்களில், பெரணிகளில் இரு வித்திலை, ஒரு வித்திலைத் தாவரங்களில், இதைக் காணலாம்.

கைப்பரேசி (Cyperaceae), குருவிக்கிபெரி (Crociferae), பிலிம்பாஜெனி (Plumbagine), நிம்பேயேனி (Nymphaeaceae) ரைசோபோரேனி (Rhizophoraceae) முதலிய குடும்பங்களில் வேர்க்காளான்கள் உண்டாவதிக்கே. ஸ்பைம், ஸ்பிரூஸ் (Spruce), பீச் (beach), பாப்ளார் (Poplar) போன்ற தாவரங்களின் குட்டையான பக்க வேர்களில் வேர்க்காளான்கள் காணப்படுகின்றன. இந்த வேர்கள் சற்று தடித்துப் பருமனாகத் தெரியும். இவ்வித வேரின் குறுக்கு வெட்டுக் தோற்றத்தில் அதன் புறனிலிருந்து செங்கலிலும், செம் இடைவெளிகளிலும் பூஞ்சை ஹைபாக்கள் இருப்பதைக் காணலாம். மேலும் இவ்வித வேர்களின் புறத்தில் கம்பளம் போர்த்தியது போல் வேர்க்காளான்கள் சுற்றிக் கொண்டுள்ளன. இப்பக்க வேர்களில் வேர்த்துளிகள்தோன்றுவதிக்கே, அப்போது வேரிலுள் செல்லும் தண்ணீரையும், தாதுப் பொருட்களின் கரைசலையும், வேர்க்காளான்களின் ஹைபாக்கள் உறிஞ்சி வேர்களுக்கு அளிக்கின்றன. வேர்க்காளான்கள் பக்க வேரின் புறத்தில் அமைந்திருந்தால் எக்டோட்ரோபிக் மைக்கோரைசா (Ectotrophic mycorrhiza) என்றும் புறணி செங்கலில் காணப்பட்டால் எண்டோட்ரோபிக் மைக்கோரைசா (Endotrophic mycorrhiza) என்றும் அழைக்கப்படுகிறது. உயர்தாவரம் வேர்க்காளான்களுக்கு இருக்க வசதியையும், தாதுப் பொருட்களையும் தருகின்றது. வேர்க்காளான்களது அதற்கு நீரையும், தாதுப் பொருட்களையும் அளிக்கின்றது. இது ஒரு கூட்டுயிர் வாழ்க்கையாகும் (symbiosis) ஆனால், இதனிலும் ஒட்டுண்ணித் தன்மை (parasitism) அடங்கி விடுப்தாகக் கூறுகின்றார்கள். எனினும் இரு கார்பினும் இவை ஒன்றொன்றும் தன் சுய நிலையை நிச்சயப்படுத்தி கொள்வதற்கென அடுத்த கூட்டாளியை நன்கு பயன்படுத்திக் கொள்வதால் இக்கக் கூட்டுறவில் ஒன்றையொன்று எதிர்த்தாலும், ஆதரிக்கவும் வசதி ஏற்பட்டுள்ளது.

உள் வேர்க்காளான்கள் (Endotrophic mycorrhiza) : இவை புறணி செய்களிலுள்ளும் இடைவேளிகளிலும் பரவி அகத்தோலை அடைகின்றன. ஆனால் அதைத் தாண்ட இயலாது. பூஞ்சை புறணியில் சிறு கொத்துகள், கிளைகள் போன்ற தோன்றும். 1905 ஆம் ஆண்டு காலர்ட் (Gallard) என்பவர் இதனை ஆர்பஸ்குலஸ் (Arbuscules) என்று அழைத்தார். இவற்றில் வை போன்ற (Vesicles) உறுப்புகளும் உண்டு. மோனோட்ரோபாவிலும் (Monotropa), ஆர்கிடிகளிலும் (Orchids) உள்வேர் காளான்கள் காணப்படுகிறது.

ஒரு வேரில் உட்காளானாக முதலில் தொடங்கும் உறவு வேளி வேர்க்காளானாகவும் மாறிவிடுவதுண்டு. இது பூஞ்சைத் தாவரத்தில் எதிர் விளைவை நோக்கியுள்ளது. வேர்க்காளான்கள் தாவர வேர்களின் முதன் முதலில் ஒட்டுண்ணி போலவே தாக்குகின்றன. செய்களின் இருக்கும் ஊறுபாக்களை உறிஞ்சுதல்பு களாகக் கொள்ளவும், ஒரு ஆதாரத் தாவரமானது இவைகளின் வளர்ச்சியைத் தடுக்கின்றது. மேலும் சில தாவரங்கள் அவைகளின் வேர் பாகத்தில் உள்ள செய்களிலிருந்து ஒரு விஷ திரவத்தைத் தோற்றுவிக்கிறது. இந்த திரவமானது வேர்க்காளான்கள் மேலும் உட்புகாமல் தடுப்பதற்கு உதவுகிறது. ஆதாரத் தாவரம் மேலும் ஒரு சவ்வு போன்ற பொருளை சுரத்து வேர்க்காளானின் ஊறுபாக்கள் நுழைய முயற்சிப்பதைத் தடை செய்கிறது. வேர்க்காளான்கள் ஆதாரத் தாவரத்தினுள்ளே புருத்து விட்டால் ஒரு ஆதாரத் தாவரத்தில் செய்களிலுள்ள நியூக்லியஸ்கள் விரிவடைகின்றன. அடுக்கு செய்கள் தம் ஆரப்போக்கில் (radial) பெரிதாகின்றன. ஆனால், வேரின் நீள்வளர்ச்சி கண்டிக்கப்படுகிறது. இதனால் வேர் தடித்துப் போகின்றது. ஆர்கிடிகளின் வேர்களிலும், அவைகளின் விதைகளிலும் ஆராய்ச்சி நடத்திய பொழுது இயல்பு வேர்க்காளான்களை நடுக்கச் செய்யும் ஆர்கிடோல் (orchidol) என்னும் பூஞ்சை விஷம் இருப்பதாகக் கண்டு பிடிக்கப்பட்டுள்ளது. ஆனால் ஆர்கிடிகளில் உள்வேர்க்காளான்கள் இருந்தால்தான் அதன் விதை முளைக்கின்றது. சாதாரண குழந்தையின் வளரும் நோயுற்ற மரங்களில் உண்டாகும் வேளி வேர்க்காளானில் பூஞ்சையானது ஒரு வலைபோல் அமைந்திருக்கின்றது. இதற்கு ஹார்டிக் வலை (Hartig net) என்று பெயர்.

எப்படி மரத்தில் 7 வித வேர்க்காளான்கள் உள்ளது. அவை சர்க்கரைப் பொருள் அதிகமாக உபயோகிக்கின்றன. காடுகளின் நில மட்டத்தில் அங்கும் இங்கு கொப்புளவில் சர்க்கரைப் பொருள் அதிகமாக இருப்பதால் இங்கு முதன் முதலில் வேர்க்காளான்கள்

மட்டுவண்ணியாக வளர்த்து பசுக்கூரைத் தாவரம் கிடைத்த பொழுது அவைகளின் வேர்களினால் புழுவின்றை, மண்ணில் நன்மை காற்றொட்டம், சூரிய ஒளி, வைட்டமின் சத்து அதிகமாக இருந்தால் வேர்க்காணால் வளர்ச்சி செழிப்பாக உள்ளது.

பூஞ்சைகளின் பயன்கள் : மக்களுக்குப் பூஞ்சைகள் மிகச் சிறந்த மூலையில் பயன்பட்டு வருகின்றன.

1. உணவுகள் : அன்பெர்ஜியன் ஒரையே (A. oryzae) என்ற பூஞ்சையை பயன்படுத்தி கோஜி (Koji) என்ற பானத்தை ஜப்பானியர் தயாரிக்கின்றனர். ஸாகே (Sake) என்ற ஜப்பானின் சுதேசி குடிபானமும் இதிலிருந்து தயாரிக்கப்படுகிறது. ஸோய் சாஸ் (Soy sauce) என்னும் கவைபொருள் தயாரிப்பதற்கு சமைத்த வேளாயு அவகைகளில் இப் பூஞ்சைகளை வளர்த்து இதை அடைகின்றார்கள். காளான்கள் (தாய்க்குடைகள்), டிரீபுள்கள் (Truffles) முதலியவை ஜரோப்பிய நாடுகளில் பெரும்பாலும் உணவாகப் பயன்படுத்தப்படுகிறது. இவைகளை மீன், வயல், பன்றித்தாக்கு, காடுகள், சமவெளி, புல்வெளி முதலிய இடங்களில் உணவுக்காகப் பயிரிட்டு வருகின்றனர். உணவளிக்கும் காளான்களை சேகரித்த உடனே உபயோகித்தால் அவற்றின் கவையும் மணமும் அதிகமாக உள்ளது. காளான்களை உப்பு நீரில் கலந்து தகரப் பெட்டிகளில் அடைத்து பதம் செய்து நீண்ட காலத்திற்கு உணவாக உபயோகிக்கின்றார்கள். இவைகளைக் கொண்டு பிராய்வுக் காளான்கள் (Broiled mushrooms), காளான் ஸ்பீட்புகம், கீரம் காளான்கள், காளான் ஸாஸ்கள் (Mushroom spaghetti sauce) முதலிய உணவுகளைத் தயாரிக்கின்றனர். (உ-ம்). லெபிபோசுடா புரோசெரா (Leptoto procera), மார்ஷெல்லா (Marshellia), அகாரிகஸ் காம்பெஸ்ட்ரிஸ் (Agaricus campestris), கான்தரெல்லஸ் (Cantharellus), லாக்டரினஸ் டெலிகியோஸஸ் (Lactarius deliciosus), போலிடஸ் எடிபுலிஸ் (Boletus Edulis), டிஸ்டி ஸெலியா ஹெபாடிகா (Fistularia hepatica), கோபரினஸ்கோமேடஸ் (Coprinus comatus) என்ற காளான்களை உலரவைத்து பொடி செய்து உணவிலும், மருத்துவனிலும் உபயோகிக்கின்றார்கள். இரத்தப்போக்கைத் தடுப்பதற்கும் இப்பொடி உபயோகமாகிறது. காயம், புண் முதலிய இரணங்களின் ஆற்றவும் காளான் பொடி உபயோகமாகிறது. இவற்றில் புரதங்களும், ரிபோகிபிளேயின் (Riboflavin), நிக்கோடமிக் அமிலம் (Nicotinic acid), வைட்டமின் A (Vitamin A) அதிக அளவிலுள்ளன. மேலும் நியாசின் (Nicotin), பியோடின் (Biotin), பான்டோதீனிக் அமிலம் (pantothenic acid) முதலியவை இருக்கின்றன.

நொதித்தல் பொருள்கள் (Fermentation products) : சர்க்கரைச் சர்க்கரைவை சாராயமாக மாற்றும் தன்மையிலும், கரியமின் வாயுவை வெளிப்படுத்தும் பண்பையும் உபயோகித்து இன்றேறல் வடித்தல், ரொட்டிக் கிடங்குகளில் ரொட்டி தயாரித்தல், சாராய மதுபானங்கள் தயாரித்தல் முதலியவைகளில் உபயோகிக்கின்றார்கள். இடைப்பொருளாகக் கிடைக்கும் கரியமின் வாயுவை சேகரித்து கட்டியாகச் செய்து உலர்த்த லுன் (dry ice) செய்கின்றனர். ரொட்டியில் மாலில் ஏற்படும் இடைவெளிகளில் கரியமின் வாயு ஆடைக்கப்பட்டு மாவு உப்புவிடுது. வெப்பத்தால் கரியமின் வாயு வெளியேறுகிறது. இதன் காரணமாக ரொட்டி புதுசு போலாகிறது. இங்கும் துணை பொருளாக கிடைப்பது ஆக்கறாகாகும். சண்டு செய்களான சேக்கரோமைஸஸ் எலிப்சாய்டுஸ் (*Saccharomyces ellipsoideus*), மீண்டு செக் கன் சைமேஸ் (*Zygozase*) என்ற நொதியை சுரக்கின்றன. இது சர்க்கரைவை சாராயமாக மாற்றுகிறது. தரசப் பொருள்களில் பூஞ்சைகளை உபயோகித்து குடிபானங்கள் செய்கின்றார்கள். மியூகர் மியூகரிடோ (*Mucor mucedo*) என்ற பூஞ்சையிலிருந்து, ரைசோபஸ் (*Rhizopus*) - சிற்றினங்களிலிருந்தும் நொதித்தல் செய்து சாராயத்தை பெறுகின்றனர். பூஞ்சைகளாகச் சீஸ் (cheese) தயாரிக்கப்படுகிறது. இவைகளுக்கு (soft cheeses of camanbert) என்று பெயர். முதன் முதலில் இருவித மணங்களை தருவதற்கு பெனிலினியம் காமம்பெர்ட் (*Penicillium Camanbert*) என்று பெயர்.

பூஞ்சை நொதிகள் : டயல்ட்டேஸ், இன்வெர்ட்டேஸ், புரோட்டேயேஸ், பெக்டினேஸ் முதலியவை பூஞ்சை நொதிகளாகும். இவைகளைப் பெறுவதற்கு ஆல்பெர்ஜீக்ஸஸ் என்ற பூஞ்சைத் தொகுப்பை உபயோகிக்கின்றார்கள். கோதுமை, தவிடு, ஆரீசி உரி, நிக்கட்டை, பிண்ணாக்கு முதலியவற்றில் இத்த ஆல்பர்ஜீக்ஸஸ் சிற்றினத்தைப் பயிரிட்டு டயல்ட்டேஸைப் பெறுகின்றார்கள்.

பூஞ்சை கொழுப்புகள் : பெனிலினியம் ஜுவானிகம் (*P. javanica*), ஆல்டுயம் லாக்டிஸ் (*oidium lactis*), மியூகர் மியூகரிடோ (*M. mucedo*) முதலிய பூஞ்சைகளைப் பயிரிட்டு கொழுப்புகளை ஜெர்மாலிய தாட்டில் முதல் உகை வுத்த முடியில் பெற்றார்கள், பல ஆமெரிக்க நிபுணர்கள் பல வகையான பூஞ்சைகள் குளுகோசிலிருந்து (Glucose) கொழுப்புகளை உண்டாக்குவதாகக் கண்டு பிடித்தார்கள். இதற்கு எண்டோமைஸிஸ் வெர்னாலிஸ் (*Endo-myces vernalis*) மிகவும் பயன்பட்டது.

புரதங்கள் : பல பூஞ்சைகள் புரதங்களைச் செல் ஆக்கக் கூறுகளாகத் தோற்றுவிக்கின்றன. ஸாக்கரோமைஸிஸ் செரவிஸியை (*Saccharomyces cerevisiae*), டொருஸாப்ஸிஸ் யூடிலிஸ் (*Torulis utilis*) என்ற சாக்குகளில் உயர்த்த ஊட்டமுள்ள புரதங்கள் அதிக அளவில் கிடைக்கின்றன. டொருஸாப்ஸிஸ் யூடிலிஸ் என்ற சாக்கு உணவு சாக்கு என்று கூறப்படுகிறது.

வைட்டமின்கள் (Vitamins) : வைட்டமின் B காம்ப்ளெக்ஸிற்கு மூலமாக இருப்பது சாக்கு செக்களாகும். ஆல்பர்ஜிஸ்ஸஸ் நைகரிஸ் ஒரு வைட்டமினிலிருந்து வளர்சிதை மாற்றப் பொருளாக வைட்டமின் C வைப் பெறுகிறார்கள்.

பூஞ்சை அமின்கள் : ஆல்பர்ஜிஸ்ஸஸ் நைகரி என்ற பூஞ்சையைத் தொதித்து, ஆக்ஸாலிக், ஸிட்ரிக் அமின்களைத் தோற்றுவிக்கின்றார்கள். இக்கிளைத்து, பெக்ஜியம், ஐக்ஜிய அமெரீக்க நாடுகள், ஐப்பான் முதலிய நாடுகளில் பூஞ்சையின் மூலமாகத்தான் ஸிட்ரிக் அமினத்தைப் பெறுகின்றனர். குளுக் கோயிக் அமிலம், ஆல்பர்ஜிஸ்ஸஸ், பெனிஸீலியம் முதலியவை சர்க்கரையில் கலந்து செயல்படுவதால் கிடைக்கிறது. இந்த அமினத்தை உணவுப் பொருள்களிலும், மருத்துகளிலும் உபயோகிக்கின்றார்கள். காலிக் அமிலம் (*Gallie acid*), ஆல்பர்ஜிஸ்ஸஸ், காமோமைஸிஸ் (*A. galliomyces*) என்ற பூஞ்சையை டானின் சாற்றில் தொதிக்க வைத்து இவ்வமினத்தைப் பெறுகிறார்கள்.

கிளிரால் (Glycerol) : சாக்கு செக்கள் சர்க்கரையைத் தொதிக்கும் பொழுது சிறிதளவு கிளிரால் கிடைக்கிறது. வேலாடியம் ஸைக்கிபட்டை சாக்கு கம்ச்சரில் சேர்த்து தொதிக்க வைத்தால் அதிக அளவு கிளிரால் கிடைக்கிறது.

பாக்டீரியங்களின் வளர்ச்சியைத் தடைசெய்யும்

**பொருள்கள்
(Antibiotics)**

இதை முதன்முதலில் 1929ல் அலெக்ஸான்டர் டிஹெயிம் (*Alexander Fleming*) என்பவர் பெனிஸீலினிலுத்திய இப் பண்பு இருப்பதாகக் கண்டுபிடித்தார். பெனிஸீலினியம் இன்கிபுரஸ்களே என்ற இன்கிபுரஸ்களை நோயைத் தோற்றுவிக்கும் பாக்டீரியத்திற்கு ஊறு செய்ய பெனிஸீலினியம் நோட்டேடம் (*P. notatum*) பயன்பட்டது. பெ. கிரைசோஜெனம், பெ. நோட்டேடம் (*P. chrysogenum*, *P. notatum*) முதலிய பூஞ்சைகளிலிருந்து பெனிஸீலின் என்ற மருந்தைத் தயாரித்தனர்.

இது புத்தத்தில் காயம் அடைந்தோர்க்கு மிகச்சிறந்த அனீக மூதன் மூதனிக் பயன்பட்டது. இப்பொழுது மக்களின் ஆரோக்கிய வாழ்விற்கு நல்ல மருந்தாகிறது. ஆம்பெர்ஜிங்ஸ் கிப்பூமி கேட்டஸ் (*A. fumigatus*), ஆ. கிளாவேட்டஸ் (*A. clavatus*) என்ற பூஞ்சைகளிலிருந்து, தோல்வோளின் என்ற பாக்கிரிய ஊறு செய்யும் பொருளை தயாரித்தனர். பெனிலினியம் அயிலமானது பன கிராம் பாஸ்டிக், கிராம் நெகடிஸ் பாக்கிரியங்களை வளராமல் தடுக்க வகைதென்று கண்டுபிடித்தார்கள். பெனிலினியம் பெடுலம் (*P. patulum*) என்ற பூஞ்சையிலிருந்து எடுக்கப்படும் படுலின் (*Patulin*) என்ற பொருளும் பெ. கிளாவிபெர்ம் (*P. claviforme*) என்ற சிற்றினத்திலிருந்து எடுக்கப்படும் கிளாவிபார்மின் (*claviformin*) என்ற பொருளும் சளி முதலிய கியாதிக்கான குணப் படுத்த வகைதென்று கண்டுபிடித்துள்ளார்கள். பெனிலினின் சருமப் பச்சையாகவும் (*skin ointment*), கண்னுளி மருந்தாகவும், தொண்டை, இரண்டாற்றும் மாத்திரையாகவும் (*P. lozenges*) உபயோகிக்கின்றார்கள். பன ஊசி மருந்துகளும் இவையிலிருந்து தயாரிக்கப்படுகிறது.

மண்ணிலுள்ள மெக்னிலியம், காப்பர், மாஸிப்டினர், சிங்க, ஸ்டீடர் குறைவுகளைக் கண்டு பிடிப்பதற்கு ஆஸ்பர்ஜிங்ஸ் நெகர் உபயோகமாகிறது. ஆவ்வாறே மண்ணிலுள்ள பாஸ் பேட்டுகள், ஸோட்டாசியம் அளவைக் கண்டுபிடிப்பதற்கு ஆஸ்பர்ஜிங்ஸ், ஹெரோபஸ் முதலியவைகளின் சிற்றினங்கள் பயன்படுகின்றன.

தோலின்மீதோல்போரியம் (*Helminthosporium*) என்ற பூஞ்சை குறுகொளியிலிருந்து ஆந்த்ரோகுவினின் (*Anthroquinone*) என்ற பொருளை சேற்றவை.

எர்க்கட் (*Ergot*): ஹை (*Rye*) என்ற கோதுமை வகை தானியத் தாவரத்தில் கிளாவிசெபில் பர்ப்பூரியா (*Claviceps purpurea*) என்ற ஒட்டுண்ணி சேதம் விளைகின்றது. இதன் கிளாவிசெபில் (*Sclerotia*) புறத்தில் சுத்தரிப்பூ நிறத்தையும் உட்புறத்தில் வெள்ளை நிறத்தையும் கொண்டது. இவை நீள் உருவம் வடிவம் கொண்டவை. சுமார் 2 அங்குல நீளமும் 7 மி.மீ. அகலமும் உள்ளவை. இதன் குவியம், மணமும் நன்றாகிறது. இதை ஹை தாவரத்தில் மஞ்சள்களிலிருந்து சேகரிக்கிறார்கள். இத்தகையவோளியங்களில் பன ஆக்சிகாரப்படுகள் தீரப்பியுள்ளன. அது மூக்கியமாக எர்க்கட்டோமின் (*Ergotomine*) ஆகும். எர்க்கட்டோமின் இரத்தப் போக்கைத் தடுக்க உபயோகமாகிறது. இதன் ஊசி மருந்து முதலும், தண்டுமும், மூலம் முதலிய மூக்கிய

பாகங்களின் ஊக்குவிப்பதற்கும் பயன்படுத்துகிறார்கள். (*monor exicenda*) இதன் மாத்திரை, ஊசி மருத்தை கருப்பையின் நார் களுக்கு பலவூட்டுவதற்கு உபயோகிக்கின்றார்கள்.

பாக்டீரியங்களின் பயன்கள்

ஸ்ட்ரெப்டோமைசின் (*Streptomycin*): ஸ்ட்ரெப்டோமைசின் (*Streptomyces griseus*) என்ற ஆக்ஸிஜனேமைஸீட்ஸ் பாக்டீரியத்திலிருந்து பாக்டீரியாவை எதிர்க்கும் மருத்து தயாரிக்கப்படுகிறது. இது கொடிய ரோகக் கிருமிகளின் வளர்ச்சியைத் தடுக்கிறது.

ஆசியோமைசின் (*Aureomycin*): ஸ்ட்ரெப்டோமைசின் ஆசியோசுபெரியஸ் (*Streptomyces aureofaciens*) என்ற ஆக்ஸிஜனேமைஸீட்டிலிருந்து இம் மருத்து தயாரிக்கப்படுகிறது. இது வைரஸ்களால் ஏற்படும் விவாதிகளைத் தடுக்கவல்லது. ரிக்கெட்ஸியா (*Rickettsia*) என்ற பாக்டீரியங்களின் எதிரியாகும்.

குளோரோமைசிட்டின் (*Chloromycetin*): ஸ். வெனிசீலா, (*Streptomyces venezuelae*) என்ற ஆக்ஸிஜனேமைஸீட்டிலிருந்து இம் மருத்தைப் பெறுகின்றார்கள். ரிக்கெட்ஸியா போன்ற பாக்டீரியத்தால் உண்டாகும் நோய்களுக்கு மருத்தாகிறது.

டெராமைசின் (*Tetramycin*): ஸ். ரெமோசஸ் (*Streptomyces retmosus*) என்ற ஆக்ஸிஜனேமைஸீட்டிலிருந்து பெறுகின்றார்கள். இது கண்வலிக்கும், சரும விவாதிகளுக்கும் உபயோகமாகிறது.

பூஞ்சைகளும் நிரலும்: பூஞ்சைகளும் பாக்டீரியங்களும் இணைந்து நிகத்திலுள்ள அழிவற்ற அங்கைப் பொருட்களை மட்காக மாற்றுகிறது. கார்திலிருத்தும், நிகத்திலிருத்தும் மற்ற உயிரினங்கள் உபயோகப்படுத்தப்பட்ட பொருட்களை இவை நிகத்தோடு இணைத்து விடுகின்றன. இவ்வாறு பயன்படுவ தால் மற்ற உயிரின வளமு முடிகிறது.

பாக்டீரியங்கள் கார்திலுள்ள நைட்ரஜனை எடுத்துக்கொண்டு அதை நைட்ரஜன் கூட்டுப் பொருட்களாக மாற்றுகிறது. நைட்ரஜனை நிலப்பகுத்தும் திறன் பல பாக்டீரியங்களுக்கு உண்டு. ஒரு வகையைச் சேர்ந்தவை நிகத்திலேயே சாறுண்ணிகளாக வாழ்கின்றன. மற்றொரு வகையைச் சார்ந்தவை உயர் தாவரங்களுக்குள்ளே வாழ்கின்றன. (உ-ம்.) பாயிஸியோபேக்டிரியம்பத்தைச் சார்ந்த தாவர வேர் முடிக்கலில் ரைசோபியம் (*Rhizobium*) என்ற பாக்டீரியம் கூட்டு விரியாக உள்ளது. அசாட்டோபேக்டர் இனாஸ்டிரியம்

(Azotobacter clostridium) என்ற பாக்டீரியாக்கள் நிலத்திலேயே வாழ்ந்து நைட்ரஜன் நிலைப்பாடு செய்கின்றன. கழிவுப் பொருள்களில் உள்ள அமோனிய கூட்டுப்பொருள்களை பெரும்பகுதி நைட்ரோசோமோனாஸ் (Nitrosomonas), நைட்ரோபேக்டர் (Nitrobacter) முதலிய பாக்டீரியங்களாக நைட்ரேட்டுகளாக ஆக்கப்படுகின்றன. இதை நைட்ரோபேக்டர் எனும் பாக்டீரியம் நைட்ரேட்டாக மாற்றுகிறது.

12. லிக்குன்கள்

(Lichens)

பாசிக் காளான்கள், பாசிப் பூஞ்சைகள்

லிக்குன் என்பது ஒரு கூட்டுயிர் இனம் தாவரமாகும். இது ஒரு பாசியும் ஒரு பூஞ்சையும் இணைத்து உருவாகும் உடனத்தையிப் பெற்றுள்ளபோதிலும், இவ்வயிர்சினங்கள் ஒரே தாவரம் போல் காட்சியளிக்கின்றன. ஆகவே, இவை தாவர உயிர்சினங்களாகக் கருதப்பட்டு, 400-க்கும் மேற்பட்ட பேரினங்களாகவும் சிற்றினங்களாகவும் வகைப்படுத்தப்பட்டுள்ளன.

லிக்குன்களில் (பாசிக்காளான்களில்) பொதுவாக டிரெபாக்ஸியா (Trebouxia), டிரென்டெபோலியா (Trentepohlia), புரோடோகாக்கஸ் (Protococcus) முதலிய பசும்பாசிப் பேரினங்களும், ஹெரோகாக்கஸ் (Heterococcus) எனும் பசும்பூசன் பாசிப் பேரினமும், நாஸ்டாக் (Nostoc), ஸ்கைட்டோனீமா (Scytonema), ஸ்டிগோனீமா (Stigonema), கிளோகாப்சா (Gloeocapsa), குரோகோகாக்கஸ் (Chroococcus) முதலிய பசுநீயிப் பாசிகளும் பாசிக் கூட்டாளியாக அமைந்துள்ளன. பெரும்பாலும் ஆங்கோமைஸிட்டைச் சார்ந்த பேரினம்தான் பூஞ்சைக் கூட்டாளியாக அமையும். பேரிடியோமைஸிட்டைச் சார்ந்த இனம் பூஞ்சைக் கூட்டாளியாக அமைந்துள்ள லிக்குன்கள் மிகக் குறைவு.

லிக்குனில் காணப்படும் பூஞ்சைக்கும் பாசிக்கும் இடையேயுள்ள உறவு எவ்வகைப்பட்டது என்பது நீர்வு காண முடியாத ஒரு பிரச்சனையாகும். இதைப்பற்றி மூன்று கருத்துக்கள் நிலவி வருகின்றன. அவை :

(1) மூதம் கருத்து, லிக்குனில் பூஞ்சை, பாசியின்மேல் ஒட்டுண்ணியாக வாழ்கின்றது என்பதாகும், பூஞ்சைகள் உறிஞ்சுறும்புகளிலும், பாசியின் உடனத்தின் ஊடுருவி, உணவைக் கிரகித்துக் கொள்ளவே இதற்குச் சான்றுகும்

(2) இரண்டாவதாக நிலவும் கருத்து, பூஞ்சையும், பாசியும் கூட்டுயிர் வாழ்க்கை (symbiosis நடத்துகின்றன) என்பதாகும். அதாவது, பாசி ஒளிச் செறிக்கையில் மூலம் தரசப் பொருளைத்

தயாரித்துப் பூஞ்சைக்கு அளிக்கிறது என்றும், பூஞ்சை பாகிக்குச் (காற்றி வளர்ந்து) சாதகமற்ற சூழ்நிலைகளிலும் பாதுகாப்பு அளிப்பதன்மூலம் பாகிக்கு வேண்டிய நீரையும், காற்றினூடான ஈரத்தினின்றும் கிரகித்து அளிக்கிறது என்றும் கருதப்படுகிறது. இதன் காரணமாகவே லைக்கன்கள் மற்றத் தாவரங்கள் வாழ இயலாத இடங்களில் நன்கு வளர்ச்சி பெற்றுக் காணப்படுகின்றன.

(3) மூன்றுவது, இந்த உறவு கட்டுப்படுத்திய ஒட்டுண்ணியம் (controlled parasitism) என்பதாகும். பூஞ்சை, பாகியின் மேல் ஒட்டுண்ணியாக வாழ்ந்த போதிலும், அதன் விளைவாக பாகிக்குத் தீங்கு ஏதும் ஏற்படாவிட்டாலும், பூஞ்சையின் ஆயிவு வேலையைப் பாகி தடை செய்து, ஒத்துவாரும் நிலையை உருவாக்குகிறது என்பதாகும்.

வளரிடமும் பரவியிருத்தலும்

லைக்கன்கள் பலவிதமான வளரிடங்களில் காணப்படுகின்றன, இவை பாறைகள், மண், மரப்பட்டைகள், இலைகள் முதலிய வேறுபட்ட வளரிடங்களில் வாழ்வதைக் காணலாம். பல லைக்கன்கள் மற்றத் தாவரங்கள் அறவே காணப்படாத இடங்களிலும் செழிப்பாக வளர்வதைக் காணலாம். உதாரணமாக, திறந்த வெளிகளில் உள்ள பாறைகளின் மேலும் பலி மூடிய ஆரீஷிக் வட்டத்தருகேயுள்ள தூத்திரப் பிரதேசங்களிலும் சிலவகை லைக்கன்கள் (உ.ம். கிளாடோனியா (Cladonia)) காண்கின்றன. இது போன்றே காற்றின் ஈரம் அதிகமாக உள்ள வெப்ப மண்டல மழைக் காடுகளில் (tropical rain forest) சிலவகை லைக்கன்கள் மிகுதியாக வளரும்.

அமைப்பு : புற அமைப்பின் அடிப்படையில் லைக்கன்களை தான்றி வகைகளாகப் பிரிக்கலாம். அவை :

(1) பசை லைக்கன்கள் (Gelatinous lichen): இத்தப் பசை போன்ற மிகுதுளான லைக்கனின் உடலத்தில் பாகியும் பூஞ்சையும் ஒரே சீராகப் (homoeomorphy) பரவியமைந்துள்ளன. (உ.ம்.) லெப்டோஜீயம் (Leptogium).

(2) பசை அல்லது மெயோடு லைக்கன் (Crustose lichen): இவை பாறைகளின் மேலும், மரப்பட்டைகளின் மேலும் படித்து தகடு போல் காணப்படும். (உ.ம்.) கிராபிஸ் (Graphis).

(3) இலை லைக்கன் (Foliose lichen): இவை தட்டையான இலையின் தாங்கல் போல் உள்ளன. இவை மரப்பிண்டங்கள் மீதும், மண்ணின் மீதும் காணப்படும். (உ-ம்), பார்க்லீயா (Parmelia).

மேல் கூறப்பட்ட மீன் இரு லைக்கன்களில் உடலத்தின் உள் அமைப்பு 3 அகலது 4 மண்டலங்களைக் கொண்டுள்ளன. அவை காவன :

1. மேற்புறணி (Upper cortex): மேல்பாகத்தில் ஐதரபாக் களால் கச்சிதமாக அமைந்துள்ளன.

2. பாரி மண்டலம் (Algae layer): மேல்புறணிக்குக் கீழே (outer cortex) பாரியின் செல்கள் அகலது இழைகள் ஒரு படல மாக அமைந்து காணப்படும். ஆராய்ச்சியாளர்களால் இத்தப் பாரி மண்டலத்திலுள்ள செல்கள் லைக்கனின் இனப்பெருக்கச் செல்கள் (gonidial layer) என்று தவறாக அழைக்கப்பட்டு வந்தது. ஆனால், இப்போது அவை இந்தக் கூட்டுயிர்த தாவரத்தில் பாரிப் பேரினத்தின் செல்களேவாகுமென்று நன்கு அறியப்பட்டுள்ளது.

3. மெடுல்லா என்ற மத்திய பாகம் : இங்கு ஐதரபாக்கள் பரவலாக அமைந்து காணப்படுகின்றன.

4. கீழ்ப்புறணி (Lower cortex): இந்த மண்டலம் கச்சித மாக அமைந்த ஐதரபாக்களாலானவை. அடிப்பாகத்தினின்று லை ஐதரபாக்கள் கீழேயுள்ள அடித்தளத்தில் புகுந்து ஈரலாய்டு (rhizoid) அகலது ஈரலேக்களாகச் (rhizine) செயல்படுகின்றன.

(4) குறுஞ்செடி லைக்கன்கள் (Fruticose lichen): இவை புகர்ச் செடிகளைப் போன்றும், உருளைவடிவத்தடலானது, கிளைத்த தாடா போன்றது. மரக்கிளைகளிலிருந்து தொங்கிக் கொண்டோ அகலது செங்குத்தாகவோ வளர்ந்து காணப்படும். (உ-ம்.) அஸ்ஸீயா (Usnea) (படம் 192), கிளெடோனீயா (Cladonia).

குறுஞ்செடி போன்ற லைக்கன்களில் (fruticose lichens) உள் அமைப்பில் ஐதரபாக்கள் கச்சிதமாகக் கொண்ட புறணியும் (outer cortex), அதன் கீழே பாரிப்படலமும் (algae layer) அதற்குக் கீழே பரந்து அமைந்துள்ள ஐதரபா பாகமும் நடுமையத்தில் கச்சிதமாக அமைக்கப்பட்ட ஐதரபாக்களாலான மெடுல்லா என்ற பாகத்தையும் காணலாம் (படம் 193). (உ-ம்.) அஸ்ஸீயா (Usnea).

கைக்கன் உடலத்தில் மேல்பரப்பில் ஆங்காங்கே கச்சிதமாக உள்ள மேல்புறணியில் இடைவெளிகள் காணப்படுகின்றன. அவை மெழுகைப் பாகத்துடன் நேரடியாகத் தொடர்பு கொண்டிருத்தலால் காற்றோட்டத்துக்கு இவை மிகவும் சாதகமாக உள்ளன. இவற்றினைக் காற்றுத் துயாரங்கள் (air pores) என்று குறிக்கலாம். இவ்வித இடைவெளிகள் சில கைக்கன்களில் சிற்ப புறணியினும் காணப்படுகின்றன. சைபெல்லி (cyphellae) என்று இக் காற்றுத் துளைகளுக்குப் பெயர்.

சில கைக்கன்களில் மேல்புறமாக பல கோளவடிவக் கரணிகள் அல்லது முடிச்சுகள் காணப்படுகின்றன. இவை துடிவா (isidia) என்று குறிக்கப்படுகின்றன. இவைகளில் ஹைபாவாயான புற அடுக்கும், அதற்குள் பல பாசிச் செங்கள் அல்லது இழைகள் மூல உடலத்தில் காணப்படுவதுபோல் அமைந்துள்ளன. இவ்வித வளரிகளால், அவற்றினுள்ள பாசிகள் அதிகப்படியாக ஒளிச் சேர்க்கையில் ஈடுபடச் சாதகமாக உள்ளது என்று அறியப்படுகிறது.

உடலப் பெருக்கல் : பொதுவாகப் பெரும்பாலான பேரினங்களில் சொரிடியா (soredia) என்று குறிக்கப்படும் மிகச்சிறிய (மொட்டுவிடல் போன்ற) வளரிகளால் நடைபெறுகிறது. இந்த வளரிகள் சில ஹைபாக்களைப் புறத்தே கொண்டு, அவைகளுக்கு இடையே சில பாசிச் செங்கள் அல்லது இழைகள் கொண்டு கோள வடிவாயுள்ளன. இந்த எண்ணற்ற சொரிடியங்கள் உடலத்தின் மேல்பரப்பில் துளிகள் போல் காணப்படும். இவை உடலத்திலிருந்து பிரித்து காற்றினால் அடித்துச் செல்லப்பட்டு வேறு இடங்களில் படித்து வளர்ந்து புதிய கைக்கன் உடலங்களைத் தோற்றுவிக்கின்றன.

பாணியப் பெருக்கல் : கைக்கனில் உடலம் முழுவதும் ஆகிய இரு கூட்டங்களிலும் கொண்டிருக்கிற பேரிலும், பூஞ்சைகள் மாதிரிய்தான் பாணியப் பெருக்கத்தில் ஈடுபடுகின்றன. இத்தப் பூஞ்சை ஆன்கோமைஸ்பட்டாக இருத்தால், பாணியப் பெருக்கத்தின் விளைவாக ஆன்கோமார்ப்புப் மேல் பரப்பில் தோற்றுவிக்கின்றன. இந்த ஆன்கோமார்ப்பு சில பேரினங்களில் பெரிதளவு மிகும் (perithecium) (உ-ம்.) ஸுபீனாஸா (Pyrenula). சில பேரினங்களில் அபொதீனியமாகவும் (Apothecium) (உ-ம். லெப்டோஜியம் (Leptogium), அஸினா (Urena)) அமைந்துள்ளன. இத்த ஃபுருட் பாடி உண்டாவதற்கு மூன்பு, மூன்றாம்பு ஆன்கோமையினம், ஆத்தரிடியினம் உண்டாகி, பின்னர் ஆன்கோமையினம் ஹைபா இழைகள் தோன்றி அவைகளின் மேல் ஆன்களாக

உண்டாகின்றன. ஆல்கன்களைச் சுற்றிப் பெரிதும் உண்டாகிப் பெரிதாவது அங்ஙனது அபொதினிய வகை சிபுருட் பாடி உருவாகிறது.

பூஞ்சைக் கூட்டாளி பேலிடியோமைஸிட்டாக இருந்தால், லைக்கனின் அடிப்பாகத்தின் பேலிடிய வகுக்குகள் வரிசைத் திரமமாக உண்டாகி பேலிடியோம்போர்களைத் தொற்றுவிக்கின்றன. (உ-ம்.) கொரா (Cora).

லைக்கனளின் வகையாடு

லைக்கன்கள் பூஞ்சைக் கூட்டாளியின் வகையாட்டு நிலையை அடிப்படையாகக்கொண்டு ஆங்கொலைக்கன் (பூஞ்சைக் கூட்டாளி ஆங்கொமைஸிட்ட இனத்தைச் சார்ந்துள்ளது) என்றும், பேலிடியோ லைக்கன் (பூஞ்சைக் கூட்டாளி பேலிடியோமைஸிட்ட இனத்தைச் சார்ந்தது) என்றும் இரு வகைகளாகப் பிரிக்கப்பட்டுள்ளன. மீண்டும், ஆங்கொலைக்கன்கள் அவை தொற்றுவிக்கும் ஆங்கொகார்ப்பின் தன்மையைக் கொண்டு ஸ்பிரெனிலைக்கன் (Pyrenolichen) [சிபுருட்பாடி பெரிதாவியதாக உள்ளது—(உ-ம்.) ஸ்பிரெனா] என்றும், டிஸ்கொலைக்கன் (Discolichen) [சிபுருட்பாடி அபொதினியமாக உள்ளது—(உ-ம்.) டெஸ்டோலிசம், அஸினியா] என்றும் பிரிக்கப்பட்டுள்ளன.

லைக்கனின் பொருளாதார முக்கியத்துவம்

லைக்கன்கள் பெரும்பாலும் பாதைப் பிரதேசங்களில் குடிபெறி அவற்றின்மீது படர்ந்து வளர்வதால், பாதை சிறிது சிறிதாகச் சிதைந்து, பிரகு துகள்களாக மாறி, லைக்கன்கள் இதற்கும்போது உண்டாகும் மட்டுடன் (lupans) கலந்து, பல ஆண்டுகளுக்குப் பிரகு மண்ணாக மாற்றம் அடைவதற்கு லைக்கன்கள் பெரிதும் உதவிவுள்ளன.

பல லைக்கன்கள் தூத்திரப் பிரதேசங்களில் 'ரெயின்டர்' (Reindeer) மாண்களுக்கு உணவாகப் பயன்படுகின்றன. (உ-ம்.) கிளோனோலா (Cladonia), செர்தாரியா (Cetraria).

சில பேலிசன்களை ஸ்கெண்டிநேவியா, மேற்கு ஆசியா, வட ஆப்பிரிக்கா பாகங்களில் உள்ள மக்கள் உணவாகக் கொள்வீர்தனர். (உ-ம்.) லீகேனோரா (Lecanora). இதைப்பற்றிய குறிப்பு விவிலிய தாவிலும் (Bible) காணப்படுகிறது. இஸ்ரேலிட்டுகள் (Israelites) பாலைவனத்தைக் கடந்து செல்லும்போது பசியால் வாடியபோது வானத்திலிருந்து மானு தேவகண்ணடி

(Manna or bread from Heaven) என்ற சொட்டி போன்ற உணவு பொழிந்தது என்றும், அங்ஙனவு இந்த லிகேனோசைக்கஸ்தான் என்றும் கூறப்பட்டுள்ளது.

மற்றும் சில பேரினங்கள், மூன்றுக்களில் மருத்துவத்தில் கையாளப்பட்டு வந்தன (உ-ம்.) பெல்டிஜரா (Peltigera), லோபேரியா (Lobaria).

இந்தானில் பல சைக்கஸ்களிலிருந்து, சைக்கஸ் அமிலங்கள் (lichen acids) பிரித்தெடுக்கப்படுகின்றன (extracted). மற்றும் சாயம் பொருள்களும் (dye stuff) பல சைக்கஸ் உடலங்களிலிருந்து பிரித்தெடுக்கப்படுகின்றன. மூக்கியமாக வேடு ஆய்வுக் கூடத்தில் பெரிதும் பயன்படும் விட்மன் கரைசல் (Vitrus solution) ரோசெல்லா டிக்டோரியா (Rocella tinctoria), லிகேனோசா (Lecanora) முதலிய சைக்கஸ் பேரினங்களிலிருந்து பிரித்தெடுக்கப்படுகிறது.

அஸ்னியா (Usnea)

இது டிக்டோசைக்கஸ் வகையைச் சார்ந்த பேரினமாகும். வெப்ப மண்டல மழைக் காடுகளிலும், குளிர்பிரதேசங்களில்,




படம் 192

அஸ்னியா—கடலத்தின் வளியங்கு

மரங்களிலிருந்தும் செடிகளிலிருந்தும் தொங்கும் உடர்த்தை உடையது. இதன் உடல அமைப்புக் குறுஞ்செடி இக்கள்

(fruticose) வகையைச் சார்ந்தது. இவ்வுடலத்தில் கிரீன்கள் உருளைவாகவோ அல்லது தட்டையாகவோ நுனியில் அப்போதியிய கீடுகுட்பாடினைக் கொண்டுள்ளன (படம் 193). இவற்றில் உள்ள பாசிக் கூட்டாளி டிரபுக்சியா (Trebouxia) என்னும் ஒற்றைச்செல் பசும்பாசியாகும். பூஞ்சைக் கூட்டாளி ஆன்கோ மஸ்டீட் வகையைச் சார்ந்தது.



படம் 193


அக்சியா—உடலத்தின் குறுக்குவெட்டுத் தோற்றம்

உடலத்தின் குறுக்குவெட்டுத் தோற்றம் (படம் 193) மேற் புறணி பாசி மண்டலத்தையும், அதற்குக் கீழே பரவலான ஹைபா பாகத்தையும், செட்டிய ஹைபாக்களாக ஆன மேடுக்கள் பாகத்தையும் கொண்டுள்ளது.

பாலின இனப்பெருக்கம்: இந்த லைக்கனில் சொரீடியங்களினால் (soredia) நடைபெறுகிறது. பூஞ்சை ஹைபாக்களையும் பாசி செல்களையும் கொண்டுள்ளது. இவ்விதமான சொரீடியா என்னுந் ற ஒற்றையில் உடலத்தின் மேற்பரப்பில் ஆங்காங்கே பரவி விரும்பதைக் காணலாம். இவை, சாதகமான சூழ்நிலையில் புதிய லைக்கன் உடலத்தை உண்டாக்குகின்றன.

பாலினப் பெருக்கம் : இந்த லைக்கனில் உள்ள பூஞ்சை ஆன்கோ மஸ்டீட் வகையைச் சார்ந்ததாகும். புறணிப்பாகத்திலுள்ள ஹைபாக்களில் பாறுறுப்புகள் தோன்றுகின்றன. விரிந்த காய்புடன்கூடிய ஆன்கோ மஸ்டீடியமும் உருவாகிறது.

(ஆர்க்கிகார்ப் archicarp—என்று அழைக்கப்படுவது). ஆகக் கோனியத்திற்கு அருகில் குவித்த பாகங்களில் ஹைபாக்கள் புருத்து ஸ்பெர்மோஸியங்களைத் தொற்றுவிக்கின்றன. இந்த ஸ்பெர்மோஸியாக்கள் பசைப்பொருளுடன் வெளியித்து டிரைக் கோகைன்மேல் மோதுகின்றன.



படம் 194

ஆனியா—அபொதீனியத்தின் கீழ்மேட்டுத் தொற்றல்

பின்னர் மூன்றப்படி ஆன்கோனியத்திலிருந்து ஆன்கோ ஜீனஸ் ஹைபாக்கள் தொன்றி, பின் அவற்றினின்றும் ஆன்கைகள் தொன்றுகின்றன. இதன் விளைவாக, டிரைகோமைனீட்டிக் உன்னதுபோல் குவளைபோன்ற அபொதீனியமாக, ஆன்கோ கார்ப் உருவாகிறது (படம் 194). சிறப்பாகத்திலும் பக்கங்களிலும் பாசிக் கூட்டானிச் செல்கள் இருப்பதாக, இந்த லைக்கன் அபொதீனியத்தை, பெனெஜா (Penia) போன்ற பூஞ்சை அபொதீனியத்திலிருந்து எளிதில் வேறுபடுத்தி அறியலாம்.

அபொதீனியத்தினின்றும் வெளியாகும் ஆன்கோகார்போர்கள் முளைத்துச் சில ஹைபா இழைகளை உண்டாக்குகின்றது. இந்த ஹைபாக்கள் பாசிக் கூட்டானியான டிரைபுக்ஸியாச் செல்கள் அருகில் இருந்தாக, அதைச் சுற்றி வளர்ச்சியடைத்து, புதிய ஆன்கியா உடனத்தை உண்டாக்குகிறது. இவ்வாறியுக் ஹைபா வளர்ச்சியின்றி அழிந்துவிடுகின்றது. (ஆயின், பாசிக் செல்செர் தனித்து வாரும் இயல்புடையது.)

எனவே, ஆன்கியா உடனம் உருவாகப் பாசிக் கூட்டானியான டிரைபுக்ஸியா, ஆன்கோமைனீட்டைச் சேர்ந்த பூஞ்சை ஆயி இரண்டுமே இன்றியமையாதன என்று தெள்ளத் தெளியத் தெரிகிறது.


13. பாக்டீரியா

(Bacteria)

உயிற்றின் கோடானு கோடி உயிர்களுள் மண்ணிலும், நீரிலும், காற்றிலும், உயிர்கள் பாவத்திலும், எங்கும் பரவி யிருக்கும் பாக்டீரியாவே மிக நுண்ணியவைகளாகும். இவை 'மெய்கள்' (germs) அல்லது மைக்ரோப்கள் (microbes) என்று பொதுவாகக் குறிக்கப்படுகின்றன. 1676ஆம் ஆண்டில் முதன் முதலாக 'ஆன்டன் வான் லீவன் ஹாக்' (Anton Van Leeuwenhoek) என்பவர் பாக்டீரியா என்றும் நுண்ணுயிர்கள் எங்கும் பரவியிருத்தலை உலகுக்கு வெளிப்படுத்தினார். ஹாகத்து தேசத்தைச் சார்ந்த வெண் தலாசிப்பாளரான இவர், இத் நுண்ணுயிர்களை மனித உடலத் திரவங்களான உமிழ்நீரில் (saliva) கண்ணுற்றார். பின்னர், லூயிஸ்பாஸ்டர் (Louis Pasteur) என்ற கிபிரெஞ்சு அறிவியல் அறிஞர் பாக்டீரியாவின் வெய்வோறு அம் சக்திப்பற்றிச் சோதனைகள் பல ஆற்றி அவற்றின் முக்கியத் துவத்தை உலகுக்கு அறிவித்தார். ஆகவே, அவரை 'பாக்டீரியா இயலின் தந்தை' (Father of Bacteriology) என்று அழைக்கிறோம். பின்னர், மனித இனத்திற்கும், காந்தடைகளுக்கும் தீக்கு விளைவிக்கும் மனித நோய்களுக்கும் இப் பாக்டீரியாவே காரணம் என்று ஆராய்ச்சியாளர்கள் உணரத் தலைபட்டார்கள். 'ஆத்திராக்சு' (Anthrax) போன்ற (காந்தடை) நோய்கள், சில பாக்டீரியாவிற்குள் உண்டாகும் என்று முதலில் 'ராபர்ட் கோக்' (Robert Koch) என்பவர் விளக்கிக் காட்டினார். இது போலவே தாவர நோய்களுள் சில, பாக்டீரியாவிற்குள் உண்டாகின்றன என்று ((உ-ம்.) ஆம்பிளின் பிஸப் பிளீட் (Fire Blight)), முதலில் 'புரீலி' (Burrill) என்பவர் கண்டறிந்தார். பாக்டீரியாவின் உடலம் ஒரு செல்லாக் ஆகது. ஆயினும், ஆக்டிமோமைசிடீஸ் (Actinomyceles) என்னும் ஒருவகை பாக்டீரியாவின் உடலம் மிகுந்த பூஞ்சைகளின் இனமுக்கின்போல்) அமைந்துள்ளது. பாக்டீரியாக்கள் நிரந்திரம், நீரிலும், காற்றிலும் பரவியுள்ளன. இவையே மண்ணிக் காணப்படும் நுண்ணாயிரங்களும் (microflora) பெரும்பகுதியாகும். சில பாக்டீரியா உயர்த்த வெப்பநிலையினுள்ள வெந்நீர் ஊற்றுகளிலும்

(உஷ்ண நிலை 75°C-ல்) காணப்படும். மற்றும் விலங்குகளின் குடவிலும், மனிதனின் குடவிலும் சில பாக்டீரியாக்கள் (உ-ம். எஸ்சீரியா கோலி (Escherichia coli)) வாழ்கின்றன.

சாதாரண ஒளி மைக்ரோஸ்கோப்பிற்கும் புலப்படாத இந்த பாக்டீரியா பொதுவாக 2—5 மைக்ரான்கள் (microns) அளவில் உள்ளன (சராசரி 1.5 மைக்ரான்கள்). எடுத்துக்காட்டாக,



படம் 195

அ. பாக்டீரியா—ஸ்ட்ரெப்டோகாக்கஸ் ஆ. ஸ்டாபிலோகாக்கஸ்

இ. ஈ. கிளபிரீலம் வகைகள் உ. ஸ்டாபில் டிபெரிகலம்

பேஸில்லஸ் ஆந்த்ராக்சிஸ் (Bacillus anthracis) என்றும் பாக்டீரியம் 5—10 மைக்ரான் நீளத்தையும், 1—2 மைக்ரான் பருமனைக் கொண்டது. காக்கஸ் என்றும் வகை பாக்டீரியா 15—2 மைக்ரான் விட்டத்தைக் கொண்டுள்ளது.

எனவே, பாக்டீரியாவை உருவத்தை அடிப்படையாகக் கொண்டு 3 வகைகளாகப் பிரிக்கலாம். சில பாக்டீரியா கோள வடிவத்துடனும் (spherical), சில கோள வடிவத்துடனும்

(rod shape), சுருள்வடிவத்துடனும் (spiral) காணப்படுகின்றன. கோள வடிவம் கொண்டவற்றை 'காக்கஸ்' (Coccus) என்றும் (படம் 195ஆ) (உ-ம்.) டிப்ளோ காக்கஸ் நிகோஸியி (Diplococcus pneumoniae), கோள வடிவம் கொண்டவற்றை 'பேசில்லஸ்' (Bacillus) என்றும் (படம் 195உ) (உ-ம்.) பேசில்லஸ் ஆந்த்ராக்சிஸ் (Bacillus anthracis), சுருள்வடிவம் கொண்டவற்றை ஸ்பைரில்லம் (Spirillum) வகை (படம் 195இ) (உ-ம்.) டிரெபோனெமாவீடா (Treponema pallidum) என்றும் குறிப்பிடுகின்றன. காக்கஸ் வகைகளில் சில திரணாகலம் (clusters) (உ-ம்.) ஸ்டபைலோ காக்கஸ் (Staphylococcus), சில சங்கிலி போன்று ஒரு வரிசையில் அமைத்தும் காணப்படுகின்றன (படம் 195ஆ). சில பேசில்லஸ் வகைகள் சிறிது வளைந்து 'காமா' (comma) அல்லது கொக்கி போன்று காணப்படும் (படம் 195ச). அவை விப்ரியோ (Vibrio) என்றும் குறிக்கப்படுகின்றன. மற்றொரு வகை பாக்டீரியா, கிளைத்த செங்கிலையோ அல்லது மிக மெல்லிய குறுக்குச் சுவரத்த ஹைபா (Hypha) இழைகளைப் போன்றும் செங்கிலை உடைவன. இவை, ஆக்டிமோமைசிடீஸ் (Actinomycetes) அல்லது சுதிர பாக்டீரியா (Ray bacteria) என்று வழங்கப்படுகின்றன. அவை பூஞ்சைவையோடு தொடர்புடையபோதிலும் செல் உள் அமைப்பில், பேக்டீரியா இனத்தையே சார்ந்ததாகும் (உ-ம்.) மைக்கோ பேக்டீரியம் (Mycobacterium), ஸ்ட்ரெப்டோமைசீஸ் (Streptomyces).

பேசில்லஸ் வகைகளில் சில பேரினங்களும், ஸ்பைரில்லம் வகைப் பேரினங்களும் கணையிழைகளை உடைவன. ஆகவே, அவைகளின் இயக்கத்தால் நீரில் நீந்திச் செல்லும் திறனைக் கொண்டுள்ளன. எடுத்துக்காட்டாக, பெசில்லஸ் எஸ்டடலிஸ் (B. subtilis) ஒரு விநாடிக்கு 200 மைக்ரான்கள் தூரம் நகர வல்லன. சில பேரினங்களில் ஒரு துருவத்தில் ஒரே ஒரு கணையிழையைக் கொண்டும் அல்லது ஒவ்வொரு துருவத்திலும் ஒரு கணையிழையைக் கொண்டும், மற்றும் சில, கணையிழைகளைக் கொத்தாகத் துருவங்களில் கொண்டும் இருக்கின்றன. உடவத்தைச் சுற்றி எவ்வாறு பாக்டீரியாவும் கணையிழைகளைக் கொண்டும் சில பேரினங்கள் உள்ளன. இந்த பாக்டீரியாவின் கணை இழையின் அதி மூக்கிலமான அம்சம் வாதெனில் இதன் உள் அமைப்பில் ஒன்று (அல்லது இரண்டு) கிளைப்பிரி (filril) தான் காணப்படும், மற்ற எவ்வாறு கணையிழைகொண்ட உயிரினங்களிலும் கணையிழைக்குள் (9 + 2) கிளைப்பிரிங்கள் (படம் 2) உள்ளன.

உள்ளமைப்பு

பாக்டீரியாவின் செல் பன அம்சங்களில் மற்றத் தாவரச் செல்லினினின்றும் (பசுநீயப்பாசி தவிர) வேறுபாட்டைக் காட்டுகிறது. இதன் உள்ளமைப்பு பசுநீயப்பாசிகளைப் போன்று, பரிணாமத்தின் கீற்றிலேயே காட்டுகின்றது. செல்லின் உறைக்கு வெளியே பன பேரினங்களில் கேப்ஸ்யூல் (capsule) என்ற பாசிச் சேக்கரைடுகளாக (polysaccharides) ஆன பசைப்பொருள் காணப்படுகின்றது. செல் உறை பெரும்பாலும் பாசிச் சேக்கரைடுகள் (குளுக்கோஸ், கேலக்டோஸ், மேனோஸ்) கொண்டிருப்பது



படம் 196

பாக்டீரியா—*பேசுநீயப்பாசி* (அவரைக் குடும்பச் செட்களில் காணப்படுகிறது)

பிளூம் ஸுரேமிக் அமினோம் (muranic acid) பன அமைனோ அமினங்களிலும் (amino acids), ஸுக்ஸிலமாக டை அமைனோ பிமேலிக் அமினோம் (diamino pimelic acid), மற்றும் லிப்பிடுகளும் (lipids) கொண்டுள்ளது. ஸுரேமிக் அமினோம், டை அமைனோபிமேலிக் அமினோம், பசுநீயப்பாசிகள் செல் உறைகளிலும் காணப்படுகின்றன. பாக்டீரியாவின் உறையின் தன்மை 'கிராம்' நிறச்சோதனை முறையில் (Gram's staining procedure)

ஒருவாறு அழிய இயலும். கிரிஸ்டல் வயலட் (crystal violet), அல்கஹாய்ச் ஆகிய நிறமிகளின் தொய்த்துச் சாராயத்தில் (alcohol) கலவியிலும் சில பாக்டீரியாக்கள் நிறமிகளை அப்படியே தம் உடலத்தில் நிறுத்தி வைத்துக்கொள்ளும் தன்மை வாய்ந்தன. இவற்றை தாம் கிராம் பாஸிடிவ் (Gram-positive) பாக்டீரியா என்று குறிப்பிடுகிறோம். மற்றவை, நிறமிகளை உடலத்தில் நிறுத்தி வைத்துக் கொள்ள இயலாதவைவாக உள்ளன. அவை கிராம்-நெகடிவ் (Gram-negative) என்று குறிக்கப்படுகின்றன. கிராம் பாஸிடிவ் பாக்டீரியாவின் செவ்வரை ஒரு நெற்றி மீப்பிடு களைக் (lipids) கொண்டுள்ளன. ஆனால், கிராம் - நெகடிவ் பாக்டீரியா, 20 சதவிகிதத்துக்குமேல் மீப்பிடுகளைக் கொண் டுள்ளன. இவ்வாறே கிராம் பாஸிடிவ் பாக்டீரியா, சில அமைப்போ அமின்களையே (குளுடாமிக் அமினம், அலானின்) கொண் டுள்ளன. ஆனால், கிராம் நெகடிவ் பாக்டீரியா பல்வேறு அமைப்போ அமின்களைக் கொண்டுள்ளன.

செவ்வின் புரோட்டோபிளாஸ்டிக் எண்டோபிளாஸ்டிக் வலை (endoplasmic reticulum), கைமட்டோகாண்டிரியா (mitochondria) களைக்கூட ஆகிய மூன்றும் காணப்படுகின்றன. மற்றும், செவ்வின் நூக்கியல் உறைவற்றப் பசுநீர்ப் பாசியின் நூக்கி யணைப் போலக் (prokaryotic) காணப்படும். டி.என்.ஏ. (D.N.A.) செவ்வின் மத்தியில் கைமட்டோபிளாஸ்திக் நுண்மணிகள் மயமாகக் காணப்படுகின்றது. ஈரபோஸோம்கள் (எண்டோ ப்ளாஸ்டிக் வலை இல்லாததால்) கைமட்டோபிளாஸ்திக் ஆல் காங்கே அமைந்துள்ளன. கவனித்தனுக்கு வேண்டிய நொதிகள் (respiratory enzymes) கைமட்டோகாண்டிரியா இல்லாத காரணத் தால் செவ்வின் பிளாஸ்மா ஜவ்வின் அண்மையிலேயே அமைந் திருப்பதாகக் கருதப்படுகிறது.


செவ் பகுப்பு அனுகூலமான சூழ்நிலையில் சாதாரணமாக 20—30 நிமிடங்களுக்கு ஒரு முறை தடைபெறுகின்றது. அப்போது செவ் குறுக்குவாட்டில் இரண்டாகப் பிரித்து, ஒரு தாய்ச் செவ், இரு செவ்ச் செவ்வை உண்டாக்குகிறது (குறுக்குப் பிரிவு—binary fission). ஆகவே, சூழ்நிலை சாதகமாக இருப்பின், ஒரு பாக்டீ ரியம் 24 மணி நேரத்திற்குள் எண்ணற்ற பாக்டீரியாவை உண் டாக்க வல்லது. எனவே, பாக்டீரியா விரைவில் எண்ணிக் கையில் பெருகும் திறனுடையவை என்பது புலப்படும்.

ஒருசில பாக்டீரியா, சாதகமற்ற நிலைகளில் கம்போரை உண்டாக்கிக் கொள்ளும் சக்தி பெற்றுள்ளன. (உ-ம்.) பேசிலியஸ் (Bacillus), கிளாஸ்டிரிட்யம் (Clostridium). இவை செவ்னுக்குள்

ஒவிர ஒரு தடித்த தனி உறைவைக் கொண்ட ஸ்போரை (எண்டோஸ்போர்—endospore) உண்டாக்கிக் கொள்ளுகின்றன. சாதாரணமாக பாக்கிரியா 60° செ. வெப்பநிலையில் 10 நிமிடக் கனிக் கொல்லப்படுகின்றன. ஆனால், ஸ்போர்திறையை அடைந்தபின் இந்த பாக்கிரியா 100° சென்டிஜிரேயுக் 8 மணி நேரம் வைத்தஸ்போரிலும் கொல்லப்படுவதில்லை. ஆக்டிபிரைமசிடில் என்ற பாக்கிரியா இனங்களில், கொனிட்யூயானின் மூலம் (சக்ஸிலிபோல்) பாலினா இனப்பெருக்கம் தடைபெறுகின்றது.

பாலினப் பெருக்கம்

பாக்கிரியாவில் மிக அரிதாகப் பாலினப் பெருக்கம் (conjugation) தடைபெறும். இப் பாலினப் பெருக்க நிகழ்ச்சியை முதல்முதலில் என்சரீஷியா கோலி (Escherichia coli) என்றும் பேரினத்தில் கண்டு உலகுக்கு உரைத்தவர் லெடர்பர்க் (Lederberg, 1946) ஆவார். ஆனால், பாலி, பூஞ்சைகளில் தடைபெறும்



படம் 197 அ—இ. என்சரீஷியாகோலி—பாலினப் பெருக்கப் படிகள்

அ. ஆன் செல்லும் பெண் செல்லும் இணைதல் ஆ. ஆன் செல்லிலிருந்து குரோமோசோம் பெண் செல்லுக்குப் பிரவேசித்தல் இ. பெண் செல்லின் குரோமோசோமத்தின் அருகில் ஆன் குரோமோசோம் அமைந்திருத்தல்.

இணைப்பு முறைகளிலின்றும் இது பல அம்சங்களில் வேறுபட்டது. இந்தச் சிற்றினத்தில் செல்லின் நடுவில் ஒரு வட்டவடிவ குரோமோசோம் காணப்படுகிறது. இன்னபும் இரு செவ்வால்கள்,

ஒன்று ஆன் தன்மையையும் மற்ருென்று பெண் தன்மையையும் கொண்டுள்ளதென்று கருதப்படுகிறது. ஆன் செவ்வில் எபிரோம் (epirome) என்ற ஓர் உறுப்பு குரோமனோமில் ஒரு பக்கத்தில் இருப்பதைக் காணலாம் (படம் 197அ). இணைப்பின்போது ஆன் செவ்வில் வட்டமான குரோமனோம் ஒரு பக்கத்தில் பிளந்த பின்னர் இஹை தோன்றுகிறது. இஹை போன்ற குரோமனோம் சிற்று சிற்றாகப் பெண் செவ்வுக்குள் பிரவேசிக்கிறது (one-way transfer, படம் 197இ). மூழு குரோமனோமோ அல்லது குரோமனோமத்தின் ஒரு பகுதியோ பெண் செவ்வினுள்ள குரோமனோமில் அன்மையில் அமைத்து விடுகிறது (படம் 197இ). பின்னர், இரு குரோமனோம்களுக்கும்மிடையே, சில பாகங்களில் குறுக்கு மாற்றம் (cross over) நடைபெறுகிறது. எனகோட், நீண்ட பாக்கியியாவில் காணப்படாத போதிலும், ஆன் செவ்வின் குரோமனோமில் சில பாகங்களைத் தன் குரோமனோமத்துடன் இப்போது கொண்டிருத்தலால் பெண்செவ் பாகுபாட்டையும் போது ஆன் செவ்வின் பண்புகள் புதிதாக உண்டான செவ்வில் காணப்படுகின்றன. ஆகவே, பாக்கியியாவில் மையவானில் பாகு பாடு நடைபெறுவிலும், மரபுவழிப் பண்புக் கலப்பு (genetic recombination) ஏற்படுகின்றது. ஆன் செவ் தன் குரோமனோமத்தை இழக்க நேரிடுவதால் இறந்துவிடுகிறது.

வட்ட முறையின் அடிப்படையில் பாக்கியியாவைப் பூரணிகள் என்றும் கல-ஜீவிகள் என்றும் இரு வகைகளாக வகிக்கலாம். பூரணிகள் ஒட்டுண்ணிகளாகவோ (parasites) சாறுண்ணிகளாகவோ (saprophytes) அல்லது உட்டுவிர்களாகவோ (symbiotic) வாழ்கின்றன.

ஒட்டுண்ணிகள் தாவரங்களையும், விலங்குகளையும், மனிதனையும் பாதித்துப் பல நோய்களை உண்டாக்குகின்றன. தாவரத்தைப் பாதிக்கும் பாக்கியிய நோய்கள் : (1) பாரங்கைமா (அழகல்) நோய்கள் (paranchyma diseases) (உ-ம்) ஆப்பிளின் கிபவர்பினைட் (fire blight of apples-Bacillus amylovorus), ஆரஞ்சு கேங்கர் (citrus canker), (2) சாற்றுக்குழாய் நோய்கள், (vascular diseases) (உ-ம்) தக்காளி, கத்தரி, புகையிலை வாடுதல் நோய் (wilt Pseudomonas solanai), (3) வீக்க நோய்கள் (hyper plastic diseases) பழ மரங்களின் 'காங்கல்' (உ-ம்) ஸ்பிரெமோனாஸ் கலுமிபெரியன்ஸ் (Pseudomonas saviticens) என ஒன்று வகைப்படும். இவ்வித நோய்களுக்குக் காரணமான பாக்கியிய இனத்துகளை, வெவ்வு செல், தேன் சுரப்பிகள் (nectaries) ஆவனவகையில் மூன்றாம் ஆதாரத் தாவரங்களுக்குள்ளே புகுத்து பின்வரும் மாறுதல்களை விளைவிக்கின்றன. (1) தடுப்பு இடைபடுக்கு (middle lamella)

கரைத்துவிடுதலாகச் செங்கம் தனித்தனியே பிரித்துவிட நேரிடுகின்றது; (2) நொடிகளைச் சுரப்பிப்பதன் மூலம் தரசப் பொருள்களையும், புரதப் பொருள்களையும் எவிய பொருள்களாகச் சிதைவுறச் செய்தல்; (3) பேடுவிரைவிக்கும் அமிலங்களையும், காரங்களையும் இதர நச்சுப் பொருள்களையும் (toxins) உண்டாக்குதல்; (4) செம்பு குப்பை வேகமாக நிகழ்ச்செய்து அதனால் வீக்கங்களை உண்டாக்குதல்.

ஆத்ராக்சு (anthrax—*Bacillus anthracis*) முதலிய பாக்கிரியா நோய்கள் காய்தடைகளைப் பாதிக்கின்றன. இவ்விதமே மனிதனைப் பாதிக்கும் டைபாய்டு (typhoid—*Berthallia typhaze*), காலரா (cholera—*Vibro cholerae*), காசநோய் (Tuberculosis—*Mycobacterium tuberculosis*), நிமோனியா (pneumonia *Diplococcus pneumonia*), தொழு நோய் (leprosy—*Micobacteria leprae*) முதலிய நோய்களுக்கு காரணமாக உள்ளன.

கூட்டுவிரவாழ், பாக்கிரியாவிற்குச் சிறந்த எடுத்துக்காட்டு. ரைஜோபியம் (*Rhizobium*) என்னும் பேரினமாகும். (ரை) லெக்யுமினோசெரம் (*R. leguminosesarum*) என்னும் பாக்கிரியம் அவரைக் குடும்பத்தைச் (*Leguminosae*) சேர்ந்த செடிகளின் வேர்களுக்குச் சிரமேரித்து முடிச்சுகளை (nodules) உண்டாக்குகிறது. (படம் 196). இந்த வேர் முடிச்சுகளுக்குள் (root nodules) இந்த பாக்கிரியம் வாழ்ந்து கொண்டு கைட்டிரஜன் நிலைநிறுத்துகிறது (nitrogen fixation). இது வேர்ச் செங்களிலுள்ள தரசப் பொருள்களைச் சிரமித்துக்கொண்டு அதற்குப் பதிலாக கைட்டிரஜன் நிலைநிறுத்துதல் மூலம் கைட்டிரஜன் கூட்டுப்பொருள்களை உண்டாக்கி வேர்ச் செங்களுக்குத் தருகின்றது. ஆகவே, இந்த பாக்கிரியா கூட்டுவிர பாக்கிரியா (Symbiotic Bacteria) என்றுகுறிப்பிடப் படுகின்றன. இந்த பாக்கிரியம் கோல் வடிவம் (rod-shaped) கொண்டு ஒரு தருவத்தின் ஒரு கணவிகழையைக் கொண்டுள்ளது. இது வேர்த் துளியை அணுரிச் செல் உறைவைத் துளைத்து உட்செங்கின்றது. பின்னர், வேர்த்துளிக்கூள், ஹாற்றுக்கணக்காகப் பாருபாடு அடைத்து அவையாவும் அணிவகுத்துப் புறணிக்குள் புகுகின்றன. இந்த பாக்கிரியானினம் சுரப்பிக்கப்பட்ட ஹார்மோன் பொருள்களின் துண்டினாலும் புறணிச்செங்கம் பெரிதாவதோடன்றி கிரையின் பாருபாடு அடைவதும் நேரிடுகிறது. ஆகவே அய்விடங்களின் கவரின் புறத்தின் உருண்டையான முடிச்சுகள் தோன்றுகின்றன.

அவரைக் குடும்பத்தைச் சார்ந்த செடிகள் வளரும் இடங்களிலெல்லாம் வேர்ப் பகுதிகளின் இவ்வாறு முடிச்சுகள் உண்டாவதால், புதைத்து விடக்கும் இந்த முடிச்சுகளின் உண்டாகும்

தைட்டரூஸ் கூட்டுப் பொருள்கள் அதிகமாகி மண்ணை வள மடையச் செய்கின்றன. ஆகவே, மற்றப் பயிர்கள் சாகுபடி செய்யும் வயல்களில், இடைக்காலங்களில் இவ்விதமான அவரைக் குழம்பச் செலுத்தி வளர்த்து, அதன்மூலம் நிலத்தில் தைட்டரூஸ் வளத்தைப் பெருக்குவது விவசாயத்தில் இன்றியமையாத முறை வாகிவிட்டது (மற்றும் பயிர் சாகுபடி—crop rotation).

சாறுண்ணிகளாக வரலும் பாக்கியியா, மனித வார்க்கத்துக்கு பெரிதும் பயனுளிப்பவையாகும். இத்தச் சாறுண்ணி, அழிவும் அங்ககப் பொருள்களையே உணவாகக் கொண்டுள்ளதால் மட்டுமே தாவரம். இறந்த விவங்கு, மனிதன் ஆடுபவற்றின் உடலங்களின் சிதிற சிதிறாகச் சிதைவுநச் செய்கின்றன. இத்தகைய பாக்கியியா உலகில் இவ்விடவெளில் உயிரற்ற உடல்கள் சிதைவுமுயல் அந் நிலையையே குவித்துவிடும். ஆகவே, இவ்வகை பாக்கியியா உலகில் இவ்வாறு நிலையைக் கற்பனை செய்வவே இயலாது. இச் சாறுண்ணி பாக்கியியா மறித விதங்களிலும் தமக்குப் பயனளித் தின்றன. அவை, பாலினின்று மோர்த்தயிர், வெண்ணெய் முதலிய (savouring of milk) உண்டாவதற்கும், பாலாடைக்கட்டி இனிய மணத்தைப் பெறுவதற்கும் (ripening of cheese), சாராயம் (alcohol) அலிடிச் அமிலமாக மாறுவதற்கும், தோல் பதனிறு வதற்கும் (tanning of leather), தார் பிரித்தலிலும் (retting of fibres), காய்சி, உ, கோகோ முதலியவற்றையும் பதப்படுத்தலிலும் (curing), பெரிய தகரங்களில் அகத்த நீரின் தச்சப் பொருள்களை அகற்றும் பணிகளிலும் (sewage disposal) இப் பாக்கியியா இன்றியமையாதவையாகும்.

ஆறும், சில சாறுண்ணிப் பேரினங்கள் உணவுப் பொருள் களின்மேல் வளர்ந்து தச்சப் பொருள்களை உண்டாக்கும். அதை உண்பவர்கள் பாடுவிசம் (botulism) என்ற தச்ச தோயலாக பாதிக்கப்படுகிறார்கள்.

சுய ஜீவி பாக்கியியாவை (1) வேதிச் சேர்க்கை (chemosynthetic) பாக்கியியா என்றும் (2) ஒளிச்சேர்க்கை பாக்கியியா என்றும் வகைப்படுத்தலாம்.

வேதிச் சேர்க்கை பாக்கியியா அடித்தனத்திலும் உள்ள அங்ககப் பொருள்களை (inorganic) ஆக்ஸிஜனும் செய்து அந் நிகழ்ச்சியின் மூலம் வெளிப்படும் சக்தியைக்கொண்டு தரைய்பொருள்களைத் தயாரிக்கின்றன. அதாவது, ஒளிச் சக்திக்குப் பதிலாக

வேதிச்சக்தி, தரப்பொருள் தயாரிக்க உதவுகின்றது. இத்தகைய பாக்டீரியா பின்வரும் வகைகளைச் சார்ந்தவை ; மண்ணில் தனித்து வாழும்.

(1) சுதேரஜன நிலநிறுத்தும் பாக்டீரியா (nitrogen fixing, free living). (உ-ம்.) அசோட்டோபேக்டர் (azotobacter) கிளாஸ்டிரியம் (clostridium). இவை மண் துகள்களுக்கு இடையே வசித்துக் கொண்டு வாயுமண்டலத்திலிருந்து சுதேரஜன நிலநிறுத்துகின்றன.

(2) சுதேரிகைபயிற் பாக்டீரியா (nitrifying bacteria) சுதேர-சுதேரேட் ஆக்ஸிகரண அங்ஙன சுதேரிகைபயிற் பாக்டீரியா) நிகழ்த்துள்ள அம்மோனிய கூட்டும் பொருள்களைச் சில பாக்டீரியா (உ-ம்.) சுதேரோனோமாரும் ஆக்ஸிகரணத்தின் மூலம் சுதேரேட்டுகளாக மாற்றுகின்றன. இத்த சுதேரேட்டுகளை வேறு சில பாக்டீரியா (உ-ம்.) சுதேரோபாக்டர் (nitrifier) சுதேரேட்டுகளாக ஆக்ஸிகரணத்தின்மூலம் மாற்றுகின்றன.

(3) டி-சுதேரிகைபயிற் பாக்டீரியா (de nitrifying bacteria-குறைக்கும் பாக்டீரியா) : இவை மேற்கூறிய நிகழ்ச்சிக்கு நேர் மாறாக சுதேரேட்டுகளை சுதேரேட்டுகளாகவும், சுதேரேட்டுகளை அம்மோனியா அங்ஙன சுதேரஜனாகக் குறைக்கும் பாக்டீரியா ஆகும். (உ-ம்.) டி-சுதேரிகைபயிற் (B. denitrificans). மேற்கூறிய நிகழ்ச்சிகள் வாயும் சுதேரஜன் சுழற்சியின் (nitrogen cycle) பல அம்சங்களாகும்.

(4) சுத்த பாக்டீரியா (sulphur bacteria) : சுத்தம் மிகுந்த நீர்நிலைகளில் இவை மிகுதியாகக் காணப்படும் (உ-ம்.) பெக்டியடோவா (Beggiatoa), தியோத்ரிக்ஸ் (Thiothrix). இத்தப் பெரின்கள் உதையால் சூழப்பட்டு (sheathed) இழைபோன்ற (ஆஸ்கிலடோரியாபோன்ற—like oscillatoria), உடலத்தைக் கொண்ட இழை பாக்டீரியாவாகும் (filamentous bacteria). இவை நீரிலுள்ள சுதேரஜன் சங்கை (hydrogen sulphide) ஆக்ஸிகரணத்தின் மூலம் சுத்தமாக மாற்றும், இத்த சுத்த நுண்மணிகள் (granules) அத்த பாக்டீரியாவின் உடலத்திலுள்ள காணப்படுகின்றன.

(5) அய (இரும்பு) பாக்டீரியா (iron bacteria) : இவை நெய்திலிருந்து அசைவற்ற நீரில் பழுப்பு வர்ண நீரில் காணப்படும் (உ-ம்.) லெப்தோத்ரிக்ஸ் (Leptothrix), லெப்தோத்ரிக்ஸ்

(Cladotrix), கிரீனோத்ரிக்ஸ் (Crenothrix), இவை அயச (ferrous) கூட்டுப் பொருள்களை ஆக்ஸிகரணத்தின்மூலம் அயச (ferric) கூட்டுப் பொருள்களாக மாற்றும். பன்கொடி ஆண்டுக்குமூன்று வரந்த அய பாக்கிரியாவே உலகிலுள்ள இரும்புப் படிமக் கலுக்குக் காரணமென்று புவிப்பயல் வல்லுநர்கள் கருதுகின்றனர்.

ஒளிச்சேர்க்கை பாக்கிரியா : பெரும்பகுதிகளில் வாரும் சில பாக்கிரியா (உ-ம்.) குரோமோஷியம் (Chromatium), ரோடோஸ்பிரிலியம் (Rhodospirillum), சில பாக்கிரியா ஒள்கித பச்சை நிறமிவை உடலில் கொண்டுள்ளன. இத் நிறமி, பகத்தாவரங்களில் உண்டான பச்சைபத்தினின்றும் சிறிதே வேறுபட்டிருத்தலால் அத் நிறமிவை பாக்கிரியோ பச்சைபம் (bacterio-chlorophyll) என்று வழங்குகின்றனர். மற்றும் இத் நிறமி பசுங்கணிகள்களுக்குள் அமைவாயல் பசுநிலப் பானியில் உண்ணுபோல் சவ்வால் குழப்படாத மெல்லிய அடுக்குகளில் (lamellae) அமைந்துள்ளது. இது ஒளிச் சக்தியைக் கிரமித்து, அதன்மூலம் ஹைட்ரஜன் சவ்வாடை (hydrogen sulphide) ஆக்ஸிகரணம் செய்து, கத்த கத்த வெளிப் படுத்துகிறது. [அதாவது பகத்தாவரங்களின் ஒளிச்சேர்க்கையின் போது ஆக்ஸிஜன் வெளியேற்றப்படுகிறது, அதற்குப் பதிலாக இங்குக் கத்தகம்தான் (sulphur) வெளிப் படுகிறது.]

பாக்கிரியா உலகில் தோன்றிய முதலுயிர்களாக இருக்கலா மென்று பல அறிவியல் அறிஞர்கள் நினைக்கின்றனர். இதற்குக் காரணங்கள் : 1. பாக்கிரியாவின் உடலில் ஒரே செல்லினால் ஆன எளிய அமைப்பைக் (prokaryotic) கொண்டது ; 2. பச்சைபம் அற்ற நிலையில் ஒளிச்சேர்க்கை இல்லாமையால் அனாக்சைப் பொருள்களை ஆக்ஸிகரணம் செய்து அதன்மூலம் வெளிப்படும் சக்தியைக் கொண்டு தரசப் பொருள்களைத் தயாரிக்கவல்ல பாக்கிரியாவே முதன் முதலில் தோன்றிய உயிரினமாக இருத் திருக்க வேண்டும் ; 3. பாக்கிரியா இன்றி, முதன் முதலில் வேறு எந்த உயிர்கள் தோன்றியிருப்பினும், அவை இரத்த பின்னர், உடன்கதைச் சிதைவுறச் செய்ய இயலாமற்போயிருக்கும்.

பாக்கிரியங்களின் வகைப்பாடு (Classification of Bacteria)

பெர்க்மியின் மானுஷுவல் (Bergey's Manual) என்ற புத்தகத்தின்படி பாக்கிரியங்களை அதாவது ஷைமோமைஸீட்டுகளை (Schizomycetes) 10 துறைகளாக (Order) வகுத்து உள்ளார்,

குறகு 1. : ஸுடோமோனாடேலில் (*Pseudomonadales*) செல்கள் மூட்டை வடிவம் கொண்டோ அல்லது நேராகவோ அல்லது சற்று வளைந்த கோல் போன்றோ காணப்படும். சில பேரினங்கள் கசை இழைகளின் மூலம் அசையும் தன்மை பெற்றவை. இவைகளில் என்டோஸ்போர்கள் (*endospore*) காணப்படா. இவை ஒட்டுண்ணிகள் பல தாவர நோய்களை நோத்தறவிக் கின்றன. (உ.-ம்.) ஸுடோமோனாஸ் (*Pseudomonas*), ஸாந்தோ மோனாஸ் (*xanthomonas*).

குறகு 2. : கிளாமிடோபாக்டீரியேலில் (*Chlamydo bacteriales*) இவை பசுநீய வண்ண ஆங்காக்களைப் போன்று இழை போன்ற பல செல்லுறுக்கோய்களைக் கொண்ட பாக்க்டீரியாக்கள் இழை உறுப்புடன் காணப்படுவன. (உ.-ம்.) லெப்டோத்ரிக்ஸ் (*Lepthothrix*), கிரீனோத்ரிக்ஸ் (*crenothrix*), கிளாடோத்ரிக்ஸ் (*cladothrix*).

குறகு 3. : ஹைபோமைக்ரோஸ்பிரேலில் (*Hypomicrobiales*) செல்கள் உருவியாக அல்லது வளைந்து அல்லது நேராக அல்லது திருகு கோல்களாக காணப்படலாம். மொட்டு விடுதலின் மூலம் மிகுதியாக இனப்பெருக்கம் தடைபெறும். செல்கள் நிறமாக (*aggregate*) சில பேரினங்கள் கிரன்டேஷியாவின் (*crustacea*) மேல் ஒட்டுண்ணிகளாக வாழ்கின்றன.

குறகு 4. : யூபாக்டீரியேலில் (*Eubacteriales*) கோள அல்லது நேர் கோளவடிவம் கொண்டவை. கசை இழைகளைக் கொண்டு இயங்கும் தன்மைமுடையது. பல நோய்களை உண்டாக்கும் ஒட்டுண்ணிகளாகவும் சாகுண்ணிகளாகவும் வாழ்கின்றன. (உ.-ம்.) ஸ்ட்ரெப்டோகாகஸ் (*Streptococcus*), ஸ்டாபிலோகாகஸ் (*Staphylococcus*), அகிரோபாக்டீரியம் (*Agrobacterium*), எர் வீனியா (*Erveinia*), கொரினியெக்டீரியம் (*Coryne Bacterium*) ரைசோபியம் (*Rhizobium*).

குறகு 5. : ஆக்டினோமைசிடேலில் (*Actinomycetales*) இப் பேக்டீரியங்கள் வளைந்த ஹைபா போன்று மெல்லிய இழை களாலானது. இவைகளிலிருந்து சக்திவித் தொடரிக் கொளிக் வர்கள் நோன்றுகின்றன. இதனால் இந்த பாக்க்டீரியங்கள் பூஞ்சை களானிகள் போன்று நோன்றுகிறது. இவை தரை மண்ணில் மிகுதியாகக் காணப்படுவன. (உ.-ம்.) மைக்ரோபேக்டீரியம் (*Mycobacterium*), ஸ்ட்ரெப்டோமைசஸ் (*Streptomyces*), ஆக்டினோமைசஸ் (*Actinomyces*).

குற 6. : பெக்ஸிடோமோலிஸ் (Beggiastiales) இப்பேக்கிரியங்கள் பெரிய செல்களைக் கொண்டு ஊடகரக்கோம்களாக காணப்படும். சுத்தக் மணிகள் (Sulphur granules) செல்களின் மேற்பரப்பில் காணப்படுகின்றன. செல்கள் அசைத்தாடியும், உருண்டோடியும், அல்லது நழுவிச் செல்லும் (oscillating, rolling, gliding) இயக்கம் பெற்றவை. பசுநீர் ஆக்சிசன்கள் போன்று சுருக்கதிர்ச்சியும் (jerky movement) பெற்றவை. பின்னே ஜெக்ஸாக்கள் கிடைவா. (உ-ம்.) பெக்ஸிடோவா (Beggiastova), தியோதிரிக்ஸ் (Thiothrix).

குற 7. : கேரியோபெனோலிஸ் (Caryophanales) இவை நிரு கமைப்பு, அல்லது கோணமைப்பு பெற்ற ஊடகரக்கோம்களாகவே காணப்படும். மண்ணிலும், பூச்சி, விவந்துகளின் குடல் உறுப்பு களிலும் காணப்படும்.

குற 8. : மிக்ஸோபேக்மரியோலிஸ் (Mycobacteriales) செல்கள் வளைக்கூடியனவாகவும், இரு முனைகளும் படரும் தன்மையும் பெற்றவை. இந்த செல்கள் பொதுவாக பசைபுடல் (Slime) சேர்த்து இயங்குகின்றன. கூட்டுவிரிகளின் ஓய்வு பெற்ற செல் களிலிருந்து பளவடைக்கப்பட்ட பெரிய களி உடமைகள் தோன்று கின்றன.

குற 9. : ஸ்பைரோசிடேலிஸ் (Spirochaetales) செல்கள் நிரண்டு பெருத்த அல்லது சிறுத்த நிரகு அமைப்பு பெற்ற நீத்தும் தன்மை பெற்றவை. கசை இழைகளும் கொண்டவை. (உ-ம்.) டிரைப்ஸோனீமா (Treponema), ஸ்பைரோசிட் (Spirochaete).

குற 10. : மைகோபிளாஸ்மோலிஸ் (Mycoplasmatales) இயக்கமற்றவை. பல உருவங்களில் காணப்படுகின்றன. இவை மிகவும் தொய்மை (delicate) வாய்ந்தவை. வைரஸ்களைப்போல வடித்தம் செய்து (filterable) திரிக்கக்கூடிய நீர்ை பெற்றவை. (உ-ம்.) ரிக்கெட்ஸியா (Rickettsia), மைகோபிளாஸ்மா (Mycoplasma).

பாக்கிரியங்களின் பாலினப் பெருக்கம்

1946 ஆம் ஆண்டில் பாக்கிரியங்களிலும் பாலினப் பெருக்கம் நடைபெறுகிறதென்று கண்டுபிடிக்கப்பட்டது. இதை மரபுவழி இணக்கவாப்பு (genetic recombination) என்று

அனழத்தாரர்கள். பாக்டீரியங்களில் மூன்று செல்வெழுன மரபுவழி இடைக்களப்பு முறைகள் உள்ளன. இதன் மூலம் புதிய மரபுவழி இடைக்களப்புகள் குரோமோமோன்களில் எழலாம்.

1. இணைப்பு (Conjugation)
2. மரபு இயல் மாற்றம் (Transformation)
3. டிரான்ஸ்டக்ஷன் (Transduction)

இம் மூன்று முறைகளிலும் பொதுவாக சிப்ட்கண்ட பொது பண்புகள் இருக்கின்றன.

(1) மூன்று முறைகளிலும் ஒரு அளிக்கும் செல்தரம் (Donor) ஒரு ஏற்றம் (recipient) செல்தரம் உண்டு. அளிக்கும், செல்வாணது மரபுவழி பொருள்களை எடுத்துவெறுது. மற்றொன்று அதை ஏற்கின்றது. இதற்கு ஏற்கும் பாக்டீரியம் (Recipient bacterium) என்று பெயர்.

(2) மரபுவழி பொருள்கள் ஏற்கும் பாக்டீரியத்திற்கு அப் பொருள்களை அளிக்கும் செல்வாணது அவைகளை முழுமைவாக அளிப்பதினும்.

மரபுவழி இடைக்களப்புகள்

1. இணைப்பு முறை (Conjugation process)

லெடர்பர்க் (Lederberg), டாட்டும் (Tatum) என்பவர்கள் முதன்முதலில் என்சீஷியா கோலி (Escherichia coli) என்ற பாக்டீரியத்தில் கண்டுபிடித்தார்கள். 1958-ம் ஆண்டு இந்த ஆராய்ச்சிக்காக இவர்களுக்கும், பீடில் (Beadle) என்பவருக்கும் நோபெல் பரிசு (Nobel prize) வழங்கப்பட்டது. அவர்கள் சில பாக்டீரியத்தின் இணைப்பு முறையை 1946-ம் ஆண்டே கண்டு பிடித்தார்கள்.

என்சீஷியா கோலி என்ற பாக்டீரியத்தில், சுமார் 100 இலட்சம் பாக்டீரியங்களை நாம் ஆராய்த்தால் இணைப்பு முறை பானின்பெருக்கமாவது ஏதோ ஒன்றில்தான் இயற்கைவாச தடைபெறுகிறது. இரண்டு செல்கள் தோராயமாக வந்து இணைப்பு ஏற்படுகின்றது. இணையும் செல்களில் ஒன்று பெரியதாகவும், ஒன்று சிறியதாகவும் இருந்தன. இதனால் பரிமாற்றமானது ஒரு பானின்பெருக்க முறை என்று நினைக்க முடிந்தது. மரபு வழி பொருள்கள் (genetic factors) அல்லது ஜீன்கள் ஒன்றன்மீது ஒன்றாக ஒரே கோட்டில் (linear order) அடுக்கப்பட்டிருந்தன. இந்த பாக்டீரியத்தில் இணையும் முறையும் இரண்டு விதமாக இருந்தது ஹேய்ஸ் (Hayes) என்பவர் பாக்டீரியங்களில்

எபிசோம் (episome) என்ற பாக்டீரியா. இது டோனர் அல்லது அனிக்ரம் செல்வினுள்ளது. இது ஆண் செல்களைச் செயல்படுத்துகிறது. இதனும் இதற்கு ஆண்பால் ஆக்கக் கூறு (Male determining factor) என்ற பெயர் வந்தது. எம்சுரீஷியா கோலி என்ற பாக்டீரியத்தில் சில வகை அம்சங்களில் (strains) எபிசோம் ஆனது குரோமோசோமில் ஒருபுறமாக அமைந்துள்ளது. இது ஜீன் பரிமாற்றத்தில் பங்கு கொண்டு அதை அறிவிக்கச் செய்கிறது. தென்றும் கண்டுபிடித்துள்ளார்கள்.

இணைப்பானது (conjugation) இயற்கை முறையிலும் செயற்கை முறையிலும் தடைபெறும் போழுது செல்களுக்கு இடையே ஒரு செல்லிய இணைப் போன்ற இணைவுபாணம் (protoplasmic bridge) இருக்கிறதென்றும் கண்டுபிடிக்கப்பட்டுள்ளது. ஆண்பால் அல்லது டோனர் பாக்டீரியத்தை F+ என்றும், ஏற்கும் (recipient) பாக்டீரியத்தை F- என்றும் குறிக்கப்பட்டுள்ளது. ஜாகப், வோக்மான் (Jacob, Wollman) என்பவர்கள் சாதாரண டுண்டெனோக்ஸிபீனேயே பாக்டீரியங்களில் இணைப்பு திணைக்க காட்டினார்கள்.

டோனர் குரோமோசோமிலுள்ள ஒன்றன்பிற ஒன்றாக அமைந்த ஜீன்களை பெண் செல் அல்லது ஏற்கும் செல்லுக்குக் கடத்தப்படுகின்றது. செயற்கை வளர்தளங்களில் வேறுபட்ட கால அசைவுகளில் இவையகளை வளர்த்து பரிசோதித்தால் குரோமோசோம்களில் எந்த ஆக்கக் கூறுகள் (genes) ஏற்கும் செல்லுக்கு செலுத்தப்படுகிறதென்று அறிந்து, இதன் மூலம் தாம் குரோமோசோம்களின் வரைபடத்தை (Chromosome map) அமைக்கலாம்.

3. மாறு இயல் மாற்ற முறை (Transformation)

இம் முறையை 1927-ம் ஆண்டு கிரீஃபித் (Griffith) என்பவர் டிப்ளோகாக்கஸ் நிமோனியே (Diplococcus pneumoniae) அல்லது நிமோகாக்கஸ் (Pneumococcus) என்ற நிமோனியா நோயை விளைவிக்கும் பாக்டீரியத்தில் கண்டுபிடித்தார். இதில் ஒருவகை அம்சமானது (strain) பாலிசாக்கரைடுகளால் (Polysaccharide) ஆன மிகுதுவான காப்பிழல் கொண்டது (Capsule). இது நச்சுத் தன்மை மிக்க (Virulent strain) வகையாகும். மற்றொரு வகையானது கரகரப்பான கவர் கொண்டது. இதற்கு காப்பிழல் இடையாது. இதில் நச்சுத்தன்மை மிகக் குறைவாகவே இருந்தது. (Mild non-virulent) நச்சுத் தன்மையுடையதை சோதனைக்காக வளர்க்கப்பட்ட எலிகளில் ஊடுபின் மூலம் ஏற்றினால்

அவை இறந்தன. ஆனால், நச்சுத்தன்மையற்றதை ஏற்றினால் அவை இறக்கவில்லை. மற்ருெரு சொதனைகில் நச்சுத்தன்மையற்ற வகை ஷுடன் செல்பத்தாகில் கொல்லப்பட்ட காப்ச்யூல் உடைய இறந்த பாக்கிரியங்கலையும் கலத்து எலிசலில் ஏற்றியபோது அவை இறந்து விட்டன. இறந்த எலிசலில் குறுதியை ஆராய்த்த போது அதில் அதிக அளவு காப்ச்யூல் கொண்ட நச்சுத்தன்மை மிக்க நிமோகாக்சஸ் வகை பாக்கிரியங்கள் இருத்தன. இதில் நச்சுத்தன்மைக்கு காரணமான ஜீன்கள், நச்சுத்தன்மை குறை வாகவுள்ள ஜீன்களுடன் பரிமாற்றமடைந்தன.

1944-ம் ஆண்டு எவெரி, மெக்லட், மெக்கார்தி (Every, Mcleod, Macarthy) என்பவர்கள் செயற்கை வளர் தன்ம்கலை (Culture) ஆராய்த்து, இவ்வாறு ஜீன் பரிமாற்றத்தின் ஈடுபடும் மரபுவழி காரணி DNA என்று கண்டு பிடித்துள்ளார்கள். இது DNA கரைசலில் கலத்துள்ளது. மேலும் இம்முறையில் மெக்லன் இணைவது இல்லை. இவ்வாறு DNA-வை ஈர்த்துக் கொள்ளும் தன்மையானது பாக்கிரியத்தின் செல்கவர் தன்மையைப் பொறுத்துள்ளது. மேலும் இம்முறையின் மூலம் நூக்லியல் அமிலங்களின் (Nucleic acid) மூலமே மரபுவழி இடைக்கலப்புகள் பரவின. ஆனால், புரதத்தின் மூலம் அல்ல என்று நிரூபிக்கப் பட்டது. இவ்வாறு ஒரு பாக்கிரிய வகையின் மரபுவழி பொருளை மற்ருெரு வகை பாக்கிரியத்தின் மரபு பொருளோடு, செல் கவரின் மூலம் ஈர்த்துக் கொள்ளப்படும் தன்மையையே மரபுவழி மாற்றுமுறை தத்துவம் (Transforming principle) என்று அழைக்கப்படுகின்றது.

3. டிரான்ஸ்டக்ஷன் முறை (Transduction)

இது பாக்கிரியாஃபேஜின் மூலம் (Bacteriophage) ஒரு பாக்கிரியா செல்கிலுள்ள மரபுவழி காரணிகலை மற்ருெரு பாக்கிரிய செல்கிலிருக் கடத்தும் முறையாகும். இதில் DNA ஆனது அளிக்கும் (Donor) செல்கிலிருந்து ஏற்கும் (Recipient) செல்கிலிருக் ஒரு ஃபேஜின் (Phage) மூலமாக கடத்தப்படும் (DNA, ஃபேஜின் உறையால் மூடப்பட்டு) தன்மையாகும். ஆனால், மரபுவழி மாற்ற முறையில் (Transformation) நேரடியாக DNA கரைசலிலிருந்து ஈர்த்துக் கொள்ளப்படுகின்றது. கிராம் பாஸிடிவ் (Gram-positive) கிராம் நெகடிவ் (Gram-negative) பாக்கிரியங்களுக்கு ஃபேஜிகள் (Phages) உள்ளன. இவைகளின் மூலமாக டிரான்ஸ்டக்ஷன் நடைபெறுகிறது. வைரஸ்களின் (Virus) மூலமாக பாக்கிரிய ஜீன்கள் கடத்தப் படுவதற்கு அளிக்கும், ஏற்கும் பாக்கிரிய செல்கள் தேவை ஆகவே,

டிசான்ஸ்டக்ஷன் ஐந்து படிகளில் நடைபெறுகிறது. 1. வைரஸ், பாக்டீரியத்தை தொத்துதல், 2. அனிக்டம் பாக்டீரியத்திலுள் பாக்டீரிய DNA வைரஸ்களில் உட்புறதல், 3. அனிக்டம் பாக்டீரியம் வெடித்து DNA-வை கொண்ட வைரஸ்கள் வெளியேறுதல், 4. வைரஸ் ஏற்கும் பாக்டீரியத்தை தொத்துதல், 5. வைரஸ் பாக்டீரிய DNA-வை ஏற்கும் பாக்டீரிய குரோமோசோமில் செலுத்துதல்.

மேற்கூறிய மூன்று முறைகளில் (Conjugation Transfor mation and Transduction) பானினப் பெருக்கம் பாக்டீரியங்களில் நடைபெறுகிறது.

பாக்டீரியங்களில் பானினத் தன்மை (Sexuality in Bacteria)

ஹேய்ஸ் (Hayes) என்பவர் பாக்டீரியங்களில் 'F' என்ற ஒரு காரணி இருப்பதாகக் கண்டு பிடித்தார். பாக்டீரியங்களில், இக் காரணியைப் பொறுத்து, F+, F- என்ற இரு வகையாகப் பிரிக்கலாம். F+ வகையிலிருந்து F- வகைக்குச் சென்று கின்றது. செயற்கை வளர்தளத்தில் உருவாக்கப்பட்ட F+ வகையில் சில பாக்டீரியங்களில் 'F' காரணியானது, குரோமோசோமில் தானாகவே நுழைந்துள்ளது. இவை களுக்கு HFR (High Frequency Recombination) பாக்டீரியங்கள் என்று பெயர். இவைகளில் இருப்பே தீய்களில் மாற்றத்திற்கு F+, F- கலப்பில் காரணமாகின்றது. இது இணைப்பில் போது கடைசியில் நுழைகிறது. இது குரோமோ சோமம் மாற்றத்தின்போது எதிர் செக்ஸ் அக்டைப்களேண்டு மென்றால் இணைப்பின் கால அளவு கூடிய அளவு நீட்டியடைத் திருக்க வேண்டும். அப்போது மூல குரோமோசோமும் உச்சே ளர்த்துக் கொண்டிருக்கும்.

சில பாக்டீரியங்களில் எபிஸோம் (Episome) என்ற ஒரு உறுப் புள்ளது. இது குரோமோசோமம் வகையத்தோடு இணைந்து சில பாக்டீரியங்களில் காணப்படுகின்றது. இதற்கு HFR பாக்டீரியம் என்று பெயர். சிலவற்றில் இடம் விட்டு அமைந்துள்ளது. எபிஸோமில் இருப்பையும், இக்காரணமையையும் பொறுத்து பாக்டீரியங்களில் பானினத் தன்மை தீர்ணயிக்கப்படுகின்றது.

விரைஸ் காய்சர் (Citrus canker)

இது பாக்டீரியாவாகக் கிளைக்கப்படும் ஒரு நோய். இத் நோயானது எலுமிச்சை, மிச்சிளி வகைத் தாவரங்களைப் பாதித் தின்றது. சீத்கண்ட பாக்டீரியம் இந்நோய்க்கு காரணமாகின்றது.

அவை க்சாந்தோமோனஸ் ஸிட்ஸர (Xanthomonas Citri-Hassk. Dowson) இத் தோய் எடுக்கெவ்வாம் எதுமிச்சை, கிச்சிவி வகை தாவரங்கள் புகிரிடப்படுகின்றதோ. அந்நாடு கவினெக்வாயம் காணப்படுகின்றது. முக்கியமாக இத்தீபா, சிஞ், ஜப்பான், ஐரவா, கிமினாரிடா, கலிபோர்னியா முதலிய நாடுகளில் இத் தோயானது வெகு கடுமையாகப் பரவிபுகின்றது. இத் தோய் தென்மேற்கு ஆசிய கண்டங்களில் முதன் முதலில் தோன்றியதாக உறப்படுகின்றது.

இத்தோய் மாக்ஹீயானின் அமைப்பு

இவை குட்டையான கோல்வடிவம் கொண்டவை. 1-5-3μ நீளமும், 0-5-1-5μ அகலமும் கொண்டவை. ஒரு காப்பிலுலாக் (Capsule) சூழப்பட்டது. இது ஒரு காத்நுவாழ் உயிர், அகர்மீடியத்தில் இது கிராம் நெகடிவ் (Gram-negative), மஞ்சள் நிறமான கூட்டமைவாக காணப்படுகின்றது.

தோளவத் தோற்றங்களிலும் முறை

இவை இலை துளைவழியாகவும் (Stomata) தாவரகாயங்களின் வழியாகவும் புகுகின்றன. இவை செல் இடைவெளிகளில் பரவி, ஆதாரத் தாவரத்தின் புதனியை அடைகின்றது. ஆதார தாவரத்தில் தட்ப பதனம் (moisture) டடித்து, வெப்பநிலை யானது. 20°C—25°C இருப்பின் இத்தோய் தோற்றுவதற்கு ஏதுவாக உள்ளது. மேலும் வெப்பநிலையானது மீதமாகவும், கரமூள்ள காத்நுடைய சூழ்நிலை கொண்டும் இருக்க வேண்டும். காத்நு, மழை, இலைத்துளிப்பான் பூச்சிகள் முதலியவைகளின் மூலம் இத்தோய் பரவுகின்றது.

தோயின் அறிகுறிகள்

ஆதாரத் தாவரத்தில் நிகழட்டத்தில் மீதுள்ள எவ்வா பாகங்களையும் இத்தோய் தோற்றுகின்றது. பெரும்பாலும் கொம்புகள், இலைகள், கனிகள் பாதிக்கப்படுகின்றன. முதன் முதலில் இலைமீயீது சிறிய நீர் கோத்த, ஒளிபுகுவவான (Translucent) புள்ளிகளாகத் தோன்றுகின்றன. இப் பாக மானது மற்ற பாகங்களைக் காட்டிலும் கரும்பசுமை நிறம் பெற்று, சூலித்த உருப்பெற்றுள்ளது. இப் புள்ளிகள் முதலில் தே பாகத்தில் தான் தோன்றுகின்றன. இப்புள்ளிகளைச் சுற்றி, ஒரு ஒளிவட்டம் (halo) தெரிகின்றது. இது மூலரித்த கறவுப் புண்ணிலும் (lesions) காணப்படுகின்றது. தோய் மூற்ற மூற்ற, புள்ளிகளின் மேற்பரப்பானது வெண்மை நிறம் அல்லது சாய்பல்

நிறத்தைப் பெறுகின்றது. பிறகு, இப்புள்ளிகள் பிளவுறுகின்றன. இதனால் வெளிச் பழுப்பு நிறம் பெற்ற பஞ்சுத் தன்மையுடைய ஒரு தடுத்திரன் வெளிப்படுத்தப்படுகின்றது. இத்திறனானது ஸிமில்லாரியின் (Crater) அமைப்புப் பெற்றுள்ளது. முதிர்ச்சி யடைந்த நூவுப் புண்கள் காரிக் தன்மை பெற்று பழுப்பு அல்லது சிவப்பு நிறமடைகின்றது. புள்ளிகள் பரவுகின்றன.

கொம்புகளில் தோன்றும் நூவுப் புண்கள் இலைகள், கனி களின் மீதுள்ளவை போன்றே இருக்கின்றன. ஆனால் ஒழுங்கற்ற அமைப்பு பெற்றவை. இவற்றில் காக்கர் தன்மையானது மிகுந் துள்ளது. மேலும் புறத்தோலானது மூலதனம் சிதைக்கப் படுகின்றது.

கனிகளின் மீது தோன்றும் காக்கர் அமைப்பும் இலைப்புள்ளி கள் போன்றே உள்ளன. ஆனால், இவை மஞ்சள் நிறமற்றவை. ஸிமில்லாரியின் அமைப்பு நன்றாக அமைந்துள்ளது. பஞ்சு போன்ற காக்கர்பான, ஒழுங்கற்ற பொட்டுகள், சில சமயம் கனிக் இலைத்து படைபோன்ற (Scurvy) அமைப்பைப் பெறுகின்றன.

இந் நோயைத் தடுக்கும் முறைகள்

1. காக்கர் நோயால் பாதிக்கப்பட்ட தாவர பாகங்களை அழித்தல் இவைகளைக் கொழுத்திலிடலாம். ஆப்பிரிக்கா கனிக் போர்னியா முதலிய நாடுகளில் பண்டாயர்கள் மதிப்புள்ள தோட்டங்களை, இந் நோயுற்றதால் அழித்துள்ளார்கள். தாவரங்களை வேருடன் களைந்து நீக்கினார்கள். இதனால் வரும் கால பயிர்கள் இந் நோயிலிருந்து தப்பித்தன.

2. போர்டோ கரைசல் (Bordeaux mixture) கண்ணாம்பு, கத்தக கரைசல் தெளித்தும் இந்நோயைத் தடுக்கலாம். முக்கிய மாக கனிகள் நோன்றாவதற்கு முகம் மூன்று மாதத்தின் தெளித்தால் அதிக அளவு பயனை அளிக்கும்.

விட்ரஸ் ஜாம்பிரி (Citrus jambhiri-Tanaka), ஸிட்ரஸ் ஆரன்டிஃபோலியா கனிக் (Citrus aurantifolia-Swing) முதலிய சிற்றினங்களை இந்நோய் அதிக அளவு பாதித்து சோதம் கிளைகி கின்றது. விட்ரஸ் கலனன்ஸிஸ் (Citrus sinensis) என்ற சிற்றினத்தை இந்நோய் தொற்றாது.

14. வைரஸ்கள்

(Plant Viruses)

மனித நோய்களுக்கும் பூஞ்சைகளும் பாக்டீரியாக்களும் காரணமாகவுள்ளன என்று மூன்று ஆற்றித்தோம். நோய்களை உண்டாக்கும் மற்றொரு வகையான காரணிகள் வைரஸ்கள் (viruses) எனப்படும். உதாரணமாக ஜவதோஷம், இச்சிப்புரு வண்ணா (influenza) அம்மை நோய்கள், இளம்பிள்ளை வாதம், (polio), வெறிதாங்க்கடி (hydrophobia) முதலிய வைரஸ் நோய்கள் மனித இனத்தைப் பாதிக்கின்றன. ரேபீஸ் (rabies—நாய் வெறி), காக் நடைகளின் பாத-வாய் நோய் (fod and mouth disease of cattle) முதலியன விலங்குகளைப் பாதிக்கும் வைரஸ் நோய்களாகும். புகைவினை மொசேயிக் (tobacco mosaic), வெண்ணடை அல்லது தக்காளி மொசேயிக் (bhendi or tomato mosaic), மொச்சை முகடுகள் மொசேயிக் (bean enation mosaic) உருளைக்கிழங்கு வைரஸ் முதலியவை தாவரங்களைப் பாதிக்கும் வைரஸ் நோய்களாகும். சில வைரஸ்கள் பாக்டீரியாக்களையும் (பாக்டீரியோ பேஜ்—bacteriophage), சில பசுநீய்ப் பாக்டீரியையும் (வைரோபேஜ்—cytrophage) மற்றும் சில பூஞ்சைகளையும் தாக்குகின்றன. ஆகவே, வைரஸ்களை, மனித வைரஸ்கள் (human viruses) விலங்கு வைரஸ்கள் (animal viruses), தாவர வைரஸ்கள் (plant viruses), பாக்டீரிய வைரஸ்கள் (bacteria viruses) என்று வகைப்படுத்தலாம்.

வைரஸ்களின் நிறப்புப்பண்புகள்

1. மிக நுண்ணளவை (Ultra microscopic) : இவை ஒளி எயக்ட்ரான்மோஸ்கோப்பின் மூலம் கூடப் பார்க்க முடியாத அளவிற்கு மிக மிக நுண்ணியனவாக உள்ளன. எலெக்ட்ரன் எயக்ட்ரான் மோஸ்கோப்பின் (electron microscopic) மூலம்தான் இவை காணக்கூடியவை. இவை 10—200 மில்லிமைக்ரான் (millimicron) அளவிலேயே உள்ளன. (ஒரு மில்லி எயக்ட்ரான் என்பது ஒரு மில்லி மீட்டரில் 100000 பாகமாகும்.)

ஆகவே, அளவில் இவை உயிரற்ற அக்கன மூலக்கூறின் அளவிற்கும் (அயர் 5—10 மில்லி எயக்ட்ரான்) மிகச் சிறிய

பாக்டீரியத்தின் அளவிதும் (சுமார் 200 மிக்ரீமைட்ரான்) இடையில் அமைந்துள்ளதாம். உயிரற்ற மூலக்கூறுகளையும் நுண் ணுபிரிவினையும் இனிக்கும் பரணமாக இவை கருதப்படுகின்றன.

2. நுண்ணுண் வடிவாட்டியின் மூலம் செல்லக்கூடிய இயல்பு (Filterability) : வைரஸ்கள் மிக நுட்பமாகவுள்ள காரணத்தினால் பாக்டீரியங்கள் புகழுடியவாத வடிவாட்டியின் மூலமும் (bacteria-proof filters) புகுந்து செல்லக்கூடிய தன்மையைப் பெற்றுள்ளன. இந்தச் செடுப்புத் தன்மையை ஐன்ஜெக்ஷி (Inoexky) என்பவர் முதன் முதலில் எடுத்துக் காட்டினார். ஆகவே வைரஸ் நோய் களைக் கண்டறிய (diagnosis) இத்தன்மை மிகவும் பரவல் படுகிறது.

3. நிலைமாறு ஒட்டுண்ணித்தன்மை (Obligat parasitism) : வைரஸ்கள் உயிருள்ள செல்களில்தான் (ஆகாரச் செல்) வளர்ந்து பெருக வல்லன (சாறுண்ணியாக வளர இயலாதவை). குழிப் பிட்ட வைரஸ்களைக் குழிப்பிட்ட உயிரினச் செல்களையே தாக்க வல்லது. தாக்கும் இயல்பிக்கு வேறுபடும் இவ்வகைகளை வைரஸின் பண்புட் செலியின்களாக (strains) அறியலாம். மற்றும் உயிருள்ள செல்களுடன் தொடர்பு கொண்டாக், அதனுட் புகுந்து, பெருகி நோயை உண்டாக்க வல்லன. இவ்விதமாக நோய் தொற்றிப் பரவச் செய்க்கூடிய ஆற்றல் (infective capacity) வைரஸ் களுக்கு உண்டு என்பதை பெஜ்னிக் (Beijerinck) என்பவர் எடுத்துரைத்தார்.

4. வேதித் தன்மை (Chemical nature): வைரஸ்கள் வாயும் நூக்கியோ-புரோட்டினும் (nucleoprotein) ஆனவை. அதாவது, ஒவ்வொரு வைரஸ் கூறும் நூக்கிய அமிலத்தாக் (nucleic acid) ஆன மத்திய பாகத்தையும், அதைச் சுற்றி புரத்ததாக் ஆன உறைவும் (protein coat) கொண்டுள்ளது. இந்த நூக்கியல் அமிலம் பொதுவாக தாவர வைரஸ்களில் ரைபோ நூக்கிய அமில வகையைச் (ribo-nucleic acid—RNA) சார்ந்தும், பாக்டீரிய, விலங்கு, மனித வைரஸ்களில் டி ஆக்ஸி ரைபோ நூக்கிய அமில (deoxyribo-nucleic acid—DNA) வகையைச் சார்ந்தும் உள்ளன.

மேற் கூறப்பட்ட உயிரிய அம்சங்கள் (characteristics of living organisms) பண்பற்றினைக் கொண்டிருந்த போதிலும் வைரஸ்கள் சவாசித்தல் அற்ற தன்மையிலும் (do not respire) படிமமாக்கப்படும் (can be crystallised) இயல்பிலும் உயிரற்ற மூலக்கூறுகள் போல் உள்ளன.

தாவர வயரங்கள், தாவரங்களைத் தாக்கும்போது குறிப்பிட்ட நோய் அறிகுறிகளையே உண்டாக்குவதால், அவ்வயரவின் தன்மையை அறிகுறிகளிலிருந்து கண்டறிய இயலும். அம் அறிகுறிகளாவன :

1. பச்சைய சோகை (Chlorosis) : வயரம் தாக்குதலின் விளைவாகப் பச்சைகளில்க்கள் பாதிக்கப்படுவதனும் பச்சையம் குறைத்து சோகைத்தன்மை தோன்றுவதும். இது இரு வகைப்படும்.

(a) மஞ்சள் தன்மை (Yellowing) : சோகைத் தன்மை இலைகள் முழுமையிலும் சீராகக் காணப்படுவதால் பாதிக்கப்பட்ட இலைகள் முழுமையும் மஞ்சள் நிறத்துடன் காணப்படும். (உ-ம்.) பீச் மஞ்சள் தன்மை (Peach yellow), சர்க்கரை பீட் மஞ்சள் தன்மை (Sugar beet yellow).

(b) மோசைமிக் தன்மை (Mosaic) : இலைகளில் சோகைத் தன்மை சீராக அமையாமல், ஆங்காங்கே திட்டுகளாகக் காணப்படும். பாதிக்கப்பட்ட இலைகளில் பச்சை, வெள்ளிறிய பச்சை, மஞ்சள் ஆகிய மூன்று வண்ணப் பாகங்கள் (variegated) பண்பிதல் களில் அமைந்துள்ளன. இத்தச் சின்னத்திற்கு மோசைமிக் (mosaic) என்று பெயர். (உ-ம்.) புகையிலை மோசைமிக் (Tobacco mosaic), வெண்ண. மோசைமிக் (Bbendi mosaic).

2. நிக் கொல்லம் (Necrosis) : பாதிக்கப்பட்ட நிக்கள் மடித்து மழுப்பு வண்ணத்துடன் புறத்தே காணப்படும். (உ-ம்.) உருமிசு பிழங்கு X-வயரம்.

3. புறப்பாண வளர்ச்சி (Abnormal over growth) : பாதிக்கப் பட்ட நிக்கள் வரம்பின்மீறிய பாகுபாடடைத்து பெரிதாகி, கரணிகள் (galls) அல்லது முக்குகை (ridges) உண்டாக்குகின்றன. (உ-ம்.) உரும்பின் பிழி நோய் (Fiji disease of sugarcane), வெங்காயின் முக்கு மோசைமிக் (Bean enation mosaic).

4. தாமப்பீட, குறுமே வளர்ச்சி (stunting), மடைத்துத் தன்மை (sterility) : ஆதாரத் தாவரம் குறுமியும் (stunting) உருங்கிச் சுருண்ட இலைகளுடன் காணப்படுவது. எள்ளின் மலர் பாகங்கள் இலையோன் மாறுதல் (Sesamum phyllody).

5. ஒளிர்தல் : சில தாவரங்களில் புறத்தே சின்னங்கள் ஏதும் காணப்படாவிடினும் புற னதாக்கி ஒளிரலின் (Ultra violet ray) அடியில் பாதிக்கப்பட்ட பாகங்கள் ஒளிர்வதனும் அறிவ வாகம் (fluorescence).

6. உள்னடக்கப் பொருள் (Inclusion bodies) தோற்றம் : பாதிக்கப்பட்ட செல்லில் சில படிவப் போன்ற அனைய அயிர் போன்ற உறுதிகள் தோன்றுகின்றன. இவை X-கறுகள் (X-bodies) என்று அழைக்கப்படுகின்றன. செல்லின் புரோட்டோ பிளாஸ்டுக்கும் வைரஸுக்கும் இடையே நிகழும் வேதிய மாறுதல்களிலும் இவை தோன்றுகின்றன.

வைரஸ் பரவுக் விதம் (Transmission of viruses) : தாவர வைரஸ்கள் சித்ச் குறிக்கப்பட்ட முறைகளில் பரவுகின்றன.

1. ஒட்டுதல் மூலம் பரவுதல் : ஒட்டுச் சேர்க்கையில் மூலம் வைரஸ் உள்ள பாகத்திலிருந்து நோயற்ற பாகத்திற்குப் பன வைரஸ்கள் பரவுகின்றன.

2. ஒடுதண்டு, உறிஞ்சுதலுப்புகள் மூலம் பரவுதல் : ஸ்ட்ரா பெரியில் (strawberry) ஒடுதண்டு மூலம் (runner), முடிதாளியில் (Cuscuta) உறிஞ்சுதலுப்பு மூலமும் சில வைரஸ்கள் பரவுகின்றன.

3. விதைபிண இனப்பெருக்கப் பாகங்கள் மூலம் பரவுதல் : பாதிக்கப்பட்ட கிழங்கு, குமிழ்தண்டு, அடிமட்டத்தண்டு, நில மட்டத்தண்டு ஆகிய விதைபிண இனப்பெருக்கப் பாகங்களிலிருந்து வளரும் தாவரங்கள் வைரஸ் நோயால் பீடிக்கப்படுகின்றன.

4. உராவ்தல் மூலம் பரவுதல் : நோய்வாய்ப்பட்ட தாவரத்தின் பாகம் அண்மையிலுள்ள நோயற்ற தாவரத்தின் மேல் சிதறு உராவ்த்தாக்கட வைரஸ் பரவ நேரிடுகின்றது (உ.ம்.) புதலாவை வோனெக்க வைரஸ்.

5. உறிஞ்சுதலுக் கொண்ட பூச்சி இனங்கள் மூலம் பரவுதல் (Insect vector) : வைரஸ் பரவுதலுக்குப் பூச்சிகள் மிக முக்கியமான காரணிகளாகும். மஞ்சள் நோய்கள் (yellow), உருளைக் கிழங்கு வைரஸ் (Potato virus), கருப்பு வோனெக்க (viburnum mosaic) முதலிய நோய்களை உறிஞ்சுதலுக் கொண்ட பூச்சி விளங்கள் பரவச் செய்கின்றன. திசுக்களிலிருந்து (சிபினோயம்) ரசத்ததக் குழல் மூலம் உறிஞ்சும்போது அத்த ரசத்தின்மூலம் வைரஸ் பரவ நேரிடுகின்றது.

தவறுபடுத்தல் முறைகள் (Control measures)

1. நோய்வாய்ப்பட்ட தாவரங்களை உடனடியாக அகற்றுதல்.

3. நோயுண்ட தாவரங்களிலிருந்து விதைவிகா இனப் பெருக்கப்பாக்கங்களை அல்லது விதைகளைப் புதிய பயிர்களை உண்டாக்க உபயோகிக்காமல் இருத்தல்.

3. சில வைரஸ்கள் பூச்சிகளால் பரவுவதாகப் பூச்சி கொய்கிகள் மூலம் அவைகளை அழிக்க வேண்டும்.


4. கரும்பு மொசைக்க நோயால் பாதிக்கப்பட்ட பாகைகளைச் சிவமணி நேரம் வெந்நீரில் $50-55^{\circ}$ சென்டிஜிரேடு வைக்கப்பட்டால், அந்த வைரஸ் செயலற்று விடுகிறது.

5. சில வைரஸ் நோய்கள் புற ஊதாக் கதிர்களாலும் (ultra-violet rays) வேதிப் பொருள்களாலும் (chemicals) கட்டுப்படுத்தப்படுகின்றன.

எடுத்துக்காட்டாக, புகையிலைவாத தாக்கும் மொசைக்க வைரஸைப் பற்றிய (Tobacco mosaic virus) சில சிறப்பியல்புகளை இப்போது கவனிப்போம்.

புகையிலை மொசைக்க வைரஸ் (Tobacco Mosaic Virus)

W. N. ஸ்டான்லி என்பவரால் 1935 ஆம் ஆண்டு இம் நோயின் பண்புகள் முதலில் கண்டறியப்பட்டன. இதற்காக



படம் 198

அ. புற அடுக்கம். (Protein Coat)

ஆ. வைரஸ் பிழைக்கான அமிலம் (R.N.A)

இவருக்கு நோயெல் பரிசு கொடுக்கப்பட்டது. 1936 ஆம் ஆண்டு மேயர் (Mayer) என்ற ஜெர்மானியர் பல வண்ண நோய்க்கு

மொஸேயிக் என்ற பெயரிட்டார். இந்த வைரஸ் ஒம்பு தாவரத்திலிருந்து ஒதுக்கப்பட்டால் (isolated) குழல் போன்ற உருவத்தில் காணப்படுகிறது (215 மிக்ரீ ஹெக்ரான் நீளம், 15-18 மிக்ரீ ஹெக்ரான் குறுக்களவு). இந்த வைரஸ் கருள் போன்ற ஆர். என். ஏ. (RNA)-வைக் கொண்டுள்ளது. அதைச் சுற்றிப் புரத உறையைக் கொண்டுள்ளது. இப் புரத உறையின் தோற்றம் வானமுக குளையில் பழங்கள் தெருவி அமைந்திருப்பதை ஒத்திருக்கும்.

தோயின் ஆறிருநிலை : செடிசன் வெளிர் பச்சை நிறமாகவும் சில பாகங்கள் சிறுத்தும் அகவது குச்சிபோல் நீண்டும் காணப்படும். இலைகளில் ஆழ்ந்த பச்சை, துளிர்ப் பச்சை நிறப் பாகங்கள் திட்டுத் திட்டாகக் காணப்படும். இதனும் இந்த தோய்க்கு மொஸேயிக் தோய் என்ற பெயரிடப்பட்டது. புகையிலை உணவில் பல நாடுகளில் பரவிடப்படுவதால் அவைகளில் மொஸேயிக் தோய் ஏற்பட்டால் வருடத்தோறும் கோடிக்கணக்கில் நஷ்டமாகிறது. பாதிக்கப்பட்ட புகையிலையைப் புகை பிடிக்கும் பொருள்கள் செய்ய உபயோகிக்க மாட்டார்கள். மேலும் இத்தோய் புகை பிடிப்போர்கள் மூலம் ஆரோக்கியமான தாவரங்களிலும் பரவுகின்றது. முதன் முதலில் புகையிலைத் தாவர துலியீனாள்ள துளிகள் கருளுகின்றன. பின்னத்க் கொண்களில் திரிந்து பசுமைச் சோகையும் காணப்படும். தோய் மும்முரமாகத் தாக்கும்பொழுது மொஸேயிக் துள்கள் இருத்த இடங்கள் கொப்புளங்கள் போன்று தடித்து மெத்தென்ற தன்மை கொள்ளும். இலைகளின் மற்றப் பாகங்கள் பசுமைச் சோகையைக் காட்டும். செடியின் சிழ்க் கணுக்களில் உண்டான இளனில் பரவலான மஞ்சள் நிறத் திட்டுகள் ஏற்படலாம். இவைகளில் காய்த்துபோன சிறு பாகங்களும் தோன்றுகின்றன. இக்குறிக்கு "நெகிரோஸிஸ்" (necrosis) என்று பெயர்.

வைரஸ், வலிமை குன்றாது பல வருடங்கள்வரை பிழிக்கும். தோய்நிற தாவரக் காழ்மை U19000000 என்ற விதித்திற்கு தன்விருடன் கூத்து இந்த நீர்மத்தை தோய்நிற செடிகளின் மீது தடவியால் தோய் தோன்றுகிறது. 90°C வெப்பத்தினால் வைரஸின் தாக்கும் தன்மை குன்றாமல் காணப்படும். கோடை காலத்தில் சாதுபடி செயல்படும் புகையிலைவில் அதிகமாக மொஸேயிக் தோய் காணப்படுகிறது. புகையிலை வைரஸால் தாக்கப்பட்ட செடி செடிகளில் எக்ஸ் பாகங்கள் (X-bodies) என்ற படிசு வடிவற்ற (amorphous) பொருள்கள் இருக்கின்றன; வரிகளுடன் கூடிய துணுக்குகளும் உண்டு. புகையிலை, கருட்டு, கிகரெட் முதலியவற்றால் வைரஸ் பல இடங்களில் பரவுகின்றது.

தமிழ் முறைகள்

1. நோயுற்ற செடிகளின் பாகங்களை நீக்குதல்.
2. தக்காளி நாற்றுடன் வளருயிட்டுத்திரு வெகு தூரமாக இவைகளைப் பயிரிடுதல் வேண்டும். 3. புகையிலை பயிரிடுவோர் உருளை, வெண்ணரி போன்ற செடிகளைத் தொடவாகாது. 4. கைகளைச் சோம்பி போட்டுக் கழுவுவதால் ஓரளவு வைரஸ் பரவுதலைத் தடுக்கலாம். 5. வைரஸ் நோய் தடுக்கும் ஆற்றலைப் பெற்ற புகையிலைச் செறினங்களைப் பயிரிடல் வேண்டும். 6. நோயுற்ற புகையிலைச் செடிகள் வளர்ந்த நிலத்தை மறுபடியும் புகையிலைச் சாகுபடிக்கு உபயோகிக்கக் கூடாது.

பாக்டீரியோபேஜ் (Bacteriophage)

பாக்டீரியங்களைத் தாக்கும் வைரஸிற்கு பாக்டீரியோபேஜ் என்று பெயர். இவை பொதுவாகத் தலைப்பிரட்டை (Tailpole) வடிவம் கொண்டவை. இவைகளின் தலைப்பாகத்தில் டி.என்.ஏ. (DNA) அதைச் சுற்றிப் புரத உறை இருப்பதை எகக்ட்ரான் நுண்ணோக்கியின்மூலம் கண்டுபிடித்தார்கள்.

பாக்டீரியோபேஜின் அமைப்பு இத்தகுப் படிசம் போன்ற தலைப் பாகம் புரத்ததாலானது. அதனுள்ளே டி.என்.ஏ. இழைகள் இருக்கின்றன. படிச உருவின் மேல் கழுத்துப் பாகம் இருக்கின்றது. அங்கு மெலித்த கழுத்தைச் சுற்றி ஒரு காலர் அமைந்துள்ளது. அதன் மேல் வாலும், வாலின் மேல் தட்டும் அமைந்துள்ளன. வாலின் நுனியில் பேஸல் தட்டு (Basal plate) என்ற பாகம் உள்ளது. அதன் சுற்றுப்புறத்திலிருந்து 6 நாள் போன்ற இழைகள் (tail fibres) தோன்றுகின்றன. ஒவ்வொரு வால் நாலும் ஒரு முடிச்சைக் கொண்டுள்ளது.

எசுசீரிஸ்கா கோலி (Escherichia Coli) என்ற பாக்டீரியத்தை பாக்டீரியோபேஜ் தாக்கி இனப்பெருக்கத்தைச் சாதித்துக் கொள்கிறது. இது 5 நினைகளில் நடைபெறுகிறது.

1. பாக்டீரியோபேஜ் பாக்டீரியத்தைத் தாக்குவதால் தலைப் பிரட்டை வடிவம் கொண்ட பாக்டீரியோபேஜானது முதலில் பாக்டீரிய செல்கவரின்மேல் தனது வால் நாசிகளைப் பினைத்து ஒட்டிக்கொள்கிறது. இந்த இடத்திற்கு ஏற்றும் இடம் (Receptive spot) என்று பெயர். உடனே அந்த பாக்டீரியத்தின் கவர் கரைந்துவிடுகிறது.

2. பேஜின் தலைப்பாகத்தினுள்ளே இருக்கும் டி.என்.ஏ. (DNA) இழை புரத்ததாலான அதன் மேலுறை கழுக்குவதால்

வானின் துவாரத்தில் வழிவாக பாக்கிரியத்தின் உட்புறம் செலுத்தப்படுகிறது. புரத மேலுறை அங்கியோல் வெளித் தங்குகிறது.

3. பேஜின் டி.என்.ஏ. பாக்கிரியத்தினால் புகுத்ததும் அந்த செல்லின் கல காரியங்களைத் தடுத்துவிட்டு பேஜ் அந்த செல்லி தன்மையாக்கிக் கொள்கிறது.

4. பேஜின் டி.என்.ஏ. பாக்கிரியத்திற்குக் கட்டடங் தருவது போல் செயல்பட்டுத் தன்மையமான டி.என்.ஏ.வைத் தோற்றமளிக்கிறது. சில விநாடிகளில் பாக்கிரியத்தின் செல்லினால் ஆயிரக்கணக்கான பேஜ் துகள்கள் புரத உறைவுடன் மூழுத் தலைப் பிரட்டைவடிவம் கொண்டு தோன்றுகின்றன.

5. இவ்வாறு ஆயிரக்கணக்கான வைரஸ் துண்டங்கள் உண்டான பின்னர் பாக்கிரியம் வெடிக்க பேஜ்கள் வெளியேறுகின்றன. மேற்கண்ட முறைகளில் பாக்கிரியோபேஜும் இனப் பெருக்கம் புரிகிறது. இவ்வாறு ஒருமுறை நடைபெறுவதற்குக் கமார் ½ மணி நேரம் ஆகிறது. வெளியேற்றப்பட்ட புதிய பாக்கிரியோபேஜ்கள் ஒவ்வொன்றும் மறுபடியும் புதிய பாக்கிரியங்களைத் தாக்குகின்றது.

பாக்கிரியோபேஜான T₂ என்பது முழு உருவம் பெற்ற தலை, கழுத்து, வால், வால்தார்க்கள் முதலியவை தன்னத்தனியாக அமைக்கப்பட்டுப் பிறகு ஒன்றுசேர்ந்து முழு பாக்கிரியோபேஜாக உருப்பெறுகிறது. இவ்வாறு ஒவ்வொரு பாகமும் அமைக்கப்படுவதற்குப் பல தனிப்பட்ட ஜீன்கள் (genes) காரணமாகின்றன. தலை மட்டும் தோன்றுவதற்குக் கமார் பேஜின் 18 ஜீன்கள் செயல்படுகின்றன என்று கண்டறிந்துள்ளனர்.

வைரஸ்களின் தன்மையையும் பெருக்க முறையையும் நோக்கும்பொழுது இரு பிரதான அம்சங்கள் தெனியாகப் புறப்படுகின்றன.

1. வைரஸின் நூக்கிளிக் அமிலத்தன்மை.

2. ஆதாரச் செல்லின் (host cell) சூழ்நிலையிலிருந்து தன்னைப் போன்றான உறுகளை உருவாக்கவல்ல திறன். ஆதாவது வைரஸ் உறுகள், வைரஸ் அல்லாத (non-virus) செல் புரோட்டோபிளாண்டிலிருந்து தன்னைப்போன்ற புதிய வைரஸ் உறுகளை உண்டாக்க வல்லன.

இப் பண்புகளில் வவரல், மரபு வழியில் (hereditary) அடிப் படை அலகான (basic unit) ஜீனின் (Gene) வேதித் தன்மை வையும், தன்னைத்தானே இரட்டிக்கும் (self-replicatory) திறனையும் ஒத்திருக்கின்றன.

ஆகவே, வவரல்பற்றி மிகுதியாக நடைபெறும் ஆராய்ச்சி கள் பாரம்பரியத்தின் பல பிரச்சினைகளுக்கும், முதலில் உயிர் உயலில் எவ்வாறு தோன்றியது என்ற கேள்விக்கும், வரும் காலத்தில் விவரமில் நீர்வுகாண உதவும் என்பதில் நிரிதும் ஸ்பம் இல்லை.

கலைச்சொற்கள்

A

Absorption	— உறிஞ்சுதல், இரமித்தல்
Acervulus	— ஏலர்வுஸஸ்
Acicular	— ஊசிபோன்ற
Actinomorphy	— ஆரக் சமச்சீர்
Adaptation	— தக அமைவு
Adaxial	— அடாக்ஸியல்
Adventitious	— வேந்தரிடத்து
Aecidiospore	— ஏனிடீபோஸ்போர்
Aerobe	— காற்றுவாழ் உயிர்
Affinity	— உறவு
Agar	— அகார்
Agglutination	— ஒட்டிய இரட்டி
Akinete	— ஏனகலிட்
Alga	— பர்சி
Alternate	— மாறியமைத்த, ஒன்றுவிட்ட
Alternate or secondary	— துணை அல்லது மாற்று ஆதாரத் தாவரம்
Alternation of generations	— சத்ததி மாற்றம்
Alternation, homologous	— உருவம்ஒத்த
Amitosis	— அமைட்டாவிஸ்
Amoeboid	— அமீபா போன்ற
Anaerobe	— காற்றின்றி வாழ் உயிரினம்
Anaerobe facultative	— நிலைமாறும் உயிரினம்
Anaerobe obligate	— நிலைமாறாத உயிரினம்
Analogous	— செயலொத்த
Anisogamy	— அனீசோகமீ
Anther	— மகரத்தப்பை
Antheridium	— ஆந்தரீடியம்
Antherozoid	— ஆந்தரோஸாயிட்
Antibiotic	— துண்ணுயிர் ஒழன்மொருள்
Antioxial (radial)	— ஆரப்போக்கு

Apex	— துணி
Aplanogamete	— ஏப்ளேனோகேமீட்
Aplanospore	— ஏப்ளேனோஸ்போர்
Apothecium	— அபொதினியம்
Apparatus	— கருவி
Appendage	— ஒட்டுபாகம்
Appressorium	— ஒட்டும் தட்டு
Archicarp	— ஆர்க்கிகார்ப்
Arthrospore	— ஆர்த்ரோஸ்போர்
Asocarp	— ஆஸ்கோகார்ப்
Ascogonium	— ஆஸ்கோனியம்
Ascospore	— ஆஸ்கோஸ்போர்
Ascus	— ஆஸ்கஸ்
Aseptate	— தடுப்பற்ற (பூஞ்சை), குறுக்குத் கரைற்ற
Asexual	— பாலினா
Assimilation	— தன்மமயமாதம்
Association	— கூட்டு
Autogamy	— தன்னினக் கலப்பு
Autophyte	— சுயஜீவி
Auto colony	— சுயக் கூட்டமயவு
Auxospore	— ஆக்ஸோஸ்போர்
Axil	— இடைக்கோணம்
Axis	— தண்டு, அச்ச

B

Bacillus	— பேஸிலஸஸ்
Bacteria	— பாக்டீரியா
Bacterium	— பாக்டீரியம் (ஒருமை)
Bacteriology	— பாக்டீரிய இயல்
Bacterial nodule	— பாக்டீரியா மூடிச்சு
Bacteriophage	— பேக்டீரியாபேஜ்
Bark	— பட்டை
Basidium	— பேஸிடியம்
Basidia (pl.)	— பேஸிடியா (பன்மை)
Basidiocarp	— பேஸிடியோகார்ப்
Basidiospore	— பேஸிடியோஸ்போர்
Beak	— அளகு
Biflagellate	— இரு கைசலினைமுகடைய
Binary fission	— இரு சமப்பிசிவு

Blaucleate (also Dikarydic)	— இரு நூக்கலியங்கொண்ட
Biology	— உயிரியல்
Bisexual	— இருபாலவான
Blade	— தாள்
Blepharoplast	— பிளிபெரோபிளாஸ்ட்
Blight	— பிளைட்
Bract	— பூவடிச் சிதல்
Bracteole	— பூக்காம்புச் சிதல்
Branching	— கிளைத்தல்
" dichotomous	— இருசுழம்பக்கக் கிளைத்தல்
" lateral	— பக்கக் கிளைத்தல்
Bud	— மொட்டு
Budding	— மொட்டுவிடல்
Bulb	— குமிழ் தண்டு
Bulbil	— புல்பிக்

C

Callose	— கேலோஸ்
Calyx	— புல்லிவட்டம்
Cambium	— காம்பியம்
Canker	— கேன் கர்
Capsule	— கார்ப்ஸ்யூல்
Capillitium	— கேபிலிடியம்
Carbohydrate	— தரசம்
Carotene	— கரோடின்
Carpel	— குழை நீண்ட
Carpogonium	— கார்ப்போகோனியம்
Carpophore	— கார்ப்போபோர்
Carpospore	— கார்ப்போஸ்போர்
Carrier	— கடத்தி
Cell	— செல்
Cell - division	— செல்பிரிவு
Cell plate	— செல்தட்டு
Cell sap	— செல்சாறு
Cellulose	— செல்லுலோஸ்
Cell wall	— செல் உறை
Chemotroph	— வேதி உயிர்
Chemosynthesis	— வேதிச்சேர்க்கை
Chlorophyll	— பச்சையம்
Chloroplast	— பச்சைகளிசம்

Chlorosis	— பசுமைச் சோகை
Chromatid	— குரோமேடிட்
Chromatin	— குரோமேட்டின்
Chromatin reticulum	— குரோமேட்டின் வலை
Chromoplast	— வண்ணக்கணிகம்
Chromosome	— குரோமோசோம்
Ciliate	— ஸீலியம் கொண்ட
Cilium	— ஸீலியம்
Clamp connection	— கிளாம்பு இணைப்பு
Clavate	— குண்டாத்தடி போன்ற
Climate	— தட்பவெப்ப நிலை
Cluster cups	— திரள் குவளை
Coccus	— சாக்கல்
Coenobium	— ஸிஞ்சுவியம்
Coenocyte	— ஸிஞ்சுனைட்
Colloid	— கொல்லாயிட் (கழ்மம்)
Colony	— கூட்டமையு
Columella	— காதுமெல்லா
Competition	— போட்டி
Component	— கூறு
Compound	— சேர்மம்
Concept	— கருத்து
Conceptacle	— கான்செப்டின்
Conduction	— கடத்தல்
Conidiophore	— கொனீடியோபோர்
Conidiospore	— கொனீடியோஸ்போர்
Conidium	— கொனீடியம்
Conjugation	— இணைப்பு (காந்து-கேஷன்)
Conjugate division	— இணை பகுப்பு
Coprophilous	— சாணத்தில் வளரும்
Corn	— தண்டடிக் கிழங்கு
Corolla	— அல்லிவட்டம்
Cortex	— புறணி
Cotyledon	— வித்திலை
Crossing - over	— குறுக்கு மாற்றம்
Crown gall	— கூர்மிகரணை
Crozier (hook shaped)	— குரோஸீயர் (கொக்கிபோன்ற)
Cryptogams	— பூவாத தாவரம்
Crustose	— வளர் தளம் ஒட்டிய
Culture solution	— ஊட்டக்கரைசல், வளர்ப்புக் கரைசல்

Curvature	— வளைவு
Cuticle	— கூட்டிக்கிள்
Cyst	— கிஸ்ட்
Cystocarp	— கிஸ்டோகார்ப்
Cytokinesis	— புரோட்டோபிளாஸ்ட் (செல்) பிரிதல்
Cytoplasm	— கைட்டோபிளாஸம்
Cytoplasmic strands	— கைட்டோபிளாஸ்டிக் நூல் இழைகள்

D

Daughter cells	— மகன் செவிச் செல்கள்
Defoliation	— இலை உதிர்
Diatomaceous earth	— டயாடம் மண்
Differentiation	— வேறுபாடு அடைதல்
Diffuse	— பரவலான
Dikaryotic	— இரு நூக்கியஸ்கொண்ட
Dioecious	— ஸைகியஸ்
Dumbbells	— டம்பெல்கள்

E

Elaeoplast	— எலையோபிளாஸ்ட்
Embryo	— கரு
Endodermis	— அகத்தோல்
Endogenous	— அகத்தோன்றிய
Endophyte	— அகவாழ் தாவரம்
Endospore	— அக ஸ்போர்
Environment	— சூழ்நிலை
Epibasidium	— எபிபேஸிடியம்
Epidermis	— புறத்தோல்
Epiphyte	— தொற்றுத்தாவரம், ஒட்டுவாழ் தாவரம்
Epiplasm	— எபிபிளாஸம்
Erect (stem)	— நிமிர் (தண்டு)
Evolutionary tendencies	— பரிணாமப் போக்குகள்
Exospore	— புற ஸ்போர்

F

Fats	— கொழுப்புப் பொருள்கள்
Facultative	— நிலைமாறும்
Fermentation	— தொதித்தல்

Fertile	— வனமான இனப்பெருக்கத் தன்மையுடைய
Fertilization	— கருவுறுதல்
Fibre	— நார்த் திசு
Filament	— கம்பி (மகரந்த) இழை (பாசி)
Flagellum	— கணையிழை
Fragmentation	— துண்டாகுதல்
Fruit body	— கிடுகுட் பாடி (கனியொத்த)
Fungi (fungus)	— பூஞ்சைகள் (பூஞ்சை)
G	
Gametangium	— காமிட்டேஜியம்
Gamete	— காமிட்
Gamete genesis	— காமிட் தோற்றமுறை
Gametophyte	— காமிட்டேடானைப்
Genus	— பேரினம்
Gonidium	— கொனிடியம்
Granular	— நுண்மணி உருவான
Growth	— வளர்ச்சி
H	
Habit	— வளர் இயல்பு
Habitat	— வாழ் இடம்
Haploid	— ஒத்தைமயம்
Haustorium	— உறிஞ்ச உறுப்பு
Heterocyst	— திறைரோஸிஸ்ட்
Heteroecious	— பல் இயல்புள்ள
Heteromorphic	— மாற்றுத் தோற்றமுள்ள, உருவம் ஒவ்வாத
Heterotrophic	— பர ஊட்டமுள்ள
Heterotrichous	— திறைரோபிகரணம்
Heterothallic	— வேற்றுடமைகொண்ட
Homologous	— உருவம் ஒத்த
Homothallic	— ஒத்த உடமை கொண்ட
Hormogone	— நொர்மிகோன்
Host	— ஆதாரத்தாவரம்
Humus	— இயைமட்டு
Hygroscopic	— நீர் கர்த்தம்
Hyperplasia	— திறைபரிபிணக்கம்
Hypertrophy	— திறைபரிபிணக்கம்
Hypothesis	— கோட்பாடு
Hyphe	— இழை (பூஞ்சை)

I

Incompatibility	— ஒவ்வாத்தன்மை
Inflorescence	— மஞ்சரி
Inorganic	— அனங்கக
Intercalary growth	— இடைநிலை வளர்ச்சி
Inter-cellular space	— செல் இடைவெளி
Internode	— கணு இடைவெளி
Intra-cellular	— செல்லினுட்பட்ட
Inversion	— தலைகீழ் மாற்றம்
Isogametes	— ஒத்த காமிட்டுகள்
Isogamy	— துசோகமி
Isomorphic	— ஒத்த உருவ அமைப்புகள்

J

Juvenile	— இளம் பருவ
----------	-------------

K

Karyogamy	— நூக்கரிவல் இணைப்பு
Katabolism	— சிதைவாற்றம்

L

Lamella	— தாள் அடுக்கு
Lamina	— தாள்
Layer	— அடுக்கு, படவம்
Leaf spot	— இலைப்புள்ளி
Lichen	— லிக்சன், பாசிப்பூஞ்சை, பாசிக் காளான்
Lithophyte	— பாறைவாழ் தாவரம்
Locomotion	— இடப்பெயர்ச்சி

M

Main axis	— பிரதான அச்சு
Manubrium	— மேனுபிரியம்
Matrix	— மேட்ரிக்ஸ்
Mature	— முதிர்ந்த
Medulla	— மேடுல்லா
Meiosis	— மையோசிஸ் (குன்றல் பாகு பாகு)

Membrane	— துடிவு
Metabolism	— களர்சிதை மாற்றம்
Metamorphosis	— உருமாற்றம்
Middle lamella	— தடுப்பு இடைவடுக்கு
Mid rib (mid vein)	— நடு தரம்பு
Mitosis	— கைட்டாஸிஸ்
Modification	— மாற்றுரு
Moisture	— ஈரம்
Mould	— பூஞ்சை
Mobile	— இயங்கும்
Molecule	— மூலக்கூறு
Monocious	— மானிஷியம்
Movement	— அசைவு, இயக்கம்
Mushroom	— காளான்
Mycelium	— கைசீலியம்
Mycology	— பூஞ்சை இயல்

N

Nectar	— பூத்தேன்
Nitrification	— நைட்ரிபிகேஷன்
Node	— கணு
Nodule	— முண்டு, முடிச்சு
Nucleus	— நுக்கிலியம்
Nutrition	— ஊட்டம்

O

Oblong	— நீள் சதுர
Obligate	— நிலையான
Oidiospore	— ஆய்டியோஸ்போர்
Oidium	— ஆய்டியம்
Oogamy	— ஊகமி
Oogonium	— ஊகோனியம்
Ooplasm	— ஊபிளாசம்
Operculum	— மூடி
Opposite (phyllotaxy)	— எதிர் இலைவடுக்கம்
Organic matter	— அங்ககப் பொருள்
Organism	— உயிசி
Origin of sex	— பால் தொடர்நம்
Osmosis	— துய்யுடு பரவல்

Ostiole	— துண் துளை
Out growth	— வளர்
Ovary	— சூம்பை
Ovate	— முட்டை வடிவ
Ovum	— முட்டை
Oxidation	— ஆக்ஸிகரணம்

F

Palmella stage	— பாங்கெல்ஸா நிலை
Papilla	— ரோமம்
Parasite	— ஒட்டுண்ணி
Parthenogenesis	— பார்த்தினோஜெனீஸிஸ்
Parthenospore	— பார்த்தினோஸ்போர்
Pedical	— பூக்காய்
Peduncle	— மஞ்சரித் தண்டு
Periplasm	— பெரிபிளாசம்
Photosynthesis	— ஒளிச்சேர்க்கை
Phyllotaxy	— இலை அமைப்பு (அடுக்கம்)
Phylum	— பெருத்தொகுதி
Pileus	— கைலியம்
Pistil	— சூவகம்
Plasma membrane	— பிளாஸ்மா ஜெவ்
Polymorphism	— பல உருத்தொத்தம்
Pore	— துண் துளை
Principle	— தத்துவம்
Protonema	— புரோட்டோனீமா
Physiological	— செவலியல்

R

Reserve food	— சேமிப்பு உணவு
Reduplication	— மறு இரட்டித்தல்
Respiration	— சுவாசத்தல்
Reproductive phase	— இனப்பெருக்கப் பருவம்
Rhizoid	— கரஜோய்ட்
Rhizome	— மட்டநிலத்தண்டு
Rhizomorph	— கரஜோமார்ப்
Root hair	— வேர்த்தூளி
Root nodule	— வேர் முடிச்சு
Runner	— ரன்னர், ஒடுதண்டு

S

Saprophyte	— சாறுண்ணி
Secrete	— சுரத்தல்
Seedling	— நாற்று
Sessile	— காம்பற்ற
Sex organs	— பால் உறுப்புகள்
Sexual reproduction	— பாலினப் பெருக்கம்
Shoot	— தண்டு
Soil	— மண்
Soil solution	— மண்ணரசம்
Somatic	— சோமோடிக்
Species	— சித்தினம்
Spermatium	— ஸ்பெர்மேதீயம்
Spindle	— ஸ்பிண்டில்
Spirillum	— ஸ்பிரில்லம்
Sporangium	— ஸ்போராகம்
Sporangiophore	— ஸ்போராகக் காம்பு
Spore	— ஸ்போர்
Sporophyte	— ஸ்போரோலைபட்
Starch	— தரசம்
Stem	— தண்டு
Strain	— ஸ்ட்ரேன் (பூஞ்சை)
Stroma	— ஸ்ட்ரோமா
Subterranean	— தரைக்கீழ்
Symbiotes	— கூட்டுயிர்கள்
Symbiosis	— கூட்டுயிர் வாழ்க்கை

T

Taxonomy	— வகைப்பாட்டியல்
Tetrahedral	— நான்குமுகி
Tetraspore	— டெட்ராஸ்போர்
Tetrasporangium	— டெட்ராஸ்போராகம்
Thallus	— உடலம்
Theory	— கொள்கை
Tide (high, low)	— கடல்மட்ட (ஏற்ற,இறக்க)நீர்
Tissue	— நிசு
Toxin	— விஷப்பொருள்
Trama	— திராமா

Tropical

— வெப்பப் பிரதேச

Tuber

— கிழங்கு

U

Unique

— தனிச் சிறப்புப்பெற்ற

Underground

— தரைக்கீழ்

Uniflagellate

— ஒருகைசவீழையுடைய

V

Vacuole

— வெக்டூலம்

Variation

— மாற்றம்

Velum

— வீலம்

Vegetative phase

— வளர் பருவம்

Vegetative reproduction

— உடம்புப் பெருக்கம்

W

Whorled

— வட்ட

Wilt

— வாடுதல்

Y

Yeast

— யஸ்டு

Z

Zone

— மண்டலம்

Zoosporangium

— ஜூஸ்போரகம்

Zoospore

— ஜூஸ்போர்

Zygote

— ஸைகோட்

