

அணிகளும் அணிக்கோவைகளும்

(மட்டப்படிப்புக்குரியது)

(திருத்தப்பட்ட பாடத்திட்டத்தின்படி வெளியிடப்படுகிறது)

ஆசிரியர் :

ஜே. டி. சாமுவேல், எம். ஏ., எம். எஸ்., (இக்லினுயர்ஸ்)

கணிதப் பேராசிரியர்,
பிஷப் ஹீப்ர் கல்லூரி,
திருச்சிராப்பள்ளி.



தமிழ்நாட்டுப் பாடநூல் நிறுவனம்

த. பர. தி. (க.வெ.) வரிசை எண்—801

அணிகளும் அணிக்கோவைகளும்

(பட்டப்படிப்புக்குரியது)

(திருத்தப்பட்ட பாடத்திட்டத்தின்படி வெளியிடப்படுகிறது)

ஆசிரியர் :

ஜே. டி. சாமுவேல், எம். ஏ., எம். எஸ்., (இயற்கையல்)

கணிதப் பேராசிரியர்,
மிஷப் ஹிப் கல்லூரி,
திருச்சிராப்பள்ளி.



தமிழ்நாட்டுப் பாடநூல் நிறுவனம்

First Edition—February, 1972

T.N.T.B.S. (C.P.) No. 301

© Tamil Nadu Text Book Society

MATRICES AND DETERMINANTS

J. D. SAMUEL

Net Price Rs. 9-50

(No discount)

'Published by the Tamil Nadu Text Book Society under the Centrally Sponsored Scheme of Production of Books and literature in regional languages at the University level, of Government of India in the Ministry of Education and Social Welfare.'

அணிந்துரை

திரு. இரா. நெடுஞ்செழியன்

(தமிழகக் கல்வி—உள்ளாட்சித் துறை அமைச்சர்)

தமிழைத் கல்லாசிக் கல்வி மொழியாக ஆக்கிப் பதினா ளாண்டுகள் ஆகியிட்டன. குறிப்பிட்ட சில கல்லாசிகளில் பி.ஏ. வகுப்பு மாணவர்கள் தங்கள் பாடங்கள் அறிந்ததையும் தமிழிலேயே கற்று வந்தனர். 1968ஆம் ஆண்டின் தொடக்கத் தில் புதுமுக வகுப்பினும் (P.U.C.), 1969ஆம் ஆண்டிலிருந்து பட்டப்படிப்பு வகுப்புகளிலும் அறிவியல் பாடங்களையும் தமிழிலேயே கற்பிக்க ஏற்பாடு செய்துள்ளோம். தமிழிலேயே கற்பிப்போம் என முன்வந்துள்ள கல்லாசி ஆசிரியர்களின் ஊக்கம், சிற பல துறைகளிலும் தொண்டு செய்வோர் இதற் கெனத் தத்த உழைப்பு, தங்கள் சிறப்புத் துறைகளில் தங்கள் எழுதித் தர முன்வந்த துலாசிரியர்கள் தொண்டுணர்ச்சி இவற்றின் காரணமாக இத் திட்டம் நம்மிடையே மகிழ்ச்சியும் மன திறையும் தாத்தக உணர்வுகளில் நடைபெற்று வருகிறது. இவ் வனையில், கல்லாசிப் பேராசிரியர்கள் கலை, அறிவியல் பாடங்களை மாணவர்களுக்கு தமிழிலேயே பயிற்றுவிப்பதற்குத் தேவையான பயிற்சியைப் பெறுவதற்கு மதுரைப் பல்கலைக்கழகம் ஆண்டு தோறும் எடுத்துவரும் பெருமையற்சியைக் குறிப்பிட்டுச் சொல்ல வேண்டும்.

பல துறைகளில் பணிபுரியும் பேராசிரியர்கள் எத்தனையோ நெருக்கடிகளுக்கிடையே குறுகிய காலத்தில் அரிய முறையில் தங்கள் எழுதித் தந்துள்ளனர்.

வரலாறு, அரசியல், உளவியல், பொருளாதாரம், தத்துவம், புறவியல், புறவணிகவியல், மனவியல், கணிதம், பொருதிகம், வேதியியல், உயிரியல், வானியல், புள்ளியியல், விவகியல், தாவரவியல், பொறியியல் ஆகிய எல்லாத் துறைகளிலும் தனி துறிகள், மொழிபெயர்ப்பு துறிகள் என்ற இரு வகையிலும் தமிழ்தாட்டுப் பாட துல் திறுவனம் வெளியிட்டு வருகிறது.

இவற்றுள் ஒன்றான 'அனிகளும் அனிக்கோவைகளும்' என்ற இத் துல் தமிழ்தாட்டுப் பாட துல் திறுவனத்தின் 301ஆவது வெளியிடாகும். இதுவரை 336 துல்கள் வெளியிவந்துள்ளன.

உழைப்பின் வாரா உறுதிகள் இல்லை; ஆதலின், உழைத்து வெற்றி காண்போம். தமிழைப் பரிலும் மாணவர்கள் உலக மாணவர்களிடையே சிறத்த இடம் பெறவேண்டும்; அதுவே தமிழன்னைின் குறிக்கோளுமாகும். தமிழ்தாட்டுப் பல்கலைக் கழகங்களின் பவவகை உதவிகளுக்கும் ஒத்துழைப்புக்கும் நம் மனம் கலத்த நன்றி உரித்தாகுக.

இரா. நெடுஞ்செழியன்

பொருளடக்கம்

	பக்கம்
1. அணி என்னும் என்ன ?	1
2. அணிகளின் இயல்பு கணிதம்	15
3. தொடர்புள்ள அணிகள்	35
4. சேர்ப்பு அணி, தேர்வு அணி	91
5. அணிகளைப் பாடுபடுத்தல்	136
6. அணிகளில் சாதாரண நிறை (நிரல்) மாற்றங்கள்	166
7. அணியின் அளவை	201
8. ஒருங்கமை ஒருபடிச் சமன்பாடுகள்	234
9. ஒரு படியில் மாற்றி மாற்றங்கள்	261
10. நிறப்பெயர்ப்புச் சமன்பாடுகள்	266
11. செங்குத்தணிகள்	282
12. இயல்புச் சமன்பாடுகளின் கோவைகள்	309
அனுபந்தம் : அணிக் கோவைகள்	317
BIBLIOGRAPHY	354
கலைச்சொற்கள்	355

1. அணி என்ருல் என்ன ?

1.0. அணி என்றும் என்ன என்று வரையறுக்குமுன் ஓர் உதாரணம் காட்டுவது நன்று.

க	ர	டி
ர	மி	ல்
டி	ல்	மி

என்பது ஓர் அணி. நாம் சிறுவர்களாக இருத்தபோதே இது நம்மைக் கவர்த்துள்ளது. இதில் $3 \times 3 = 9$ உறுப்புகளைச் சதுர வடிவில் எழுதி, அவற்றைப் பல அடைப்புகளுள் வைத்திருக்கிறோம்.

இது	ர	மி	ல்
	க	ர	டி
	டி	ல்	மி

என்ற அணியினின்று

வேறுபட்டது எனக் கூறத் தேவையில்லை. எனவே, 'எந்த முறையில் இதன் உறுப்புகள் அமைந்துள்ளன' என்பது முக்கியத்தும் வலிந்தது. இந்த உறுப்புகளை முகவர்கள் என்னும் சொல்வேண்டும்.

1.1. அணியின் வகைவிலக்கணம்

5×3 உறுப்புகளை நீண்ட சதுர வடிவில் எழுதி அவற்றைப் பல அடைப்புகளுள் வைத்தால் அதற்கு 5×3 அணி என்பது பெயர்.

உதாரணம் :

$$\begin{bmatrix} 1 & 7 & 2 \\ 2 & 3 & 5 \\ 3 & 5 & -8 \\ 4 & 4 & 0 \\ 5 & 1 & 1 \end{bmatrix}$$

இவ்வணியில் இடமிருந்து வலமாக 5 வரிசைகள் உள்ளன. இவற்றை நாம் 'நிரைகள்' (rows) என்று சொல்கிறோம்.

முதல் நிரை : (1, 7, 2)

இரண்டாம் நிரை : (2, 3, 5) முதலியன.

மேலும், மேலிருந்து கீழாக 3 வரிசைகள் உள்ளன. இவைகளுக்கு 'நில்கைகள்' (columns) என்பது பெயர்.

முதல் நிரை

இரண்டாம் நிரை

மூன்றாம் நிரை

$$\begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \\ 4 \\ 5 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} 7 \\ 3 \\ 5 \\ 4 \\ 1 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} 2 \\ 5 \\ -8 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}$$

இப்பொழுது, ஒர் அணியில் உள்ள எந்த உறுப்பையும் குறிப்பிடுவது எளிதாகிறது. உதாரணமாக, 4ஆவது நிரலில், 2ஆவது நிலையில் உள்ள உறுப்பு 8. இதனை,

$$a_{42}=8$$

என்று எழுதலாம். பொதுவாக, i ஆவது நிரலிலும், j ஆவது நிலிலும் உள்ள உறுப்பை $(i-j)$ ஆவது உறுப்பு எனச் சொல்லி a_{ij} என்று குறிப்பிடுவோம்.

1.2. அணியின் வகையும் தரவும் (Order of a Matrix)

5 நிரல்களும் 8 நிரல்களும் உள்ள அணியினை 5×8 அணி என எழுதுவதும், ஐந்திற்கு மூன்று அணி எனச் சொல்வதும் வழக்கம். இதை ஆங்கிலத்தில் '5 by 8' அணி என்பர். இதில் $5 \times 8 = 16$ உறுப்புகள் (ஸ்காலர்கள்) உண்டு.

ஆனால், 4×4 என்ற சதுர அணி இருந்தால் அதன் தரம் (order) 4 என்று சொல்வோம்.

பொதுவாக, ஒரு $m \times n$ அணியில் mn உறுப்புகள் உண்டு.

இதனை

$$A = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} & \dots & a_{1j} & \dots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} & \dots & a_{2j} & \dots & a_{2n} \\ \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots \\ a_{i1} & a_{i2} & a_{i3} & \dots & a_{ij} & \dots & a_{in} \\ \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots \\ a_{m1} & a_{m2} & a_{m3} & \dots & a_{mj} & \dots & a_{mn} \end{bmatrix}$$

என்று எழுதுவோம். இதையே, சுருக்கமாக

$$A = m \times n \text{ அணி } [a_{ij}]$$

அல்லது, $A = [a_{ij}]_{m \times n}$ என எழுதலாம். மீண்டும் இதைக் குறிப்பிட A என்பதே பொதுமானது.

அணியினை

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \\ 7 & 8 & 9 \end{pmatrix} \text{ என்றும்,}$$

$$\begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 5 & 6 & 7 & 8 \end{vmatrix} \text{ என்றும்}$$

குறிப்பிடுவது வழக்கத்தில் உள்ளது.

குறிப்பு :

ஆனால்,

$$\begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \\ 7 & 8 & 9 \end{vmatrix}$$

என்பது அணிக் கோவையை மட்டும் குறிக்கும். இதன் வரை வரையை அனுபத்தத்தில் காண்க.

1.3. குணகங்களின் அணி

x, y, z ஆகிய 3 மாநிகளின் உள்ள 3 சமன்பாடுகளின் தொகுதி வருமாறு :

$$ax + by + gz = 0 \quad \dots \quad \dots \quad \dots \quad (1)$$

$$hx + by + fz = 0 \quad \dots \quad \dots \quad \dots \quad (2)$$

$$gx + fy + ez = 0 \quad \dots \quad \dots \quad \dots \quad (3)$$

இவற்றின் குணகங்களை மூன்றங்கு எழுதினால்

$$A = \begin{bmatrix} a & b & g \\ h & b & f \\ g & f & e \end{bmatrix}$$

என்ற 3×3 அணி கிடைக்கிறது. இது,

$$\begin{bmatrix} h & b & f \\ g & f & e \\ a & b & g \end{bmatrix} \quad \text{இல்}$$

இருந்து வேறுபட்டது என்பதைக் கவனிக்கவும்.

கன இயல் (Set Theory) கணிதத்தில் $\{a, b\} = \{b, a\}$ என்பது போல் அணிகளைப் பற்றிக் கூற இயலாது. ஆகவே, அணி என்பது வெறும் எண்களின் திரை அல்ல.

1.4. பக்கை அணிகள்

(1) நிர அணி (Row Matrix) : ஒர் அணியில் ஒரே ஒரு நிர இருந்தால் அந்த நிர அணி என்று சொல்வோம்.

உதாரணம் 1 : $[க ச ட த ப ந]$ என்ற 1×6 அணி.

உதாரணம் 2 : $[a_{11} \ a_{12} \ a_{13} \ a_{14} \ a_{15}]$ என்ற 1×5 அணி.
இதில் $n=1$ ஆக இருக்க வேண்டும்.

(2) நிரல் அணி (Column Matrix): ஒரே அணியில் ஒரே ஒரு நிரல் இருத்தால் அதை நிரல் அணி என்று சொல்வோம்.

உதாரணம் 1 :

$$\begin{bmatrix} a_{11} \\ a_{21} \\ a_{31} \\ a_{41} \end{bmatrix} \quad \text{என்ற } 4 \times 1 \text{ அணி}$$

இதில் $n=1$ ஆக இருக்க வேண்டும்.

உதாரணம் 2 :

$$\begin{bmatrix} 0 \\ 4 \\ 8 \end{bmatrix} \quad \text{என்ற } 3 \times 1 \text{ அணி.}$$

(3) சதுர அணி (Square Matrix): $m=n$ ஆக இருக்கும் போது, அதாவது, n நிரல்களும், n நிரல்களும் உள்ள அணியை n -சதுர அணி என்று சொல்வோம்.

உதாரணம் 1 :

$$n \text{ சதுர அணி} = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} & \dots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} & \dots & a_{2n} \\ \dots & \dots & \dots & \dots & \dots \\ a_{n1} & a_{n2} & a_{n3} & \dots & a_{nn} \end{bmatrix}$$

உதாரணம் 2 :

$$2 \times 3 \text{ அணி} = \begin{bmatrix} 2 & 9 & 4 \\ 7 & 5 & 8 \\ 3 & 1 & 6 \end{bmatrix}$$

தலைமைய மூலைவிட்டம் (Principal Diagonal)

ஒரு சதுர அணியில் $a_{11}, a_{22}, a_{33}, \dots$. என்கின்ற உறுப்புகளால் ஆன மூலைவிட்டத்திற்குத் தலைமைய மூலைவிட்டம் என்பது பெயர். சாதாரணமாக, மூலைவிட்டம் என்றால் அது தலைமைய மூலைவிட்டத்தைத்தான் குறிக்கும். ஆகவே, $a_{11}, a_{22}, \dots, a_{nn}$ என்பனவற்றை மூலைவிட்ட மூலக்கள் அல்லது மூலைவிட்ட உறுப்புகள் (Diagonal Elements) என்று குறிப்பிடுவது பொருத்தம்.

(4) முக்கோண அணிகள் (Triangular Matrices): ஒரு சதுர அணியில் மூலைவிட்டத்திற்குக் கீழே உள்ள உறுப்புகள் பூச்சியமாக இருந்தால் அதாவது, $i > j$ ஆக இருக்கும் போது $a_{ij} = 0$ ஆக இருந்தால் அந்த மேல் முக்கோண அணி (upper triangular matrix) என்று சொல்லுவோம்.

உதாரணம் 1 :

$$\begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} & a_{14} & a_{15} \\ 0 & a_{22} & a_{23} & a_{24} & a_{25} \\ 0 & 0 & a_{33} & a_{34} & a_{35} \\ 0 & 0 & 0 & a_{44} & a_{45} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & a_{55} \end{bmatrix}$$

உதாரணம் 2 :

$$\begin{bmatrix} 3 & 2 & 7 & 5 \\ 0 & 5 & 4 & 8 \\ 0 & 0 & 1 & 6 \\ 0 & 0 & 0 & -1 \end{bmatrix}$$

இதே விதமாக, ஒரு சதுர அணியில், மூலைவிட்டத்திற்கு மேலே உள்ள உறுப்புகள் பூச்சியமாக இருந்தால் அதாவது, $i < j$ ஆக இருக்கும் போது $a_{ij} = 0$ ஆக இருந்தால், அதைக் கீழ் முக்கோண அணி (lower triangular matrix) என்று சொல்வோம்.

உதாரணம் 1 :

$$\begin{bmatrix} a_{11} & 0 & 0 & 0 \\ a_{21} & a_{22} & 0 & 0 \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} & 0 \\ a_{41} & a_{42} & a_{43} & a_{44} \end{bmatrix}$$

உதாரணம் 2 :

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 2 & 7 & 0 & 0 \\ 4 & 6 & 5 & 0 \\ 9 & 8 & 8 & 8 \end{bmatrix}$$

(5) மூலைவிட்ட அணி (Diagonal Matrix): மூலைவிட்ட உறுப்புகளைத் தவிர மீதி உறுப்புகள் எல்லாம் பூச்சியமாக இருந்தால், அதை மூலைவிட்ட அணி என்று சொல்வோம். ஒரு மூலைவிட்ட அணி, மூன்று முக்கோண அணியாகவும், கீழ் முக்கோண அணியாகவும் இருப்பதை கவனி.

உதாரணம் 1 :

$$\begin{bmatrix} d_1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & d_2 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & d_3 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & d_4 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & d_5 \end{bmatrix}$$

இதனை $D =$ மூலைவிட்ட அணி $(d_1, d_2, d_3, d_4, d_5)$ எனக் குறிப்பிடுவதும் வழக்கம்.

$D =$ மூலக்கோண அணி $(d_1, d_2, d_3, d_4, d_5)$ ஆனால்,
 $|D| = d_1 d_2 d_3 d_4 d_5$ என்பது கவனிக்கத் தக்கது. $|D|$ என்பது
 D என்ற அணிக்கோவைகளின் மதிப்பாகும்.

உதாரணம் 2 :

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 5 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 7 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 8 \end{bmatrix} = \text{மூலக்கோண அணி} \\ (1, 5, 7, 8)$$

(6) அளவை அணி அல்லது மூலக்கோண அணி (Scalar Matrix):
 ஒரு மூலக்கோண அணியில் உள்ள மூலக்கோண உறுப்புகள்
 எல்லாம் சமமாக இருந்தால்—அதாவது r இன் எல்லா மதிப்
 புக்கும் $a_{rr} = k$ என இருந்தால் அதை அளவை அணி என்று
 சொல்வோம். இதை மூலக்கோண அணி என்றும் சொல்லலாம்.

உதாரணம் :

$$\begin{bmatrix} k & 0 & 0 \\ 0 & k & 0 \\ 0 & 0 & k \end{bmatrix}$$

(7) அலகு அணி (Unit Matrix): ஓர் அளவை அணியின்
 மாறாத உறுப்பு 1 ஆக இருந்தால், அதை அலகு அணி என்று
 சொல்வோம். இதன் தரம் n சதுரமானால் இதனை I_n எனக் குறிப்
 பிடுவது வழக்கம்.

உதாரணம் :

$$I_2 = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix};$$

$$I_3 = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

இதன் தரம் தெளிவாக இருக்குமபோது I என்றே குறிப்பிடலாம்.

(8) பூச்சிய அணி (Null or Zero Matrix): ஒர் அணியில் உள்ள ஒவ்வொரு உறுப்பும் பூச்சியமாக இருந்தால் அதற்குப் பூச்சிய அணி என்பது பெயர்.

உதாரணம் :

$$5 \times 4 \text{ பூச்சிய அணி} = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

நிரவும் நிரவும் தெரித்திருந்தால் $A=0$ என்றே குறிப்பிடலாம்.

(9) கீழ் அணி (Sub-matrix): A என்ற அணியில் இருந்து சில நிரல்களையோ அல்லது நிரல்களையோ அல்லது இரண்டையுமோ நீக்கிய பின்னர் கிடைக்கும் அணிக்கு A இன் கீழ் அணி என்பது பெயர்.

உதாரணம் :

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 \\ 8 & 0 & 2 & 1 & 4 \\ 0 & 2 & 3 & 1 & 2 \end{bmatrix} \text{ ஆக இருக்கட்டும்.}$$

இதில் 3ஆவது நிரலையும் : 3ஆம், 5ஆம் நிரல்களையும் நீக்கிய பின்னர் கிடைக்கும் கீழ் அணி

$$\begin{bmatrix} 1 & 2 & 4 \\ 8 & 0 & 1 \end{bmatrix} \text{ ஆகும்.}$$

A என்ற சதுர அணியில் இருந்து, இணையான நிரல்களையும் நிரல்களையும் நீக்கிய பின்னர் கிடைக்கும் சதுர கீழ் அணியில் உள்ள ஒவ்வொரு உறுப்புகள் A இலும் ஒவ்வொரு உறுப்புகளாய் இருந்தனவாதாம். இத்தகைய கீழ் அணிக்குத் தலைவரய கீழ் அணி (Principal Sub-matrix) என்பது பெயர். கடைசியில் உள்ள நிரல்களையும் நிரல்களையும் மட்டும் நீக்கிக் கிடைக்கும் தலைவரய கீழ் அணியைப் பிரதான கீழ் அணி (Leading Sub-matrix) என்று சொல்லுவோம்.

உதாரணம் :

$$A = \begin{bmatrix} 2 & 3 & 1 & 0 & 2 \\ 3 & 4 & 1 & 2 & 3 \\ -1 & 2 & 5 & 3 & 1 \\ 4 & 0 & 2 & 1 & 0 \\ 2 & -2 & 1 & 0 & 2 \end{bmatrix}$$

ஆக இருக்கட்டும்.

இதில் கடைசி இரண்டு நிரல்களையும், நிரல்களையும் நீக்கிய பின் கிடைக்கும் மீதான சீழ் அணி.

$$\begin{bmatrix} 2 & 3 & 1 \\ 3 & 4 & 1 \\ -1 & 2 & 5 \end{bmatrix} \text{ ஆகும்.}$$

(10) ஒர் அணியின் சிற்றணிக் கோவைகள் (Minors of a Matrix) : ஒர் அணியின் சதுர சீழ் அணிகளின் அணிக்கோவைகளை அந்த அணியின் சிற்றணிக் கோவைகள் என்று சொல்வோம்.

உதாரணம் :

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 3 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

என்ற அணியின் சிற்றணிக் கோவைகள் வருமாறு :

$$\begin{vmatrix} 2 & 3 \\ 0 & 1 \end{vmatrix} ; \begin{vmatrix} 0 & 3 \\ 0 & 1 \end{vmatrix} ; \begin{vmatrix} 0 & 2 \\ 0 & 0 \end{vmatrix} ;$$

$$\begin{vmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{vmatrix} ; \begin{vmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{vmatrix} ; \begin{vmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{vmatrix} ;$$

$$\begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 2 & 8 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 8 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 2 & 2 \end{bmatrix}$$

என்பதாவதும்.

மேலும் ஒக்கிவாசி உறுப்பையும் முதல்தரச் சிற்றணித் கோவை யாகக் கருதலாம். கடைசியாக, கொடுக்கப்பட்ட அணியின் அணிக்கோவைமையையும் இவைகளில் ஒன்றாகக் கருதலாம்.

(11) சிக்கல் அணி (Complex Matrix) : ஒர் அணியின் மூலங்களில் சில சிக்கல் எண்களாகவும் (complex numbers) இருக்கலாம். இவ்வாறு உள்ள அணிகளைச் சிக்கல் அணிகள் என்று சொல்வோம்.

உதாரணம் :

$$(i) \begin{bmatrix} 3+4i & 2-i & 1 \\ 2+3i & 2i & 3+i \\ 5 & 7-i & i \end{bmatrix}$$

$$(ii) \begin{bmatrix} 1 & i & 1 & i \\ i & -1 & -i & -i \\ 1 & -1 & 1 & -1 \\ 1 & -i & -1 & i \end{bmatrix}$$

பயிற்சி 1

1. கீழ்க்கண்ட அணிகளில் நிராகர், நிராகர் இவற்றை எழுது :

$$(அ) \begin{bmatrix} 2 & -1 & 1 \\ 0 & 1 & 2 \\ 1 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$$(ஆ) \begin{bmatrix} 1 & 2 & -1 & 0 \\ 4 & 0 & 2 & 1 \\ 2 & -3 & 1 & 2 \end{bmatrix}$$

$$(இ) \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ -2 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & -2 & -1 & 0 \\ 5 & -1 & -1 & 1 \end{bmatrix}$$

2. கீழ்க்கண்ட அணிகளின் வகை யாது?

$$(அ) \begin{bmatrix} \lambda & 1 & 0 \\ 0 & \lambda & 1 \\ 0 & 0 & \lambda \end{bmatrix}$$

$$(ஆ) \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ a & b & -1 & 0 \\ c & d & 0 & -1 \end{bmatrix}$$

$$(இ) \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 3 & 1 & 2 \end{bmatrix}$$

3. அணிக்கும், அணிக்கோவைக்கும் உச்ச வேறுபாடுகள் யாவை?

4. நிர அணிக்கு நான்கு உதாரணங்கள் தருக.
5. நிரல் அணிக்கு நான்கு உதாரணங்கள் தருக.
6. சதுர அணிக்கு நான்கு உதாரணங்கள் தருக.
7. கீழ்க்கண்ட சதுர அணிகளில்

(i) தலைவாய் ஒலிவிட்டம்,

(ii) ஒலிவிட்ட உறுப்புகள் ஆகியவற்றை எழுதுக.

$$(அ) \begin{bmatrix} 4 & 3 & 8 \\ -1 & 0 & -1 \\ -4 & -4 & -8 \end{bmatrix}$$

$$(ஆ) \begin{bmatrix} 1 & -3 & -4 \\ -1 & 3 & 4 \\ 2 & 0 & -3 \end{bmatrix}$$

$$(இ) \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 2 & 1 & 0 & 0 \\ 4 & 2 & 1 & 0 \\ -2 & 2 & 1 & 1 \end{bmatrix}$$

8. மேல் முக்கோண அணிக்கு இரண்டு உதாரணங்கள் கொடு.
9. கீழ் முக்கோண அணிக்கு இரண்டு உதாரணங்கள் கொடு.
10. மேல் முக்கோண அணிக்கும் கீழ் முக்கோண அணிக்கும் உள்ள வேறுபாடு யாது ?
11. ஒரு மேல் முக்கோண அணியில் உள்ள நிரல்களை நிரல்களாகவும், நிரல்களை நிரல்களாகவும் மாற்றி அமைத்தால் கிடைக்கும் அணி எத்தகையது ?
12. மூலையிட்ட அணிக்கு இரண்டு உதாரணங்கள் கொடு.
13. மூலையிட்ட அணி, அளவை அணி, அகற் அணி—இவைகளுக்கு இடையே உள்ள தொடர்பு யாது ?
14. $|I_n| = 1$ என நிரூபி.
15. கீழ்க்கண்ட அணிகளில்
 - (i) தலைமைய கீழ் அணி,
 - (ii) பிரதான கீழ் அணி,
 - (iii) சிற்றணிக்கு கோவைகள் ஆகியவற்றை எழுது.

$$(அ) \begin{bmatrix} 3 & 2 & 1 \\ 0 & -1 & -2 \\ -1 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$$(ஆ) \begin{bmatrix} 1 & 2 & -1 \\ 2 & 0 & 3 \\ 4 & 1 & -2 \end{bmatrix}$$

$$(இ) \begin{bmatrix} 1 & 1 & 3 \\ 5 & 2 & 6 \\ -2 & -1 & -3 \end{bmatrix}$$

வினாக்கள்

1. (அ) திணைகள் :

$$\text{முதல் திணை : } \begin{bmatrix} 2 & -1 & 1 \end{bmatrix}$$

$$\text{இரண்டாம் திணை : } \begin{bmatrix} 0 & 1 & 2 \end{bmatrix}$$

$$\text{மூன்றாம் திணை : } \begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$$\text{திருகைள் : } \begin{bmatrix} 2 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix} ; \begin{bmatrix} -1 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix} ; \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ 1 \end{bmatrix}$$

$$\text{(ஆ) } \begin{bmatrix} 1 & 2 & -1 & 0 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 4 & 0 & 2 & 1 \end{bmatrix};$$

$$\begin{bmatrix} 2 & -5 & 1 & 2 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} 1 \\ 4 \\ 2 \end{bmatrix} ; \begin{bmatrix} 2 \\ 0 \\ -5 \end{bmatrix} ; \begin{bmatrix} -1 \\ 2 \\ 1 \end{bmatrix} ; \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 2 \end{bmatrix}$$

$$\text{(இ) } \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} -2 & 1 & 0 & 0 \end{bmatrix};$$

$$\begin{bmatrix} 0 & -2 & 1 & 0 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 3 & -1 & -1 & 1 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} 1 \\ -2 \\ 0 \\ 3 \end{bmatrix} ; \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ -2 \\ -1 \end{bmatrix} ; \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \\ -1 \end{bmatrix} ; \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}$$

2. (அ) 3×3 அணி(ஆ) 4×4 அணி(இ) 4×3 அணி3. (அ) $\begin{bmatrix} 4 & 0 & -3 \end{bmatrix}$; 4, 0, -3(ஆ) $\begin{bmatrix} 1 & 3 & -3 \end{bmatrix}$; 1, 3, -3(இ) $\begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \end{bmatrix}$; 1, 1, 1, 1

2. அணிகளின் இயல் கணிதம்

2-0. களங்கள் (Fields) பற்றிய நெடு குறிப்பு

இரண்டு அல்லது அதற்கு அதிகமான உறுப்புகளைக் கொண்ட ஒரு கணத்தை (set) களம் என்று சொல்லவேண்டுமானால் அதில் கூட்டல் (+); பெருக்கல் (.) என்னும் செய்கைகள் (operations)ப் பின் வரும் விதிகளுக்கிணக்கச் செய்யக் கூடியதாக இருக்கவேண்டும்.

1. $a + b$ என்பது F என்ற கணத்தின் ஒரே (unique) உறுப்பாக இருக்கவேண்டும்.

$$2. a + b = b + a$$

$$3. a + (b + c) = (a + b) + c.$$

$$4. a + 0 = 0 + a = a.$$

$$5. a + (-a) = 0.$$

6. $a, b = ab$ என்பது F என்ற கணத்தின் ஒரே உறுப்பாக இருக்கவேண்டும்.

$$7. ab = ba.$$

$$8. a(bc) = (ab)c$$

$$9. 1.a = a.1 = a$$

$$10. a \neq 0 \text{ ஆனால் } a.a^{-1} = a^{-1}.a = 1.$$

$$11. a(b+c) = ab+ac.$$

$$12. (a+b)c = ac+bc.$$

கனத்திற்கு உதாரணமாக எலிதிமுறு (rational) எண்களைக் கூறலாம். மேலும், மெய்யான எண்களும்; சிக்கல் எண்களும் கனங்களாகவும் என்பதை நோக்குக.

அணிகளின் இயல்பு கணிதத்தை ஆராயப்போகும் தரம், கனங்களில் உள்ள அணிகளையே எடுத்துக் கொள்வோம். அதாவது தரம் எடுத்துக்கொள்ளும் அணிகளின் ஜலகங்கள் கனங்களின் உறுப்புகளாக இருக்கும். இதிலும் சிறப்பாக, மெய்யான எண்களின் கனத்தையும், சிக்கல் எண்களின் கனத்தையும் மட்டுமே எடுத்துக் கொள்வோம்.

கூட்ட ஐம் பெருக்க ஐம்

2-1. ஒரே தர அணிகள் (Matrix of the same order)

இரு அணிகளின் தரங்கள் சமனாவிர்த்தமாக, அதாவது இரு அணிகளின் திரையளும் திசுக்களும் தனித்தனியே சமனாவிர்த்தமாக அவற்றை ஒரே தர அணிகள் என்று சொல்கோம். இவைகளை ஒப்பீடத்தகு அணிகள் (Comparable matrices) என்றும் சொல்வது வழக்கம்.

2-2. சமமான அணிகள் (Equal Matrices)

$A = m \times n$ அணி $[a_{ij}]$ ஆகவும்

$B = m \times n$ அணி $[b_{ij}]$ ஆகவும் இருக்கட்டும்.

இவை ஒப்பீடத்தக்கவை என்பதைக் கவனி.

$a_{ij} = b_{ij}$ என்ற சமன்பாடு ஒவ்வொரு i க்கும், ஒவ்வொரு j க்கும் உண்மையாக இருக்கட்டும் (இப்படிப்பட்ட சமன்பாடுகள் $m \times n$ உள்ளன). இவ்வாறு இருந்தால், இவை சமமான அணிகள் ஆகும். அதாவது, $A = B$.

(i) A என்பது ஓர் அணி ஆனால், $A = A$

(ii) $A = B$ ஆனால், $B = A$

(iii) $A = B$ ஆகவும், $B = C$ ஆகவும் இருந்தால் $A = C$ என்பவற்றை எளிதாக நிரூபிக்கலாம்.

2-3. அணிகளைக் கூட்டல்

எவையேனும் இரு அணிகளை எடுத்துக் கொண்டால், அவற்றைக் கூட்ட இயலாது. இதன்டு அணிகளும் ஒரே தர அணிகளாக

இருத்தாகத்தான் அவை கூட்டுவதற்கு இயைத்தனவாய்க் இருக்கும் (conformable to addition).

$A = [a_{ij}]$, $B = [b_{ij}]$ என்பன $m \times n$ அணிகளாக இருக்கட்டும். இவை ஒரே தர அணிகள்; எனவே கூட்டலுக்கு இயைத்தனவாக இருக்கின்றன. இப்பொழுது $c_{ij} = a_{ij} + b_{ij}$ ஆக இருக்கட்டும்.

$$\begin{aligned} A + B &= [a_{ij} + b_{ij}] \\ &= [c_{ij}] \\ &= C \text{ என வரையறை செய்வோம்.} \end{aligned}$$

குறிப்பு : C உம் $m \times n$ அணியாகத்தான் இருக்கும்.

உதாரணம் :

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 3 \\ 5 & 2 \end{bmatrix}; \quad B = \begin{bmatrix} 2 & 0 \\ 3 & -3 \end{bmatrix}$$

ஆனால்,

$$\begin{aligned} A + B &= \begin{bmatrix} 1+2 & 3+0 \\ 5+3 & 2+(-3) \end{bmatrix} \\ &= \begin{bmatrix} 3 & 3 \\ 8 & -1 \end{bmatrix} \end{aligned}$$

2.4. அணிகளைக் கழித்தல் :

$A - B = [a_{ij} - b_{ij}]$ என வரையறை செய்வோம்.

உதாரணம் :

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & -3 \\ 5 & 0 & 2 \\ 1 & -1 & 1 \end{bmatrix}; \quad B = \begin{bmatrix} 4 & 1 & 2 \\ 0 & 3 & 2 \\ 1 & -2 & 3 \end{bmatrix}$$

$$\text{ஆனால், } A - B = \begin{bmatrix} 1-4 & 2-1 & -3-2 \\ 5-0 & 0-3 & 2-2 \\ 1-1 & -1+2 & 1-3 \end{bmatrix}$$

அ. அ. - 2

$$= \begin{bmatrix} -2 & 1 & -5 \\ 5 & -3 & 0 \\ 0 & 1 & -2 \end{bmatrix}$$

2.5. இம் கூட்டல் விதிகள் :

(i) $A+B=B+A$ பரிமாற்று விதி

(ii) $A+(B+C)=(A+B)+C$ தொடர்பு விதி

(iii) $A+D=B$ என்றும் சமன்பாட்டிற்கு இணக்க D என்றும் ஒரே அணி உண்டு.

(i) $A+B=[a_{ij}+b_{ij}]$

$$=[b_{ij}+a_{ij}]$$

(சாதாரண எண்களின் பரிமாற்று விதிப்படி)

$$=B+A$$

(ii) உக்கம் பரிபரிசீலனை.

(iii) $A=[a_{ij}]$; $B=[b_{ij}]$ என இருக்கட்டும்.

$$d_{ij}=b_{ij}-a_{ij} \text{ என எடுத்துக்கொள்.}$$

$$D=[d_{ij}] \text{ ஆனும்}$$

$$A+D=[a_{ij}+d_{ij}]$$

$$=[a_{ij}+b_{ij}-a_{ij}]$$

$$=[b_{ij}]$$

$$=B.$$

2.6. அணிகளின் கூட்டலின் பூச்சியம் உண்டு.

$A, 0$ என்பன $m \times n$ அணிகளானால்,

$$A+0=A=0+A \text{ ஆக இருக்கும்.}$$

நிறுபணம் :

$$A+0=[a_{ij}+0]=[a_{ij}]$$

$$=A$$

இதேவிதமாக

$$\begin{aligned} 0 + A &= [0 + a_{ij}] = [a_{ij}] \\ &= A \end{aligned}$$

$$\therefore A + 0 = A = 0 + A$$

உதாரணம் :

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 3 \\ 0 & 2 \\ -1 & 4 \end{bmatrix}; \quad 0 = \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}$$

$$\begin{aligned} A + 0 &= \begin{bmatrix} 1+0 & 3+0 \\ 0+0 & 2+0 \\ -1+0 & 4+0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 3 \\ 0 & 2 \\ -1 & 4 \end{bmatrix} \\ &= A \end{aligned}$$

$$0 + A = \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 1 & 3 \\ 0 & 2 \\ -1 & 4 \end{bmatrix}$$

$$\begin{aligned} &= \begin{bmatrix} 0+1 & 0+3 \\ 0+0 & 0+2 \\ 0-1 & 0+4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 3 \\ 0 & 2 \\ -1 & 4 \end{bmatrix} \\ &= A \end{aligned}$$

$$\therefore A + 0 = 0 + A = A.$$

2.7. எதிர்க் கூட்டல் அணி (Additive Inverse)

$A + B = 0$ என இருந்தால் B ஐ A -ன் எதிர்க் கூட்டல் அணி என்று சொல்வோம். இப்படிப்பட்ட அணி இருக்கிறது என்பது 2-5 (iii)-ன்படி தெளிவாகிறது.

மேலும் B , A -ன் எதிர்க் கூட்டகணிவாக A ஆனது B -ன் எதிர்க் கூட்டகணிவாக இருக்கவேண்டும். ஏனென்றால் $A+B=0$. ஆனால், பரிமாற்று விதியின்படி $B+A=0$.

உதாரணம்:

$$A = \begin{bmatrix} 2 & 5 \\ 3 & -1 \end{bmatrix} \text{ ஆனால்,}$$

இதன் எதிர்க் கூட்டகணி

$$\begin{bmatrix} -2 & -5 \\ -3 & 1 \end{bmatrix} \text{ ஆகும்.}$$

2.8. அணிமய எண்ணியல் பெருக்கல் (Scalar Multiplication of a Matrix)

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 3 \\ 5 & 4 \end{bmatrix} \text{ என இருக்கட்டும்.}$$

$$A+A = \begin{bmatrix} 1+1 & 3+3 \\ 5+5 & 4+4 \end{bmatrix}$$

$$\therefore 2A = \begin{bmatrix} 2 \times 1 & 2 \times 3 \\ 2 \times 5 & 2 \times 4 \end{bmatrix}$$

$2A$ -ல் உள்ள ஒவ்வொரு உறுப்பும், A -ல் உள்ளதைப் போல் 2 மடக்காக இருப்பதைக் கவனி. எனவே, $A = [a_{ij}]$ ஆனால், $2A = [2a_{ij}]$ என்பது பொருத்தம்.

பொதுவாக, $A = [a_{ij}]$ ஆனால்,

$$kA = [ka_{ij}]$$

என வரையறுப்போம்.

k ஓர் அணி ஆக. அது ஓர் எண்ணி (scalar) ஆதலால், இதை 'எண்ணியல் பெருக்கல்' என்று சொல்கிறோம்.

2.9. அணிமய அணியல் பெருக்கல் (Multiplication of Matrices)

$A = [a_{11} \ a_{12} \ \dots \ a_{1n}]$ என்ற $1 \times n$ அணியாக இருக்கட்டும்.

A -ல் ஒரே நிரை இருப்பதால், அதை 'நிரை அணி' என அழைப்பது வழக்கம். இதே விதமாக,

$$B = \begin{bmatrix} b_{11} \\ b_{21} \\ \vdots \\ b_{n1} \end{bmatrix}$$

என்ற $n \times 1$ அணியை ஒரே நிரல் இருப்பதால் 'நிரல் அணி' என அழைப்போம்.

AB ஐ மூலதரப்படி பெறுக்கினால் C என்ற 1×1 அணி கீழ்க் காணும் வகையறாக்களைக்கே கிடைக்கும்.

$$AB = C = [a_{11}b_{11} + a_{12}b_{21} + \dots + a_{1n}b_{n1}]$$

குறிப்பு: நிரல்களில் உள்ள ஒவ்வோர் உறுப்பையும் அதற்கு ஒத்த நிரலில் உள்ள உறுப்பினால் பெருக்கிக் கூட்டி விடுகிறோம்.

உதாரணம்:

$$\begin{aligned} [1 \ 2 \ 8] \begin{bmatrix} 4 \\ -1 \\ 0 \end{bmatrix} \\ = [1 \cdot 4 + 2 \cdot (-1) + 8 \cdot 0] \\ = [2] \end{aligned}$$

இதில் கிடைப்பானது 2 என்னும் எண்ணி (Scalar) அல்ல. அது 1×1 அணி $[2]$ என்பதை நோக்குக.

இதுவரை, ஒரு நிரை அணியை ஒரு நிரல் அணியால் பெருக்கி, கிடைக்கும் நிரை அணியைப் பற்றிப் பார்த்தோம். இனி, பொதுவாக இரண்டு அணிகள் பெருக்குதற்கு இயைந்தனவா? அவற்றின் பெருக்கற்பலன் என்ன? என்று பார்ப்போம்.

$A = m \times n$ அணி $[a_{ij}]$ ஆகவும், $B = n \times p$ அணி $[b_{ij}]$ ஆகவும் இருந்தால்

$$AB = C = m \times p \text{ அணி } [c_{ij}]$$

$$\text{இதில் } c_{ij} = a_{i1}b_{1j} + a_{i2}b_{2j} + \dots + a_{in}b_{nj}$$

$$\text{i.e. } c_{ij} = \sum_{r=1}^n a_{ir}b_{rj}$$

1. C -ல் உள்ள திரைகள் = $m = A$ -ல் உள்ள திரைகள்.
2. C -ல் உள்ள நிரல்கள் = $p = B$ -ல் உள்ள நிரல்கள்.
3. A -ல் உள்ள நிரல்கள் = $n = B$ -ல் உள்ள திரைகள். எவ்வாறு கவனிக்கவும்.

உதாரணம் :

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \end{bmatrix}$$

$$B = \begin{bmatrix} 7 & 10 \\ 8 & 11 \\ 9 & 12 \end{bmatrix}$$

A -ல் உள்ள நிரல்கள் = 2 = B -ல் உள்ள திரைகள்

$\therefore AB$ பெருக்க இயலத்தகு.

$A = 2 \times 3$ அணி; $B = 3 \times 2$ அணி.

$\therefore AB = 2 \times 2$ அணி ஆகக் வேண்டும்.

$$AB = \begin{bmatrix} 1.7+2.8+3.9 & 1.10+2.11+3.12 \\ 4.7+5.8+6.9 & 4.10+5.11+6.12 \end{bmatrix}$$

$$\text{i.e. } AB = \begin{bmatrix} 50 & 65 \\ 122 & 167 \end{bmatrix} \text{ என்ற } 2 \times 2 \text{ அணி.}$$

2-10. அணிகளைப் பெருக்கல் (வேறு முறை):

$$A = m \times n \text{ அணி } [a_{ij}]$$

$$B = n \times p \text{ அணி } [b_{ij}] \text{ ஆக இருக்கட்டும்.}$$

$R_1, R_2, \dots, R_m$ என்பன A -ன் திரைகளாகவும்,

$C_1, C_2, \dots, C_p$ என்பன B -ன் திரைகளாகவும் இருக்கட்டும்.

$$\therefore R_i = [a_{i1} \ a_{i2} \ \dots \ a_{in}]$$

$$C_j = \begin{bmatrix} b_{1j} \\ b_{2j} \\ \vdots \\ b_{mj} \end{bmatrix}$$

$$\therefore R_i C_j = [a_{i1} \ a_{i2} \ \dots \ a_{in}] \begin{bmatrix} b_{1j} \\ b_{2j} \\ \vdots \\ b_{mj} \end{bmatrix}$$

$$i. e. \quad R_i C_j = a_{i1} b_{1j} + a_{i2} b_{2j} + \dots + a_{in} b_{nj}$$

இப்பொழுது

$$= \begin{bmatrix} R_1 \\ R_2 \\ \vdots \\ R_m \end{bmatrix} \text{ என்பத } m \times 1 \text{ அணி ஆகவும்,}$$

$B = [C_1 \ C_2 \ \dots \ C_p]$ என்ற $1 \times p$ அணி ஆகவும்
கொள்ளலாம்,

$$AB = \begin{bmatrix} R_1 \\ R_2 \\ \vdots \\ R_n \end{bmatrix} [C_1 \ C_2 \ \dots \ C_p]$$

$$\text{i.e. } AB = \begin{bmatrix} R_1 C_1 & R_1 C_2 & \dots & R_1 C_j & \dots & R_1 C_p \\ R_2 C_1 & R_2 C_2 & \dots & R_2 C_j & \dots & R_2 C_p \\ \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots \\ R_i C_1 & R_i C_2 & \dots & R_i C_j & \dots & R_i C_p \\ \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots \\ R_n C_1 & R_n C_2 & \dots & R_n C_j & \dots & R_n C_p \end{bmatrix}$$

என்று வரையறை செய்கிறோம்.

2.11. அணிகளின் பெருக்கலில் பரிமாற்று விதி பொருந்தாது.

அதாவது $AB \neq BA$

2.9-ல் கண்ட உதாரணத்தில் உள்ள

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \end{bmatrix} \text{ ஐயும், } B = \begin{bmatrix} 7 & 10 \\ 8 & 11 \\ 9 & 12 \end{bmatrix} \text{ ஐயும்}$$

எடுத்துக் கொள்வோம்.

B -ல் உள்ள நிரல்கள் = $3 = A$ -ல் உள்ள நிரல்கள்

$\therefore BA$ பெருக்க இயைந்தது.

மேலும் $B = 3 \times 3$ அணி; $A = 3 \times 3$ அணி

$\therefore BA = 3 \times 3$ அணி ஆதல் வேண்டும்.

$$BA = \begin{bmatrix} 7.1+10.4 & 7.2+10.5 & 7.3+10.6 \\ 8.1+11.4 & 8.2+11.5 & 8.3+11.6 \\ 9.1+12.4 & 9.2+12.5 & 9.3+12.6 \end{bmatrix}$$

$$i. e. BA = \begin{bmatrix} 47 & 64 & 81 \\ 52 & 71 & 90 \\ 57 & 78 & 99 \end{bmatrix}$$

என்ற 3×3 அணி.

ஆனால்

$$\begin{aligned} AB &= \begin{bmatrix} 1.7+2.9+3.9 & 1.10+2.11+3.12 \\ 4.7+5.8+6.9 & 4.10+5.11+6.12 \end{bmatrix} \\ &= \begin{bmatrix} 60 & 68 \\ 122 & 167 \end{bmatrix} \end{aligned}$$

என்ற 2×2 அணி எனப் பார்த்தோம்.

$\therefore AB \neq BA$.

குறிப்பு: AB ஐப் பெருக்க முடிந்தால், BA உம் பெருக்க இயைந்ததாக இருக்க வேண்டியதில்லை.

உதாரணமாக, $A = 1 \times 3$ அணி; $B = 3 \times 2$ அணி ஆக இருந்தால் A -ன் நிரல் = $3 = B$ -ன் நிரல்.

$\therefore AB$ பெருக்க இயைந்தது. இது 1×2 அணி ஆதல் வேண்டும்.

ஆனால் B -ன் திரை A -ன் திரைக்குச் சமம் அல்ல.

∴ BA தும் பெருக்க இயலாது.

எனவே, முறைப்படி பெருக்குவதன் அவசியத்தைக் கவனிக்கவும்.

அணியை அணியாகப் பெருக்கும்போது, நாம் சாதாரணமாகக் கொள்ளும் விதிகளுக்குப் புறம்பாக மேலும் பலவற்றைக் காண்கிறோம். இத்தரப் பாடத்தைப் படிக்கும் போக்கிலே 'எத்தெத்த விதிகள் இதிலும் உண்மையாக இருக்கும்?' என்பதுதான்.

ஆகவே சில விதிகள் பொருத்தவகிலும் என்னும் அதில் நாம் அதிர்ச்சி அடைபவோ, ஆச்சரியப்படவோ வேண்டியவதிலும், இவற்றை எதிர்பார்த்தே மேற்கொண்டு செல்வோம்.

2.12. $AB=0$ ஆனால் $A=0$ அல்லது $B=0$ ஆக இருக்க வேண்டியதில்லை.

உதாரணம் :

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 6 \end{bmatrix}; \quad B = \begin{bmatrix} 2 & -6 \\ -1 & 3 \end{bmatrix}$$

எனக் கொள்க.

$$\begin{aligned} AB &= \begin{bmatrix} 1 \cdot 2 + 2(-1) & 1(-6) + 2 \cdot 3 \\ 3 \cdot 2 + 6(-1) & 3(-6) + 6 \cdot 3 \end{bmatrix} \\ &= \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} = 0 \end{aligned}$$

2.13. நீக்கல் விதி (Cancellation Law)

இது அணிகளின் பெருக்கலுக்குப் பொருத்தது.

$AB = AC$ ஆனால் $B = C$ ஆக இருக்க வேண்டியதில்லை.

உதாரணம் :

$$A = \begin{bmatrix} 1 & -3 & 2 \\ 2 & 1 & -3 \\ 4 & -3 & -1 \end{bmatrix}; \quad B = \begin{bmatrix} 1 & 4 & 1 & 0 \\ 2 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & -2 & 1 & 2 \end{bmatrix}$$

$$C = \begin{bmatrix} 2 & 1 & -1 & -2 \\ 3 & -2 & -1 & -1 \\ 2 & -5 & -1 & 0 \end{bmatrix}$$

ஆக இருக்கட்டும். AB, AC ஐப் பெருக்கிப் பார்த்தால்

$$AB = AC \text{ ஆக இருக்கும்.}$$

ஆனால் $B \neq C$ என்பதைக் கவனி.

2.14. பூச்சியத்தால் பெருக்கல்

$A = m \times n$ அணி $[a_{ij}]$ ஆகவும், 0 என்பது $n \times q$ பூச்சிய அணி ஆகவும் இருக்கட்டும்.

AO பெருக்குதற்கு இயைத்தது என்பதைக் கவனி.

AO ஐப் பெருக்கிப் பார். 0 என்ற $m \times q$ பூச்சிய அணி கிடைக்கும். $\therefore AO = 0$

இதே விதமாக $OA = 0$ என்றும் நிரூபிக்கலாம்.

O, A -ன் தரங்கள் எவ்வாறு இருக்க வேண்டும்?

A உம் O உம் ஒரே தர சதுர அணிகளாய் இருத்தால் $AO = 0 = OA$ என்று சொல்லலாம்.

உதாரணம் :

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 1 & 3 & 2 \\ 1 & 4 & 3 \end{bmatrix}; \quad O = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

$$AO = \begin{bmatrix} 1.0+2.0+1.0 & 1.0+2.0+1.0 & 1.0+2.0+1.0 \\ 1.0+3.0+2.0 & 1.0+3.0+2.0 & 1.0+3.0+2.0 \\ 1.0+4.0+3.0 & 1.0+4.0+3.0 & 1.0+4.0+3.0 \end{bmatrix}$$

$$= \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} = 0$$

இதே மரதரி $0A=0$ என்னும் திருப்திக்கலாம்.

$$\therefore AO=0=0A.$$

2.15. நம பெருக்கல் விதிகள்

(i) $A(B+C) = AB+AC$ — இடப் பங்கீட்டு விதி

(ii) $(A+B)C = AC+BC$ — வலப் பங்கீட்டு விதி

(iii) $A(BC) = (AB)C$ — தொடர்பு விதி

(i) $A = [a_{ij}]_{m \times n}$; $B = [b_{ij}]_{n \times p}$; $C = [c_{ij}]_{n \times p}$ ஆக இருக்கட்டும்.

B ஏம், C ஏம் ஒரே தர அணிகள். ஆதலின் அவை கூட்டுதற்கு இயைத்தவை.

$\therefore B+C$ ஏம் $n \times p$ அணி ஆதல் வேண்டும்.

அணிகளின் கூட்டல் விதிப்படி,

$$B+C = [b_{ij} + c_{ij}]_{n \times p}$$

இப்பொழுது $A = m \times n$ அணி.

$\therefore A(B+C)$ பெருக்குதற்கு இயைத்தது. $A(B+C)$ ஆனது $m \times p$ அணி ஆதல் வேண்டும்.

2.9-ல் உள்ள பெருக்கல் விதிப்படி,

$$\begin{aligned} A(B+C)\text{-ன் } (i-j)\text{ ஆவது உறுப்பு} &= \sum_{r=1}^n a_{ir} (b_{rj} + c_{rj}) \\ &= \sum_{r=1}^n (a_{ir} \cdot b_{rj} + a_{ir} \cdot c_{rj}) \dots \end{aligned}$$

(சரிதரண எண்களின் பங்கீட்டு விதிப்படி.)

$$= \sum_{r=1}^n a_r b_{rj} + \sum_{r=1}^n a_r b_{rj} \quad \dots \quad (1)$$

இப்பொழுது, AB என்பது பெருக்குதற்கு இயைத்தது என்றும், AB -ன் தரம் $m \times p$ என்றும், AB -ன் $(i-j)$ ஆவது உறுப்பு $\sum_{r=1}^n a_r b_{rj}$ என்றும் எளிதாக நிரூபிக்கலாம்.

இதேவிதமாக, AC யும் பெருக்க இயைத்தது. AC -ன் தரம் $m \times p$. AC -ன் $(i-j)$ ஆவது உறுப்பு $\sum_{r=1}^n a_r c_{rj}$

AB யும், AC யும் ஒரே தரமாக இருப்பதால் கூட்ட இயைத்தது.

கூட்டல் விதிப்படி $AB + AC$ -ன் $(i-j)$ ஆவது

$$\text{உறுப்பு} = \sum_{r=1}^n a_r b_{rj} + \sum_{r=1}^n a_r c_{rj} \quad \dots \quad (2)$$

(1), (2)-ல் இருந்து $A(B+C)$ -ன் $(i-j)$ ஆவது உறுப்பும், $AB+AC$ -ன் $(i-j)$ ஆவது உறுப்பும் சமம் என்று அறிவிக்கும்.

$$\therefore A(B+C) = AB+AC$$

(ii) உகிலன் பவிர்த்திகென விடப்பட்டது.

(iii) $A(BC) = (AB)C$ என நிரூபிப்போம்.

$A = [a_{ij}]_{m \times n}$; $B = [b_{ij}]_{n \times p}$; $C = [c_{ij}]_{p \times q}$ ஆக இருக்கட்டும்.

2-ம்-ல் உள்ளபடி BC பெருக்க இயைத்தது.

BC -ன் தரம் $n \times q$. இதன் $(i-j)$ ஆவது உறுப்பு

$$b_{11} c_{1j} + b_{12} c_{2j} + \dots \dots \dots + b_{1p} c_{pj}$$

$\therefore BC$ -ன் j ஆவது நிரலில் உள்ள உறுப்புகள் வகுமாறு :

$$b_{11} c_{1j} + b_{12} c_{2j} + \dots = \dots \dots + b_{1p} c_{pj}$$

$$b_{21} c_{1j} + b_{22} c_{2j} + \dots \dots \dots + b_{2p} c_{pj}$$

$$b_{n1} c_{1j} + b_{n2} c_{2j} + \dots + b_{np} c_{pj}$$

$$A\text{-ன் } i\text{-ஆவது நிரை } a_{i1} \ a_{i2} \ \dots \dots \dots a_{in}$$

A யும் (BC) யும் பெருக்க இயைந்தன.

$\therefore A$ -ன் தரம் $m \times n$, (BC) -ன் தரம் $n \times p$. மேலும் $A(BC)$ -ன் தரம் $m \times p$ ஆக இருக்கவேண்டும்.

இப்பொழுது $A(BC)$ -ன் $(i-j)$ ஆவது உறுப்பு கீழ்க் கண்டவாறு இருக்கவேண்டும்.

$$\begin{aligned} & a_{i1} (b_{11} c_{1j} + b_{12} c_{2j} + \dots + b_{1p} c_{pj}) \\ & + a_{i2} (b_{21} c_{1j} + b_{22} c_{2j} + \dots + b_{2p} c_{pj}) \\ & + \dots + a_{in} (b_{n1} c_{1j} + b_{n2} c_{2j} + \dots + b_{np} c_{pj}) \\ & = (a_{i1} b_{11} + a_{i2} b_{21} + \dots + a_{in} b_{n1}) c_{1j} \\ & + (a_{i1} b_{12} + a_{i2} b_{22} + \dots + a_{in} b_{n2}) c_{2j} \\ & + \dots + (a_{i1} b_{1p} + a_{i2} b_{2p} + \dots + a_{in} b_{np}) c_{pj} \end{aligned}$$

ஆனால், இதுவே $(AB)C$ -ன் $(i-j)$ ஆவது உறுப்புமாகும். ஏனெனில் (AB) -ன் i ஆவது நிரை

$$\sum_{r=1}^n (a_{ir} b_{r1}) \quad \sum_{r=1}^n (a_{ir} b_{r2}) \dots \dots \dots \sum_{r=1}^n (a_{ir} b_{rp})$$

$$C\text{-ன் } j\text{-ஆவது நிரை} \begin{bmatrix} c_{1j} \\ c_{2j} \\ \vdots \\ c_{pj} \end{bmatrix}$$

$$\begin{aligned} \therefore (AB)C\text{-ன் } (i-j)\text{-ஆவது உறுப்பு} \\ = A(BC)\text{-ன் } (i-j)\text{-ஆவது உறுப்பு.} \end{aligned}$$

$$\therefore A(BC) = (AB)C.$$

2-16. அணிகளின் மீற அடுக்கு விதிகள்

A என்பது ஒரு சதுர அணி என்றும்

$$(i) \quad A^m \cdot A^n = A^{m+n} = A^n \cdot A^m$$

$$(ii) \quad (A^n)^m = A^{nm}$$

$$(iii) \quad AB = BA \text{ ஆனால் } (AB)^n = A^n B^n$$

நிறுபணம்: (i) A ஒரு சதுர அணிவாக இருந்தால்தான் AA அல்லது A^2 பொருக்க இயலத்தக்க இருக்கும்.

இப்பொழுது, $A^n = A \cdot A \cdot A \dots \dots \dots n$ தடவை;

$$A^n = A \cdot A \cdot A \dots \dots \dots n \text{ தடவை}$$

என வரையறை செய்வோம்.

$$\begin{aligned} \therefore A^m \cdot A^n &= (A \cdot A \dots \dots \dots m \text{ தடவை}) (A \cdot A \dots \dots \dots n \text{ தடவை}) \\ &= A \cdot A \dots \dots (m+n) \text{ தடவை} \\ &\quad [2-15 (iii)-ல் உள்ள தொடர்பு விதிப்படி.] \\ &= A^{m+n}, \end{aligned}$$

இதேவிதமாக $A^n \cdot A^m = A^{n+m}$

$$\therefore A^m \cdot A^n = A^{m+n} = A^n \cdot A^m$$

இப்பொழுது, $A^0 = I$ என வரையறை செய்வோம்.

$A^n I = A^n = I \cdot A^n$ என்பது அவரு அணியின் பண்பாகும்.

$$\therefore A^n \cdot A^0 = A^{n+0} = A^n \text{ என்பதும்,}$$

$$A^0 \cdot A^n = A^{0+n} = A^n \text{ என்பதும்,}$$

$A^0 = I$ ஆக இருப்பதால் பொருத்தமாயிருப்பதைக் கவனிக்கவும்.

$$\begin{aligned} (ii) \quad (A^n)^m &= A^n \cdot A^n \dots \dots \dots n \text{ தடவை} \\ &= (A \cdot A \dots \dots \dots m \text{ தடவை}) \\ &\quad \times (A \cdot A \dots \dots \dots m \text{ தடவை}) \\ &\quad \times \dots \dots \dots n \text{ தடவைகள்} \end{aligned}$$

A ஐ D ஆல் மூன் பெருக்கி, P என்னும் அணி கிடைத்தால் — அதாவது,

$$P = DA \text{ என இருத்தால்,}$$

$$p_{ij} = \sum_{r=1}^n d_{ir} a_{rj} \dots \dots \dots \text{உ.உ-ல் உள்ளபடி.}$$

$$= d_{ii} a_{ij}$$

(இது முயலிவிட்ட அணி ஆனதால், $i \neq j$ ஆனால் $d_{ii} = 1$)

∴ P -ல் உள்ள i ஆவது நிரலில் உள்ள உறுப்புகள், A -ல் உள்ள i ஆவது நிரலில் உள்ள உறுப்புகள் d_{ii} ஆல் பெருக்கியதால் கிடைத்தவை.

இதேதனிதமாக, A ஐ D ஆல் மூன் பெருக்கினால் அதாவது $P = AD$ ஆனால், P -ல் உள்ள j ஆவது நிரலில் உள்ள உறுப்புகள், A -ல் உள்ள ஒத்த உறுப்புகள் d_{jj} ஆல் பெருக்கிக் கிடைத்தவை ஆகும்.

உதாரணம் :

$$A = \begin{bmatrix} d_1 & 0 & 0 \\ 0 & d_2 & 0 \\ 0 & 0 & d_3 \end{bmatrix} \quad \text{ஆகவும்,}$$

$$B = \begin{bmatrix} b_{11} & b_{12} & b_{13} \\ b_{21} & b_{22} & b_{23} \\ b_{31} & b_{32} & b_{33} \end{bmatrix} \quad \text{ஆகவும் இருத்தால்,}$$

$$AB = \begin{bmatrix} d_1 \times b_{11} & d_1 b_{12} & d_1 b_{13} \\ d_2 b_{21} & d_2 b_{22} & d_2 b_{23} \\ d_3 b_{31} & d_3 b_{32} & d_3 b_{33} \end{bmatrix} \quad \text{ஆகும்.}$$

B -ன் முதல் நிரலைய d_1 -ஆல் பெருக்கி AB -ன் முதல் நிரலும்,

.. 2ஆம் .. d_2 2ஆம் ..

.. 3ஆம் .. d_3 3ஆம் ..

கிடைக்கின்றன என்பதைக் கவனிக்கவும்.

2-18. இதிலிருந்து, “கெக்வேறு உறுப்புகள் கொண்ட ஒரு மூலையில்லாத அனியுடன் மலிவாற்று அனியாக இருக்கக் கூடியது மட்டுமே மூலையில்லாத அனிதான்” என நிரூபிப்போம்.

A என்ற உ-சதுர அனியும், D என்ற அதே தர மூலையில்லாத அனியும் $AD=DA$ என்பதற்கான க இருக்கட்டும். A ஒரு மூலையில்லாத அனி என நிரூபிக்க வேண்டும்.

DA -ல் $(i-j)$ ஆவது உறுப்பு $d_{jj} a_{ij}$ (2-17). இதே விதமாக, AD -ல் $(i-j)$ ஆவது உறுப்பு $d_{jj} a_{ij}$ என நிரூபித்துள்ளோம்.

இப்பொழுது $DA=AD$... கொள்க.

$$\therefore d_{jj} \cdot a_{ij} = d_{jj} \cdot a_{ij}$$

ஆனால் $d_{ii} \neq d_{jj}$ ($\because D$ கெக்வேறு உறுப்புகள் கொண்டது என்பது கொள்கை.)

$$\therefore i \neq j \text{ ஆனால், } a_{ij} = 0$$

$\therefore A$ என்பது மூலையில்லாத அனியாகத்தான் இருக்க வேண்டும்.

உதாரணம் 1 : மூலையில்லாத அனியாக மூன்று பெருக்கல்.

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & -3 & 0 \\ 0 & 0 & 5 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} -2 & 1 & 3 \\ 4 & 5 & 2 \\ 2 & 1 & 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -2 & 1 & 3 \\ -12 & -15 & -6 \\ 10 & 5 & 0 \end{bmatrix}$$

உதாரணம் 2 : மூலையில்லாத அனியாக மூன்று பெருக்கல்.

$$\begin{bmatrix} -2 & 1 & 3 \\ 4 & 5 & 2 \\ 2 & 1 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & -3 & 0 \\ 0 & 0 & 5 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -2 & -3 & 15 \\ 4 & -15 & 10 \\ 2 & -3 & 0 \end{bmatrix}$$

2-19. அளவை அனியாகப் பெருக்கல்

ஒர் அளவை அனியின் மூன்று உறுப்பு k ஆக இருக்கட்டும். இந்த அளவை அனியாக மூன்று அனியைப் பெருக்கினாலும், k என்ற எண்ணியாக (Scalar) அதே அனியைப் பெருக்கினாலும், ஒரே பெருக்கத் பலன் தான் கிடைக்கும்.

உதாரணமாக 2-17-ல் படி,

$$\begin{bmatrix} k & 0 & 0 \\ 0 & k & 0 \\ 0 & 0 & k \end{bmatrix} \begin{bmatrix} a & b & c \\ p & q & r \\ x & y & z \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} ka & kb & kc \\ kp & kq & kr \\ kx & ky & kz \end{bmatrix} \\ = A$$

மேலும் 2-18-ல் உள்ள எண்ணியல் பெருக்கல் விதிப்படி,

$$k \begin{bmatrix} a & b & c \\ p & q & r \\ x & y & z \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} ka & kb & kc \\ kp & kq & kr \\ kx & ky & kz \end{bmatrix} = B$$

$A = B$ என்பதைக் கவனித்தவும். இதிலிருந்து அளவை அணி வின் பெயர்க் காரணத்தையும் தெரித்து கொள்கிறோம்.

2-20. அளவு அணியால் பெருக்கல்

A என்பது $m \times n$ அணியாக இருக்கட்டும்.

$$A \cdot I_n = A = I_m \cdot A$$

உதாரணம் :

$$\begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \end{bmatrix}$$

$$\text{மேலும், } \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \end{bmatrix}$$

அளவு அணியின் ஏனைய சிதப்பாசன பண்புகள் :

(i) $I + I + I + \dots \dots k$ தடவை $= kI = k$ ஐ மூன்று உறுப்பாகக் கொண்ட அளவை அணி.

(ii) $I \cdot I \dots \dots k$ தடவை $= I$.

குறிப்பு : சாதாரண எண்களின் கூட்டலில் 0 இருப்பது போல், அணிகளின் கூட்டலில் பூச்சிய அணியும்; சாதாரண எண்களின் பெருக்கலில் 1 இருப்பதுபோல், அணிகளின் பெருக்கலில் அலகு அணியும் இருப்பதைக் கவனி.

2.21. இனி 'அணிகளின் பெருக்கலுக்கும், ஒரு வடிவிக் விதிநிபந்தனாக்கும் உள்ள சம்பந்தம் என்ன?' என்று பார்க்கோம்.

$$x_1 = a_{11}y_1 + a_{12}y_2 \quad \dots \quad \dots \quad (1)$$

$$x_2 = a_{21}y_1 + a_{22}y_2 \quad \dots \quad \dots \quad (2)$$

ஆக இருக்கட்டும். இந்த இரண்டு சமன்பாடுகளையும் அணி வடிவில் ஒரே சமன்பாடாக எழுதலாம்.

$$X = AY \quad \dots \quad \dots \quad I$$

$$\text{இதில் } X = \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix}; \quad A = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{bmatrix}; \quad Y = \begin{bmatrix} y_1 \\ y_2 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} y_1 \\ y_2 \end{bmatrix}$$

$$\text{அதாவது, } \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} a_{11}y_1 + a_{12}y_2 \\ a_{21}y_1 + a_{22}y_2 \end{bmatrix}$$

2.22-ல் உள்ள அணிகளின் சமன்பாட்டு விதிப்படி,

$$x_1 = a_{11}y_1 + a_{12}y_2$$

$$x_2 = a_{21}y_1 + a_{22}y_2$$

$$\text{இப்பொழுது, } Y = BZ \quad \dots \quad \dots \quad II$$

ஆக இருக்கட்டும்.

$$B = \begin{bmatrix} b_{11} & b_{12} \\ b_{21} & b_{22} \end{bmatrix}; \quad Z = \begin{bmatrix} z_1 \\ z_2 \end{bmatrix}$$

என இருக்கட்டும். ஒன்றாவது,

$$y_1 = b_{11}z_1 + b_{12}z_2 \quad \dots \quad \dots \quad (3)$$

$$y_2 = b_{21}z_1 + b_{22}z_2 \quad \dots \quad \dots \quad (4)$$

ஆக இருக்க வேண்டும்.

(1), (2), (3), (4)-ல் இருத்து

$$x_1 = a_{11}(b_{11}x_1 + b_{12}x_2) + a_{12}(b_{21}x_1 + b_{22}x_2)$$

$$(அ - து.) \quad x_1 = (a_{11}b_{11} + a_{12}b_{21})x_1 + (a_{11}b_{12} + a_{12}b_{22})x_2 \quad \dots (5)$$

$$x_2 = a_{21}(b_{11}x_1 + b_{12}x_2) + a_{22}(b_{21}x_1 + b_{22}x_2)$$

$$(அ - து.) \quad x_2 = (a_{21}b_{11} + a_{22}b_{21})x_1 + (a_{21}b_{12} + a_{22}b_{22})x_2 \quad \dots (6)$$

x_1 ஐயும் x_2 ஐயும் x_1, x_2 சார்பாகக் கண்டு பிடித்துள்ளோம். இப்பொழுது I, II-ல் இருத்து

$$X = ABZ \quad \dots \quad III$$

என்று எழுதலாம். அதாவது,

$$\begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} b_{11} & b_{12} \\ b_{21} & b_{22} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} a_{11}b_{11} + a_{12}b_{21} & a_{11}b_{12} + a_{12}b_{22} \\ a_{21}b_{11} + a_{22}b_{21} & a_{21}b_{12} + a_{22}b_{22} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} (a_{11}b_{11} + a_{12}b_{21})x_1 + (a_{11}b_{12} + a_{12}b_{22})x_2 \\ (a_{21}b_{11} + a_{22}b_{21})x_1 + (a_{21}b_{12} + a_{22}b_{22})x_2 \end{bmatrix}$$

$$\therefore x_1 = (a_{11}b_{11} + a_{12}b_{21})x_1 + (a_{11}b_{12} + a_{12}b_{22})x_2$$

$$x_2 = (a_{21}b_{11} + a_{22}b_{21})x_1 + (a_{21}b_{12} + a_{22}b_{22})x_2$$

இவை (5), (6) என்பதை நோக்குக. இவற்றிலிருந்து A, B என்ற அணிகளின் பெருக்கலை நாம் வரையறுத்துள்ளது எத்துணை பொருத்தமானது என்பதை உணர்க.

2-28. இதே விதமாக, “அணிகளின் கூட்டலுக்கும் ஒரு வடிவிக் மீதிவிடுதலுக்கும் உள்ள சம்பந்தம் என்ன?” என்று பாசுப்போம்.

$$x_1 = a_{11}x_1 + a_{12}x_2 \quad \dots \quad \dots \quad (1)$$

$$x_2 = a_{21}x_1 + a_{22}x_2 \quad \dots \quad \dots \quad (2)$$

என்னும் சமன்பாடுகளை $X = AZ$ என்று எழுதலாம்.

$$\text{இதில் } X = \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix}; A = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{bmatrix}; Z = \begin{bmatrix} z_1 \\ z_2 \end{bmatrix}$$

$$\text{எனவே } y_1 = b_{11}x_1 + b_{12}x_2 \quad \dots \quad \dots \quad \dots \quad (3)$$

$$y_2 = b_{21}x_1 + b_{22}x_2 \quad \dots \quad \dots \quad \dots \quad (4)$$

$$\text{என்னும் சமன்பாடுகளை } Y = BZ \quad \dots \quad \dots \quad //$$

$$\text{என்று எழுதலாம். இதில் } Y = \begin{bmatrix} y_1 \\ y_2 \end{bmatrix};$$

$$B = \begin{bmatrix} b_{11} & b_{12} \\ b_{21} & b_{22} \end{bmatrix}; Z = \begin{bmatrix} z_1 \\ z_2 \end{bmatrix}$$

இப்பொழுது,

$$(1)+(3), \quad x_1 + y_1 = (a_{11} + b_{11})z_1 + (a_{12} + b_{12})z_2 \quad \dots \quad (5)$$

$$(2)+(4), \quad x_2 + y_2 = (a_{21} + b_{21})z_1 + (a_{22} + b_{22})z_2 \quad \dots \quad (6)$$

$$(I) + (II) \quad X + Y = AZ + BZ$$

$$= (A + B)Z$$

அதாவது,

$$\begin{bmatrix} x_1 + y_1 \\ x_2 + y_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} a_{11} + b_{11} & a_{12} + b_{12} \\ a_{21} + b_{21} & a_{22} + b_{22} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} z_1 \\ z_2 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} x_1 + y_1 \\ x_2 + y_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} (a_{11} + b_{11})z_1 + (a_{12} + b_{12})z_2 \\ (a_{21} + b_{21})z_1 + (a_{22} + b_{22})z_2 \end{bmatrix}$$

∴ 2.2-ல் உள்ள அணிகளின் சமன்பாட்டு எதிழில் இருந்து, $x_1 + y_1 = (a_{11} + b_{11})z_1 + (a_{12} + b_{12})z_2$

$$x_2 + y_2 = (a_{21} + b_{21})z_1 + (a_{22} + b_{22})z_2.$$

இவை (5), (6) என்பதை நோக்குக. இதிலிருந்து $A + B$ என்ற அணிகளின் கூட்டில் நாம் வரையறுத்துள்ளது எத்துனை பொருத்தமானது என்பதை உணரிக.

2.23. சதுர அணியின் பல்லுறுப்புக் கோவைகளின் இயல் கணிதம் (Algebra of polynomial of a Square Matrix)

சாதாரண பல்லுறுப்புக் கோவைகளின் இயல் கணிதமும், அணியின் பல்லுறுப்புக் கோவைகளின் இயல் கணிதமும் ஒரே வகையைச் சேர்ந்தவை என்பது கீழே தற்படும் உதாரணத்தால் விளங்கும்.

$$x^2 - (\alpha + \beta)x + \alpha\beta = (x - \alpha)(x - \beta).$$

$$A^2 - (\alpha + \beta)A + \alpha\beta I = (A - \alpha I)(A - \beta I).$$

என்ற ஒற்றொருமைகளைக் கவனி.

பக்கீட்டு விதிகள் அணிகளுக்கும் பொருத்தம் என்பதும், $IA^k = A^k$, I என்பதும், $I^k = I$ என்பதும் தங்குத் தெரியும். A , I என்பன ஒரே தரச் சதுர அணிகள் எனக் கூறத் தேவையில்லை. சாதாரண கோவையில் உள்ள மாறாத உறுப்புக்குப் பதிலாக, அணிக்கோவையில் ஆகத் உறுப்பை I ஆகப் பெருக்குகிறோம் என்பதைக் கவனி.

பொதுவாக,

$$x^n + p_1 x^{n-1} + \dots + p_r = (x - \alpha_1)(x - \alpha_2) \dots \dots \dots (x - \alpha_r)$$

என்பதற்கேற்ப, அணிகளின் பல உறுப்புக் கோவைகளில்,

$$A^n + p_1 A^{n-1} + \dots + p_r = (A - \alpha_1 I)(A - \alpha_2 I) \dots \dots (A - \alpha_r I)$$

என்று எழுதலாம். இத்தக் கோவையின் படி n . இதன் தரம் A -ன் தரம், இதனை விடுவிப்பதால் கிடைக்கும் அணிகள் 'அனாவ அணி'களாக இருக்க வேண்டும் என்பதும் நோக்கத் தக்கது.

உதாரணம்: $A^2 + I = 0$ என்ற இரண்டாத்தர சமன் பாட்டை விடுவி.

இதன் தரம் 2; $\therefore A$ -ன் தரமும் 2 ஆக இருக்க வேண்டும்.

இப்பொழுது, $x^2 + 1 = 0$ என்ற சாதாரண சமன்பாட்டை விடுவிப்போம்.

அதாவது, $(x+1)(x^2-x+1)=0$

இதன் மூலங்கள் $-1, \frac{1+i\sqrt{3}}{2}, \frac{1-i\sqrt{3}}{2}$ ஆகும்.

∴ கொடுக்கப்பட்ட அணிக் கோவைச் சமன்பாட்டின் மூலங்கள் $-1, \frac{1+i\sqrt{3}}{2}, \frac{1-i\sqrt{3}}{2}$ ஆகும்.

$$\text{இவை } \begin{bmatrix} -1 & 0 \\ 0 & -1 \end{bmatrix}; \begin{bmatrix} \frac{1+i\sqrt{3}}{2} & 0 \\ 0 & \frac{1+i\sqrt{3}}{2} \end{bmatrix};$$

$$\begin{bmatrix} \frac{1-i\sqrt{3}}{2} & 0 \\ 0 & \frac{1-i\sqrt{3}}{2} \end{bmatrix} \text{ ஆகும்.}$$

மாழிரிக் கணக்குகள்

மாழிரி 1:

$a_{ij} = 3i - 2j$ என்றன 3-சதுர அணியை எழுது.

a_{ij} என்பதில் $i = 1, j = 1$

$$\therefore a_{11} = 3 \times 1 - 2 \times 1$$

$$\text{i.e. } a_{11} = 1.$$

இதே விதமாக $a_{12} = 3 \times 1 - 2 \times 2 = -1$;

$$a_{13} = -3; \quad a_{21} = 4, \quad a_{22} = 2,$$

$$a_{23} = 0; \quad a_{31} = 7, \quad a_{32} = 5, \quad a_{33} = 3.$$

$$\therefore \text{கேள்வியுள்ள 3-சதுர அணி} = \begin{bmatrix} 1 & -1 & -3 \\ 4 & 2 & 0 \\ 7 & 5 & 3 \end{bmatrix}$$

என்பது 2 :

$$3 \begin{bmatrix} 8 & x \\ 1 & 6 \end{bmatrix} + 2 \begin{bmatrix} 1 & y \\ w & y \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} z & 0 \\ 2 & 0 \end{bmatrix}$$

ஆனால் w, x, y, z எக் கண்டுபிடி.

$$\therefore \begin{bmatrix} 24 & 3x \\ 3 & 18 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 2 & 2y \\ 2w & 2y \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} z & 0 \\ 2 & 0 \end{bmatrix}$$

$$\text{i.e., } \begin{bmatrix} 26 & 3x + 2y \\ 3 + 2w & 18 + 2y \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} z & 0 \\ 2 & 0 \end{bmatrix}$$

$$\therefore \quad 26 = z \quad \dots \quad \dots \quad \dots \quad \dots \quad (1)$$

$$3x + 2y = 0 \quad \dots \quad \dots \quad \dots \quad \dots \quad (2)$$

$$3 + 2w = 2 \quad \dots \quad \dots \quad \dots \quad \dots \quad (3)$$

$$18 + 2y = 0 \quad \dots \quad \dots \quad \dots \quad \dots \quad (4)$$

$$w = -\frac{1}{2}, x=0, y = -9, z = 26$$

என்பது 3 [a]: $A = \begin{bmatrix} 6 & -18 \\ 2 & -6 \end{bmatrix}$ ஆனால்,

$$A^2 = 0 \text{ என காண.}$$

$$\begin{aligned} A^2 &= \begin{bmatrix} 6 & -18 \\ 2 & -6 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 6 & -18 \\ 2 & -6 \end{bmatrix} \\ &= \begin{bmatrix} 6 \cdot 6 + (-18) \cdot 2 & 6(-18) + (-18)(-6) \\ 2 \cdot 6 + (-6) \cdot 2 & 2(-18) + (-6)(-6) \end{bmatrix} \\ &= \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} = 0 \end{aligned}$$

குறிப்பு: $A = 0$ அல்ல. ஆனால், $A^2 = 0$.

பூச்சிய அடுக்கு அணி (Nil potent Matrix): A என்ற சதுர அணி $A^2 = 0$ என்றவாறு இருந்தால், A ஐ k -பூச்சிய அடுக்கு அணி என்று சொல்வோம்.

மாதிரி 3 (b): $A^2 = 0$ என்று இருந்தால்,

$$A = \begin{bmatrix} a & b \\ -a & -b \end{bmatrix} \text{ என இருக்க வேண்டும் என்று நினை.}$$

$$A = \begin{bmatrix} p & q \\ r & s \end{bmatrix} \text{ ஆக இருக்கட்டும்.}$$

$$A^2 = 0 \dots\dots\dots \text{கொள்கை.}$$

$$\therefore \begin{bmatrix} p & q \\ r & s \end{bmatrix} \begin{bmatrix} p & q \\ r & s \end{bmatrix} = 0$$

$$\text{அதாவது } \begin{bmatrix} p^2 + qr & pq + qs \\ rp + sr & rq + s^2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}$$

$$\therefore p^2 + qr = 0 \quad \dots \quad \dots \quad \dots \quad (1)$$

$$pq + qs = 0 \quad \dots \quad \dots \quad \dots \quad (2)$$

$$rp + sr = 0 \quad \dots \quad \dots \quad \dots \quad (3)$$

$$rq + s^2 = 0 \quad \dots \quad \dots \quad \dots \quad (4)$$

$$(1), (4)\text{-ல் இருந்து } p^2 - s^2 = 0 \quad \therefore p = \pm s$$

முதல் வகை: $p = s$ ஆக இருக்கட்டும்,

$$\therefore q - 0 = r \quad \dots \quad \dots \quad (2), (3)\text{-ல் இருந்து}$$

$$\therefore p - 0 = s \quad \dots \quad \dots \quad (1), (4)\text{-ல் இருந்து}$$

இது $A = 0$ என்றும் கொள்கைக்கு முரணான முடிவுக்கு வருகிறது.

இரண்டாம் வகை: $p = -s$ ஆக இருக்கட்டும். இப்பொழுது, q, r க்கு எந்த மதிப்பு கொடுத்தாலும் (2), (3) பொருந்தும். ஆகையால் p, q, r ஐ $p^2 + qr = 0$ என்பதற்கிணங்க தேர்ந்தெடுத்தால் போதும்.

$s = -p$ ஆகவும் இருக்க வேண்டும். மாதிரி 3-ல் உள்ள A இத்தகையது என்பதைக் கவனி.

மாணி 4 :

$$A = \begin{bmatrix} i & 0 & 0 \\ 0 & 0 & i \\ 0 & -i & 0 \end{bmatrix} \quad \text{ஆனால்}$$

$A^2 = I$ எனக் காண்பி.

$$\begin{aligned} A^2 &= \begin{bmatrix} i & 0 & 0 \\ 0 & 0 & i \\ 0 & -i & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} i & 0 & 0 \\ 0 & 0 & i \\ 0 & -i & 0 \end{bmatrix} \\ &= \begin{bmatrix} i & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} = I. \end{aligned}$$

$$\therefore A^4 = A^2 \cdot A^2 = I \cdot I = I.$$

மாணி 5 :

$$I = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}; \quad i = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{bmatrix}$$

$$E(\theta) = \begin{bmatrix} \cos \theta & \sin \theta \\ -\sin \theta & \cos \theta \end{bmatrix} \quad \text{ஆனால்}$$

- (i) $E(\theta) = I \cos \theta + i \sin \theta$ (ii) $E(\alpha) \cdot E(\beta) = E(\alpha + \beta)$
 (iii) $\{E(\theta)\}^n = E(n\theta)$ என நிரூபி.

$$\begin{aligned}
 (i) \quad I \cos \theta &= \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \cos \theta \\
 &= \begin{bmatrix} \cos \theta \times 1 & \cos \theta \times 0 \\ \cos \theta \times 0 & \cos \theta \times 1 \end{bmatrix} \\
 &= \begin{bmatrix} \cos \theta & 0 \\ 0 & \cos \theta \end{bmatrix}
 \end{aligned}$$

இதே போல்,

$$i \sin \theta = \begin{bmatrix} 0 & \sin \theta \\ -\sin \theta & 0 \end{bmatrix}$$

$$\begin{aligned}
 \therefore I \cos \theta + i \sin \theta &= \begin{bmatrix} \cos \theta + 0 & 0 + \sin \theta \\ 0 + (-\sin \theta) & \cos \theta + 0 \end{bmatrix} \\
 &= \begin{bmatrix} \cos \theta & \sin \theta \\ -\sin \theta & \cos \theta \end{bmatrix} = E(\theta)
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 (ii) \quad E(\alpha) \cdot E(\beta) &= \begin{bmatrix} \cos \alpha & \sin \alpha \\ -\sin \alpha & \cos \alpha \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \cos \beta & \sin \beta \\ -\sin \beta & \cos \beta \end{bmatrix} \\
 &= \begin{bmatrix} \cos \alpha \cos \beta + \sin \alpha (-\sin \beta) & \cos \alpha \sin \beta + \sin \alpha \cos \beta \\ -\sin \alpha \cos \beta + \cos \alpha (-\sin \beta) & -\sin \alpha \sin \beta + \cos \alpha \cos \beta \end{bmatrix} \\
 &= \begin{bmatrix} \cos(\alpha + \beta) & \sin(\alpha + \beta) \\ -\sin(\alpha + \beta) & \cos(\alpha + \beta) \end{bmatrix} = E(\alpha + \beta).
 \end{aligned}$$

(iii) இதை Induction என்னும் தொகுத்தல் முறையில் சொல்வோம்.

(ii)-ல் $\alpha = \beta = 0$ என இருத்தால்,

$$\{E(0)\}^2 = E(2\theta) \text{ எனக் கிடைக்கும்.} \quad \dots \quad (1)$$

இப்பொழுது $\{E(0)\}^3 = E(n\theta)$ எனக் கொள்வோம். ... (2)

$$\begin{aligned} \text{அப்படியானால் } \{E(0)\}^{n+1} &= \{E(0)\}^n \cdot E(0) \\ &= E(n\theta) \cdot E(0) \dots \dots (2)\text{-ல் இருந்து} \\ &= E(n\theta + 0). \end{aligned}$$

(ii)-ல் இருந்து $\alpha = n\theta$ என்றும், $\beta = 0$ என்றும் கொள்.

$$\therefore \{E(0)\}^{n+1} = E\{(n+1)\theta\}$$

ஆகவே, இந்தத் தேற்றம் n க்கு உண்மையாக இருத்தால் $(n+1)$ க்கு உண்மையாக இருக்க வேண்டும். ஆனால் இது $n=2$ ஆக இருக்கும்போது உண்மையென நிரூபித்துள்ளோம். ஆதலால் இது $2+1=3$ ஆக இருக்கும் போது உண்மையாக இருக்க வேண்டும். அதன் விளைவாக $3+1=4$ க்கும், இவ்வாறு எல்லா தேர் முழு எண்களுக்கும் உண்மையாக இருக்க வேண்டும்.

மாதிரி 6 :

$$A = \begin{bmatrix} i & 0 \\ 0 & -i \end{bmatrix}; B = \begin{bmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}; C = \begin{bmatrix} 0 & i \\ i & 0 \end{bmatrix}$$

ஆனால்,

$$(i) \quad A^2 = B^2 = C^2 = I \quad \dots \quad (1)$$

$$(ii) \quad AB + BA = 0 = BC + CB = CA + AC \quad \dots \quad (2)$$

$$(iii) \quad D = kI + lA + mB + nC \text{ ஆனால்}$$

$$D(2kI - D) = (k^2 + l^2 + m^2 + n^2)I \text{ என நிகழி.}$$

(i)-ல், (ii)-ல் உங்கள் பரிந்துரிக்கை விடப்பட்டுள்ளன.

குறிப்பு : $AB = -BA$ என இருப்பதால் இந்த அணிகளை எதிர் பரிமாற்று அணிகள் (Anti commutative Matrices) என்று சொல்வோம்.

$$(iii) \quad D = kI + lA + mB + nC \text{ (கொடுக்கப்பட்டது.)}$$

$$\therefore -IA - mB - nC = kI - D$$

$$\therefore kI - IA - mB - nC = 2kI - D$$

$$\begin{aligned}\therefore D(2kI - D) &= (kI + IA + mB + nC)(kI - IA - mB - nC) \\ &= k^2I - kI\{IA + mB + nC\} + IA + mB + nC\} kI \\ &\quad - (IA + mB + nC)(IA + mB + nC)\end{aligned}$$

இது பங்கிட்டு விதிவிலக்க ஆகும்.

$$= k^2I - (IA + mB + nC)(IA + mB + nC)$$

$$[\therefore IA = A = AI \text{ முதலியன.}]$$

$$\begin{aligned}&= k^2I - \{l^2A^2 + lmAB + lnAC + mlBA + m^2B^2 + mnBC \\ &\quad + nlCA + nmCB + n^2C^2\} \\ &= k^2I - \{l^2A^2 + m^2B^2 + n^2C^2\}\end{aligned}$$

$\therefore$ இவை எதிர் பரிமாற்று அணிகள்

$$= (k^2 + l^2 + m^2 + n^2)I$$

$\therefore$ (i)-ன் படி $A^2 = -I$ முதலியன.

எடுத்து 7:

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 3 & 0 & -1 \\ 2 & 2 & 1 & 3 \\ 3 & 1 & 0 & 0 \\ 4 & -2 & 1 & -1 \\ 5 & 0 & 2 & 1 \end{bmatrix}^{-1}$$

$$B = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 3 & 1 & 0 \\ 5 & -1 & 3 \\ 7 & -2 & 0 \end{bmatrix} : AB = C \text{ ஆனால்}$$

C_{11}, C_{12}, C_{21} இக் கண்டுபிடி.

A என்பது 5×4 அணி. B ஆனது 4×3 அணி. எனவே, இவை பெருக்குக்கு இயலத்தவை என்றும், C என்பது 5×3 அணி ஆக இருக்க வேண்டும் என்றும் அறிகிறோம்.

இப்பொழுது, C_{11} என்பது A-ல் உள்ள 2ஆவது நிரலையும், B-ல் உள்ள 2ஆவது திரிலையும் பெருக்கிக் கிடைப்பதாகும்.

$$\therefore C_{11} = \begin{bmatrix} 2 & 1 & -1 & 2 \end{bmatrix}$$

$$= 2 \times 2 + 1 \times 1 + 0 \times (-1) + 0 \times (-2)$$

$$= 7$$

$$\text{இதே விதமாக } C_{12} = 2.2 + 2.0 + 1.2 + 2.0 = 8$$

$$C_{13} = 2.2 + 2.1 + 1(-1) + 2(-2) = -1$$

மாதிரி 3: கீழ்வரும் ஒரு மடிவில் உள்ள சமன்பாடுகளின் தொகுதியை அணி மடிவில் எழுதுக :

$$y_1 = 3x_1 + 2x_2 - x_3 \quad \dots \quad \dots \quad (1)$$

$$y_2 = 2x_1 + 4x_2 + x_3 \quad \dots \quad \dots \quad (2)$$

$$y_3 = 4x_1 - x_2 \quad \dots \quad \dots \quad (3)$$

கிடை :
$$\begin{bmatrix} y_1 \\ y_2 \\ y_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 3 & 2 & -1 \\ 2 & 4 & 1 \\ 4 & -1 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix}$$

ஏனென்றும்
$$\begin{bmatrix} y_1 \\ y_2 \\ y_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 3x_1 + 2x_2 - x_3 \\ 2x_1 + 4x_2 + x_3 \\ 4x_1 - x_2 + 0 \end{bmatrix}$$

$\therefore$ 2.2-ல் உள்ள அணிகளின் சமன்பாட்டு விதியில் இருத்து (1), (2), (3) கிடைக்கும்.

குறிப்பு :

$$\begin{bmatrix} 3 & 2 & -1 \\ 2 & 4 & 1 \\ 4 & -1 & 0 \end{bmatrix} \quad \text{என்ற அணி}$$

கொடுக்கப்பட்ட சமன்பாடுகளில் உள்ள குணகங்களை முறைப்படி எழுதக் கிடைத்ததாலும்.

மாநி 9 : A என்ற சதுர அணி $A^2 = I$ என்பதற்கிணங்க இருத்தால் அதைத் தன்னெதிர் அணி (Involutory Matrix) என்று சொல்லலாம்.

A ஒரு தன்னெதிர் அணி ஆனால் $(I + A)(I - A) = 0$ என நினை. இதன் மறுதலிப்பைப் நிரூபி.

$$\begin{aligned} (I + A)(I - A) &= I^2 - IA + AI - A^2 \\ &= I - A + A - A^2 \\ &= I - A^2 = 0 \quad \because A^2 = I \text{ (கொள்கை)} \end{aligned}$$

இப்பொழுது $(I + A)(I - A) = 0$ ஆக இருக்கட்டும்.

முன்மாதிரி, $I - A^2 = 0$

அதாவது $A^2 = I$

$\therefore A$ ஒரு தன்னெதிர் அணி

மாநி 10 : கய அடுக்கு அணி (Idempotent Matrix): A என்ற சதுர அணி $A^2 = A$ என்பதற்கிணங்க இருத்தால் அதை k -கய அடுக்கு அணி என்று சொல்வோம்.

உதாரணம் :

$$A = \begin{bmatrix} 1 & -2 & -6 \\ -3 & 2 & 9 \\ 2 & 0 & -3 \end{bmatrix} \quad \text{ஆனால்,}$$

$$A^2 = A$$

$$\therefore A^2 = \begin{bmatrix} 1 & -2 & -6 \\ -3 & 2 & 9 \\ 2 & 0 & -3 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & -2 & -6 \\ -3 & 2 & 9 \\ 2 & 0 & -3 \end{bmatrix}$$

$$= \begin{bmatrix} 1+6-12 & -2-4+0 & -6-18+18 \\ -9-6+18 & 6+4+0 & 18+18-27 \\ 2+0-6 & -4+0+0 & -12+0+9 \end{bmatrix}$$

$$A^2 = \begin{bmatrix} -5 & -6 & -6 \\ 3 & 10 & 9 \\ -4 & -4 & -3 \end{bmatrix}$$

$$\therefore A^3 = \begin{bmatrix} -5 & -6 & -6 \\ 3 & 10 & 9 \\ -4 & -4 & -3 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & -2 & -6 \\ -3 & 2 & 9 \\ 2 & 0 & -3 \end{bmatrix}$$

$$= \begin{bmatrix} -5+18-12 & 10-12+0 & 30-34+18 \\ 9-30+18 & -18+20+0 & -34+90-27 \\ -4+12-6 & 8-8+0 & 24-38+9 \end{bmatrix}$$

$$= \begin{bmatrix} 1 & -2 & -6 \\ -3 & 2 & 9 \\ 2 & 0 & -3 \end{bmatrix} = A$$

மாதிரி 11: $A^3 = A$ என்றவாறுள்ள எந்தவா 4-துறு மூலிகை விட்ட அணிவகையும் கண்டுபிடி.

அ. அ. - 4

$$D = \begin{bmatrix} d_1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & d_2 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & d_3 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & d_4 \end{bmatrix}; \quad D^2 = D \dots \text{கொள்கை.}$$

$$\therefore \begin{bmatrix} d_1^2 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & d_2^2 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & d_3^2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & d_4^2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} d_1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & d_2 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & d_3 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & d_4 \end{bmatrix}$$

குறிப்பு: 2.17ஐப் பார்க்கவும்.

$\therefore$ 2.2-ல் உள்ள அணிகளின் சமன் பாட்டு விதிப்படி.

$$d_1^2 = d_1; \quad d_2^2 = d_2; \quad d_3^2 = d_3; \quad d_4^2 = d_4$$

$\therefore d_r = 0$ அல்லது 1. ($r=1, 2, 3, 4$)

எனவே, எல்லா முனைவிட்ட அணிகளையும் எழுதிவிடலாம்.

மாதிரி 12: A, B என்னும் அணிகள் கூட்டுவதற்கும், பெருக்குவதற்கும் இயைபுத்தவைபாக இருத்தால் அவை A தர சதுர அணிகளாக இருக்க வேண்டும் என திருடி.

A என்பது $m \times n$ அணிவாக இருக்கட்டும்.

A, B கூட்டுதற்கு இயைபுத்தவை கொள்கை.

$\therefore B$ என்பதும் $m \times n$ அணி ஆகக் வேண்டும். ... (1)

மேலும் A, B பெருக்குதற்கு இயைபுத்தவை.

$\therefore B$ என்பது $n \times p$ அணி ஆகக் வேண்டும். ... (2)

(1), (2)-ல் இருந்து $m=n$... (திரைகள் சமம்)

$n=p$... (திரைகள் சமம்)

$\therefore A$ யும் B யும் $n \times n$ சதுர அணிகள்.

பயிற்சி 2

1. பின்வரும் அணிகளை எழுது :

(i) $a_{ij} = 2i + 2j$ என்றால் 4 சதுர அணி.

(ii) $a_{ij} = i^2 + j^2$ என்றால் 3×2 அணி.

$$2. A = \begin{bmatrix} 2 & 3 & 0 \\ -1 & 2 & 2 \\ 0 & 1 & 1 \end{bmatrix}; B = \begin{bmatrix} 3 & 0 & 1 \\ 1 & 2 & 1 \\ -2 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

ஆனால், $A+B$, $A-B$, $2A+3B$ ஆகியவற்றைக் கண்டு பிடி.

$$3. A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & -3 \\ 5 & 0 & 2 \\ 1 & -1 & 1 \end{bmatrix}; B = \begin{bmatrix} 3 & -1 & 2 \\ 4 & 2 & 5 \\ 2 & 0 & 3 \end{bmatrix}$$

$$C = \begin{bmatrix} 4 & 1 & 2 \\ 0 & 3 & 2 \\ 1 & -2 & 3 \end{bmatrix} \text{ ஆனால்,}$$

(i) $A+B$, $A-C$ ஐக் கண்டுபிடி.

(ii) $A+(B-C) = (A+B)-C$ என நிரூபி.

(iii) $A+D = B$ என்றால் D ஐக் கண்டுபிடி.

4. A, B இரண்டாம் வரிசைகளில் உள்ள அணிகள் ;

$$C = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 2 \\ -1 & 1 & 1 \\ 0 & 2 & 1 \end{bmatrix} \text{ ஆனால்,}$$

$$(i) A + (B + C) = (A + B) + C$$

$$(ii) A(B - C) = AB - AC \text{ என பதிலிடு.}$$

$$6. \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \\ 5 & 6 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} -3 & -2 \\ 1 & -5 \\ 4 & 3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} p & q \\ r & s \\ t & u \end{bmatrix} = 0$$

எனலாக p, q, r, s, t, u -ன் மதிப்புகளைக் காண்பிவு.

$$8. \begin{bmatrix} 3 & 0 \\ -2 & y \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ x & z \end{bmatrix} = 2 \begin{bmatrix} w & y \\ 3 & 4 \end{bmatrix}$$

ஆனாக, w, x, y, z -ன் மதிப்புகள் என்ன?

$$7. A = \begin{bmatrix} 2 & 6 \\ 4 & 0 \end{bmatrix}; \quad B = \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix};$$

$AB = BA$ ஆனாக, B ஐக் காண்பிவு.

9. கீழ்க்கண்ட அணிகளில் AB, BA -களைக் காண்பிவு.

$$(i) A = \begin{bmatrix} 1 & -1 & 1 \\ -3 & 0 & -1 \\ -2 & 1 & 0 \end{bmatrix}; \quad B = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 4 & 6 \\ 1 & 2 & 3 \end{bmatrix}$$

$$(ii) A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 1 & 3 & 2 \\ 1 & 4 & 6 \end{bmatrix}; \quad B = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

$$(3) A = \begin{bmatrix} 2 & 1 & 3 & 1 \\ 1 & 2 & 1 & 2 \end{bmatrix}; \quad B = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 2 & 1 & 2 \\ 0 & 3 & 1 \\ 4 & -1 & 2 \end{bmatrix}$$

ஆனால் AB இல் கண்டுபிடி.

BA இல் பெருக்க முடியுமா? ஏன்?

10 இரண்டுமேல்(தீர்)முக்கோண அணிவழிப் பெருக்கினால் ஒரு மூலம் (தீர்) அணி கிடைக்கும் என நிரூபி.

$$11. \quad A = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 2 & 0 & 2 \\ 0 & -1 & 1 \\ -4 & 8 & 0 \end{bmatrix}; \quad B = \begin{bmatrix} 1 & 4 \\ 2 & 5 \\ 3 & 6 \end{bmatrix}$$

$AB = C$ ஆனால், C_{11} , C_{12} , C_{13} இல் கண்டுபிடி.

$$12. \quad A = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 \\ -1 & 0 & 2 \end{bmatrix}; \quad B = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 2 & 1 \\ 0 & 3 & 1 & 2 \\ -1 & 1 & 2 & -1 \end{bmatrix};$$

$$C = \begin{bmatrix} 4 \\ 2 \\ 2 \\ 1 \end{bmatrix} \quad \text{ஆனால், } (AB)C = A(BC) = ABC \quad \text{என நிரூபி.}$$

$$13. \quad A = \begin{bmatrix} 2 & -2 & -5 \\ -1 & 4 & 5 \\ 1 & -3 & -4 \end{bmatrix}; \quad B = \begin{bmatrix} -1 & 3 & 5 \\ 1 & -3 & -5 \\ -1 & 3 & 5 \end{bmatrix};$$

$$C = \begin{bmatrix} 2 & -2 & -4 \\ -1 & 3 & 4 \\ 1 & -2 & -3 \end{bmatrix} \quad \text{ஆனால்,}$$

(i) $AB=BA=0$, $AC=A$, $CA=C$ என்பவற்றை நிரூபி.

(ii) $ACB=CBA$, $A^2-B^2=(A-B)(A+B)$, $(A\pm B)^2=A^2+B^2$ என்பவற்றை நிரூபி.

14. கீழ்க்கண்ட அணிகளில் A^2 , A^3 , A^4 ஆகியவற்றை எழுதி.

$$(24) \quad A = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & w & w^2 \\ 1 & w^2 & w \end{bmatrix} \quad \left(w = e^{\frac{2\pi i}{3}} \right)$$

$$(25) \quad A = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & i & -1 & -i \\ 1 & -1 & 1 & -i \\ 1 & -i & -1 & i \end{bmatrix}$$

$$15. (26) \quad A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 2 \\ 2 & 1 & 2 \\ 2 & 2 & 1 \end{bmatrix} \quad \text{ஆகும்,}$$

$A^2-4A-5I=0$ என நிரூபி.

$$(27) \quad A = \begin{bmatrix} 2 & 1 & 3 \\ 1 & -1 & 2 \\ 1 & 2 & 1 \end{bmatrix} \quad \text{ஆகும்,}$$

$A^2-2A^3-3A=0$ என்றும்,

$A^2-2A-3I \neq 0$ என்றும் நிரூபி.

$$15. \quad \begin{bmatrix} -1 & -1 & -1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}^2 = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ -1 & -1 & -1 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}^2$$

$$= \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ -1 & -1 & -1 \end{bmatrix}^4 = I$$

என நிரூபி.

$$17. \quad (அ) \quad \begin{bmatrix} \lambda & 1 \\ 0 & \lambda \end{bmatrix}^n = \begin{bmatrix} \lambda^n & n\lambda^{n-1} \\ 0 & \lambda^n \end{bmatrix} \text{ என நிரூபி.}$$

$$(ஆ) \quad \begin{bmatrix} \lambda & 1 & 0 \\ 0 & \lambda & 1 \\ 0 & 0 & \lambda \end{bmatrix}^n$$

$$= \begin{bmatrix} \lambda^n & n\lambda^{n-1} & \frac{1}{2}n(n-1)\lambda^{n-2} \\ 0 & \lambda^n & n\lambda^{n-1} \\ 0 & 0 & \lambda^n \end{bmatrix}$$

என நிரூபி.

$$18. \quad A = \begin{bmatrix} a & b \\ 0 & 1 \end{bmatrix}; \quad a \neq 1 \quad \text{ஆகவுடன்,}$$

$$A^n = \begin{bmatrix} a_n & b_n \\ 0 & 1 \end{bmatrix}; \quad a_n = a^n, \quad b_n = \frac{b(a^n - 1)}{(a - 1)}$$

என நிரூபி.

$$19. \quad (i) \quad A = \begin{bmatrix} x & y & z \\ y & z & x \\ z & x & y \end{bmatrix}; \quad B = \begin{bmatrix} a & b & c \\ b & c & a \\ c & a & b \end{bmatrix}$$

$$C = \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix} \text{ ஆனால்,}$$

$$ABC = ax^2 + by^2 + cz^2 + 2fyz + 2gzx + 2hxy \text{ என தருகிறீர்.}$$

(ii) இதிலிருந்து மிகவும் இரண்டாம் வடிவில் உள்ள சமன்பாட்டான கோவைகளை ஆணிகளின் பெறுக்கத் பயனுடையனா?

$$(அ) \quad x^2 + 2y^2 + 3z^2 + 4yz + 5yz + 6zx$$

$$(ஆ) \quad 3x^2 + z^2 - 2xy + 4yz - 6zx$$

$$20. \quad A = \begin{bmatrix} a & b \\ b & a \end{bmatrix}; \quad B = \begin{bmatrix} c & d \\ d & c \end{bmatrix} \text{ ஆனால்,}$$

$$AB = BA \text{ என தருகிறீர்.}$$

$$\text{இதிலிருந்து, } (A+B)(A-B) = A^2 - B^2 \text{ என தருகிறீர்.}$$

சொதுவாக $(A+B)(A-B) = A^2 - B^2$ என இருக்குமா? ஏன்?

21. A, B என்பன இரண்டாம் கோவள்களில் உள்ள ஆணிகள் ஆனால் $AB \neq BA$ என தருகிறீர்.

$$22. \quad A = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}; \quad B = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{bmatrix} \text{ ஆனால்,}$$

$AB = -BA$ என தருகிறீர். இவ்வாறுள்ள ஆணிகளை எதிர் பரிமாற்று ஆணிகள் (Anti-commutative Matrices) என்று சொல்லுவோம்.

$$(i) \quad A^2 = B^2 = I \text{ எனவும்,}$$

$$(ii) \quad (A+B)^2 = A^2 + B^2 \text{ எனவும் தருகிறீர்.}$$

$$23. \quad A = \begin{bmatrix} 1 & -1 \\ 2 & -1 \end{bmatrix} \text{ உம், } B = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 4 & -1 \end{bmatrix} \text{ உம்}$$

எதிர் பரிமாற்று ஆணிகள் என தருகிறீர்.

$$24. \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{bmatrix}$$

- இவ்வணிகள் ஒன்றோடு ஒன்று எதிர் பரிமாற்று அணிகளாகும் என நிரூபி.

$$25. A = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{bmatrix}; B = \begin{bmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}$$

$$C = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix} \text{ என்பவை } 2 \times 2 \text{ அணிவகைகள்}$$

(i) $AB = -C$; $BC = -A$; $CA = -B$ என நிரூபி.

(ii) $n = 4k, 4k + 1, 4k + 2, 4k + 3$ என்பதற்கெல்லாம் $A^n = I, A, -I, -A$ ஆகும் என நிரூபி.

(iii) இதேபோலக் B^n ஐவும், C^n ஐவும் கண்டுபிடி.

$$26. A = \begin{bmatrix} 1 & 1 & -1 \\ -2 & 3 & 4 \\ 3 & -2 & 3 \end{bmatrix}; B = \begin{bmatrix} 2 & 0 & 2 \\ 7 & 6 & 2 \\ 3 & 7 & 3 \end{bmatrix}$$

$$C = \begin{bmatrix} 3 & 2 & 3 \\ 1 & -6 & -4 \\ -2 & -3 & -2 \end{bmatrix} \text{ ஆகும்,}$$

$AB = AC$ என நிரூபி. $B \neq C$ என்பதைக் காணி.

$$27. A = \begin{bmatrix} 2 & -2 & -4 \\ -1 & 3 & 4 \\ 1 & -2 & -3 \end{bmatrix} \text{ ஆகும்,}$$

$A^2 = A$ என நிரூபி.

இந்த அணிவகைக்குரிய சிதம்பர் பெயர்கள் எவை?

88. m, n என்டான இரு எண்ணிகள் (Scalars) ஆனும்,

$$(i) (m + n)A = mA + nA$$

$$(ii) m(A + B) = mA + mB$$

$$(iii) m(nA) = (mn)A \text{ என நிறுமி.}$$

$$89. A = \begin{bmatrix} 2 & -3 & -5 \\ -1 & 4 & 3 \\ 1 & -5 & -4 \end{bmatrix}; B = \begin{bmatrix} -1 & 3 & 5 \\ 1 & -2 & -5 \\ -1 & 3 & 5 \end{bmatrix}$$

ஆனால், A உம், B உம் சுய அடுக்கு அணிகள் என நிறுமி.

90. $AB=A, BA=B$ ஆனால் A உம், B உம் சுய அடுக்கு அணிகள் என நிறுமி.

91. A ஒரு சுய அடுக்கு அணி என்றால் $B=I \cdot A$ ஒரு சுய அடுக்கு அணி என்றும் அதனுடன் $AB=BA=0$ என்றும் நிறுமி.

92. A, B சுய அடுக்கு அணிகள் என்றால் $(A+B)$ என்ற அணி, $AB=BA=0$ ஆக இருத்தால்தான், சுய அடுக்கு அணி என இருக்கும் என நிறுமி.

$$93. \begin{bmatrix} 1 & -3 & -4 \\ -1 & 3 & 4 \\ 1 & -3 & -4 \end{bmatrix} \quad \text{ஒரு பூச்சிய அடுக்கு அணி என நிறுமி.}$$

$$94. \begin{bmatrix} 1 & 1 & 3 \\ 5 & 2 & 6 \\ -2 & -1 & -3 \end{bmatrix} \quad \text{ஒரு மூன்றாம் தர பூச்சிய அடுக்கு அணி என நிறுமி.}$$

95. A ஓர் இரண்டாம் தர (index 2) பூச்சிய அடுக்கு அணி என்றால் (அதாவது $A^2=0$ ஆனால்), $A(I+A)^2=A$ என்று நிறுமி.

96. A ஒரு தன்னெதிர்த்த அணி (involutary) (அதாவது $A^2=I$) என்றால் $\frac{1}{2}(I+A)$ உம், $\frac{1}{2}(I-A)$ உம் சுய அடுக்கு அணிகள் என்றும், $\frac{1}{2}(I+A) \cdot \frac{1}{2}(I-A)=0$ என்றும் நிறுமி.

37. இக் வகுப்பைவற்ற Induction என்னும் தொகுத்தல் முறையிடி செவிக.

$$(i) \quad A = \begin{bmatrix} 3 & -4 \\ 1 & -1 \end{bmatrix} \text{ ஆனும், } A^n = \begin{bmatrix} 1+2n & -4n \\ n & 1-2n \end{bmatrix}$$

$$(ii) \quad A = \begin{bmatrix} \cos hx & \sin hx \\ \sin hx & \cos hx \end{bmatrix} \text{ ஆனும்,}$$

$$A^n = \begin{bmatrix} \cos hnx & \sin hnx \\ \sin hnx & \cos hnx \end{bmatrix}$$

(ii) $A =$ மூலக்கூட்ட அணி (p, q, r) ஆனும்

$$A^n = \text{மூலக்கூட்ட அணி } (p^n, q^n, r^n) \text{ என தருகி.}$$

$$38. \quad A = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} \text{ ஆனும், } A^2 = 0 \text{ எனவும்,}$$

$$(aI + bA)^n = a^n I + n.a^{n-1}bA \text{ எனவும் தருகி.}$$

$$39. \quad A = \begin{bmatrix} 0 & -\tan \frac{\alpha}{2} \\ \tan \frac{\alpha}{2} & 0 \end{bmatrix} \text{ ஆனும்,}$$

$$I + A = (I - A) \begin{bmatrix} \cos \alpha & -\sin \alpha \\ \sin \alpha & \cos \alpha \end{bmatrix} \text{ என தருகி.}$$

40. A என்ற n -சதுர அணியில் மூலக்கூட்ட உறுப்புகள் 1. B என்ற n -சதுர அணியில் மூலக்கூட்ட உறுப்புகள் n ; மற்ற உறுப்புகள் $(n-r)$ என்றால்,

$$(i) \quad A^2 = nA$$

$$(ii) \quad B = (n-r)A + rI$$

$$(iii) \quad B^2 = r^2I + (n-r)(n^2 - nr + 2r)A$$

$$(iv) \quad (B-rI)[B^2 - (n^2 - nr + r)I] = 0 \text{ என தருகி.}$$

41. A ஒரு n -சதுர அணி, $B = rA + sI$ ஆனும் A, B டை மாற்ற அணிகள் என தருகி.

42. A உம் B உம் n -சதுர அணிகள் r_1, r_2, s_1, s_2 அளவைகள் (Scalars) $r_1, s_2 \neq r_2, s_1$ என்றும் $C_1 = r_1 A + s_1 B$ உம் $C_2 = r_2 A + s_2 B$ உம் பரிமாற்று அணிகளாக A உம் B உம் பரிமாற்று அணிகளாக இருக்க வேண்டும் என நிரூபி.

43. A, B என்பன இரு n -சதுர அணிகள். $A=KI, B=KI$ பரிமாற்று அணிகளானால் A உம் B உம் பரிமாற்று அணிகள் என நிரூபி. இதன் மறுதலையையும் நிரூபி.

44. $A =$ மூலக்கோடி அணி $(1, 2, 3)$. இதனுடன் பரிமாற்று அணிவாக இருக்கக் கூடிய அணியின் மொது மூலம் என்ன?

45. A, B பரிமாற்று அணிகள் ஆனும் $A^n=I, B^n=I$ பரிமாற்று அணிகள் என நிரூபி.

46.
$$\begin{bmatrix} \lambda & 1 & 0 \\ 0 & \lambda & 1 \\ 0 & 0 & \lambda \end{bmatrix}$$
 இவ்வணிவாண்டு பரிமாற்று அணிவாக இருக்கும் எல்லா அணிகளையும் கண்டுபிடி.

47.
$$\begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{bmatrix}$$
 இவ்வணிவாண்டு பரிமாற்று அணிகளாக

இருக்கும் எந்த இரண்டு அணிகளும் நங்கனாக்குள்ளே பரிமாற்று அணிகளாக இருக்கும் என நிரூபி.

48.
$$A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 3 & 2 & 0 \\ -1 & -1 & -1 \end{bmatrix}; B = \begin{bmatrix} -2 & -1 & 6 \\ 3 & 2 & 9 \\ -1 & -1 & -4 \end{bmatrix}$$

ஆனால் A உம் B உம் பரிமாற்று அணிகள் என நிரூபி.

49. ஒவ்வொரு n -சதுர அணியொன்றும் பரிமாற்று அணிகளாக இருக்கக் கூடியவை n -சதுர அளவை அணிகள்தாம் என நிரூபி.

50. B, A உடன் பரிமாற்று அணிவாக இருத்தால் அது A -க் உள்ள ஒவ்வொரு பல்லுறுப்புக் கோவைபுடனும் (Polynomial in A) பரிமாற்று அணிவாக இருக்கும் என நிரூபி.

அணிகளின் இயல் கணிதம்

51. ஒரு முனைப்பட்ட அணி, அதே தரமுள்ள எல்லா அணி களுடனும் பரிமாற்று அணிபாக இருந்தால் அது ஓர் அளவை அணி என நிரூபி.

52. இரண்டு அணிகளின் பெருக்குத்தொகை ஒரு பூச்சிய மக்காத அளவை அணிக்குச் சமமானால் கொடுக்கப்பட்ட இரண்டு அணிகளும் பரிமாற்று அணிகள் என நிரூபி.

53. கீழ் வருவனவற்றை நிரூபி.

$$(i) A(B-C) = AB-AC$$

$$(ii) (B-C)A = BA-CA$$

54. A, B பரிமாற்று அணிகளானால் $(A+B)^n = A^n + {}^nC_1 \cdot A^{n-1}B + \dots + {}^nC_r \cdot A^{n-r} \cdot B^r + \dots + B^n$ என நிரூபி.

55. A, B, C என்பன n -சதுர அணிகள். $C = A + B$; $AB = BA$; $B^2 = 0$ ஆனால்,

$$C^n = A^{n-1} [A + nB] \text{ என நிரூபி.}$$

$$56. A = \begin{bmatrix} p & lm & ln \\ lm & m^2 & mn \\ ln & mn & n^2 \end{bmatrix}; B = \begin{bmatrix} p^2 & pq & pq \\ pq & q^2 & qr \\ pq & qr & r^2 \end{bmatrix}$$

ஆகவும், $\Sigma p^2 = 1$, $\Sigma q^2 = 1$ ஆகவும் இருக்கட்டும். $AB=0$ ஆனால் $\Sigma p^2 = 0$ என நிரூபி.

(l, m, n ஐ ஒரு நேர்கோட்டில் திசைக் கோடுகளாகக் என்று கொள்வோம்.)

$$57. A = \begin{bmatrix} 0 & c & -b \\ -c & 0 & a \\ b & -a & 0 \end{bmatrix}; B = \begin{bmatrix} a^2 & ab & ac \\ ab & b^2 & bc \\ ac & bc & c^2 \end{bmatrix}$$

ஆனால், $AB = BA = 0$ என நிரூபி.

58. A என்பது ஒரு $m \times n$ அணி. AB வழி, BA வழியெடுத்த இ-யத்தையானால், B ஒரு $n \times m$ அணி என நிரூபி.

59. $A(\alpha) = \begin{bmatrix} \cos^2 \alpha & \cos \alpha \sin \alpha \\ \cos \alpha \sin \alpha & \sin^2 \alpha \end{bmatrix}$ ஆகவும்,

$A(\alpha) \cdot A(\beta) = 0$ ஆகவும் இருந்தால்,

$$|\alpha - \beta| = (2K + 1) \frac{\pi}{2} \text{ என நிரூபி.}$$

60. பின்வரும் சமன்பாடுகளை அணி வடிவில் வரைக.

(i) $x + y + z = 0, -x + x + 2z = 3, y + z = 4$

(ii) $x + y + z = 1, 2x + 3y + 4z = 5, x - z + 2 = 0$

61. $A^2 - 5A + 7I = 0$ என்கவும் அணிகளின் சமன் பாட்டினை விடுவதற்கு இரண்டாம் தர அணிகள் எவை?

$$\begin{bmatrix} 3 & 1 \\ -1 & 2 \end{bmatrix} \text{ என்பதும் ஒரு மூலம் என நிரூபி.}$$

62. $A^3 - 2A^2 - 9A = 0$ என்கவும் அணிகள் சமன் பாட்டை விடுவதற்கும் மூன்றாம் தர அளவை அணிகள் எவை?

$$\begin{bmatrix} 2 & 1 & 3 \\ 1 & -1 & 2 \\ 1 & 2 & 1 \end{bmatrix} \text{ என்பதும் ஒரு மூலம் என நிரூபி.}$$

63. $d_i = r$ என இருக்கும் வரைணம் $A = (d_1, d_2, \dots, d_n)$ என்ற மூலைவிட்ட அணி உள்ளது. $B_j (j = 1, 2, \dots, n)$ என்பவை n -தர மூலைவிட்ட அணிகள். ஒவ்வொரு B_j இலும்

$$r < j \text{ ஆனால் } d_i = 0$$

$$r > j \text{ ஆனால் } d_i = 1.$$

$$\text{அப்படி யானால் } A = \sum_{j=1}^n B_j \text{ என நிரூபி.}$$

விடைகள் :

$$1. (i) \begin{bmatrix} 5 & 7 & 9 & 11 \\ 8 & 10 & 12 & 14 \\ 11 & 13 & 15 & 17 \\ 14 & 16 & 18 & 20 \end{bmatrix} \quad 4 \times 4 \text{ அணி}$$

$$(ii) \begin{bmatrix} 2 & 5 \\ 6 & 8 \\ 10 & 13 \end{bmatrix}$$

$$2. A+B = \begin{bmatrix} 5 & 3 & 1 \\ 0 & 4 & 2 \\ -2 & 1 & 1 \end{bmatrix}; \quad A-B = \begin{bmatrix} -1 & 3 & -1 \\ -2 & 0 & 1 \\ 2 & 1 & 1 \end{bmatrix}$$

$$2A+3B = \begin{bmatrix} 13 & 8 & 3 \\ 1 & 10 & 7 \\ -3 & 2 & 2 \end{bmatrix}$$

$$3. (i) A+B = \begin{bmatrix} 4 & 1 & -1 \\ 9 & 2 & 7 \\ 3 & -1 & 4 \end{bmatrix}; \quad A-C = \begin{bmatrix} -3 & 1 & -5 \\ 5 & -3 & 0 \\ 0 & 1 & -2 \end{bmatrix}$$

$$(ii) D = \begin{bmatrix} 2 & -3 & 5 \\ -1 & 2 & 3 \\ 1 & 1 & 2 \end{bmatrix}$$

$$5. p=-2, \quad q=0, \quad r=4, \quad s=-1, \quad t=9, \quad u=9.$$

$$6. w=2, \quad y=1, \quad x=9 \quad z=7.$$

9. BA ஐப் பெறுகக் கூறுவாது. ஏனெனில் B -ன் தரம் 4×3 , A -ன் தரம் 3×4 .

B -ன் திரை = A -ன் திரை

B -ன் திரை $\pm A$ -ன் திரை.

$$11. C = \begin{bmatrix} 2 & 5 \\ 8 & 20 \\ 1 & 1 \\ 10 & 10 \end{bmatrix}; \quad C_{12} = 20 \quad C_{21} = 8 \quad C_{11} = 1.$$

$$10. (ii) \quad (-A) \begin{bmatrix} x & y & z \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 2 & 5 \\ 3 & 5 & 3 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix}$$

$$(-A) \begin{bmatrix} x & y & z \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 3 & -1 & -3 \\ -1 & 0 & 2 \\ -3 & 2 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix}$$

3. தொடர்புள்ள அணிகள்

(Matrices Associated with a Given Matrix)

3.1. நெடுப்பு அணி (Transpose of a Matrix)

A என்ற அணியில், நிரல்களை நிரல்களாகவும், நிரல்களை நிரல்களாகவும் மாற்றி அமைத்தால் கிடைக்கும் அணிக்கு A -ன் நெடுப்பு அணி என்பது பெயர். இதனை A^T அல்லது A' எனக் குறிப்பிடுவது வழக்கம்.

உதாரணம்: $A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 5 & 6 & 7 & 8 \end{bmatrix}$ ஆனால்,

$$A' = \begin{bmatrix} 1 & 5 \\ 2 & 6 \\ 3 & 7 \\ 4 & 8 \end{bmatrix} \text{ ஆகும்.}$$

குறிப்பு: (i) $A = m \times n$ அணி ஆனால், $A' = n \times m$ அணி ஆகும்.

(ii) A -ல் உள்ள $(i-j)$ ஆவது உறுப்பும்,

A' -ல் உள்ள $(j-i)$ ஆவது உறுப்பும் சமம்.

அதாவது, $a_{ij} = a'_{ji}$.

மேலே உள்ள உதாரணத்தில் $a_{23} = 7 = a'_{32}$

அ. அ.-5

3.2. தேற்றம் :

$$(i) (A')' = A$$

$$(ii) (A + B)' = A' + B'$$

$$(iii) (kA)' = k \cdot A'$$

(i) A என்பது $m \times n$ அணிவாக இருக்கட்டும்.

$\therefore A'$ என்பது $n \times m$ அணி ஆகத் வேண்டும்.

$\therefore (A')'$ என்பது $m \times n$ அணி ஆகும்.

எனவே, 2.1-ன்படி, A உம் $(A')'$ உம் ஒப்பிடத்தகு அணிகள்.

இப்போது, $A = A'$, $(A')'$ ஆகியவற்றின் $(i-j)$ ஆவது உறுப்பின் மூலையே a_{ij} , a'_{ij} , a''_{ij} ஆக இருக்கட்டும்.

அப்படியானால், $a_{ij} = a'_{ji} \quad \because A, A'$ திரிபு அணிகள்

மேலும், $a'_{ji} = a''_{ij} \quad \because A', (A')'$ திரிபு அணிகள்

$$\therefore a_{ij} = a''_{ij}$$

$$\therefore A = (A')'$$

(ii) உம், (iii) உம் உணிகள் பரிதரிக்கென விடப்பட்டுள்ளன.

3.3. தேற்றம்: இரு அணிகளின் பெருக்கற் பனனுடைய திரிபு அணிவானது, அவைகளுடைய திரிபு அணிகளின் மூல் பீள்களுக்கே பெருக்கற் பனனுக்குச் சமம்.

$$(AB)' = B'A'$$

திருபணம்: $A = m \times n$ அணி $[a_{ij}]$;

$$B = n \times p \text{ அணி } [b_{ij}]$$

ஆக இருக்கட்டும். $\therefore AB = m \times p$ அணி.

மேலும் $B' = p \times n$ அணி; $A' = n \times m$ அணி.

$$\therefore B'A' = p \times m \text{ அணி}$$

இப்பொழுது, A -ன் i -ஆவது திரை $a_{i1}, a_{i2}, \dots, a_{in}$

மேலும், B -ன் j -ஆவது திரை =

$$\begin{bmatrix} b_{1j} \\ b_{2j} \\ \vdots \\ b_{nj} \end{bmatrix}$$

$$\therefore AB\text{-ன் } (i-j)\text{-ஆவது உறுப்பு} = \sum_{r=1}^n a_{ir} b_{rj} \dots \quad (1)$$

அன்றி, B' -ன் j -ஆவது திரை $b_{1j}, b_{2j}, \dots, b_{nj}$

A' -ன் i -ஆவது திரை

$$\begin{bmatrix} a_{i1} \\ a_{i2} \\ \vdots \\ a_{in} \end{bmatrix}$$

$$\begin{aligned} \therefore B'A'\text{-ன் } (j-i)\text{-ஆவது உறுப்பு} &= b_{1j} \cdot a_{i1} + b_{2j} \cdot a_{i2} \\ &\quad + \dots + b_{nj} a_{in} \\ &= \sum_{r=1}^n a_{ir} b_{rj} \end{aligned}$$

$$= AB\text{-ன் } (i-j)\text{-ஆவது உறுப்பு} \dots [(1)\text{-ல் இருந்து}]$$

$\therefore B'A'$ ஆவது AB -ன் திரை, அணிவாகும்.

3.4. நேரத்தேற்றம்: $A_1, A_2, \dots, A_n$ என்ற அணிகளின் தாய், $A_1 A_2 \dots A_n$ பெருக்குதற்கு இயைத்தவறு இருந்தால், $(A_1 A_2 \dots A_n)' = A'_n A'_{n-1} \dots A'_1$.
தேயமானம்: $(A_1 A_2)' = A'_2 A'_1 \dots$ (3.3-ன் படி)

$\therefore n = 2$ ஆக இருந்தால் தேற்றம் உண்மையானது.

இப்பொழுது, n அணிகளின் பெருக்கல் திருப்பத்திற்குத் தேற்றம் உண்மை எனக் கொள்வோம்.

$$\therefore (A_1 A_2 \dots A_n)' = A'_n \cdot A'_{n-1} \dots A'_1 \dots (1)$$

$$\begin{aligned} \text{இப்பொழுது, } (A_1 A_2 \dots A_n A_{n+1}) \\ &= \{(A_1 A_2 \dots A_n) A_{n+1}\}' \dots \text{தொடர்பு விதி} \\ &= A'_{n+1} (A_1 A_2 \dots A_n)' \dots \text{B.B-ன்படி} \\ &= A'_{n+1} (A'_n \cdot A'_{n-1} \dots A'_1) \dots \text{கொள்கை (1)} \\ &= A'_{n+1} A'_n \dots A' \dots \text{தொடர்பு விதி} \end{aligned}$$

$\therefore$ தேற்றம், $(n+1)$ மதிப்புக்கும் உண்மையாகிறது. எனவே Induction என்னும் தொகுத்தறி முறைப்படி இத்தேற்றம் உண்மையாகும்.

ஒரு சதுர அணியின் நிரலணியாகப் பெருக்கெடுத்தல் திருப்பு அணி:

$$AX = B \text{ ஆனால் } X'A' = B'$$

உதாரணம் :

$$\begin{bmatrix} 1 & 3 & -1 \\ 2 & 2 & 5 \\ 0 & 1 & 4 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 4 \\ 21 \\ 22 \end{bmatrix} \dots (I)$$

என்ற இரக்கட்டும். இவற்றின் திருப்பு அணிகள்

$$[x_1 \ x_2 \ x_3] \begin{bmatrix} 1 & 2 & 0 \\ 3 & 2 & 1 \\ -1 & 5 & 4 \end{bmatrix} = [4 \ 21 \ 22] \dots (II)$$

என்றவாறு ஆகமையும்.

I, II-ல் இருத்து கிடைக்கும் இயல் கணித (algebraic) சமன்பாடுகள் ஒன்றே என்பதைக் கீழே காண்க.

$$x_1 + 3x_2 - x_3 = 4$$

$$2x_1 + 2x_2 + 5x_3 = 21$$

$$x_2 + 4x_3 = 22$$

3-5. சமச்சித அணி (Symmetric Matrix)

A என்பது n சதுர அணி, $A' = A$ என்பதற்கினையாக இருத்தால் A ஐச் சமச்சித அணி என்று சொல்வோம்.

$\therefore$ ஒரு சமச்சித அணியில், எவ்வா i க்கும், j க்கும், $a_{ij} = a_{ji}$ என இருக்கவேண்டும் என்பது தெளிவாகிறது.

உதாரணம் :

$$\begin{bmatrix} a & f & e \\ f & b & d \\ e & d & c \end{bmatrix}, \quad \begin{bmatrix} a & h & g \\ h & b & f \\ g & f & c \end{bmatrix}, \quad \begin{bmatrix} 1 & 8 & 6 \\ 8 & 2 & 4 \\ 6 & 4 & 3 \end{bmatrix}$$

3-6. தேற்றம் : A என்பது எதாவது ஒரு சதுர அணி ஆகும், $A + A'$ என்பது சமச்சித அணி ஆகும்.

$(A + A')$ -ன் $(i-j)$ ஆவது உறுப்பு $a_{ij} + a_{ji}$

$(A + A')$ -ன் $(j-i)$ ஆவது உறுப்பு $a_{ji} + a_{ij}$

ஆனால் $a_{ij} + a_{ji} = a_{ji} + a_{ij}$

$\therefore (A + A')$ ஒரு சமச்சித அணி

$$\begin{aligned} \text{மேறு ஒரே : } (A + A')' &= A' + (A')' & \because (A + B)' &= A' + B' \\ &= A' + A & \because (A')' &= A \\ &= A + A' & \because A + B &= B + A \end{aligned}$$

$\therefore A + A'$ ஒரு சமச்சித அணி.

3-7. தேற்றம் : A, B என்பன ஒரே தர சமச்சித அணிகளாகும் $(A + B)$ உம் ஒரு சமச்சித அணி ஆகும்.

$$\begin{aligned} (A + B)' &= A' + B' \\ &= A + B & \because A, B \text{ சமச்சித அணிகள்} \end{aligned}$$

$\therefore (A + B)$ ஒரு சமச்சித அணி.

3-8. A ஒரு சமச்சித அணியாகும் kA உம் ஒரு சமச்சித அணி ஆகும்.

$$\begin{aligned} (kA)' &= kA' \quad \dots \dots \dots [3-2 \text{ (iii)-ல் இருந்து}] \\ &= kA & \because A' &= A \end{aligned}$$

3-9. A ஏதாவது ஒர் அணிவாகும், (சதுர அணிவாக இருக்க வேண்டியதில்லை) AA' ஒரு சமச்சீர் அணி ஆகும்.

$$\begin{aligned} \text{ஏனென்றால், } (AA')' &= (A')' \cdot A' & \because (AB)' &= B'A' \\ &= AA' & \because (A')' &= A \end{aligned}$$

3-10. A ஒரு சமச்சீர் அணிவாகும் A^n ஒரு சமச்சீர் அணிவாகும்.

$$\begin{aligned} \text{ஏனென்றால், } (A^n)' &= (A \cdot A \cdots A)' & \because n \text{ தடவை} \\ &= (A' \cdot A' \cdots A') & \because n \text{ தடவை} \\ &= (A \cdot A \cdots A) & \because n \text{ தடவை} \\ &= A^n. \end{aligned}$$

3-11. இரு சமச்சீர் அணிகளின் பெருக்கற்பலன் சமச்சீர் அணிவாக இருக்க வேண்டியதில்லை.

இதை ஒர் உதாரணத்தால் எடுத்துக் காட்டுவோம் :

$$A = \begin{bmatrix} a & b \\ b & c \end{bmatrix}; \quad B = \begin{bmatrix} c & d \\ d & e \end{bmatrix}$$

என்பன சமச்சீர் அணிகள்.

ஆனால், $AB = \begin{bmatrix} ac+bd & ad+be \\ bc+cd & bd+ce \end{bmatrix}$ ஒரு சமச்சீர் அணி அல்ல.

இத்தகைய திருபணத்திற்கு 'மாறான எடுத்துக்காட்டால் திருமித்தல்' (Proof by counter-example) என்பது பெயர்.

3-12. ஒரு சமச்சீர் அணியின் (பொதுவாக) $\frac{n(n+1)}{2}$ உறுப்புகள் வெவ்வேறு இருக்கும்.

முதல் நிரையில் n உறுப்புகளும் வெவ்வேறு ஆகலாம்.

2 ஆம் நிரையில் $(n-1)$ உறுப்புகள்தான் வெவ்வேறு ஆகும்.

$$\therefore a_{11} = a_{12}$$

3 ஆம் நிரையில் $(n-2)$ உறுப்புகள்தான் வெவ்வேறு ஆகும்.

$$\therefore a_{21} = a_{13} \text{ \& } a_{31} = a_{22}$$

4 ஆம் நிலையில் $(n-8)$ உறுப்புகள்தான் வெகுவேறு ஆகும்.

∴

n ஆம் நிலையில் 1 உறுப்புகள் வேறு ஆகும்.

$$\therefore \text{மொத்தம் } 1 + 2 + 3 + \dots + n = \frac{n(n+1)}{2}$$

உறுப்புகள் வெகுவேறுக இருக்கும்.

3-13. A என்பது $n \times n$ அணிவானால், $B'AB$ உம் $n \times n$ அணி என்று தீர்வு.

A என்பது சமச்சீர் அணி ... (கொள்கை).

$$\therefore A' = A \dots\dots (i)$$

$$\begin{aligned} \text{இப்பொழுது, } (B'AB)' &= B'A'(B')' & \because (ABC)' &= C'B'A' \\ &= B'A'B & \because (B')' &= B \\ &= B'AB \dots\dots (i)\text{-ன் படி.} \end{aligned}$$

∴ $B'AB$ ஒரு சமச்சீர் அணி.

3-14. எதிர்ச்சீர் அணி (Skew Symmetric Matrix)

A என்ற சதுர அணி $A' = -A$ என்பதற்கிணங்க இருத்தால், அதை எதிர்ச்சீர் அணி என்று சொல்வோம்.

எனவே, ஓர் எதிர்ச்சீர் அணியில், எல்லா i க்கும் j க்கும் $a_{ji} = -a_{ij}$ என்றவாறு இருக்கவேண்டும் என்பது தெளிவாகிறது. மேலும், $i = j$ ஆனால், $a_{ii} = -a_{ii}$ என்று இருக்கவேண்டும்.

∴ $a_{ii} = 0$. அதாவது, மூலக்கோட்டில் உறுப்புகள் பூச்சியமாதம் வேண்டும்.

உதாரணம்:

$$\begin{bmatrix} 0 & a \\ -a & 0 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 0 & a & b \\ -a & 0 & c \\ -b & -c & 0 \end{bmatrix}$$

3-15. எதிர்ச்சி அணியில் உள்ள தேற்றங்களின் திருபணம் கள் சமச்சி அணியில் உள்ளவர்களுக்கும்போல் இருப்பதாக, அவை உங்கள் பரிசீலிக்கென விடப்பட்டுள்ளன.

தேற்றம் (i): A என்பது எதாவது ஒரு சதுர அணிவாகும் $A-A'$ என்பது எதிர்ச்சி அணிவாகும்.

தேற்றம் (ii): A, B என்பன ஒரே தர எதிர்ச்சி அணிகளாகும் $(A+B)$ உம் ஒர் எதிர்ச்சி அணி.

தேற்றம் (iii): A ஒர் எதிர்ச்சி அணிவாகும் kA உம் ஒர் எதிர்ச்சி அணி.

தேற்றம் (iv): A ஒர் எதிர்ச்சி அணிவாகும் AB உம் ஒர் எதிர்ச்சி அணி.

3-16. ஒர் எதிர்ச்சி அணியில் (பொதுவாக) $n^2 - n + 1$ உறுப்புகள் வெவ்வேறு இருக்கும்.

இதில் உள்ள மொத்த உறுப்புகள் n^2 . மூலக்கூறு உறுப்புகள் n -பூச்சியங்களாகும். இதில் ஒரு பூச்சியத்தை மட்டும் வேறு உறுப்பாகக் கருதலாம். $\therefore$ இதில் உள்ள வெவ்வேறு உறுப்புகள் $n^2 - n + 1$ ஆகும்.

3-17. தேற்றம்: எந்த சதுர அணிவாகும், ஒரு சமச்சி அணி ஏதன் ஒர் எதிர்ச்சி அணியாகக் கூட்டும் பெறக் கூடியதாக ஒரே வகையில் எழுதலாம்.

திருபணம்: A என்பது ஒரு சதுர அணிவாக இருக்கட்டும்.

எனவே, $A + A'$ ஒரு சமச்சி அணி 3-8

$\therefore \frac{A + A'}{2}$ ஒரு சமச்சி அணி 3-8

மேலும், $A - A'$ ஒர் எதிர்ச்சி அணி 3-15 (i)

$\therefore \frac{A - A'}{2}$ ஒர் எதிர்ச்சி அணி 3-15 (iii)

ஆகவே, $A = \frac{A + A'}{2} + \frac{A - A'}{2}$

∴ ஒரு சமச்சீர் அணி = ஒரு சமச்சீர் அணி + ஓர் எதிர்ச்சீர் அணி. இனி, இது ஒரே வழிதான் உண்டு என திருத்திப்போம். கூடுமானால், $A = R + S$ எனவும் இருக்கட்டும்.

R ஒரு சமச்சீர் அணி; S ஓர் எதிர்ச்சீர் அணி.

$R = \frac{A+A'}{2}$ எனவும், $S = \frac{A-A'}{2}$ எனவும் திருத்தித்தான் போதுமானது.

இப்பொழுது, $A = R + S$ கொள்கை ... (1)

$$\begin{aligned} \therefore A' &= (R + S)' \\ &= R' + S' \\ &= R - S \quad \dots \quad \dots \quad \dots \quad (2) \end{aligned}$$

∴ R ஒரு சமச்சீர் அணி; S ஓர் எதிர்ச்சீர் அணி.

$$(1) + (2): A + A' = 2R$$

$$\frac{A+A'}{2} = R \quad \dots \quad \dots \quad (3)$$

$$(1) - (2): A - A' = 2S$$

$$\therefore \frac{A-A'}{2} = S \quad \dots \quad \dots \quad (4)$$

(3), (4)-ல் இருந்து R, S என்பன முறையே வேறு சமச்சீர் அணிவாகவோ, எதிர்ச்சீர் அணிவாகவோ, இருக்க முடியாது என்று தெரிகிறது. ஆகையால் A என்ற அணியை $\frac{A+A'}{2} + \frac{A-A'}{2}$ என்றும் ஒரே முறையில்தான் சமச்சீர் அணி, எதிர்ச்சீர் அணியின் கூடுதலாக எழுத முடியும்.

மாநிலிக் கணக்குகள்

மாநிலி 1: A, B பரிமாற்று அணிகளானால், A' உம், B' உம் பரிமாற்று அணிகளாக இருக்க வேண்டும்.

திருபணம்: A, B பரிமாற்று அணிகள் ... (கொள்கை)

$$\therefore AB = BA \dots \dots \dots (1)$$

$$\begin{aligned}
 \therefore |A| &= |-A'| \\
 &= (-1)^n \cdot |A'| \\
 &= -|A'| = \dots \quad \because n \text{ ஓர் ஒற்றையெண்} \\
 &= -|A| \quad \therefore |A| = |A'| \\
 \therefore |A| &= 0.
 \end{aligned}$$

3-18. சிக்கல் அணி (Complex Matrix):

ஓர் அணியில் உறுப்புகளில் சில சிக்கல் எண்களாகவும் (Complex Numbers) இருக்கலாம். இவ்வாறு இருத்தால் அந்த அணியைச் சிக்கல் அணி என்று சொல்வோம்.

சிக்கல் எண்களை இவ்வாறு அணியை மெய்யான அணி (Real Matrix) என்று அழைப்பதும் பொருத்தும்.

3-19. இணை அணிகள் (Conjugate Matrices)

A என்ற சிக்கல் அணியில் உள்ள சிக்கல் எண்களுக்குப் பதிலாக அவற்றின் இணை எண்களை உறுப்புகள் ஆக்கினால் கிடைக்கும் சிக்கல் அணிக்கு இணை அணி என்பது பெயர். இதை $\bar{A}$ எனக் குறிப்பிடுவோம்.

உதாரணம்:

$$A = \begin{bmatrix} 5+4i & 2 & i \\ 2-i & i & 1+i \\ 1 & 3-i & 5 \end{bmatrix} \quad \text{ஆனால்,}$$

$$\bar{A} = \begin{bmatrix} 5-4i & 2 & -i \\ 2+i & -i & 1-i \\ 1 & 3+i & 5 \end{bmatrix}$$

குறிப்பு: $\bar{\bar{A}} = A$ ஆனால், A ஒரு மெய்யான (Real) அணியாக இருக்க வேண்டும்.

3-20. சிக்கல் எண்களைப் பற்றிய சில குறிப்புகள்:

a, b என்பன மெய்யான எண்களாக இருக்கட்டும்.

$i = \sqrt{-1}$ ஆனும், $a + ib$ ஐச் சிக்கல் எண் என்று சொல்வோம். இதை z என்னும் எழுத்தால் குறிப்பிடுவது வழக்கம்.

$a + ib$, $a - ib$ என்பனவகளை இணை எண்கள் என்று சொல்வோம்.

$z = a + ib$ ஆனும், அதன் இணையான $a - ib$ ஐ $\bar{z}$ என்று குறிப்பிடுவோம்.

$z_1 = a + ib$, $z_2 = c + id$ என இருக்கட்டும்.

$$(i) \quad \overline{z_1 + z_2} = \bar{z}_1 + \bar{z}_2$$

$$\begin{aligned} \text{ஏனென்றும், } \overline{z_1 + z_2} &= \overline{(a + ib) + (c + id)} \\ &= \overline{(a + c) + i(b + d)} \\ &= (a + c) - i(b + d) \\ &= (a - ib) + (c - id) \\ &= \bar{z}_1 + \bar{z}_2 \end{aligned}$$

$$(ii) \quad \overline{z_1 z_2} = \bar{z}_1 \cdot \bar{z}_2$$

$$\begin{aligned} \text{ஏனென்றும், } \overline{z_1 z_2} &= \overline{(a + ib)(c + id)} \\ &= \overline{(ac - bd) + i(ad + bc)} \\ &= (ac - bd) - i(ad + bc) \\ &= (a - ib)(c - id) \\ &= \bar{z}_1 \cdot \bar{z}_2 \end{aligned}$$

$$(iii) \quad \overline{\bar{z}} = z \quad \text{உங்களைப் பார்த்தீர்களா.}$$

3-21. தேற்றம் :

$$(i) \quad \overline{(\bar{A})} = A$$

$$(ii) \quad \overline{(\bar{A} + \bar{B})} = A + B$$

$$(iii) \quad \overline{(kA)} = \bar{k} \cdot \bar{A}$$

$$(iv) \quad \overline{(AB)} = \bar{A} \cdot \bar{B}$$

நிபுணம்: (i) $\overline{A} = [\overline{a_{ij}}]$

$$\therefore \overline{\overline{A}} = [\overline{\overline{a_{ij}}}]$$

$$= [a_{ij}] \quad \because \overline{\overline{x}} = x$$

$$= A$$

$$(ii) \overline{A+B} = [\overline{a_{ij}+b_{ij}}]$$

$$= [\overline{a_{ij}} + \overline{b_{ij}}] \quad \because \overline{x_1 + x_2} = \overline{x_1} + \overline{x_2}$$

$$= [\overline{a_{ij}}] + [\overline{b_{ij}}]$$

$$= \overline{A} + \overline{B}$$

$$(iii) \overline{kA} = [\overline{ka_{ij}}]$$

$$= [\overline{k \cdot a_{ij}}] \quad \because \overline{x_1 x_2} = \overline{x_1} \cdot \overline{x_2}$$

$$= \overline{k} \cdot [\overline{a_{ij}}]$$

$$= \overline{k} \cdot \overline{A}$$

(iv) $\overline{AB} = \overline{A} \cdot \overline{B}$ என நிரூபிக்க வேண்டும்.

$A = [a_{ij}]$ என்ற $m \times n$ அணி ஆகவும்,

$B = [b_{ij}]$ என்ற $n \times p$ அணி ஆகவும் இருக்கட்டும்.

$\therefore AB$ என்ற $m \times p$ அணிதான் $(i-j)$ ஆவது உறுப்பு

$$= \sum_{r=1}^n a_{ir} \cdot b_{rj}$$

$$\therefore \overline{AB} \text{-ன் } (i-j) \text{ ஆவது உறுப்பு} = \overline{\left(\sum_{r=1}^n a_{ir} \cdot b_{rj} \right)}$$

$$= \sum_{r=1}^n (\overline{a_{ir} \cdot b_{rj}}) \quad \because \overline{x_1 + x_2 + \dots + x_n} = \overline{x_1} + \dots + \overline{x_n}$$

$$= \sum_{r=1}^n \overline{a_{ir}} \cdot \overline{b_{rj}} \quad \because \overline{x_1 x_2} = \overline{x_1} \cdot \overline{x_2}$$

$$= \overline{A} \cdot \overline{B} \text{-ன் } (i-j) \text{ ஆவது உறுப்பு}$$

$$\therefore \overline{AB} = \overline{A} \cdot \overline{B}$$

3.22. நிரூப - இண அணி (Transpose or Transpose of a Conjugate Matrix)

A என்ற அணி கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது. A -ன் இண அணி $\bar{A}$. $\bar{A}$ -ன் நிரூப அணி $(\bar{A})'$. $(\bar{A})'$ ஐ A -ன் நிரூப இண என்று சொல்வோம். இதை A^* எனக் குறிப்பிடுவது வழக்கம்.

$$\text{மேற்றம் : (i) } (\bar{A})' = (A')' = A^*$$

$$(ii) (A^*)^* = A$$

$$(iii) (A+B)^* = A^* + B^*$$

$$(iv) (kA)^* = k \cdot A^*$$

$$(v) (AB)^* = B^* A^*$$

மேற்றம் 1: ஒர் அணியின் நிரூப அணிமீதுமைய இண அணியும், இண அணியின் நிரூப அணியும் சமமாகும்.

அதாவது,

$$(\bar{A})' = (\bar{A})' = A^*.$$

ஏனென்தால், $A = [a_{ij}]$

$$\therefore A' = [a_{ji}], \quad \therefore (\bar{A})' = [\overline{a_{ji}}] \quad \dots \quad (1)$$

$$\text{மேலும், } \bar{A} = [\overline{a_{ij}}] \quad \therefore (\bar{A})' = [\overline{a_{ji}}] \quad \dots \quad (2)$$

(1), (2)-ல் இருந்து $(\bar{A})' = (\bar{A})' = A^*$ என தெரிகிறது.

மேற்றம் (ii) A -ன் நிரூப இண அணி A .

அதாவது, $(A^*)^* = A$

தற்போதம் : $A = [a_{ij}]$ ஆனால் $A^* = [\overline{a_{ji}}]$

$$\therefore \bar{A}^* = [\overline{\overline{a_{ji}}} = [a_{ji}] \quad \therefore \bar{\bar{A}} = A$$

$$\therefore (\bar{A}^*)' = [a'_{ji}]$$

$$= [a_{ij}]$$

$$= A$$

$$\therefore (A^*)^* = A.$$

உதாரணம்:

$$A = \begin{bmatrix} 2+4i & 2-i \\ 3 & i \end{bmatrix} \text{ ஆகும்}$$

$$\bar{A} = \begin{bmatrix} 2-4i & 2+i \\ 3 & -i \end{bmatrix}$$

$$\therefore A^* = (\bar{A})' = \begin{bmatrix} 2-4i & 3 \\ 2+i & -i \end{bmatrix}$$

$$\text{இப்போது } \bar{A^*} = \begin{bmatrix} 2+4i & 3 \\ 2-i & i \end{bmatrix}$$

$$\therefore (A^*)^* = (\bar{A^*})' = \begin{bmatrix} 2+4i & 2-i \\ 3 & i \end{bmatrix} = A$$

தேற்றம் (iii): $(A+B)^* = A^* + B^*$

$$\begin{aligned} \because (A+B)^* &= \{ (\overline{A+B}) \}' = \{ \bar{A} + \bar{B} \}' \dots \text{B-21(ii)} \\ &= \bar{A}' + \bar{B}' \dots \text{B-2(ii)} \\ &= A^* + B^* \end{aligned}$$

தேற்றம் (iv): $(kA)^* = \bar{k} \cdot A^*$

$$\begin{aligned} \because (kA)^* &= \{ (\overline{kA}) \}' = \{ \bar{k} \cdot \bar{A} \}' \dots \text{B-21(iii)} \\ &= \bar{k}(\bar{A})' \dots \text{B-2(iii)} \\ &= \bar{k} \cdot A^* \end{aligned}$$

தேற்றம் (v): $(AB)^* = B^* A^*$

$$\begin{aligned} \because (AB)^* &= \{ (\overline{AB}) \}' = \{ \bar{A} \bar{B} \}' \dots \text{B-21(iv)} \\ &= \bar{B}' \cdot \bar{A}' \dots \text{B-2} \\ &= B^* A^* \end{aligned}$$

3-23. நெய்மீஷன் அணி (Hermitian Matrix)

ஒர் அணிவானது அதன் திருப்பு-இணை அணிக்குச் சமமானால் அந்த நெய்மீஷன் அணி என்று சொல்வோம். அதாவது, $A^* = A$ ஆனால், A என்பது நெய்மீஷன் அணி.

∴ ஒரு ஹெர்மிஷன் அணியில் எல்லா i -க்கும், j -க்கும் $a_{ij} = \overline{a_{ji}}$ என்று இருக்கும்.

மூலவிட்ட உறுப்புகளை நோக்குமிடத்து, $a_{ii} = \overline{a_{ii}}$ என்று இருக்க வேண்டும். ஆதலால், மூலவிட்ட உறுப்புகள் சிக்கல் எண்களால் இராமல், மெய் எண்களால் (real) இருக்கவேண்டும். கீழே தரப்படும் ஹெர்மிஷன் அணிமையே பார்க்கவும்.

$$\begin{bmatrix} a & h + iv & g + iw \\ h - iv & b & f + iw \\ g - iw & f - iw & c \end{bmatrix}$$

3-24. எதிர் ஹெர்மிஷன் அணி (Skew Hermitian Matrix)

ஒர் அணியின் திருப்பு இணை அணி அதன் எதிர்க் கூட்ட ஹெர்மிஷன் மையாகவும் அதை எதிர் ஹெர்மிஷன் அணி என்று சொல்வோம். அதாவது, $A^* = -A$ ஆகவும், A என்பது எதிர் ஹெர்மிஷன் அணி.

எனவே, ஒர் எதிர் ஹெர்மிஷன் அணியில், எல்லா i -க்கும், j -க்கும் $a_{ij} = -\overline{a_{ji}}$ என்று இருக்கும். மூலவிட்ட உறுப்புகளை நோக்குமிடத்து, $a_{ii} = -\overline{a_{ii}}$ என்று இருக்க வேண்டும்.

∴ இவை மூச்சியங்களேனாகவும் ஒழுங்கும் கற்பனை மான எண்களையேனாகவும் (Purely imaginary numbers) இருக்க வேண்டும்.

உதாரணம்:

$$\begin{bmatrix} ia & h - w & g - r \\ h + w & ib & f - u \\ g + r & f + u & ic \end{bmatrix}$$

குறிப்பு (i): A என்பது ஹெர்மிஷன் அணிவாகவும், IA என்பது எதிர் ஹெர்மிஷன் அணி.

$A = [a_{ij}]$ என்பது ஒரு ஹெர்மிஷன் அணிவாக இருக்கட்டும்.

$$\therefore a_{ij} = \overline{a_{ji}} \dots \dots \dots (1)$$

இப்பொழுது, iA -க் உடன் $(i-j)$ ஆவது உறுப்பு $= i \cdot a_{ij}$;
 $(j-i)$ ஆவது உறுப்பு $= i \cdot a_{ji}$

$\therefore i \cdot a_{ji} = -(i \cdot a_{ij})$ என நிரூபித்தாகிய போதுமானது.

$$R.H.S. = -(i \cdot a_{ji}) = -i \cdot \overline{a_{ji}}$$

$$= -(-i) \cdot \overline{a_{ji}} = i \cdot \overline{a_{ji}}$$

$$= i \cdot a_{ji} \dots\dots\dots (1)\text{-க் இருந்து.}$$

$$= L.H.S.$$

குறிப்பு (ii): A ஓர் எதிர் ஹெர்மிதிக் அணிவாகும், iA ஒரு ஹெர்மிதிக் அணி.

$$B = iA \text{ ஆக இருக்கட்டும்} \dots\dots\dots (1)$$

$$\overline{B} = \overline{iA} = 1 \cdot \overline{A} = -i \cdot \overline{A}$$

$$\therefore (\overline{B})^T = (-iA)^T$$

$$= -i \cdot (A)^T$$

$$= -i \cdot A^*$$

$$= -i(-A) \quad \because A^* \text{ ஓர் எதிர் ஹெர்மிதிக் அணி.}$$

$$= iA$$

$$\therefore B^* = B \quad \because B = iA \dots\dots (1)$$

3.25. P, Q என்பன முற்றிலும் சமச்சீர் (Real) சமச்சீர் அணியாகவும், எதிர்ச்சீர் அணியாகவும் இருந்தால், $P+iQ$ ஒரு ஹெர்மிதிக் அணிவாகும்; $iP-Q$ ஓர் எதிர் ஹெர்மிதிக் அணிவாகும்.

இதை ஓர் உதாரணத்தால் விளக்குவோம்.

$$P = \begin{bmatrix} a & h & g \\ h & b & f \\ g & f & c \end{bmatrix}, \quad Q = \begin{bmatrix} 0 & w & r \\ -w & 0 & u \\ -r & -u & 0 \end{bmatrix}$$

என்பன முற்றிலும் சமச்சீர், எதிர்ச்சீர் அணிகள்.

அ. அ. - 6

$$P+iQ = \begin{bmatrix} p & h+iv & g+iv \\ h-iv & b & f+iu \\ g-iv & f-iu & c \end{bmatrix}$$

என்பது நேர்மிகு அணியாகும்.

$$iP-Q = \begin{bmatrix} iq & ih-w & ig-r \\ ih+w & ib & if-u \\ ig+r & if+u & ic \end{bmatrix}$$

என்பது எதிர் நேர்மிகு அணியாகும்.

இதிலிருந்து, சிக்கல் எண்கள் இல்லாவிட்டால் ஓர் நேர் மிகு அணி மெய்யான சமச்சீர் அணியாகவும்; ஓர் எதிர் நேர் மிகு அணி மெய்யான எதிர்ச்சீர் அணியாகவும் இருக்க வேண்டும் என்று தெரிகிறது.

8-26. தேற்றம் (i): A என்பது ஏதாவது ஒரு $n \times n$ அணி யானால்,

- (a) $A+A^*$ ஒரு நேர்மிகு அணி,
 (b) $A-A^*$ ஓர் எதிர் நேர்மிகு அணி.

$$\begin{aligned} \text{ஏனென்றால் (a) } (A+A^*)^* &= A^*+(A^*)^* \dots\dots 8-22 \text{ (iii)} \\ &= A^*+A \dots\dots 8-22 \text{ (ii)} \\ &= A+A^* \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{(b) } (A-A^*)^* &= A^*-(A^*)^* \dots\dots 8-22 \text{ (iii)} \\ &= A^*-A \dots\dots 8-22 \text{ (ii)} \\ &= -(A-A^*) \end{aligned}$$

தேற்றம் (ii): சிக்கல் எண்களை உறுப்புகளாகக் கொண்ட எந்தச் சதுர அணியாகவும், ஒரு நேர்மிகு அணியுடன் ஓர் எதிர் நேர்மிகு அணியாக கூட்டிப் பெறக்கூடியதாக, ஒரே வகை மிக்தான், எழுத இயலும்.

A என்பது ஒரு சதுர அணியாக இருக்கட்டும்.

$$\therefore A+A^* \text{ ஒரு நேர்மிகு அணி} \dots\dots(i) \text{ ஈ}$$

$\therefore \frac{A+A^2}{2}$ ஒரு நெர்மிஷன் அணி.

இதேவிதமாக, $\frac{A-A^2}{2}$ ஓர் எதிர் நெர்மிஷன் அணி(i) b

$$\text{ஆனால் } A = \frac{A+A^2}{2} + \frac{A-A^2}{2}$$

$\therefore$ ஒரு சதுர அணி = ஒரு நெர்மிஷன் அணி + ஓர் எதிர் நெர்மிஷன் அணி.

இது ஒரேவகை என்பதை 8.17 ஐப் போல் நிரூபிக்கலாம்.

மாநிரிக் கணக்குகள்

மாநிக் 1: $H = P+iQ$ ஆக இருக்கட்டும். P, Q மெய்யான சமச்சீர், எதிர்ச்சீர் அணிகள். H ஒரு நெர்மிஷன் அணி என்று நிரூபி. H^*H என்பது மெய்யான அணியானால் $PQ = -QP$ என நிரூபி.

$$\begin{aligned} \text{நிரூபணம்: } H^* &= (P+iQ)^* \\ &= P^* + iQ^* \\ &= (\bar{P}) + i(\bar{Q}) \\ &= P^* - iQ^* \quad \because P, Q \text{ மெய்யானவை.} \\ &= P - i(-Q) \quad \because \begin{cases} P \text{ சமச்சீர் அணி,} \\ Q \text{ எதிர்ச்சீர் அணி.} \end{cases} \\ &= P + iQ \\ &= H \end{aligned}$$

$\therefore H$ ஒரு நெர்மிஷன் அணி.

$$\text{இப்பொழுது } H^*H = HH$$

$$\begin{aligned} &= (P + iQ)(P + iQ) \\ &= P^2 + iPQ + iQP - Q^2 \\ &= P^2 - Q^2 + i(PQ + QP) \end{aligned}$$

ஆனால், இது மெய்யான அணி. (கொள்கை)

$$\therefore PQ + QP = 0.$$

மாநிர் 5 : H ஒரு நெர்மிஷன் அணியானால் $A'HA$ ஒரு நெர்மிஷன் அணி என நிரூபி.

நிரூபணம் : H ஒரு $n \times n$ அணி ஆகவும், A ஒரு $n \times m$ அணி ஆகவும் இருக்கட்டும்.

$\therefore HA$ பெருக்க இயைபத்தது.

மேலும், A' ஒரு $m \times n$ அணியாதல் வேண்டும்.

$\therefore A'HA$ பெருக்க இயைபத்தது. இது $m \times m$ அணி.

இப்பொழுது $A' = A^0$

$$\begin{aligned} \therefore (A'HA)^0 &= (A^0HA)^0 \\ &= A^0H^0(A^0)^0 = A^0HA \\ &= A'HA \end{aligned}$$

மாநிர் 6 : A, B என்பன நெர்மிஷன் அணிகள் ஆனால்,

(i) $(AB - BA)$ ஓர் எதிர் நெர்மிஷன் அணி எனவும்,

(ii) $AB + BA$ ஒரு நெர்மிஷன் அணி எனவும் நிரூபி.

$$\begin{aligned} (AB - BA)^0 &= (AB)^0 - (BA)^0 \\ &= B^0A^0 - A^0B^0 \\ &= BA - AB \quad \because A, B \text{ நெர்மிஷன் அணிகள்} \\ &= -(AB - BA) \end{aligned}$$

$\therefore (AB - BA)$ ஓர் எதிர் நெர்மிஷன் அணி.

மாநிர் 7 : ஒரு நெர்மிஷன் அணியின் அணிமனோவாக்களும் ஒரு மெய்யான எண்ணுக்குச் சமம் என நிரூபி.

A ஒரு நெர்மிஷன் அணியாக இருக்கட்டும்.

$$\therefore A = A^2 = (\bar{A})',$$

$$\therefore A' = \{(\bar{A})'\}' = (\bar{A}) \quad \dots \quad \dots \quad \dots \quad (1)$$

$$\begin{aligned} |A| &= |A'| = |\bar{A}| \quad \dots \quad \dots \quad (1)\text{-ல் இருந்து} \\ &= |\bar{A}| \end{aligned}$$

$\therefore |A|$ உம், அதன் இணையான $|\bar{A}|$ உம் சமமாய் இருக்கின்றன.

$\therefore |A|$ வெவியான எண்ணாக இருக்க வேண்டும்.

மாதிரி 8 : A என்னும் நெறியிலுள்ள அணி, $A^2 = 0$ என்பதற்கினால் இருத்தால் $A = 0$ என நிரூபி.

நிரூபணம் : A என்பது $[a_{ij}]$ ஆகவும், $A^2 = [c_{ij}]$ ஆகவும் இருக்கட்டும். இதில், $a_{ij} = x_{ij} + \sqrt{-1} \cdot y_{ij}$ என இருக்கட்டும்.

$$\text{இப்பொழுது, } c_{ij} = \sum_{r=1}^n a_{ir} a_{rj} \quad \dots \quad \dots \quad (2.9)$$

$$\therefore c_{ij} = \sum_{r=1}^n a_{ir} \cdot a_{rj}$$

$$0 = \sum_{r=1}^n a_{ir} \cdot a_{rj} \quad \because A^2 = 0$$

$$= \sum_{r=1}^n a_{ir} \cdot \overline{a_{rj}} \quad \because A \text{ நெறியிலுள்ள அணி.}$$

$$0 = \sum_{r=1}^n (x_{ir}^2 + y_{ir}^2)$$

$$\therefore x_{i1} = x_{i2} = \dots \quad \dots \quad \dots \quad \dots = x_{in} = 0$$

$$\text{மேலும், } y_{i1} = y_{i2} = \dots \quad \dots \quad \dots \quad \dots = y_{in} = 0$$

$$\therefore a_{ij} = x_{ij} + \sqrt{-1} \cdot y_{ij} = 0 + \sqrt{-1} \cdot 0 = 0$$

$$\therefore A = 0.$$

பயிற்சி 3

1. $A = \begin{bmatrix} 3 & 1 & -1 \\ 0 & 1 & 2 \end{bmatrix}$ என்றும், AA' உம், $A'A$ உம் கண்டுபிடி.

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 5 & 3 \\ -2 & 1 & 6 & 1 \\ 3 & 2 & 7 & 1 \\ 4 & -4 & -2 & 0 \end{bmatrix} \quad \text{ஆனும், } A + A' \text{ உம்,}$$

$A - A'$ உம் கண்டுபிடி.

$$2. \quad A = \begin{bmatrix} 3 & -4 \\ 1 & 1 \\ 2 & 0 \end{bmatrix}, \quad B = \begin{bmatrix} 2 & 1 & 2 \\ 1 & 3 & 4 \end{bmatrix} \quad \text{என்றும்,}$$

$(AB)' = B'A'$ என நிரூபி.

$$3. \quad A = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{bmatrix}; \quad B = \begin{bmatrix} 5 & 6 \\ 7 & 8 \end{bmatrix} \quad \text{ஆனும்,}$$

$(AB)' = B'A'$ எனக் காண்க.

$$4. \quad U = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \quad \text{ஆனும்,}$$

UU' உம், $U'U$ உம் கண்டுபிடி.

$$5. \quad \text{கொடுக்கப்பட்ட அணி } A = \begin{bmatrix} 12 & 7 & 3 \\ 7 & 5 & 4 \\ 3 & 4 & 6 \end{bmatrix} \quad \text{ஐ}$$

$A = BB'$ என்ற வடிவில் எழுது.

B தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட அணிக்கு B' என்பது B யின் மூலக்கோண அணி.

7.
$$\begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \\ 7 & 8 & 9 \end{bmatrix}$$
 என்ற அணியை ஒரு சமச்சீர் அணி

யுடன், எதிர்ச்சீர் அணியைக் கூட்டிப் பெறக்கூடிய வகையில் எழுது.

8.
$$A = \begin{bmatrix} 3 & i & 3-i \\ -i & 0 & 2+i \\ 3+i & 2-i & 1 \end{bmatrix}$$
 ஆகும்.

(i) A' , (A') , λ , $(\lambda)'$ ஆகியவற்றைக் கண்டுபிடி. $(A') = (\lambda)'$ என்று திருப்தி.

(ii) A ஒரு நெர்மியன் அணி என திருப்தி.

(iii) P , Q மெய்யான அணிகளாக இருக்குமா? A ஐ $P+iQ$ எனப் பிரித்து எழுது. P , Q எத்தகைய சிதப்பு அணிகள்?

(iv) iA ஐ எழுதி, அது ஓர் எதிர் நெர்மியன் அணி என திருப்தி.

9. (அ)
$$A = \begin{bmatrix} 1 & 1+i & 2+3i \\ 1-i & 2 & -i \\ 2-3i & i & 0 \end{bmatrix}$$
 ஒரு நெர்

மியன் அணி என திருப்தி.

(ஆ)
$$B = \begin{bmatrix} i & 1+i & 2-3i \\ -1+i & 2i & 1 \\ -2-3i & -1 & 0 \end{bmatrix}$$

ஓர் எதிர் நெர்மியன் அணி எனக் காண்பி.

(இ) iB ஒரு நெர்மியன் அணி என திருப்தி.

(ஈ) $\bar{A}$ ஒரு நெர்மியன் அணி என்றும் $\bar{B}$ ஓர் எதிர் நெர்மியன் அணி என்றும் திருப்தி.

10. A ஒரு சமச்சீர் அணிபாகவோ அல்லது எதிர்ச்சீர் அணிபாகவோ இருந்தால் $AA' = A'A$ உம், A^2 உம் சமச்சீர் அணி கள் என திருப்தி.

11. A ஒரு சமச்சீர் அணியானால், $aA^p + b \cdot A^{p-1} + \dots + rI$ உம் ($a, b, \dots, r$ அளவைகள், p நேர் முழு எண்) சமச்சீர் அணி என திருப்தி.

12. A ஒரு சதுர அணியானால் AA^0, A^0A என்பன நெல் மீயுள் அணிகள் என்று திருப்தி.

13. A என்பது ஏதாவது ஒரு சதுர அணிபாக இருக்க ளும். $A = P + iQ$ என்று இருக்கும் வண்ணம், P, Q என்ப நெல்மீயுள் அணிகளை ஒரே வகையில்லாத கண்டுபிடிக்க முடியும் என திருப்தி.

$$\left(P = \frac{A + A^*}{2} ; Q = \frac{A - A^*}{2i} \text{ என எடுத்துக் கொள்ளவும்.} \right)$$

14. $A' = A$ என்றால் $(A^2)' = A^2$ என திருப்தி.

$$15. \quad P = \begin{bmatrix} 1 & a & a^2 \\ 1 & b & b^2 \\ 1 & c & c^2 \end{bmatrix} \quad \text{ஆனால்,}$$

$$P^2 = \begin{bmatrix} -bc & -ca & -ab \\ b+c & c+a & a+b \\ -1 & -1 & -1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} b-c & 0 & 0 \\ 0 & c-a & 0 \\ 0 & 0 & a-b \end{bmatrix}$$

எனக் காண்பீ.

16. $(\alpha A)^2 = \alpha^{2-1} A^2$ என திருப்தி.

17. (i) $AA^0 = A^0A = |A| I$ என திருப்தி.

(ii) $|A^2| = |A|^{2-1}$ என திருப்தி.

(iii) $(A^2)^2 = |A|^{2-1} A$ என திருப்தி.

18. ஒவ்வொரு சதுர அணி A லுமும் $A = B + C$ என்ற வடிவில் எழுதலாம். B ஒரு நேர்மிகுன் அணி; C ஓர் எதிர் நேர்மிகுன் அணி என நிறுமி.

19. B உம் C உம் நேர்மிகுன் அணிகளானால் ஒவ்வொரு சதுர அணி A லுமும் $A = B + iC$ என்ற வடிவில் எழுதலாம் என நிறுமி.

20. A உம் B உம் $AB = A$, $BA = B$ என்றவாறிருத்தால்

(அ) $B'A' = A'$, $A'B' = B'$ என நிறுமி.

(ஆ) A' உம் B' உம் சப அடுக்கு அணிகள் என நிறுமி.

21. A உம் B உம் n -சதுர எதிர்ச்சி அணிகளாகவும், பரிமாற்று அணிகளாகவும் இருத்தால் AB ஒரு சமச்சி அணிவாகும் என நிறுமி.

21. A ஒரு நேர்மிகுன் அணிவானால் A^n ஒரு நேர்மிகுன் அணி என நிறுமி.

22. A ஒரு எதிர்ச்சி அணிவானால்,

(i) A^n ஒரு சமச்சி அணிவெனவும்,

(ii) A^{2n+1} ஓர் எதிர்ச்சி அணிவெனவும் நிறுமி.

24. $(A_1 A_2 \dots \dots A_n)^n = A^n_1 \cdot A^n_2 \cdot \dots \dots A^n_n$ என நிறுமி.

25. A, B நேர்மிகுன் அணிகளாகவும், A, B பரிமாற்று அணிகளாகவும் இருத்தால், AB உம் நேர்மிகுன் அணி என நிறுமி. இதன் மாறாதவி உண்மையானதா? ஏன்?

26. ஒரு மெய்யான சமச்சி அணி, நேர்மிகுன் அணிவாக இருக்கவிவண்டும் என நிறுமி.

27. P ஓர் எதிர்ச்சி அணிவாகவும், Q ஒரு சமச்சி அணிவாகவும் இருக்கும்படி, கொடுக்கப்பட்ட ஓர் எதிர் நேர்மிகுன் அணியை $P + iQ$ என்ற எழுதலாம் என நிறுமி. உதாரணம் கொடு.

28. A, B என்ற நேர்மிகுன் அணிகள் $A^2 + B^2 = 0$ என்பதற்க்கணக்க இருத்தால் $A = 0, B = 0$ என நிறுமி.

விடைகள்

$$1. \begin{bmatrix} 11 & -1 \\ -1 & 5 \end{bmatrix}; \begin{bmatrix} 2 & 2 & -2 \\ 2 & 2 & 1 \\ -2 & 1 & 5 \end{bmatrix}$$

$$2. \begin{bmatrix} 2 & -2 & 8 & 7 \\ -2 & 2 & 8 & -2 \\ 8 & 8 & 14 & -1 \\ 7 & -2 & -1 & 0 \end{bmatrix};$$

$$\begin{bmatrix} 0 & +2 & +2 & 1 \\ -2 & 0 & +4 & +5 \\ -2 & -4 & 0 & +2 \\ +1 & -5 & -2 & 0 \end{bmatrix}$$

$$3. \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}; \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

4. சேர்ப்பு அணி, நேர் மாடுள அணி

4.1. சேர்ப்பு அணி: $A = [a_{ij}]$ என்பது n -சதுர அணிவாக இருக்கட்டும்.

$$A = [a_{ij}] = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1j} & \dots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \dots & a_{2j} & \dots & a_{2n} \\ \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots \\ a_{i1} & a_{i2} & \dots & a_{ij} & \dots & a_{in} \\ \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots \\ a_{n1} & a_{n2} & \dots & a_{nj} & \dots & a_{nn} \end{bmatrix}$$

இதில் ஒலகமான a_{ij} க்கும் பதிலாக, அதன் இணைக் காரணியான (co-factor) A_{ij} ஐப் போட்டால் கீழ்க்கண்ட $[A_{ij}]$ என்ற அணி கிடைக்கும்.

$$[A_{ij}] = \begin{bmatrix} A_{11} & A_{12} & \dots & A_{1j} & \dots & A_{1n} \\ A_{21} & A_{22} & \dots & A_{2j} & \dots & A_{2n} \\ \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots \\ A_{i1} & A_{i2} & \dots & A_{ij} & \dots & A_{in} \\ \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots \\ A_{n1} & A_{n2} & \dots & A_{nj} & \dots & A_{nn} \end{bmatrix}$$

$[A_{ij}]$ ஐ, அதாவது, $[A_{ij}]$ -ன் திரும்பு அணியை A -ன் சேர்ப்பு அணி என வரையறுப்போம்.

$$\therefore \text{கொடுப்பு அணி } A = \begin{bmatrix} A_{11} & A_{12} & \dots & A_{1n} & \dots & A_{1n} \\ A_{21} & A_{22} & \dots & A_{22} & \dots & A_{2n} \\ \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots \\ A_{j1} & A_{j2} & \dots & A_{ji} & \dots & A_{jn} \\ \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots \\ A_{i1} & A_{i2} & \dots & A_{in} & \dots & A_{in} \end{bmatrix}$$

உதாரணம் :

$$A = \begin{bmatrix} 1 & -2 & 3 \\ 0 & 1 & 5 \\ -1 & 2 & 0 \end{bmatrix} \text{ ஆக இருக்கட்டும்.}$$

$$A_{11} = \begin{vmatrix} 1 & 5 \\ 2 & 0 \end{vmatrix} = -10; \quad A_{12} = - \begin{vmatrix} 0 & 5 \\ -1 & 0 \end{vmatrix} = -5;$$

$$A_{13} = \begin{vmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 2 \end{vmatrix} = 1.$$

$$A_{21} = \begin{vmatrix} -2 & 3 \\ 2 & 0 \end{vmatrix} = -6; \quad A_{22} = \begin{vmatrix} 1 & 3 \\ -1 & 0 \end{vmatrix} = 3;$$

$$A_{23} = - \begin{vmatrix} 1 & -2 \\ -1 & 2 \end{vmatrix} = 0.$$

$$A_{31} = \begin{vmatrix} -2 & 3 \\ 1 & 5 \end{vmatrix} = -13; \quad A_{32} = - \begin{vmatrix} 1 & 3 \\ 0 & 5 \end{vmatrix} = -5;$$

$$A_{33} = \begin{vmatrix} 1 & -2 \\ 0 & 1 \end{vmatrix} = 1.$$

$$\therefore \text{செத்பு } A = \begin{bmatrix} A_{11} & A_{21} & A_{31} \\ A_{12} & A_{22} & A_{32} \\ A_{13} & A_{23} & A_{33} \end{bmatrix}$$

$$= \begin{bmatrix} -10 & 6 & -18 \\ -6 & 8 & -5 \\ 1 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

4-2. தேற்றம் : A , செத்பு $A = |A| I_n = \text{செத்பு } A \cdot A$

(A செத்பு A)-ன் (i - j) கூறு உறுப்பு

$$= \sum_{r=1}^n a_{ir} \cdot A_{jr}$$

$$= a_{i1} \cdot A_{j1} + a_{i2} \cdot A_{j2} + \dots + a_{in} \cdot A_{jn}$$

$$= \begin{cases} |A| & i=j \text{ ஆக இருந்தால்;} \\ 0 & i \neq j \text{ ஆக இருந்தால்.} \end{cases}$$

$\therefore$ பெருக்கற் பணிகில் சூழ்ச்சிப்பட்ட உறுப்புகளே உண்டு,

அவை ஒவ்வொன்றும் $|A|$ க்குச் சமம்,

$$\therefore A \cdot \text{செத்பு } A = \begin{bmatrix} |A| & 0 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & |A| & 0 & \dots & 0 \\ 0 & 0 & |A| & \dots & 0 \\ \dots & \dots & \dots & \dots & \dots \\ 0 & 0 & 0 & \dots & |A| \end{bmatrix}$$

$$= |A| \cdot \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & 1 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & 0 & 1 & \dots & 0 \\ \dots & \dots & \dots & \dots & \dots \\ 0 & 0 & 0 & \dots & 1 \end{bmatrix}$$

$$= |A| \cdot I_n$$

இதே விதமாகச் செய்வு $A \cdot A = |A| I_n$

$\therefore A \cdot$ செய்வு $A =$ செய்வு $A \cdot A = |A| I_n$

உதாரணம் :

$$A = \begin{bmatrix} a_1 & a_2 & a_3 \\ b_1 & b_2 & b_3 \\ c_1 & c_2 & c_3 \end{bmatrix} \quad \text{ஆனும்,}$$

$$\begin{aligned} A \cdot \text{செய்வு } A &= \begin{bmatrix} a_1 & a_2 & a_3 \\ b_1 & b_2 & b_3 \\ c_1 & c_2 & c_3 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} A_1 & B_1 & C_1 \\ A_2 & B_2 & C_2 \\ A_3 & B_3 & C_3 \end{bmatrix} \\ &= \begin{bmatrix} a_1 A_1 + a_2 A_2 + a_3 A_3 & a_1 B_1 + a_2 B_2 + a_3 B_3 & a_1 C_1 + a_2 C_2 + a_3 C_3 \\ b_1 A_1 + b_2 A_2 + b_3 A_3 & b_1 B_1 + b_2 B_2 + b_3 B_3 & b_1 C_1 + b_2 C_2 + b_3 C_3 \\ c_1 A_1 + c_2 A_2 + c_3 A_3 & c_1 B_1 + c_2 B_2 + c_3 B_3 & c_1 C_1 + c_2 C_2 + c_3 C_3 \end{bmatrix} \\ &= \begin{vmatrix} |A| & 0 & 0 \\ 0 & |A| & 0 \\ 0 & 0 & |A| \end{vmatrix} = |A| \cdot I_3 \end{aligned}$$

4.3. ஒர் ஒழுங்கு அணியும், ஒரு பூச்சிய அணிக்கோவை அணியும், A என்ற அணியில் $|A| = 0$ ஆக இருந்தால் அதை ஒரு பூச்சிய அணிக்கோவை அணி என்று சொல்வோம். இது பூச்சிய அணியிலிருந்து வேறுபட்டது என்பதை நினைவிழ்க்கொள்வது நல்ல.

$|A| \neq 0$ ஆனும், A ஐ ஒழுங்கு அணி என்று சொல்வோம்.

4.4. $|A| \neq 0$ ஆனும், $|\text{செய்வு } A| = |A|^{n-1}$

நீடுபணம்: $A \cdot$ செய்வு $A = |A| I_n \dots (4.2 \text{ இலிருந்து})$

$$\therefore |A \cdot \text{செய்வு } A| = | |A| I_n |$$

$$\therefore |A| \cdot |\text{செய்வு } A| = |A|^n$$

$$\therefore |\text{செய்வு } A| = |A|^{n-1}$$

4.5. நேர்தேற்றம்: செய்யு (செய்யு A) = $|A|^{n-1} \cdot A$

திருபணம்: $A \cdot$ செய்யு $A = |A| I_n \dots (4.2)$

$$\therefore \text{செய்யு } A \cdot \text{செய்யு (செய்யு } A) = |\text{செய்யு } A| \cdot I_n \\ = |A|^{n-1} \cdot I_n \dots (4.4)$$

$$\therefore A \cdot \text{செய்யு } A \cdot \text{செய்யு (செய்யு } A) \\ = A \cdot |A|^{n-1} \cdot I_n$$

$$\text{ஆனால் } A \text{ செய்யு } A = |A| I_n$$

$$\therefore |A| I_n \text{ செய்யு (செய்யு } A) = A |A|^{n-1} I_n$$

$$\therefore \text{செய்யு (செய்யு } A) = |A|^{n-1} A.$$

நேர்மாறான அணி அல்லது நேரெதிர் அணி

4.6. A, B என்ற சதுர அணிகள் $AB = BA = I$ என்பதற்க்கான இத்தகைய B ஐ A -ன் நேர்மாறான அணி அல்லது நேரெதிர் அணி என்று சொல்லுவோம். இதை $B = A^{-1}$ எனக் குறிப்பிடுவோம். A உம், B -ன் நேரெதிர் அணி என்பதைக் கவனிக்கவும். ஆகவே $A = B^{-1}$.

உதாரணம் :

$$(i) \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 5 & 3 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 3 & 1 \\ -5 & 2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} = I_2$$

$$(ii) \begin{bmatrix} 1 & -2 & 3 \\ 0 & 1 & 5 \\ -1 & 2 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} -\frac{1}{2} & 2 & -\frac{1}{2} \\ -\frac{1}{5} & 1 & -\frac{1}{5} \\ \frac{1}{2} & 0 & \frac{1}{2} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} = I_3$$

இதிலிருந்து ஒவ்வோர் அணிக்கும் நேரெதிர் அணி உண்டு எனக் கருதிவிட வேண்டாம். $|A| = 0$ ஆனால் A என்ற அணிக்கு நேரெதிர் அணி கிடையாது. இதை 4.8-ல் திருப்பிப் போம்.

4.7. A என்ற அணிக்கு n மே நடு நேர்மாறான அணிதான் உண்டு.

கூடுமானால், B, C என்பன A -ன் நேர்மாறான அணிகளாக இருக்கும்.

$B = C$ என திருத்தம் வேண்டும்.

B ஆனது A -ன் நேர்மாறான அணி (கொள்கை)

$$\therefore AB = BA = I \quad \dots \quad (1)$$

$$\text{இதேவிதமாக, } AC = CA = I \quad \dots \quad (2)$$

இப்பொழுது, $B = BI$

$$= B(AC) \quad \dots \quad (2)$$

$$= (BA)C \quad \dots \quad \text{தொடர்வு விதி}$$

$$= IC \quad \dots \quad (1)$$

$$= C$$

4-8. A என்னும் அணிக்கு நேர் மாறான அணி இருப்பதற்கு வேண்டிய போதும திபத்தனை $|A| \neq 0$ என்பதாகும்.

திருபணம்: (i) A^{-1} என்பது இருக்கட்டும்.

$|A| \neq 0$ என திருவிடுவோம்.

வரையறுக்கப்படி $AA^{-1} = I$

$$\therefore |AA^{-1}| = |I|$$

$$\therefore |A| \cdot |A^{-1}| = 1$$

$$\therefore |A^{-1}| = \frac{1}{|A|}$$

ஆனால் A^{-1} இருக்கிறது. $\therefore |A| \neq 0$

(ii) $|A| \neq 0$ ஆக இருக்கட்டும்.

A^{-1} இருக்கிறதென திருவிடுவோம்.

செய்யு $\frac{A}{|A|}$ என்னும் அணியை A^{-1} எனக் குறிப்பிடுவோம்.

ஆப்படியானால்,

$$\begin{aligned} AA^{-1} &= A \cdot \left(\frac{\text{சேர்ப்பு } A}{|A|} \right) \\ &= \frac{1}{|A|} \cdot A \cdot \text{சேர்ப்பு } A \\ &= \frac{1}{|A|} \cdot |A| \cdot I \quad \dots \quad \dots \quad (4.2) \\ &= I \end{aligned}$$

$$\therefore AA^{-1} = A^{-1}A = I$$

அதாவது, A^{-1} என்பது A -ன் நேரெதிர் அணி.

4.9. இதிலிருந்து, " A என்ற அணியின் நேரெதிர் அணிவானது $\frac{\text{சேர்ப்பு } A}{|A|}$ " என வரையறை செய்வோம்.

குறிப்பு: $|A| = 0$ ஆக இருக்கக் கூடாது.

அதாவது, A ஓர் ஒழுங்கு அணிவாக இருக்க வேண்டும்.

4.10. A ஓர் ஒழுங்கு அணிவாக இருந்தால் அதற்கு ஓர் ஒரு நேரெதிர் அணிதான் உண்டு. (இரண்டாம் முறை).

A -ன் நேரெதிர் அணி $= \frac{\text{சேர்ப்பு } A}{|A|}$ என நிரூபித்துக்கொள்வோம்.

$\frac{\text{சேர்ப்பு } A}{|A|}$ ஐ A^{-1} எனக் குறிப்பிடுவோம்.

கூடுமானால், B உடம், $AB = BA = I$ என்பதற்க்கினங்க இருக்கட்டும். $B = A^{-1}$ என நிரூபிப்போம்.

$$\begin{aligned} \text{இப்பொழுது, } A(B - A^{-1}) &= AB - AA^{-1} \\ &= I - I \\ &= 0 \end{aligned}$$

$$\therefore A^{-1} \{ A(B - A^{-1}) \} = A^{-1} \cdot 0 = 0$$

அ. அ.-7

$$\begin{aligned}
 \text{ஆனால் } A^{-1} \{ A(B - A^{-1}) \} &= A^{-1}A(B - A^{-1}) \\
 &\quad \dots \text{தொடக்கி விடு} \\
 &= I(B - A^{-1}) \\
 &= B - A^{-1}
 \end{aligned}$$

$$\therefore B - A^{-1} = 0$$

$$\text{அதாவது } B = A^{-1}$$

$$\text{இதேவிதமாக, } BA = I \text{ ஆனால்,}$$

$$(B - A^{-1})A = BA - A^{-1}A = I - I = 0$$

$$\therefore (B - A^{-1})AA^{-1} = 0, A^{-1} = 0$$

$$\text{அதாவது } B - A^{-1} = 0$$

$$\therefore B = A^{-1}$$

4.11. அணிகளை மருத்தம்;

A என்பது கொடுக்கப்பட்ட ஒரு n -சதுர அணிவாகவும், B என்பது ஒரே ஒழுக்கு n -சதுர அணிவாகவும் இருந்தால் $A = BX$ என இருக்குமா? ஒரே ஒரு n -சதுர அணி X தான் உண்டு. அதாவது $X = B^{-1}A$.

நிறுபணம்: $A = BX$ என்ற சமன்பாட்டில், $X = B^{-1}A$ என்று போடு.

அப்போழுது $A = BB^{-1}A = IA = A$ என்பது பொருத்தமாக உள்ளது.

கருணாகும், $X = 0$ ஆகவும் இருக்கலாம்.

$$\text{அப்படியானால் } A = BC$$

$$\therefore A - BC = 0$$

$$\therefore BB^{-1}A - BC = 0$$

$$\therefore B(B^{-1}A - C) = 0,$$

$$\therefore B^{-1} \{ B(B^{-1}A - C) \} = B^{-1} \cdot 0 = 0$$

$$\therefore B^{-1} B(B^{-1}A - C) = 0 \dots \text{தொடர்புவிதி}$$

$$B^{-1}A - C = 0$$

$$\text{அதாவது } B^{-1}A = C$$

இதே விதமாக, $A = YB$ என இருக்கும் வண்ணம் ஒரே ஒரு சதுர அணி, $Y = AB^{-1}$ தான் உண்டு என நிரூபிக்கலாம்.

$B^{-1}A$ என்பதை A ஐ B ஆல் மூன் வகுத்தல் என்றும்; AB^{-1} என்பதை A ஐ B ஆல் மீன் வகுத்தல் என்றும் வரையறை செய்வோம். B ஓர் ஒழுங்கு அணிவாக இருத்தால்தான் இந்த வரையறை பொருள் உடனதாகும்.

உதாரணம் :

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{bmatrix}; B = \begin{bmatrix} 1 & 3 \\ 1 & 4 \end{bmatrix}; B^{-1} = \begin{bmatrix} 4 & -3 \\ -1 & 1 \end{bmatrix}$$

A ஐ B ஆல் மூன் வகுத்தால்,

$$B^{-1}A = \begin{bmatrix} 4 & -3 \\ -1 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -5 & -4 \\ 2 & 2 \end{bmatrix}$$

என்ற அணி கிடைக்கும்.

ஆனால் A ஐ B ஆல் மீன் வகுத்தால்,

$$AB^{-1} = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 4 & -3 \\ -1 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 5 & -1 \\ 8 & -5 \end{bmatrix}$$

என்ற அணி கிடைக்கும்.

4-12. விளக்கேற்பம் : A ஒரு $m \times n$ அணிவாகவும், B ஓர் ஒழுங்கு ம-சதுர அணிவாகவும் இருக்கட்டும் $A = BY$ ஆனால் $X = B^{-1}A$ என்ற ஒரே அணிவாகத்தான் இருக்க முடியும்.

A ஒரு $m \times n$ அணி, B ஒரு $m \times m$ அணி.

$$\therefore X \text{ ஒரு } m \times n \text{ அணி ஆதல் வேண்டும்.} \quad \dots \quad (1)$$

B^{-1} ஒரு $m \times m$ அணி, A ஒரு $m \times n$ அணி.

$$\therefore B^{-1} \text{ ஒரு } m \times n \text{ அணி} \quad \dots \quad (2)$$

(1), (2)-ல் இருந்து $X = B^{-1}A$ ஆக இருக்க முடியும்.

மேலும், $BX = B \cdot B^{-1}A = A$

இப்பொழுது உடுமானால் $A = BC$ ஆகவும் இருக்கட்டும். C ஒரு $m \times n$ அணி ஆகத்தான் இருக்கவேண்டும்.

$$\therefore A - BC = 0$$

$$\therefore BB^{-1}A - BC = 0$$

$$\therefore B(B^{-1}A - C) = 0$$

$$\therefore B^{-1}\{B(B^{-1}A - C)\} = B^{-1} \cdot 0 = 0$$

$$\therefore B^{-1}B(B^{-1}A - C) = 0 \quad \dots \quad \dots \quad \dots \quad \text{தொடர்பு விதி}$$

$$B^{-1}A - C = 0$$

அதாவது, $B^{-1} = C$

இதே விதமாக, A ஒரு $m \times n$ அணியாகவும், B ஓர் ஒழுங்கு n -சதுர அணியாகவும் இருந்தால் $A = YB$ என இருக்கும் வண்ணம் ஒரே ஒரு $m \times n$ அணி $Y = AB^{-1}$ தான் உண்டு.

4-13. A என்பது ஓர் ஒழுங்கு அணியாகவும், $AB = 0$ ஆகவும் இருந்தால் $B = 0$ ஆக இருக்க வேண்டும்.

நிறுபணம் : $AB = 0 \quad \dots \dots$ கொள்க

$$\therefore A^{-1}(AB) = A^{-1} \cdot 0 = 0$$

(A ஒழுங்கு அணி ஆதலின் A^{-1} இருக்கிறது.)

$$\therefore (A^{-1}A)B = 0 \quad \dots \quad \dots \quad \dots \quad \text{தொடர்பு விதி}$$

$$\therefore B = 0.$$

இதே விதமாக, B என்பது ஓர் ஒழுங்கு அணியாகவும், $AB = 0$ ஆகவும் இருப்பதால், $A = 0$ ஆக இருக்க வேண்டும் என நிறுபிக்கலாம்.

மேலும், A என்பது ஓர் ஒழுங்கு அணியாகவும், $AB = AC$ ஆகவும் $BA = CA$ ஆகவும் இருந்தால் $B = C$ என நிறுபிக்கலாம்.

എങ്കിൽ $AB = AC$ ആയതിൽ

$$A(B - C) = 0$$

$$\therefore B - C = 0$$

$$\therefore B = C$$

2-12, 2-18-ൽ ഉൾപ്പെടുത്തുക.

ഉദാഹരണം 1:

$$A = \begin{bmatrix} 2 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 2 \\ 1 & 3 & 2 \end{bmatrix} \quad \text{ആയതിൽ, മേട്രിക് } A \text{ സ്ഥിരം.}$$

A^{-1} സ്ഥിരം കണ്ടെത്തുക.

$$A_{11} = \begin{vmatrix} 2 & 2 \\ 3 & 2 \end{vmatrix} = -2; \quad A_{12} = - \begin{vmatrix} 1 & 2 \\ 1 & 2 \end{vmatrix} = 0$$

$$A_{13} = \begin{vmatrix} 1 & 2 \\ 1 & 3 \end{vmatrix} = -1; \quad A_{21} = - \begin{vmatrix} 1 & 1 \\ 3 & 2 \end{vmatrix} = 1$$

$$A_{22} = \begin{vmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 2 \end{vmatrix} = 3; \quad A_{23} = - \begin{vmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 3 \end{vmatrix} = -5$$

$$A_{31} = \begin{vmatrix} 1 & 1 \\ 2 & 2 \end{vmatrix} = 0; \quad A_{32} = - \begin{vmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 2 \end{vmatrix} = -3$$

$$A_{33} = \begin{vmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 2 \end{vmatrix} = 3.$$

$$\therefore \text{മേട്രിക് } A = \begin{bmatrix} A_{11} & A_{12} & A_{13} \\ A_{21} & A_{22} & A_{23} \\ A_{31} & A_{32} & A_{33} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -2 & 0 & -1 \\ 1 & 3 & -5 \\ 0 & -3 & 3 \end{bmatrix}$$

$$|A| = \begin{vmatrix} 2 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 2 \\ 1 & 2 & 2 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 0 & 0 & 1 \\ -2 & 0 & 2 \\ -2 & 1 & 2 \end{vmatrix} = -2$$

$$A^{-1} = \frac{\text{Cofactor } A}{|A|} = \begin{bmatrix} \frac{-2}{-2} & \frac{1}{-2} & \frac{0}{-2} \\ \frac{0}{-2} & \frac{2}{-2} & \frac{-2}{-2} \\ \frac{1}{-2} & \frac{-2}{-2} & \frac{2}{-2} \end{bmatrix}$$

$$A^{-1} = \begin{bmatrix} 1 & -\frac{1}{2} & 0 \\ 0 & -1 & 1 \\ -\frac{1}{2} & 1 & -1 \end{bmatrix}$$

ഉദാഹരണ 2 :

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & \cos \alpha & \sin \alpha \\ 0 & -\sin \alpha & \cos \alpha \end{bmatrix} \text{ എങ്കിൽ}$$

Cofactor A എങ്കിൽ, A^{-1} എങ്കിൽ കണ്ടെത്തുക.

$$A_{11} = \begin{vmatrix} \cos \alpha & \sin \alpha \\ -\sin \alpha & \cos \alpha \end{vmatrix} = 1; \quad A_{12} = - \begin{vmatrix} 0 & \sin \alpha \\ 0 & \cos \alpha \end{vmatrix} = 0$$

$$A_{13} = \begin{vmatrix} 0 & \cos \alpha \\ 0 & -\sin \alpha \end{vmatrix} = 0; \quad A_{21} = - \begin{vmatrix} 0 & 0 \\ -\sin \alpha & \cos \alpha \end{vmatrix} = 0$$

$$A_{11} = \begin{vmatrix} 1 & 0 \\ 0 & \cos \alpha \end{vmatrix} = \cos \alpha; \quad A_{12} = - \begin{vmatrix} 1 & 0 \\ 0 & \sin \alpha \end{vmatrix} = \sin \alpha$$

$$A_{21} = \begin{vmatrix} 0 & 0 \\ \cos \alpha & \sin \alpha \end{vmatrix} = 0; \quad A_{22} = - \begin{vmatrix} 1 & 0 \\ 0 & \sin \alpha \end{vmatrix} = -\sin \alpha$$

$$A_{33} = \begin{vmatrix} 1 & 0 \\ 0 & \cos \alpha \end{vmatrix} = \cos \alpha.$$

$$\text{செய்யு } A = \begin{bmatrix} A_{11} & A_{12} & A_{13} \\ A_{21} & A_{22} & A_{23} \\ A_{31} & A_{32} & A_{33} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & \cos \alpha & -\sin \alpha \\ 0 & \sin \alpha & \cos \alpha \end{bmatrix}$$

இப்பொழுது, $|A| = 1$.

$$A^{-1} = \left[\frac{A_{ji}}{|A|} \right] = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & \cos \alpha & -\sin \alpha \\ 0 & \sin \alpha & \cos \alpha \end{bmatrix}$$

4-14. $AB = AC$ ஆகவும், $|A| \neq 0$ ஆகவும் இருந்தால் $B = C$ என நிரூபித்துக்கொள்வோம்.

இதை உபயோகித்துக் கீழ்க்கண்ட தேற்றங்களை எளிதாக நிரூபிக்கலாம்.

(i) செய்யு $(AB) = \text{செய்யு } B, \text{ செய்யு } A$

(ii) செய்யு $(A') = (\text{செய்யு } A)'$

(iii) செய்யு $(A^n) = (\text{செய்யு } A)^n$

நிரூபணம்: (1) (4-2)-ல் இருந்து

$$(AB), \text{ செய்யு } (AB) = |AB| I = \text{செய்யு } (AB), (AB) \dots (1)$$

$$\begin{aligned}
& \text{இப்பொழுது, } AB = (\text{செய்ய } B, \text{செய்ய } A) \\
& = A(B, \text{செய்ய } B), \text{செய்ய } A \dots \text{தொடர்பு விதி} \\
& = A \cdot |B| I, \text{செய்ய } A \\
& = |B| (A, \text{செய்ய } A) \\
& = |B| \cdot |A| I \\
& = |AB| I \dots (2) \quad \therefore |AB| = |A| \cdot |B|
\end{aligned}$$

(1), (2)-ல் இருந்து

$$AB, \text{செய்ய } (AB) = AB, (\text{செய்ய } B, \text{செய்ய } A)$$

இதேவிதமாக,

$\text{செய்ய } (AB), AB = \text{செய்ய } B, \text{செய்ய } A, AB$ என நிரூபிக்கலாம்.

$$\therefore \text{செய்ய } (AB) = \text{செய்ய } B, \text{செய்ய } A.$$

$$(ii) \quad A, \text{செய்ய } A = |A| I \dots (4 \cdot 2)$$

$$\therefore A', \text{செய்ய } A' = |A'| I$$

$$\text{ஆனால் } |A'| = |A|$$

$$\therefore A', \text{செய்ய } A' = |A| I \quad \dots \quad (1)$$

$$\text{மேலும் } \text{செய்ய } A, A = |A| I$$

$$\therefore (\text{செய்ய } A, A)' = (|A| I)'$$

$$\therefore A', (\text{செய்ய } A)' = |A| I'$$

$$\text{ஆனால் } I' = I$$

$$\therefore A' (\text{செய்ய } A)' = |A| I \quad \dots \quad (2)$$

(1), (2)-ல் இருந்து

$$\text{செய்ய } A' = (\text{செய்ய } A)'$$

$$(iii) \quad A^0, \text{செய்ய } A^0 = |A^0| I = \text{செய்ய } A^0, A^0$$

$$\text{மேலும், } A, \text{செய்ய } A = |A| I$$

$$\therefore (A, \text{செய்ய } A)^0 = (|A| I)^0$$

$$(\text{செய்ய } A)^0, A^0 = |A| \cdot I^0$$

ஆனால் $I^2 = I$.

$$\therefore (\text{செய்யு } A)^2 A^2 = |A| I \quad \dots \quad (2)$$

ஆனால் $(\text{செய்யு } A^2) \cdot A^2 = |A| I \dots (1)$ -ல் இருந்து.

$$\text{ஏனெனில் } |A^2| = |A|$$

$$\therefore (\text{செய்யு } A)^2 = \text{செய்யு } A^2.$$

(iv) A என்பது ஒரு நேர்மிகை அணி ஆனால், $(\text{செய்யு } A)$ உம் ஒரு நேர்மிகை அணி என நினை.

$$\text{நினைவம்: } (\text{செய்யு } A)^2 = \text{செய்யு } (A^2) \dots (iii)$$

$$= \text{செய்யு } A \quad \because A \text{ ஒரு நேர்மிகை அணி}$$

$$\therefore \text{செய்யு } A \text{ ஒரு நேர்மிகை அணி.}$$

நினைத்தேற்றம்: A ஓர் ஒழுங்கு நேர்மிகை அணிவானால் A^{-1} உம் ஒரு நேர்மிகை அணிவாக இருக்கவேண்டும்.

$$\text{நினைவம்: } \text{செய்யு } A \text{ ஒரு நேர்மிகை அணி}$$

$$\therefore \frac{\text{செய்யு } A}{|A|} \text{ உம் ஒரு நேர்மிகை அணி.}$$

4-15. இரு அணிகளின் பெருக்கற்பணவின் தேர்வளி அணி வானது அவற்றின் தேர்வளி அணிகளின் முக்கீர்வளி பெருக்குத் தொகைக்குச் சமம். அதாவது, $(AB)^{-1} = B^{-1}A^{-1}$

$$\text{வாழ்வாததின்படி, } (AB)^{-1} \cdot (AB) = (AB) \cdot (AB)^{-1} \\ = I \quad \dots \quad (1)$$

$$\text{இப்பொழுது, } (B^{-1}A^{-1})AB = B^{-1}(A^{-1}A)B \dots \text{தொடர்பு விதி} \\ = B^{-1}IB \\ = B^{-1}B = I \quad \dots \quad (2)$$

$$\text{மேலும் } (AB)(B^{-1}A^{-1}) = A \cdot (BB^{-1}) \cdot A^{-1} \dots \text{தொடர்பு விதி} \\ = A \cdot I \cdot A^{-1} \\ = AA^{-1} = I \quad \dots \quad (3)$$

$\therefore (AB)^{-1} = B^{-1}A^{-1}$ ஆக இருக்கவேண்டும் என்பது (1), (2), (3)-களில் இருந்து தெளிவாகத் தெரிகிறது. ஏனெனில், ஒரே ஒரு நேரெதிர் அணிதான் உண்டு.

$$\text{உதாரணம்: } A = \begin{bmatrix} 2 & 2 & 6 \\ 1 & 1 & 2 \\ 2 & 2 & 6 \end{bmatrix}$$

$$B = \begin{bmatrix} -1 & 2 & 1 \\ 6 & -8 & -6 \\ -8 & 6 & 4 \end{bmatrix} \quad \text{ஆனால் } (AB)^{-1} = B^{-1}A^{-1}$$

என்பதைச் சரிபார்க்க.

$$AB = C = \begin{bmatrix} -2+10-12 & 2-16+20 & 2-12+24 \\ -1+6-8 & 2-8+10 & 1-6+8 \\ -2+10-12 & 4-16+20 & 2-12+20 \end{bmatrix}$$

$$C = \begin{bmatrix} -11 & 20 & 16 \\ -2 & 4 & 8 \\ -2 & 18 & 10 \end{bmatrix}$$

$$C_{11} = 1; \quad C_{12} = -1; \quad C_{13} = 2$$

$$C_{21} = -5; \quad C_{22} = -6; \quad C_{23} = 8$$

$$C_{31} = 0; \quad C_{32} = 8; \quad C_{33} = -4$$

$$\therefore \text{எனவே } C = \begin{bmatrix} 1 & -1 & 2 \\ -5 & -6 & 8 \\ 0 & 8 & -4 \end{bmatrix}$$

$$|C| = 1$$

$$\therefore \frac{\text{கோடு } C}{|C|} = C^{-1}$$

$$= \begin{bmatrix} 1 & -5 & 0 \\ -1 & -5 & 8 \\ 2 & 8 & -4 \end{bmatrix} = (AB)^{-1} \quad \dots \quad (1)$$

இருபெருக்கடி

$$B_{11} = -2; \quad B_{12} = -2; \quad B_{13} = 1$$

$$B_{21} = -3; \quad B_{22} = -1; \quad B_{23} = -1$$

$$B_{31} = -4; \quad B_{32} = -1; \quad B_{33} = -2$$

$$\therefore \text{கோடு } B = \begin{bmatrix} -2 & -2 & 1 \\ -3 & -1 & -1 \\ -4 & -1 & -2 \end{bmatrix}$$

$$|B| = 1$$

$$\therefore B^{-1} = \frac{\text{கோடு } B}{|B|} = \begin{bmatrix} -2 & -2 & 1 \\ -3 & -1 & -1 \\ -4 & -1 & -2 \end{bmatrix}$$

$$A_{11} = 1; \quad A_{12} = -1; \quad A_{13} = 0$$

$$A_{21} = 2; \quad A_{22} = 2; \quad A_{23} = -2$$

$$A_{31} = -2; \quad A_{32} = 0; \quad A_{33} = 1$$

$$\text{கோடு } A = \begin{bmatrix} 1 & -2 & 0 \\ -1 & 2 & -2 \\ 0 & -2 & 1 \end{bmatrix}$$

$$|A| = 1$$

$$\therefore A^{-1} = \frac{\text{Cofactor } A}{|A|} = \begin{bmatrix} 1 & 2 & -3 \\ -1 & 3 & 0 \\ 0 & -2 & 1 \end{bmatrix}$$

$$\therefore B^{-1}A^{-1} = \begin{bmatrix} -2+3+0 & -4-2+3 & 4+0-4 \\ -2+1+0 & -4-3+3 & 4-0-1 \\ 1+1+0 & 3-3+4 & -2+0-2 \end{bmatrix}$$

$$= \begin{bmatrix} 1 & -5 & 0 \\ -1 & -5 & 3 \\ 2 & 3 & -4 \end{bmatrix} = (AB)^{-1} \dots (1)\text{-ல் இருந்து}$$

4.16. A என்ற ஒழுங்கு அணிமீதுகூடப் திருப்பு அணியின் தேரெதிர் அணிவாஸது. அதன் தேரெதிர் அணியின் திருப்பு அணிக்குச் சமம்.

$$\text{அதாவது, } (A')^{-1} = (A^{-1})'$$

திருபாயம் : A ஓர் ஒழுங்கு அணி.....கொண்டது.

$$\therefore |A| \neq 0.$$

$$\therefore AA^{-1} = A^{-1}A = I \text{ என்பதத்திணைக்க } A^{-1} \text{ உருவது.}$$

$$\therefore (AA^{-1})' = (A^{-1}A)' = I'$$

$$\therefore (A^{-1})' \cdot A' = A' \cdot (A^{-1})' = I \quad (\because I' = I)$$

இதிலிருந்து $(A^{-1})'$ ஆனது A' -ன் தேரெதிர் அணி எனத் தெரி விறது. அதாவது,

$$(A^{-1})' = (A')^{-1}.$$

$$\text{மேலு முறை : } (A')^{-1} = (A^{-1})'$$

$$\text{இப்பொழுது } A^{-1} = \frac{A\mu}{|A|} \quad \dots \quad \dots \quad \dots \quad (4.9)$$

$$\therefore (A^{-1})^t = \left[\frac{A_{ji}}{|A|} \right]$$

$$\text{மேலும் } A' = [a_{ji}],$$

$$\therefore A' \cdot (A^{-1})^t = [a_{ji}] \cdot \left[\frac{A_{ji}}{|A|} \right]$$

$$= I \quad (\because \sum a_{ji} A_{ji} = |A| ;$$

$$\sum a_{ji} A_{ik} = 0)$$

$$\therefore (A^{-1})^t = (A')^{-1}.$$

4.17. A என்பது ஒருங்கு அணிமீறாடைய, திருவு இணை அணி யின் தேரெதிர் அணிபடவது, அதன் தேரெதிர் அணியின் திருவு இணை அணிக்குச் சமம்.

$$\text{அதாவது, } (A^t)^{-1} = (A^{-1})^t$$

தீர்மானம்: A ஓர் ஒருங்கு அணி (கொள்கை)

$$\therefore |A| \neq 0$$

$$\therefore AA^{-1} = A^{-1}A = I \text{ என்பதறிவிக்க } A^{-1} \text{ உடனது.}$$

$$\therefore (AA^{-1})^t = (A^{-1}A)^t = I^t$$

$$\therefore (A^{-1})^t A^t = A^t \cdot (A^{-1})^t = I \quad (\because I^t = I)$$

$$\therefore (A^{-1})^t \text{ ஆனது } A^t\text{-ன் தேரெதிர் அணி.}$$

$$\text{அதாவது } (A^{-1})^t = (A^t)^{-1}.$$

4.18. $A^{-1} = \left[\frac{A_{ji}}{|A|} \right]$ என்பது வரைவதை ஏன்?

$$X = \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix}; \quad Y = \begin{bmatrix} y_1 \\ y_2 \end{bmatrix}; \quad A = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{bmatrix}$$

என்று இருக்கட்டும்.

$X = AY$ என்பது சமன்பாட்டை எடுத்துக்கொள்.

$$\begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} y_1 \\ y_2 \end{bmatrix}$$

$$\therefore x_1 = a_{11} y_1 + a_{12} y_2 \quad \dots \quad \dots \quad (1)$$

$$x_2 = a_{21} y_1 + a_{22} y_2 \quad \dots \quad \dots \quad (2)$$

$$(1) \times A_{11} + (2) \times A_{21} :$$

$$\begin{aligned} A_{11} x_1 + A_{21} x_2 &= a_{11} A_{11} y_1 + a_{12} A_{11} y_2 \\ &\quad + a_{21} A_{21} y_1 + a_{22} A_{21} y_2 \\ &= y_1 (a_{11} A_{11} + a_{21} A_{21}) \\ &\quad + y_2 (a_{12} A_{11} + a_{22} A_{21}) \\ &= y_1 |A| + y_2 \cdot 0 \\ &= |A| y_1 \end{aligned}$$

$$\therefore y_1 = \frac{A_{11}}{|A|} x_1 + \frac{A_{21}}{|A|} x_2 \quad \dots \quad \dots \quad (3)$$

இதேதரமாக, $(1) \times A_{12} + (2) \times A_{22}$ -ல் இருந்து

$$y_2 = \frac{A_{12}}{|A|} x_1 + \frac{A_{22}}{|A|} x_2 \quad \dots \quad \dots \quad (4)$$

என்று கிடைக்கும்.

(3), (4) எந்த சமன்பாடுகளில்

$$\begin{bmatrix} y_1 \\ y_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{A_{11}}{|A|} & \frac{A_{21}}{|A|} \\ \frac{A_{12}}{|A|} & \frac{A_{22}}{|A|} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix}$$

அதாவது,

$$Y = \begin{bmatrix} \frac{A_{11}}{|A|} & \frac{A_{21}}{|A|} \\ \frac{A_{12}}{|A|} & \frac{A_{22}}{|A|} \end{bmatrix} X$$

என எழுதலாம்.

ஆனால் $X = AY$ ஆகிறது,

$A^{-1} X = Y$ என்பது பொருத்தும்.

$$\text{ஆகவே } A^{-1}\text{ஐ } \begin{bmatrix} \frac{A_{11}}{|A|} & \frac{A_{21}}{|A|} \\ \frac{A_{12}}{|A|} & \frac{A_{22}}{|A|} \end{bmatrix} \text{ என வரையறை}$$

செய்வது பொருத்தமானதாகும்.

2.21 ஐவும், 2.22 ஐவும் ஒப்பிட்டுப் பாஃ.

4-19. இயக் கணித சமன்பாடுகளை கீழ்க்கண்டவதன் மூலம் தேரெடுத் அணியைக் கண்டுபிடித்தல்.

$x_1, x_2, \dots, x_n$ என்ற மாறிகளில் உள்ள n -சமன்பாடு களை எடுத்துக் கொள்வோம்.

$$a_{11} x_1 + a_{12} x_2 + \dots + a_{1n} x_n = b_1$$

$$a_{21} x_1 + a_{22} x_2 + \dots + a_{2n} x_n = b_2$$

$$\dots \dots \dots$$

$$a_{n1} x_1 + a_{n2} x_2 + \dots + a_{nn} x_n = b_n$$

இவற்றை அணிகளில் கீழ்க்கண்டவாறு எழுத இயலும்

$$\begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} \dots a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} \dots a_{2n} \\ \dots & \dots \dots \dots \\ a_{n1} & a_{n2} \dots a_{nn} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} b_1 \\ b_2 \\ \vdots \\ b_n \end{bmatrix}$$

$$\text{அதாவது, } AX = B \quad \dots \dots \dots (1)$$

$$\text{இதில் } A = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} \dots a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} \dots a_{2n} \\ \dots & \dots \dots \dots \\ a_{n1} & a_{n2} \dots a_{nn} \end{bmatrix}$$

$$X = \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \dots \\ x_n \end{bmatrix}; \quad Y = \begin{bmatrix} y_1 \\ y_2 \\ \dots \\ y_n \end{bmatrix}$$

(1)-ஐ A^{-1} ஆல் பெருக்கினால் $(|A| \neq 0)$ ஆக இருக்க வேண்டும்.)

$$A^{-1} A X = A^{-1} B$$

$$\text{அதாவது, } X = A^{-1} B \quad \dots \quad (2)$$

என்று கிடைக்கும். இதிலிருந்து A^{-1} -ஐக் கண்டு விடிந்து விடலாம்.

உதாரணம் 1 :

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & -2 \\ -1 & 3 & 0 \\ 0 & -2 & 1 \end{bmatrix} \text{ ஆனால்,}$$

A^{-1} ஐக் கண்டுவிடி.

$$x_1 + 2x_2 - 2x_3 = b_1 \quad \dots \quad (1)$$

$$-x_1 + 3x_2 = b_2 \quad \dots \quad (2)$$

$$-2x_2 + x_3 = b_3 \quad \dots \quad (3)$$

என்ற சமன்பாடுகளை எடுத்துக்கொள்வோம்.

$$(1) + (2) \quad 5x_2 - 2x_3 = b_1 + b_2 \quad \dots \quad (4)$$

$$2 \times (3) \quad -4x_2 + 2x_3 = 2b_3 \quad \dots \quad (5)$$

$$(4) + (5) \quad x_3 = b_1 + b_2 + 2b_3$$

$$(3)\text{-ஐ இருந்து } \dots \quad x_3 = 2b_1 + 2b_2 + 5b_3$$

$$(2)\text{-ஐ இருந்து } \dots \quad x_1 = 3b_1 + 2b_2 + 3b_3$$

இவற்றை, மூலமப்படி எழுதினும்,

$$x_1 = 3b_1 + 2b_2 + 6b_3$$

$$x_2 = b_1 + b_2 + 2b_3$$

$$x_3 = 2b_1 + 2b_2 + 5b_3$$

என்று கிடைக்கும். இவற்றை அணி வடிவில்

$$\begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 3 & 2 & 6 \\ 1 & 1 & 2 \\ 2 & 2 & 5 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} b_1 \\ b_2 \\ b_3 \end{bmatrix}$$

என எழுதலாம். அதாவது,

$$X = A^{-1}B$$

$$\therefore A^{-1} = \begin{bmatrix} 3 & 2 & 6 \\ 1 & 1 & 2 \\ 2 & 2 & 5 \end{bmatrix}$$

உதாரணம் 2 :

$$x + 3y - z = 4 \dots \dots \dots (1)$$

$$2x + 2y + 5z = 21 \dots \dots \dots (2)$$

$$y + 4z = 14 \dots \dots \dots (3)$$

இத்தச் சமன்பாடுகளின் குணக்கக் அணியின் நேரெதிர் அணியைக் கண்டுபிடிப்பதன் மூலம் இத்தச் சமன்பாடுகளை விடுவி.

$$\text{குணக்கக் அணி } A = \begin{bmatrix} 1 & 3 & -1 \\ 2 & 2 & 5 \\ 0 & 1 & 4 \end{bmatrix}$$

அ. அ. - 5

(1), (2), (3)ஐ அணி வடிவில் எழுதினும்

$$\begin{bmatrix} 1 & 8 & -1 \\ 8 & 8 & 6 \\ 0 & 1 & 4 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 4 \\ 21 \\ 14 \end{bmatrix}$$

அதாவது, $A \cdot X = B$ என இருக்கட்டும்.

$$\therefore X = A^{-1}B.$$

இப்பொழுது $A_{11} = 1$; $A_{12} = -8$; $A_{13} = 2$

$$A_{21} = -18$$
; $A_{22} = 4$; $A_{23} = -1$

$$A_{31} = 17$$
; $A_{32} = -7$; $A_{33} = -4$

$$|A| = 1 \times 8 + 8 \times (-8) + (-1) \times 8$$

$$= -28.$$

$$\therefore A^{-1} = \begin{bmatrix} \frac{8}{-28} & \frac{13}{28} & \frac{-17}{28} \\ \frac{8}{28} & \frac{-4}{28} & \frac{1}{28} \\ \frac{-2}{28} & \frac{1}{28} & \frac{4}{28} \end{bmatrix}$$

(5)-ல் இருக்க $X = A^{-1}B$.

$$\therefore \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{8}{-28} & \frac{13}{28} & \frac{-17}{28} \\ \frac{8}{28} & \frac{-4}{28} & \frac{1}{28} \\ \frac{-2}{28} & \frac{1}{28} & \frac{4}{28} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 4 \\ 21 \\ 14 \end{bmatrix}$$

$$\therefore x = \frac{1}{-28}(-8 \times 4 + 18 \times 21 - 17 \times 14) = 1$$

$$y = \frac{1}{28}(8 \times 4 - 4 \times 21 + 7 \times 14) = 2$$

$$z = \frac{1}{28}(-2 \times 4 + 1 \times 21 + 4 \times 14) = 3$$

4.20 : $|A| = 0$ ஆனால் A , செய்யுறு $A =$ பூச்சிய அணி.

நித்யமணி : செய்யுறு $A = [A_{ij}]$

$\therefore A$, செய்யுறு A -ன் $(i-j)$ ஆவது உறுபு

$$= \sum_{r=1}^n a_{ir} \cdot A_{jr}$$

$$= a_{i1} \cdot A_{j1} + a_{i2} \cdot A_{j2} + \dots + a_{in} \cdot A_{jn}$$

$$= \begin{cases} |A| & i = j \text{ ஆக இருந்தால்,} \\ 0 & i \neq j \text{ ஆக இருந்தால்.} \end{cases}$$

$$\therefore A \text{ செய்யுறு } A = \begin{bmatrix} |A| & 0 & \dots & 0 \\ 0 & |A| & \dots & 0 \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ 0 & 0 & \dots & |A| \end{bmatrix}$$

ஆனால் $|A| = 0 \dots \dots$ (செய்யுறு)

$\therefore A$ செய்யுறு $A =$ பூச்சிய அணி.

4.21 : அணிவளின் n ம் அடுக்கு வீழ்ச்சு :

$A^{-1} = (A^n)^{-1}$ என வரையறை செய்கோம்.

(i) $A^{-n} = (A^{-1})^n$ என நித்யப்போம்.

(ii) $A^n \cdot A^{-n} = A^{n-n}$

நித்யமணி :

$$(A^n)^{-1} = (A \cdot A \cdot A \dots \dots n \text{ தடவை})^{-1}$$

$$= A^{-1} \cdot A^{-1} \dots \dots n \text{ தடவை}$$

$$= (A^{-1})^n$$

ஆனால் $A^{-1} = (A^n)^{-1}$ (வரையறை).

$$\therefore A^{-n} = (A^{-1})^n$$

(ii) $A^n \cdot A^{-n} = A^{n-n}$

முதலாம் வகை : $m > n$ ஆக இருக்கட்டும்.

$\therefore m = n + k$ என இருக்கும்படி k என்ற நேர் முழு எண் உண்டு.

இப்பொழுது,

$$\begin{aligned} A^m \cdot A^{-n} &= A^{n+k} \cdot A^{-n} \\ &= A^k \cdot A^n \cdot A^{-n} \dots \text{தொடர்பு விதி} \\ &= A^k \cdot A^n \cdot (A^n)^{-1} \dots \text{வரையறை} \\ &= A^k \cdot I \\ &= A^k \\ &= A^{m-n} \end{aligned}$$

$$\therefore A^m \cdot A^{-n} = A^{m-n}.$$

இரண்டாம் வகை : $m < n$ ஆக இருக்கட்டும்.

$\therefore n = m + k$ என இருக்கும்படி k என்ற நேர் முழு எண் உண்டு.

$$\begin{aligned} \text{இப்பொழுது, } A^m \cdot A^{-n} &= A^m \cdot (A^{-1})^n \\ &= A^m \cdot (A^{-1})^{m+k} \\ &= A^m \cdot (A^{-1})^m (A^{-1})^k \dots \text{தொடர்பு விதி} \\ &= A^m \cdot A^{-m} \cdot A^{-k} \dots \text{வரையறை} \\ &= I \cdot A^{-k} \dots \text{(i)-ல் இருத்து} \\ &= A^{-k} \end{aligned}$$

$$\therefore A^m \cdot A^{-n} = A^{m-n}$$

மூன்றாம் வகை : $m = n$ ஆக இருக்கட்டும்.

$$A^m \cdot A^{-n} = A^n \cdot A^{-n} = I \dots \text{(i)-ல் இருத்து}$$

$$\therefore A^{m-n} = I \dots \text{எனச் சொல்வது,}$$

அதாவது $A^0 = I$ என வரையறை செய்வது பொருத்தமானது என்பதைக் காண்க. 2-18ஐயும் ஒப்பிட்டுப் பார்க்க.

மாதிரிக் கணக்குகள்

மாதிரி 1: A என்பது 2-சதுர அணிவானும்,

சேர்ப்பு (சேர்ப்பு A) = A என நினை.

$$A = \begin{bmatrix} p & q \\ r & s \end{bmatrix} \text{ ஆக இருக்கட்டும்.}$$

P, Q, R, S என்பன p, q, r, s -ன் இணைக் காரணிகளாக (co-factors) இருக்கட்டும். அப்படியானால்,

$$\text{சேர்ப்பு } A = \begin{bmatrix} P & R \\ Q & S \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} s & -q \\ -r & p \end{bmatrix}$$

$$\begin{aligned} \therefore \text{சேர்ப்பு (சேர்ப்பு } A) &= \begin{bmatrix} p & -(-q) \\ -(-r) & s \end{bmatrix} \\ &= \begin{bmatrix} p & q \\ r & s \end{bmatrix} = A. \end{aligned}$$

$$\therefore \text{சேர்ப்பு (சேர்ப்பு } A) = A.$$

மாதிரி 2: ஒரு முனைப்பட்ட அணியின் சேர்ப்பு அணியும் முனைப்பட்ட அணிவாக இருக்க வேண்டும்.

(சேர்ப்பு A)-ன் $(i-j)$ ஆவது உறுப்பு A_{ji} ஆகும்.

ஒரு முனைப்பட்ட அணியில் $i \neq j$ ஆனால் $A_{ji} = 0$.

மேலும், $i = j$ ஆனால்,

$$\begin{aligned} A_{ii} &= | \text{முனைப்பட்ட அணி } (d_1 d_2 \dots d_{i-1}, d_{i+1} \dots d_n) | \\ &= d_1 d_2 \dots d_{i-1} d_{i+1} \dots d_n. \quad \text{இதில் } d_i = a_{ii}. \end{aligned}$$

$\therefore$ சேர்ப்பு A உம் ஒரு முனைப்பட்ட அணி.

வேறுமுறை:

$$A = \begin{bmatrix} d_1 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & d_2 & \dots & 0 \\ 0 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & 0 & \dots & d_n \end{bmatrix} \text{ ஆக இருக்கட்டும்.}$$

இதற்கிணங்க இவற்றைக் கணித சமன்பாடுகள் வகுமாறு :

$$d_1 x_1 = b_1 \quad \dots \quad \dots \quad \dots \quad (1)$$

$$d_2 x_2 = b_2 \quad \dots \quad \dots \quad \dots \quad (2)$$

$$\dots \quad \dots \quad \dots \quad \dots \quad \dots \quad \dots$$

$$d_n x_n = b_n \quad \dots \quad \dots \quad \dots \quad (n)$$

$$\therefore x_1 = \frac{1}{d_1} b_1$$

$$x_2 = \frac{1}{d_2} b_2$$

$$\dots \quad \dots \quad \dots$$

$$x_n = \frac{1}{d_n} b_n$$

$$\therefore A^{-1} = \begin{bmatrix} \frac{1}{d_1} & 0 & \dots & 0 \\ 0 & \frac{1}{d_2} & \dots & 0 \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ 0 & 0 & \dots & \frac{1}{d_n} \end{bmatrix}$$

$$= \frac{\text{Cofactor } A}{|A|}$$

$$\therefore \text{Cofactor } A = |A| \begin{bmatrix} \frac{1}{d_1} & 0 & \dots & 0 \\ 0 & \frac{1}{d_2} & \dots & 0 \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ 0 & 0 & \dots & \frac{1}{d_n} \end{bmatrix}$$

ஆனால் $|A| = d_1 d_2 \dots d_n$

$$\therefore \text{செய்யு } A = \begin{bmatrix} (d_1 d_2 \dots d_n) & 0 & \dots & \dots & \dots & 0 \\ 0 & (d_1 d_2 \dots d_n) & \dots & \dots & \dots & 0 \\ 0 & 0 & \dots & \dots & \dots & (d_1 d_2 \dots d_{n-1}) \end{bmatrix}$$

என்பதும் ஒரு முடிவாக அணி.

மாதிரி 3: பூச்சிய அணிகள் அல்லாத இரு அணிகளின் பெருக்கற்பலன் பூச்சிய அணியானால் அவை ஒற்றியு அணிகள் ஆகை என நினை.

$A \neq 0; B \neq 0$; ஆனால், $AB = 0 \dots$ (கொள்கை)

$|A| = 0, |B| = 0$ என நினை.

நினைபவம்: கூடுமானால், $|A| \neq 0$ என வைத்துக் கொள்ளும். அப்படியானால் A^{-1} என்ற அணி இருக்க வேண்டும்.

இப்பொழுது $AB = 0 \dots$ (கொள்கை)

$$\therefore A^{-1}AB = A^{-1} \cdot 0 = 0$$

$$IB = 0, \text{ அதாவது } B = 0$$

இது கொள்கைக்கு முரணானது.

$\therefore |A| = 0$ ஆக இருக்க வேண்டும்.

இதேவிதமாக $|B| = 0$ எனவும் நினைக்கலாம்.

மாதிரி 4: A, B என்பன சமச்சீர் அணிகளாகவும், பரிமாற்று அணிகளாகவும் இருந்தால் $A^{-1}B, AB^{-1}, A^{-1}B^{-1}$ என்பனவும் சமச்சீர் அணிகள் என நினை.

$$A = A'; B = B'; AB = BA \dots \dots \dots \text{(கொள்கை)}$$

$$(i) (A^{-1}B)' = A^{-1}B$$

$$(ii) (AB^{-1})' = AB^{-1}$$

(iii) $(A^{-1}B^{-1})' = A^{-1}B^{-1}$ என நிரூபிக்க வேண்டும்.

$$\begin{aligned}
 \text{(i)} \quad (A^{-1}B)' &= B' \cdot (A^{-1})' && \dots \dots \dots (3.8) \\
 &= B' \cdot (A')^{-1} && \dots \dots (4.16) \text{--இலிருந்து} \\
 &= B \cdot (A)^{-1} && \because \text{இவை சமச்சீர் அணிகள்} \\
 &= B \cdot A^{-1} B^{-1} B \\
 &= B \cdot (BA)^{-1} B \\
 &= B \cdot (AB)^{-1} B && \dots \dots \dots \because A, B \text{ பரஸ்பரம் அணிகள்} \\
 &= BB^{-1} \cdot A^{-1} B \\
 &= A^{-1} B && \because BB^{-1} = I
 \end{aligned}$$

(ii) உங்கள் பரிந்துரிக்காக.

$$\begin{aligned}
 \text{(iii)} \quad (A^{-1}B^{-1})' &= (B^{-1})' \cdot (A^{-1})' && \dots \dots \dots (3.8) \\
 &= (B')^{-1} \cdot (A')^{-1} && \dots \dots (4.16) \\
 &= B^{-1} \cdot A^{-1} && \dots \dots \dots \because \text{இவை சமச்சீர்} \\
 & && \text{அணிகள்} \\
 &= (AB)^{-1} \\
 &= (BA)^{-1} && \therefore \text{இவை பரஸ்பரம் அணிகள்} \\
 &= A^{-1}B^{-1}
 \end{aligned}$$

மாதிரி 5: A ஓர் ஒற்றங்கு அணிவானால், $A^{-1} = (A'A)^{-1}A'$ என்று காண்க.

$$\begin{aligned}
 \text{நிரூபணம்:} \quad (A'A)^{-1}A' &= A^{-1} \cdot (A')^{-1} \cdot A' \\
 &= A^{-1} \cdot (A^{-1})' \cdot A' \\
 &= A^{-1}(AA^{-1})' \\
 &= A^{-1}I \\
 &= A^{-1}I = A^{-1}
 \end{aligned}$$

$$\therefore A^{-1} = (A'A)^{-1}A'$$

மாதிரி 6 : A, B பரிமாற்று அணிகளாக இருத்தால்,

A^{-1} உம், B^{-1} உம் பரிமாற்று அணிகள் என நினை.

$AB = BA \dots$ (கொள்கை)

$A^{-1}B^{-1} = B^{-1}A^{-1}$ என நினைக்கவேண்டும்.

நிபுணம்: $AB = BA \dots$ (கொள்கை)

$$\therefore (AB)^{-1} = (BA)^{-1}$$

$$\therefore B^{-1}A^{-1} = A^{-1}B^{-1}$$

மாதிரி 7 :

$$\begin{bmatrix} \cos \theta & -\sin \theta \\ \sin \theta & \cos \theta \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & -\tan \frac{\theta}{2} \\ \tan \frac{\theta}{2} & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & \tan \frac{\theta}{2} \\ -\tan \frac{\theta}{2} & 1 \end{bmatrix}^{-1}$$

என நினை.

$$A = \begin{bmatrix} 1 & \tan \frac{\theta}{2} \\ -\tan \frac{\theta}{2} & 1 \end{bmatrix} \text{ ஆக இருக்கட்டும்.}$$

$$A_{11} = 1; \quad A_{12} = -\left(-\tan \frac{\theta}{2}\right)$$

$$A_{21} = -\tan \frac{\theta}{2}; \quad A_{22} = 1$$

$$|A| = 1 - \left(-\tan^2 \frac{\theta}{2}\right) = \sec^2 \frac{\theta}{2}$$

$$\begin{aligned}
A^{-1} &= \frac{1}{|A|} \cdot \begin{bmatrix} A_{11} & A_{21} \\ A_{12} & A_{22} \end{bmatrix} = \cos^2 \frac{\theta}{2} \begin{bmatrix} 1 & -\tan \frac{\theta}{2} \\ \tan \frac{\theta}{2} & 1 \end{bmatrix} \\
&= \begin{bmatrix} \cos^2 \frac{\theta}{2} & -\sin \frac{\theta}{2} \cos \frac{\theta}{2} \\ \sin \frac{\theta}{2} \cos \frac{\theta}{2} & \cos^2 \frac{\theta}{2} \end{bmatrix} \\
&= \begin{bmatrix} 1 & -\tan \frac{\theta}{2} \\ \tan \frac{\theta}{2} & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \cos^2 \frac{\theta}{2} & -\sin \frac{\theta}{2} \cos \frac{\theta}{2} \\ \sin \frac{\theta}{2} \cos \frac{\theta}{2} & \cos^2 \frac{\theta}{2} \end{bmatrix} \\
&= \begin{bmatrix} \cos^2 \frac{\theta}{2} - \sin^2 \frac{\theta}{2} & -\sin \frac{\theta}{2} \cos \frac{\theta}{2} - \sin \frac{\theta}{2} \cos \frac{\theta}{2} \\ \sin \frac{\theta}{2} \cos \frac{\theta}{2} + \sin \frac{\theta}{2} \cos \frac{\theta}{2} & -\sin^2 \frac{\theta}{2} + \cos^2 \frac{\theta}{2} \end{bmatrix} \\
&= \begin{bmatrix} \cos \theta & -\sin \theta \\ \sin \theta & \cos \theta \end{bmatrix}
\end{aligned}$$

மேலும் 6: P, Q என்னும் அனிகிகள் $|P| = 1 = |Q|$ என்பதற்கானதாக உள்ளன. $A =$ சேர்வு B ஆனால் $PAQ =$ சேர்வு $(Q^{-1}BP^{-1})$ என நிறுவு.

$$B, \text{ சேர்வு } B = |B| I \quad \dots \quad \dots \quad \dots \quad (4.8)$$

$$\text{ஆனால் } A = \text{சேர்வு } B \quad \dots \quad \dots \quad \dots \quad (\text{கொள்வனவு})$$

$$\therefore BA = |B| I \quad \dots \quad \dots \quad \dots \quad (1)$$

$PAQ =$ சேர்வு $(Q^{-1}BP^{-1})$ என நிறுவிக்கவேண்டும்.

$$\therefore (Q^{-1}BP^{-1})(PAQ) = |Q^{-1}BP^{-1}| I \text{ என நிறுவித்தால் } \\ \text{பெறுவோம்.} \quad \dots \quad \dots \quad \dots \quad \dots \quad (2)$$

இப்பொழுது $(Q^{-1}BP^{-1})(PAQ) = Q^{-1}B(P^{-1}P)AQ \dots$ தெய்விய
விதி

$$= Q^{-1}BIAQ$$

$$= Q^{-1}(BA)Q$$

$$= Q^{-1} | B | I Q \dots \dots (1)\text{-ல் இருந்து}$$

$$(Q^{-1}BP^{-1})(PAQ) = | B | I \dots \dots (2)$$

$$\begin{aligned} \text{மேலும் } | Q^{-1}BP^{-1} | I &= | Q^{-1} | \cdot | B | \cdot | P^{-1} | \cdot I \\ &= 1 \times | B | \times 1 \times I \dots (4) \end{aligned}$$

$$\text{ஏனெனில் } QQ^{-1} = I$$

$$\therefore | QQ^{-1} | = 1$$

$$\therefore | Q | \cdot | Q^{-1} | = 1$$

$$\therefore | Q^{-1} | = 1 \quad \because | Q | = 1 \dots (\text{கொள்கை})$$

$$\text{இதேவிதமாக } | P^{-1} | = 1.$$

$$(3), (4)\text{-ல் இருந்து } (Q^{-1}BP^{-1})(PAQ) = | Q^{-1}BP^{-1} | I$$

$$\therefore PAQ = \text{செய்யு } (Q^{-1}BP^{-1}).$$

மாநி 10: A ஒரு சமச்சரி அணி; B ஓர் எதிர்ச்சரி அணி; $A+B$ ஓர் ஒழுங்கு அணி; மேலும் $C = (A+B)^{-1}(A-B)$. ஆனால் C இன் கருவணவற்றை திருபி.

$$(i) \quad C'(A+B), C = A+B$$

$$(ii) \quad C'(A-B)C = A-B$$

$$(iii) \quad C'AC = A$$

$$(i) \quad C = (A+B)^{-1} \cdot (A-B) \dots \dots (\text{கொள்கை})$$

$$\therefore C' = [(A+B)^{-1} (A-B)]'$$

$$= (A-B)' [(A+B)^{-1}]'$$

$$= (A-B)' [(A+B)']^{-1}$$

$$= (A'-B') [A'+B']^{-1}$$

$$= (A+B) [A-B]^{-1}$$

$$\begin{aligned}
 \therefore C'(A+B) \cdot C &= (A+B)(A-B)^{-1}(A+B)(A+B)^{-1}(A-B) \\
 &= (A+B)(A-B)^{-1}I(A-B) \\
 &= (A+B)(A-B)^{-1}(A-B) \\
 &= (A+B)I \\
 &= (A+B)
 \end{aligned}$$

$$\therefore C'(A+B) \cdot C = A+B \quad \dots \quad \dots \quad (1)$$

$$(ii) \text{ இமேதரிதமாக } C'(A-B)C = A-B \quad \dots \quad (2)$$

(iii) (1)ஐவும் (2)ஐவும் கூட்ட

$$C'2AC = 2A$$

$$\therefore C'AC = A$$

மதி 11 : c என்பது $(1, 1, \dots, 1)$ என்பவைகளை உறுப்புக்களாகக் கொண்ட நேர் அணிவாகவும், c' என்பது அதன் நேர்மாறு அணிவாக நேர் அணிவாகவும் இருக்கட்டும்.

A என்பது n -சதுர அணி, $M(x) = I + xAcc'$ என இருக்கட்டும். x ஓர் எண்ணி (scalar).

(i) $k = c'Ac$ என்ற எண்ணியானால் $M(x), M(y) = M(x+y+kxy)$ என நிரூபி.

(ii) $M(x)$ -ன் நேர்மாறு அணி $M\left(\frac{-x}{1+kx}\right)$ என நிரூபி.

(iii) $b_{ii}=1$ ஆகவும், $i \neq j$ ஆனால் $b_{ij}=b$ ஆகவும் உள்ள $B=[b_{ij}]$ என்றும் அணியை $(1-b)I + bcc'$ என எழுதலாம் என நிரூபி. இதிலிருந்து B^{-1} ஐக் கண்டுபிடி.

நிரூபணம்:

$$\begin{aligned}
 (i) \quad M(x), M(y) &= (I + xAcc')(I + y \cdot Acc') \\
 &= I + (x+y)Acc' + xyAcc'Acc' \\
 &= I + (x+y)Acc' + xyAekc' \\
 &\quad \because c'Ac = k. \\
 &= I + (x+y)Acc' + kxyAcc'
 \end{aligned}$$

$$= I + (x + y + kxy) A \alpha \alpha'$$

$$= M(x + y + kxy),$$

(ii) $x + y + kxy = 0$ என்று போடு. அதாவது, $y = \frac{-x}{1+kx}$ என்று போட்டால்,

$$M(x) \cdot M\left(\frac{-x}{1+kx}\right) = M(0) = I \text{ என்று கிடைக்கிறது.}$$

$$\text{எனவே } M\left(\frac{-x}{1+kx}\right) = [M(x)]^{-1} \text{ என்று தெரிகிறது.}$$

$$\begin{aligned} \text{(iii)} \quad B &= \begin{bmatrix} 1 & b & b & \dots & b \\ b & 1 & b & \dots & b \\ \dots & \dots & \dots & \dots & \dots \\ b & b & b & \dots & 1 \end{bmatrix} \\ &= \begin{bmatrix} (1-b+b) & 0+b & 0+b & \dots & 0+b \\ 0+b & (1-b+b) & 0+b & \dots & 0+b \\ \dots & \dots & \dots & \dots & \dots \\ 0+b & 0+b & \dots & \dots & (1-b+b) \end{bmatrix} \\ &= \begin{bmatrix} 1-b & 0 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & 1-b & 0 & \dots & 0 \\ \dots & \dots & \dots & \dots & \dots \\ 0 & 0 & 0 & \dots & 1-b \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} b & b & \dots & \dots & b \\ b & b & b & \dots & b \\ \dots & \dots & \dots & \dots & \dots \\ b & b & b & \dots & b \end{bmatrix} \\ &= (1-b)I + b \alpha \alpha' \end{aligned}$$

$$\alpha \alpha' = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ \dots \\ 1 \end{bmatrix} [1 \quad 1 \quad \dots \quad 1] = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & \dots & 1 \\ 1 & 1 & 1 & \dots & 1 \\ \dots & \dots & \dots & \dots & \dots \\ 1 & 1 & 1 & \dots & 1 \end{bmatrix}$$

$$\text{இப்பொழுது, } B = (1-b) \left[I + \frac{b}{1-b} \cdot cc' \right]$$

$$\therefore B^{-1} = \left[I + \frac{b}{1-b} \cdot cc' \right]^{-1} (1-b)^{-1}$$

$$= (M(x))^{-1} (1-b)^{-1}$$

$$\text{இதில் } x = \frac{b}{1-b}; \quad A = I; \quad k = c'Ic = a.$$

$$= \left[I - \frac{\frac{b}{1-b}}{1 + \frac{a \cdot b}{1-b}} \cdot cc' \right] (1-b)^{-1}.$$

$$B^{-1} = \left[I - \frac{b}{1 + (a-1)b} \right] (1-b)^{-1}$$

மாதிரி 14 : ஒரு சமச்சரி அணியின் நேரெதிர் அணியும் சமச்சரி அணி எனத் தரும். உதாரணம் கொடு.

தீர்மானம் : A ஒரு சமச்சரி அணியாக இருக்கும்.

$$\therefore A = A' \quad \dots \quad \dots \quad \dots \quad \dots \quad (1)$$

$(A^{-1}) = (A^{-1})'$ என நிரூபிக்க வேண்டும்.

$$AA^{-1} = I \quad \dots \quad \text{வரையறைப்படி.}$$

$$\therefore (AA^{-1})' = I'$$

$$(A^{-1})' \cdot A' = I \quad \therefore I' = I$$

$$\therefore (A^{-1})' \cdot A = I \quad \therefore A' = A \quad \dots \quad \dots \quad (1)$$

$$\therefore A^{-1} = (A^{-1})'.$$

உதாரணம் :

$$A = \begin{bmatrix} 7 & 3 & 2 \\ 3 & 2 & 1 \\ 2 & 1 & 1 \end{bmatrix} \text{ ஆகும்,}$$

$$A_{11} = 1; \quad A_{12} = -1; \quad A_{13} = -1$$

$$A_{21} = -1; \quad A_{22} = 3; \quad A_{23} = -1$$

$$A_{31} = -1; \quad A_{32} = -1; \quad A_{33} = 3$$

$$A^{-1} = \frac{1}{|A|} \cdot \begin{bmatrix} 1 & -1 & -1 \\ -1 & 3 & -1 \\ -1 & -1 & 3 \end{bmatrix}$$

$$\text{ஆகவே } |A| = 2.$$

$$\therefore A^{-1} = \begin{bmatrix} \frac{1}{2} & -\frac{1}{2} & -\frac{1}{2} \\ -\frac{1}{2} & \frac{3}{2} & -\frac{1}{2} \\ -\frac{1}{2} & -\frac{1}{2} & \frac{3}{2} \end{bmatrix} = (A^{-1})'$$

மேற் 15 : ஒர் எதிர்ச்சி அணியில் தாம் இரட்டை எண்ணாக (even number) இருத்தால்தான் அதற்கு நேரெதிர் அணி உண்டு என்றும், அதுவும் எதிர்ச்சி அணியாக இருக்கும் என்றும் திருப்தி.

A ஒரு n -சதுர எதிர்ச்சி அணியாக இருக்கட்டும்.

$$\therefore A = -A'$$

$$\therefore |A| = (-1)^n, \quad |A'| = (-1)^n, \quad |A|$$

n ஒற்றை எண் (odd number) ஆக இருத்தால்

$$|A| = -|A|$$

$$\therefore |A| = 0 \text{ ஆகிவிடும்.}$$

$\therefore A$ ஒழுங்கு அணி அல்ல. A^{-1} என்பது அர்த்தமற்றது.

ஆகவே, n இரட்டை எண்ணாக இருத்தால்தான் அதற்கு நேரெதிர் அணி உண்டு.

$$\text{மேலும், } AA^{-1} = I_n$$

$$\therefore (A^{-1})' A' = I'$$

$$(A^{-1})', (-A) = I \quad \because I = I, A' = -A$$

$$\therefore A\text{-ன் நேர்மாறு அணி } -(A^{-1})'.$$

$$\text{அதாவது, } A^{-1} = -(A^{-1})'.$$

$$\therefore A^{-1} \text{ ஓர் எதிர்க்கதி அணி.}$$

$$\text{உதாரணம்: } A = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{bmatrix} \text{ என்பது}$$

எதிர்க்கதி அணியாகும்

$$A^{-1} = \begin{bmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix} \text{ என்பது எதிர்க்கதி அணியாகும்}$$

என்பதைச் சரிபார்க்க.

பயிற்சி 4

1. கீழ்க்கரும் அணிகளின் சேர்ப்பு அணிகளைக் காண்பிப்பிடு.

$$(i) \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & -3 \\ 2 & -1 & 3 \end{bmatrix} \quad (ii) \begin{bmatrix} -1 & -2 & 3 \\ -2 & 1 & 1 \\ 4 & -5 & 2 \end{bmatrix}$$

$$(iii) \begin{bmatrix} 2 & 1 & 0 \\ 0 & -3 & 1 \\ -1 & -1 & 3 \end{bmatrix} \quad (iv) \begin{bmatrix} 0 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 0 \\ 3 & -1 & 4 \end{bmatrix}$$

$$(v) \begin{bmatrix} 5 & 0 & 0 & 2 \\ 1 & 1 & 0 & 2 \\ 0 & 0 & 2 & 1 \\ 1 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \quad (vi) \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 0 \\ 2 & 3 & 3 & 2 \\ 1 & 2 & 3 & 2 \\ 4 & 6 & 7 & 4 \end{bmatrix}$$

$$2. \quad A = \begin{bmatrix} -1 & -2 & -2 \\ 2 & 1 & -2 \\ 2 & -2 & 1 \end{bmatrix} \quad \text{ஆனால்,}$$

சேர்ப்பு $A = 3A'$ எனக் காண்க.

$$3. \quad A = \begin{bmatrix} 4 & -3 & -3 \\ 1 & 0 & 1 \\ 4 & 4 & 8 \end{bmatrix} \quad \text{ஆனால்,}$$

சேர்ப்பு $A = A$ எனக் காண்க.

4. A ஒரு சமச்சீர் அணியானால் சேர்ப்பு A உம் ஒரு சமச்சீர் அணி எனக் காண்க.

5. A ஒரு நேர்மிகு அணியானால் சேர்ப்பு A உம் ஒரு நேர்மிகு அணி என நிரூபி.

6. ஓர் அளவை அணியின் சேர்ப்பு அணியும் ஓர் அளவை அணி என நிரூபி.

7. ஒரு மூலம் விட்ட அணியின் சேர்ப்பு அணியும் ஒரு மூலம் விட்ட அணி என நிரூபி.

8. ஒரு முக்கோண அணியின் சேர்ப்பு அணியும் ஒரு முக்கோண அணி என நிரூபி.

9. A ஒரு n -சதுர எதிர்ச்சீர் அணியானால், n ஒற்றையெண்ணாகவோ இரட்டையெண்ணாகவோ இதர்ப்பதற்கேற்ப சேர்ப்பு A ஆனது சமச்சீர் அணியாகவோ எதிர்ச்சீர் அணியாகவோ இருக்கும்.

10. $|A| = 0$ ஆனால் $|சேர்ப்பு A| = 0$ என நிரூபி.

11. A ஒரு 2-சதுர அணியானால் சேர்ப்பு $(சேர்ப்பு A) = A$ என நிரூபி.

12. A ஒரு மூன்றாம் தரமுள்ள முக்கியமங்கலாத அணி, சேர்ப்பு $A' = 0$ என்றவாறிருக்கிறது என்றால் A ஐ எழுது.

13. A ஒரு n -சதுர அணியாகவும், k ஓர் எண்ணியாகவும் இருந்தால் $|Ak| = |A| \cdot k^n$ எனவும், சேர்ப்பு $(kA) = k^{n-1} (சேர்ப்பு A)$ எனவும் நிரூபி.

அ. அ. - 9

14. A ஒரு n -சதுர அணிவாகுல் $|\operatorname{Cof} A|$ ($\operatorname{Cof} A$) $= |A|^{(n-1)}$ என்று திருபி.

15. பின்வரும் அணிகளில் தேர்வாகுன (தேர்வெதிர்) அணி கண்டிப்பிடு. பின்னர் $AA^{-1} = I$ எனவும் திருபி.

$$(i) \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 4 & 5 \\ 3 & 5 & 6 \end{bmatrix}$$

$$(ii) \begin{bmatrix} 0 & 1 & 2 \\ 1 & 2 & 3 \\ 3 & 1 & 1 \end{bmatrix}$$

$$(iii) \begin{bmatrix} \cos \theta & -\sin \theta & 0 \\ \sin \theta & \cos \theta & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$$(iv) \begin{bmatrix} 1 & 2 & 0 & 0 \\ 0 & 3 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 2 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 3 \end{bmatrix}$$

$$(v) \begin{bmatrix} 2 & 1 & -1 & 2 \\ 1 & 3 & 2 & -3 \\ -1 & 2 & 1 & -1 \\ 2 & -3 & -1 & 4 \end{bmatrix}$$

$$(vi) \begin{bmatrix} \cos \theta \cos \phi & \sin \phi & \cos \phi \sin \theta \\ -\sin \theta \cos \phi & \cos \phi & -\sin \phi \cos \theta \\ -\sin \theta & 0 & \cos \theta \end{bmatrix}$$

16. பின்வருவனவற்றில் A இன் தேர்வாகுன அணிவாகுல் கண்டுபிடித்து விடைவைச் சரிபாதி.

$$(i) A = \begin{bmatrix} 3 & -2 & 0 & -1 \\ 0 & 2 & 2 & 1 \\ 1 & -2 & -3 & -2 \\ 0 & 1 & 2 & 1 \end{bmatrix} \quad \text{ஆனால்,} \quad A^{-1} = \begin{bmatrix} 1 & 1 & -2 & -4 \\ 0 & 1 & 0 & -1 \\ -1 & -1 & 3 & 3 \\ 2 & 1 & -3 & -10 \end{bmatrix}$$

$$(ii) A = \begin{bmatrix} 0 & 2 & 1 & 5 \\ 1 & 1 & -1 & -2 \\ 1 & 2 & 0 & 1 \\ -1 & 1 & 2 & 6 \end{bmatrix} \text{ ஆனால், } A^{-1} = \begin{bmatrix} -1 & -2 & 0 & -1 \\ 1 & 1 & -1 & 0 \\ 2 & -5 & 2 & -2 \\ -1 & 1 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$$(iii) A = \begin{bmatrix} -1 & -1 & 1 & 1 \\ 11 & -7 & 1 & -1 \\ 7 & -2 & -1 & -1 \\ -26 & 16 & 0 & 2 \end{bmatrix} \text{ ஆனால், } A^{-1} = \frac{1}{4} \begin{bmatrix} 8 & 4 & 10 & 4 \\ 8 & 6 & 14 & 6 \\ 4 & 6 & 6 & 4 \\ 14 & 4 & 18 & 8 \end{bmatrix}$$

$$(iv) A = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ -2 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & -2 & 1 & 0 \\ 5 & -1 & -1 & 1 \end{bmatrix} \text{ ஆனால், } A^{-1} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 2 & 1 & 0 & 0 \\ 4 & 2 & 1 & 0 \\ -2 & 3 & 1 & 1 \end{bmatrix}$$

$$(v) \begin{bmatrix} 1 & 3 & 3 & 2 & 1 \\ 1 & 4 & 2 & 3 & -1 \\ 1 & 3 & 4 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 1 & -1 \\ 1 & -2 & -1 & 2 & 2 \end{bmatrix} \text{ ஆனால்,}$$

$$A^{-1} = \frac{1}{15} \begin{bmatrix} 30 & -20 & -15 & 25 & -6 \\ 30 & -11 & -18 & 7 & -8 \\ -30 & 12 & 21 & -9 & 6 \\ -15 & 12 & 6 & -9 & 6 \\ 15 & -7 & -9 & -1 & -1 \end{bmatrix}$$

17. $(AB)^{-1} = B^{-1} \cdot A^{-1}$ என்பதைப் பின்வரும் அணி களில் சரிபார்க்க.

$$(i) \quad A = \begin{bmatrix} 2 & 3 \\ 1 & 4 \end{bmatrix}; \quad B = \begin{bmatrix} 3 & 2 \\ 5 & 4 \end{bmatrix}$$

$$(ii) \quad A = \begin{bmatrix} 1 & 3 & 3 \\ 1 & 3 & 4 \\ 1 & 4 & 3 \end{bmatrix}; \quad B = \begin{bmatrix} 1 & -3 & 2 \\ -3 & 3 & -1 \\ 2 & -1 & 0 \end{bmatrix}$$

18. பின்வருவனவற்றைத் தீருக.

$$(i) \quad (-A)^{-1} = -(A)^{-1}$$

$$(ii) \quad (A)' = \overline{(A^{-1})}$$

$$(iii) \quad (A^{-1})^{-1} = A.$$

19. A உம் B உம் n -சதுர அணிகள். A -க்கு நேர்மாறான அணி உண்டா என்க.

$$(A + B) \cdot A^{-1} (A - B) = (A - B) \cdot A^{-1} (A + B).$$

$$20. (i) \quad x_1 + 2x_2 = b_1; \quad 3x_2 = b_1;$$

$$2x_2 + x_3 = b_2; \quad 3x_3 = b_2$$

என்னும் சமன்பாடுகளை அணி வடிவில் எழுது.

$$x_1 = b_1 - \frac{2}{3}b_2; \quad x_2 = \frac{b_1}{3}$$

$$x_3 = \frac{1}{2}b_2 - \frac{1}{6}b_1; \quad x_4 = \frac{1}{3}b_2$$

என்று கண்டுபிடித்து, இவற்றையும் அணி வடிவில் எழுது.

இவற்றிலிருந்து,

$$\begin{bmatrix} 1 & 2 & 0 & 0 \\ 0 & 3 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 2 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 3 \end{bmatrix}^{-1} = \begin{bmatrix} 1 & -\frac{2}{3} & 0 & 0 \\ 0 & \frac{1}{3} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & \frac{1}{2} & -\frac{1}{6} \\ 0 & 0 & 0 & \frac{1}{3} \end{bmatrix}$$

(b) இதை முறைமை உபயோகித்து, பின்வரும் அணிகளில் நேரெதிர் அணிகளைக் காண்போம்.

$$(i) \begin{bmatrix} 7 & -8 & -8 \\ -1 & 0 & 1 \\ -1 & 1 & 0 \end{bmatrix} \quad (ii) \begin{bmatrix} 0 & 1 & 2 \\ 1 & 2 & 3 \\ 3 & 1 & 1 \end{bmatrix}$$

21. கிஞ்சி (அணிகள் முறையில்) :

$$(i) \quad x + 2y + 3z = 5$$

$$3x - y + z = 1$$

$$2x + y - z = 4$$

$$(ii) \quad -x + y + 4z = 0$$

$$2x - y + z = 7$$

$$3x + 2y - z = 1.$$

$$(iii) \quad 2x - 3y + 3z = 9$$

$$x + y + z = 6$$

$$x - y + z = 2$$

$$(iv) \quad 3x + 7y + 3z = 6$$

$$5x - y + 4z = 1$$

$$6x + 8y + 2z = 4.$$

$$22. \quad A = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ -1 & -1 & -1 \end{bmatrix} \text{ ஆகும்.}$$

$A^3 = A^{-1}$ என நிரூபி.

23. A ஒரு n -சதுர அணிவாகவும், B அதன் சேர்ப்பு அணி வாகவும் இருந்தால் $|AB + kI| = (|A| + k)^n$ என நிரூபி.

குறிப்பு : k என்பது ஓர் எண்ணி (scalar).

24. A என்றும் அணி $A^2 - A \neq 0$ என்பதற்க்கணக்க இயக்காக A^{-1} இருக்கிறது என்றும் அதன் மதிப்பு $I - A$ என்றும் திருவி.

25. $|I + A| \neq 0$ ஆனால் $(I + A)^{-1}$ உம், $(I - A)$ உம் பரிமாற்று அணிகள் என திருவி.

$$25. A = \begin{bmatrix} 1 & 3 & 2 & 3 \\ 1 & 4 & 1 & 3 \\ 1 & 3 & 5 & 4 \end{bmatrix} \quad \text{ஆனால் அதன் ஒரு வலது}$$

தேரெதிர் அணி (Right Inverse)வைக் காட்டுவிட.

$$27. \begin{bmatrix} 7 & -1 & -1 & a \\ -8 & 1 & 0 & b \\ -8 & 0 & 1 & c \end{bmatrix} \text{ -ஐ } \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 2 & 4 & 3 \\ 3 & 3 & 4 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \text{ -ன்}$$

இடது தேரெதிர் அணி (Left Inverse) யாக எழுது. a, b, c மாறிலிகள்.

$$28. A = \begin{bmatrix} 1 & 3 & 4 & 7 \\ 1 & 4 & 5 & 9 \\ 2 & 3 & 5 & 8 \end{bmatrix} \quad \text{என்ற அணிக்கு இடது}$$

அல்லது வலது தேரெதிர் அணி கிடைப்பாது எனக் காண்க.

எழுதங்கள்

$$31. (i) \begin{bmatrix} 3 & -4 & -5 \\ -9 & 1 & 4 \\ -5 & 3 & 1 \end{bmatrix} \quad (ii) \begin{bmatrix} 7 & -11 & -5 \\ 3 & -14 & -5 \\ 3 & -13 & -5 \end{bmatrix}$$

$$(iii) \begin{bmatrix} -8 & -8 & 1 \\ -1 & 8 & -2 \\ -8 & -1 & -8 \end{bmatrix}$$

$$(iv) \begin{bmatrix} 8 & -5 & -2 \\ -4 & 8 & 1 \\ -7 & 8 & 1 \end{bmatrix}$$

$$(v) \begin{bmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 2 & 8 & 0 & -10 \\ 1 & 0 & 8 & -5 \\ -2 & 0 & 0 & 10 \end{bmatrix}$$

$$(vi) \begin{bmatrix} -14 & 2 & -2 & 2 \\ 14 & -2 & 2 & -2 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ -7 & 1 & -1 & 1 \end{bmatrix}$$

$$18. (i) \begin{bmatrix} 1 & -8 & 2 \\ -8 & 8 & -1 \\ 2 & -1 & 0 \end{bmatrix}$$

$$(ii) \frac{1}{2} \begin{bmatrix} 1 & -1 & 1 \\ -8 & 8 & -2 \\ 5 & -8 & 1 \end{bmatrix}$$

$$(iii) \begin{bmatrix} \cos \alpha & \sin \alpha & 0 \\ -\sin \alpha & \cos \alpha & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$$(iv) \begin{bmatrix} 1 & -\frac{1}{2} & 0 & 0 \\ 0 & \frac{1}{2} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & \frac{1}{2} & -\frac{1}{2} \\ 0 & 0 & 0 & \frac{1}{2} \end{bmatrix}$$

$$(v) \frac{1}{18} \begin{bmatrix} 2 & 5 & -7 & 1 \\ 5 & -1 & 5 & -2 \\ -7 & 5 & 11 & -10 \\ 1 & -2 & 10 & 5 \end{bmatrix}$$

$$20. (b) (i) \begin{bmatrix} 1 & 3 & 3 \\ 1 & 3 & 4 \\ 1 & 4 & 3 \end{bmatrix}$$

$$(ii) \begin{bmatrix} \frac{1}{2} & -\frac{1}{2} & \frac{1}{2} \\ -4 & 3 & -1 \\ \frac{1}{2} & -\frac{1}{2} & \frac{1}{2} \end{bmatrix}$$

5. அனிகளைப் பாகுபடுத்தல்

5-1. அனிகளைப் பாகுபடுத்திக் கூட்டல் :

A, B என்ற அனிகள் ஒரே தரம் உள்ளவைகளாக $m \times n$ அனிகளாக இருக்கட்டும். இவற்றை ஒரே விதமாகப் பிரித்தால் தான் அவை கூட்ட இயைத்தனமவாக இருக்கும். ஆகலால் A ஐ m_1 நிரல்களுக்குப் பிரிக்கும், $m_2, m_3 + m_4$ நிரல்களுக்குப் பிரிக்கும் பிரித்தால் B ஐயும் அதேவிதமாகப் பிரிக்கவேண்டும்.

$$A = \begin{bmatrix} A_{11} & A_{12} & A_{13} \\ A_{21} & A_{22} & A_{23} \end{bmatrix}; \quad B = \begin{bmatrix} B_{11} & B_{12} & B_{13} \\ B_{21} & B_{22} & B_{23} \end{bmatrix}$$

A_{11}, B_{11} என்பவை $m_1 \times n_1$ அனிகள்

A_{12}, B_{12} " $m_1 \times n_2$ "

A_{13}, B_{13} " $m_1 \times n_3$ "

A_{21}, B_{21} " $m_2 \times n_1$ "

A_{22}, B_{22} " $m_3 \times n_2$ "

A_{23}, B_{23} " $m_4 \times n_3$ "

$\therefore$ இவற்றுள் ஒவ்வொரு ஜோடியும் கூட்ட இயைத்தனம், $m_1 + m_2 = m$ ஆகவும், $n_1 + n_2 + n_3 = n$ ஆகவும் இருக்க வேண்டும் என்பது வெளிப்படல்.

$$\begin{aligned} \text{இப்பொழுது } A+B &= \begin{bmatrix} A_{11}+B_{11} & A_{12}+B_{12} & A_{13}+B_{13} \\ A_{21}+B_{21} & A_{22}+B_{22} & A_{23}+B_{23} \end{bmatrix} \\ &= \begin{bmatrix} C_{11} & C_{12} & C_{13} \\ C_{21} & C_{22} & C_{23} \end{bmatrix} = C \end{aligned}$$

உதாரணம்:

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 \\ 3 & 2 & 5 & 1 & 0 \\ 1 & 3 & -1 & 0 & 2 \\ 0 & -2 & 3 & 1 & 1 \end{bmatrix};$$

$$B = \begin{bmatrix} 5 & 4 & 3 & 2 & 1 \\ -2 & 1 & 2 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 3 & -1 \\ 1 & 0 & 1 & -2 & 1 \end{bmatrix}$$

$$A_{11} + B_{11} = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 2 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 5 & 4 \\ -2 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 6 & 6 \\ 1 & 3 \end{bmatrix} = C_{11}$$

$$A_{12} + B_{12} = \begin{bmatrix} 3 & 4 \\ 5 & 1 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 3 & 2 \\ 2 & -1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 6 & 6 \\ 7 & 0 \end{bmatrix} = C_{12}$$

$$A_{13} + B_{13} = \begin{bmatrix} 5 \\ 0 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 6 \\ 0 \end{bmatrix} = C_{13}$$

$$A_{21} + B_{21} = \begin{bmatrix} 1 & 3 \\ 0 & -2 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 3 \\ 1 & -2 \end{bmatrix} = C_{21}$$

$$A_{22} + B_{22} = \begin{bmatrix} -1 & 0 \\ 2 & 1 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 1 & 3 \\ 1 & -2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 3 \\ 4 & -1 \end{bmatrix} = C_{22}$$

$$A_{23} + B_{23} = \begin{bmatrix} 2 \\ 1 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} -1 \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \end{bmatrix} = C_{23}$$

$$\begin{aligned} A + B &= \begin{bmatrix} A_{11} + B_{11} & A_{12} + B_{12} & A_{13} + B_{13} \\ A_{21} + B_{21} & A_{22} + B_{22} & A_{23} + B_{23} \end{bmatrix} \\ &= \begin{bmatrix} C_{11} & C_{12} & C_{13} \\ C_{21} & C_{22} & C_{23} \end{bmatrix} \end{aligned}$$

$$= \begin{bmatrix} \begin{bmatrix} 6 & 6 \\ 1 & 8 \end{bmatrix} & \begin{bmatrix} 6 & 6 \\ 7 & 0 \end{bmatrix} & \begin{bmatrix} 6 \\ 0 \end{bmatrix} \\ \begin{bmatrix} 1 & 8 \\ 1 & -2 \end{bmatrix} & \begin{bmatrix} 0 & 6 \\ 4 & -1 \end{bmatrix} & \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \end{bmatrix} \end{bmatrix}$$

$$= \begin{bmatrix} 6 & 6 & 6 & 6 & 6 \\ 1 & 8 & 7 & 0 & 0 \\ 1 & 8 & 0 & 6 & 1 \\ 1 & -2 & 4 & -1 & 2 \end{bmatrix}$$

5.2. அணிகளின் மாதிரித்தும் பெருக்கல் :

$A = [a_{ij}]$ என்ற $m \times n$ அணிவாகவும்,

$B = [b_{ij}]$ என்ற $n \times p$ அணிவாகவும் இருக்கட்டும்.

AB -ன் பெருக்கல் மாதிரித் தரக்கூடும்போது, A ஐ m திரை அணிகளாகவும், B ஐ p திரை அணிகளாகவும் மாதிரித்ததால் பெருக்கிடுகும்.

உதாரணம் :

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 1 \\ \cdots & \cdots & \cdots \\ 2 & 0 & 1 \\ \cdots & \cdots & \cdots \\ 3 & 1 & 2 \end{bmatrix}; \quad B = \begin{bmatrix} 2 & 0 \\ 2 & 1 \\ 1 & 2 \end{bmatrix}$$

$$AB = \begin{bmatrix} R_1 \\ R_2 \\ R_3 \end{bmatrix} [C_1 \ C_2]$$

$$= \begin{bmatrix} R_1 C_1 & R_1 C_2 \\ R_2 C_1 & R_2 C_2 \\ R_3 C_1 & R_3 C_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 8+4+1 & 0+2+2 \\ 6+0+1 & 0+0+2 \\ 9+2+2 & 0+1+4 \end{bmatrix}$$

$$= \begin{bmatrix} 13 & 4 \\ 7 & 2 \\ 13 & 6 \end{bmatrix} \text{ என்ற } 3 \times 2 \text{ அணி.}$$

ஆனால் இந்த ஒரு வழியில்தான் பாகுபடுத்தல் கூடும் எனக் கருத வேண்டாம். இதரப் பல்வேறு முறைகளில் பாகுபடுத்தலாம்.

$$A = \begin{bmatrix} m_1 \times n_1 & m_1 \times n_2 & m_1 \times n_3 \\ \vdots & \vdots & \vdots \\ m_2 \times n_1 & m_2 \times n_2 & m_2 \times n_3 \end{bmatrix}$$

$$A = m \times n \text{ அணி} \quad \therefore m = m_1 + m_2$$

$$n = n_1 + n_2 + n_3$$

$$B = \begin{bmatrix} n_1 \times p_1 & n_1 \times p_2 \\ n_2 \times p_1 & n_2 \times p_2 \\ n_3 \times p_1 & n_3 \times p_2 \end{bmatrix}$$

$$B = n \times p \text{ அணி} \quad \therefore n = n_1 + n_2 + n_3, \quad p = p_1 + p_2$$

$$\text{இவ்வாறு } A = \begin{bmatrix} A_{11} & A_{12} & A_{13} \\ A_{21} & A_{22} & A_{23} \end{bmatrix} \text{ எனவும்,}$$

$$B = \begin{bmatrix} B_{11} & B_{12} \\ B_{21} & B_{22} \\ B_{31} & B_{32} \end{bmatrix} \text{ எனவும், முறைவே}$$

பெறப்படுகிறது.

அப்படியானால்,

$$AB = \begin{bmatrix} A_{11}B_{11} + A_{12}B_{21} + A_{13}B_{31} & A_{11}B_{12} + A_{12}B_{22} + A_{13}B_{32} \\ A_{21}B_{11} + A_{22}B_{21} + A_{23}B_{31} & A_{21}B_{12} + A_{22}B_{22} + A_{23}B_{32} \end{bmatrix}$$

$$= \begin{bmatrix} C_{11} & C_{12} \\ C_{21} & C_{22} \end{bmatrix} = C$$

குறிப்பு: A, B ஐப் பார்ப்படுத்தும்போது, ஒவ்வொரு பகுதியும் பெருக்குவதற்கு இயைத்ததாக இருக்கிறதா என்பதைக் கவனித்தல் வேண்டும். A ஐ நம் விருப்பம்போல் பிரிக்கலாம். ஆனால் B ஐ அதற்கு இயைத்தவாறு பிரித்தல் இன்றியவையாதது. நாம் எடுத்துக்கொண்ட உதாரணத்தில் A_{11}, A_{21} என்பன மூன்றாவே $m_1 \times n_1$ ஆணி, $m_2 \times n_1$ ஆணி. ஆகவே B_{11}, B_{21} என்பவைகளின் தலைகள் n_1 ஆக இருக்கவேண்டும். p_1, p_2 ஐ நம் விருப்பம் போல் எடுத்துக்கொள்ளலாம். இதை மாதிரிக் கணக்குகள் மூலம் நன்றாகத் தெரிந்து கொள்க.

உதாரணம்:

$$A = \begin{bmatrix} 2 & 2 & 1 \\ 0 & 1 & 2 \\ \hline 3 & 0 & 1 \end{bmatrix}; B = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 & 0 \\ 2 & 1 & 1 & 2 \\ \hline 0 & 2 & 2 & 1 \end{bmatrix}$$

$$\text{இதில் } A_{11} = \begin{bmatrix} 2 & 2 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}; A_{12} = \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \end{bmatrix}$$

$$A_{21} = [3 \ 0]; A_{22} = [1]$$

$$B_{11} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 2 & 1 & 1 \end{bmatrix}; B_{12} = \begin{bmatrix} 0 \\ 2 \end{bmatrix}$$

$$B_{21} = [0 \ 2 \ 2]; B_{22} = [1]$$

$$AB = \begin{bmatrix} A_{11}B_{11} + A_{12}B_{21} & A_{11}B_{12} + A_{12}B_{22} \\ A_{21}B_{11} + A_{22}B_{21} & A_{21}B_{12} + A_{22}B_{22} \end{bmatrix}$$

$$\begin{aligned}
 &= \left[\begin{array}{c} \begin{bmatrix} 6 & 2 & 4 \\ 2 & 1 & 1 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 & 3 & 2 \\ 0 & 6 & 4 \end{bmatrix} & \begin{bmatrix} 4 \\ 2 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \end{bmatrix} \\ \hline \begin{bmatrix} 3 & 0 & 8 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 & 3 & 2 \end{bmatrix} & \begin{bmatrix} 0 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 1 \end{bmatrix} \end{array} \right] \\
 &= \left[\begin{array}{c} \begin{bmatrix} 6 & 5 & 6 \\ 2 & 7 & 5 \end{bmatrix} & \begin{bmatrix} 5 \\ 4 \end{bmatrix} \\ \hline \begin{bmatrix} 3 & 3 & 6 \end{bmatrix} & \begin{bmatrix} 1 \end{bmatrix} \end{array} \right] \\
 &= \begin{bmatrix} 6 & 5 & 6 & 5 \\ 2 & 7 & 5 & 4 \\ 3 & 3 & 6 & 1 \end{bmatrix}
 \end{aligned}$$

5.3. $A = \begin{bmatrix} A_{11} & A_{12} \\ A_{21} & A_{22} \end{bmatrix}$ ஆனால் A^{-1} ஐக் காண்டுதல்.

$$A^{-1} = \begin{bmatrix} B_{11} & B_{12} \\ B_{21} & B_{22} \end{bmatrix} = B \text{ ஆக இருக்கட்டும்.}$$

அப்படியானால் $AB = BA = I$.

இப்பொழுது,

$$\begin{aligned}
 AB &= \begin{bmatrix} A_{11}B_{11} + A_{12}B_{21} & A_{11}B_{12} + A_{12}B_{22} \\ A_{21}B_{11} + A_{22}B_{21} & A_{21}B_{12} + A_{22}B_{22} \end{bmatrix} \\
 &= \begin{bmatrix} I & 0 \\ 0 & I \end{bmatrix}
 \end{aligned}$$

$$\therefore A_{11}B_{11} + A_{12}B_{21} = I \quad \dots \quad \dots \quad (1)$$

$$A_{11}B_{12} + A_{12}B_{22} = 0 \quad \dots \quad \dots \quad (2)$$

மேலும்,

$$\begin{aligned}
 BA &= \begin{bmatrix} B_{11}A_{11} + B_{12}A_{21} & B_{11}A_{12} + B_{12}A_{22} \\ B_{21}A_{11} + B_{22}A_{21} & B_{21}A_{12} + B_{22}A_{22} \end{bmatrix} \\
 &= \begin{bmatrix} I & 0 \\ 0 & I \end{bmatrix}
 \end{aligned}$$

$$\therefore B_{21} A_{11} + B_{22} A_{21} = 0 \quad \dots \quad (5)$$

$$B_{21} A_{12} + B_{22} A_{22} = I \quad \dots \quad (6)$$

$$B_{12} = X^{-1} \text{ என வைத்துக்கொள்வோம்.} \quad \dots \quad (5)$$

$$(2)\text{-ல் இருந்து } A_{11} B_{12} = -A_{12} B_{22}$$

$$\therefore B_{12} = -A_{11}^{-1} \cdot A_{12} \cdot X^{-1} \quad \dots \quad (6)$$

$$(3)\text{-ல் இருந்து } B_{21} A_{11} = -B_{22} A_{21}$$

$$\therefore B_{21} = -X^{-1} \cdot A_{21} \cdot A_{11}^{-1} \quad \dots \quad (7)$$

$$(1)\text{-ல் இருந்து } A_{11} B_{11} = I - A_{12} B_{21} \\ = I + A_{12} \cdot X^{-1} \cdot A_{21} A_{11}^{-1}$$

$$\therefore B_{11} = A_{11}^{-1} + A_{11}^{-1} \cdot A_{12} \cdot X^{-1} \cdot A_{21} \cdot A_{11}^{-1} \quad (8)$$

$$(4), (5), (7)\text{-ல் இருந்து,}$$

$$-X^{-1} \cdot A_{21} \cdot A_{11}^{-1} \cdot A_{12} + X^{-1} A_{22} = I$$

$$\therefore -A_{21} \cdot A_{11}^{-1} \cdot A_{12} + A_{22} = X \quad \dots \quad (9)$$

$$(9)\text{-ல் இருந்து } X \text{ ஐவும், (5), (6), (7), (8)-ல் இருந்து } B_{11}, B_{12}, B_{21}, B_{22} \text{ ஐவும் கண்டுபிடித்து விடலாம்.}$$

உதாரணம் 1 :

$$\begin{bmatrix} 3 & 2 & 6 \\ 1 & 1 & 2 \\ 2 & 2 & 5 \end{bmatrix} \quad \text{என்ற அணிவின்}$$

மேயெதிர் அணிவைக் கண்டுபிடி.

$$\text{இதில் } A_{11} = \begin{bmatrix} 3 & 2 \\ 1 & 1 \end{bmatrix}; \quad A_{12} = \begin{bmatrix} 6 \\ 2 \end{bmatrix};$$

$$A_{21} = \begin{bmatrix} 2 & 2 \end{bmatrix}; \quad A_{22} = \begin{bmatrix} 5 \end{bmatrix}$$

என்றவாறு கொடுக்கப்பட்ட அணிவைப் பிரித்துக்கொள்வோம்.

$$A_{11}^{-1} = \frac{1}{|A_{11}|} \cdot \begin{bmatrix} 1 & -2 \\ -1 & 3 \end{bmatrix} = \frac{1}{1} \begin{bmatrix} 1 & -2 \\ -1 & 3 \end{bmatrix}$$

$$\therefore A_{11}^{-1} \cdot A_{12} = \begin{bmatrix} 1 & -2 \\ -1 & 3 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 3 \\ 2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2 \\ 0 \end{bmatrix}$$

$$A_{21} \cdot A_{11}^{-1} = \begin{bmatrix} 2 & 2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & -2 \\ -1 & 3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 2 \end{bmatrix}$$

$$\begin{aligned} X &= A_{22} - A_{21} (A_{11}^{-1} \cdot A_{12}) = \begin{bmatrix} 6 \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} 2 & 2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 2 \\ 0 \end{bmatrix} \\ &= \begin{bmatrix} 2 \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} 4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -2 \end{bmatrix} \end{aligned}$$

$$\therefore X^{-1} = \begin{bmatrix} 1 \end{bmatrix}$$

$$B_{11} = A_{11}^{-1} + (A_{11}^{-1} \cdot A_{12}) \cdot X^{-1} \cdot (A_{21} \cdot A_{11}^{-1})$$

$$= \begin{bmatrix} 1 & -2 \\ -1 & 3 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 2 \\ 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 & 2 \end{bmatrix}$$

$$= \begin{bmatrix} 1 & -2 \\ -1 & 3 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 & 4 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ -1 & 3 \end{bmatrix}$$

$$B_{12} = -(A_{11}^{-1} \cdot A_{12}) \cdot X$$

$$= - \begin{bmatrix} 2 \\ 0 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -2 \\ 0 \end{bmatrix}$$

$$B_{21} = -X^{-1} \cdot (A_{21} \cdot A_{11}^{-1})$$

$$= - \begin{bmatrix} 1 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 0 & 2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & -2 \end{bmatrix}$$

$$B_{22} = X^{-1} = \begin{bmatrix} 1 \end{bmatrix}$$

$$\therefore A^{-1} = \begin{bmatrix} B_{11} & B_{12} \\ B_{21} & B_{22} \end{bmatrix}$$

$$= \begin{bmatrix} 1 & 2 & -2 \\ -1 & 3 & 0 \\ 0 & -2 & 1 \end{bmatrix}$$

5.4. A_{11} ஆக எதனை எடுத்துக்கொள்வது?

ஒரு n -சதுர அணி கொடுக்கப்பட்டிருந்தால், A_{11} ஐ $(n-1)$ சதுர அணியாக எடுத்துக்கொள்வது சிகரம் அல்லவல்லது. இப்பொழுது, A_{11}^{-1} ஐக் கண்டுபிடிப்பது எப்படி?

$$\text{இதற்கு } G_2 = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{bmatrix};$$

$$G_3 = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{bmatrix};$$

$$G_4 = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} & a_{14} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} & a_{24} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} & a_{34} \\ a_{41} & a_{42} & a_{43} & a_{44} \end{bmatrix}$$

என்று வைத்துக் கொள்வோம். G_2^{-1} ஐக் கண்டுபிடிப்பது எளிது. இதுதான் G_2 -ன் A_{11}^{-1} .

$\therefore G_3^{-1}$ ஐக் கண்டுபிடித்து விடலாம். G_3^{-1} தான் G_4 -ன் A_{11}^{-1} . $\therefore G_4^{-1}$ ஐக் கண்டு பிடித்துவிடலாம். இவ்வாறு G_n^{-1} ஐக் கண்டு பிடித்து விடலாம்.

உதாரணம் 2:

$$\begin{bmatrix} 2 & 2 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 2 & 1 \\ 2 & 2 & 5 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 2 \end{bmatrix} \quad \text{என்ற அணியின்}$$

தேர்மான (தெரெதி) அணியைக் கண்டுபிடி.

$$\text{இதில் } A_{11} = \begin{bmatrix} 3 & 2 & 3 \\ 1 & 1 & 2 \\ 2 & 2 & 5 \end{bmatrix} ; A_{12} = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix}$$

$$A_{21} = [1 \ 0 \ 1] ; A_{22} = [2].$$

A_{11}^{-1} ஐ உதாரணம் 1-ல் உள்ளதுபோல்,

$$\begin{bmatrix} 1 & 2 & -2 \\ -1 & 3 & 0 \\ 0 & -2 & 1 \end{bmatrix} \text{ எனக் கண்டுபிடிக்க வேண்டும்.}$$

$$A_{11}^{-1} \cdot A_{12} = \begin{bmatrix} 1 & 2 & -2 \\ -1 & 3 & 0 \\ 0 & -2 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 3 \\ 2 \\ -2 \end{bmatrix}$$

$$\begin{aligned} A_{11} \cdot A_{11}^{-1} &= [1 \ 0 \ 1] \begin{bmatrix} 1 & 2 & -2 \\ -1 & 3 & 0 \\ 0 & -2 & 1 \end{bmatrix} \\ &= [1 \ 0 \ -1] \end{aligned}$$

$$\text{இப்போது, } Y = A_{22} - A_{21}(A_{11}^{-1} \cdot A_{12})$$

$$= [2] - [1 \ 0 \ 1] \begin{bmatrix} 3 \\ 2 \\ -2 \end{bmatrix}$$

$$= [2] - [1] = [1]$$

$$\therefore B_{22} = Y^{-1} = [1]$$

$$\text{எ. அ.} = 10$$

$$B_{11} = A_{11}^{-1} + (A_{11}^{-1} \cdot A_{12}) \cdot X^{-1} (A_{21} \cdot A_{11}^{-1})$$

$$= \begin{bmatrix} 1 & 2 & -2 \\ -1 & 3 & 0 \\ 0 & -2 & 1 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 3 \\ 2 \\ -2 \end{bmatrix} [1] [1 \ 0 \ -1]$$

$$= \begin{bmatrix} 1 & 2 & -2 \\ -1 & 3 & 0 \\ 0 & -2 & 1 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 3 & 0 & -3 \\ 2 & 0 & -2 \\ -2 & 0 & 2 \end{bmatrix}$$

$$= \begin{bmatrix} 4 & 2 & -5 \\ 1 & 3 & -2 \\ -2 & -2 & 3 \end{bmatrix}$$

$$B_{12} = -(A_{11}^{-1} \cdot A_{12}) \cdot X^{-1}$$

$$= - \begin{bmatrix} 3 \\ 2 \\ -2 \end{bmatrix} [1] = \begin{bmatrix} -3 \\ -2 \\ 2 \end{bmatrix}$$

$$B_{21} = -X^{-1} \cdot (A_{21} \cdot A_{11}^{-1})$$

$$= -[1] \cdot [1 \ 0 \ -1] = [-1 \ 0 \ 1]$$

$$\therefore \text{റേഞ്ചിംഗ് മാട്രിക്സ് അത്} = \begin{bmatrix} B_{11} & B_{12} \\ B_{21} & B_{22} \end{bmatrix}$$

$$= \begin{bmatrix} 4 & 2 & -5 & -3 \\ 1 & 3 & -2 & -2 \\ -2 & -2 & 3 & 2 \\ -1 & 0 & 1 & 1 \end{bmatrix}$$

5.5. ஒரு சமச்சீர் அணியின் நேர்மாறு அணி

ஒரு சமச்சீர் அணியின் நேர்மாறு அணியும் சமச்சீர் அணி யாகத்தான் இருக்கும். ஏனெனில்,

$$(A^{-1})' = (A')^{-1} \quad \dots \quad \dots \quad \dots \quad \dots \quad (4.16)$$

$$= (A)^{-1} \quad \because A \text{ ஒரு சமச்சீர் அணி.}$$

$\therefore A^{-1}$ ஒரு சமச்சீர் அணி.

ஆகையால், $B_{11} = A_{11}^{-1} + (A_{11}^{-1} A_{12}) X^{-1} (A_{21} - A_{11}^{-1})$ என்பதை $B_{11} = A_{11}^{-1} + (A_{11}^{-1} \cdot A_{12}) \cdot X^{-1} (A_{11}^{-1} \cdot A_{12})$ என எழுதுவோம்.

$$B_{12} = - (A_{11}^{-1} \cdot A_{12}) \cdot X^{-1}$$

$$B_{21} = B_{12}'$$

$$B_{22} = X^{-1}.$$

$$X = A_{22} - A_{21} (A_{11}^{-1} \cdot A_{12})$$

உதாரணம் :

$$\begin{bmatrix} 1 & 2 & 0 \\ 2 & 5 & 3 \\ 0 & 3 & 8 \end{bmatrix}$$

$$\text{இதில் } A_{11} = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 5 \end{bmatrix}$$

$$\therefore A_{11}^{-1} = \frac{1}{|A_{11}|} \cdot \begin{bmatrix} 5 & -2 \\ -2 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 5 & -2 \\ -2 & 1 \end{bmatrix}$$

$$\because |A_{11}| = 1.$$

$$A_{11}^{-1} \cdot A_{12} = \begin{bmatrix} 5 & -2 \\ -2 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 \\ 3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -6 \\ 3 \end{bmatrix}$$

$$\begin{aligned}
 X &= A_{11} - A_{11} (A_{11}^{-1} \cdot A_{12}) \\
 &= [8] - [0 \ 8] \begin{bmatrix} -8 \\ 8 \end{bmatrix} = [8] - [8] = [-1] \\
 \therefore X^{-1} &= [-1] = B_{11}
 \end{aligned}$$

இப்பொழுது,

$$\begin{aligned}
 B_{11} &= A_{11}^{-1} + (A_{11}^{-1} \cdot A_{12}) \cdot X^{-1} \cdot (A_{11}^{-1} \cdot A_{12})' \\
 &= \begin{bmatrix} 8 & -8 \\ -8 & 1 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} -8 \\ 8 \end{bmatrix} [-1] [-8 \ 8] \\
 &= \begin{bmatrix} 8 & -8 \\ -8 & 1 \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} 64 & -16 \\ -16 & 8 \end{bmatrix} \\
 &= \begin{bmatrix} -56 & 16 \\ 16 & -8 \end{bmatrix}
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 B_{12} &= -(A_{11}^{-1} \cdot A_{12}) \cdot X^{-1} \\
 &= - \begin{bmatrix} -8 \\ 8 \end{bmatrix} [-1] = \begin{bmatrix} -8 \\ 8 \end{bmatrix}
 \end{aligned}$$

$$B_{21} = B_{12}' + [-8 \ 8]$$

$$\therefore \text{வேண்டிய நேர்மாறு அணி} = \begin{bmatrix} B_{11} & B_{12} \\ B_{21} & B_{22} \end{bmatrix}$$

$$= \begin{bmatrix} -56 & 16 & -8 \\ 16 & -8 & 8 \\ -8 & 8 & -1 \end{bmatrix}$$

A என்பது சமச்சீர் அணியாக இல்லாவிட்டால் $A'A$ என்பது சமச்சீர் அணியாக இருக்கவேண்டும்.

$$\text{ஏனெனில் } (A'A)' = A' \cdot (A')' = A' \cdot A$$

$\therefore$ இந்த முறையை உபயோகித்து $(A'A)^{-1}$ ஐக் காண்டு பிடிக்கலாம். மேலும், $A^{-1} = (A'A)^{-1} \cdot A'$ என்பதை உபயோகித்து A^{-1} ஐக் காண்டுபிடிக்கலாம்.

நேரடிச் கூட்டணிகள் : $A_1, A_2, \dots, A_k$ என்பன மூன்றையே $n_1, n_2, \dots, n_k$ தரக்கொண்டவ சதுர அணிகளாக இருக்கட்டும்.

$$A = \begin{bmatrix} A_1 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & A_2 & \dots & 0 \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ 0 & 0 & \dots & A_k \end{bmatrix} = \text{மூலக்கூட்ட அணி (A_1, A_2, \dots, A_k)}$$

என்பதை $A_1, A_2, \dots, A_k$ என்பவற்றின் நேரடிச் கூட்டணிகள் என்று வரையறை செய்வோம்.

உதாரணம் :

$$A_1 = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \\ 7 & 8 & 9 \end{bmatrix}; \quad A_2 = [1]; \quad A_3 = \begin{bmatrix} 3 & 1 \\ 2 & 5 \end{bmatrix}$$

ஆனால் A_1, A_2, A_3 -ன் நேரடிச் கூட்டணிகள்

= மூலக்கூட்ட அணி (A_1, A_2, A_3)

$$= \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 & 0 & 0 & 0 \\ 4 & 5 & 6 & 0 & 0 & 0 \\ 7 & 8 & 9 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 2 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 3 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 2 & 5 \end{bmatrix}$$

A = மூலக்கூட்ட அணி ($A_1, A_2, \dots, A_n$) ஆகவும்,

B = மூலக்கூட்ட அணி ($B_1, B_2, \dots, B_n$) ஆகவும்,

A, B என்பன ஒரே தரமுடைய சதுர அணிகளாகவும்,

$C = A \cdot B$, ஆகவும் இருந்தால்,

AB = மூலக்கூட்ட அணி ($C_1, C_2, \dots, C_n$) என நிறுமி.

தீர்மானம் :

$$A = \begin{bmatrix} A_1 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & A_2 & \dots & 0 \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ 0 & 0 & \dots & A_n \end{bmatrix} ; \quad B = \begin{bmatrix} B_1 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & B_2 & \dots & 0 \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ 0 & 0 & \dots & B_n \end{bmatrix}$$

இவை கொடுக்க இயைபத்தவாறு சீர்தீர்க்கப்பட்டிருக்கின்றன. ஏனெனில் A_1, B_1 ஒரே தரமுடையவை எனக் கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது.

$$\therefore AB = \begin{bmatrix} A_1 B_1 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & A_2 B_2 & \dots & 0 \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ 0 & 0 & \dots & A_n B_n \end{bmatrix}$$

A_1, A_2, A_3 -ன் நேரடிச் கூட்டாணிகளில் நேரடித் அணி = மூலக்கூட்ட அணி ($A_1^{-1}, A_2^{-1}, A_3^{-1}$) எனத் தீர்க்க.

தீர்மானம் :

$$\begin{bmatrix} A_1 & 0 & 0 \\ 0 & A_2 & 0 \\ 0 & 0 & A_3 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} P & Q & R \\ S & T & U \\ V & W & X \end{bmatrix} = I$$

ஆக இருக்கட்டும்.

$$\therefore \begin{bmatrix} A_1 P & A_1 Q & A_1 R \\ A_2 S & A_2 T & A_2 U \\ A_3 V & A_3 W & A_3 X \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} I & 0 & 0 \\ 0 & I & 0 \\ 0 & 0 & I \end{bmatrix}$$

$$\therefore P = A_1^{-1}; \quad Q = 0; \quad R = 0$$

$$S = 0; \quad T = A_2^{-1}; \quad U = 0$$

$$V = 0; \quad W = 0; \quad X = A_3^{-1}$$

∴ [முனைவிட்ட அணி $(A_1, A_2, A_3)]^{-1}$ = முனைவிட்ட அணி $(A_1^{-1}, A_2^{-1}, A_3^{-1})$

பொதுவாக,

$$[\text{முனைவிட்ட அணி } (A_1 A_2 \dots A_n)]^{-1} \\ = [\text{முனைவிட்ட அணி } (A_1^{-1} A_2^{-1} \dots A_n^{-1})]$$

மாநிலிக் கணக்குகள்

மாநிலி 1 : A ஒரு சதுர அணியானால் $\left[\begin{array}{c|c} A & O \\ \hline B & A \end{array} \right]$ என்ற

அணியின் நேரெதிர் அணிவழிக் கண்டுபிடி. இதை உபயோகித்து

$$\left[\begin{array}{cccccc} 1 & 2 & -2 & 0 & 0 & 0 \\ -1 & 3 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -2 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 1 & 2 & -2 \\ 0 & 1 & 1 & -1 & 3 & 0 \\ -1 & 0 & 0 & 0 & -2 & 1 \end{array} \right]$$

என்ற அணியின் நேர்மாறான (நேரெதிர்) அணிவழிக் கண்டுபிடி.

$$\left[\begin{array}{cc} A & O \\ B & A \end{array} \right] \left[\begin{array}{cc} P & Q \\ R & S \end{array} \right] = I \quad \dots \quad (1)$$

ஆக இருக்கட்டும்.

இதில் A ஒரு $n \times n$ அணியானால் O, B, P, Q, R, S உள் n சதுர அணிகளாக இருக்கவேண்டும்.

இப்பொழுது, (1)-ல் இருந்து

$$\left[\begin{array}{cc} AP & AQ \\ BP+AR & BQ+AS \end{array} \right] = I$$

$$\therefore AP = I \quad \dots \quad \dots \quad \dots \quad (2)$$

$$AQ = 0 \quad \dots \quad \dots \quad \dots \quad (3)$$

$$BP + AR = 0 \quad \dots \quad \dots \quad \dots \quad (4)$$

$$BQ + AS = I \quad \dots \quad \dots \quad \dots \quad (5)$$

$$(2)\text{-ல் இருந்து } P = A^{-1} \quad \dots \quad \dots \quad \dots \quad (6)$$

$$(3)\text{-ல் இருந்து } Q = 0 \quad \dots \quad \dots \quad \dots \quad (7)$$

$$(4), (5)\text{-ல் இருந்து } \dots BA^{-1} + AR = 0$$

$$\therefore AR = -B \cdot A^{-1}$$

$$\therefore A^{-1} \cdot AR = -A^{-1} \cdot BA^{-1}$$

$$R = -A^{-1} B \cdot A^{-1} \quad \dots \quad \dots \quad \dots \quad (8)$$

$$(5), (7)\text{-ல் இருந்து } S = A^{-1} \quad \dots \quad \dots \quad \dots \quad (9)$$

$$\therefore \begin{bmatrix} A & 0 \\ B & A \end{bmatrix}^{-1} = \begin{bmatrix} A^{-1} & 0 \\ -A^{-1} \cdot B \cdot A^{-1} & A^{-1} \end{bmatrix}$$

இப்பொழுது, கொடுக்கப்பட்ட B -ஐத் து அணிவிக்

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & -2 \\ -1 & 3 & 0 \\ 0 & -2 & 1 \end{bmatrix}$$

A^{-1} ஐக் கண்டுபிடிக்கவேண்டும்.

4.19-ல் உள்ளபடி,

$$\therefore A^{-1} = \begin{bmatrix} 3 & 2 & 6 \\ 1 & 1 & 2 \\ 2 & 2 & 5 \end{bmatrix}$$

$$\therefore -A^{-1} \cdot B \cdot A^{-1} =$$

$$= - \begin{bmatrix} 3 & 2 & 6 \\ 1 & 1 & 2 \\ 2 & 2 & 5 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \\ -1 & 0 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 3 & 2 & 6 \\ 1 & 1 & 2 \\ 2 & 2 & 5 \end{bmatrix}$$

$$= - \begin{bmatrix} 3 & 2 & 6 \\ 1 & 1 & 2 \\ 2 & 2 & 5 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 1 & 2 \\ 3 & 3 & 7 \\ -3 & -2 & -6 \end{bmatrix}$$

$$= - \begin{bmatrix} -9 & -9 & -16 \\ -2 & 0 & -3 \\ -7 & -2 & -12 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 9 & 9 & 16 \\ 2 & 0 & 3 \\ 7 & 2 & 12 \end{bmatrix}$$

$\therefore$ கொடுக்கப்பட்ட 6-சதுர அணியின் நேர்மாறு அணி

$$= \begin{bmatrix} 3 & 2 & 6 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 2 & 0 & 0 & 0 \\ 2 & 2 & 5 & 0 & 0 & 0 \\ 9 & 9 & 16 & 3 & 2 & 6 \\ 2 & 0 & 3 & -1 & 1 & 2 \\ 7 & 2 & 12 & 2 & 2 & 5 \end{bmatrix}$$

மாதிரி 2 :

$$P = \begin{bmatrix} A & B \\ C & D \end{bmatrix} \text{ -ல் } A, B, C, D \text{ என்பன } n\text{-சதுர அணிகள்.}$$

L என்பத n -சதுர அணிகள்,

L என்பத n -சதுர அணி

$$Q = \begin{bmatrix} A & B \\ LA+C & LB+D \end{bmatrix} \text{ என்பதற்கான } Q \text{ இருத்தால்}$$

$$|P| = |Q| \text{ என தருகி.}$$

மேலும் $AC=CA$ ஆனால் $|P| = |AD-CB|$ என திருப்தி.

$$\begin{aligned} \begin{bmatrix} I & O \\ L & I \end{bmatrix} \begin{bmatrix} A & B \\ C & D \end{bmatrix} &= \begin{bmatrix} IA & IB \\ LA+IC & LB+ID \end{bmatrix} \\ &= \begin{bmatrix} A & B \\ LA+C & LB+ID \end{bmatrix} \end{aligned}$$

$$\therefore \begin{bmatrix} I & O \\ L & I \end{bmatrix} P = Q$$

$$\begin{bmatrix} I & O \\ L & I \end{bmatrix} |P| = |Q|$$

$$|P| = |Q|$$

ஏனெனில் $\begin{bmatrix} I & O \\ L & I \end{bmatrix} = 1$

மேலும்,

$$\begin{bmatrix} C & -A \\ I & O \end{bmatrix} \begin{bmatrix} A & B \\ C & D \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} CA-AC & CB-AD \\ IA & IB \end{bmatrix}$$

$$\therefore \begin{bmatrix} C & -A \\ I & O \end{bmatrix} P = \begin{bmatrix} 0 & CB-AD \\ A & B \end{bmatrix} \quad \because CA=AC$$

$$\therefore \left| \begin{bmatrix} C & -A \\ I & O \end{bmatrix} P \right| = \begin{vmatrix} 0 & CB-AD \\ A & B \end{vmatrix}$$

$$\therefore |I| |A| |P| = |A| \cdot |CB-AD|$$

$$\therefore |P| = |CB-AD|$$

மேலும் 3 : (i) A, B, C, D என்பன n -சதுர அணிகள் L, M என்றும் n -சதுர அணிகள்.

$$G = \begin{bmatrix} A & B \\ C & D \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} I & O \\ L & M \end{bmatrix} \begin{bmatrix} A & B \\ I & O \end{bmatrix}$$

என்பதற்கான இரகசியம் என திருப்தி.

(ii) மேலும் $|G| = (-1)^n \cdot |C-D \cdot B^{-1}A| |B|$ என திருப்தி.

(iii) $(C - DB^{-1}A)$ ஓர் மூலக்கூறு அணியானால் G -ன் நேரெதிர் அணியைக் காட்டுகிடி.

$$\begin{bmatrix} I & 0 \\ L & M \end{bmatrix} \begin{bmatrix} A & B \\ I & 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} IA & IB \\ LA + MI & LB \end{bmatrix}$$

$$\therefore LA + M = C \quad \dots \quad \dots \quad \dots \quad (1)$$

$$LB = D \quad \dots \quad \dots \quad \dots \quad (2)$$

ஆகையால் $L = DB^{-1}$

$$\therefore (1)\text{-ல் இருந்து } M = C - DB^{-1}A$$

இப்பொழுது,

$$G = \begin{bmatrix} I & 0 \\ L & M \end{bmatrix} \begin{bmatrix} A & B \\ I & 0 \end{bmatrix}$$

$$|G| = (-1)^n \cdot |M| \cdot |B| \quad \therefore L\text{-ன் தரம் } n$$

$$= (-1)^n \cdot |C - DB^{-1}A| \cdot |B|.$$

இனி, G^{-1} ஐக் காட்டுகிறோம்.

$$Ax_1 + Bx_2 = b_1 \quad \dots \quad \dots \quad \dots \quad (3)$$

$$Cx_1 + Dx_2 = b_2 \quad \dots \quad \dots \quad \dots \quad (4)$$

ஆக இருக்கட்டும்.

$$B^{-1}A x_1 + x_2 = B^{-1}b_1$$

$$x_2 = B^{-1}b_1 - B^{-1}Ax_1$$

$$(4)\text{-ல் இருந்து } Cx_1 + DB^{-1}b_1 - D \cdot B^{-1}Ax_1 = b_2$$

$$(C - DB^{-1}A) x_1 = -DB^{-1}b_1 + b_2$$

$$\therefore x_1 = \frac{-DB^{-1}}{(C - DB^{-1}A)} \cdot b_1 + \frac{1}{C - DB^{-1}A} \cdot b_2$$

$$\therefore x_2 = B^{-1}b_1 + \frac{B^{-1}A \cdot DB^{-1}}{(C - DB^{-1}A)} \cdot b_1 - \frac{B^{-1}A}{C - DB^{-1}A} \cdot b_2$$

$$\therefore G^{-1} = \begin{bmatrix} -D, B^{-1}X & X \\ B^{-1} + B^{-1}ADB^{-1}X & -B^{-1}AX \end{bmatrix}$$

$$\text{இதில் } X = (C - DB^{-1}A)^{-1}$$

$\therefore C - DB^{-1}A$ ஓர் ஒழுங்கு அணிவாக இருக்க வேண்டும் என்பதைக் கவனி.

மாதிரி 4 : A, B, C என்பன ஒழுங்கு சதுர அணிகள்; ஆனால் ஒரே தரமுடையன அல்ல.

$$G = \begin{bmatrix} A & D & E \\ 0 & B & F \\ 0 & 0 & C \end{bmatrix} \text{ ஆனால் } G^{-1} \text{ ஐக் காண்டுவிட.}$$

$$\begin{bmatrix} A & D & E \\ 0 & B & F \\ 0 & 0 & C \end{bmatrix} \begin{bmatrix} P & Q & R \\ S & T & U \\ V & W & X \end{bmatrix} = I \text{ ஆக இருக்கட்டும்.}$$

$$\therefore \begin{bmatrix} AP+DS+EV & AQ+DT+EW & AR+DU+EX \\ BS+FV & BT+FW & BU+FX \\ CV & CW & CX \end{bmatrix} = I$$

$$= \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$$\therefore AP+DS+EV=I \quad \quad \quad \dots \quad \dots \quad (1)$$

$$AQ+DT+EW=0 \quad \quad \quad \dots \quad \dots \quad (2)$$

$$AR+DU+EX=0 \quad \quad \quad \dots \quad \dots \quad (3)$$

$$BS+FV=0 \quad \quad \quad \dots \quad \dots \quad (4)$$

$$BT + FW = I \quad \dots \quad (5)$$

$$BU + FX = 0 \quad \dots \quad (6)$$

$$CV = 0 \quad \dots \quad (7)$$

$$CW = 0 \quad \dots \quad (8)$$

$$CX = I \quad \dots \quad (9)$$

$$(9)\text{-ல் இருந்து } X = C^{-1} \quad \dots \quad (10)$$

$$\therefore |C| \neq 0$$

$$\therefore (7), (8)\text{-ல் இருந்து } V = 0, W = 0 \quad \dots \quad (11)$$

$$(4), (11)\text{-ல் இருந்து } S = 0 \quad \dots \quad (12)$$

$$(5), (11)\text{-ல் இருந்து } BT = I \quad \therefore T = B^{-1} \quad (13)$$

$$\therefore |B| \neq 0$$

$$(6), (10)\text{-லிருந்து } BU + FC^{-1} = 0$$

$$\therefore B^{-1}BU + B^{-1}FC^{-1} = 0$$

$$\therefore U = -B^{-1}FC^{-1} \quad \dots \quad (14)$$

$$(1), (11), (12)\text{ லிருந்து } P = A^{-1} \quad \dots \quad (15)$$

$$\therefore |A| \neq 0$$

$$(3), (11)\text{ லிருந்து } AQ + DT = \dots \quad (16)$$

$$(13)\text{ லிருந்து } AQ + DB^{-1} = 0$$

$$\therefore A^{-1}AQ + A^{-1}DB^{-1} = 0$$

$$\therefore Q = -A^{-1} \cdot D \cdot B^{-1} \quad \dots \quad (17)$$

$$(8), (10), (14)\text{-ல் இருந்து}$$

$$AR - DB^{-1} \cdot FC^{-1} + EC^{-1} = 0.$$

$$\therefore A^{-1}AR - A^{-1} \cdot DB^{-1} + FC^{-1} + A^{-1}E \cdot C^{-1} = 0.$$

$$\therefore R = A^{-1}D \cdot B^{-1} \cdot FC^{-1} = A^{-1}EC^{-1}$$

$$\therefore G^{-1} = \begin{bmatrix} A^{-1} & -A^{-1}DB^{-1} & A^{-1}DB^{-1} \cdot FC^{-1} - A^{-1}EC^{-1} \\ 0 & B^{-1} & B^{-1} \cdot F \cdot C^{-1} \\ 0 & 0 & C^{-1} \end{bmatrix}$$

பயிற்சி 5

1. கீழ்வரும் அணிகளைப் பாகுபடுத்திக் கூட்டுக.

$$\begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 3 & 2 & 5 & 0 \\ 1 & -1 & 2 & 3 \\ \hline 2 & 3 & 0 & 1 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 & 0 \\ 2 & 0 & 2 & 3 \\ 1 & 3 & 1 & 1 \\ \hline 5 & 1 & 0 & 2 \end{bmatrix}$$

2. மேற்கண்ட பாகுபாட்டைப் பயன்படுத்திப் பெருக்கக் கூடுவானது சொக. இன்றேல், காரணம் கூறி, வேறுமுறையில் பாகுபடுத்திப் பெருக்குக.

3. AB -ஐக் கண்டுபிடி.

$$(i) \quad A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 3 & 2 \end{bmatrix}; \quad B = \begin{bmatrix} 1 & 4 \\ 2 & 5 \\ \hline 3 & 0 \end{bmatrix}$$

$$(ii) \quad A = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 3 \\ 0 & 1 & 2 \end{bmatrix}; \quad B = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \\ \hline -1 & 2 \end{bmatrix}$$

$$(iii) \quad A = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -2 \end{bmatrix}, \quad B = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 3 & 4 \\ 2 & 3 & 0 & 0 \\ 4 & 5 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

$$(iv) \quad A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 2 & 2 \end{bmatrix}, \quad B = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 2 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

$$(v) \quad A = \begin{bmatrix} 3 & 2 & 3 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 2 & 0 & 0 & 0 \\ 2 & 2 & 5 & 0 & 0 & 0 \\ 3 & 3 & 13 & 3 & 2 & 3 \\ 2 & 0 & 3 & 1 & 1 & 2 \\ 7 & 2 & 12 & 2 & 2 & 5 \end{bmatrix}$$

$$B = \begin{bmatrix} 1 & 2 & -2 & 0 & 0 & 0 \\ -1 & 3 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -2 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 1 & 2 & -2 \\ 0 & 1 & 1 & -1 & 3 & 0 \\ -1 & 0 & 0 & 0 & -2 & 1 \end{bmatrix}$$

$$4. \quad A = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ a & b & -1 & 0 \\ c & d & 0 & -1 \end{bmatrix} \quad \text{ஆனால்,}$$

$A^2 = I$ என நிரூபி.

5. $A =$ மூலக்கோண அணி ($A_1 \ A_2 \ \dots \ A_n$)

$B =$ மூலக்கோண அணி ($B_1 \ B_2 \ \dots \ B_n$)

A_i, B_i என்பன ஒரே தர அணிகளாகியிருந்தால்

(i) $A + B =$ மூலக்கோண அணி
($A_1 + B_1, A_2 + B_2, \dots, A_n + B_n$)

(ii) $AB =$ மூலக்கோண அணி ($A_1 B_1, A_2 B_2, \dots, A_n B_n$)
எனவும் நிரூபி.

6. A என்பது ஒரு சதுர அணியாக இருக்கட்டும். அதன் மூலக்கோண உறுப்புகளின் கூட்டுத்தொகையை A -ன் ரேதி அல்லது ரேதி A என்று சொல்வோம்.

$$\text{உதாரணம்: } A = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{bmatrix} \quad \text{ஆனால்}$$

ரேதி $A = a_{11} + a_{22} + a_{33}$

(i) ரேதி $(A+B) =$ ரேதி $A +$ ரேதி B .

(ii) ரேதி $(kA) = k \cdot$ ரேதி A என நிரூபி.

(iii) A, B என்பன 5ஆம் வினாவில் உள்ள அணிகளானால் ரேதி $AB =$ ரேதி $A_1 B_1 +$ ரேதி $A_2 B_2 + \dots +$ ரேதி $A_n B_n$ என நிரூபி.

7. P, Q என்பன ஒழுங்கு சதுர அணிகளாகவும்,

$$A = \begin{bmatrix} P & 0 \\ 0 & Q \end{bmatrix} \text{ ஆகவும் இருந்தால்}$$

$$A^{-1} = \begin{bmatrix} P^{-1} & 0 \\ 0 & Q^{-1} \end{bmatrix} \text{ என நிரூபி.}$$

8. A, C என்பன ஒழுங்கு சதுர அணிகளாக இருந்தால்

$$\begin{bmatrix} A & 0 \\ B & C \end{bmatrix} \text{-ன் நேர்மாறு அணிபானது}$$

$$\begin{bmatrix} A^{-1} & 0 \\ -C^{-1}BA^{-1} & C^{-1} \end{bmatrix} \text{ ஆக இருக்கவேண்டும் என நிரூபி.}$$

9. பின்வரும் அணிகளில் பெருக்குவதற்கு எத்தகைய பாகு பாடு சிறத்தது எனக் காண்க.

$$(i) \begin{bmatrix} 5 & 2 & 0 & 0 \\ 2 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 5 & 8 \\ 0 & 0 & 5 & 2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & -2 & 0 & 0 \\ -2 & 5 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 2 & -3 \\ 0 & 0 & -5 & 5 \end{bmatrix}$$

$$(ii) \begin{bmatrix} 1 & -1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 2 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 3 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 2 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 2 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 2 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 2 & 2 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 3 & 2 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 3 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 2 \end{bmatrix}$$

$$(iii) \begin{bmatrix} 1 & -1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 2 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 2 & 3 & 0 \\ 0 & 0 & 2 & 3 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 5 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 & 2 & 3 & 4 \\ 0 & 0 & 2 & 3 & 4 & 5 \\ 6 & 7 & 0 & 0 & 0 & 2 \\ 1 & 2 & 0 & 0 & 0 & 3 \\ 3 & 4 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 5 & 6 & 7 & 8 & 9 & 0 \end{bmatrix}$$

10. இவ்வரும் அணிகளின் தேற்றத்திற் அணியினைப் பாராட்டுதலிற் செவ்வும் மூலதனமெனக் கண்டுபிடி.

$$(i) \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 1 & 3 & 3 \\ 2 & 4 & 3 \end{bmatrix} \quad (ii) \begin{bmatrix} 1 & 2 & -1 \\ -1 & 1 & 2 \\ 2 & -1 & 1 \end{bmatrix}$$

$$(iii) \begin{bmatrix} 2 & 3 & 4 \\ 4 & 3 & 1 \\ 1 & 2 & 4 \end{bmatrix} \quad (iv) \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 & 1 \\ 1 & 3 & 3 & 2 \\ 2 & 4 & 3 & 3 \\ 1 & 1 & 1 & 1 \end{bmatrix}$$

$$(v) \begin{bmatrix} 1 & 2 & 0 & 0 \\ 0 & 3 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 2 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 3 \end{bmatrix} \quad (vi) \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 3 & -4 \\ 2 & 3 & 5 & -5 \\ 3 & -4 & -5 & 3 \end{bmatrix}$$

11. இவ்வரும் சமச்சரி அணிகளின் தேற்றத்திற் அணியினை 5-5 மூலதனப்படி கண்டுபிடி.

$$(i) \begin{bmatrix} 1 & 3 & -5 \\ 3 & -1 & 5 \\ -5 & 5 & -5 \end{bmatrix} \quad (ii) \begin{bmatrix} 2 & 4 & 4 \\ 2 & 4 & 5 \\ 2 & 5 & 4 \end{bmatrix}$$

$$(iii) \begin{bmatrix} 1 & 2 & -1 & 2 \\ 2 & 2 & -1 & 1 \\ -1 & -1 & 1 & -1 \\ 2 & 1 & -1 & 2 \end{bmatrix} \quad (iv) \begin{bmatrix} 0 & 1 & 2 & 2 \\ 1 & 1 & 2 & 3 \\ 2 & 2 & 2 & 3 \\ 2 & 2 & 2 & 3 \end{bmatrix}$$

12. $A = \begin{bmatrix} E & F \\ G & H \end{bmatrix}$ ஆக இருக்கட்டும்.

இதில் $E = m \times m$ அணி, $F = n \times m$ அணி, $G = m \times n$ அணி; $H = n \times n$ அணியாக இருக்கட்டும். அப்படியானால்

$$A^{-1} = \begin{bmatrix} X^{-1} & -X^{-1} \cdot F \cdot H^{-1} \\ -H^{-1} \cdot G X^{-1} & H^{-1} \cdot (I_n + G X^{-1} \cdot F \cdot H^{-1}) \end{bmatrix}$$

என திருதி. இதில் $X = E - F H^{-1} G$.

13. $P = \begin{bmatrix} p & 1 \\ 0 & p \end{bmatrix}$; $Q = \begin{bmatrix} q & 1 \\ 0 & q \end{bmatrix}$;

$R = [r]$ என்றும் அணிகள். இவற்றில் p, q, r பூச்சியமல்ல. மேலும்,

$$A = \begin{bmatrix} P & 0 & 0 \\ 0 & Q & 0 \\ 0 & 0 & R \end{bmatrix} \text{ ஆகும்.}$$

(i) $A^2 = \begin{bmatrix} P^2 & 0 & 0 \\ 0 & Q^2 & 0 \\ 0 & 0 & R^2 \end{bmatrix}$ என்றும்,

(ii) $A^{-1} = \begin{bmatrix} P^{-1} & 0 & 0 \\ 0 & Q^{-1} & 0 \\ 0 & 0 & R^{-1} \end{bmatrix}$ என்றும் திருதி.

மேலும் $f(A) = a_0 A^n + a_1 A^{n-1} + a_2 A^{n-2} + \dots + a_n$
(இதில் $a_0, a_1, a_2, \dots, a_n$ எல்பன் எண்ணிகள்) ஆனும்,

$$(iii) \quad f(A) = \begin{bmatrix} f(P) & 0 & 0 \\ 0 & f(Q) & 0 \\ 0 & 0 & f(R) \end{bmatrix} \text{ என நினை.}$$

$f(A)$ ஓர் ஒழுக்கணிபானும்,

$$(iv) \quad \frac{1}{f(A)} = [f(A)]^{-1}$$

$$= \begin{bmatrix} \frac{1}{f(P)} & 0 & 0 \\ 0 & \frac{1}{f(Q)} & 0 \\ 0 & 0 & \frac{1}{f(R)} \end{bmatrix}$$

என நினை.

$g(A)$ எல்பது மத்தேர் பல்லுறுப்புக் கோவைபாகவும்,
 $|g(A)| \neq 0$ ஆகவும் இருத்தால்

$$(v) \quad \frac{f(A)}{g(A)} = \begin{bmatrix} \frac{f(P)}{g(P)} & 0 & 0 \\ 0 & \frac{f(Q)}{g(Q)} & 0 \\ 0 & 0 & \frac{f(R)}{g(R)} \end{bmatrix}$$

என நினை.

விடைகள்.

$$1. \begin{bmatrix} 2 & 4 & 6 & 4 \\ 6 & 2 & 7 & 8 \\ 2 & 2 & 8 & 4 \\ 7 & 4 & 0 & 2 \end{bmatrix}$$

$$2. (i) \begin{bmatrix} 14 & 32 \\ 18 & 48 \end{bmatrix} \quad (ii) \begin{bmatrix} -2 & 8 \\ -2 & 6 \end{bmatrix}$$

$$(iii) \begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & -8 & -4 \\ 4 & 6 & 0 & 0 \\ -8 & -10 & 0 & 0 \end{bmatrix} \quad (iv) \begin{bmatrix} 0 & 0 & 4 & 0 \\ 0 & 0 & 2 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 2 & 2 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

6. அணிகளில் சாதாரண நிறை (நிரல்) மாற்றங்கள்

6-1. அணிகளின் வேறு சில பண்புகளை இந்த அதிகாரத்தில் காணலாம். அணிகளில் எந்தெந்த அணிதச் செய்கைகள் (operations) புரியலாம் என்பதை இதில் ஆராய்வோம். சிறப்பாக, அணிகளின் வகுத்தல் விதியின் விளைகத்தையும், ஒருபடி சமன்பாடுகளை விடுவிக்கும் வகையையும் இங்குக் காண்போம்.

உதாரணமாக,

$$2x_1 + 3x_2 = 9 \quad \dots \dots \dots (1)$$

$$x_1 + 5x_2 = 8 \quad \dots \dots \dots (2)$$

என்ற சமன்பாடுகளை எடுத்துக்கொள்வோம். இவற்றை விடுவிக்க நாம் பின்வரும் முறைவைப் பின்பற்றுவோம்.

$$2 \times (2) \quad 2x_1 + 10x_2 = 16 \quad \dots \dots \dots (3)$$

$$(3)-(1) \quad 7x_2 = 7$$

$$\therefore x_2 = 1$$

$$x_1 = 3$$

இதில் இரண்டாம் சமன்பாட்டை 2 என்றும் எண்ணியால் பெருக்கி, பின்பு மூதல் சமன்பாட்டை மூக்குவதிலிருந்து கழிக்கிறோம்.

இப்பொழுது $\begin{bmatrix} 2 & 8 \\ 1 & 5 \end{bmatrix}$ என்ற குணக்களையான அணியை எடுத்துக்கொள்வோம். இரண்டாவது நிறையை 2 ஆகப் பெருக்கினால் $\begin{bmatrix} 2 & 8 \\ 2 & 10 \end{bmatrix}$ என்ற அணி கிடைக்கின்றது.

இதில் முதல் நிறையை இரண்டாவதிலிருந்து கழித்தால் $\begin{bmatrix} 2 & 8 \\ 0 & 7 \end{bmatrix}$ என்ற அணி கிடைக்கிறது. இவற்றை நாம் சாதாரண நிறை மாற்றங்கள் என அழைக்கின்றோம்.

6.2. ஓர் அணியின் நிறைகளில் 2 வகையான மாற்றங்களைச் செய்யலாம். இவற்றைச் சாதாரண நிறை மாற்றங்கள் என்று சொல்வோம். இவையாவன :

(i) இரு நிறைகளை இடம் மாற்றி அமைத்தல்

உதாரணம் :

$$\begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \\ 7 & 8 & 9 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 7 & 8 & 9 \\ 4 & 5 & 6 \\ 1 & 2 & 3 \end{bmatrix}$$

(ii) ஒரு குறிப்பிட்ட நிறையின் ஒவ்வொரு உறுப்பையும் k ($k \neq 0$) என்ற எண்ணியால் (scalar) பெருக்கல்.

உதாரணம் :

$$\begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \\ 7 & 8 & 9 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 8 & 6 & 9 \\ 4 & 5 & 6 \\ 7 & 8 & 9 \end{bmatrix}$$

(iii) j ஆவது நிறையிலுள்ள ஒவ்வொரு உறுப்பின், i ஆவது நிறையிலுள்ள அதற்கு இயைபுத்த உறுப்பை k ஆல் பெருக்கிக் கூட்டுதல்.

உதாரணம் :

$$\begin{bmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 2 & -1 & 3 \\ -3 & 2 & 1 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 1 & 2 & 1 \\ -7 & 6 & 6 \\ -8 & 2 & 1 \end{bmatrix}$$

A என்ற ஒரு கொடுக்கப்பட்ட அணியில் இத்த நிறை மாற்றங்களைச் செய்வதும், A ஐத் தகுந்ததொர் அணியால் மூன்

பெருக்கதவதும் ஒன்றே ஆகும். இதனை மூன் ஊட்டிய உதாரணக் களாக விளக்குவோம்.

$$(i) \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \\ 7 & 8 & 9 \end{bmatrix} : \begin{bmatrix} 7 & 8 & 9 \\ 4 & 5 & 6 \\ 1 & 2 & 3 \end{bmatrix} = H_{12}$$

இதில் 1 ஆம், 3 ஆம் நிரல்கள் இட மாற்றம் பெற்றுள்ளன. இதை H_{12} எனக் குறிப்பிடுவோம்.

$$\text{இப்பொழுது } \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \text{ என்ற அளவு அணியில் இதே}$$

$$\text{மாற்றத்தைச் செய்தால் } \begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \end{bmatrix} \text{ என்ற அணி கிடைக்க}$$

கிறது. இதனைக் கொண்டு, கொடுக்கப்பட்ட அணியை மூன் பெருக்குவோம்.

$$\begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \\ 7 & 8 & 9 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 7 & 8 & 9 \\ 4 & 5 & 6 \\ 1 & 2 & 3 \end{bmatrix}$$

$$(ii) \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \\ 7 & 8 & 9 \end{bmatrix} : \begin{bmatrix} 3 & 6 & 9 \\ 4 & 5 & 6 \\ 7 & 8 & 9 \end{bmatrix} = R_1(3)$$

இதில் முதல் நிரலைய 3 ஆம் பெருக்கி இருக்கிறோம். இதை $R_1(3)$ எனக் குறிப்பிடுவோம். இப்பொழுது I_3 -ன் முதல் நிரலைய 3 ஆம் பெருக்கினால் கிடைக்கும்

$$\begin{bmatrix} 3 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \text{ என்ற ஆணியால் கொடுக்கப்பட்ட ஆணியை}$$

மூன் பெருக்குவோம்.

$$\begin{bmatrix} 3 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \\ 7 & 8 & 9 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 3 & 6 & 9 \\ 4 & 5 & 6 \\ 7 & 8 & 9 \end{bmatrix}$$

$$(iii) \begin{bmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 2 & -1 & 3 \\ -3 & 2 & 1 \end{bmatrix} ; \begin{bmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 5 & -3 & 2 \\ -3 & 2 & 1 \end{bmatrix} = H_{21}(-1)$$

இதில் 3 ஆவது நிரையிலுள்ள உறுப்புகளை (-1) ஆல் பெருக்கி, இரண்டாம் நிரையிலுள்ள அதற்குரியதான உறுப்புகளுடன் கூட்டி யுள்ளோம். இதை $H_{21}(-1)$ எனக் குறிப்பிடுவோம். இப்போது I_3 -ல் 3 ஆவது நிரையிலுள்ள உறுப்புகளை 3 ஆல் பெருக்கி, இரண்டாம் நிரையில் உள்ள அதற்குரியதான உறுப்புகளுடன் கூட்டினால்,

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \text{ என்ற ஆணி கிடைக்கும்.}$$

கொடுக்கப்பட்ட ஆணியை, இந்த ஆணியால் மூன் பெருக்கினால்

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 2 & -1 & 3 \\ -3 & 2 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 5 & -3 & 2 \\ -3 & 2 & 1 \end{bmatrix}$$

6-3. இதே விதமாகச் சாதாரண நிரல் மாற்றங்கள் ஒன்று உண்டு. இவற்றை அல்லு அணியில் இயைபுற்ற மாற்றம் க் கொடுத்து கொடுக்கப்பட்ட அணியைப் பின் பெருக்கி அடைவோம்.

உதாரணம் :

(i) இரு நிரல்களை இடம் மாற்றி அமைத்தல் C_{12}

$$\begin{bmatrix} 1 & 4 \\ 2 & 5 \\ 3 & 6 \end{bmatrix} ; \begin{bmatrix} 4 & 1 \\ 5 & 2 \\ 6 & 3 \end{bmatrix} = C_{12}$$

$$\text{மேலும், } \begin{bmatrix} 1 & 4 \\ 2 & 5 \\ 3 & 6 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 4 & 1 \\ 5 & 2 \\ 6 & 3 \end{bmatrix}$$

(ii) ஒரு குறிப்பிட்ட நிரலின் ஒவ்வொரு உறுப்பையும் $C_1(k)$; $k(\neq 0)$ என்ற எண்ணியாக் பெருக்கல்,

$$\begin{bmatrix} 1 & 4 \\ 2 & 5 \\ 3 & 6 \end{bmatrix} ; \begin{bmatrix} 3 & 4 \\ 6 & 5 \\ 9 & 6 \end{bmatrix} = C_1(3)$$

$$\text{மேலும், } \begin{bmatrix} 1 & 4 \\ 2 & 5 \\ 3 & 6 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 3 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 3 & 4 \\ 6 & 5 \\ 9 & 6 \end{bmatrix}$$

(iii) j ஆவது நிரலில் உள்ள ஒவ்வொரு உறுப்புடன் i ஆவது நிரலில் உள்ள அதற்கு இயைபுற்ற உறுப்பை, k ஆக பெருக்கிக் கூட்டுதல். $C_{ij}(k)$

$$\begin{bmatrix} 1 & 4 \\ 2 & 5 \\ 3 & 6 \end{bmatrix} ; \begin{bmatrix} 1 & 8 \\ 2 & 13 \\ 3 & 18 \end{bmatrix} = C_{12}(4).$$

$$\text{மேலும், } \begin{bmatrix} 1 & 4 \\ 2 & 5 \\ 3 & 6 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 4 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 8 \\ 2 & 13 \\ 3 & 18 \end{bmatrix}$$

6-4. சாதாரண அணிகள்

ஒர் அல்லது அணியிலிருந்து சாதாரண நிறை அல்லது நிரல் மாற்றங்களுக்கும் பிறகு கிடைக்கும் அணிகளுக்கும் சாதாரண அணிகள் என்பது பொருள்.

$$\text{உதாரணமாக, } I_3 = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \text{ ஐ}$$

எடுத்துக் கொள்வோம்.

$$R_{12} = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} = C_{12}$$

$$R_3(k) = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & k \end{bmatrix} = C_3(k)$$

$$R_{12}(k) = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ k & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} = C_{12}(k)$$

ஆகவே, இவை எல்லாம் சாதாரண அணிகளாகும்.

6-5. தேற்றம்: அணிகளில் ஒரு சாதாரண நிறை (நிரல்) மாற்றத்திற்குச் செல்லும், அதற்கெனவந்த சாதாரண அணியால் முன்(பின்) பெருக்குவதற்குச் சமமாகும்.

$AB = C$ என்றும் அணிகளில் பெருக்கலை எடுத்துக் கொள்வோம். இதில் முன் காரணியான A -ல் ஒரு சாதாரண

நிறை மாற்றத்தைச் செய்து A_2 கிடைக்கிறது என வைத்துக் கொள்வோம். $A_2 B = C_2$ ஆக இருக்கட்டும். C_2 என்பது C -ல் தாம் அதே சாதாரண நிறை மாற்றத்தைச் செய்தால் கிடைக்கும் என்று திருப்பிப்போம்.

இதே விதமாக, பின் காரணியான B -ல் ஒரு நிரல் மாற்றத்தைச் செய்து B_2 கிடைக்கிறது என வைத்துக் கொள்வோம். $A B_2 = C_2$ ஆக இருக்கட்டும். C_2 என்பது C -ல் தாம் அதே சாதாரண நிரல் மாற்றத்தைச் செய்தால் கிடைக்கும் என திருப்பிப்போம்.

நிரூபணம் :

$$A = \begin{bmatrix} R_1 \\ R_2 \\ \vdots \\ R_m \end{bmatrix}, \quad B = [C_1 C_2 \dots C_n]$$

ஆகவும் இருக்கட்டும்.

$$\therefore AB = \begin{bmatrix} R_1 C_1 & R_1 C_2 & \dots & R_1 C_n \\ R_2 C_1 & R_2 C_2 & \dots & R_2 C_n \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ R_m C_1 & R_m C_2 & \dots & R_m C_n \end{bmatrix}$$

இதிலிருந்து A -ல் உள்ள $R_1, R_2, \dots, R_m$ -ல் தாம் என்ன சாதாரண நிறை மாற்றத்தைச் செய்தாலும் அது AB யிலும் அதே விதமாகப் பிரதிபலிக்கும் என்று காண்கிறோம்.

இதேவிதமாக B -ல் உள்ள $C_1, C_2, \dots, C_n$ -ல் தாம் எந்த விதமான சாதாரண நிரல் மாற்றத்தைச் செய்தாலும், AB யிலும் அதேவிதமாகப் பிரதிபலிக்கும் என்பதைக் காண்கிறோம்.

இப்பொழுது, $IA = A$ என்பதிலிருந்து $I_2 A = A_2$ என்ற சமன்பாட்டைப் பெறலாம்.

அதாவது A -ல் நிரைமாற்றம் செய்வது, A ஐ ஒரு சாதாரண அணியாக (அல்லது அணியில் அதே நிரை மாற்றம் செய்து கிடைக்கப் பெற்ற அணியாக), மூன்் பெருக்குவதற்குச் சமம்.

இதேவிதமாக $AI = A$ என்பதிலிருந்து $AI_0 = A_0$ என்று கிடைக்கும். $\therefore A$ -ல் ஒரு நிரல் மாற்றம் செய்வது, A ஐ ஒரு சாதாரண அணியாக (அல்லது அணியில் அதே நிரல் மாற்றம் செய்து கிடைக்கப் பெற்ற அணியாக) மூன்் பெருக்குவதற்குச் சமம்.

6.6. நெய்த்நேற்றம் : சாதாரண அணிகளின் நேர்மாறான (நேரெதிர்) அணிகள் அதே வகைச் சாதாரண அணிகள்.

மேலும், சாதாரண அணிகள் பூச்சியத்தில் கோவை அணிகள் (அல்லது ஒழுங்கணிகள்) ஆக இருக்க வேண்டும்.

R_{ij} , $R_i(k)$, $R_{ij}(k)$ என்பன நிரை மாற்றம் வழி வந்த சாதாரண அணிகள்.

R_{ij} -ன் i, j நிரைகளை மீண்டும் மாற்றி அமைத்தால் I கிடைக்கும் என்பது வெளிப்படை...

$$\therefore R_{ij} \cdot R_{ij} = I$$

$$\therefore R_{ij}^{-1} = R_{ij}$$

R_{ij} என்ற சாதாரண அணியில் நேரெதிர் அணி அதே வகைச் சாதாரண அணி என்பதைக் கவனிக்கவும். மேலும் R_{ij} -க்கு நேரெதிர் அணி இருப்பதால் $|R_{ij}| \neq 0$. அதாவது, R_{ij} ஓர் ஒழுங்கணி.

மேலும், $R_i(k)$ ஐ k^{-1} ஆல் பெருக்கினால் நிரல்படி I கிடைக்கும் என்பது வெளிப்படை. அதாவது, $R_i(k)$ ஐ $R_i(k^{-1})$ ஆல் மூன்் பெருக்கினால் I கிடைக்கும்.

$$\therefore R_i(k^{-1}) \cdot R_i(k) = I$$

$$\therefore R_i^{-1}(k) = R_i(k^{-1})$$

$\therefore R_i(k)$ ஓர் ஒழுங்கணி. இதன் நேரெதிர் அணியும் இதே வகைச் சாதாரண அணி.

$$\text{கடைசிவகை, } R_{ij}(-k) \cdot R_{ij}(k) = I$$

$$\therefore R_{ij}^{-1}(k) = R_{ij}(-k)$$

$\therefore R_1(k)$ ஓர் ஒழுங்கணி. இதன் நேரெதிர் அணிவும் இதே வகைச் சாதாரண அணி.

இதே விதமாக நிரல் மாற்று வழி வந்த சாதாரண அணி களுக்கும் திருபணைச் செய்யலாம்.

6-7. நேரெதிர் அணிகளைச் சாதாரண அணிகளின் மூலம் கொண்டு கண்டுபிடித்தல்.

தாம் இதுவரை நேரெதிர் அணிகளைக் கண்டுபிடிக்கப் பல் வேறு முறைகளை விளக்கியோம். இவைகளை எல்லாவற்றையும் விட இந்த முறை சிறந்ததாகும். சிறப்பாக அணிகளின் தரம் மூன்றுக்கு மேற்பட்டால் இதன் எளிமை தெளிவாகும். இந்த முறையை மூன்று உதாரணங்களால் விளக்குவோம்.

உதாரணம் 1 :

$$A = \begin{bmatrix} 2 & 3 \\ 1 & 4 \end{bmatrix} \text{ ஆகவும் } A^{-1} \text{ ஐக் கண்டுபிடி.}$$

A ஓர் ஒழுங்கு அணி என்பதைக் கவனி. இதில் பல்வித திரை மாற்றங்கள் செய்து I என்ற அணிவாக்குவோம். இது P, Q, R, S என்ற சாதாரண அணிகளால் முறையே மூன்் பெருக்கு வதற்குச் சமமாகும்.

$$A = \begin{bmatrix} 2 & 3 \\ 1 & 4 \end{bmatrix}$$

(1) முதல் திரையை $\frac{1}{2}$ ஆல் பெருக்கல்

$$PA = R_1\left(\frac{1}{2}\right) \begin{bmatrix} 2 & 3 \\ 1 & 4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & \frac{3}{2} \\ 1 & 4 \end{bmatrix}$$

(2) இரண்டாம் திரையை (-1) ஆல் பெருக்கி, இரண்டாம் திரையின் கூட்டல்.

$$Q \cdot (PA) = R_2(-1) \begin{bmatrix} 1 & \frac{3}{2} \\ 1 & 4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & \frac{3}{2} \\ 0 & \frac{5}{2} \end{bmatrix}$$

(3) இரண்டாம் திரையை $\frac{2}{5}$ ஆல் பெருக்கல்.

$$R\left(QPA\right) = R_3\left(\frac{2}{5}\right) \begin{bmatrix} 1 & \frac{3}{2} \\ 0 & \frac{5}{2} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & \frac{3}{2} \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$$

(4) இரண்டாம் திரையை $-\frac{3}{2}$ ஆல் பெருக்கி, முதல் திரை யுடன் கூட்டல்.

$$S(RQPA) = R_{12}(-\frac{3}{2}) \begin{bmatrix} 1 & \frac{3}{2} \\ 0 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$$\therefore SRQPA = I$$

$$\therefore SRQPA \cdot A^{-1} = I \cdot A^{-1} = A^{-1}$$

$$\therefore SRQPI = A^{-1}$$

$$\therefore A^{-1} = SRQPI = R_{12}(-\frac{3}{2}) \cdot R_1(\frac{3}{2}) \cdot R_{31}(-1) \cdot R_1(\frac{1}{2}) \cdot I$$

$$\therefore A^{-1} = R_{12}(-\frac{3}{2}) \cdot R_1(\frac{3}{2}) \cdot R_{31}(-1) \cdot$$

$$\left\{ R_1(\frac{1}{2}) \cdot \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \right\}$$

$$= R_{12}(-\frac{3}{2}) \cdot R_1(\frac{3}{2}) \cdot R_{31}(-1) \begin{bmatrix} \frac{1}{2} & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$$

(தரம் முதலில் A க்குச் செய்த அதே நிறை மாற்றத்தை I க்கும் முதலாவதாகச் செய்வதைக் கவனி.)

$$= R_{12}(-\frac{3}{2}) \cdot R_1(\frac{3}{2}) \cdot \begin{bmatrix} \frac{1}{2} & 0 \\ -\frac{1}{2} & 1 \end{bmatrix}$$

$$= R_{12}(-\frac{3}{2}) \begin{bmatrix} \frac{1}{2} & 0 \\ -\frac{1}{2} & \frac{3}{2} \end{bmatrix}$$

$$A^{-1} = \begin{bmatrix} \frac{1}{2} & -\frac{3}{2} \\ -\frac{1}{2} & \frac{3}{2} \end{bmatrix}$$

தரம் முதலில் செய்த நிறை மாற்றங்களை, முறையே அங்கு அணிவழிச் செய்து A^{-1} ஐக் கண்டுபிடிக்கிறோம். இந்த மாற்றங்களைப் படைத்தலாகச் செய்வதால், ஆனால் A^{-1} ஐப் பெற அவற்றை முறையே அங்கு அணிவழிச் செய்வதோண்டும்.

உதாரணம் 2 :

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 4 & 5 \\ 3 & 5 & 6 \end{bmatrix} \quad \text{ஆனால் } A^{-1} \text{ ஐக் கண்டுபிடி.}$$

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 4 & 5 \\ 3 & 5 & 6 \end{bmatrix}; \quad I = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

1. $P = R_{21}(-3)$. மூலம் நிரையை -3 ஆல் பெருக்கி, இரண்டாம் நிரையுடன் கூட்டல்.

$$PA = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 4 & 5 \\ 3 & 5 & 6 \end{bmatrix}; \quad PI = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ -3 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

2. $Q = R_{21}(-2)$. மூலம் நிரையை -2 ஆல் பெருக்கி இரண்டாம் நிரையுடன் கூட்டல்.

$$QPA = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 0 & 0 & -1 \\ 0 & -1 & -3 \end{bmatrix}; \quad QPI = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ -2 & 1 & 0 \\ -2 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

3. $R = R_{23}(-1)$. மூன்றாம் நிரையை (-1) ஆல் பெருக்கி, இரண்டாம் நிரையுடன் கூட்டல்.

$$RQPA = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 0 & 1 & 2 \\ 0 & -1 & -3 \end{bmatrix}; \quad RQPI = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & -1 \\ -2 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

4. $S = R_{32}(+1)$. இரண்டாம் நிரையை (1) -ஆல் பெருக்கி மூன்றாம் நிரையுடன் கூட்டல்.

$$SRQPA = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 0 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & -1 \end{bmatrix}$$

$$SRQPI = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & -1 \\ -2 & 1 & 0 \end{bmatrix}$$

6. $T = R_2(-1)$. ஒன்றாம் நிறையை (-1) ஆல் பெருக்கல்.

$$TSRQPA = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 0 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}; TSRQPI = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & -1 \\ 2 & -1 & 0 \end{bmatrix}$$

3. $U = R_{12}(-2)$. ஒன்றாம் நிறையை (-2) ஆல் பெருக்கி இரண்டாம் நிறையுடன் கூட்டல்.

$$UTSRQPA = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}; UTSRQPI = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ -2 & 2 & -1 \\ 2 & -1 & 0 \end{bmatrix}$$

7. $V = R_{12}(-3)$. ஒன்றாம் நிறையை (-3) ஆல் பெருக்கி மூதாம் நிறையுடன் கூட்டல்.

$$VUTSRQPA = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}; VUTSRQPI = \begin{bmatrix} -5 & 2 & 0 \\ -2 & 2 & -1 \\ 2 & -1 & 0 \end{bmatrix}$$

8. $W = R_{12}(-2)$. இரண்டாம் நிறையை (-2) ஆல் பெருக்கி மூதாம் நிறையுடன் கூட்டல்.

$$WVUTSRQPA = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix};$$

$$WVUTSRQPI = \begin{bmatrix} 1 & -2 & 2 \\ -2 & 2 & -1 \\ 2 & -1 & 0 \end{bmatrix}$$

$$\therefore WVUTSRQPA = I$$

$$WVUTSRQPA A^{-1} = I A^{-1} = A^{-1}$$

$$WVUTSRQPI = A^{-1}$$

$$\therefore \begin{bmatrix} 1 & -3 & 3 \\ -3 & 3 & -1 \\ 2 & -1 & 0 \end{bmatrix} = A^{-1}.$$

இதில் 7, 8 ஐத் தனித்தனியே செயல்படுவனடிய தேவை யில்லை. அவை அனியை அடையவேண்டியதுதான் குறிக்கோள். இவ்வளவு விவரமாக ஒவ்வொரு திசையையும் விளக்காமல் அடுத்த உதாரணத்தில் செய்து காட்டுவோம்.

உதாரணம் 8 :

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 & 1 \\ 1 & 3 & 3 & 2 \\ 2 & 4 & 3 & 3 \\ 1 & 1 & 1 & 1 \end{bmatrix} \quad \text{ஆனால் } A^{-1} \text{ ஐக் கண்டுபிடி.}$$

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 & 1 \\ 1 & 3 & 3 & 2 \\ 2 & 4 & 3 & 3 \\ 1 & 1 & 1 & 1 \end{bmatrix} \quad \text{ஆனால்,}$$

$$I = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$$\begin{array}{l} R_{21}(-1), \\ R_{31}(-2), \\ R_{41}(-1) \end{array} \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & -2 & 1 \\ 0 & -1 & -2 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ -1 & 1 & 0 & 0 \\ -2 & 0 & 1 & 0 \\ -1 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$$\begin{array}{l} R_{12}(-2), \\ R_{13}(1), \\ R_{42}(+1) \end{array} \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & -2 & 1 \\ 0 & 0 & -2 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & -2 & 1 & 0 \\ -1 & 1 & 0 & 0 \\ -2 & 0 & 1 & 0 \\ -2 & 1 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$$R_{34}(-1) \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & -2 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & -2 & 1 & 0 \\ -1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 1 & -1 \\ -2 & 1 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$$R_{43}(-2) \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & -2 & 1 & 0 \\ -1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 1 & -1 \\ -2 & 2 & -2 & 2 \end{bmatrix}$$

$$\begin{array}{l} R_{14}(-1), \\ R_4(-1) \end{array} \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & -2 & 1 & 0 \\ 1 & -2 & 2 & -2 \\ 0 & 1 & -1 & 1 \\ -2 & 2 & -2 & 2 \end{bmatrix}$$

$$\therefore (Z \dots \dots \dots P) A = I$$

$$\therefore (Z \dots \dots \dots P) \cdot AA^{-1} = IA^{-1}$$

$$(Z \dots \dots \dots P) I = A^{-1}$$

$$\begin{bmatrix} 1 & -2 & 1 & 0 \\ 1 & -2 & 2 & -3 \\ 0 & 1 & -1 & 1 \\ -2 & 3 & -2 & 6 \end{bmatrix} = A^{-1}$$

6-8. சம மாற்று அணிகள்

A, B என்ற அணிகளில் ஒன்றை, அடுத்ததிலிருந்து சாதாரண நிறை அல்லது திரும்ப மாற்றங்களினால் பெற முடிந்தால் அவற்றைச் சம மாற்று அணிகள் என்று சொல்வோம். இதை $A \sim B$ எனக் குறிப்பிடுவது வழக்கம். இது ஒரு 'சமமான உறவு' (Equivalence Relation) ஆகும். ஏனெனினும்,

(i) $A \sim A$, ஏனெனில் $IA = A$

(ii) $A \sim B$ ஆனால் $B \sim A$

ஏனெனில் $B = RA$ ஆனால் $R^{-1}B = A$.

R சாதாரண அணியானால் R^{-1} உம் சாதாரண அணி என்பதை நினைவிற் கொள்ளவும்.

(iii) $A \sim B$; $B \sim C$ ஆனால் $A \sim C$.

ஏனெனில் $B = R_1A$ ஆகவும், $C = R_2B$ ஆகவும் இருந்தால் $C = R_2R_1A = R_3A$.

இரு சாதாரண அணிகளின் பெருக்கற்பணன் மற்றோர் சாதாரண அணியாதலின் $R_3 = R_2R_1$ என்பது பொருத்தும்.

6-9. சமநிலை மாற்று அணிகள்

A, B என்ற அணிகளில் ஒன்று அடுத்ததிலிருந்து சாதாரண நிறை மாற்றங்களினால் மாட்டுமே பெற முடிந்தால் அவற்றைச் "சமநிலை மாற்று அணிகள்" என்று சொல்வோம். இதுவும் "ஒரு சமன்பாட்டுத் தொடர்பு" ஆகும்.

6-8. (ii)-ல் R என்பது அளவு அணியிலிருந்து சாதாரண நிறை மாற்றங்களால் கிடைத்த அணி ஆனால், R^{-1} உம் அதே வகையைச் சேர்ந்தது.

உ.உ. (iii)-ல் R_1, R_2 என்பன இத்தகைய அணிகளானால் $R_3 = R_1 R_2$ உம் இத்தகைய அணிவேதான். இதேவிதமாகச் சம நிரல் மாற்று அணிகளையும் வரையறை செய்வோம்.

உதாரணம் 1 : சம நிறை மாற்று அணிகள் :

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 5 & 6 & 7 & 8 \\ 9 & 10 & 11 & 12 \end{bmatrix} \sim \begin{bmatrix} 2 & 4 & 6 & 8 \\ 5 & 6 & 7 & 8 \\ 9 & 10 & 11 & 12 \end{bmatrix} \\ \sim \begin{bmatrix} 2 & 4 & 6 & 8 \\ 3 & 2 & 1 & 0 \\ 9 & 10 & 11 & 12 \end{bmatrix} = B$$

உதாரணம் 2 : சம நிரல் மாற்று அணிகள் :

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 5 & 6 & 7 & 8 \\ 9 & 10 & 11 & 12 \end{bmatrix} \sim \begin{bmatrix} 1 & 1 & 3 & 4 \\ 5 & 1 & 7 & 8 \\ 9 & 1 & 11 & 12 \end{bmatrix} \\ \sim \begin{bmatrix} 1 & 1 & 3 & 4 \\ 1 & 5 & 7 & 8 \\ 1 & 9 & 11 & 12 \end{bmatrix} = B.$$

உதாரணம் 3 : சம மாற்று அணிகள் :

$$A = \begin{bmatrix} 5 & 3 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \\ 6 & 3 & 1 \end{bmatrix} \sim \begin{bmatrix} 2 & 3 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 2 & 3 & 1 \end{bmatrix} \\ \sim \begin{bmatrix} 1 & 3 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 1 & 3 & 1 \end{bmatrix} \sim \begin{bmatrix} 1 & 3 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} = C$$

8 ஆகிய உதாரணத்தில், C என்ற அணியை A -ன் ஒரு நிபமன வடிவம் (canonical form) என்று சொல்லலாம். இதன் வரையறைகளிலிருந்து இதற்கும் அணி மாற்றத்திற்கும் உள்ள தொடர்பைக் காணலாம்.

6-10. A -க்கு ஒரு நிபமன வடிவ அணி:

A என்பது (பூச்சிய அணி அல்லாத) ஒர் அணிவாக இருக்கட்டும். அதைச் சில சாதாரண நிரை மாற்றங்கள் மூலம் சீர் வரும் பண்புகள் உள்ள C எனும் நிபமன வடிவ அணிவாக மாற்றலாம்.

(i) முதல் r நிரைகளில் ($r > 0$) ஈட்டும் ஒன்று அல்லது அதற்கு மேற்பட்ட பூச்சியமில்லாத உறுப்புகள் இருக்கும்.

(ii) அத்தகைய ஒவ்வொரு நிரையிலும், பூச்சியமில்லாத முதல் உறுப்பு (இடமிருந்து வலம் வரும்போது) 1 ஆக இருக்கும்.

(iii) ஒரு நிரையிலுள்ள முதல் பூச்சியமல்லாத உறுப்பு (அது 1) அதற்கு மேலே உள்ள நிரைகளில் உள்ள முதல் பூச்சியமில்லாத உறுப்புக்கு வலப்புறம் இருக்கும்.

(iv) முதல் r நிரைகளுக்குக் கீழே உள்ள எல்லா நிரைகளிலும் உள்ள எல்லா உறுப்புகளும் பூச்சியமாக இருக்கும்.

உதாரணம் :

$$(i) \begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 & 2 & 3 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & -4 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} ; (ii) \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 0 & 1 & 5 & 6 \\ 0 & 0 & 1 & 7 \end{bmatrix}$$

என்பன நிபமன வடிவ அணிகள்.

குறிப்பு : A என்று கொடுக்கப்பட்ட ஒர் அணிக்குப் பல நிபமான வடிவ அணிகள் இருக்கலாம்.

6-11. இனிமேல், “கொடுக்கப்பட்ட அணியின் நிபமான வடிவ அணியைக் கண்டுபிடிப்பது எங்கனம்” என விளக்குவோம்.

முதல் நிரையில் உள்ள முதல் பூச்சியமில் உறுப்பு p ஆவது நிரையில் உள்ள p ஆக இருக்கட்டும். முதல் நிரையில் பூச்சியமில் உறுப்பு இல்லாமல் 1 ஆவது நிரையில் இருந்தால் முதல் முதலாக

இவ்விரு நிரைகளையும் மாற்றிக் கொள்ளலாம். இப்பொழுது முதல் நிரலிலுள்ள உறுப்புகளை p ஆக வகுக்க, முதல் நிரலில் உள்ள முதல் பூச்சியமில் உறுப்பு 1 ஆவதைக் கவனி. இதன் மின்னர், முதல் நிரலின் தகுத்த உடங்குகளை இரண்டாம், மூன்றாம் நிரைகளில் இருந்து எழிக்கவும். அப்படியானால் j ஆவது நிரலில் மீதி உள்ள நிரைகளில் பூச்சியம்தான் உண்டு.

இப்பொழுது, முதல் நிரையைத் தவிர மீதி நிரைகளில் எல்லாம் பூச்சியம் இருத்தால், இதுதான் நிலமான அணி. இல்லாவிட்டால், இதே விதமாக இரண்டாம் நிரலின் $(j+1)$ ஆவது நிரலில் (இதில் பூச்சியம் இருத்தால் $(j+2)$ ஆவது நிரலில், அன்றி அதிலும் பூச்சியமிருத்தால் அதற்கடுத்த நிரலில்) 1 வரும் படி மாற்றங்கள் செய்வோம்.

இப்பொழுது, மூன்றிரு நிரைகளைத் தவிர மீதி நிரைகளில் எல்லாம் பூச்சியமிருத்தால், இதுதான் நிலமான அணி. இல்லாவிட்டால், மூன்றாம் தொடர்ந்து மாற்றங்கள் செய்ய்க.

$$\text{உதாரணம் 1 : } \begin{bmatrix} 0 & 1 & 2 \\ 8 & 6 & 9 \\ 1 & 4 & 7 \end{bmatrix} \text{ என்ற அணியை நிலமான அணியில்}$$

எழுதுக.

$$R_1: \begin{bmatrix} 8 & 6 & 9 \\ 0 & 1 & 2 \\ 1 & 4 & 7 \end{bmatrix} \text{ இது முதல் நிரலின் தொடக்கத்தில்}$$

பூச்சியமில் உறுப்பைத் தருகிறது.

$$R_1\left(\frac{1}{8}\right) \begin{bmatrix} 1 & \frac{3}{4} & \frac{9}{8} \\ 0 & 1 & 2 \\ 1 & 4 & 7 \end{bmatrix} \text{ இது முதல் நிரலின் முதல் உறுப்பை,}$$

$\frac{1}{8}$ ஐ 1 ஆக மாற்றுகிறது.

$$R_{21}(-1) \cdot \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 0 & 1 & 2 \\ 0 & 2 & 7 \end{bmatrix}$$

இது a_{21} ஐப் பூச்சிவனாக்குகிறது.

$$R_{32}(-2) \cdot \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 0 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 3 \end{bmatrix}$$

இது a_{32} ஐப் பூச்சிவனாக்குகிறது.

$$R_3\left(\frac{1}{3}\right) \cdot \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 0 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

இது a_{33} ஐ 1 ஆக்குகிறது. இது A -ன் திவமன வடிவ அணி.

உதாரணம் 2 :

$$\begin{bmatrix} 1 & 2 & 1 & 0 \\ 3 & 2 & 1 & 2 \\ 2 & -1 & 2 & 5 \\ 5 & 6 & 3 & 2 \\ 3 & 7 & 1 & -3 \end{bmatrix}$$

என்ற அணிவை திவமன வடிவில் எழுதுக.

$$\begin{bmatrix} 1 & 2 & 1 & 0 \\ 3 & 2 & 1 & 2 \\ 2 & -1 & 2 & 5 \\ 5 & 6 & 3 & 2 \\ 3 & 7 & 1 & -3 \end{bmatrix}$$

$$\sim \begin{bmatrix} 1 & 2 & 1 & 0 \\ 0 & -4 & -2 & 2 \\ 0 & -5 & 0 & 5 \\ 0 & -4 & -2 & 2 \\ 0 & -1 & 2 & 3 \end{bmatrix} \quad \begin{array}{l} \therefore R_{11}(-2); \quad R_{21}(-2); \\ R_{31}(-5); \quad R_{41}(2) \end{array}$$

$$\sim \begin{bmatrix} 1 & 2 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & -1 \\ 0 & -4 & -2 & 2 \\ 0 & 1 & -2 & -3 \end{bmatrix} \quad \begin{array}{l} \therefore R_{24}(-1); \quad R_3(-\frac{1}{2}); \\ R_4(-1). \end{array}$$

$$\sim \begin{bmatrix} 1 & 2 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & -2 & -3 \\ 0 & 0 & 2 & 2 \\ 0 & 0 & -10 & -10 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \quad \begin{array}{l} \therefore R_{14}; \quad R_{22}(-1) \\ R_{43}(4). \end{array}$$

$$\sim \begin{bmatrix} 1 & 2 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & -2 & -3 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \quad \begin{array}{l} R_1(\frac{1}{2}); \quad R_{13}(10) \end{array}$$

$= C =$ நிலமன வடிவ அணி.

உதாரணம் 8 : கீழ்க்கண்ட அணிமைய திசுமன வடிவில் எழுது.

$$\begin{aligned}
 & \begin{bmatrix} 0 & 1 & b & d \\ 1 & 0 & c & e \\ b & c & 2bc & cd+be \\ d & e & cd+be & 2de \end{bmatrix} \\
 & \sim \begin{bmatrix} 1 & 0 & c & e \\ 0 & 1 & b & d \\ b & c & 2bc & cd+be \\ d & e & cd+be & 2de \end{bmatrix} \quad \because R_{17} \\
 & \sim \begin{bmatrix} 1 & 0 & c & e \\ 0 & 1 & b & d \\ 0 & c & bc & cd \\ 0 & e & be & de \end{bmatrix} \quad \because R_{31}(-b); R_{41}(-d) \\
 & \sim \begin{bmatrix} 1 & 0 & c & e \\ 0 & 1 & b & d \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \quad \because R_{31}(-c); R_{41}(-d)
 \end{aligned}$$

6-12. கொடுக்கப்பட்ட ஓர் அணிமைய இயல் வடிவம் (Normal form of a given Matrix) :

A என்ற கொடுக்கப்பட்ட திசுமையில் அணிமைய திசு. திசு மாற்றங்களால்

$$I_n \left[\begin{array}{cc} I_r & 0 \\ 0 & 0 \end{array} \right], [I_r, 0], \left[\begin{array}{c} I_r \\ 0 \end{array} \right]$$

என்னும் வடிவங்களில் ஒன்றாக மாற்றலாம். இதனை A -ன் இயல் வடிவம் என்று சொல்வோம். இதனை N என்று குறிப்பிடுவது வழக்கம்.

குறிப்பு: ஒரு பூச்சிய அணியின் இயல் வடிவம் ஆகவே தான்.

கொடுக்கப்பட்ட அணியின் நிபமண வடிவமாக்க நிரை மாற்றங்களை மட்டுமே உபயோகித்தோம். இதில் நிரல் மாற்றக் களியை உபயோகிக்கலாம். ஆகவே, 1ஐ முதல் நிரையிலும் முதல் நிரலும் இருக்குமாறு எழுதலாம். அதை, முதல் நிரையிலும் முதல் நிரலும் உள்ள மீதி உறுப்புகளையெல்லாம் பூச்சியமாக்குவோம். அதன்மீது, இரண்டாம் நிரை, இரண்டாம் நிரலில் உள்ள உறுப்பை 1 ஆக மாற்றலாம். அதே, 2 ஆம் நிரையிலும், 2 ஆம் நிரலிலும் உள்ள மீதி உறுப்புகளைப் பூச்சியமாக்க வேண்டும். இவ்வாறு தொடர்ந்து $n-1$ ஆகக் வேண்டும்... இறுதியில் இயல் வடிவம் கிடைக்கும்.

இதிலிருந்து, A என்னும் $n \times n$ அணி கொடுக்கப்பட்டால், $R_1 (= n \times n$ அணி); $C_1 (= n \times n$ அணி) என்பனவகளை $RAC = N$ என இருக்கும் வண்ணம் எழுத முடியும் எனத் தெரிகிறது. இதில் R என்பது சாதாரண நிரை அணிகளின் பெருக்கத் பலன் என்பதும், C என்பது சாதாரண நிரல் அணிகளின் பெருக்கத் பலன் என்பதும் குறிப்பிடத்தக்கது.

6.13. நிரைநேற்றம் (i)

A என்பது ஒரு n -அறு ஒழுங்கணியானால் R, C என்னும் அணிகள் $RAC = I_n$ என்பதற்கிணக்க உண்டு.

$$\text{ஏனெனில், } N = I_n.$$

நிரைநேற்றம் (ii)

A என்பது ஒரு n -அறு ஒழுங்கணியானால் அதனைச் சாதாரண அணிகளின் பெருக்கத் பலனாக எழுத இயலும்.

$$A \text{ என்பது ஒர் ஒழுங்கணி} \quad \dots \quad \dots \quad (\text{கொள்கை})$$

$$\therefore 6.13 (i)\text{-ல் இருந்து, } RAC = I_n \quad \dots \quad (1)$$

$$\text{இதில் } R = R_1 \ R_2 \ \dots \ \dots \ R_l$$

$$C = C_1 \ C_2 \ \dots \ \dots \ C_k$$

R_l என்பது ஒரு சாதாரண நிரை அணி.

C_k என்பது ஒரு சாதாரண நிரல் அணி.

$$(1)\text{-ல் இருந்து } R^{-1} \cdot R \cdot AC \cdot C^{-1} = R^{-1} / C^{-1}$$

$$\therefore A = R^{-1} \cdot C^{-1}.$$

$$= (R_1 \cdot R_2 \cdot R_3)^{-1} \cdot (C_1 \cdot C_2 \cdot C_3)^{-1}$$

$$= R_1^{-1} \cdot R_2^{-1} \cdot C_3^{-1} \cdot C_2^{-1} \cdot C_1^{-1}$$

$$= \text{சாதாரண அணிகளின் பெருக்கற் பலன்}$$

(ஏனென்றால், ஒரு சாதாரண அணியின் நேர்மாறு அணியும் சாதாரண அணிதான் 6.6)

உதாரணம் 1 :

$$\begin{bmatrix} 1 & 1 & 2 & 3 \\ 1 & 3 & 0 & 3 \\ 1 & -2 & -3 & -3 \\ 1 & 1 & 2 & 3 \end{bmatrix} \quad \text{என்ற}$$

அணிமீறல் இயல் வழியில் எழுது.

$$\begin{bmatrix} 1 & 1 & 2 & 3 \\ 1 & 3 & 0 & 3 \\ 1 & -2 & -3 & -3 \\ 1 & 1 & 2 & 3 \end{bmatrix} \sim \begin{bmatrix} 1 & 1 & 2 & 3 \\ 0 & 2 & -2 & 0 \\ 0 & -3 & -5 & -6 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

$$\because R_{21}(-1); R_{31}(-1); R_{41}(-1).$$

$$\sim \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & -2 & 0 \\ 0 & -3 & -5 & -6 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \quad \because C_{21}(-1); C_{31}(-2); C_{31}(-3).$$

$$\sim \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & -1 & 0 \\ 0 & -3 & -5 & -6 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \quad \because R_3\left(\frac{1}{2}\right)$$

$$\sim \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & -8 & -6 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \quad \because R_{33}(8)$$

$$\sim \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -8 & -4 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \quad \because C_{32}(1)$$

$$\sim \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & \frac{1}{8} \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \quad \because R_3(-\frac{1}{8})$$

$$\sim \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \quad \because C_{43}(-\frac{1}{8})$$

$$= \begin{bmatrix} I_3 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} = N$$

உதாரணம் 2 :

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 1 \\ -1 & 0 & 2 \\ 2 & 1 & -3 \end{bmatrix} \quad \text{ஆண்கள்}$$

P, Q என்னும் அணிவின் $PAQ = I_3$ என்பதற்குரியது காண்போம்.

$A = 3 \times 3$ அணி $\therefore P, Q$ உம் 3×3 அணிகள்

$A = I_3$ அல்லது AI_3 என எழுதலாம்.

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \quad A = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$$R_{21}(-1); R_{31}(-2) : A \sim \begin{bmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 0 & 2 & 2 \\ 0 & -2 & -5 \end{bmatrix}$$

$$= \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 \\ -2 & 0 & 1 \end{bmatrix} \quad A = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$$C_{21}(-2); C_{31}(-1) : A \sim \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 2 \\ 0 & -2 & -5 \end{bmatrix}$$

$$= \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 \\ -2 & 0 & 1 \end{bmatrix} \quad A = \begin{bmatrix} 1 & -2 & -1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$$R_2\left(\frac{1}{2}\right) : A \sim \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & \frac{1}{2} \\ 0 & -2 & -5 \end{bmatrix}$$

$$= \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ \frac{1}{2} & \frac{1}{2} & 0 \\ -2 & 0 & 1 \end{bmatrix} \quad A = \begin{bmatrix} 1 & -2 & -1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$$R_{22}(8) \cdot A \sim \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & \frac{1}{2} \\ 0 & 0 & -\frac{1}{2} \end{bmatrix}$$

$$= \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ \frac{1}{2} & \frac{1}{2} & 0 \\ -\frac{1}{2} & \frac{3}{2} & 1 \end{bmatrix} A \begin{bmatrix} 1 & -2 & -1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$$C_{22}(-\frac{1}{2}) \cdot A \sim \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & -\frac{1}{2} \end{bmatrix}$$

$$= \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ \frac{1}{2} & \frac{1}{2} & 0 \\ -\frac{1}{2} & \frac{3}{2} & 1 \end{bmatrix} A \begin{bmatrix} 1 & -2 & 2 \\ 0 & 1 & -\frac{1}{2} \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$$R_3(-2) \cdot A \sim \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} = I_3$$

$$= \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ \frac{1}{2} & \frac{1}{2} & 0 \\ 1 & -2 & -2 \end{bmatrix} A \begin{bmatrix} 1 & -2 & 2 \\ 0 & 1 & -\frac{1}{2} \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$$\therefore P = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ \frac{1}{2} & \frac{1}{2} & 0 \\ 1 & -2 & -2 \end{bmatrix}; Q = \begin{bmatrix} 1 & -2 & 2 \\ 0 & 1 & -\frac{1}{2} \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

என்கிறதால் :

$$\begin{aligned}
 A Q &= \begin{bmatrix} 1 & 2 & 1 \\ -1 & 0 & 2 \\ 2 & 1 & -3 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & -2 & 2 \\ 0 & 1 & -\frac{1}{2} \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \\
 &= \begin{bmatrix} 1+0+0 & -2+2+0 & 2-2+1 \\ -1+0+0 & 2+0+0 & -2+0+2 \\ 2+0+0 & -4+1+0 & 4-\frac{1}{2}-3 \end{bmatrix} \\
 &= \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ -1 & 2 & 0 \\ 2 & -3 & -\frac{1}{2} \end{bmatrix} \\
 \therefore P A Q &= \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ \frac{1}{2} & \frac{1}{2} & 0 \\ 1 & -2 & -2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ -1 & 2 & 0 \\ 2 & -3 & -\frac{1}{2} \end{bmatrix} \\
 &= \begin{bmatrix} 1+0+0 & 0+0+0 & 0+0+0 \\ \frac{1}{2}-\frac{1}{2}+0 & 0+1+0 & 0+0+0 \\ 1+2-4 & 0+6+6 & 0+0+1 \end{bmatrix} \\
 &= \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} = I_3
 \end{aligned}$$

உதாரணம் 3 :

$$A = \begin{bmatrix} 8 & 2 & 1 & 5 \\ 6 & 1 & 4 & 2 \\ 1 & 4 & 6 & 0 \end{bmatrix} \quad \text{ஆகும்.}$$

A ஐ அதன் இயல் வடிவத்தில் எழுது. P, Q ஐ $PAQ = N$ என இருக்கும்படி கண்டுபிடி.

$A=3 \times 4$ அணி. $\therefore P=3 \times 3$ அணி. $Q=4 \times 4$ அணி.

$$A = \begin{bmatrix} 3 & 2 & 1 & 5 \\ 5 & 1 & 4 & 2 \\ 1 & 4 & 6 & 0 \end{bmatrix}$$

$$= \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 3 & 2 & 1 & 5 \\ 5 & 1 & 4 & 2 \\ 1 & 4 & 6 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$$A \sim \begin{bmatrix} 1 & 4 & 6 & 0 \\ 5 & 1 & 4 & 2 \\ 3 & 2 & 1 & 5 \end{bmatrix} \quad \because R_{13}$$

$$= \begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \end{bmatrix} A \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$$A \sim \begin{bmatrix} 1 & 4 & 6 & 0 \\ 0 & -19 & -25 & 2 \\ 0 & -10 & -17 & 5 \end{bmatrix} \quad \because \begin{matrix} R_{21}(-5) \\ R_{31}(-3) \end{matrix}$$

$$= \begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & -5 \\ 1 & 0 & -3 \end{bmatrix} A \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$$A \sim \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -19 & -26 & 2 \\ 0 & -10 & -17 & 5 \end{bmatrix} \quad \begin{array}{l} \because C_{21}(-4); \\ C_{31}(-6) \end{array}$$

$$= \begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & -5 \\ 1 & 0 & -8 \end{bmatrix} A \begin{bmatrix} 1 & -4 & -6 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$$A \sim \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 7 & -26 & 2 \\ 0 & 7 & -17 & 5 \end{bmatrix}$$

$$= \begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & -5 \\ 1 & 0 & -8 \end{bmatrix} A \begin{bmatrix} 1 & 2 & -8 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$$A \sim \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & -26 & 2 \\ 0 & 1 & -17 & 5 \end{bmatrix}$$

$$= \begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & -5 \\ 1 & 0 & -8 \end{bmatrix} A \begin{bmatrix} 1 & \frac{1}{2} & -8 & 0 \\ 0 & \frac{1}{2} & 0 & 0 \\ 0 & -\frac{1}{2} & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$$A \sim \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & -26 & 2 \\ 0 & 0 & 2 & 2 \end{bmatrix}$$

$$= \begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & -5 \\ 1 & -1 & 2 \end{bmatrix} A \begin{bmatrix} 1 & \frac{3}{2} & -8 & 0 \\ 0 & \frac{1}{2} & 0 & 0 \\ 0 & -\frac{1}{2} & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$$A \sim \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 2 & 2 \end{bmatrix}$$

$$= \begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & -5 \\ 1 & -1 & 2 \end{bmatrix} A \begin{bmatrix} 1 & \frac{3}{2} & \frac{19}{2} & -\frac{3}{2} \\ 0 & \frac{1}{2} & \frac{25}{2} & -\frac{3}{2} \\ 0 & -\frac{1}{2} & -\frac{13}{2} & \frac{3}{2} \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$$A \sim \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 2 \end{bmatrix}$$

$$= \begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & -5 \\ 1 & -1 & 2 \end{bmatrix} A \begin{bmatrix} 1 & \frac{3}{2} & \frac{19}{2} & -\frac{3}{2} \\ 0 & \frac{1}{2} & \frac{25}{2} & -\frac{3}{2} \\ 0 & -\frac{1}{2} & -\frac{13}{2} & \frac{3}{2} \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$$A \sim \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{bmatrix} = [I_3 \quad 0] = N$$

$$= \begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & -5 \\ 1 & -1 & 2 \end{bmatrix} \quad A = \begin{bmatrix} 1 & \frac{1}{2} & \frac{19}{2} & -\frac{11}{2} \\ 0 & \frac{1}{2} & \frac{11}{2} & -\frac{11}{2} \\ 0 & -\frac{1}{2} & -\frac{11}{2} & \frac{11}{2} \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$$\therefore P = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & -5 \\ 1 & -1 & 2 \end{bmatrix}; Q = \begin{bmatrix} 1 & \frac{1}{2} & \frac{19}{2} & -\frac{11}{2} \\ 0 & \frac{1}{2} & \frac{11}{2} & -\frac{11}{2} \\ 0 & -\frac{1}{2} & -\frac{11}{2} & \frac{11}{2} \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

இதைச் சரிபார்க்க, முதலில் PA ஐக் கண்டுபிடித்து, பின் PAQ ஐக் கண்டுபிடிப்பது எளிதானதும்.

பயிற்சி 6

1. கீழ்க்கரும் தீர்வு மாதிரிகளைக் கீழ்க்கண்ட அணிகளில் மூன்றடிய செவ்வு, கடைசியில் கிடைக்கும் அணிகள் A, B என தருகி.

- (i) $R_2(2)$ (ii) R_{14} (iii) $R_{24}(-2)$ (iv) $R_{24}(2)$
(v) R_{41} (vi) $R_2(\frac{1}{2})$.

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ -2 & 1 & 0 & 3 \\ 1 & 2 & 1 & -1 \\ 2 & 1 & 3 & 5 \end{bmatrix}; B = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \\ 7 & 8 & 9 \\ 0 & 1 & 2 \end{bmatrix}$$

2. பின்வரும் நிரல் மாற்றங்களை முதல் நேர்வீழில் உள்ள அணிகளில் முதற்படிச் செய்து கடைசியில் கிடைக்கும் அணிகள் A, B என நிறுதி.

- (i) $C_2 (-2)$; (ii) $C_{23} (2)$ (iii) C_{12} (iv) C_{12}
(v) $C_{23} (-2)$ (vi) $C_3 (-\frac{1}{2})$.

3. முதல் இரண்டு விலுக்களில் கடைசியில் A, B கிடைக்க காரணம் என்ன?

4. பின்வரும் 3-சதுர சாதாரண அணிகளை எழுது. பின்பு, அவற்றின் நேரெதிர் அணிகளைக் கண்டுபிடி.

- (i) $R_{22} \cdot R_{12} (-1) \cdot R_2 (-2) \cdot I_3$.
(ii) $C_{12} \cdot C_{13} (-1) \cdot C_2 (-2) \cdot I_3$
(iii) $R_{12} \cdot C_{12} \cdot C_1 (3) \cdot R_{12} (2) \cdot I_3$.

5. பின்வரும் 4-சதுர அணிகளின் நேரெதிர் அணிகளை உடனே (அந்த அணிகளைக் கண்டுபிடிக்காமலேயே) எழுது.

- (i) $R_{12} (-4)$; $R_4 (2)$; R_{23}
(ii) C_{12} ; $C_{13} (1)$; $C_1 (2)$.

6. பின்வரும் அணிகளின் நேரெதிர் அணிகளைக் கண்டுபிடி.

$$(i) \begin{bmatrix} 1 & 0 & -1 \\ 8 & 4 & 5 \\ 0 & -3 & -7 \end{bmatrix}; \text{ (கிடை } \begin{bmatrix} 10 & 10 & \frac{1}{2} \\ 30 & -10 & -\frac{2}{5} \\ -10 & 10 & \frac{1}{2} \end{bmatrix})$$

$$(ii) \begin{bmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 8 & 2 & 3 \\ 1 & 1 & 2 \end{bmatrix}; \text{ (கிடை } \begin{bmatrix} -\frac{1}{2} & \frac{3}{2} & 0 \\ \frac{3}{2} & -\frac{1}{2} & 0 \\ -\frac{1}{2} & -\frac{1}{2} & 1 \end{bmatrix})$$

$$(iii) \begin{bmatrix} 0 & 1 & 2 & 2 \\ 1 & 1 & 2 & 3 \\ 2 & 2 & 2 & 3 \\ 3 & 3 & 3 & 3 \end{bmatrix} : (\text{விடை} \begin{bmatrix} -1 & 1 & -1 & 1 \\ 1 & -2 & 2 & -3 \\ 0 & 1 & -2 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & -\frac{1}{2} \end{bmatrix})$$

$$(iv) \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 & 1 \\ 1 & 3 & 3 & 2 \\ 2 & 4 & 3 & 3 \\ 1 & 1 & 1 & 1 \end{bmatrix} : (\text{விடை} \begin{bmatrix} 1 & -2 & 1 & 0 \\ 1 & -2 & 2 & -3 \\ 0 & 1 & -1 & 1 \\ -2 & 3 & -2 & -3 \end{bmatrix})$$

$$(v) \begin{bmatrix} -1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & -1 \\ 1 & 1 & 5 & 1 \\ 1 & -1 & 1 & 1 \end{bmatrix} : (\text{விடை} \begin{bmatrix} 2 & 4 & -2 & 4 \\ 4 & 4 & -2 & 2 \\ -2 & -2 & 2 & -2 \\ -4 & 2 & -2 & 4 \end{bmatrix})$$

7. கீழ்க்கண்ட n -சதுர சாதாரண அணிகளில் எத்த ஜோடிவை எடுத்தாலும் அவை பரிமாற்று அணிகளாக இருக்கும் என திருவி.

$$R_{21}(k_1); R_{21}(k_2); \dots; R_{21}(k_{n-1})$$

8. கீழ்க்கண்ட அணிகளின் தலைமை வடிவங்களைக் கண்டுபிடி.

$$(i) \begin{bmatrix} 1 & -1 & 2 & 3 \\ 1 & 3 & 0 & 3 \\ 1 & -2 & -3 & -3 \\ 1 & 1 & 2 & 3 \end{bmatrix} \quad (ii) \begin{bmatrix} 1 & -1 & 2 & -3 \\ 4 & 1 & 0 & 2 \\ 0 & 3 & 0 & 4 \\ 0 & 1 & 0 & 2 \end{bmatrix}$$

$$(iii) \begin{bmatrix} 1 & -1 & 3 & 6 \\ 1 & 3 & -3 & -4 \\ 4 & 3 & 0 & 7 \end{bmatrix} \quad (iv) \begin{bmatrix} 3 & 2 & -1 & 5 \\ 5 & 1 & 4 & -2 \\ 12 & 1 & 13 & -11 \end{bmatrix}$$

9. 8-ஆம் கோவிலில் உள்ள அணிகளின் இயல் வடிவத்தைக் காட்டுகிடி.

10. $A \sim B$ ஆக இருந்தால்,

$$B = P_n P_{n-1} \dots P_1 A Q_1 Q_2 \dots Q_n \text{ என நிரூபி.}$$

11. P, Q என்னும் அணிகளை PAQ இயல் வடிவில் இருக்கும் படி காட்டுகிடி.

$$(i) A = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 2 \\ 1 & 2 & 3 \\ 0 & -1 & -1 \end{bmatrix}; (ii) A = \begin{bmatrix} 3 & 2 & -1 & 5 \\ 5 & 1 & 4 & -2 \\ 1 & -4 & 11 & -19 \end{bmatrix}$$

$$(iii) \begin{bmatrix} 3 & 3 & -3 \\ -1 & 2 & 2 \end{bmatrix}$$

12. பின்வரும் அணிகளைச் சாதாரண அணிகளின் பெருக்கற் பலனாக எழுது.

$$(i) \begin{bmatrix} 1 & 3 & 3 \\ 1 & 4 & 3 \\ 1 & 3 & 4 \end{bmatrix}; (ii) \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 & 1 \\ 1 & 3 & 3 & 2 \\ 2 & 4 & 3 & 3 \\ 3 & 5 & 4 & 4 \end{bmatrix}$$

$$(iii) \begin{bmatrix} 2 & 1 & -1 & 2 \\ 3 & 4 & 1 & -1 \\ -1 & 2 & 1 & -1 \\ 1 & -1 & 0 & 3 \end{bmatrix}; (iv) \begin{bmatrix} 0 & 1 & 2 & 2 \\ 1 & 1 & 2 & 3 \\ 2 & 2 & 2 & 3 \\ 2 & 3 & 3 & 3 \end{bmatrix}$$

விடைகள்

$$11. (i) P = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ -1 & 1 & 0 \\ -1 & 1 & 1 \end{bmatrix}; Q = \begin{bmatrix} 1 & -1 & -1 \\ 0 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$$(ii) \quad P = \begin{bmatrix} -1 & 0 & 0 \\ 4 & 1 & 0 \\ 2 & -2 & 1 \end{bmatrix}; \quad Q = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & \frac{1}{2} & -\frac{1}{2} & -2 \\ 1 & \frac{3}{2} & -\frac{1}{2} & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$$(iii) \quad P = \begin{bmatrix} \frac{1}{2} & 0 \\ \frac{1}{2} & \frac{1}{2} \end{bmatrix}; \quad Q = \begin{bmatrix} 1 & -1 & 2 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

7. அணியின் அளவை

(Rank of a Matrix)

7-1. ஒர் அணியின் சிற்றணிக் கோவைகள் :

A என்பது ஒரு $m \times n$ அணிவாக இருக்கட்டும். இதில் குறியிட்ட r நிரல்களிலும், r நிரல்களிலும் உள்ள உறுப்புகளைத் தவிர பீதி உறுப்புகளை நீக்கி விடுவோம். [இந்த உறுப்புகள் குறிக் கப்பட்ட நிரல்களிலும் இருக்கவேண்டும்; நிரல்களிலும் இருக்க வேண்டும்.] அப்படியானால் நமக்கு ஒரு r -சதுர அணி கிடைக்கும். இந்த அணிக் கோவையை A -ன் சிற்றணிக் கோவை என்று சொல்வோம். இதன் தரம் r .

இவ்வாறு நோக்குமிடத்து, A -ன் ஒவ்வொரு உறுப்பையும் A -ன் 1 தரமுள்ள சிற்றணிக் கோவை என்று சொல்வோம்.

உதாரணம் 1 :

$$\begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \\ 7 & 8 & 9 \end{bmatrix} \text{ என்ற அணியில் } \begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \\ 7 & 8 & 9 \end{vmatrix} \text{ -ஐயே}$$

8ஆம் தரமுள்ள சிற்றணிக் கோவை எனலாம். $\begin{vmatrix} 4 & 5 \\ 7 & 8 \end{vmatrix}$ என்பது

2ஆம் தரமுள்ள சிற்றணிக் கோவை. 1, 2, ..., 9 என்பவை முழுவதர சிற்றணிக் கோவைகள்.

$$\text{உதாரணம் 2 : } \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 5 & 6 & 7 & 8 \\ 9 & 10 & 11 & 12 \end{bmatrix} \text{ என்ற அணியின்}$$

எல்லாச் சிற்றணிக் கோவைகளையும் எழுது.

கொடுக்கப்பட்ட அணியின் வகை 3×4

∴ தவக்குக கிடைக்கக் கூடிய பெரிய சிற்றணிக் கோவைவின் தரம் 3. இவ்வாறு 4_{C_3} சிற்றணிகள் உண்டு. அதாவது

1	2	3	:	1	2	4	:	1	2	3	:	1	2	4	:
5	6	7	:	5	6	8	:	5	6	7	:	5	6	8	:
9	10	11	:	9	10	12	:	9	10	11	:	9	10	12	:
1	3	4	:	2	3	4	:	1	3	4	:	2	3	4	:
5	7	8	:	6	7	8	:	5	7	8	:	6	7	8	:
9	11	12	:	10	11	12	:	9	11	12	:	10	11	12	:

இனி, 2×2 சிற்றணிகள் $3_{C_2} \times 4_{C_2} = 18$ உண்டு.

நாம் முதலிரண்டு நிரல்களை மட்டும் எடுத்துக்கொண்டு 6 சிற்றணிகளை எடுத்துக் காட்டுவோம்.

1	2	:	1	3	:	1	4	:
5	6	:	5	7	:	5	8	:
2	3	:	2	4	:	3	4	:
6	7	:	6	8	:	7	8	:

இதேவிதமாய் முதல், மூன்றாம் நிரல்களிலிருந்து மத்தோர் 6 சிற்றணிகளும், இரண்டாம் மூன்றாம் நிரல்களிலிருந்து 6 சிற்றணிகளும் பெறலாம். முதல்தரச் சிற்றணிகள்

$3_{C_1} \times 4_{C_1} = 12$. இவையாவன 1, 2, ..., 12

7-2. ஓர் அணியின் அளவை : ஓர் அணியில் அந்த அணியுடன் சம்பந்தப்பட்ட ஒரு தேர்வு எண். கொடுக்கப்பட்ட A என்ற அணியில்,

(i) ஒரு r -சதுர சிற்றணிக் கோவைவாவது பூச்சியத்திலிருந்து வேறுபட்டிருக்க வேண்டும்;

(ii) ஒவ்வொரு $(r+1)$ சதுர சிற்றணிக் கோவைவும் பூச்சியமாக இருக்கவேண்டும்;

என்ற இரு திபத்தணைகளையும் பூர்த்தி செய்தால் அதன் அளவை அல்லது மதிப்பிடும் r என வரையறை செய்வோம்.

• இதை $\rho(A) = r$ என எழுதுவோம்.

இதிலிருந்து பூர்விய அணியின் அளவை, பூர்வியம் என்ற வரையறை செய்வது பொருத்தமானது என்பது விளங்கும்.

A என்ற n -சதுர அணி, $|A| \neq 0$ என்றவாறு இருத்தால் அதன் அளவை n ஆக இருக்கவேண்டும். அதாவது $\rho(A) = n$.

குறிப்பு: ஒவ்வொரு $(r+1)$ சதுர சிற்றணியும் பூர்வியமாக இருத்தால், ஒவ்வொரு $(r+2)$ சதுர சிற்றணியும் பூர்வியமாக இருக்கவேண்டும். ஏனென்றால் ஒரு $(r+2)$ சதுர அணியை முதல் நிரையிலுள்ள வீரித்து எழுதியால், ஒவ்வொரு இரண்டு காரணி (co-factor) யும் $(r+1)$ சதுர சிற்றணியாக இருப்பதால் பூர்வியமாகும். ஆகவே அந்த அணிக்கோவைகளும் பூர்வியமாகும்.

ஆதலால், ஒர் அணியின் அளவை r ஆனால் அதன் மிகப் பெரிய பூர்வியமில் சிற்றணிக்கோவைகளின் தரம் r ஆக இருக்க வேண்டும் என்று சொல்வாம்.

பார்க்கை : ஒவ்வொரு $(r+1)$ சதுர அணியும் பூர்வியமாகாது r -சதுர சிற்றணி பூர்வியமாக இருக்க வேண்டியதில்லை. பின்வரும் உதாரணத்தைப் பார்க்கவும்.

$$\begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 1 & 2 & 4 \\ 1 & 2 & 5 \end{vmatrix} = 0 \quad \text{ஆனால்} \quad \begin{vmatrix} 2 & 3 \\ 2 & 4 \end{vmatrix} \neq 0.$$

உதாரணம் :

$$\begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 2 & 3 & 5 & 2 \\ 1 & 3 & 4 & 10 \end{bmatrix} \quad \text{என்ற அணியின் அளவைவைக்}$$

கண்டுபிடி.

இது ஒரு பூர்விய அணி அல்ல. ஆகவே, இதன் அளவை > 1 ஆக இருக்கவேண்டும். இது ஒரு 3×4 அணி. $\therefore$ இதன் மிகப் பெரிய சிற்றணிக் கோவை 3×3 தரமுடையது.

∴ இதன் மதிப்பீடம் < 8

$$\text{மேலும் இந்த அணியைப் பார்த்தவுடன் } \begin{vmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 3 \end{vmatrix} \neq 0.$$

எனத் தெரிகிறது. எனவே இதன் மதிப்பீடம் > 2 ஆக இருக்க வேண்டும்.

∴ இதில் இருக்கக்கூடிய d_{c_1} , 3 சதுர அணிகளும் பூச்சியமான இல்லையா என்று பார்க்க வேண்டும்.

$$\begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 3 & 5 \\ 1 & 3 & 4 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 2 & 3 & 3 \\ 1 & 1 & 1 \end{vmatrix} = 0$$

$$\begin{vmatrix} 1 & 2 & 4 \\ 2 & 3 & 2 \\ 1 & 3 & 10 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 1 & 2 & 4 \\ 3 & 5 & 12 \\ 1 & 3 & 10 \end{vmatrix} = 3 \begin{vmatrix} 1 & 2 & 4 \\ 1 & 3 & 4 \\ 1 & 3 & 10 \end{vmatrix} = 0$$

$$\begin{vmatrix} 1 & 3 & 4 \\ 2 & 5 & 4 \\ 1 & 4 & 10 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 1 & 3 & 4 \\ 2 & 5 & 2 \\ 4 & 12 & 16 \end{vmatrix} = 4 \begin{vmatrix} 1 & 3 & 4 \\ 2 & 5 & 2 \\ 1 & 3 & 4 \end{vmatrix} = 0$$

கடைசியாக,

$$\begin{vmatrix} 2 & 3 & 4 \\ 3 & 5 & 2 \\ 3 & 4 & 10 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 2 & 3 & 4 \\ 3 & 5 & 2 \\ 5 & 12 & 16 \end{vmatrix} = 4 \begin{vmatrix} 2 & 3 & 4 \\ 3 & 5 & 2 \\ 2 & 3 & 4 \end{vmatrix} = 0$$

∴ இதன் மதிப்பீடம் அல்லது அளவை 2. இந்த மூன்றாவில் ஒரு பெரிய அணியின் மதிப்பீடத்தைக் கண்டுபிடிப்பது 'கம்ப்யூட்டர்' உதவியாக கடைசி சிரமமானது ஆகும். ஆகவே, ஓர் எளிய முறையைக் கையாளுவதற்கு ஏதுவாகப் பின்வரும் தேற்றத்தை நினைப்போம்.

7.3. தேற்றம் : சாதாரண நினைவு அல்லது நினைவு மாற்றங்கள் ஓர் அணியின் அளவைவளம் பாதிக்காது.

(i) முதலாவதாக "இரு நினைவுகள் இடமாற்றி அமைப்பதால் ஓர் அணியின் அளவை அல்லது மதிப்பிடம் மாறுது" என நிரூபிப்போம்.

A என்பது கொடுக்கப்பட்ட அணியாக இருக்கட்டும். இதன் மதிப்பிடம் r எனக் கொள்வோம். இரு நினைவுகள் இடமாற்றியின் கிடைக்கும் அணி B ஆக இருக்கட்டும். இதன் மதிப்பிடம் r' ஆக இருக்கட்டும். $r=r'$ என நிரூபிக்க வேண்டும்.

B -ல் உள்ள $|B_0|$ என்ற $(r+1)$ தரச் சிற்றணிக் கோவைகள் எடுத்துக் கொள்வோம். இதன் நினைவுகள் A -ல் உள்ள நினைவுகள் தாம். ஒருகால், இரு நினைவுகள் இடமாற்றியிருக்கலாம். இத்தகைய இடமாற்றம் ஓர் அணிக்கோவையின் குறையை (sign) மாட்டுமே மாற்றம்.

ஆகவே,

$|B_0| = |A_0|$ அல்லது $|B_0| = -|A_0|$ ஆக இருக்க வேண்டும். ஆனால் A -ன் மதிப்பிடம் r . $\therefore (r+1)$ நினைவுள்ள A_0 என்ற சிற்றணிக் கோவையின் மதிப்பு $|A_0| = 0$ ஆக இருக்க வேண்டும்.

$\therefore |B_0| = 0$. அதாவது, ஒவ்வொரு $(r+1)$ நினைவுள்ள B_0 என்ற சிற்றணிக் கோவையின் மதிப்பு $|B_0| = 0$.

$\therefore B$ -ன் மதிப்பிடமான $r' < r$. (1)

இப்பொழுது, A -ஐ B -யிலிருந்து 2 நினைவுகள் இடமாற்றியதால் கிடைத்த அணியாகக் கருதலாம். $\therefore r < r' \dots$ (2)

(1), (2)-ல் இருந்து $r = r'$.

இரண்டாவதாக, (ii) "ஒரு நினைவிலுள்ள உறுப்புகளை $k (\neq 0)$ என்னும் எண்ணியால் பெருக்கினால் அந்த அணியின் மதிப்பிடம் மாறுது."

A என்ற அணியின் மதிப்பிடம் r ஆக இருக்கட்டும். A -ல் உள்ள ஒரு நினைவை k ஆல் பெருக்கியதால் கிடைக்கும் அணி B ஆகவும், இதன் மதிப்பிடம் r' ஆகவும் இருக்கட்டும். $r=r'$ என நிரூபிப்போம். B -ல் உள்ள ஏதாவது ஒரு $(r+1)$ சிற்றணிக் கோவை $|B_0|$ ஐ எடுத்துக் கொள்வோம். இதற்கு இணைவாக

A -ல் $|A_0|$ இருக்கும். தாம் k ஆம் பெருக்கிய திரை இந்த அணிக்கோவையின் இயல்வாழிடமாக $|B_0| = |A_0|$ ஆகவும்; k ஆம் பெருக்கிய திரை இதில் இருத்தால் $|B_0| = k |A_0|$ ஆகவும் இருக்கும். A -ன் மதிப்பிடம் r ஆனதால் $|A_0| = 0$ ஆக இருக்கவேண்டும். $\therefore |B_0| = 0$

$$\therefore r' < r \quad \dots \quad \dots \quad \dots \quad (1)$$

மேலும், A -ல், B -ல் இருந்து ஒரு திரையை $\frac{1}{k}$ ஆம் பெருக்கிக் கிடைத்ததாகக் கருதலாம்.

$$\therefore r < r' \quad \dots \quad \dots \quad \dots \quad (2)$$

(1), (2)-ல் இருந்து $r = r'$

மூன்றாவதாக, (iii) ஓர் அணியில் ஒரு திரையிலுள்ள உறுப்புகளுடன் மற்றொரு திரையிலுள்ள இணைத்த உறுப்புகளை k ஆம் பெருக்கிக் கூட்டினால் அதன் மதிப்பிடம் மாறாது.

A என்பதன் மதிப்பிடம் r எனக் கொள்க. A -ல் உள்ள i ஆவது திரையின் உறுப்புகளோடு மற்றோர் திரையான j -ன் இணைத்த உறுப்புகளை k ஆம் பெருக்கிக் கூட்டியதால் கிடைத்த அணி B ஆகவும், B -ன் மதிப்பிடம் r' ஆகவும் இருக்கட்டும். $r = r'$ என நிரூபிப்போம்.

B -ல் உள்ள $(r+1)$ தரச் சிற்றணிக் கோவையான $|B_0|$ ஐவும், அதற்குரிய A -ல் உள்ள சிற்றணிக்கோவையான $|A_0|$ ஐவும் கவனி.

முதல் வகை :

$$i \text{ ஆவது திரை } A_0\text{-ல் இயல்வாழிடம் } |B_0| = |A_0| \quad \dots \quad (1)$$

இரண்டாம் வகை :

i ஆவது திரையின் பகுதி A_0 -ல் இருந்து, j ஆவது திரையின் பகுதி A_0 -ல் இயல்வாழிடமாக $|B_0| = |A_0| + k |C_0|$. இதில் C_0 என்பதும் A -ல் உள்ள $(r+1)$ தரச் சிற்றணிக் கோவை.

$$\therefore |C_0| = 0 \quad \therefore |B_0| = |A_0| \quad \dots \quad (2)$$

மூன்றாம் வகை :

i ஆவது நிரையின் பகுதியும், j ஆவது நிரையின் பகுதியும் A -ல் இருந்தால்,

$$|B_0| = |A_0| + k |D_0|$$

$|D_0| = 0$ $|i$ ஆவது j ஆவது நிரைகள் சமமாயிருப்பதால்,

$$|D_0| = 0 \quad \therefore |B_0| = A_0 \quad \dots \quad \dots \quad \dots \quad (8)$$

ஆனால் $(r+1)$ சிற்றணிக் கோவை $|A_0| = 0$

$$\therefore A\text{-ன் மதிப்பிடும் } r \quad \therefore |B_0| = 0$$

$$\therefore r < r'$$

A ஐ B -ல் உள்ள i ஆவது நிரையிலுள்ள உறுப்புகளோடு j ஆவது நிரையிலுள்ள இசைந்த உறுப்புகளை k ஆல் பெருக்கிக் கிடைத்ததாகக் கருதலாம்.

$$\therefore r < r'$$

$$\therefore r = r'$$

இதே விதமாக மூன்று வகையான நிரல் மாற்றங்களும் ஓர் அணிமீள் அளவையை அடங்கு மதிப்பிடத்தை மாற்றது என நிரூபிக்கலாம்.

7.4. கீழ்க்கேற்றம் : (i) சாதாரண அணிகளால் ஓர் அளவையை மூன் பெருக்கினாலும், மீள் பெருக்கினாலும் அந்த அணிமீள் அளவை மாறாது.

ஏனென்றால், இவை மூன்றையே ஒரு நிரை மாற்றத்தையும், நிரல் மாற்றத்தையுமே ஏற்படுத்துகின்றன.

கீழ்க்கேற்றம் : (ii) ஓர் அணிமீள் அளவை அதனை ஓர் ஒழுங்கணிவால் பெருக்கினால் மாறாது.

அதாவது P ஓர் ஒழுங்கணியானால்,

$$P(PA) = P(A)$$

ஏனெனில், எந்த ஒழுங்கணியையும் சாதாரண அணிகளின் பெருக்கற் பலனாக எடுத்த இயலும். 8.18 (ii).

இதே விதமாக, Q ஓர் ஒழுங்கணிவாளும் $p(AQ) = p(A)$ என திருப்திக்கலாம்.

உதாரணம் 1 :

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 2 & 3 & 5 & 2 \\ 1 & 3 & 4 & 10 \end{bmatrix} \quad \text{என்ற அணியின் மதிப்பிடத்தக்க}$$

கண்டுபிடி.

$H_{3,1}(1)$ இரண்டாம் திரையை (1 ஆம் பெருக்கி) மூன்றாம் திரையுடன் கூட்டுவோம்.

$$\begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 2 & 3 & 5 & 2 \\ 3 & 5 & 7 & 12 \end{bmatrix}$$

$H_{3,1}(-2)$. முதல் திரையை (-2) ஆக பெருக்கி, மூன்றாம் திரையுடன் கூட்டுவோம்.

$$\begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 2 & 3 & 5 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

$$\text{இதில் } \begin{vmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 3 \end{vmatrix} = -1 \neq 0$$

$\therefore$ இதன் மதிப்பிடம் 2; அதாவது $p(A) = 2$.

உதாரணம் 2 :

$$A = \begin{bmatrix} 5 & 2 & 2 & 3 & 1 \\ 5 & 2 & 3 & 3 & 0 \\ 16 & 3 & 4 & 6 & 4 \\ 11 & 1 & 1 & 4 & 6 \end{bmatrix} \quad \text{ஆனால் } p(A) \text{ ஐக் கண்டுபிடி.}$$

$$A \sim \begin{bmatrix} 1 & 2 & 2 & 2 & 5 \\ 0 & 2 & 2 & 2 & 5 \\ 4 & 2 & 4 & 6 & 15 \\ 6 & 1 & 1 & 4 & 11 \end{bmatrix} \quad C_{12}$$

$$\sim \begin{bmatrix} 1 & 2 & 2 & 2 & 5 \\ 0 & 2 & 2 & 2 & 5 \\ 0 & -5 & -4 & -6 & -5 \\ 0 & -11 & -11 & -14 & -19 \end{bmatrix} \quad \begin{matrix} R_{31}(-4); \\ R_{41}(-6). \end{matrix}$$

$$\sim \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 2 & 2 & 5 \\ 0 & -5 & -4 & -6 & -5 \\ 0 & -11 & -11 & -14 & -19 \end{bmatrix} \quad \begin{matrix} C_{31}(-2); \\ C_{31}(-2); \\ C_{41}(-2); \\ C_{41}(-5). \end{matrix}$$

$$\sim \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 1 & -4 \\ 0 & -5 & -4 & -6 & -5 \\ 0 & -11 & -11 & -14 & -19 \end{bmatrix} \quad R_{22}(-2); R_{34}(1)$$

$$\sim \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 1 & -4 \\ 0 & 0 & -4 & -1 & -25 \\ 0 & 0 & -11 & -8 & -33 \end{bmatrix} \quad R_{32}(5); R_{42}(11)$$

$$\sim \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -4 & -1 & -25 \\ 0 & 0 & -11 & -8 & -33 \end{bmatrix} \quad C_{42}(-1); C_{42}(4)$$

$$\sim \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 12 \\ 0 & 0 & -11 & -8 & -69 \end{bmatrix} R_4(-8); R_{43}(1).$$

$$\sim \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 12 \\ 0 & 0 & 0 & -8 & 69 \end{bmatrix} R_{43}(11)$$

$$\sim \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & -28 \end{bmatrix} C_{43}(-12); R_4(-\frac{1}{8}).$$

$$\sim \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \end{bmatrix} C_{34}(28)$$

∴ இதன் மதிப்பிடம் 4.

அதாவது $\rho(A) = 4$

T-5. தேற்றம் (i): A என்பது ஒரு $m \times n$ அணி. $\rho(A) = r$ ஆனால், P என்பது ஒழுங்காணியை $PA = \begin{bmatrix} R \\ 0 \end{bmatrix}$ என்பதற்கானது கண்டுபிடிக்க இயலும். இதில் $R = r \times n$ அணி; $0 = (m-r) \times n$ அணி; $P = m \times m$ அணி.

தீவுபணம்: $\rho(A) = r$ (கொள்க)

6-12-ல் உள்ளது.

$$PAQ = \begin{bmatrix} I_r & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} \quad \dots \quad \dots \quad \dots \quad (1)$$

என இருக்கும் வண்ணம் P, Q என்னும் ஒழுங்குகளிகளைக் கண்டு பிடிக்கலாம். இதில் $P = P_1 \cdot P_2 \dots P_k$ ஆகவும்,

$$Q = Q_1 \cdot Q_2 \dots Q_k \text{ ஆகவும் இருக்கும்.}$$

P_i, Q_i என்பன முறையே சாதாரண நிரல், நிரல் அனிகள்.

$\therefore P, Q$ ஒழுங்குகளாக இருக்கவேண்டும்.

$$\therefore PAQ_1 Q_2 \dots Q_k = \begin{bmatrix} I_r & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}$$

$$\therefore PA \cdot Q_1 \cdot Q_2 \dots Q_k \cdot Q_k^{-1} \dots Q_1^{-1} \cdot Q_1^{-1}$$

$$= \begin{bmatrix} I_r & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} \cdot Q_k^{-1} \dots Q_2^{-1} \cdot Q_1^{-1}$$

இப்பொழுது சாதாரண அனிகளாக $\begin{bmatrix} I_r & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}$ ஐப் பின்பெறுகுவதால், கீழே உள்ள $(m-r)$ பூச்சிய நிரல்களும் மாறுது.

$$\therefore PA = \begin{bmatrix} R \\ 0 \end{bmatrix} \quad \dots \quad = \quad (2)$$

இதில் $R = r \times n$ அணி; $0 = (m-r) \times n$ அணி.

$$(1)\text{-ல் இருந்து } \rho(PAQ) = r$$

$$\therefore \rho(PAQ \cdot Q^{-1}) = r$$

ஏனெனில், ஓர் அனியின் மதிப்பிடம் அதைச் சாதாரண அனிகளால் பெறுகுவதால் மாறுது.

$Q^{-1} = Q_k^{-1} \dots Q_2^{-1} \cdot Q_1^{-1}$ என்பதில் ஒவ்வொரு அணி யும் சாதாரண நிரல் அனியின் நேரெதிர் அணியாக இருப்பதால், அநெவகைச் சாதாரண நிரல் அணியாகத்தான் இருக்கவேண்டும்.

$$\therefore \rho(PA) = r$$

$$\therefore \begin{bmatrix} R \\ 0 \end{bmatrix}\text{-ன் மதிப்பிடம்} = r.$$

$$\therefore \rho(R) = r$$

தேற்றம் (ii) : A என்பது ஒரு $m + n$ அணி. $p(A) = r$ ஆனால் Q என்ற ஒழுங்கணிவை $AQ = [S \ 0]$ என்பதற்கிணங்க, கண்டுபிடிக்க இயலும். இதில் $S = m \times r$ அணி; $0 = m \times (n-r)$ அணி; $Q = n \times n$ அணி.

$$\text{நேர்ப்பணம்: } p(A) = r \quad \dots \quad \dots \quad (\text{கொள்கை})$$

8.12-ல் உள்ளபடி.

$$PAQ = \begin{bmatrix} I_r & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} \quad \dots \quad \dots \quad (1)$$

என இருக்கும்படி, P, Q என்னும் ஒழுங்கணிகளைக் கண்டு பிடிக்கலாம். இதில் $P = P_1 \cdot P_2 \dots P_k$ ஆகவும்,

$$Q = Q_1 \cdot Q_2 \dots Q_k \text{ ஆகவும் இருக்கும்.}$$

P_k, Q_k என்பன மூன்றையே சாதாரண நிரை, நிரல் அணிகள்.

$\therefore P, Q$ ஒழுங்கணிகள் ஆக இருக்கவேண்டும்.

$$\therefore P_1 P_2 \dots P_k AQ = \begin{bmatrix} I_r & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}$$

$$\therefore P_k^{-1} \dots P_2^{-1} \cdot P_1^{-1} \cdot P_1 \cdot P_2 \dots P_k \cdot AQ$$

$$= P_k^{-1} \dots P_2^{-1} \cdot P_1^{-1} \begin{bmatrix} I_r & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}$$

இப்பொழுது, சாதாரண அணிகளால் $\begin{bmatrix} I_r & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}$ ஐ மூன் பெருக்குவதால், கவர்ப்புறம் உள்ள $(n-r)$ பூச்சிய நிரல்களும் மரபுது.

$$\therefore AQ = [S \ 0] \quad \dots \quad \dots \quad \dots \quad (2)$$

இதில் $S = m \times r$ அணி; $0 = m \times (n-r)$ அணி

$$(1)\text{-ல் இருந்து } p(PAQ) = r$$

$$\therefore p(P^{-1} PAQ) = r.$$

ஏனெனில், ஒர் அணியின் மதிப்பிடம் அதைச் சாதாரண அணிகளால் பெருக்குவதால் மாறுது.

$P^{-1} = P_1^{-1} \dots P_{s-1}^{-1} P_s^{-1}$ என்பதில் ஒவ்வொரு அணியும் சாதாரண நிரை அணியின் தேர் மூலுள் அணியாக இருப்பதால், அதே வகைச் சாதாரண நிரை அணியாகத்தான் இருக்க வேண்டும்.

$$\therefore p(AQ) = r.$$

$$\therefore [S \ 0]\text{-ன் அளவை} = r.$$

$$\therefore p(S) = r.$$

7-6. பெருக்கத் பலனின் அளவைத் தேற்றம் :

இரு அணிகளின் பெருக்கத் பலனின் அளவை அத்த அணிகளின் ஒவ்வொன்றின் அளவையை விடச் சிறியது.

அதாவது, (i) $p(AB) \leq p(A)$.

(ii) $p(AB) \leq p(B)$.

இவ்விரண்டையும் இணைத்து,

$$p(AB) \leq \text{சிறியது } (p(A), p(B))$$

$$p(AB) \leq \text{Min } (p(A), p(B))$$

என எழுதுவது வழக்கம்.

நிறுபணம்: A, B என்பன முறையே $m \times n$, $n \times p$ அணிகளாக இருக்கட்டும். இவை பெருக்க இயைந்தன என்பதைக் கவனி. மேலும், இவைகளின் மதிப்பிடல்கள் முறையே r_1, r_2 ஆக இருக்கட்டும்.

$$7-6\text{-ல் இருந்து } PA = \begin{bmatrix} R \\ 0 \end{bmatrix}$$

இதில் $R = r_1 \times n$ அணி; $0 = (m-r_1) \times n$ அணி.

$$\therefore PAB = \begin{bmatrix} R \\ 0 \end{bmatrix} B$$

$$\therefore p(PAB) = p \left\{ \begin{bmatrix} R \\ 0 \end{bmatrix} B \right\}$$

ஆகவே, $p(PAB) = p(AB)$.

ஏனெனில், ஓர் அணியின் மதிப்பிடம், அதை P என்ற ஒழுக் கணியால் பெருக்குவதால் மாறாது.

$$\therefore p(AB) = p \left\{ \begin{bmatrix} R \\ 0 \end{bmatrix} B \right\}$$

$p(AB) = r$ என இருக்கட்டும்.

அப்படியானால்,

$$p \left\{ \begin{bmatrix} R \\ 0 \end{bmatrix} B \right\} = r.$$

$\begin{bmatrix} R \\ 0 \end{bmatrix}$ -ல் கீழே உள்ள $(m-r_1)$ நிரல்கள் பூச்சிய நிரல்கள்.

$\therefore \begin{bmatrix} R \\ 0 \end{bmatrix}$ கிலேயும் $(m-r_1)$ நிரல்கள் பூச்சிய நிரல்களாக இருக்கவேண்டும்.

$$\therefore p \left\{ \begin{bmatrix} R \\ 0 \end{bmatrix} B \right\} \leq r_1$$

அதாவது, $r \leq r_1$

அதாவது, $r \leq$ முன் காரணி அணியின் மதிப்பிடம் ... (1)

[இதே விதமாக $r \leq r_2$ என நிரூபிக்கலாம்]

இப்பொழுது $p(AB) = r$

$$\therefore p(ABY) = r$$

$$\therefore p(B'A') = r.$$

ஆகவே, $r \leq$ முன் காரணி அணியின் மதிப்பிடம்... (1)-ல் இருந்து,

$$\leq p(B'')$$

$$\leq p(B)$$

$$\leq r_2 \dots \dots \dots (2)$$

$$\therefore \rho \leq \text{சிறியது } (r_1, r_2)$$

மேறு முறை :

$$PAQ = N = \begin{bmatrix} I_r & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}$$

என்ற A -ன் இயல் வடிவை எடுத்துக்கொள்.

இதில் P, Q ஒழுங்குணிகள் என்பதைக் கவனி.

$$\therefore P^{-1}PAQ \cdot Q^{-1} = P^{-1}NQ^{-1}$$

$$\therefore A = P^{-1}NQ^{-1}$$

$$\therefore AB = P^{-1}NQ^{-1} \cdot B$$

$$\therefore \rho(AB) = \rho(NQ^{-1}B) \quad \because P^{-1} \text{ ஓர் ஒழுங்குணி.}$$

இப்பொழுது $NQ^{-1}B$ -ல் முதல் r நிரைகளைத் தவிர, சீரே உள்ள $(n-r)$ நிரைகளும் பூச்சிய நிரைகளாய் இருக்கவேண்டும்.

$$\therefore \rho(AB) \leq r$$

$$\therefore \rho(AB) \leq \rho(A)$$

$$\text{இதேவிதமாக } \rho(AB) \leq \rho(B).$$

7.7. “ A என்பது ஓர் ஒழுங்கு சதுர அணியானால் AA' -ன் அளவையும் A -ன் அளவையும் ஒன்றே என நிரூபி.

$$B = AA' \text{ ஆக இருக்கட்டும்.}$$

$$\therefore \rho(B) = \rho(AA')$$

$$\therefore \rho(B) \leq \rho(A) \quad \dots \quad 7.8\text{-ல் இருந்து (1)}$$

மேலும் A ஒழுங்கு சதுர அணியாதலால் A^{-1} என்ற A -ன் அடிதழுவன் உண்டு.

$$\therefore A^{-1}B = A^{-1}AA' = A'$$

$$\therefore \rho(A') = \rho(A^{-1}B)$$

$$\rho(A) = \rho(A^{-1}B) \quad \because \rho(A) = \rho(A').$$

$$\rho(A) \leq \rho(B) \quad \dots \quad 7.8\text{-ல் இருந்து (2)}$$

(1), (2)-ல் இருந்து $\rho(A) = \rho(B) = \rho(AA')$.

7.8. திசைகளின் பந்தியின் குறியீடுகள் (Vectors and Vector Spaces)

$a_1i + a_2j + a_3k$ என்ற திசை (vector) னைப் பந்தி வரலாகக் கூறித்திருப்பார்கள். அதை (a_1, a_2, a_3) எனக் குறிப்பிடுவதையும் அறிவார்கள். இதேவிதமாக $A = (a_{11}, a_{12}, \dots, a_{1n})$ என்பதை n தர வெக்டர் அல்லது n -வெக்டர் என்றே சொல்லலாம். இதில் $(a_{11}, a_{12}, \dots, a_{1n})$ வரிசைப்படுத்தியதாகையால் இதை $1 \times n$ அணியோடு ஒத்து நோக்குவது பொருத்தும். வெக்டர்களைக் கூட்டும், வெக்டர்களின் சமத்துவம், வெக்டர்களை எண்ணியால் (scalar) பெருக்கல் முதலியவை அணிகளின் கூட்டம், சமத்துவம், எண்ணியால் பெருக்கல் ஆகியவற்றுடன் இயைத்திருப்பதாகக் கவனி. மேலும்,

$$A = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \dots & a_{2n} \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ a_{m1} & a_{m2} & \dots & a_{mn} \end{bmatrix}$$

என்ற $(m \times n)$ அணிவை $A = \begin{bmatrix} R_1 \\ R_2 \\ \vdots \\ R_m \end{bmatrix}$

என எழுதி, $R_1, R_2, \dots, R_m$ என்பவற்றை $1 \times n$ வெக்டர்களாகக் கருதுவாம்.

7.9. வெக்டர்களின் ஒருங்கித சமீபக் குழு.

$X_1, X_2, \dots, X_r$ என்ற r வெக்டர்கள் கொடுக்கப்பட்டிருக்கட்டும். எல்லாம் பூச்சியமில்லாத $k_1, k_2, \dots, k_r$ என்ற எண்ணிகளை $\sum_{i=1}^r k_i X_i = 0$ என்றவாறு காணமுடியுமாயின், $X_1, X_2, \dots, X_r$ இ

ஒரு ங்கித சமீப வெக்டர்கள் என்று கூறுவோம். $\sum_{i=1}^r k_i X_i = 0$

என்ற சமன்பாட்டில் இருந்து $k_1 = k_2 = \dots = k_r = 0$ என்ற ஒரே மூலவு கிடைக்கும்மையின் $X_1, X_2, \dots, X_r$ என்பன ஒருபடித்த சார்பற்ற வெக்டர்கள் என்று கூறுவோம்.

T-10. வெக்டர்களின் ஒருபடிக்கூட்டு வெக்டர்.

$$X = k_1 X_1 + k_2 X_2 + \dots + k_r X_r \quad (1)$$

ஆனால், X ஐ $(X_1, X_2, \dots, X_r)$ -ன் ஒருபடிக்கூட்டு வெக்டர் என்று சொல்வோம்.

குறிப்பு : இவ்வாறு இருத்தால் $X, X_1, X_2, \dots, X_r$ என்பன ஒருபடித்த சார்பு வெக்டர் குழு.

ஏனெனில் (1)-ல் இருந்து,

$$X - k_1 X_1 - k_2 X_2 - \dots - k_r X_r = 0$$

என்று தெரியும். இதில் X -ன் குணகம் $= 1 \neq 0$ என்பதைக் கவனி.

T-11. கிளைத்தேற்றம் (i) :

$X_1, X_2, \dots, X_r$ என்பன ஒருபடித்த சார்பற்ற வெக்டர் குழுவாகவும், $X, X_1, X_2, \dots, X_r$ என்பன ஒருபடித்த சார்பு வெக்டர் குழுவாகவும் இருத்தால் X ஐ $(X_1, X_2, \dots, X_r)$ -ன் ஒருபடிக்கூட்டு வெக்டராக எழுதவாம்.

கிளைத்தேற்றம் (ii) :

$(X_1, X_2, \dots, X_r)$ என்பன ஒருபடித்த சார்பு வெக்டர் குழுவானால், $(X_1, X_2, \dots, X_r, X_{r+1})$ -ல் ஒருபடித்த சார்பு வெக்டர் குழு ஆகல் வேண்டும்.

ஏனெனில் $k_1 X_1 + k_2 X_2 + \dots + k_r X_r = 0$ என்பதில் எல்லா k -களும் பூச்சியமாக என்பது கொள்கை. இப்பொழுது $k_{r+1} = 0$ ஆக எடுத்துக் கொண்டு,

$$k_1 X_1 + k_2 X_2 + \dots + k_r X_r + k_{r+1} X_{r+1} = 0$$

என்னும் சமன்பாட்டில் எல்லா k -களும் பூச்சியமாக இருக்க வேண்டியதில்லை என்பதைக் கவனி.

T-12. வெக்டர் வெளி (Vector Space)

$X_1, X_2, \dots, X_r$ என்ற வெக்டர்களை எடுத்துக் கொள்வோம்.

$k_1 X_1 + k_2 X_2 + \dots + k_r X_r$ என்ற

ஒரு டித்த கூட்டு வெக்டர்களின் குழுவை வெக்டர் வெளி என வரையறை செய்வாம். இதைவே, (i) X_1, X_2 என்பன இரு வெக்டர்களானால் $X_1 + X_2$ -ம் இத்த வெக்டர் வெளியைச் சேர்ந்ததாக இருக்கவேண்டும். மேலும் (ii) X ஒரு வெக்டரானால் kX -ம் இத்த வெக்டர் வெளியைச் சேர்ந்ததாக இருக்க வேண்டும் என்ற இரு நிபந்தனைகளைக் கூறலாம். அதாவது,

$$X_1, X_2 \in V \implies (X_1 + X_2) \in V$$

$$X \in V \implies kX \in V$$

T-13. வெக்டர் உள் வெளி :

S என்பது V_n என்பதன் பூச்சியமில் உட்குழுவாக இருக்கட்டும். மேலும்,

(i) X_1, X_2 என்பன S -ல் இருந்தால் $X_1 + X_2$ -ம் S -ல் இருக்கவேண்டும்.

(ii) X என்பது S -ல் இருந்தால் kX -ம் S -ல் இருக்க வேண்டும்.

இவ்வாறுள்ள S ஐ V_n இன் வெக்டர் உள் வெளி என்று சொல்வோம்.

V_n -ல் உள்ள குறிப்பிட்ட n -வெக்டர்களின் எம்வாறிற ஒரு டித்த கூட்டு வெக்டர்கள் S என்ற வெக்டர் உள் வெளியை திரும்பி என்று சொல்வோம்.

T-14. உள் வெளியின் அடிப்படை வெக்டர் குழு :

(i) இத்த வெக்டர்களின் ஒரு டித்த கூட்டு வெக்டர்கள் (Linear combination of basic Vectors) உள் வெளியான S ஐ திரும்ப வேண்டும்.

(ii) இத்தக் குழு ஒரு டித்த சார்பற்ற குழுவாய் இருக்க வேண்டும்.

என்ற நிபந்தனைகளுக்கிணங்க உள்ள வெக்டர்களின் குழுவை உள்வெளி அடிப்படை வெக்டர் குழு என்று சொல்வோம்.

உதாரணம்: $e_1 = (1, 0, 0); e_2 = (0, 1, 0)$ என்பது V_3 -ன் உள்வெளியான V_2 ஐ திரும்ப அடிப்படை வெக்டர் குழு.

ஒரு குழுவில் உள்ள வெக்டர்கள் ஒருபடித்த கூட்டு வெக்டர்கள், உள்வெளியான S ஐ தீர்வீனாக இதிலிருந்து ஓர் அடிப்படைக் குழுவைப் பிரித்தெடுக்க முடியும்.

தேற்றம்: ஓர் உள்வெளியை தீர்ப்பு அடிப்படை வெக்டர் குழுவில் உள்ள எண்ணிக்கை மாறுத எண்ணாகும். அதாவது $(X_1, X_2, \dots, X_n)$ $(Y_1, Y_2, \dots, Y_n)$ என்ற இரு அடிப்படைக் குழுக்கள் இருந்தால் $n = n$.

$X_1, X_2, \dots, X_i$ என்பன ஒரு படித்த சார்பற்ற வெக்டர் குழுவாக இருந்தால், இதனுடன் $X_{i+1}, X_{i+2}, \dots, X_{i+j}$ ஐச் சேர்த்து ஓர் அடிப்படைக் குழுவாக மாற்ற இயலும்.

V_n -ல் உள்ள எந்த $(n+1)$ வெக்டர்களை எடுத்துக்கொண்டாலும் அவை ஒருபடித்த சார்பு வெக்டர் குழுவாக இருக்க வேண்டும்.

7-15. வெக்டர் உள் வெளியின் பரிமாணம் :

ஒரு வெக்டர் உள் வெளியின் அடிப்படைக் குழுவில் உள்ள வெக்டர்களின் எண்ணிக்கையை அந்த உள் வெளியின் பரிமாணம் என்று வரையறை செய்வோம்.

அடிப்படைக் குழுக்களும், கூறுகளும்

$i = [1, 0, 0]$; $j = [0, 1, 0]$; $k = [0, 0, 1]$ என்ற அனகு அனிகளை V_3 -ல் அடிப்படைக் குழு என்பதை நாம் அறிவோம். ஆகவே, $V = [x, y, z]$ என்ற வெக்டரை $xi + yj + zk$ என்ற எழுத இயலும். (x, y, z) -ஐ (i, j, k) அடிப்படைக் குழுவின் சார்பான கூறுகள் (co-ordinates) என்பது பொருத்தும்.

மாஇரிக் கணக்குகள்

மாஇரீ 1: $X_1 = [2, 2]$; $X_2 = [1, 3]$;

$X_3 = [-1, -3]$ ஆனாக,

$3X_1 + 4X_2$, $X_1 - X_2 + 2X_3$ என்ற திசையிகளைக் கண்டு பிடி.

$$3X_1 = [6, 6]; \quad 4X_2 = [4, 12]$$

$$\therefore 3X_1 + 4X_2 = [10, 18]$$

$$X_1 - X_2 = [(2-1), (2-3)] = [1, -1]$$

$$2X_2 = 2[-1, -3] = [-2, -6]$$

$$\therefore X_1 - X_2 + 2X_2 = [-1, -7]$$

மாதிரி 2: $X_1 = [2, 2, -2]; X_2 = [1, 3, -1]$

$$X_3 = [-1, -3, 3]; X_4 = [3, 0, -1] \text{ ஆகும்,}$$

(i) X_1, X_2, X_3 என்பன ஒருங்கிட்டு சார்பற்ற வெக்டர் குழு என்றும்,

(ii) X_2, X_3, X_4 என்பன ஒருங்கிட்டு சார்பு வெக்டர் குழு என்றும் தீர்மானி.

(i) $k_1X_1 + k_2X_2 + k_3X_3 = 0$ என வைத்துக் கொள்வோம்.

$$k_1 [2, 2, -2] + k_2 [1, 3, -1] + k_3 [-1, -3, 3] = 0$$

$$[2k_1, 2k_1, -2k_1] + [k_2, 3k_2, -k_2] + [-k_3, -3k_3, 3k_3] = 0.$$

$$\therefore [2k_1 + k_2 - k_3, 2k_1 + 3k_2 - 3k_3, -2k_1 - k_2 + 3k_3] = 0.$$

$$\therefore 2k_1 + k_2 - k_3 = 0; \quad 2k_1 + 3k_2 - 3k_3 = 0; \\ -2k_1 - k_2 + 3k_3 = 0.$$

$$\therefore 2k_2 - 2k_3 = 0; \quad 2k_2 = 0;$$

$$\therefore k_2 = 0.$$

$$\therefore k_1 = 0.$$

$$\therefore \{X_1, X_2, X_3\} \text{ ஒரு சார்பற்ற வெக்டர் குழு.}$$

(ii) $k_2X_2 + k_3X_3 + k_4X_4 = 0$ எனக் கொள்வோம்.

$$k_2 [1, 3, -1] + k_3 [-1, -3, 3] + k_4 [3, 0, -1] = 0.$$

$$[k_2 - k_3 + 3k_4, 3k_2 - 3k_3 + 0k_4, -k_2 + 3k_3 - k_4] = 0$$

$$\therefore k_1 - k_2 + 2k_4 = 0 \quad \dots \quad (1)$$

$$2(k_1 - k_2 + 2k_4) = 0 \quad \dots \quad (2)$$

$$-k_1 + 2k_2 - k_4 = 0 \quad \dots \quad (3)$$

$$(1) + (3) \quad 2k_2 + 2k_4 = 0; \quad k_2 = -k_4$$

$$\therefore k_2 = k_1 - 2k_4 = -4k_4$$

k_4 -க்கு எந்த மதிப்பும் கொடுக்கலாம்.

$$\text{உதாரணமாக } k_4 = 1 \text{ ஆனால் } k_2 = -1; k_1 = -4$$

$$\therefore k_1, k_2, k_3 \text{ பூச்சியமல்ல.}$$

$$\therefore \{X_1, X_2, X_3\} \text{ ஒரு சார்புக் குழு ஆகும்.}$$

மாதிரி 3: $A_r = [a_{r1}, a_{r2}, a_{r3}]$, $r = 1, 2, 3$ என்ற வெக்டர்கள் ஒருபடித்த சார்பு வெக்டர் குழுவானால்,

$$\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix} = 0$$

என நினை.

A_1, A_2, A_3 என்பன ஒரு படித்த சார்புக் குழுவானால் X_1, X_2, X_3 என்ற எண்ணிகள்,

$$x_1 A_1 + x_2 A_2 + x_3 A_3 = 0. \quad \dots \quad (1)$$

எந்தவாறு இருக்கவேண்டும்.

எல்லா எண்ணிகளும் பூச்சியமாயிருக்க முடியாது.

(1)-ல் இருந்து,

$$x_1 [a_{11}, a_{12}, a_{13}] + x_2 [a_{21}, a_{22}, a_{23}] + x_3 [a_{31}, a_{32}, a_{33}] = 0.$$

$$\therefore [a_{11}x_1 + a_{21}x_2 + a_{31}x_3; a_{12}x_1 + a_{22}x_2 + a_{32}x_3; a_{13}x_1 + a_{23}x_2 + a_{33}x_3] = 0.$$

$$\therefore a_{11}x_1 + a_{21}x_2 + a_{31}x_3 = 0$$

$$a_{12}x_1 + a_{22}x_2 + a_{32}x_3 = 0$$

$$a_{13}x_1 + a_{23}x_2 + a_{33}x_3 = 0$$

இவை ஒரு படியில் சமவடித்தான சமன்பாடுகள். இவைகளின் மூலங்கள் (roots) எல்லாமே பூச்சியமில்லாமல் இருக்க

$$\therefore \begin{vmatrix} a_{11} & a_{21} & a_{31} \\ a_{12} & a_{22} & a_{32} \\ a_{13} & a_{23} & a_{33} \end{vmatrix} = 0$$

$$\therefore \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix} = 0.$$

7.16. ஓர் அணியின் நிர் அளவை (Row Rank)

A என்ற $m \times n$ அணியின் m நிரைகளையும் ஒரு n -வெக்டராகக் கருதலாம். ஏனெனில்,

$$A = \begin{bmatrix} R_1 \\ R_2 \\ \vdots \\ R_m \end{bmatrix}$$

இதில் $R_1 = [a_{11}, a_{12}, \dots, a_{1n}]$ என்ற n -வெக்டர். இத்த m -நிரைகளால் திரும்பப்படும் V_n என்பதன் உள் வெளிக்கு நிர் வெளி (Row space) என்பது பெயர்.

இத்த நிர் வெளியின் பரிமாணமே (Dimension) இதன் நிர் அளவை (Row rank) ஆகும்.

இதே விதமாக நிரல் வெளியையும் (Column space), நிரல் அளவையும் (Column rank) வரையறுக்கலாம்.

7-17. தேற்றம்: ஓர் அணியின் அளவை அந்த அணியின் தீர்வு அளவிற்கும், அதன் தாக்கு அளவிற்கும் சமம்.

$$A = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & \dots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \dots & \dots & a_{2n} \\ \dots & \dots & \dots & \dots & \dots \\ a_{m1} & a_{m2} & \dots & \dots & a_{mn} \end{bmatrix} \text{ என்ற}$$

$m \times n$ அணிவாக இருக்கட்டும் ($m < n$) இதில் $R_1 = [a_{11}, a_{12}, \dots, \dots, a_{1n}]$ என m வெக்டர்கள் இருப்பதைக் கவனி. இந்த அணியின் மதிப்பிடம் $r (< m)$ ஆக இருந்தால், $\{R_1, \dots, R_r\}$ என்ற வெக்டர் குழுவில் r வெக்டர்கள் மட்டும் ஒருபடித்த சார்பற்ற குழுவாக இருக்கும் என்றும், மீதமுள்ள $m - r$ வெக்டட்களை இவற்றின் சார்பாக எழுதலாம் என்றும் நினை. அதாவது, இந்த வெக்டர் உள் வெளிக்குப் பரிமாணம் r . இதையே இன்னும் வேறு விதமாகக் கூறலாம், இந்த வெக்டர் வெளியின் அடிப் படைக் குழுவில் (basis) r வெக்டர்கள் இருக்கும்.

நிபுணம்: A -ன் மதிப்பிடம் $= r$ $m \dots m$ கொள்கை. $\therefore$ ஒரு r -சதுர சிற்றணிக் கோவைவின் மதிப்பாவது பூச்சியத் தனித்து வேறுபட்டிருக்க வேண்டும். இதை (வேண்டிய தீர்வு மாற்றக்கூகி செய்யு)

$$D = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & \dots & a_{1r} \\ a_{21} & a_{22} & \dots & \dots & a_{2r} \\ \dots & \dots & \dots & \dots & \dots \\ a_{r1} & a_{r2} & \dots & \dots & a_{rr} \end{bmatrix}$$

என எழுதலாம்,

இப்பொழுது,

$$D' = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & \dots & a_{1r} & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \dots & \dots & a_{2r} & a_{2n} \\ \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots \\ a_{r1} & a_{r2} & \dots & \dots & a_{rr} & a_{rn} \\ a_{p1} & a_{p2} & \dots & \dots & a_{pr} & a_{pn} \end{bmatrix} = 0$$

என்ற $(r+1)$ தரச் சிற்றணியை எடுத்துக் கொள். இதன் மதிப்பு பூச்சியம் என்பதைக் கவனி. (ஏனெனில் இந்த அணியின் அளவை $=r$) இதனை $(r+1)$ ஆவது திரின் அடிபாக மிதித்தால்,

$$a_{11}k_1 + a_{21}k_2 + \dots + a_{r1}k_r + a_{p1}k_{r+1} = 0 \dots (I)$$

எனக் கிடைக்கும். $k_1, k_2, \dots, k_r$ என்பன $a_{11}, a_{21}, \dots, a_{r1}$ -ன் இணை காரணிகள். k_{r+1} ஆவது a_{p1} -ன் இணை காரணி.

இப்பொழுது, $(r+1)$ ஆவது திரை q -க்கு $r+1, r+2, \dots, r+n-r$ மதிப்புகள் கொடுத்து $(n-r)$ சமன்பாடுகளிற் பெறலாம். மேலும், $q = 1, 2, 3, \dots, r$ ஆக இருத்தாலும் சமன்பாடு I உண்மையாக இருக்கும்.

$\therefore$ ஒர் அணியில் ஒரு திரின் உறுப்புகளை மற்றொரு திரின் இசைந்த (corresponding) இணை காரணிகளைக் கொண்டு பெருக்கிக் கூட்டிய தொகை பூச்சியம் என்பது நமக்கு தெரியும்.

$\therefore I$ -ல் $q = 1, 2, \dots, r, \dots, n$ எனப் போட்டுக் கூட்டினால்

$$k_1 [a_{11} a_{12} \dots a_{1n}] + k_2 [a_{21} a_{22} \dots a_{2n}] + \dots \\ + k_r [a_{r1} a_{r2} \dots a_{rn}] + k_{r+1} [a_{p1} a_{p2} \dots a_{pn}] = 0$$

அதாவது $k_1 X_1 + k_2 X_2 + \dots + k_r X_r + k_{r+1} X_p = 0$.

இதில் $k_1, k_2, \dots, k_r, k_{r+1}$ என்பனவை எண்ணிகள் (scalars) என்பதையும் $k_{r+1} = D \neq 0$ என்பதையும் கவனி.

$$\therefore X_p = - \frac{1}{k_{r+1}} [k_1 X_1 + \dots + k_r X_r]$$

$$X_p = - \frac{1}{D} \cdot [k_1 X_1 + \dots + k_r X_r] \quad \dots (I)$$

இதில் $p = r+1, r+2, \dots, n$ ஆக இருக்கலாம். இனிமேல், $\{X_1, X_2, \dots, X_r\}$ ஒழுங்குபட்ட சார்பற்ற குழு என திருவிடுபடும்.

$k_1 X_1 + k_2 X_2 + \dots + k_r X_r = 0$ எனக் கொள்க.

$$k_1 [a_{11}, a_{12}, \dots, a_{1n}] + k_2 [a_{21}, a_{22}, \dots, a_{2n}] + \dots \\ \dots + k_r [a_{r1}, a_{r2}, \dots, a_{rn}] = 0$$

$$\therefore a_{11}k_1 + a_{21}k_2 + \dots + a_{r1}k_r = 0$$

$$a_{12}k_1 + a_{22}k_2 + \dots + a_{r2}k_r = 0$$

$$\dots \dots \dots$$

$$a_{1n}k_1 + a_{2n}k_2 + \dots + a_{rn}k_r = 0$$

இதில் முதல் r சமன்பாடுகளை மட்டும் எடுத்துக் கொள்வோம். $D \neq 0$ ஆகையால், கிரேம்ஸ் விதிப்படி,

$$k_1 = k_2 = \dots = k_n = 0.$$

$$\therefore \begin{array}{ccccccc} \{ X_1, X_2, \dots, X_r \} & \text{என்பது} & \text{ஒரு} & \text{படித்த} & \text{சரிவற்ற} & & \\ \text{குழு} & & \dots & & \dots & & \text{(B)} \end{array}$$

(1), (B)-ல் இருந்து $\{ X_1, \dots, X_2, \dots, X_r \}$ ஓர் அடிப்படையாகக் குறு எண்ணம்.

$\therefore$ இந்த அணியின் திரை மதிப்பிடம் $= r$. இப்பொழுது,

A -ன் திரை மதிப்பிடம் $= A'$ -ன் திரை மதிப்பிடம்.

$= A'$ -ன் மதிப்பிடம்

$= A$ -ன் மதிப்பிடம்.

$\therefore$ ஓர் அணியின் மதிப்பிடம் $=$ அதன் திரை மதிப்பிடம்

$=$ அதன் திரை மதிப்பிடம்

T-18. A என்ற ஒரு $m \times n$ அணியை ஓர் ஒழுங்கணியாக மூன் பெருக்கினால் அதன் திரை மதிப்பிடம் மாறுதல்.

ஓர் அணியை ஒழுங்கணியாக பெருக்கினால் அதன் மதிப்பிடம் மாறுதல். ஆனால் அதன் மதிப்பிடம் $=$ திரை மதிப்பிடம்.

$\therefore$ அதன் திரை மதிப்பிடம் மாறுதல்.

வேறு முறை:

A என்பது $m \times n$ அணியாகவும், X என்பது m -சதுர ஒழுங்கணியாகவும் இருக்கட்டும்.

$XA = B$ எனக் கொள்க. A -ன் மதிப்பிடம் $= B$ -ன் மதிப்பிடம் என நிரூபிக்க வேண்டும்.

அ. அ. - 16

இப்பொழுது, $XA = B$

$$\therefore \begin{bmatrix} X_{11} & X_{12} & \dots & X_{1n} \\ X_{21} & X_{22} & \dots & X_{2n} \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ X_{m1} & X_{m2} & \dots & X_{mn} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} R_1 \\ R_2 \\ \vdots \\ R_n \end{bmatrix} = B$$

$\therefore B$ -ன் திரைகள் பின்வருமாறு இருக்கும்.

முதல் திரை : $X_{11} R_1 + X_{12} R_2 + \dots + X_{1n} R_n$

இரண்டாம் திரை : $X_{21} R_1 + X_{22} R_2 + \dots + X_{2n} R_n$

...

மஆவது திரை : $X_{m1} R_1 + X_{m2} R_2 + \dots + X_{mn} R_n$

இவை $\{R_1, R_2, \dots, R_n\}$ -ன் ஒரு படித்த கூட்டு வெக்டர்கள் (linear combination of vectors).

$\therefore B$ -ன் ஒவ்வொரு திரையையும் A -ன் திரைவெளி யிலிருந்து (Row space) பெறலாம். மேலும், $A = X^{-1}B$. இதில் X^{-1} ஓர் ஒழுங்கணி $\therefore$ முன்மாதிரியே, A -ன் ஒவ்வொரு திரையையும் B -ன் திரை வெளியிலிருந்து பெற முடியும் என நிரூபிக்க முடியும்.

$\therefore A$ -ன் திரை வெளியும், B -ன் திரை வெளியும் சமம்.

$\therefore$ அளவகளின் பரிமாணம் (Dimension) சமம்.

$\therefore$ அளவகளின் திரை மதிப்பிடம் சமம்.

7-19. இதே விதமாக, ஓர் அணியை ஓர் ஒழுங்கணியால் பின் பெருக்கினால் அதன் திரை மதிப்பிடம் மாலுது என நிரூபிக்க வாம்.

7-20. மேற்படும் : A என்ற $m \times n$ அணியின் திரை மதிப் பிடம் r ஆக இருந்தால், X என்னும் ஒழுங்கணியை,

$$XA = \begin{bmatrix} R \\ 0 \end{bmatrix} \text{ என இருக்கும் வண்ணம்}$$

கண்டு பிடிக்கலாம். இதில் $R = r \times n$ அணி; $0 = (m-r) \times n$ அணி.

நிபுணம்: மூலவாறு, கொடுக்கப்பட்ட A என்ற அணி மீன் நிற வேலிக்கு அடிப்படை நிற வேகடர்களான r நிற களைத் தெரித்து கொள்ளோம். தகுத்த நிற மாற்றங்கள் மூலமாக இத்த r நிறகளையும் மேலே இருக்குமாறு செய்யலாம். இது கொடுக்கப்பட்ட அணி A -ஐச் சாதாரண நிற அணிகளாக மூன் பெருக்குவதற்குச் சமம்.

இப்பொழுது கீழே உள்ள $(n-r)$ நிறகளையும், மேலேயுள்ள நிறகளைத் தகுத்த எண்ணியால் பெருக்கிக் கூட்டினால் கழித்தோ, பூச்சிய நிறகள் ஆக்கிவிடலாம். இவையும் சாதாரண நிற வணிகளாக மூன் பெருக்குவதற்குச் சமமே.

மேலும் சாதாரண நிறவணிகளின் பெருக்கற் பலன் ஓர் ஒழுங்கணி. இது X ஆக இருக்கட்டும். ஆகையால்,

$$XA = \begin{bmatrix} R \\ 0 \end{bmatrix}$$

இதேவிதமாக, s என்பது A -ன் நிக் மதிப்பிடமாக இருத் தால் Y என்ற ஒழுங்கணியை $AY = [S \ O]$ என இருக்கும் வண்ணம் கண்டு பிடிக்க முடியும். இதில் $S = m \times s$ அணி; $O = m \times (n-s)$ அணி.

7-21. தேற்றம்: ஓர் அணிமீன் மதிப்பிடம் அதன் நிற மதிப் பிடத்திற்கும், அதன் நிக் மதிப்பிடத்திற்கும், சமமாகும். (வேறு முறை)

A என்ற அணிமீன் மதிப்பிடம் r ஆகவும், அதன் நிற மதிப் பிடம் r_1 ஆகவும் இருக்கட்டும்.

ஓர் அணிமீன் மதிப்பிடமும், நிற மதிப்பிடமும் ஓர் ஒழுங் கணியால் மூன் பெருக்கினால் மாறுது என்று தெரியும் (7-4 (ii); 7-18).

இதன் நிற மதிப்பிடம் r_1 ஆனதால்

$$XA = \begin{bmatrix} R_1 \\ 0 \end{bmatrix} \text{ என எழுதலாம் (7-20)}$$

இதில் R_1 என்பது $r_1 \times n$ அணி.

$\therefore (r_1 + 1)$ தரச் சிற்றணிகள் பூச்சியவாகும்.

$\therefore p(XA) \leq r_1$.

$$\therefore P(A) \leq r_1 \quad \because P(XA) = P(A)$$

$$\therefore r \leq r_1 \quad \dots \quad \dots \quad \dots \quad (1)$$

மேலும், $P(A) = r$ ஆனதால்,

$$PA = \begin{bmatrix} R \\ 0 \end{bmatrix} \text{ என எடுத்துக்கொள்வோம்} \quad \dots \quad \dots \quad (7.6)$$

இதில் R என்பது $r \times n$ அணி.

$$\therefore PA\text{-ன் நிரை மதிப்பிடம்} \leq r$$

ஆகவே, PA -ன் நிரை மதிப்பிடம்

$= A$ -ன் நிரை மதிப்பிடம் ($\because$ ஓர் ஒழுங்குணியால் பெருக்கினால் நிரை மதிப்பிடம் மாறாது)

$$\therefore r_1 \leq r \quad \dots \quad \dots \quad \dots \quad (2)$$

(1), (2)ல் இருந்து $r = r_1$

இதேவிதமாக, ஓர் அணியின் மதிப்பிடமும் அதன் நிரை மதிப்பிடமும் சமம் என நிரூபிக்கலாம்.

7.22. கூட்ட அணியின் (மதிப்பிடம்) அளவை

A, B என்பன ஒரே தர அணிகளானால்

$$P(A+B) \leq P(A) + P(B)$$

நிரூபணம்: A, B என்பன $m \times n$ அணிகளானால் $A+B$ -ல் $m \times n$ அணி என்பதைக் கவனி. r_1, r_2 என்பன முறையே A, B -ன் மதிப்பிடல்களாக இருக்கட்டும்.

இப்பொழுது S என்பது A -ன் நிரைகளாலும், B -ன் நிரைகளாலும் சேர்த்து நிரப்பப்படும் உள்வெளி (Sub space) யாக இருக்கட்டும். S_A, S_B, S_{A+B} என்பன முறையே A -ன் நிரைகளாலும், B -ன் நிரைகளாலும், $(A+B)$ -ன் நிரைகளாலும் நிரப்பப்படும் உள்வெளிகளாக இருக்கட்டும். அப்படியானால்

$$S_{A+B}\text{-ன் பரிமாணம்} \leq S\text{-ன் பரிமாணம்}$$

$$< (S_A\text{-ன் பரிமாணம்})$$

$$+ (S_B\text{-ன் பரிமாணம்})$$

$$r \leq r_1 + r_2$$

$$\text{அதாவது, } P(A+B) \leq P(A) + P(B)$$

7-23. A. B et al. LAM 11-3 μ g. significant trend.

$$p(A \cap B) \geq p(A) + p(B) - 1 \text{ или } p(A \cap B) \geq p(A) + p(B) - p(A \cup B).$$

நிபுணம் : $\beta(A) = r$ ஆக இருக்கட்டும். அப்படியானால் P, Q என்னும் ஒவ்வொருவரின்

$$PAQ = \begin{bmatrix} I_r & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}$$
 என இருக்கும்படி உண்டா.

$$\therefore P^{-1}PAQ, Q^{-1}A=P^{-1}\begin{bmatrix} I_r & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}Q^{-1} \quad (1)$$

$$\text{இப்போது } C = P^{-1} \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & I_{n-1} \end{bmatrix} Q^{-1} \quad \dots \quad (2)$$

என்ற அண்ணா எடுத்திருந்தேன் என்றேன்.

$$\begin{aligned} A + C &= P^{-1} \left\{ \begin{bmatrix} I_r & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & I_{n-r} \end{bmatrix} \right\} Q^{-1} \\ &= P^{-1} I_n Q^{-1} \\ &= P^{-1} Q^{-1} \end{aligned}$$

 $\therefore A + C$ not orthogonal.

$$\therefore P(A + C) = n.$$

$$P(B) = P[(A+C)B]$$

∴ ஓர் அணியின் p ஆனது ஓர் ஒழுக்கனியாகப் பெருக்கி
னாக மாறுபடு.

$$\begin{aligned} \therefore P(B) &= P[(AB+CB)] \\ &\leq P(AB) + P(CB) \end{aligned} \quad \dots \quad (3)$$

7-22-4 - 8/1/4

$$\begin{aligned} \text{கருது } p(CB) &\leq p(C) & \dots & \dots & 7.8 \\ &= n-r & \dots & \dots & (2)\text{-ல் இருந்து} \\ &= n-p(A) \end{aligned}$$

$$\therefore (8) \Rightarrow P(B) \leq P(AB) + n - P(A)$$

$$\therefore p(A) + p(B) - n \leq p(AB).$$

மாநிரல் கணக்குகள்

மாநிர் 1: A என்ற n -சதுர அணி சய அடுக்கு அணிவாக இருத்தால் (Idempotent) $\rho(I-A) = n - \rho(A)$ என நிறுதி.

A ஒரு சய அடுக்கு அணி.

$$\therefore A^2 = A$$

$$A - A^2 = 0$$

$$A(I-A) = 0$$

$$\rho\{A(I-A)\} = \rho(0) \dots \text{இதில் } 0 \text{ பூச்சிய அணி.}$$

$$= 0 \dots \dots \dots \text{பூச்சிய எண். (1)}$$

$$\text{இப்பொழுது } \rho(AB) \geq \rho(A) + \rho(B) - n$$

$$0 \geq \rho(A) + \rho(I-A) - n$$

$$n - \rho(A) \geq \rho(I-A).$$

மாநிர் 2: பின்வரும் அணியின் (மதிப்பீடம்) அளவை க்கு அதிகமாயிருக்க முடியாது என நிறுதி.

$$\begin{bmatrix} a_1\alpha_1 + a_2\alpha_2 & a^2\beta_1 + a_2\beta_2 & a_1\gamma_1 + a_2\gamma_2 \\ b_1\alpha_1 + b_2\alpha_2 & b_1\beta_1 + b_2\beta_2 & b_1\gamma_1 + b_2\gamma_2 \\ c_1\alpha_1 + c_2\alpha_2 & c_1\beta_1 + c_2\beta_2 & c_1\gamma_1 + c_2\gamma_2 \end{bmatrix}$$

A என்பது செங்குக்கப்பட்ட அணியாய் இருக்கட்டும்.

$$A = \begin{bmatrix} a_1 & a_2 & a_3 \\ b_1 & b_2 & b_3 \\ c_1 & c_2 & c_3 \end{bmatrix} \quad \begin{bmatrix} \alpha_1 & \beta_1 & \gamma_1 \\ \alpha_2 & \beta_2 & \gamma_2 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

என்று எழுதலாம்.

$$A = BC \text{ ஆனால்}$$

$$\rho(A) \leq \text{சிறியது } [\rho(B), \rho(C)]$$

இதில் C -ன் கடைசி நிரை பூச்சிய நிரை

$$\text{ஆதலால் } \rho(C) = 2$$

$$\therefore \rho(A) \leq 2$$

பயிற்சி 7

1. கீழ்வரும் அணிகளின் அளவைகளை (மதிப்பிடத்தை)க் கண்டுபிடி:

$$(i) \begin{bmatrix} 1 & -1 & 1 \\ 0 & -3 & 2 \\ 2 & -4 & 3 \end{bmatrix} \quad (ii) \begin{bmatrix} 1 & a & b & 0 \\ 0 & c & d & 1 \\ 1 & a & b & 0 \\ 0 & c & d & 1 \end{bmatrix}$$

$$(iii) \begin{bmatrix} 2 & 1 & -2 & -2 \\ 0 & 1 & -4 & -3 \\ -2 & -2 & 6 & 5 \end{bmatrix} \quad (iv) \begin{bmatrix} -2 & -4 & -1 & 3 \\ 6 & 3 & 2 & -2 \\ 4 & 7 & 4 & -4 \\ 2 & 3 & 2 & -2 \end{bmatrix}$$

2. ஓர் அணியில் ஒவ்வொரு உறுப்பும் 1 ஆனால் அதன் மதிப்பிடமும் 1 என நிறுபி.

$$3. A = \begin{bmatrix} 1 & 1 & -1 \\ 2 & -3 & 4 \\ 3 & -2 & 3 \end{bmatrix}; B = \begin{bmatrix} -1 & -2 & -1 \\ 6 & 12 & 6 \\ 5 & 10 & 5 \end{bmatrix} \text{ ஆனால்,}$$

$A, B, A + B, AB, BA$ -ன் மதிப்பிடங்கள் 2, 1, 2, 0, 1 என நிறுபி.

4. கீழ்வரும் அணிகளை இயல் வடிவில் எழுது. அதிலிருந்து அவற்றின் அளவைகளை (மதிப்பிடத்தை)க் கண்டுபிடி.

$$(i) \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 & 7 \\ 2 & 2 & 2 & 0 \\ 3 & 4 & 5 & 7 \end{bmatrix} \quad (ii) \begin{bmatrix} 0 & 1 & 2 & 3 & 4 \\ 1 & 1 & 2 & 3 & 3 \\ 2 & 2 & 0 & 2 & 2 \\ 3 & 3 & 2 & 1 & 1 \\ 4 & 3 & 2 & 1 & 0 \end{bmatrix}$$

$$(iii) \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 & 0 \\ 2 & 4 & 3 & 2 \\ 3 & 2 & 1 & 3 \\ 6 & 8 & 7 & 5 \end{bmatrix} \quad (iv) \begin{bmatrix} 3 & -2 & 0 & -1 & -7 \\ 0 & 2 & 2 & 1 & -5 \\ 1 & -2 & -2 & -2 & 1 \\ 0 & 1 & 2 & 1 & -3 \end{bmatrix}$$

5. PAQ என்பது இயல் வடிவில் இருக்குமாறு P, Q என்றும் அணிகளைக் கண்டுபிடி.

$$(i) \begin{bmatrix} 1 & 1 & 2 \\ 1 & 2 & 3 \\ 0 & -1 & -1 \end{bmatrix}$$

$$(ii) \begin{bmatrix} 1 & -1 & 2 & -1 \\ 4 & 2 & -1 & 2 \\ 2 & 2 & -2 & 0 \end{bmatrix}$$

$$(iii) \begin{bmatrix} 3 & -1 & -2 & 1 \\ 1 & 4 & 6 & 1 \\ 7 & -11 & -6 & 1 \\ 7 & 2 & 12 & 3 \end{bmatrix}$$

6. கீழ் வரும் வெக்டர்கள் ஒரு படித்த சார்புக் குழுவா அல்லவா என ஆராய்க.

$$(i) (1,0,0); (0,1,0); (0,0,1)$$

$$(ii) (1, 2, 3); (1, -1, 0).$$

$$(iii) [1, 1, -2, -3], [2, 4, -1, 1], [-2, 2, -2, -1] \\ [0, 7, -3, -3]$$

$$(iv) [-3, -4, 1, 2], [1, -2, 0, -1], [-1, -3, 1, 5] \\ [-3, -14, 3, 7]$$

7. $\rho(A)=2$ ஆக உள்ள A என்ற ஏதாவதொரு 3 சதுர அணியை எடுத்துக் கொண்டு அதன் தீர்வு வெக்டர்களும், தீர்வு வெக்டர்களும் ஒரு படித்த சார்புக் குழுக்கள் என நிரூபி.

வினாக்கள்

1. (i) 2 (ii) 2

(iii) 2 (iv) 4

4. (i) 2 (iii) 3 (iv) 4

5. (i) $P = \begin{bmatrix} -1 & 0 & 0 \\ -1 & 1 & 0 \\ -1 & 1 & 1 \end{bmatrix}; Q = \begin{bmatrix} 1 & -1 & -1 \\ 0 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$

(ii) $P = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ -\frac{3}{2} & \frac{1}{2} & 0 \\ -\frac{1}{2} & \frac{1}{2} & -\frac{1}{2} \end{bmatrix}; Q = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 & -\frac{1}{2} \\ 0 & 1 & -1 & \frac{3}{2} \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{bmatrix}$

(iii) $P = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & -3 & 0 & 0 \\ -1 & -\frac{1}{2} & 0 & \frac{1}{2} \\ 2 & 2 & 1 & 0 \end{bmatrix}; Q = \begin{bmatrix} 1 & 3 & 2 & 5 \\ 0 & 1 & 0 & 2 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & -7 & -8 & -18 \end{bmatrix}$

6. (i) சரிபற்ற குறு

(ii) சரிபற்ற குறு

(iii) சரியாக இல்லை

(iv) சரிபற்ற குறு.

8. ஒருங்கமை ஒருபடிச் சமன்பாடுகள்

8.1. அனிகன் பற்றிப் பயிர்வதாக, சமன்பாடுகளை விடுவிக்கும் முறைகளைத் தெரிந்து கொள்வது உதவியாக இருக்கும் என்று முதலிலேயே குறிப்பிட்டோம். இவற்றிற்கிணைய கூட்டில், பொருக்கல் முதலியவைகளை வரையறை செய்வதையும் நினைவுபடுத்தினோம் : ஒரு சில சமன்பாடுகளை விடுவிக்கும் கணக்குகள் கூடச் செய்து காட்டியுள்ளோம். இப்பொழுது இத்தச் சமன்பாடுகளை விடுவிப்பதில் உள்ள கொள்கைகளை (theory) முறைவாக உதாரணங்களால் விளக்குவோம்.

$$a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \dots + a_{1n}x_n = b_1$$

$$a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + \dots + a_{2n}x_n = b_2$$

$$\dots \dots \dots \dots \dots$$

$$a_{m1}x_1 + a_{m2}x_2 + \dots + a_{mn}x_n = b_m \quad \dots \quad (1)$$

$$X = [x_1, x_2, \dots, x_n]' \text{ ஆகவும்,}$$

$$B = [b_1, b_2, \dots, b_m]' \text{ ஆகவும்,}$$

A என்பது குணகங்களில் அணிவாகவும் இருந்தால் (1)-ஐ $AX = B$ என எழுதலாம்.

இனி, இத்தச் சமன்பாடுகளைத் தீர்க்க (solve) இயலாது, அவை ஏற்கத்தக்கவனா என்ற கேள்விகள் எழும். இவற்றிற்கும் மேலாக தீர்வு காணும் வகை யாது? என்பதைப்பெரிவாய் நாம் ஆரித்துக்கொள்ள வேண்டும்.

முதலாவதாக, 'தீர்வு' என்னும் $x_1, x_2, \dots, x_n$ -க்கு நாம் கண்டு பிடிக்கும் $a_1, a_2, \dots, a_n$ என்ற எண் மதிப்புகள் ஒவ்வொரு சமன்பாட்டிற்கும் பொருத்துவதாக இருக்க வேண்டும். இதனால் நான் நாம் இவற்றை ஒருங்கமை சமன்பாடுகள் என்று சொல்

கிறோம். உதாரணமாக $a_1, a_2, \dots, a_n$ என்பன சிக்கல் எண்களாக (complex numbers) இருக்கக் கூடாதென நாம் எதிர் பார்க்கப்படுகிறது. ஆனால் தூய (pure) கணிதம் பயிற்சுவோர் இதை ஏற்க மாட்டார்கள். வேறு சில சந்தர்ப்பங்களில் நாம் மேல் ஒரு எண்களையே விடைகளாக எதிர்பார்க்க வேண்டியதும் இருக்கும். இவற்றை நாம் தேவைக்கேற்றவாறு மாற்றிச் செய்ய வேண்டும் எனக் கூற தேவையில்லை.

8.2. இப்பொழுது, நாம் சில எளிய உதாரணங்களைக் கவனிப்போம்.

உதாரணம் 1: ஒரே மாறியிலுள்ள ஒரு சமன்பாடு $a_{11}x_1 = b_1$.

இதில் a_{11}, b_1 என்ற எண்ணிகளின் மதிப்பு தங்குதத் தெரியும். ஆகையால் x_1 இக் கண்டுபிடிப்பது எல்லாவு எளிது!

$x_1 = b_1/a_{11}$. ஆனால் a_{11} பூச்சியமாகிவிட்டதால்? கேட்க வேண்டிய கேள்விதான் என ஒப்புக்கொள்ளினீர்கள்!

(i) $a_{11} \neq 0$ ஆனால் x_1 க்கு b_1/a_{11} என்ற ஒரே மதிப்ப்தான் உண்டு.

(ii) $a_{11} = 0$ ஆனால், x_1 -ன் மதிப்பு b_1 -ன் மதிப்பைப் திருக்கிறது.

(அ) $b_1 \neq 0$ ஆக இருந்தால், இந்தச் சமன்பாட்டைத் தீர்க்க இயலாது. ஏனெனில் x_1 -ன் மதிப்பு எதுவானாலும் இடப் புறம் $a_{11}x_1 = 0$ ஆகவும், வலப்புறம் பூச்சியமில்லாமலும் இருக்கும். இது பொருத்தாததொன்று.

(ஆ) $b_1 = 0$ ஆக இருந்தால், இதை எண்ணற்ற விதமாகத் தீர்க்கலாம். x_1 -க்கு எந்த மதிப்பும் கொடுத்தாலும் பொருத்தவ தாக அமையும் என்பதை நோக்குக.

இந்தச் சிறிய உதாரணத்தையே எல்லாவு ஆழத்து நோக்க வேண்டி இருக்கிறது என்பதை வாசகர்கள் உணர்வார்களாக.

$$\text{உதாரணம் 2: } x_1 + x_2 = 7 \quad \dots \quad (1)$$

$$x_1 - x_2 = 1 \quad \dots \quad (2)$$

$$x_2 = 7 - x_1 \quad \dots \quad (1)\text{-ல் இருந்து}$$

$$\therefore x_1 = (7 - x_1) = 1$$

$$2x_1 - 7 = 1; 2x_1 = 8; x_1 = 4$$

$$\therefore x_1 = 8.$$

மேலும் $4 + 8 = 12$; $4 - 8 = -4$ ஆனதால் x_1, x_2 களுக்கு நாம் கண்டு பிடித்துள்ள மதிப்புகள் சரியான தீர்வு எனக் காண்கிறோம். -
என்ற தீர்வு இருப்பதாகவும் தெரிவிக்கிறோம்.

$$\text{உதாரணம் 3: } x_1 + x_2 = 7 \quad \dots \quad (1)$$

$$2x_1 + 2x_2 = 10 \quad \dots \quad (2)$$

இதைத் தீர்க்க உதாரணம் 2-ல் காட்டியபடி செய்வ முறப் பட்டால் தோன்றியே அடையோம். (2) ஆவது சமன்பாட்டின் இ.ப. (இடப் பக்கம்) முதல் சமன்பாட்டின் இ. ப. ஐர்ப்பால் இரு மடங்கு. ஆனால் 2ஆம் சமன்பாட்டின் வ.ப. முதல் சமன்பாட்டின் வ. ப. ஐர்ப்பால் இரு மடங்காக இல்லை!

ஆதலின் இதன் சமன்பாடுகள் ஒன்றுக்கொன்று மாறுதலை (Inconsistent Equations) என்பதைக் காண்கிறோம். $\therefore x_1, x_2$ -க்கு எந்த மதிப்புக் கொடுத்தாலும் இரு சமன்பாடுகளிலும் பொருத்தாது. ஏனெனில் முதல் சமன்பாட்டிற்குப் பொருத்தும் மதிப்புகள் இரண்டாம் சமன்பாட்டிற்குப் பொருத்தா. இவற்றை ஒரேயேயான சமன்பாடுகள் என்பது பொருத்தும்!

உதாரணம் 4 :

$$x_1 + x_2 = 7 \quad \dots \quad (1)$$

$$2x_1 + 2x_2 = 14 \quad \dots \quad (2)$$

இதில் இரண்டாவது சமன்பாட்டின் இடப்பக்கமும், வலப் பக்கமும் முதல் சமன்பாட்டின் இ. ப. வ. ப.-ஐப் போல் இரு மடங்காக உள்ளன. ஆகவே, இவற்றை இரு சமன்பாடுகளாகக் கருதாது, ஒரே சமன்பாடாக எடுத்துக் கொள்ளலாம். ஏனெனில் ஒரு சமன்பாட்டுக்குப் பொருத்தும் x_1, x_2 -ன் எந்த மதிப்புகள் அடுத்த சமன்பாட்டிற்கும் பொருத்தும். இதில் குணகங்களின் அணிவான $\begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 2 & 2 \end{bmatrix}$ -ன் மதிப்பீடும் 1 என்பது தோக்கத்தாகும்.

இதில் $x_1 = t$ எனக் கொள்வோம். அப்படியானால் $x_2 = 7 - t$

∴ தீர்வு $(x_1, x_2) = (t, 7 - t)$. இதில் t எந்த எண் மதிப்பும் கொள்ளலாம். t ஒரு சாரா மாதி (parameter) என்பதை நோக்குக.

8.3. தேற்றம் : n என்ற செவ்வேறு மாறிகளில் n சமன்பாடுகள் இருக்கட்டும். மேலும் A என்ற மூலக்கங்கள் அணிஒருங்கமை இருக்கட்டும். அப்படியானால் $AX = B$ என்ற சமன்பாடு களுக்கு ஒரே கடைகதி (Unique) தீர்வுதான் உண்டு.

நிரூபணம் :

A ஓர் ஒழுங்கமை ... (கொள்கை)

∴ A^{-1} இருக்கிறது. இப்பொழுது, $AX = B$... (1)

∴ $A^{-1} \cdot AX = A^{-1}B$

$X = A^{-1}B$... (2)

எனவே ஒருங்கமைத் தீர்வைக் கண்டு விட்டோம். ... இனி இது ஒரே கடைகதி தீர்வுதான் உண்டு என நிரூபிப்போம். கூடுமானால் $X = Y$ என்பது மற்றோர் தீர்வாக இருக்கட்டும். அதாவது,

$AY = B$... (3)

(1) - (3) $AX - AY = 0$

∴ $A(X - Y) = 0$

∴ $X - Y = A^{-1} \cdot 0 = 0$

∴ $X = Y$

உதாரணம் 2 ஐ மீண்டும் கவனிப்போம்.

$$x_1 + x_2 = 7$$

$$x_1 - x_2 = 1.$$

$$\text{இதில் } A = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{bmatrix} \quad |A| \neq 0$$

A^{-1} ஐப் பின்புலமுள்ள கண்டுபிடிப்பது கவனம் என்பதும் தயக்கத் தெரியும்.

$$\begin{array}{cc} A & I \\ \left[\begin{array}{cc} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{array} \right] & \left[\begin{array}{cc} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{array} \right] \end{array}$$

$$\left[\begin{array}{cc} 2 & 0 \\ 1 & -1 \end{array} \right] \quad \left[\begin{array}{cc} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{array} \right]$$

$$\left[\begin{array}{cc} 1 & 0 \\ 1 & -1 \end{array} \right] \quad \left[\begin{array}{cc} \frac{1}{2} & \frac{1}{2} \\ 0 & 1 \end{array} \right]$$

$$\left[\begin{array}{cc} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{array} \right] \quad \left[\begin{array}{cc} \frac{1}{2} & \frac{1}{2} \\ \frac{1}{2} & -\frac{1}{2} \end{array} \right]$$

$$\therefore A^{-1} = \left[\begin{array}{cc} \frac{1}{2} & \frac{1}{2} \\ \frac{1}{2} & -\frac{1}{2} \end{array} \right]$$

$$(B)\text{-ல் இருந்து } X = A^{-1}B = \left[\begin{array}{cc} \frac{1}{2} & \frac{1}{2} \\ \frac{1}{2} & -\frac{1}{2} \end{array} \right] \left[\begin{array}{c} 7 \\ 1 \end{array} \right]$$

$$\left[\begin{array}{c} x_1 \\ x_2 \end{array} \right] = \left[\begin{array}{cc} \frac{1}{2} \cdot 7 + \frac{1}{2} \cdot 1 \\ \frac{1}{2} \cdot 7 - \frac{1}{2} \cdot 1 \end{array} \right] = \left[\begin{array}{c} 4 \\ 3 \end{array} \right]$$

$$\therefore x_1 = 4; \quad x_2 = 3.$$

இதையே, இன்னும் சுருக்கமாகச் செய்ய பெரிதாக்கிய அணிமனம் (Augmented Matrix)ஐ பயன்படுத்தலாம். A உடன் B ஐச் சேர்த்து $[AB]$ என எழுதி, ஒத்ததன் திரும், தன் மாற்றம் களைச் செய்தால் $A^{-1}B$ கடைசி திரை இருக்கும். இது எவ்வாறு என்று சுருக்கமாக விளக்குவோம்.

$$R_1 \cdot R_2 \dots R_n A = I \text{ ஆனால்}$$

$$R_1 R_2 \dots R_n AA^{-1} = I \cdot A^{-1}$$

$$\text{அதாவது } R_1 R_2 \dots R_n I = A^{-1}$$

$$\text{மேலும் } R_1 \cdot R_2 \dots R_n B = A^{-1}B.$$

$$\text{இப்பொழுது, } AB = \left[\begin{array}{ccc} 1 & 1 & 7 \\ 1 & -1 & 1 \end{array} \right]$$

$$\sim \left[\begin{array}{ccc} 2 & 0 & 8 \\ 1 & -1 & 1 \end{array} \right] \sim \left[\begin{array}{ccc} 1 & 0 & 4 \\ 1 & -1 & 1 \end{array} \right]$$

$$= \begin{bmatrix} 1 & 0 & 4 \\ 0 & -1 & -9 \end{bmatrix} \sim \begin{bmatrix} 1 & 0 & 4 \\ 0 & 1 & 9 \end{bmatrix}$$

$$\text{இதில் } \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} = I \quad \therefore A^{-1}B = \begin{bmatrix} 4 \\ 9 \end{bmatrix}$$

இதன்படி மதிப்புக் உதாரணத்தால் காண்குவோம்.

$$2x_1 + 3x_2 + 4x_3 - x_4 = 9 \quad \dots \quad \dots \quad (1)$$

$$x_1 - x_2 + 2x_3 + 3x_4 = 7 \quad \dots \quad \dots \quad (2)$$

$$4x_1 - 5x_2 - 2x_3 - 3x_4 = 9 \quad \dots \quad \dots \quad (3)$$

$$3x_1 + 2x_2 - 4x_3 + 5x_4 = 7 \quad \dots \quad \dots \quad (4)$$

இதில், இரண்டாவது சமன்பாட்டை முதலில் எழுதுவோம்.
(இதனால் குணக அணிவில் $x_1 = 1$ ஆகும்.)

$$x_1 - x_2 + 2x_3 + 3x_4 = 7$$

$$2x_1 + 3x_2 + 4x_3 - x_4 = 9$$

$$4x_1 - 5x_2 - 2x_3 - 3x_4 = 9$$

$$3x_1 + 2x_2 - 4x_3 + 5x_4 = 7$$

இப்பொழுது, பெரிதாக்கிய $A = [AB]$

$$= \begin{bmatrix} 1 & -1 & 2 & 3 & 7 \\ 2 & 3 & 4 & -1 & 9 \\ 4 & -5 & -2 & -3 & 9 \\ 3 & 2 & -4 & 5 & 7 \end{bmatrix}$$

$$\sim \begin{bmatrix} 1 & -1 & 2 & 3 & 7 \\ 0 & 5 & 0 & -7 & -12 \\ 0 & -1 & -10 & -15 & -19 \\ 0 & 5 & -10 & -4 & -14 \end{bmatrix}$$

$$\sim \begin{bmatrix} 1 & -1 & 2 & 3 & 7 \\ 0 & 1 & 0 & -\frac{1}{2} & -\frac{13}{2} \\ 0 & -1 & -10 & -16 & -19 \\ 0 & 5 & -10 & -4 & -14 \end{bmatrix}$$

$$\sim \begin{bmatrix} 1 & 0 & 2 & \frac{1}{2} & \frac{33}{2} \\ 0 & 1 & 0 & -\frac{1}{2} & -\frac{13}{2} \\ 0 & 0 & -10 & -\frac{33}{2} & -\frac{101}{2} \\ 0 & 0 & -10 & 3 & -2 \end{bmatrix}$$

$$\sim \begin{bmatrix} 1 & 0 & 2 & \frac{1}{2} & \frac{33}{2} \\ 0 & 1 & 0 & -\frac{1}{2} & -\frac{13}{2} \\ 0 & 0 & 1 & \frac{33}{20} & \frac{101}{20} \\ 0 & 0 & -10 & 3 & -2 \end{bmatrix}$$

$$\sim \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & -\frac{43}{20} & \frac{3}{20} \\ 0 & 1 & 0 & -\frac{1}{2} & -\frac{13}{2} \\ 0 & 0 & 1 & \frac{33}{20} & \frac{101}{20} \\ 0 & 0 & 0 & \frac{33}{2} & \frac{33}{2} \end{bmatrix}$$

$$\sim \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & -\frac{43}{20} & \frac{3}{20} \\ 0 & 1 & 0 & -\frac{1}{2} & -\frac{13}{2} \\ 0 & 0 & 1 & \frac{33}{20} & \frac{101}{20} \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 1 \end{bmatrix}$$

$$\sim \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & 2 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & \frac{1}{2} \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 1 \end{bmatrix}$$

$$\therefore A^{-1}B = [2 \quad -1 \quad \frac{1}{2} \quad 1]$$

$$\therefore x_1 = 2; \quad x_2 = -1; \quad x_3 = \frac{1}{2}; \quad x_4 = 1.$$

8.4. $AX=B$ என்ற சமன்பாடு, ஹாண்டாடு இல்லாது ஒருங்கமை நேன்டிய வோதுமான நிபத்தனை $\rho(A) = \rho[AB]$ ஆகும். இதில் $[AB]$ என்பது A -உடன் B ஐச் சேர்த்தும் வோதக்கிய அணி.

நிறுபணம்: $c_1, c_2, \dots, c_n$ என்பன A -ன் நிரல் அணிகளாக இருக்கட்டும். அப்படியானால் $AX = B$ ஐ

$$[c_1 \ c_2 \ \dots \ c_n] \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} b_1 \\ b_2 \\ \vdots \\ b_n \end{bmatrix} \quad \text{என எழுதலாம்.}$$

$$\text{அதாவது, } x_1 c_1 + x_2 c_2 + \dots + x_n c_n = B \quad \dots \quad (1)$$

இப்பொழுது, A -ன் மதிப்பிடம் r ஆக இருக்கட்டும்.

$\therefore c_1, c_2, \dots, c_n$ என்ற மூலம் r நிரல்களும் சார்வற்ற வெக்டர் குழு ஆகும். [ஏனைய நிரல்களாவிரத்தால் தருத்த நிரல் மாற்றங்கள் செய்து இவற்றை மூலவில் வராமாறு வரிசைசர்படுத்த இயலும்].

கொடுக்கப்பட்ட சமன்பாடுகள் ஹாண்டாடு இல்லாதிருத்தால் ஒரு தீர்வு காண இயலும். அதாவது $k_1, k_2, \dots, k_n$ என்ற எண்ணிக்கை $k_1 c_1 + k_2 c_2 + \dots + k_n c_n = B \quad \dots \quad (2)$ என இருக்கும் வண்ணம் கண்டுபிடிக்கலாம்.

அ. அ. — 18

ஆனால் $c_{r+1}, c_{r+2}, \dots, c_r$ ஐ $c_1, c_2, \dots, c_r$ சார்பாக எழுத இயலும். $\therefore p(A) = r$

$\therefore (2)$ -ல் இருந்து B ஐயும் $c_1, c_2, \dots, c_r$ சார்பாக எழுதலாம்.

$$\therefore p[AB] \leq r$$

$$\therefore p[AB] \leq p(A) \quad \dots \quad \dots \quad \dots \quad (3)$$

மேலும் $p(A) \leq p[AB]$ என்பது வெளிப்படல்.

$\therefore A$ ஆனது AB யிலிருந்து B ஐ நீக்கியதால் கிடைத்தது.

$$\therefore p[AB] = p[A].$$

(ii) இப்பொழுது $p(A) = p[AB] = r$ (கொடுக்க)

$\therefore [AB]$ -ல் உள்ள எந்த $(r+1)$ நிரல்களும் ஒரு சார்புக் குழு ஆகும்.

$$\therefore k_1 c_1 + k_2 c_2 + \dots + k_r c_r + k_{r+1} B = 0 \quad \dots \quad (1)$$

இதில் முதல் r நிரல்களையும், கடைசி நிரலான B ஐயும் எடுத்துக் கொண்டும், இனி $k_{r+1} = 0$ ஆக இருக்க முடியுமா? என ஆராய்தல் அவசியம். அது 0 என வைத்துக் கொள்வோம்.

$$\text{அவடியானால், } k_1 c_1 + k_2 c_2 + \dots + k_r c_r = 0$$

ஆனால் $c_1, c_2, \dots, c_r$ ஒரு சார்பற்ற குழு.

$$\therefore k_1 = 0; k_2 = 0, \dots, k_r = 0$$

$\therefore$ சமன்பாடு (1) பொய்யாகும். இது ஒவ்வாதது.

$$\therefore k_{r+1} \neq 0$$

$$\therefore B = \frac{-(k_1 c_1 + k_2 c_2 + \dots + k_r c_r)}{k_{r+1}}$$

$$= x_1 c_1 + x_2 c_2 + \dots + x_r c_r$$

$$\text{இதில், } x_i = \frac{-k_i}{k_{r+1}}$$

$$\text{அதாவது } a_{11} x_1 + a_{12} x_2 + \dots + a_{1r} x_r = b_1$$

$$a_{21} x_1 + a_{22} x_2 + \dots + a_{2r} x_r = b_2$$

ஆகவே, $x_1, x_2, \dots, x_r$ என்ற எண்ணிக்கை இத்தச் சமன்பாடுகளில் ஸ்தம்பபடிவாதவாறு அமைவக் கண்டு பிடித்து விட்டோம். இதில் $x_{r+1}, x_{r+2}, \dots, x_n$ என்ற $(n-r)$ மாறிகளை 0 ஆகக் கொண்டுள்ளோம். ஆனாலும் இது ஒரு தீர்வு என்பதை நிரூபித்து விட்டோம்.

குறிப்பு: வேறு தீர்வுகள் உண்டா, அவை எத்தனைவன் என்பதை இங்கு நாம் ஆராயவில்லை.

8.5. நிகழ்நேரம்: $\rho(A) < \rho[AB]$ ஆக இருத்தால் கொடுக்கப்பட்ட சமன்பாடுகளுக்குத் தீர்வு (Solution) இல்லை.

உதாரணம் 1: பின்வரும் சமன்பாடுகளைக் கூடுமானால் விடுவி.

$$x_1 + 3x_2 = 7 \quad \dots \quad \dots \quad \dots \quad (1)$$

$$2x_1 + x_2 = 4 \quad \dots \quad \dots \quad \dots \quad (2)$$

$$2x_1 + 6x_2 = 6 \quad \dots \quad \dots \quad \dots \quad (3)$$

$$\text{இதில் } A = \begin{bmatrix} 1 & 3 \\ 2 & 1 \\ 2 & 6 \end{bmatrix}; B = \begin{bmatrix} 7 \\ 4 \\ 6 \end{bmatrix}$$

$\therefore B$ ஆல் பெரிதாகிய $A = [AB]$

$$= \begin{bmatrix} 1 & 3 & 7 \\ 2 & 1 & 4 \\ 2 & 6 & 6 \end{bmatrix} \sim \begin{bmatrix} 1 & 3 & 7 \\ 0 & -5 & -10 \\ 0 & 0 & 8 \end{bmatrix}$$

$$\sim \begin{bmatrix} 1 & 3 & 7 \\ 0 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 8 \end{bmatrix} \sim \begin{bmatrix} 1 & 3 & 7 \\ 0 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 8 \end{bmatrix}$$

$$\sim \begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 8 \end{bmatrix} \sim \begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$$\therefore P(A) = 2; P[AB] = 3.$$

$$\therefore P(A) < P[AB].$$

$$\therefore \text{இத்தகை சமன்பாடுகளுக்குத் தீர்வு இல்லை.}$$

இனி, இத்த நகர மாற்றங்கள் நமக்கு எதைத் தெரிவிக்கின்றன எனப் பார்ப்போம்.

கடைசி அணியிலிருந்து $0.x_1 + 0.x_2 = 1$ ஆக இருக்க வேண்டும். x_1, x_2 -ன் எந்த மதிப்பும் இதற்கும் பொருத்ததாது. நமக்குக் கடைசியாக இருக்கும் சமன்பாடுகளின் அணி, கொடுக்கப்பட்ட சமன்பாடுகளிலிருந்து கிடைக்கப் பெற்றதுதான்,

$$(2) - 2 \times (1) \quad -5x_1 = -10 \quad \dots \quad (4)$$

$$\therefore x_1 = 2 \quad \dots \quad (5)$$

$$\text{மேலும் (5) - } 2 \times (1) \quad 0.x_1 + 0.x_2 = -9 \quad \dots \quad (6)$$

(5)-ம் (6)-ம் ஸ்தம்பாடானவை எப்பதைக் காண்க.

உதாரணம் 2 :

பின்வரும் சமன்பாடுகளைக் கூடுமானால் விடுவி.

$$x_1 + 3x_2 = 7 \quad \dots \quad (1)$$

$$2x_1 + x_2 = 4 \quad \dots \quad (2)$$

$$2x_1 + 6x_2 = 14 \quad \dots \quad (3)$$

$$\text{இப்பொழுது } [AB] = \begin{bmatrix} 1 & 3 & 7 \\ 2 & 1 & 4 \\ 2 & 6 & 14 \end{bmatrix}$$

$$\sim \begin{bmatrix} 1 & 3 & 7 \\ 0 & -5 & -10 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \sim \begin{bmatrix} 1 & 3 & 7 \\ 0 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

$$\sim \begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

$$\therefore p(A) = 2 - p(AB)$$

$\therefore$ இத்தச் சமன்பாடுகளுக்குத் தீர்வு உண்டு.

$x_1 = 1$, $x_2 = 2$ என்பதைக் கடைசி நிரலிலிருந்து உடனே எழுதி விடலாம்.

8-6. ஒரே படியில் (homogeneous) உள்ள ஒருபடி (linear)ச் சமன்பாடுகள்

$$AX = B \text{ என்பதில் } B = 0 \text{ ஆனால், அதாவது}$$

$AX = 0$ என்பன ஒரே படியில் உள்ள ஒருபடிச் சமன்பாடுகள் ஆகும்.

$$p(A) = p(A, 0)$$

$\therefore$ இத்தகுத் தீர்வு உண்டு.

$$X = 0 \text{ ஒரு தீர்வு என்பது வெளிப்படை.}$$

8-7. தேற்றம் :

$AX = 0$ என்பதன் தீர்வுகளின் குழுவானது V_n -ன் ஓர் உள் வெளி ஆகும்.

(i) X_1, X_2 என்பன தீர்வுகளானால் $X_1 + X_2$ -ம் ஒரு தீர்வு என்றும்,

(ii) X_1 ஒரு தீர்வு ஆனால் kX_1 ஒரு தீர்வு என்றும் நிரூபிக்க வேண்டும்.

$$(i) A(X_1 + X_2) = AX_1 + AX_2 = 0 + 0 = 0$$

$$(ii) A(kX_1) = k.AX_1 = k.0 = 0$$

$$8-8. \text{ தேற்றம் : } AX = 0 \quad \dots \quad \dots \quad \dots \quad (1)$$

என்ற சமன்பாடுகளை விடுவிக்கும் போது,

$$p(A) = r \text{ ஆனால், } X_1, X_2, \dots, X_{n-r}$$

என்ற ஒரு படியில் சார்பற்ற தீர்வுக் குழு கிடைக்கும்.

$$\text{நிபுணம்: } p(A) = r \quad \quad \quad \text{கொள்கை}$$

$\therefore$ முதல் r நிரல்களான $C_1, C_2, \dots, C_r$ ஐ ஒரு படியில் சார்பற்ற நிரல்களாக (அடுத்த நிரல் மாற்றங்களுக்குப் பின்) எடுத்துக் கொள்ளலாம்.

$$\therefore A = [c_1 \ c_2 \ \dots \ c_n] \quad \dots \quad (ii)$$

$$(i), (ii)\text{-ல் இருந்து } x_1 c_1 + x_2 c_2 + \dots + x_n c_n = 0 \quad \dots \quad (iii)$$

இப்போது $c_1, c_2, \dots, c_r$ சார்பற்ற தீர்வுகளு

$$\therefore c_{r+1} = k_{11}c_1 + k_{12}c_2 + \dots + k_{1r}c_r \quad \dots \quad (1)$$

$$c_{r+2} = k_{21}c_1 + k_{22}c_2 + \dots + k_{2r}c_r \quad \dots \quad (2)$$

$$c_n = k_{p1}c_1 + k_{p2}c_2 + \dots + k_{pr}c_r \quad \dots \quad (n-r)$$

$$\text{இதில் } p = n-r \quad \dots \quad \dots \quad \text{சமன்பாடுகள் (iv)}$$

(iii) ஐயும் (iv)-ல் (1) ஐயும் ஒப்பிட்டுப் பார்ப்போம்.

$$X_1 = [k_{11} \ k_{12} \ \dots \ k_{1r} \ -1 \ 0 \ 0 \ \dots \ 0]^T$$

இதேதன்மையாக

$$X_2 = [k_{21} \ k_{22} \ \dots \ k_{2r} \ 0 \ -1 \ 0 \ \dots \ 0]^T$$

$$\dots \quad \dots \quad \dots \quad \dots \quad \dots \quad \dots \quad \dots \quad \dots$$

$$X_{n-r} = [k_{p1} \ k_{p2} \ \dots \ k_{pr} \ 0 \ 0 \ \dots \ -1]^T$$

$$\text{என்பன } (n-r) \text{ தீர்வுகள்.} \quad \dots \quad \dots \quad (v)$$

இனி இவை ஒருபடிமில் சார்பற்ற குழு என்று நிரூபிப்போம்.

கருவானால்,

$$\lambda_1 X_1 + \lambda_2 X_2 + \dots + \lambda_{n-r} X_{n-r} = 0 \quad \dots \quad (vi)$$

ஆக இருக்கட்டும். $\lambda_1 = 0, \lambda_2 = 0, \dots, \lambda_{n-r} = 0$ என நிரூபிக்கவேண்டும்.

(v)-ல் இருந்து, $\lambda_1 X_1 + \dots + \lambda_{n-r} X_{n-r}$ -ன் $(r+1)$ ஆவது உறுப்பு,

$$\lambda_1 (-1) + \lambda_2 \cdot 0 + \dots + \lambda_{n-r} \cdot 0 = -\lambda_1 \text{ என்று பார்க்கிறோம்.}$$

ஆனால் (vi)-ன் வ. ப. பூச்சிய அணி ஆதலால் $\lambda_1 = 0$ ஆக இருக்க வேண்டும்.

இதே விதமாக $\lambda_2 = 0, \dots, \lambda_{n-r} = 0$. கடைசியாக $X = [x_1 \ x_2 \ \dots \ x_n]^T$ என்ற ஏதாவது ஒரு தீர்வை $X_1, X_2, \dots, X_{n-r}$ சார்பாக எழுதலாம் என்று நினைப்போம்.

X ஒரு தீர்வு..... (கொள்கை)

மேலும் $X_1, X_2, \dots, X_{n-r}$ மூன்றே கண்டுபிடித்த தீர்வுகள்

$\therefore$ 8-7-ன் படி,

$Z = X + x_{r+1} \cdot X_1 + x_{r+2} \cdot X_2 \dots + x_n \cdot X_{n-r}$ என்பதும் ஒரு தீர்வாக இருக்க வேண்டும். (vii)

அதாவது, $Z = [x_1 \ x_2 \ \dots \ 0 \ 0 \ \dots \ 0]$ என்பது ஒரு தீர்வு (v)-ல் இருந்து.

$$\therefore AZ = 0$$

$$\therefore Z_1 c_1 + Z_2 c_2 + \dots + Z_r c_r = 0$$

ஆனால் $c_1, c_2, \dots, c_r$ ஒரு படியில் சரிபற்ற குறு.

$$\therefore Z_1 = 0, Z_2 = 0, \dots, Z_r = 0$$

$$\therefore Z = 0.$$

$\therefore$ (vii)-ல் இருந்து,

$$X = -x_{r+1} \cdot X_1 - x_{r+2} \cdot X_2 - \dots - x_n \cdot X_{n-r}$$

ஆகவே, X -ஐ $X_1, X_2, \dots, X_{n-r}$ சார்பாகக் கண்டு பிடித்து விட்டோம்.

8-9. ஓர் அணிவின் பூச்சிய அளவு (Nullity of a Matrix)

$AX = 0$ என்பதற்க்கிணங்க இருக்கும்

$(X_1, X_2, \dots, X_{n-r})$ என்ற ஒரு படியில் சரிபற்ற வேக்டர் குழுவாகப் பிறப்பிக்கப்படும் உள் வெளியை (Generated space) பூச்சிய உள் வெளி (Null space) என்று சொல்வோம். இதன் பரிமாணமான $(n-r)$ ஐ இந்த அணிவின் (திரை) பூச்சிய அளவு என்று சொல்வோம்.

$\therefore A$ என்ற ஓர் அணியை எடுத்துக் கொண்டால், அணிவின் மதிப்பிடம் + (திரை) பூச்சிய அளவு = n (திரைகளின் எண்ணிக்கை).

இதேவிதமாக,

அணியின் மதிப்பீட்டும் + (நிலை) பூச்சிய அளவு = n (நிலைகளின் எண்ணிக்கை) என நிரூபிக்கலாம்.

பூச்சிய அளவை $\gamma(A)$ எனக் குறிப்பிடுவது வழக்கம்.

$$\therefore \rho(A) + \gamma(A) = n$$

8.10. $AX = 0$ என்பதன் ஒரு டி.டி.யில் சாம்பதந தீர்வுக் குழு $(X_1, X_2, \dots, X_{n-r})$ ஆகவும், $AX_0 = B$ ஆகவும் இருத்தலாம். $X_0 + k_1 X_1 + k_2 X_2 + \dots + k_{n-r} X_{n-r}$ என்பது $AX = B$ என்பதன் தீர்வாக இருக்கும் என நிரூபி.

நீடுபணம் :

$X_1, X_2, \dots, X_{n-r}$ என்பன $AX = 0$ -ன் தீர்வுகள்.

$\therefore k_1 X_1 + k_2 X_2 + \dots + k_{n-r} X_{n-r}$ -ம், $AX = 0$ -ன் தீர்வாக இருக்க வேண்டும்.

இப்பொழுது,

$$\begin{aligned} A(X_0 + k_1 X_1 + \dots + k_{n-r} X_{n-r}) \\ = AX_0 + A(k_1 X_1 + k_2 X_2 + \dots + k_{n-r} X_{n-r}) \\ = B + 0 = B \end{aligned}$$

இனி $X = Y$ என்பது ஏதாவது ஒரு தீர்வாக இருத்தலாம்

$$Y \text{ ஐ } X_0 + k_1 X_1 + k_2 X_2 + \dots + k_{n-r} X_{n-r}$$

என்று எழுத முடியும் என நீடுபிடுபோம்.

இதற்கு $Y - X_0$ ஆனது $AX = 0$ என்பதன் தீர்வு என நீடுபித்தாக போதுமானது. (8.8)

$$A(Y - X_0) = AY - AX_0 = B - B = 0$$

ஆகவே, $AX = B$ என்பதன் டிகம் பொதுவான தீர்வு (most general solution).

$X_0 + k_1 X_1 + k_2 X_2 + \dots + k_{n-r} X_{n-r}$ எனத் தெரிவாகிறது.

மாநிரல் கணக்குகள்

மாதிரி 1 : விடுவி :

$$x_1 + 2x_2 + 3x_3 = 10$$

$$4x_1 + 5x_2 + 6x_3 = 28$$

A என்பது குணக்கவரின் அணி ஆனால்,

$$\text{பெரிதாக்கிய } A = [AB]$$

$$= \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 & 10 \\ 4 & 5 & 6 & 28 \end{bmatrix} \sim \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 & 10 \\ 0 & -3 & -6 & -12 \end{bmatrix}$$

$$= \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 & 10 \\ 0 & 1 & 2 & 4 \end{bmatrix} \sim \begin{bmatrix} 1 & 0 & -1 & 2 \\ 0 & 1 & 2 & 4 \end{bmatrix}$$

$$\therefore x_1 - x_3 = 2$$

$$x_2 + 2x_3 = 4$$

$$\therefore x_1 = 2 + x_3; \quad x_2 = 4 - 2x_3$$

இதில் x_3 -ஐச் சாரா மாதி (parameter) t ஆகக் கொண்டு $[2+t, 4-2t, t]$ என்பது தீர்வுக் குழு எனக் கூறலாம்.

தீர்வுக் குழுவின் ரூபம் வெவ்வேறு இருக்கலாம்; ஆனால் மதிப்பு ஒன்றே.

இதே கணக்கில் x_3 லும் x_2 லும் மாத்தி,

$$x_1 + 2x_2 + 2x_3 = 10$$

$$4x_1 + 5x_2 + 5x_3 = 28 \text{ என எழுதுவோம்.}$$

$$\text{இப்பொழுது } [AB] = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 2 & 10 \\ 4 & 5 & 5 & 28 \end{bmatrix}$$

$$\sim \begin{bmatrix} 1 & 2 & 2 & 10 \\ 0 & -3 & -6 & -12 \end{bmatrix} \sim \begin{bmatrix} 1 & 2 & 2 & 10 \\ 0 & 1 & 2 & 4 \end{bmatrix}$$

$$\sim \begin{bmatrix} 1 & 0 & -2 & 2 \\ 0 & 1 & 2 & 4 \end{bmatrix}$$

$$\therefore x_1 + \frac{x_2}{2} = 4$$

$$x_2 + \frac{x_3}{2} = 2$$

$$\therefore x_1 = 4 - \frac{x_2}{2}; \quad x_2 = 2 - \frac{x_3}{2}$$

இதில் x_3 ஐச் சரஸ் மாநி n ஆகக் கொண்டால்,

$$\left[4 - \frac{n}{2}, \quad n, \quad 2 - \frac{n}{2} \right] \quad \dots \quad (2)$$

என்பது தீர்வுக் குழு ஆகும்.

(1)-ல் $4 - \frac{n}{2} = n$ என்று போட்டால் (2) கிடைக்கும் என்பதை நோக்கு:

$$\text{மீண்டும் } p(A) = p(AB) = 2 = r$$

$$n = 2 \quad n = 8$$

ஆகவே நாம் புறக்கணிக்கக் கூடிய தீர்வுகள்

$$= n - r = 2 - 2 = 0$$

இதில் உள்ள சரஸ் மாநி $n - r = 8 - 2 = 6$ என்பதையும் கவனி.

மாதிரி 2 : விடுவி :

$$x_1 + 2x_2 + 3x_3 - x_4 = 10$$

$$2x_1 - x_2 - 2x_3 + 3x_4 = 6$$

$$\text{பெரிதாக்கிய } A = [AB] = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 & -1 & 10 \\ 2 & -1 & -2 & 3 & 6 \end{bmatrix}$$

$$\sim \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 & -1 & 10 \\ 0 & -5 & -8 & 5 & -14 \end{bmatrix}$$

$$\sim \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 & -1 & 10 \\ 0 & 1 & \frac{8}{5} & -1 & \frac{14}{5} \end{bmatrix}$$

$$\sim \begin{bmatrix} 1 & 0 & -\frac{1}{5} & 1 & \frac{32}{5} \\ 0 & 1 & \frac{8}{5} & -1 & \frac{14}{5} \end{bmatrix}$$

$$\therefore x_1 - \frac{x_3}{8} + x_4 = \frac{3}{8}$$

$$x_3 + \frac{8x_3}{8} = x_4 = \frac{1}{2}$$

$$\therefore x_1 = \frac{x_3}{8} - x_4 + \frac{3}{8}$$

$$x_1 = -\frac{8x_3}{8} + x_4 + \frac{1}{8}$$

$\therefore x_3, x_4$ இ மூன்றையே t, u என்ற சார மாறிகளாகக் கொண்டு, தீர்வுக் குழுவை

$$\left[\frac{t}{8} - u + \frac{22}{8}, -\frac{8t}{8} + u + \frac{14}{8}, t, u \right]$$

என எழுதலாம்.

ஒரு குறிப்பிட்ட தீர்வுக் காண $t = 8, u = 4$ என்று போடு. $[1, 2, 8, 4]$ என்ற விடை கிடைக்கிறது.

இதில் $u = 4$ ஆனால் $t = 2$.

$\therefore$ தவிர வேண்டிய சார மாறிகள் $u - t = 4 - 2 = 2$ என்பதைக் கவனி.

$$\text{மாதிரி 3: } x_1 + 3x_2 - 2x_3 = 0$$

$$x_1 + x_3 + 2x_3 = 6$$

என்பதற்கு ஒரு குறிப்பிட்ட தீர்வு கண்டு, அதிலிருந்து தீர்வுக் குழுவின் பொது ரூபத்தைக் கண்டுபிடி.

x_1 -க்கு தாம் ஏதாவதும் எதிர்ப்புக் கொடுத்து பின் x_2, x_3 ஐக் கண்டுபிடிப்போம்.

$x_1 = 1$ என வை. அப்படியானால் $x_2 = 1, x_3 = 2$. அதாவது $X_0 = [1, 1, 2]$ என்பது ஒரு குறிப்பிட்ட தீர்வுக் குழு. இனி $AX = 0$ என்பதை விடுவித்தால் போதுமானது.

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 3 & -2 \\ 1 & 1 & 2 \end{bmatrix} \sim \begin{bmatrix} 1 & 3 & -2 \\ 0 & -2 & 4 \end{bmatrix}$$

$$\sim \begin{bmatrix} 1 & 3 & -2 \\ 0 & 1 & -2 \end{bmatrix} \sim \begin{bmatrix} 1 & 0 & 4 \\ 0 & 1 & -2 \end{bmatrix}$$

$$\therefore x_1 + 4x_2 = 0; \quad x_2 - 2x_3 = 0$$

$$\therefore x_1 = -4x_2; \quad x_2 = 2x_3$$

x_3 ஐ t என்ற சார மாறியாகக் கொண்டால், $[-4t, 2t, t]$ என்பது தீர்வுக் குறு ஆகும்.

$$\begin{aligned} \therefore AX &= B \text{ என்பதன் தீர்வுக் குறு} \\ &= [-4t, 2t, t] + [1, 1, 2]^t \\ &= [1-4t, 1+2t, 2+t]^t \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{மாதிரி 4: } x_1 + x_2 + x_3 &= 6 \\ x_1 + 2x_2 + 3x_3 &= 10 \\ x_1 + 2x_2 + px_3 &= q \end{aligned}$$

என்னும் சமன்பாடுகளில்,

- (i) தீர்வு காண இயலாவிட்டால்
- (ii) ஒரே தீர்வு இருந்தால்
- (iii) எண்ணற்ற தீர்வுகள் இருந்தால் p, q -ன் மதிப்பைக் கண்டுபிடி.

$$\text{முன்கூறுகள் அணி } A = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 3 \\ 1 & 2 & p \end{bmatrix}$$

$$\text{பெரிதாக்கிய } A = [AB] = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 6 \\ 1 & 2 & 3 & 10 \\ 1 & 2 & p & q \end{bmatrix}$$

$$\sim \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 6 \\ 0 & 1 & 2 & 4 \\ 0 & 1 & p-1 & q-6 \end{bmatrix} \sim \begin{bmatrix} 1 & 0 & -1 & 2 \\ 0 & 1 & 2 & 4 \\ 0 & 0 & p-3 & q-10 \end{bmatrix}$$

(i) $p(A) \neq [AB]$ ஆனும் தீர்வு காண இயலாது.

$$p = 3 \text{ ஆனால் } p(A) = 2$$

$$q \neq 10 \text{ ஆனால் } p[AB] = 3.$$

$\therefore p = 3, q \neq 10$ ஆனும் தீர்வு இல்லை.

(ii) $p \neq 3$ ஆனால் A ஓர் ஒழுங்கணி.

$\therefore 3 \times 3$ -ன் படி ஒரே தீர்வுதான் உண்டு.

(iii) $p = 3$ ஆகவும், $q = 10$ ஆகவும் இருந்தால் $p(A) = 2$
 $= p[AB] = r$ ஆனால், $n = 3$.

$\therefore$ இதற்கு எண்ணற்ற தீர்வுகள் உண்டு.

மாதிரி 5 :

$$\left. \begin{aligned} a_1x + b_1y + c_1z &= d_1 \\ a_2x + b_2y + c_2z &= d_2 \\ a_3x + b_3y + c_3z &= d_3 \end{aligned} \right\} \quad \dots \quad \dots \quad (1)$$

என்னும் தளங்களின் (planes) சமன்பாடுகளுக்குத் தீர்வு கண்டு
 அவை எவ்வாறு அமைந்துள்ளன என்பதைக் கண்டுபிடி.

$$A = \begin{bmatrix} a_1 & b_1 & c_1 \\ a_2 & b_2 & c_2 \\ a_3 & b_3 & c_3 \end{bmatrix}; [AB] = \begin{bmatrix} a_1 & b_1 & c_1 & d_1 \\ a_2 & b_2 & c_2 & d_2 \\ a_3 & b_3 & c_3 & d_3 \end{bmatrix}$$

(i) $p(A) = p[AB] = 3 = r$

ஆனால் (i) க்கு ஒரே தீர்வுதான் உண்டு,

$\therefore 3$ தளங்களும் ஒரே புள்ளியில் வெட்டுகின்றன.

(ii) $p(A) = p[AB] = 2$

இப்பொழுதும் தீர்வு உண்டு. மேலும் $n = 3$ ஆனால் $r = 2$
 ஆனதால் விடைமீல் ஒரு சாரா மாதி இருக்க முடியும்.
 $\therefore 3$ தளங்களும் ஒரு நேர் கோட்டில் (ஒரு பரிமாணம்=single
 dimension) வெட்டிக் கொள்ள வேண்டும்.

$$(iii) \quad p(A) = p[AB] = 1$$

இப்பொழுதும் தீர்வு உண்டு. மேலும் $n = 3$ ஆனால் $r = 1$ ஆனதால் விடைகளில் இரு சார மாதிகள் இருக்க முடியும். ஆகவே விடை 2 பரிமாணம் (சதுர அளவு) உள்ளது. $\therefore 3$ தளங்களும் ஒரே தளத்தில் அமைவ வேண்டும். ஆகவே தளத்தில் உள்ள எல்லாப் புள்ளிகளில் கூறுகளும் (co-ordinates) தீர்வுக் குறையில் அமைவும்.

$$(iv) \quad p(A) = 2, \quad p[AB] = 3, \quad \text{தீர்வு இல்லை.}$$

$$p(A) = 2 \text{ ஆனதால்,}$$

$a_3 = k_1a_1 + k_2a_2$ ஆகவும், $b_3 = k_1b_1 + k_2b_2$ ஆகவும், $c_3 = k_1c_1 + k_2c_2$ ஆகவும் இருக்க வேண்டும். ஆனால் $p[AB] = 3$ ஆனதால் $d_3 = k_1d_1 + k_2d_2$ ஆக இருக்க முடியாது.

$\therefore 3$ ஆம் தளத்தை

$$k_1(a_1x + b_1y + c_1z) + k_2(a_2x + b_2y + c_2z) = k(\neq k_1d_1 + k_2d_2)$$

என எழுதலாம்.

இத்தச் சமன்பாட்டில் இருத்து 3 ஆம் தளமானது முதலிரண்டு தளங்கள் வெட்டும் கோட்டுக்கு இணையாக உள்ளது எனத் தெரிகிறது.

$\therefore 3$ தளங்களும் ஒரு பட்டகம் (Prism) உண்டாக்குகின்றன எனக் கூறலாம்.

$$(v) \quad p(A) = 1, \quad p[AB] = 3 \quad \text{தீர்வு இல்லை.}$$

இவ்வாறு இருக்க இயலாது.

(vi) $p(A) = 1; p[AB] = 2$. தீர்வு இல்லை. இப்பொழுது எல்லாத் தளங்களும் இணையாக இருக்கும்.

உதாரணம் :

$$x + 2y + 3z = 5$$

$$x + 2y + 3z = 3\frac{1}{2}$$

$$x + 2y + 3z = 17$$

$$AB = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 & 5 \\ 1 & 2 & 3 & 8\frac{1}{2} \\ 1 & 2 & 3 & 17 \end{bmatrix} \sim \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 & 5 \\ 0 & 0 & 0 & 4\frac{1}{2} \\ 0 & 0 & 0 & 8 \end{bmatrix} \dots$$

$\rho[AB] = 2$ எனக் கொள்வாயோ? (v) இப் படி.

$$[AB] \sim \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 & 5 \\ 0 & 0 & 0 & 4\frac{1}{2} \\ 0 & 0 & 0 & 8 \end{bmatrix} \therefore R_{33}(-\frac{1}{2})$$

(vii) $\rho(A) = 1$; $\rho[AB] = 1$

இப்பெளத்த சமன்பாடு தளமும் ஒரே தளம் தான்!

மாதிரி 6 : விடுக :

$$x_1 + x_2 + x_3 + x_4 = 0$$

$$x_1 + 2x_2 + 3x_3 + 4x_4 = 0$$

$$2x_1 + x_2 \quad \quad \quad = x_4 = 0$$

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 3 & 4 \\ 2 & 1 & 0 & -1 \end{bmatrix} \sim \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 2 & 3 \\ 0 & -1 & -2 & -2 \end{bmatrix}$$

$$\sim \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 2 & 3 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \sim \begin{bmatrix} 1 & 0 & -1 & -2 \\ 0 & 1 & 2 & 3 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

$$\therefore x_1 - x_3 - 2x_4 = 0; \quad x_2 + 2x_3 + 3x_4 = 0$$

$$\therefore x_1 = 1 + 2t; \quad x_2 = -2t - 3t$$

இதில் x_3, x_4 இல் t என்கிற சார்பு மாறிகளாகக் கொண்டுள்ளோம்.

$$\rho(A) = 2 = r; \quad n = 4$$

$$\therefore n - r = 2$$

$\therefore$ இதில் 2 சுதந்திர மாறிகள் உள்ளன.

மாதிரி 7 :

$$2x_1 + 8x_2 + 11 = 0$$

$$6x_1 + 20x_2 - 8x_3 = -8$$

$$8x_2 - 18x_3 + 1 = 0$$

என்பவை முரண்பாடான சமன்பாடுகள் என திரும்பி,

A என்பது குணகங்கள் அணிபாணம்

$$\text{பெரிதாக்கிய } [AB] = \begin{bmatrix} 2 & 8 & 0 & -11 \\ 6 & 20 & -8 & -8 \\ 0 & 8 & -18 & -1 \end{bmatrix}$$

$$\sim \begin{bmatrix} 1 & 8 & 0 & -11 \\ 6 & 20 & -8 & -8 \\ 0 & 8 & -18 & -1 \end{bmatrix}$$

$$\sim \begin{bmatrix} 1 & 8 & 0 & -11 \\ 0 & 8 & -8 & 80 \\ 0 & 8 & -18 & -1 \end{bmatrix} \sim \begin{bmatrix} 1 & 8 & 0 & -11 \\ 0 & 1 & -8 & 15 \\ 0 & 8 & -18 & -1 \end{bmatrix}$$

$$\sim \begin{bmatrix} 1 & 0 & 8 & -101 \\ 0 & 1 & -8 & 15 \\ 0 & 0 & 0 & -91 \end{bmatrix}$$

$$\therefore \rho(A) = 2 \text{ ஆனால் } \rho[AB] = 3$$

$\therefore$ இந்தச் சமன்பாடுகளுக்குத் தீர்வு இல்லை.

மாதிரி 8 : A என்ற n -சதுர அணி பூச்சிய அணியல்ல. ஆனால் $|A| = 0$. அப்படியானால் $B (\neq 0)$ என்றும் அணியானால் $AB = 0$ என்பதற்கிணங்க இருக்கும்படி கண்டுபிடிக்க இயலும் என திரும்பி.

நிபுணம் : $B_1, B_2, \dots, B_r$ என்றன B -ன் திரல் அணி
காரக இருக்கிறது.

$$AB=0 \quad \dots \quad \dots \quad \dots \quad \dots \quad \dots \quad (Gardner)$$

$$\therefore AB_1=0, AB_2=0, \dots, AB_n=0$$

இதில் $AB_1 = 0$ ஐ எடுத்துக் கொள்வோம்.

$$a_{11}b_{11} + a_{12}b_{12} + \dots + a_{1n}b_{1n} = 0$$

$$a_{g1} b_{11} + a_{g2} b_{21} + \dots + a_{gn} b_{n1} = 0$$

$$a_{n1}b_{11} + a_{n2}b_{21} + \dots + a_{nn}b_{n1} = 0$$

$$\mathbb{E}[\mathbf{A} \mid \text{contrasting effect absent}] = \mathbf{0}$$

∴ இதனை விடுவிக்கும்போது பூச்சியமல்லாத தீர்வுக் குழு
உண்டாகும்.

11. 20

340

குறிப்பு: இதேவிதமாக $B_1, B_2, \dots, B_n$ கண்டு பிடித்தால் B கண்டு பிடித்து விடலாம்.

11909 8

1. **afgader** :

$$(i) \quad x_1 + 2x_2 + 3x_3 + 4x_4 = 5$$

$$\begin{aligned} \text{(ii)} \quad & x_1 + 2x_2 + 3x_3 = 6 \\ & 2x_1 + 4x_2 + 6x_3 = 6 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{(iii)} \quad & x_1 + 2x_2 + 3x_3 = 5 \\ & 2x_1 + 4x_2 + 5x_3 = 9 \\ & 5x_1 + 6x_2 + 7x_3 = 12 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{(iv)} \quad & x_1 + 2x_2 + 3x_3 = 8 \\ & 2x_1 - x_2 - 2x_3 = 2 \\ & 3x_1 + x_2 + x_3 = 13 \end{aligned}$$

2. கீழ்க்கரும் சமன்பாடுகளைக் கூடுமானால் விடுவி :

$$(i) \quad x_1 + 2x_2 + x_3 + x_4 = 5$$

$$2x_1 - x_2 + 3x_3 - 2x_4 = 2$$

$$4x_1 + 3x_2 + 5x_3 = 7$$

$$(ii) \quad x - y + 2z = 1$$

$$x - y - z = 2$$

$$x - y + 3z = 0$$

$$(iii) \quad \frac{x}{2} + \frac{y}{3} + \frac{z}{4} = 12.5$$

$$\frac{x}{2} + \frac{y}{4} + \frac{z}{5} = 15.5$$

$$x + y + z = 39$$

$$(iv) \quad 4x - 3y + 2z = 8$$

$$3x + 2y - 5z = 9$$

$$-x + 4y + 3z = 8$$

$$(v) \quad w + 2x + 3y + 4z = 29$$

$$w - 22x + y + 2z = 7$$

$$3w - 2x + 5y + 6z = 43$$

$$(vi) \quad w + x + y + z = 0$$

$$w - 3x - y - z = 0$$

$$4w + 2y + 3z = 0.$$

$$(vii) \quad x + y + z = 1$$

$$x + 2y + 3z = 4$$

$$x + 3y + 5z = 7$$

$$x + 4y + 7z = 10$$

$$(viii) \quad 3w + 4x - y - 2z = 0$$

$$2x + 3y + 2z - 3w = 0$$

$$2x + y - 14z - 8w = 0$$

$$x + 3y + 13z + 3w = 0.$$

$$\begin{aligned} 3. \quad x_1 + x_2 + x_3 &= 1 \\ x_1 + 2x_2 + 4x_3 &= k \\ x_1 + 4x_2 + 10x_3 &= k^2 \end{aligned}$$

என்ற சமன்பாடுகளைத் தீர்க்க, k -க்கு எந்த மதிப்பைக் இருக்கவாம்? தீர்மானமும் கண்டுபிடி.

$$\begin{aligned} 4. \quad kx + 2y - 2z &= 1 \\ 4x + 2ky - z &= 2 \\ 6x + 3y + kz &= 3 \end{aligned}$$

என்ற சமன்பாடுகளை விடுவி. $k=2$ ஆனால் தீர்வு என்ன?
[Ans : $\frac{1}{2}, 0, 0$]

$$\begin{aligned} 5. \quad x+ay+a^2z &=a^3+\lambda a^2 \\ x+by+b^2z &=b^3+\lambda b^2 \\ x+cy+c^2z &=c^3+\lambda c^2 \end{aligned}$$

இதில் $a \neq b$; $b \neq c$; $c \neq a$ என்று கொடுக்கப்பட்டுள்ளது.

- (i) $a+b+c=0$ ஆனால் தீர்வு எவ்வாறு இருக்கும்?
(ii) இல்லாவிடில் எவ்வாறு இருக்கும் எனக் கண்டுபிடி.

6. மின்னாற்றம் சமன்பாடுகள் ஓரண்பாடு இல்லாமல் இருக்கும் வண்ணம் k -ன் மதிப்பைக் கண்டுபிடி.

$$\begin{aligned} 2x + ky - 2 &= 0; \quad kx - 3y + k + 4 = 0 \\ 2x - y + 4 &= 0. \end{aligned}$$

7. விடுவி :

$$\begin{aligned} x + 2y + 3z &= \lambda x \\ 3x + y + 2z &= \lambda y \\ 2x + 3y + z &= \lambda z \end{aligned}$$

இதற்கு, பூச்சியமற்றத வேறு தீர்வு கண்டு $\lambda = 6$ ஆக இருக்கவேண்டும் என நிரூபி.

$$\begin{aligned} 8. \quad 2w - 3x + 4y + z &= 0 \\ w + y - z &= 0 \\ 3w - 2x + 5y &= 0 \\ 4w - 2x + 3y - z &= 0 \end{aligned}$$

என்பதற்கு இரண்டே தீர்வுக் குறுக்கீசத் தாம் உண்டெனவும், ஏனைய தீர்வுகள் இவைவிரண்டின் ஒருபடியில் கூட்டுகள் (Linear combinations) எனவும் திருபி.

9. $AX=0$ என்பதற்கும் பூச்சியமல்லாத தீர்வு காண, வேண்டிய பௌதிய நிபத்தனை $\rho(A) < n$ (இதில் n என்பது நிரல்களின் எண்ணிக்கை) என திருபி.

10. n ஊறிகளில் m -சமன்பாடுகள் ஒருபடியில் ஒரே படியில் கொடுக்கப்பட்டுள்ளன. $n > m$ ஆனால் பூச்சியமில் தீர்வு காண இயலும் என திருபி.

11. வெவியது $\{r(A), r(B)\} \leq r(AB) \leq r(A) + r(B)$ என திருபி.

12. பின்வரும் தளங்கள் ஒரே நேர் கோட்டில் வெட்டிக் கொள்ள நிபத்தனை என்ன?

$$bx + ay - z = 0$$

$$cy + bz - x = 0$$

$$ax + cx - y = 0$$

விடைகள்

1. (i) $x_1 = -2t - 3u - 4v + 5$; $x_2 = t$; $x_3 = u$; $x_4 = v$

(ii) $x_1 = t$; $x_2 = 1 - 2t$; $x_3 = 1 + t$

(iii) $x_1 = t$; $x_2 = 1 - 2t$; $x_3 = 1 + t$

(iv) $x_1 = 3$; $x_2 = 2$; $x_3 = 1$

2. (i) முற்றானவை

(ii) முற்றானவை

(v) $x = t$, $y = -2t$, $z = t$

(viii) $x = t - 2$, $y = 5 - 2t$, $z = t$

(ix) $w = 11t + 6u$

$x = -3t - 3u$

$y = t$, $z = u$

4. $\frac{1}{2}$, 0, 0

6. $k = 8, 14$

9. ஒரு படியில் மாறி மாற்றங்கள்

(Linear Transformations)

9-0. இந்த அதிகாரத்தைப் படிக்கும் முன்பு, வெக்டர்கள், அடிப் படைக் குறுக்கங்கள், கூறுகள் பற்றிய கருத்துகளை நினைவுபடுத்திக் கொள்ளத் தயார். 7-8-ல் இருந்து 7-10 வரை உள்ளவற்றை வாவது மீண்டும் படித்தல் தயார்.

$$9-1. A = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \dots & a_{2n} \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ a_{n1} & a_{n2} & \dots & a_{nn} \end{bmatrix}$$

ஆக இருக்கட்டும். மேலும்,

$$X = [x_1, x_2, \dots, x_n]$$

$$Y = [y_1, y_2, \dots, y_n] \text{ என்பன}$$

2n வெக்டர்களாக இருக்கட்டும். இவற்றின் கூறுகள் (co-ordinates) ஒரே அடிப்படைக் குறுக்கை (same basis) சார்ந்த தன்மையாக இருக்கட்டும். இப்பொழுது,

$$y_1 = a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \dots + a_{1n}x_n$$

$$y_2 = a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + \dots + a_{2n}x_n$$

$$\dots \dots \dots \dots \dots$$

$$y_n = a_{n1}x_1 + a_{n2}x_2 + \dots + a_{nn}x_n$$

ஆக இருத்தல்,

$$Y = AX \quad \dots \quad \dots \quad \dots \quad \dots \quad (1)$$

என எழுதலாம். X-ன் சிம்பயசன் (Image) Y-ஐ (1)-லிருந்து பெறுகிறோம். A ஐ மாறி மாற்ற ஆணி (Matrix of transformation) என்று சொல்வோம்.

(i) X_1, X_2 -ன் மீம்பங்கள் Y_1, Y_2 ஆனால் $(X_1 + X_2)$ -ன் மீம்பம் $(Y_1 + Y_2)$ ஆக இருக்கும்;

(ii) X_1 -ன் மீம்பம் Y_1 ஆனால், kX_1 -ன் மீம்பம் kY_1 ஆக இருக்கும்

என்பவை (1) எண்பாட்டிலிருந்து தெளிவாகத் தெரிகிறது. ஆதலால் இதை ஒருபடியில் (linear) மாறி மாற்றம் என அழைக்கிறோம்.

(i) ஐவும் (ii) ஐவும் இணைத்து

(iii) $(k_1 X_1 + k_2 X_2)$ -ன் மீம்பம் $k_1 Y_1 + k_2 Y_2$ என்று சொல்வதும் உண்டு.

உதாரணம் 1 :

$$A = \begin{bmatrix} 2 & 3 & 5 \\ 1 & 0 & 1 \\ 2 & 1 & 0 \end{bmatrix} \text{ ஆனால்,}$$

$Y = AX$ என்பதில் இருந்து $X = [1, 0, 2]^T$ -ன் மீம்பத்தைக் கண்டுபிடி.

$$Y = \begin{bmatrix} 2 & 3 & 5 \\ 1 & 0 & 1 \\ 2 & 1 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 12 \\ 3 \\ 2 \end{bmatrix}$$

உதாரணம் 2 :

ஒரு வெக்டரின் மீம்பம் $[12, 3, 2]^T$ ஆனால் மூத்தின மாறி மாற்ற அணிமீன் துணை கொண்டு அந்த வெக்டரைக் கண்டுபிடி.

$$Y = AX$$

$$\therefore A^{-1}Y = X.$$

$$\text{பெரிதாக்கிய } A = [AY] = \begin{bmatrix} 2 & 3 & 5 & 12 \\ 1 & 0 & 1 & 3 \\ 2 & 1 & 0 & 2 \end{bmatrix}$$

$$\begin{aligned}
 [AY] &= \begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 & 3 \\ 2 & 3 & 5 & 12 \\ 2 & 1 & 0 & 2 \end{bmatrix} \sim \begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 & 3 \\ 0 & 3 & 3 & 6 \\ 0 & 0 & -2 & -4 \end{bmatrix} \\
 &\sim \begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 & 3 \\ 0 & 1 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 1 & 2 \end{bmatrix} \sim \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 2 \end{bmatrix}
 \end{aligned}$$

$$\therefore X = [1, 0, 2]$$

குறிப்பு: கடைசியாக உள்ள அணியில் $I = AA^{-1}$ முதல் மூன்று நிரல்களாக உள்ளது. கடைசி நிரல் Y . A ஐ A^{-1} ஆல் பெருக்கினால்தான் I கிடைக்கும்.

$\therefore Y$ ஐவும் A^{-1} ஆல் பெருக்கியுள்ளோம்.

$$\therefore A^{-1}Y = X$$

நாங்கள் வந்து நிரலில் கிடைக்கிறது.

9.2. இரு மாழி மாற்றங்களின் விளைவு

$X = AY$ ஆகவும்; $Y = BZ$ ஆகவும் இருத்தால் $X = ABZ$ ஆகும்.

2-21 ஐப் பார்த்து, நாம் அணிகளின் பெருக்கல் விதியை, இதைத் கருத்தில் கொண்டுதான் வரையறுத்தோம் என்பதை நினைவுபடுத்துகிறோம்.

9.3. V_n என்ற n வெக்டர் வெளிக்ரு.

$$E_1 = [1, 0, \dots, 0]^T; \quad E_2 = [0, 1, 0, \dots, 0]^T;$$

$$E_n = [0, 0, \dots, 1]^T$$

என்னும் அலகு (unit) வெக்டர்கள் முக்கியமான அடிப்படைக் குழு (basis) ஆகும்.

$X = [c_1, c_2, \dots, c_n]^T$ என்ற வெக்டரை $X = c_1E_1 + c_2E_2 + \dots + c_nE_n$ என ஒரே மூலையில்நான் எழுத இயலும். $c_1, c_2, \dots, c_n$ -ஐ E -ஐ அடிப்படைவாகக் கொண்ட X -ன் கூறுகள் (co-ordinates) எனக் கூறுகள் $E = [E_1, E_2, \dots, E_n]$.

இப்பொழுது, $F_1, F_2, \dots, F_n$ என்பது V_n உடைய மத்ரேஸ் அடிப்படைக் குழுவாக இருக்கட்டும். அப்படியானால்

$$X = f_1 F_1 + f_2 F_2 + \dots + f_n F_n$$

என எடுத்துவர, $f_1, f_2, \dots, f_n$ என்பன $F = [F_1, F_2, \dots, F_n]$ இ அடிப்படையாகக் கொண்ட X -ன் கூறுகள்.

$$X_F = [f_1, f_2, \dots, f_n] \text{ ஆகும்,}$$

$$X = [F_1 F_2 \dots F_n] X_F$$

$$= F X_F$$

F என்றும் அணிமிக் உள்ள திரிக்கள் $F_1, F_2, \dots, F_n$ என்ற அடிப்படை வெக்டர்கள் ஆகும்.

உதாரணம் 3: $F_1 = [8, 2, 4]^T$; $F_2 = [1, 0, 2]^T$; $F_3 = [1, -1, -1]^T$ ஆகவை V_3 -ன் அடிப்படைக் குழுவாகவும், $X_F = [1, 2, -1]^T$ ஆகவும் இருத்தால் X_F -ஐக் கண்டுபிடி.

$$X = X_F = F X_F = [F_1 F_2 F_3] X_F$$

$$= \begin{bmatrix} 8 & 1 & 1 \\ 2 & 0 & -1 \\ 4 & 2 & -1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ -1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 4 \\ 8 \\ 9 \end{bmatrix}$$

$$= [4 \ 8 \ 9]^T$$

இனி, $G = [G_1, G_2, \dots, G_n]$ என்பது V_n உடைய மத்ரேஸ் அடிப்படைக் குழுவாகவும், $X_G = [x_1, \dots, x_n]^T$ ஆகவும் இருத்தால்

$$X = [G_1 G_2 \dots G_n] X_G = G X_G \quad \dots \quad (1)$$

$$\text{மேலும் } X = F X_F$$

$$\therefore F X_F = G X_G$$

$$\therefore X_G = G^{-1} F X_F$$

$$= P X_F, \quad \text{இதில் } P = G^{-1} F.$$

எனவே, V_n என்ற வெக்டர் வெளிக் கு F, G என்ற இரண்டு அடிப்படைக் குழுக்கள் இருத்தால் P என்ற அணியை $X_G = P X_F$ என இருக்குமாடி கண்டுபிடிக்கலாம்.

2.4. அடிப்படைக் குழுவின் மாற்றம்

F ஐ அடிப்படைக் குழுவாகக் கொண்டு

$$Y_F = AX_F$$

என்ற ஒருபடி மாற்றம் (linear transformation) இருக்கட்டும். அடிப்படைக் குழுவை F -லிருந்து G ஆக மாற்ற: X_G, Y_G என்பன மூன்றையே X_F, Y_F -ல் புதிய கூறுகளாக இருக்கட்டும். அப்படியானால்,

$$X_G = PX_F$$

$$Y_G = PY_F$$

என்பதற்கான P என்ற அணி இருக்கும். இப்பொழுது, $P^{-1} = Q$ ஆனால்,

$$X_F = QX_G; Y_F = QY_G$$

என்று கிடைக்கும்.

$$\therefore Y_G = Q^{-1}Y_F = Q^{-1}AX_F = Q^{-1}AQX_G$$

$$\text{அதாவது, } Y_G = BX_G$$

$$\text{இதில் } B = Q^{-1}AQ.$$

இதிலான இருத்தல் A, B ஆகியவற்றை வடிவொத்த அணிகள் என்று சொல்வோம்.

10. சிறப்பியல்புச் சமன்பாடுகள்

10-1. $A = [a_{ij}]$ என்ற n -சதுர அணியால் $Y = AX$ என்ற மாறி மாற்றத்தைச் செய்யப்போது $X = [x_1 x_2 \dots x_n]'$ என்ற வெக்டர் $Y = [y_1 y_2 \dots y_n]'$ என்னும் வெக்டர் ஆகின்றது.

இப்பொழுது, இந்த மாற்றத்தால் X ஆனது λX ஆவது எப்போது என ஆராய்வோம். λ ஒரு திசையினி (scalar) என்பதை நினைவிற் கொள்க.

X என்னும் பூச்சியமில் வெக்டர், $AX = \lambda X$ என்பதற்க்கணக்க இருத்தால் X ஐ மாற்றமீனா வெக்டர் ஆவது சிறப்பியல்பு வெக்டர் என்றும், λ ஐச் சிறப்பியல்பு மூலம் என்றும் சொல்வோம்.

குறிப்பு 1. கொடுக்கப்பட்ட ஒரே சிறப்பியல்பு வெக்டருக்கு, இரண்டு சிறப்பியல்பு மூலங்கள் இருக்க முடியாது.

ஏனெனில்,

$$AX = \lambda_1 X; AX = \lambda_2 X; \lambda_1 \neq \lambda_2 \text{ ஆக இருத்தால்,}$$

$$\lambda_1 X = \lambda_2 X \text{ ஆகும்.}$$

$$\therefore (\lambda_1 - \lambda_2) X = 0 \quad \dots \quad \dots \quad \dots \quad (1)$$

ஆனால் $\lambda_1 \neq \lambda_2; X \neq 0$

$$\therefore (\lambda_1 - \lambda_2) X \neq 0 \quad \dots \quad \dots \quad \dots \quad (2)$$

(1)-ம் (2)-ம் எதிர்மாதையானவை.

$$\therefore \lambda_1 = \lambda_2.$$

குறிப்பு 2. ஒரே சிறப்பியல்பு மூலத்திற்குப் பல்வேறு சிறப்பியல்பு வெக்டர்கள் உடன்பாடாக இருக்கலாம்.

ஏனெனில், $AX = \lambda X$ ஆனால்,

$$A(kX) = \lambda(kX)$$

$\therefore kX$ -ம் ஒரு சிறப்பியல்பு வெக்டர்.

X -ம், kX -ம் ஒன்றையொன்று சார்ந்தவை (dependent) என்பதையும் நோக்கുക.

19-2 சிறப்பியல்புச் சமன்பாடு

$AX = \lambda X = \lambda IX$ என இருக்கட்டும்.

$$\therefore (A - \lambda I)X = 0.$$

$$\therefore \begin{bmatrix} (a_{11}-\lambda) & a_{12} & \dots & a_{1n} \\ a_{21} & (a_{22}-\lambda) & \dots & a_{2n} \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ a_{n1} & a_{n2} & \dots & (a_{nn}-\lambda) \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \dots \\ x_n \end{bmatrix} = 0$$

இதில் $|A - \lambda I| = 0$ ஆக இருக்கவேண்டும்.

$\therefore X$ என்பது பூச்சிய வெக்டர் அல்ல.

$$\therefore \begin{bmatrix} (a_{11}-\lambda) & a_{12} & \dots & a_{1n} \\ a_{21} & (a_{22}-\lambda) & \dots & a_{2n} \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ a_{n1} & a_{n2} & \dots & (a_{nn}-\lambda) \end{bmatrix} = 0.$$

இதனைச் சிறப்பியல்புச் சமன்பாடு என வரையறை செய்கோம். இதன் மூலக்கருத்துச் சிறப்பியல்பு மூலக்கள் என்று பெயர் இருக்கோம்.

உதாரணம் 1. பின் வரும் அணிபின் சிறப்பியல்பு மூலக் களைக் காண்போம்.

$$\begin{bmatrix} 2 & -2 & 2 \\ 1 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & -1 \end{bmatrix}$$

இதனுடைய சிறப்பியல்புச் சமன்பாடு

$$\begin{vmatrix} 2-\lambda & -2 & 2 \\ 1 & 1-\lambda & 1 \\ 1 & 2 & -1-\lambda \end{vmatrix} = 0 \text{ ஆகும்.}$$

இதனை விரித்தெழுதினால்

$$\lambda^3 - 2\lambda^2 - 4\lambda + 8 = 0.$$

என்று கிடைக்கும். இதனுடைய மூலங்கள், அதாவது, சிறப்பியல்பு மூலங்கள் 2, 2, -2 என எளிதே கண்டு பிடிக்கலாம்.

உதாரணம் 2. ஒரு சம மூலை வரை அணிவின் சிறப்பியல்பு மூலங்கள் அதன் மூலைவிட்ட உறுப்புகள் என திரும்பி.

$$A = \begin{bmatrix} a_{11} & 0 & \dots & 0 \\ 0 & a_{22} & \dots & 0 \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ 0 & 0 & \dots & a_{nn} \end{bmatrix}$$

என்பது ஒரு சம மூலை வரை அணிவாக இருக்கட்டும். இதன் சிறப்பியல்புச் சமன்பாடு

$$\begin{vmatrix} (a_{11}-\lambda) & 0 & \dots & 0 \\ 0 & (a_{22}-\lambda) & \dots & 0 \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ 0 & 0 & \dots & (a_{nn}-\lambda) \end{vmatrix} = 0$$

ஆகும். இதனை விரித்தெழுத,

$(a_{11}-\lambda)(a_{22}-\lambda) \dots (a_{nn}-\lambda) = 0$ ஆகும். இதன் மூலங்கள் $a_{11}, a_{22}, \dots, a_{nn}$ என்ற மூலைவிட்ட உறுப்புகளாகும்.

இதேவிதமாக, ஒரு மூக்கோண அணிவின் சிறப்பியல்பு மூலங்களும் அதன் மூலைவிட்ட உறுப்புகள்தான் என திரும்பிக்கலாம்.

உதாரணம் 3: A' என்பது A -ன் திரும்பு அணி ஆனால் A' -ன் சிறப்பியல்பு மூலங்கள் A -ன் சிறப்பியல்பு மூலங்கள் என திரும்பி.

$$A = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \dots & a_{2n} \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ a_{n1} & a_{n2} & \dots & a_{nn} \end{bmatrix}$$

ஆக இருக்கட்டும். இதன் சிறப்பியல்புச் சமன்பாடு

$$\begin{vmatrix} (a_{11}-\lambda) & a_{12} & \dots & a_{1n} \\ a_{21} & (a_{22}-\lambda) & \dots & a_{2n} \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ a_{n1} & a_{n2} & \dots & (a_{nn}-\lambda) \end{vmatrix} = 0 \dots (1)$$

ஆக இருக்கும். இப்பொழுது,

$$A' = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{21} & \dots & a_{n1} \\ a_{12} & a_{22} & \dots & a_{n2} \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ a_{1n} & a_{2n} & \dots & a_{nn} \end{bmatrix}$$

∴ A' -ன் சிறப்பியல்புச் சமன்பாடு

$$\begin{vmatrix} (a_{11}-\lambda) & a_{12} & \dots & a_{1n} \\ a_{21} & (a_{22}-\lambda) & \dots & a_{2n} \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ a_{n1} & a_{n2} & \dots & (a_{nn}-\lambda) \end{vmatrix} = 0 \dots (2)$$

ஆகும். (1), (2)-ல் ஒரேவிட்ட உறுப்புகள் நிலை மாறவில்லை. மேலும், ஓர் அணித்தொகையின் மதிப்பானது அதன் நிரல்களை வர, நிரல்களைவும் மாற்றி அமைத்தால் மாறுதல். எனவே (1), (2)-ல் இருந்து A -ம், A' -ம் ஒரே சிறப்பியல்புச் சமன்பாட்டை உடையன என்பதும்; ஆகவே, அவற்றின் சிறப்பியல்பு மூலங்களும் சமனாக இருக்கவேண்டும் என்பதும் தெரிகிறது.

உதாரணம் 4. $\lambda_1, \lambda_2, \lambda_3$ என்பன ஒரு சிறப்பியல்புச் சமன்பாட்டின் வெவ்வேறு மூலங்கள் ஆனால், அவற்றிற்கு இடையே

சிறப்பியல்பு வெக்டர்களான X_1, X_2, X_3 என்பன ஒரேபடிச் சரிபெற்றவை என நினைவி.

நிதியுபயம்: கூடுமானால், k_1, k_2, k_3 என்பன

$$k_1 X_1 + k_2 X_2 + k_3 X_3 = 0 \quad - \quad (1)$$

என்பதற் கிணங்க இருக்கட்டும்.

$$\therefore k_1 AX_1 + k_2 AX_2 + k_3 AX_3 = 0 \quad - \quad (2)$$

$$\text{ஆனால் } \left. \begin{array}{l} AX_1 = \lambda_1 X_1 \\ AX_2 = \lambda_2 X_2 \\ AX_3 = \lambda_3 X_3 \end{array} \right\} \quad - \quad - \quad - \quad (3)$$

$$\therefore k_1 \lambda_1 X_1 + k_2 \lambda_2 X_2 + k_3 \lambda_3 X_3 = 0 \quad - \quad (4)$$

$$\therefore k_1 \lambda_1 AX_1 + k_2 \lambda_2 AX_2 + k_3 \lambda_3 AX_3 = 0 \quad - \quad (5)$$

$\therefore$ (3)-ஐ மீண்டும் உபயோகித்து

$$k_1 \lambda_1^2 X_1 + k_2 \lambda_2^2 X_2 + k_3 \lambda_3^2 X_3 = 0 \quad - \quad (6)$$

(1), (4), (6)-ல் இருத்து

$$\text{ஆனால் } \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 \\ \lambda_1 & \lambda_2 & \lambda_3 \\ \lambda_1^2 & \lambda_2^2 & \lambda_3^2 \end{vmatrix} \begin{bmatrix} k_1 X_1 \\ k_2 X_2 \\ k_3 X_3 \end{bmatrix} = 0$$

$$\begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 \\ \lambda_1 & \lambda_2 & \lambda_3 \\ \lambda_1^2 & \lambda_2^2 & \lambda_3^2 \end{vmatrix} = (\lambda_1 - \lambda_2)(\lambda_2 - \lambda_3)(\lambda_3 - \lambda_1)$$

மேலும், $\lambda_1 \neq \lambda_2$; $\lambda_2 \neq \lambda_3$; $\lambda_3 \neq \lambda_1$ எனக் கொடுக்கப் பட்டிருக்கிறது.

$$\therefore \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 \\ \lambda_1 & \lambda_2 & \lambda_3 \\ \lambda_1^2 & \lambda_2^2 & \lambda_3^2 \end{vmatrix} \neq 0$$

$$\therefore \begin{bmatrix} k_1 & X_1 \\ k_2 & X_2 \\ k_3 & X_3 \end{bmatrix} = 0$$

$$\therefore k_1 = 0 = k_2 = k_3.$$

அதாவது, X_1, X_2, X_3 ஒருபடிச் சார்பு அற்றவை.

உதாரணம் 5 : A -ன் சிறப்பியல்பு ஓலங்கள் $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n$ ஆகும்.

(i) kA -ன் சிறப்பியல்பு ஓலங்கள் $k\lambda_1, \dots, k\lambda_n$.

(ii) $(A - kI)$ -ன் சிறப்பியல்பு ஓலங்கள் $\lambda_1 - k, \dots, \lambda_n - k$.

நிகுபணம் :

(i) A -ன் சிறப்பியல்புச் சமன்பாடு

$$|A - \lambda I| = 0.$$

இதன் ஓலங்கள் $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n$.

$$\therefore |A - \lambda I| = (\lambda - \lambda_1)(\lambda - \lambda_2) \dots (\lambda - \lambda_n) \dots (I)$$

இப்பொழுது kA -ன் சிறப்பியல்புச் சமன்பாடானது

$$|kA - \lambda I| = 0 \text{ ஆகும்.}$$

$$\text{அதாவது, } |k(A - \frac{\lambda}{k} I)| = 0$$

$$\text{அதாவது, } k^n |A - \frac{\lambda}{k} I| = 0 \quad \because |kA| = k^n |A|.$$

ஆனால் $k \neq 0$

$$\therefore |A - \frac{\lambda}{k} I| = 0$$

$\therefore$ (I)-ல் இருந்து

$$|A - \frac{\lambda}{k} I| = \left(\frac{\lambda}{k} - \lambda_1\right) \left(\frac{\lambda}{k} - \lambda_2\right) \dots \left(\frac{\lambda}{k} - \lambda_n\right)$$

இதன் ஓலங்கள் $k\lambda_1, k\lambda_2, \dots, k\lambda_n$.

(ii) $(A - kI)$ -ன் சிறப்பியல்புச் சமன்பாடு

$$|A - kI - \lambda I| = 0$$

$$\text{அதாவது } |A - (k + \lambda)I| = 0.$$

∴ (1)-ல் இருந்து

$$(k + \lambda - \lambda_1)(k + \lambda - \lambda_2) \dots (k + \lambda - \lambda_n) = 0,$$

இதன் மூலக்கள் $\lambda_1 - k, \lambda_2 - k, \dots, \lambda_n - k$.

உதாரணம் 6 :

α ஆனது A-ல் சிறப்பியல்பு மூலமாக இருந்தால், $\frac{|A|}{\alpha}$ ஆனது செல்லு A-ல் சிறப்பியல்பு மூலமாக இருக்கும்.

நித்யனம் :

$$A(\text{செல்லு } A) = (\text{செல்லு } A)A = |A|I \quad \dots \quad (1)$$

இப்போழுது, $|A - \lambda I|$

$$= \left| A - \frac{\lambda}{|A|} (A \text{ செல்லு } A) \right| \quad \dots \quad (1)\text{-ல் இருந்து}$$

$$= \left| A \left(I - \frac{\lambda}{|A|} \text{செல்லு } A \right) \right|$$

$$= |A| \left| I - \frac{\lambda}{|A|} \text{செல்லு } A \right|$$

$$= |A| \left| I - \frac{\lambda}{|A|} \left(\text{செல்லு } A - \frac{|A|}{\lambda} I \right) \right|$$

$$= -\frac{\lambda}{|A|} |A| \left| \text{செல்லு } A - \frac{|A|}{\lambda} I \right|$$

$$= -\lambda \left| \text{செல்லு } A - \frac{|A|}{\lambda} I \right|$$

$$\therefore |A - \alpha I| = 0 \quad \text{ஆனால்}$$

$$\left| \text{செல்லு } A - \frac{|A|}{\alpha} I \right| = 0 \quad \text{ஆகும்.}$$

அதாவது, α ஆனது A-ல் சிறப்பியல்பு மூலம் ஆகும்.

$\frac{|A|}{\alpha}$ ஆனது (செல்லு A)-ல் சிறப்பியல்பு மூலம் ஆகும்.

உதாரணம் 7: A-ல் சிறப்பியல்பு மூலம் α ஆனால், A^{-1} -ல் சிறப்பியல்பு மூலம் α^{-1} ஆகும்.

$$\text{நித்யனம்: } AA^{-1} = A^{-1}A = I \quad \dots \quad (1)$$

$$\begin{aligned}
 & \text{இப்பொழுது, } |A - \lambda I| \\
 &= |A - \lambda A A^{-1}| \quad \dots (1)\text{-ல் இருந்து} \\
 &= |A(I - \lambda A^{-1})| \\
 &= |A| \cdot |I - \lambda A^{-1}| \\
 &= |A| \cdot \left| -\lambda \left(A^{-1} - \frac{I}{\lambda} \right) \right| \\
 &= -\lambda |A| \cdot \left| A^{-1} - \frac{I}{\lambda} \right| \\
 \therefore |A - \alpha I| = 0 \text{ ஆனால் } \left| A^{-1} - \frac{I}{\alpha} \right| &= 0,
 \end{aligned}$$

($|A| \neq 0$ என்பதைக் கவனிக்கவும்),

அதாவது, α ஆனது A -ன் சிறப்பியல்பு மூலம்

ஆனால், $\frac{1}{\alpha}$ ஆனது A^{-1} -ன் சிறப்பியல்பு மூலம் ஆகும்.

உதாரணம் 8 :

A -ன் சிறப்பியல்பு மூலம் α ஆனால், A^2 -ன் சிறப்பியல்பு மூலம் α^2 என நிரூபி.

நிஜபணம் : $|A - \alpha I| = 0 \quad \dots \dots \dots (1)$
எனக் கொடுக்கப்பட்டுள்ளது.

$$\begin{aligned}
 |A^2 - \alpha^2 I| &= |A^2 - \alpha^2 I^2| \\
 &= |(A + \alpha I)(A - \alpha I)| \\
 &= |A + \alpha I| \cdot |A - \alpha I| \\
 &= 0 \quad \dots \dots \dots (1)\text{-ல் இருந்து}
 \end{aligned}$$

$\therefore A^2$ -ன் சிறப்பியல்பு மூலம் α^2 .

குறிப்பு : பொதுவாக, $f(A)$ என்ற பல்லுறுப்புக் கோவை (polynomial) அணிவின் மூலம் $f(\alpha)$ என நிரூபிக்கலாம்.

10-8. கேலி-ஹாமில்்டன் தேற்றம் :

ஒவ்வொரு சதுர அணிவையும், அதன் சிறப்பியல்புச் சமன்பாட்டின் மூலம் எனலாம்.

அ.அ.-15

A என்பது கொடுக்கப்பட்ட சதுர அணிவாக இருக்கட்டும். இதன் சீதப்பெயர்வுச் சமன்பாடு

$$|A - \lambda I| = 0 \quad \dots \quad \dots \quad \dots \quad (1)$$

ஆகும். இதனை,

$$a_0 + a_1\lambda + a_2\lambda^2 + \dots + a_n\lambda^n = 0 \quad \dots \quad (2)$$

என விரித்து எழுதலாம்.

A ஆனது இதன் மூலம் என நிரூபிக்கவேண்டும். அதாவது,

$$a_0 + a_1A + a_2A^2 + \dots + a_nA^n = 0 \quad \dots \quad (3)$$

என நிரூபிக்க வேண்டும்.

இப்பொழுது,

$$(A - \lambda I) (\text{சேர்வு } (A - \lambda I)) = |A - \lambda I| I \quad \dots \quad (4)$$

$(A - \lambda I)$ என்ற அணியின் உறுப்பில் உள்ள λ -ன் படி ஒன்று. ஆதலால் சேர்வு $(A - \lambda I)$ -ன் உறுப்புகளில் λ -ன் படி $(n-1)$ ஆகவோ, ஆகவது, அதற்குக் குறைவாகவோதான் இருக்கவேண்டும். ஆதலால்,

$$\text{சேர்வு } (A - \lambda I) = B_0 + B_1\lambda + B_2\lambda^2 + \dots + B_{n-1}\lambda^{n-1} \quad \dots \quad (5)$$

என எழுதலாம். இதில் $B_0, B_1, \dots, B_{n-1}$ என்பன a_{ij} களின் சார்புகள் (functions of a_{ij}) உறுப்புகளாகக் கொண்டு n -சதுர அணிகள் என்பதைக் கவனிக்கவும். மேலும், (4), (5)-ல் இருந்து,

$$\begin{aligned} (A - \lambda I) (B_0 + B_1\lambda + B_2\lambda^2 + \dots + B_{n-1}\lambda^{n-1}) \\ = (A - \lambda I) (\text{சேர்வு } (A - \lambda I)) \\ = |A - \lambda I| I \\ = a_0I + a_1\lambda I + a_2\lambda^2I + \dots + a_n\lambda^nI \quad \dots \quad (6) \end{aligned}$$

என இருக்கட்டும். (6)-ல் இட, வலப்பக்கங்களிலுள்ள λ -ன் அடுக்குகளில் குறைவாகவோச் சமன்படுத்தினால்

$$AB_0 = a_0I$$

$$AB_1 - IB_0 = a_1I$$

$$AB_2 - IB_1 = a_2I$$

$$\dots \quad \dots \quad \dots$$

$$AB_{n-1} - IB_{n-2} = a_{n-1}I$$

$$-IB_{n-1} = a_n I$$

என்ற சமன்பாடுகள் கிடைக்கும். இவற்றை, முறையே $I, A, A^2, \dots, A^n$ ஆகியவற்றைப் பெருக்கிக் கூட்டினால்

$$\begin{aligned} & AB_0 + (A^2B_1 - AB_0) + (A^3B_2 - A^2B_1) + \dots \\ & \dots + (A^nB_{n-1} - A^{n-1}B_{n-2}) - A^nB_{n-1} \\ & = a_0I + a_1A + a_2A^2 + \dots + a_nA^n \end{aligned}$$

$$\text{ஆதலால், } 0 = a_0I + a_1A + a_2A^2 + \dots + a_nA^n \quad (7)$$

குறிப்பு : இடப்பெறும் உள்ள 0 , பூச்சிய அணியைக் குறிக்கும்.

நினைந்தேற்றம் 1 : A பூச்சியைக் அணியாக இருந்தால்

$$A^{-1} = -\frac{1}{a_0} [a_1I + a_2A + \dots + a_nA^{n-1}]$$

நிபுணம் : (1), (2)-ல் இருந்து

$$|A - \lambda I| = a_0 + a_1\lambda + a_2\lambda^2 + \dots + a_n\lambda^n.$$

இதில் $\lambda = 0$ என்று போட்டால்,

$$|A| = a_0 \neq 0.$$

(7)ஐ A^{-1} ஆல் பெருக்கினால்

$$0 = a_0A^{-1} + a_1I + a_2A + \dots + a_nA^{n-1}$$

$$\therefore A^{-1} = -\frac{1}{a_0} [a_1I + a_2A + \dots + a_nA^{n-1}]$$

நினைந்தேற்றம் 2. m என்னும் ஒரு முழு எண் $m \geq n$ என்பதற்கான இறுத்தால் A^m ஐ A -ன் $(m$ ஐ விட) குறைந்த அடுக்குகளால் ஒரு படியில் எழுத முடியும்.

ஏனெனில், (7)ஐ A^{m-n} ஆல் பெருக்கினால்

$$a_0A^{m-n} + a_1A^{m-n+1} + \dots + a_nA^{m-1} = 0$$

உதாரணம் 9.

$A = \begin{bmatrix} 8 & 2 \\ 2 & 0 \end{bmatrix}$ ஆகும். A -ன் சிறப்பியல்புச் சமன் பாட்டைக் கண்டுபிடி. அதில் இருந்து A^{-1} ஐக் கண்டுபிடி.

A -ன் சிறப்பியல்புச் சமன்பாடானது

$$\begin{vmatrix} 8-\lambda & 2 \\ 2 & -\lambda \end{vmatrix} = 0 \text{ ஆகும்.}$$

$$\therefore (8-\lambda)(-\lambda) - 4 = 0$$

$$\lambda^2 - 8\lambda - 4 = 0 \quad \text{---} \quad \text{---} \quad (1)$$

$$\therefore A^2 - 8A - 4I = 0 \quad \text{---} \quad (\text{கோவ்-ஹேமிட்டன்})$$

இதை A^{-1} ஆல் பெருக்கினால்

$$A - 8I - 4A^{-1} = 0$$

$$\therefore \frac{1}{4} (A - 8I) = A^{-1}.$$

உதாரணம் 10. முத்தினை உதாரணத்தில், சிறப்பியல்பு மூலம் கணியும், கெக்டர்க்கியும் கண்டுபிடி.

$$\lambda^2 - 8\lambda - 4 = 0 \quad \text{---} \quad \text{---} \quad (1)\text{-ல் இருந்து}$$

$$\therefore (\lambda - 4)(\lambda + 1) = 0. \quad \therefore \lambda = 4 \text{ அல்லது } -1.$$

முதன்மை : $\lambda = 4$ ஐ எடுத்துக் கொள்ளோம்.

$$A - 4I = \begin{bmatrix} 8-4 & 2 \\ 2 & -4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -1 & 2 \\ 2 & -4 \end{bmatrix}$$

$$\therefore -x_1 + 2x_2 = 0$$

$$2x_1 - 4x_2 = 0$$

$$\therefore X = \begin{bmatrix} 2 \\ 1 \end{bmatrix} \text{ எனில் } AX = 4X \text{ என்ற சமன்பாட்டை}$$

கிடைக்க உள்ளது.

இரண்டாம் வகை : $\lambda = -1$ ஆனால் $Y = \begin{bmatrix} 1 \\ -2 \end{bmatrix}$ என்ற சிறப்பியல்பு வெக்டர் கிடைக்கும்.

இந்த உதாரணத்தில் இருந்து சிறப்பியல்புச் சமன்பாட்டின் சிழிக்கண்ட பண்புகளை அறிகிறோம்.

1. சிறப்பியல்புச் சமன்பாடானது ஓர் இயல் கணித சமன்பாடாகும் (Algebraic Eqn).
2. இந்தச் சமன்பாட்டின் மடியானது A என்ற அணியின் தரமாகும்.
3. இந்தச் சமன்பாட்டின் மூலங்கள் அணியின் தாத்தையிட அதிவகை இருக்க முடியாது.
4. ஒவ்வொரு சிறப்பியல்பு மூலத்தில் இருந்து, ஒரு சிறப்பியல்பு வெக்டரைக் கண்டு பிடிக்க இயலும்.
5. X ஒரு சிறப்பியல்பு வெக்டர் ஆனால் kX -ம் ஒரு சிறப்பியல்பு வெக்டர் ஆகும்.

உதாரணம் 10-ல் $X = \begin{bmatrix} 2 \\ 1 \end{bmatrix}$ என்பதும்,

$kX = \begin{bmatrix} 2k \\ k \end{bmatrix}$ என்பதும் சிறப்பியல்பு வெக்டர்கள் என்பதை நோக்குக.

மேலும், நாம் எடுத்துக்கொண்ட உதாரணத்தில்

$A = \begin{bmatrix} 8 & 2 \\ 2 & 0 \end{bmatrix}$ என்பது ஒரு சமர் 2×2 அணி என்பதைக் கவனிக்கவும். இதன் சிறப்பியல்பு வெக்டர்களான

$\begin{bmatrix} 2 \\ 1 \end{bmatrix}$, $\begin{bmatrix} 1 \\ -2 \end{bmatrix}$ என்பன செங்குத்தான வெக்டர்கள்.

ஏனெனில், $\begin{bmatrix} 2 \\ 1 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 1 \\ -2 \end{bmatrix} = 2 \cdot 1 + 1 \cdot -2 = 0$.

இது இயல்வாகுத்தான் இருக்கவேண்டும் என்பது பின் வரும் தேற்றத்தால் விளங்கும்.

10.4. A என்ற சமச்சரிவியில் வெவ்வேறு சிறப்பியல்பு மூலக் களான λ, μ -ல் இருத்து கிடைக்கும் சிறப்பியல்பு வெக்டர்கள் X, Y ஆனால் $X \cdot Y = 0$

நிபுணம் :

$$AX = \lambda X \quad \dots \quad \dots \quad \dots \quad (1)$$

$$AY = \mu Y \quad \dots \quad \dots \quad \dots \quad (2)$$

$$(1)\text{-ல் இருத்து } AX \cdot Y = \lambda X \cdot Y \quad \dots \quad \dots \quad \dots \quad (3)$$

$$(2) \quad \dots \quad X \cdot AY = X \cdot \mu Y \quad \dots \quad \dots \quad \dots \quad (4)$$

$$\therefore AX \cdot Y - X \cdot AY = (\lambda - \mu) X \cdot Y \quad \dots \quad \dots \quad \dots \quad (5)$$

$$\text{இப்பொழுது, } X \cdot AY = A'X \cdot Y$$

$$= AX \cdot Y \quad (\because A' = A)$$

$$\therefore 0 = (\lambda - \mu) X \cdot Y$$

$$\lambda \neq \mu \quad \dots \quad \dots \quad \dots \quad \dots \quad \text{கொடுக்கப்பட்டுள்ளது.}$$

$$\therefore X \cdot Y = 0.$$

10.5. ஓர் அணிவைச் சம மூலிகையா அணிவாக மாற்றும்

உதாரணம் 11. $\begin{bmatrix} 8 & 2 \\ 2 & 0 \end{bmatrix}$ என்ற அணிவைச் சம மூலிகையா அணிவாக மாற்றுக.

$A = \begin{bmatrix} 8 & 2 \\ 2 & 0 \end{bmatrix}$ என்ற அணியின் சிறப்பியல்பு வெக்டர்கள் $\begin{bmatrix} 2 \\ 1 \end{bmatrix}$, $\begin{bmatrix} 1 \\ -2 \end{bmatrix}$ என 10 ஆம் உதாரணத்தில் மாற்றோம். இவற்றை நிரூபணமாக கொண்டு அணி $\begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 1 & -2 \end{bmatrix} = P$ ஆகும்.

$$\therefore P^{-1} = \begin{bmatrix} \frac{2}{5} & \frac{1}{5} \\ \frac{1}{5} & -\frac{2}{5} \end{bmatrix}.$$

$$\begin{aligned} \therefore P^{-1}AP &= \begin{bmatrix} \frac{3}{2} & \frac{1}{2} \\ \frac{1}{2} & -\frac{3}{2} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 3 & 2 \\ 2 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 1 & -2 \end{bmatrix} \\ &= \begin{bmatrix} \frac{3}{2} & \frac{1}{2} \\ \frac{1}{2} & -\frac{3}{2} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 5 & -1 \\ 4 & 2 \end{bmatrix} \\ &= \begin{bmatrix} 4 & 0 \\ 0 & -1 \end{bmatrix} \end{aligned}$$

இதன் சம மூலிகளை அணிவின் மூலிகளிட்ட உறுப்புகள் A -ன் சிறப்பியல்பு மூலங்களான $4, -1$ என்பதைக் காட்டுக.

தேற்றம்: $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n$ என்பன A -ன் சிறப்பியல்பு மூலங்களாக இருக்கட்டும். $X_1, X_2, \dots, X_n$ இவற்றிற்கு இவைத்த சிறப்பியல்பு வெக்டர்களாக இருக்கட்டும். $P = [X_1, X_2, \dots, X_n]$ ஆனால் $P^{-1}AP =$ சம மூலிகளை அணி ($\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n$) ஆகும்.

நிபுணம்:

$$AX_1 = \lambda_1 X_1; \quad AX_2 = \lambda_2 X_2; \quad \dots \quad AX_n = \lambda_n X_n$$

(பொருளை)

$$\text{இப்பொழுது, } X_1 = [x_{11}, x_{21}, \dots, x_{n1}]$$

$$X_2 = [x_{12}, x_{22}, \dots, x_{n2}]$$

$$\dots \quad \dots \quad \dots$$

$$X_n = [x_{1n}, x_{2n}, \dots, x_{nn}]$$

ஆக இருக்கட்டும். அப்படியானால்,

$$P = [X_1, X_2, \dots, X_n]$$

$$= \begin{bmatrix} x_{11} & x_{12} & \dots & x_{1n} \\ x_{21} & x_{22} & \dots & x_{2n} \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ x_{n1} & x_{n2} & \dots & x_{nn} \end{bmatrix}$$

$$\text{எனவே, } D = \begin{bmatrix} \lambda_1 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & \lambda_2 & \dots & 0 \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ 0 & 0 & \dots & \lambda_n \end{bmatrix}$$

ஆக இருக்கட்டும். அப்படியானால்

$$\begin{aligned} PD &= \begin{bmatrix} \lambda_1 X_{11} & \lambda_2 X_{12} & \dots & \lambda_n X_{1n} \\ \lambda_1 X_{21} & \lambda_2 X_{22} & \dots & \lambda_n X_{2n} \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ \lambda_1 X_{n1} & \lambda_2 X_{n2} & \dots & \lambda_n X_{nn} \end{bmatrix} \\ &= [\lambda_1 X_1, \lambda_2 X_2, \dots, \lambda_n X_n] \\ &= [AX_1, AX_2, \dots, AX_n] \quad \dots \quad \dots \quad (\text{காரணம்}) \\ &= A[X_1, X_2, \dots, X_n] \\ &= AP. \\ \therefore D &= P^{-1}AP. \end{aligned}$$

உதாரணம் 12.

$$\begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \end{bmatrix} \text{ ஐச் சமதரமாவதை அணிவதாக மாற்று.}$$

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \end{bmatrix} \text{ ஆக இருக்கட்டும்.}$$

A -ன் சிதழியைப்படிச் சமன்மாதாரனது

$$\begin{vmatrix} 1-\lambda & 1 & 1 \\ 1 & 1-\lambda & 1 \\ 1 & 1 & 1-\lambda \end{vmatrix} = 0 \quad \text{ஆகும்.}$$

$$\therefore \begin{vmatrix} 3-\lambda & 1 & 1 \\ 3-\lambda & 1-\lambda & 1 \\ 3-\lambda & 1 & 1-\lambda \end{vmatrix}$$

$$= (3-\lambda) \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1-\lambda & 1 \\ 1 & 1 & 1-\lambda \end{vmatrix} = 0,$$

$$\therefore (3-\lambda) \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & -\lambda & 0 \\ 0 & 0 & -\lambda \end{vmatrix} = (3-\lambda) \lambda^2 = 0.$$

$\therefore 3, 0, 0$ என்பன சிறப்பியல்பு மூலங்கள்,

$\lambda_1 = 3$ என்பதை முதலில் எடுத்துக் கொள்வோம்.

$$A - 3I = \begin{bmatrix} 1-3 & 1 & 1 \\ 1 & 1-3 & 1 \\ 1 & 1 & 1-3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -2 & 1 & 1 \\ 1 & -2 & 1 \\ 1 & 1 & -2 \end{bmatrix} = 0$$

$$\therefore -2x_1 + x_2 + x_3 = 0$$

$$x_1 - 2x_2 + x_3 = 0$$

$$x_1 + x_2 - 2x_3 = 0$$

$\therefore X = [1, 1, 1]$ என்பது இதன் சிறப்பியல்பு வெக்டர்.

$\lambda_1 = 0 = \lambda_2$. இது சிறப்பியல்பு மூலங்கள் சமமாக இருப்பதைக் கவனிக்கவும்.

$$A - 0I = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \end{bmatrix} = 0$$

$$\therefore x_1 + x_2 + x_3 = 0$$

$$x_1 + x_2 + x_3 = 0$$

$$x_1 + x_2 + x_3 = 0.$$

ஆக ஒன்று என்பாடுகளும் ஒன்றேதான். இதிலிருந்து தமக்கு இரண்டு வெக்டர் குழுக்கள் கிடைக்கின்றன. அவை $[2, -1, -1]$; $[0, 1, -1]$.

$\therefore$ சிதற்பெயர்வு வெக்டர்களை நிரக்களாகக் கொண்டு,

$$P = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 0 \\ 1 & -1 & 1 \\ 1 & -1 & -1 \end{bmatrix}$$

$$\therefore P^{-1} = \begin{bmatrix} \frac{1}{2} & \frac{1}{2} & \frac{1}{2} \\ \frac{1}{2} & -\frac{1}{2} & -\frac{1}{2} \\ 0 & \frac{1}{2} & -\frac{1}{2} \end{bmatrix}$$

$$P^{-1}AP = \begin{bmatrix} \frac{1}{2} & \frac{1}{2} & \frac{1}{2} \\ \frac{1}{2} & -\frac{1}{2} & -\frac{1}{2} \\ 0 & \frac{1}{2} & -\frac{1}{2} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 2 & 0 \\ 1 & -1 & 1 \\ 1 & -1 & -1 \end{bmatrix}$$

$$= \begin{bmatrix} \frac{1}{2} & \frac{1}{2} & \frac{1}{2} \\ \frac{1}{2} & -\frac{1}{2} & -\frac{1}{2} \\ 0 & \frac{1}{2} & -\frac{1}{2} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 3 & 0 & 0 \\ 3 & 0 & 0 \\ 3 & 0 & 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 3 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}.$$

இதன் மூலமிட்ட உறுப்புகளான 3, 0, 0 என்பவை A-ன் சிதற்பெயர்வு மூலங்கள் என்பது கவனிக்கத் தக்கது.

10-8. ஸ்டிசெத்த அணிகள் (Similar Matrices)

A, B என்னும் அணிகள் $B = P^{-1}AP$ என்பதற்கிணங்க இத்தகைய இவற்றை ஸ்டிசெத்த அணிகள் என அழைப்போம்.

குறிப்பு: $B = P^{-1}AP$ ஆனால்

$$PBP^{-1} = PP^{-1}APP^{-1} = IAI = A \text{ ஆகும்.}$$

தேற்றம் 1: $A, P^{-1}AP$ என்ற வடிவெடுத்த அணிக்கு ஒரே சிறப்பியல்புச் சமன்பாடு உண்டு.

$$\text{நிபுணம்: } |P^{-1}AP - \lambda I|$$

$$= |P^{-1}AP - P^{-1}\lambda IP|$$

$$= |P^{-1}(A - \lambda I)P|$$

$$= |P^{-1}| |A - \lambda I| |P|$$

$$= |P^{-1}| |P| |A - \lambda I|$$

$$= |A - \lambda I|$$

∴ இவற்றின் சிறப்பியல்புச் சமன்பாடுகள் ஒன்றே.

∴ இவற்றின் சிறப்பியல்பு மூலங்களும் சமமாகும்.

நிகழ்த்தேற்றம். AB, BA என்பன ஒரே சிறப்பியல்பு மூலங்கள் உடையவை. ∵ $AB = B^{-1}(BA)B$

தேற்றம் 2. $B = P^{-1}AP$ என்னும் அணியின் λ என்ற சிறப்பியல்பு மூலத்திற்கு இவைத்த மாற்றமில்ல வெக்டர் Y ஆனால், $X = PY$ என்பது A என்ற அணியின் λ மூலத்திற்கு இவைத்த மாற்றமில்ல வெக்டர் ஆகும்.

$$BY = \lambda Y \quad \dots \quad \dots \quad \dots \quad (\text{கொள்கை})$$

$$\text{மேலும் } PB = PP^{-1}AP = AP.$$

$$\therefore AX = APY = PBY = P\lambda Y = \lambda PY = \lambda X.$$

உதாரணம் 12.

உதாரணம் 10-ல் $A = \begin{bmatrix} 8 & 2 \\ 2 & 0 \end{bmatrix}$ என்ற அணியின் 4 என்ற சிறப்பியல்பு மூலத்திற்கு இவைத்த மாற்றமில்ல வெக்டர் $X = \begin{bmatrix} 2 \\ 1 \end{bmatrix}$ என்ற பரீட்சேரம்.

$$\text{இப்போது, } P = \begin{bmatrix} 3 & 1 \\ 4 & 2 \end{bmatrix} \text{ ஆனால்}$$

$$P^{-1} = \begin{bmatrix} 1 & -\frac{1}{3} \\ -2 & \frac{2}{3} \end{bmatrix} \text{ ஆகும்.}$$

$$\therefore P^{-1}AP = \begin{bmatrix} 1 & -\frac{1}{3} \\ -2 & \frac{2}{3} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 3 & 2 \\ 2 & 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 3 & 1 \\ 4 & 2 \end{bmatrix}$$

அதாவது,

$$B = \begin{bmatrix} 1 & -\frac{1}{3} \\ -2 & \frac{2}{3} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 17 & 7 \\ 8 & 2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 14 & 6 \\ -25 & -11 \end{bmatrix}$$

A , B வடிவெடுத்த அணிகள் ஆகும். இப்பொழுது, இவற்றின் சிதப்பியல்புச் சமன்பாடுகள் ஒன்றிடுக்கிலின்றனவா எனச் சரி பார்ப்போம்.

B -ன் சிதப்பியல்புச் சமன்பாடு,

$$\begin{vmatrix} (14-\lambda) & 6 \\ -25 & (-11-\lambda) \end{vmatrix} = \lambda^2 - 3\lambda - 4 = 0.$$

இதுவே A -ன் சிதப்பியல்புச் சமன்பாடு என்பதை B ஆம் உதாரணத்தில் காண்க. எனவே, இவற்றின் சிதப்பியல்பு மூலம் வரும் சமன்பாள். அவை, 4, -1.

இனி 10-6 தேற்றம் B -க் உகின்படி, 4 என்ற சிதப்பியல்பு மூலத்திற்கு இயைந்த B -ன் வெக்டர் Y ஆனும் $X-PY$ என இருக்கிறது என்பதைச் சரி பார்ப்போம்.

$$B-4I = \begin{bmatrix} (14-4) & 6 \\ -25 & (-11-4) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 10 & 6 \\ -25 & -15 \end{bmatrix}$$

$$\therefore 10y_1 + 6y_2 = 0$$

$$-25y_1 - 15y_2 = 0$$

$$\text{அதாவது, } 5y_1 + 3y_2 = 0.$$

$$\therefore Y_1 = 3 \text{ ஆகும் } Y_2 = -5$$

$$\therefore Y = \begin{bmatrix} 3 \\ -5 \end{bmatrix}$$

உதாரணம் 10-ல், இதே மூலத்திற்கு (4) இயைத்த வெக்டர்

$X = \begin{bmatrix} 2 \\ 1 \end{bmatrix}$ என்று பார்த்தோம். இப்பொழுது,

$$PY = \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 4 & 2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 2 \\ -5 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 4 \\ 2 \end{bmatrix} = 2X.$$

இங்கு உதாரணம் 10-ன் அடியில் உள்ள 5 ஆம் குறியீடு தோக்கத்தக்கது.

10.7. A என்ற சதுர அணிவின் சிறப்பியல்பு மூலங்கள் $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n$ ஆக இருந்தால், இந்த மூலங்களை மூலமிட்ட உறுப்புகளாகக் கொண்ட ஒரு மூக்கோண அணியை A -க்கு ஸ்பெசெத் அணிவாகக் கண்டுபிடிக்க முடியும்.

இதை ஓர் உதாரணத்தால் விளக்குவோம்.

உதாரணம் 13.

$$A = \begin{bmatrix} 2 & 2 & 0 \\ 2 & 1 & 1 \\ -7 & 2 & -3 \end{bmatrix} \text{ ஆக இருக்கட்டும்.}$$

$$\begin{vmatrix} 2-\lambda & 2 & 0 \\ 2 & 1-\lambda & 1 \\ -7 & 2 & -3-\lambda \end{vmatrix} = \lambda^3 - 12\lambda + 12 = 0$$

$\therefore$ இதன் சிறப்பியல்பு மூலங்கள் 1, 3, -4.

$\lambda = 1$ என்பதற்கு இயைத்த மாற்றமியை வெக்டர் X ஆக இருக்கட்டும்.

$$\therefore (A - \lambda I)X = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 0 \\ 2 & 0 & 1 \\ -7 & 2 & -4 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix} = 0$$

$$\therefore x_1 + 2x_2 = 0; \quad 2x_1 + x_2 = 0; \quad -7x_1 + 2x_2 - 4x_3 = 0$$

$$x_2 = 1 \text{ ஆனால் } x_1 = -2; \quad x_3 = 4.$$

$$\therefore X = [-2, 1, 4]$$

இப்பொழுது, X ஐ P என்ற பூச்சியமிக் அணியின் மூலம் நிரலாக்கச் செய்க. (மற்ற திசைகள் $|P| \neq 0$ என்பதற்கினால் இருத்தல் பொதுவானது.)

$$\therefore P = \begin{bmatrix} -2 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 \\ 4 & 0 & 1 \end{bmatrix} \quad \therefore P^{-1} = \begin{bmatrix} -\frac{1}{2} & 0 & 0 \\ \frac{1}{2} & 1 & 0 \\ 2 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

என எடுத்துக் கொள்வோம்.

$$AP = \begin{bmatrix} 2 & 2 & 0 \\ 2 & 1 & 1 \\ -7 & 2 & -3 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} -2 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 \\ 4 & 0 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -2 & 2 & 0 \\ 1 & 1 & 1 \\ 4 & 2 & -3 \end{bmatrix}$$

AP -ன் மூலம் திசை $= AX = \lambda_1 X = 1 \cdot X = X$ என்பதைக் கவனி. (1)

$$\therefore P^{-1}AP = \begin{bmatrix} -\frac{1}{2} & 0 & 0 \\ \frac{1}{2} & 1 & 0 \\ 2 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} -2 & 2 & 0 \\ 1 & 1 & 1 \\ 4 & 2 & -3 \end{bmatrix} \\ = \begin{bmatrix} 1 & -1 & 0 \\ 0 & 2 & 1 \\ 0 & 0 & -3 \end{bmatrix}$$

$$\therefore P^{-1}AP \begin{bmatrix} 1 & B_1 \\ 0 & A_1 \end{bmatrix} \quad \dots \quad \dots \quad (2)$$

(1)-ல் இருந்து $P^{-1}AP$ -ன் மூலம் திசை $P^{-1}\lambda_1 X$ ஆக இருக்க வேண்டும். மேலும், இதுவே $P^{-1}\lambda_1 P$ -ன் மூலம் திசை.

$$\therefore \text{மூலம் திரவானது } [\lambda_1, 0, 0]' \\ = [1, 0, 0]' \quad \because \lambda_1 = 1.$$

(2)-ல் இருந்து A_1 -ன் தரம் $(n-1)$ என்பது தெளிவு. மேலும் $|\lambda I - P^{-1}AP| = (\lambda - \lambda_1) |\lambda I - A_1|$ ஆனால், A -ன் மூலங்களும், $P^{-1}AP$ -ன் மூலங்களும் சமம்.

$\therefore A_1$ -ன் மூலங்கள் $\lambda_2, \lambda_3, \dots, \lambda_4$; இங்கு $3, -4$ ஆக இருக்கவேண்டும்.

இனிமேல், A இப்போல் A_1 ஐ மாற்றி A_1 -ன் மூலம் உறுப்பாக 3ஐக் கொண்டுவிடுத்துவிடலாம்.

$$A_1 = \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 6 & -3 \end{bmatrix} \\ \begin{vmatrix} 2-\lambda & 1 \\ 6 & -3-\lambda \end{vmatrix} = \lambda^2 + \lambda - 12 = 0$$

இதன் மூலங்கள் $3, -4$.

$$(A_1 - 3I) Y = \begin{bmatrix} -1 & 1 \\ 6 & -3 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} y_1 \\ y_2 \end{bmatrix} = 0$$

$$\therefore -y_1 + y_2 = 0; \quad 6y_1 - 3y_2 = 0$$

$$\therefore y_1 = y_2$$

$$Y = [1, 1]'$$

இப்போது, Y ஐ Q என்ற மூச்சியலில் அணிவித்து மூலம் திரவாகக் கொள்வோம்.

$$\therefore Q = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 1 \end{bmatrix}; \quad Q^{-1} = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ -1 & 1 \end{bmatrix}$$

என எடுத்துக் கொள்ளலாம்.

$$Q^{-1} A_1 Q = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ -1 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 6 & -3 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 1 \end{bmatrix} \\ = \begin{bmatrix} 3 & 1 \\ 0 & -4 \end{bmatrix}$$

இப்பொழுது, $M = P \begin{bmatrix} I_1 & 0 \\ 0 & Q \end{bmatrix}$

என்பதுதான் தேவையான அணி.

$$M = \begin{bmatrix} -2 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 \\ 4 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -2 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 \\ 4 & 1 & 1 \end{bmatrix}$$

$$M^{-1} = \begin{bmatrix} -\frac{1}{2} & 0 & 0 \\ \frac{1}{2} & 1 & 0 \\ \frac{1}{2} & -1 & 1 \end{bmatrix}$$

$$M^{-1}AM = \begin{bmatrix} -\frac{1}{2} & 0 & 0 \\ \frac{1}{2} & 1 & 0 \\ \frac{1}{2} & -1 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 2 & 1 & 1 \\ -7 & 2 & -2 \end{bmatrix}$$

$$= \begin{bmatrix} -2 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 \\ 4 & 1 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 2 & 1 \\ 0 & 0 & -4 \end{bmatrix}$$

இதன் மூலியளிட்ட உறுப்புகளான 1, 2, -4 என்பவை A -ன் சிறப்பியல்பு மூலங்கள்.

பயிற்சி 10

1. கீழ்வரும் அணிகளின் சிறப்பியல்பு மூலங்களைக் காண்டு
பிடி.

$$(a) \begin{bmatrix} 1 & -1 & -1 \\ -1 & 1 & -1 \\ -1 & -1 & 1 \end{bmatrix} \quad (b) \begin{bmatrix} 0 & 1 & 2 \\ 1 & 0 & -1 \\ 2 & -1 & 0 \end{bmatrix}$$

$$(c) \begin{bmatrix} a & b & g \\ 0 & b & f \\ 0 & 0 & c \end{bmatrix}$$

$$(d) \begin{bmatrix} 2 & -2 & 2 \\ 1 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & -1 \end{bmatrix}$$

2. பின்வரும் அணிகளின் சிதர்பீயவ்யபு மூலக்கணையும் அவற்றிற்கிணைத்த வெக்டர்களையும் காண்போம்.

$$(a) \begin{bmatrix} 6 & -2 & 2 \\ 2 & 3 & -1 \\ 2 & -1 & 2 \end{bmatrix}$$

$$(b) \begin{bmatrix} 2 & -2 & 2 \\ 1 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & -1 \end{bmatrix}$$

$$(c) \begin{bmatrix} -2 & 2 & -2 \\ 2 & 1 & -6 \\ -1 & -2 & 0 \end{bmatrix}$$

$$(d) \begin{bmatrix} 2 & 2 & 1 \\ 1 & 2 & 1 \\ 1 & 2 & 2 \end{bmatrix}$$

3. பின்வரும் அணிகளின் சிதர்பீயவ்யபுச் சமன்பாடுகளைக் காண்போம். மேலும், கேள்வி-2-யின் தேற்றத்தை உபயோகித்து இவற்றின் தேர்வதிக அணிகளைக் காண்போம்.

$$(a) \begin{bmatrix} 2 & -1 & 1 \\ -1 & 2 & -1 \\ 1 & -1 & 2 \end{bmatrix}$$

$$(b) \begin{bmatrix} 1 & 0 & -1 \\ -1 & 1 & -2 \\ 2 & 2 & 4 \end{bmatrix}$$

$$(c) \begin{bmatrix} 1 & 1 & 2 \\ 2 & 1 & 1 \\ 2 & 2 & 1 \end{bmatrix}$$

$$(d) \begin{bmatrix} 1 & 0 & 2 \\ 0 & 2 & 1 \\ 2 & 0 & 2 \end{bmatrix}$$

4. கொடுக்கப்பட்ட ஒரு சிதர்பீயவ்யபு மூலத்திற்குப் பல்வேறு சார்பற்ற வெக்டர்கள் இருக்கலாம் என்பதை அடிமீற்கண்ட அணியைக் கொண்டு நிரூபி.

$$\begin{bmatrix} -2 & 2 & -2 \\ 2 & 1 & -6 \\ -1 & -2 & 0 \end{bmatrix}$$

5. மின் வளும் அணிகள் ஒரே சிதப்பியல்புச் சமன்பாடு கொண்டன. ஆனால் அவை வடிவொத்தன அல்ல என நிரூபி.

$$(i) \begin{bmatrix} 2 & 2 & 1 \\ 1 & 2 & 1 \\ 1 & 2 & 2 \end{bmatrix}; \begin{bmatrix} 2 & 1 & -1 \\ 0 & 2 & -1 \\ -3 & -2 & 3 \end{bmatrix}$$

$$(ii) \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}; \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$$

6. மீள்வழுவன் வடிவொத்த அணிகளா, அல்லவா எனக் கண்டுபிடி.

$$(i) A = \begin{bmatrix} 6 & 2 \\ -2 & 1 \end{bmatrix}; B = \begin{bmatrix} 8 & 6 \\ -8 & -1 \end{bmatrix}$$

$$(ii) A = \begin{bmatrix} -2 & -1 \\ 0 & 11 \end{bmatrix}; B = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 2 & 2 \end{bmatrix}$$

7. $A = \begin{bmatrix} a & a-1 \\ b+1 & b \end{bmatrix}$ என்ற மெய்யான அணியைச் சம மூலையனா அணிவதாக மாற்றுக. இதன் சிதப்பியல்பு வெக்டர் களைக் கண்டுபிடி.

விடைகள்

$$1. (a) -1, 2, 2 \quad (b) 2, 1 \pm \sqrt{3}$$

$$(c) a, b, c \quad (d) 2, 2, -2$$

$$2. (a) \begin{bmatrix} 2 & -1 & 1 \\ -1 & 0 & 2 \\ 1 & 2 & 0 \end{bmatrix} \quad (b) \begin{bmatrix} 1 & -2 & 2 \\ 2 & 2 & 1 \\ -2 & 1 & 2 \end{bmatrix}$$

$$(c) \begin{bmatrix} 1 & -2 & 3 \\ 2 & 1 & 0 \\ -1 & 0 & 1 \end{bmatrix} \quad (d) \begin{bmatrix} 2 & 1 & 1 \\ -1 & 0 & 1 \\ 0 & -1 & 1 \end{bmatrix}$$

$$8. (a) A^{-1} = -\frac{1}{4} (A^2 - 6A + 9I)$$

$$(b) A^{-1} = \frac{1}{6} (A^2 - 6A + 13I)$$

$$(c) A^{-1} = \frac{1}{11} (A^2 - 8A + 7I)$$

$$(d) A^{-1} = -\frac{1}{2} (A^2 - 6A + 7I).$$

$$9. (i) \frac{25}{16}$$

$$(ii) \frac{25}{16}$$

11. செங்குத்தனிகள்

11-0 செங்குத்தான வெக்டர்கள்

$$X = [x_1, x_2, \dots, x_n]' \text{ ஆகவும்,}$$

$$Y = [y_1, y_2, \dots, y_n]' \text{ ஆகவும் இருத்தால்}$$

$$X \cdot Y = x_1 y_1 + x_2 y_2 + \dots + x_n y_n$$

என்பதை X, Y -ன் உட்பெருக்கு (Inner Product) என்று சொல்வோம். X, Y -ன் உட்பெருக்கு பூச்சியமானதும் சுவர்த்தைச் செங்குத்து வெக்டர்கள் என்று சொல்வோம்.

$$\text{உதாரணம்: } X = [1, 1, 1]'; Y = [1, 1, -2]'$$

$$\text{ஆனால், } X \cdot Y = 1 \cdot 1 + 1 \cdot 1 + 1 \cdot (-2) = 0$$

$\therefore X, Y$ செங்குத்து வெக்டர்களாகும்.

$$\text{வெக்டரின் நீளம்: } X = [x_1, x_2, \dots, x_n]' \text{ ஆனால்}$$

$$X \cdot X = x_1 \cdot x_1 + x_2 \cdot x_2 + \dots + x_n \cdot x_n$$

$$= x_1^2 + x_2^2 + \dots + x_n^2$$

$$\therefore \sqrt{X \cdot X} = \sqrt{x_1^2 + x_2^2 + \dots + x_n^2}$$

X, X -ன் உட்பெருக்கினுடைய வர்க்க மூலத்தை X என்ற வெக்டரின் நீளம் என வரையறை செய்வோம். இதை

$\|X\|$ எனக் குறிப்பிடுவோம்.

$$\therefore \|X\| = \sqrt{X \cdot X} = \sqrt{x_1^2 + x_2^2 + \dots + x_n^2}$$

வெக்டர் இயல் ஷட்வம்

X என்ற வெக்டர் ஒவ்வோர் உறுப்பையும் $\|X\|$ ஆல் வகுக்கக் கிடைக்கும் வெக்டரை X -ன் இயல் ஷட்வம் (normalised form of X) என்று சொல்வோம்.

உதாரணம் : $X = [8, 4, 12]^T$

$$\|X\| = \sqrt{8^2 + 4^2 + 12^2} = \sqrt{64 + 16 + 144} = 18$$

$$\therefore X\text{-ன் இயல் ஷட்வம்} = \left[\frac{8}{18}, \frac{4}{18}, \frac{12}{18} \right]^T$$

குறிப்பு : இயல் ஷட்வ வெக்டர்கள் அனைத்து வெக்டர்களாக இருக்க வேண்டும். அதாவது அவற்றின் நீளம் 1 (unit).

11.1. செங்குத்தனிகள் :

A என்றும் சதுர அணி $A'A = I$ என்பதற்குரிய இருத்தல் அனைத்து செங்குத்தனி என வரையறை செய்வோம்.

குறிப்பு 1 : $A^{-1} = A'$ ஆக இருக்க வேண்டும்.

குறிப்பு 2 : $|A'A| = |I| = 1$

$$\therefore |A|^2 = 1 \quad \therefore |A'| = |A|,$$

$$\therefore |A| = \pm 1.$$

எனவே, A ஒரு பூச்சியமில் அணிவாக இருக்க வேண்டும்.

உதாரணம் 1 :

$$A = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{bmatrix}$$

ஒரு செங்குத்தனியாக இருக்கட்டும். $\therefore A'A = I$

$$\therefore \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$$\therefore a_{11}^2 + a_{21}^2 + a_{31}^2 = 1$$

$$a_{12}^2 + a_{22}^2 + a_{32}^2 = 1$$

$$a_{13}^2 + a_{23}^2 + a_{33}^2 = 1.$$

$$a_{11} \cdot a_{12} + a_{21} \cdot a_{22} + a_{31} \cdot a_{32} = 0$$

$$a_{11} \cdot a_{13} + a_{21} \cdot a_{23} + a_{31} \cdot a_{33} = 0$$

$$a_{12} \cdot a_{13} + a_{22} \cdot a_{23} + a_{32} \cdot a_{33} = 0.$$

ஆகவே, A -ன் 3 உறுப்புகளுக்குள் 3 சமன்பாடுகள் இருக்க வேண்டும். நீதமான 3 உறுப்புகளையும் நம் வீரூபம்மேசம் எடுத்துக்கொள்ள முடியாது. உதாரணமாக ஒரு மெய்யான ஆணியில் எந்த உறுப்பும் $-1 < a_{ij} < 1$ ஆக இருக்க வேண்டும் என்பது மூதல் மூன்று சமன்பாடுகளில் இருந்து தெரிகிறது.

பொதுவாக, n வெக்டர்கள் கொண்ட குழுவில் இருந்து $n + (n-1) + \dots + 1 = \frac{n(n+1)}{2}$ உட்பெருக்கங்கள் கிடைக்கும்.

(இதில் ஒரு வெக்டரை அதனுடன் உட்பெருக்கியதும் அடங்கும்.)

எனவே, $n^2 - \frac{n(n+1)}{2} = \frac{n(n-1)}{2}$ உறுப்புகளைத் தெரித்து கொள்ளலாம். இவை $|a_{ij}| < 1$ என்றும் நிபந்தனைக்கு உட்பட்டவை.

11.2. தேற்றம் 1:

A, B என்பன செங்குத்தணிகள் ஆனால் AB -ம், BA -ம் செங்குத்தணிகள் ஆதல் வேண்டும்.

$$A'A = I = B'B \quad \dots \quad \dots \quad \text{கொள்கை}$$

$$\therefore (AB)' AB = B'A' AB = B'IB = I$$

$$\therefore AB \text{ ஒரு செங்குத்தணி.}$$

இவ்வாறு, BA -க் ஒரு செங்குத்தணியாகும்.

தேற்றம் 2: A என்றும் செங்குத்தணி, $|A| = +1$ என்பதற்க்கெனங்க இருந்தால் அதன் ஒப்போல் உறுப்பும் அதனதம் இணை காரணிகளுக்குச் சமவாய் இருக்கும்.

நிபுணம் : A ஓர் இரு சதுர செங்குத்தணி.

$$\therefore A^{-1} = A' \quad \dots \dots \dots (1)$$

$$\text{ஆகவே, } A^{-1} = \begin{bmatrix} A_{11} & A_{12} \\ A_{21} & A_{22} \end{bmatrix} = |A|$$

$$= \begin{bmatrix} A_{11} & A_{21} \\ A_{12} & A_{22} \end{bmatrix} \quad \because |A| = 1$$

$$\therefore A' = \begin{bmatrix} A_{11} & A_{21} \\ A_{12} & A_{22} \end{bmatrix} \quad \dots \dots (1)\text{-ல் இருந்து}$$

$$\therefore \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} A_{11} & A_{21} \\ A_{12} & A_{22} \end{bmatrix}$$

$$a_{11} = A_{11}, \quad a_{21} = A_{21}, \quad a_{12} = A_{12}, \quad a_{22} = A_{22}$$

குறிப்பு 1 : இந்த நிபுணம் n -சதுர அணிக்கும் எளிதாகப் பொருத்தும்.

குறிப்பு 2 : $|A| = +1$ ஆக இருக்கும் செங்குத்தணிவைத் தகு செங்குத்தணி (Proper orthogonal Matrix) என்று சொல்வதன் பொருள்.

உதாரணம் 2 : ஓர் இரு சதுர மெய்யான செங்குத்து அணி $\begin{bmatrix} \cos \theta & -\sin \theta \\ \sin \theta & \cos \theta \end{bmatrix}$ ஆகலது $\begin{bmatrix} \cos \theta & \sin \theta \\ \sin \theta & -\cos \theta \end{bmatrix}$ என்று இருக்க வேண்டும் என நிரூபி.

நிபுணம் : $A = \begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix}$ என்பது ஒரு செங்குத்தணிவாக இருக்கட்டும்.

$$\therefore A'A = I$$

$$\therefore \begin{bmatrix} a & c \\ b & d \end{bmatrix} \begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$$\therefore \begin{bmatrix} a^2 + c^2 & ab + cd \\ ab + cd & b^2 + d^2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$$\therefore a^2 + c^2 = 1 = b^2 + d^2; \quad ab + cd = 0$$

ஆனால் a, b, c, d மெய்யானவை.

$\therefore$ அவற்றின் மதிப்பு 1 ஐ விடக் குறைவாக இருக்க வேண்டும்.

$$\therefore a = \cos \theta, \quad b = \cos \phi \text{ எனக் கொள்க.}$$

$$\text{அப்படியானால் } c = \pm \sin \theta; \quad d = \pm \sin \phi$$

$$\text{மேலும் } ab + cd = 0$$

$$\therefore \cos \theta \cdot \cos \phi \pm \sin \theta \cdot \sin \phi = 0$$

$$\therefore \cos(\phi \pm \theta) = 0$$

$$\therefore \phi = \frac{\pi}{2} - \theta \text{ அல்லது } \phi = \frac{\pi}{2} + \theta.$$

$$\therefore A = \begin{bmatrix} \cos \theta & \sin \theta \\ \sin \theta & -\cos \theta \end{bmatrix} \text{ அல்லது } \begin{bmatrix} \cos \theta & -\sin \theta \\ \sin \theta & \cos \theta \end{bmatrix}$$

என்பது தேவையான அணியின் பொது ரூபமாகும்.

11.3. செங்குத்தான மாற்றங்கள் (Orthogonal transformations)

A என்பது ஒரு செங்குத்தனியாக இருக்கட்டும். $Y = AX$ என்றும் மாற்றத்தைச் செங்குத்தான மாற்றம் என்று சொல்வோம்.

தேற்றம் 3 : ஒரு செங்குத்தான மாற்றத்தாக ஒரு வெக்டரின் நீளம் மாறாது.

$$Y = AX \text{ என்ற மாற்றத்தை எடுத்துக்கொள். இதில் } A' = A^{-1}$$

$$Y'Y = (AX)' \cdot AX = X' A' A X = X' I X = X'X$$

$$\therefore Y\text{-ன் நீளம்} = X\text{-ன் நீளம்.}$$

தேற்றம் 4 : (1-ன் மறுதலை) : A என்ற அணி கொண்டு ஒரு வெக்டரை மாற்றும் போழுது அதன் நீளம் மாறுதிருத்தாக A ஒரு செங்குத்தனியாக இருக்க வேண்டும்.

$$(AX)'AX = X'X \quad \dots \quad \dots \quad \dots \quad (\text{கொள்க})$$

$$\therefore X' A' A X = X'X$$

$$\therefore X'(A'A - I)X = 0$$

$$B = A'A - I \text{ ஆகும்}$$

$$X'BX = 0 \quad \dots \quad \dots \quad \dots \quad (1)$$

இதில் X எந்த வெக்டராகவும் கொள்ளலாம். $B = 0$ என நாம் நிரூபிக்க வேண்டும்.

($\because$ அப்பொழுது $A'A = I$ ஆக இருக்கும்.)

(1)-ல் $B = 0$ எனப் போட்டால் அது பொருத்தும் என்பது தெளிவு. ஆனால் அது 0 ஆகத்தான் இருக்க வேண்டும் என நிரூபிக்க வேண்டும்.

முதலாவதாக, B ஒரு எம்ச்சி அணி என்பதைக் கவனி.

$$\therefore B' = (A'A - I)' = A'A - I = B$$

B -ல் உள்ள ஒர் உறுப்பு b_{ij} ($=b_{ji}$) ஆகவும் X -ன் ஒர் உறுப்பு x_i ஆகவும் இருத்தால்,

$$X'BX = b_{11}x_1^2 + b_{22}x_2^2 + 2b_{12}x_1x_2 + \dots + 2b_{ij}x_ix_j + \dots$$

இதில் $X' = (1, 0, \dots, 0)$ எனப் போடலாம்.

$$\therefore b_{11}x_1^2 \text{ தவிர மீதிவெல்லாம் பூச்சியம்.}$$

$$\therefore X'BX = b_{11}x_1^2 = 0 \quad \therefore b_{11} = 0$$

இதேவிதமாக எல்லா i -க்கும் $b_{ii} = 0$ என நிரூபிக்கலாம்.

இப்பொழுது $x_1 = 1 = x_j$ ஆகவும், மீத உறுப்புகளும் 0 ஆகவும் இருக்கும்படி X ஐ எடுத்துக்கொள். அப்படியானால் $2 \cdot b_{ij}x_ix_j$ தவிர மீதி எல்லாம் பூச்சியமாகும். ($b_{ii} = b_{jj} = 0$ என நிரூபித்துவிட்டோம் என்பதை நினைவிற் கொள்.)

$$\therefore X'BX = 2b_{ij}x_ix_j = 2b_{ij} = 0$$

$$\therefore B = 0 \quad \therefore A'A - I = 0 \quad \therefore A'A = I$$

$$\therefore A \text{ ஒரு செங்குத்தணி.}$$

11-4. செங்குத்தனிகளின் நேர்மேயல்பு மூலங்கள்

முதலாவதாக, ஒரு மேல்பாண அணியின் சிதம்பேயல்பு மூலங்கள் சிக்கல் எண்களாக (Complex numbers) இருக்கக்கூடும் என்பதை நினைவுபடுத்திக் கொள்வோம்.

தேற்றம் 5: ஒரு செக்குத்தனியின் சிறப்பியல்பு மூலத்தின் மட்டு (Modulus of the characteristic root) ஒன்றாக இருக்க வேண்டும்.

திருபணம்: A என்ற செக்குத்தனியின் சிறப்பியல்பு மூலம் λ ஆக இருக்கட்டும்.

$$\therefore \lambda X = AX$$

$$\therefore \bar{\lambda} \bar{X} = A \bar{X} \quad (\because \bar{A} = A).$$

A ஒரு மெய்யான அணி.

$$\therefore \bar{\lambda} \bar{X}' = \bar{X}' \cdot A'$$

$$\begin{aligned} \therefore \bar{\lambda} \lambda \cdot \bar{X}' X &= \bar{X}' A' AX \quad \because AX = \lambda X \\ &= \bar{X}' X \quad \because A \text{ ஒரு செக்குத்தணி,} \end{aligned}$$

$$\therefore \bar{\lambda} \lambda = 1 \quad \therefore |\lambda| = 1.$$

குறிப்பு: ஒரு செக்குத்தனியின் சிறப்பியல்பு மூலத்தை $\cos \alpha + i \sin \alpha$ எனக் குறிப்பிடலாம்.

$$\therefore |\cos \alpha + i \sin \alpha| = 1.$$

தேற்றம் 6: ஒரு சிக்கமென் செக்குத்தனியின் சிறப்பியல்பு மூலமாக இருத்தல், அதன் இயைச் சிக்கமென்னும் ஒரு சிறப்பியல்பு மூலமாக இருக்கவேண்டும்.

λ என்பது A என்ற செக்குத்தனியின் சிறப்பியல்பு மூலமாக இருக்கட்டும்.

$$\therefore \lambda X = AX$$

$$\therefore \lambda^{-1} \lambda \cdot A^{-1} X = \lambda^{-1} A^{-1} AX$$

$$A^{-1} X = \lambda^{-1} X$$

$$\therefore A' X = \lambda^{-1} X \quad \therefore A \text{ ஒரு செக்குத்தணி}$$

$$\therefore 0 = |\lambda^{-1} I - A| = |(\lambda^{-1} I - A)'| = |\lambda^{-1} I - A|$$

$$\therefore \lambda^{-1} \text{-ம் } A\text{-ன் சிறப்பியல்பு மூலமாகும்.}$$

$$\text{ஆகவே } \lambda^{-1} = \bar{\lambda}$$

$$\therefore \lambda, \bar{\lambda} \text{ என்பன } A\text{-ன் சிறப்பியல்பு மூலங்கள்.}$$

தேற்றம் 7 : A என்ற செங்குத்தணிவின் சிதப்பியல்புச் சமன்பாடு ஒரு தலைகீழ்ச் சமன்பாடு (Reciprocal equation) ஆகும்.

$$\begin{aligned}
 \phi(\lambda) &= |\lambda I - A| \\
 &= |\lambda A A' - A| \quad \because A' A = I \\
 &= |-A \lambda \left(\frac{I}{\lambda} - A' \right)| \\
 &= \pm \lambda^3 \left| \frac{I}{\lambda} - A' \right| \quad \because |A| = \pm 1 \\
 &= \pm \lambda^3 \cdot \phi\left(\frac{1}{\lambda}\right).
 \end{aligned}$$

உதாரணம் 3 : $c_1 = \begin{bmatrix} \frac{1}{2} \\ \frac{2}{3} \\ \frac{1}{3} \end{bmatrix}$ என இருக்குமாறு.

$A = [c_1 \ c_2 \ c_3]$ என்ற ஒரு செங்குத்தணிவைக் கண்டுபிடி.

$$A = \begin{bmatrix} \frac{1}{2} & a & x \\ \frac{2}{3} & b & y \\ \frac{1}{3} & c & z \end{bmatrix} \text{ ஆக இருக்கட்டும்.}$$

$$\begin{aligned}
 A'A &= \begin{bmatrix} \frac{1}{2} & \frac{2}{3} & \frac{1}{3} \\ a & b & c \\ x & y & z \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \frac{1}{2} & a & x \\ \frac{2}{3} & b & y \\ \frac{1}{3} & c & z \end{bmatrix} \\
 &= \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}
 \end{aligned}$$

$$\therefore x^2 + b^2 + c^2 = 1 \quad \dots \dots \dots (1)$$

$$x^2 + y^2 + z^2 = 1 \quad \dots \dots \dots (2)$$

$$x + 2y + 3z = 0 \quad \dots \quad (3)$$

$$x + 2y + 3z = 0 \quad \dots \quad (4)$$

$$ax + by + cz = 0 \quad \dots \quad (5)$$

(3)-ல் $x = 0$; $b = 1$; $c = -1$ எனப் போடலாம்.

$$\text{ஆனால் (1)-ல் இருந்து } a = 0; \quad b = \frac{1}{\sqrt{2}}; \quad c = -\frac{1}{\sqrt{2}}$$

ஆக இருக்கவேண்டும் என்பது தெரிகிறது.

$$\therefore (4), (5)\text{-ல் இருந்து } \frac{x}{-4} = \frac{y}{1} = \frac{z}{1}$$

$$\therefore (2)\text{-ல் இருந்து } x = \frac{4}{3\sqrt{2}}; \quad y = \frac{-1}{3\sqrt{2}}; \quad z = \frac{-1}{3\sqrt{2}}$$

$$\therefore A = \begin{bmatrix} \frac{1}{3} & 0 & \frac{4}{3\sqrt{2}} \\ \frac{2}{3} & \frac{1}{\sqrt{2}} & -\frac{1}{3\sqrt{2}} \\ \frac{2}{3} & -\frac{1}{\sqrt{2}} & -\frac{1}{3\sqrt{2}} \end{bmatrix}$$

11-5. சிக்கல் செங்குத்தணி (Unitary Matrix)

A என்ற சதுர அணி $A^* A = I$ என்பதற்கிடையாக இருந்தால் அந்தச் சிக்கல் செங்குத்தணி என்று சொல்வோம்.

$$|A^*| = |\bar{A}'| = |\bar{A}|$$

$$|A^* A| = |A^*| |A| = |\bar{A}| |A|$$

$$\therefore A^* A = I \text{ ஆனால் } |\bar{A}| |A| = 1$$

அதாவது, ஒரு சிக்கல் செங்குத்தணியின் அணிக் கோவை யின் மட்டு (modulus) 1 ஆக இருக்க வேண்டும்.

உதாரணம் 4: $A = \begin{bmatrix} 0 & -i \\ i & 0 \end{bmatrix}$ ஒரு சிக்கல் செங்குத்தணி என்று காண்பி.

$$A = \begin{bmatrix} 0 & i \\ -i & 0 \end{bmatrix}; \quad (A)^* = \begin{bmatrix} 0 & -i \\ i & 0 \end{bmatrix}$$

$$\begin{aligned} \therefore A^* A &= (A)^* A = \begin{bmatrix} 0 & -i \\ i & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 & -i \\ i & 0 \end{bmatrix} \\ &= \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} = I \end{aligned}$$

$$\therefore A^* A = I$$

$\therefore A$ ஒரு சிக்கல் செங்குத்தணி.

தேற்றம் 8: A, B என்பன சிக்கல் செங்குத்தனிகள் ஆனால் AB -ம், BA -ம் செங்குத்தனிகள்.

$$\begin{aligned} \text{நியுபனம்: } (AB)^* \cdot AB &= B^* A^* \cdot AB \\ &= B^* IB \\ &= B^* B \\ &= I \end{aligned}$$

$\therefore AB$ ஒரு செங்குத்தணி.

இங்ஙனமே BA -ம் ஒரு செங்குத்தனியாகும்.

அச்சுகளைச் சுழற்றல் (Rotation of Axes)

$V = xi + yj + zk$ என்பது நமக்கு தங்குதத் தெரிந்த வெக்டர். இது V^* வெக்டர் வெளியில் உள்ளது. i, j, k , என்பன X, Y, Z அச்சுகள் வழி உள்ள அலகு வெக்டர்கள் ஆகும். இவை ஓர் அடிப்படை வெக்டர் குழு (basis) என்றும் நாம் அறிவேோம்.

இப்பொழுது,

$$A = \begin{bmatrix} u_1 & u_2 & u_3 \\ v_1 & v_2 & v_3 \\ w_1 & w_2 & w_3 \end{bmatrix}$$

என்ற செங்குத்தனியை எடுத்துக் கொள்வோம்.

இதன் மூலம் கிடைக்கும்,

$$u = u_1 i + u_2 j + u_3 k$$

$$v = v_1 i + v_2 j + v_3 k$$

$$w = w_1 i + w_2 j + w_3 k$$

என்ற u, v, w வெக்டர்கள் அல்ல வெக்டர்களாக இருக்க வேண்டும். ஏனெனில்

$$\begin{aligned} u \cdot u &= (u_1 i + u_2 j + u_3 k) \cdot u_1 i + (u_2 j + u_3 k) \\ &= u_1^2 + u_2^2 + u_3^2 \\ &= 1 \quad \because A \text{ ஒரு செக்குத்தணி.} \end{aligned}$$

இதே விதமாக $v \cdot v = 1 = w \cdot w$.

மேலும், அதே ஆதிவை (origin) ஐ ஒத்துக் கொண்டு u, v, w ன் திசைகளில் U, V, W அச்சுகளை எடுத்துக்கொண்டால் இவை ஒன்றுக்கொன்று செங்குத்தாக இருக்கும். ஏனெனில்,

$$\begin{aligned} u \cdot v &= u_1 v_1 + u_2 v_2 + u_3 v_3 \\ &= 0 \quad \because A \text{ ஒரு செக்குத்தணி.} \end{aligned}$$

இதேவிதமாக, $u \cdot w = 0 = v \cdot w$.

ஆகவே, (u, v, w) என்ற அல்ல வெக்டர்கள் மற்ரேச் அடிப் படைக் குழு ஆகும்.

$$\begin{aligned} \therefore V &= (x, y, z) \\ &= xi + yj + zk \\ &= x' u + y' v + z' w \\ &= (x', y', z') \\ &= V' \end{aligned}$$

என்று கொள்வது தரும். மேலும்,

$$\begin{aligned} xi + yj + zk &= x' u + y' v + z' w \\ &= x' (u_1 i + u_2 j + u_3 k) \\ &\quad + y' (v_1 i + v_2 j + v_3 k) \\ &\quad + z' (w_1 i + w_2 j + w_3 k) \end{aligned}$$

$$\therefore x = u_1 x' + v_1 y' + w_1 z'$$

$$y = u_2 x' + v_2 y' + w_2 z'$$

$$z = u_3 x' + v_3 y' + w_3 z'$$

$$\text{இதை } \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} u_1 & v_1 & w_1 \\ u_2 & v_2 & w_2 \\ u_3 & v_3 & w_3 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x' \\ y' \\ z' \end{bmatrix}$$

$$\text{அல்லது } V = A' V'$$

என்று குறிப்பிடுவோம்.

$$\therefore AV = AA' V' = V' \quad (\because AA' = I.)$$

உதாரணம்:

$$A = \begin{bmatrix} \cos \alpha & \sin \alpha \\ -\sin \alpha & \cos \alpha \end{bmatrix}$$

என்ற அனியாக் விலையுள் அச்ச நிலை மாற்றத்தை ஆராய்க.

முதலாவதாக, A ஒரு செக்குத்தணி எம்பதைக் கவனி. ஏனெனில்

$$AA' = \begin{bmatrix} \cos \alpha & \sin \alpha \\ -\sin \alpha & \cos \alpha \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \cos \alpha & -\sin \alpha \\ \sin \alpha & \cos \alpha \end{bmatrix} = I.$$

இப்பொழுது,

$$\begin{bmatrix} x' \\ y' \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \cos \alpha & \sin \alpha \\ -\sin \alpha & \cos \alpha \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix}$$

$$\therefore x' = x \cos \alpha + y \sin \alpha$$

$$y' = -x \sin \alpha + y \cos \alpha$$

மீண்டும், $V = A' V'$

$$\therefore \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \cos \alpha & -\sin \alpha \\ \sin \alpha & \cos \alpha \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x' \\ y' \end{bmatrix}$$

$$x = x' \cos \alpha - y' \sin \alpha$$

$$y = x' \sin \alpha + y' \cos \alpha$$

பகுமுறை வரை கணிதத்தில் (Analytical geometry)

$$\begin{aligned}x' &= r \cos (\theta - \alpha) \\&= r \cos \theta \cos \alpha + r \sin \theta \sin \alpha \\&= x \cos \alpha + y \sin \alpha\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}y' &= r \sin (\theta - \alpha) \\&= r \sin \theta \cos \alpha - r \cos \theta \sin \alpha \\&= -x \sin \alpha + y \cos \alpha\end{aligned}$$

என்பதை உற்று நோக்குக.

பொதுவாக, ஒரு செங்குத்தணி கொண்டு விளையும் மாற்றம் அநேகமாக (almost) அச்சுகளின் சுழற்சியாக இருக்கும் எனக் கூறலாம். இது எங்குள்ளதும் என்கில், A என்ற செங்குத் தணியின் அணிக்கோவை மதிப்பு $|A| = 1$ அல்லது -1 ஆக இருக்க வேண்டும். மேலும்,

$$\begin{aligned}u &= u_1 i + u_2 j + u_3 k \\v &= v_1 i + v_2 j + v_3 k \\w &= w_1 i + w_2 j + w_3 k\end{aligned}$$

என்ற சமன்பாடுகளின் துணைகொண்டு

$$u \times v = |A| w$$

என நிரூபிக்கலாம்.

$|A| = 1$ ஆனால் u, v, w -ன் திசைக் கோட் சேர்க்கை (right or left handed orientation) i, j, k ஐ ஒத்தே இருக்கும். இப்போது, சாதாரண சுழற்சிகள் மூலமே இரு அச்சுகளையும் ஒன்றுக்கிணைலாம்.

$|A| = -1$ ஆனால் $u \times v = -w$ ஆகும். இப்பொழுது வெறும் சுழற்சிகளோடு மட்டுமன்றி, ஓர் அச்சின் திசை மாற்றமும் செய்வவேண்டியதாகும்.

உதாரணம்: $XYZ; X'Y'Z'$ என்பன ஒரே ஆதிநையமுடைய இரு கூற்றத் தொகுதிகளாக (coordinate system) இருக்கட்டும். $r = (x, y, z); r' = (x', y', z')$ என்பவை ஒரே புள்ளியின் கூறு களாக இருக்கட்டும்.

$r^2 = Ar$ ஆகவும்

$$A = \begin{bmatrix} \frac{1}{2} & \frac{1}{2} & \frac{1}{2} \\ \frac{1}{2} & \frac{1}{2} & -\frac{1}{2} \\ \frac{1}{2} & -\frac{1}{2} & \frac{1}{2} \end{bmatrix}$$

ஆகவும் இருந்தால்,

(அ) ஒரு தளத்தின் சமன்பாடு $9x - 6y - 9z - 1 = 0$ ஆனால் (x, y, z) -ல் அதன் சமன்பாடு என்ன?

(ஆ) $(x, y, z) = (8, 9, 9)$ என்ற புள்ளியின் (x', y', z') என்ன?

(இ) $(x', y', z') = (11, -2, 1)$ என்ற புள்ளியின் (x, y, z) என்ன?

(ஈ) $8x - 6y - 9z + 1 = 0$ என்ற தளத்தின் (x', y', z') சமன்பாடு என்ன?

முதலாவதாக, A ஒரு செங்குத்தனி என்றும், $|A| = 1$ என்றும் இருப்பதைக் கவனி. எனவே இதனால் விளையும் அச்சங்களின் கூற்றிசியாக மட்டுமே இருக்க வேண்டும்.

$X' Y' Z'$ கூற்றத் தொகுதியை நினைவிக்க, அதன் ஆயப் படைக் குறையின் ஆயகு வெக்டர்களைக் கண்டுபிடித்தாக் போது மானது. இவைகளின் முடிவுப் புள்ளிகள் (terminal points) $(\frac{1}{2}, \frac{1}{2}, \frac{1}{2})$; $(\frac{1}{2}, \frac{1}{2}, -\frac{1}{2})$; $(\frac{1}{2}, -\frac{1}{2}, \frac{1}{2})$ ஆகும்.

[ஏனெனில் $V = A' V^*$

$$\begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{1}{2} & \frac{1}{2} & \frac{1}{2} \\ \frac{1}{2} & \frac{1}{2} & -\frac{1}{2} \\ \frac{1}{2} & -\frac{1}{2} & \frac{1}{2} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}$$

$$= \begin{bmatrix} \frac{1}{2} \\ \frac{1}{2} \\ \frac{1}{2} \end{bmatrix}$$

(அ) $V^2 = AV$.

$$\begin{bmatrix} x' \\ y' \\ z' \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{1}{3} & \frac{2}{3} & \frac{2}{3} \\ -\frac{2}{3} & \frac{1}{3} & -\frac{2}{3} \\ \frac{2}{3} & -\frac{2}{3} & \frac{1}{3} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix}$$

$$\therefore \left. \begin{aligned} x' &= \frac{x}{3} + \frac{2y}{3} + \frac{2z}{3} \\ y' &= \frac{2x}{3} + \frac{y}{3} - \frac{2z}{3} \\ z' &= \frac{2x}{3} - \frac{2y}{3} + \frac{z}{3} \end{aligned} \right\} (f)$$

$$\therefore 2x' - 2y' - 2z' - 1 = 0$$

அதாவது, $2x + 2y + 2z - 2(2x + y - 2z)$
 $-(2x - 2y + z) - 1 = 0$.

அதாவது, $-2x + 2y + 2z - 1 = 0$.

(ஆ) (f)-ல் $x = 2$, $y = 2$, $z = 2$ எனப் போடு.

$$x' = 11, y' = -2, z' = 1.$$

$$\therefore (x', y', z') = (11, -2, 1)$$

(இ) (அ) - உகைப் படித்திக்கு.

பயிற்சி 11

1. உதாரணம் 1-ல், $a_{11}, a_{12}, a_{13}; a_{21}, a_{22}, a_{23}; a_{31}, a_{32}, a_{33}$ என்பன ஒன்றுக்கொன்று செங்குத்தாக இருக்கும் என்று கோடுகளின் திசைக் கோவைகள் என நினை.

2. பின்வருவன செங்குத்தானாக என நினை.

$$(a) \begin{bmatrix} \frac{2}{\sqrt{3}} & 0 & \frac{-1}{\sqrt{3}} \\ \frac{1}{\sqrt{3}} & \frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{6}} \\ \frac{1}{\sqrt{3}} & \frac{-1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{6}} \end{bmatrix}$$

$$(b) \begin{bmatrix} \cos \phi & 0 & \sin \phi \\ \sin \theta \sin \phi & \cos \theta & -\sin \theta \cos \phi \\ -\cos \theta \sin \phi & \sin \theta & \cos \theta \cos \phi \end{bmatrix}$$

$$(c) \frac{1}{2} \begin{bmatrix} 1 & 2 & 2 \\ 2 & 1 & -2 \\ -2 & 2 & -1 \end{bmatrix}$$

$$(d) \begin{bmatrix} \cos \phi & \sin \phi & 0 \\ -\sin \phi & \cos \phi & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

8. கீழ்வருவன சிக்கல் செங்குத்தணிகள் என நோக்கி.

$$(a) \begin{bmatrix} \frac{1}{2} (1 + i) & \frac{i}{\sqrt{2}} & \frac{8 + i}{2\sqrt{15}} \\ -\frac{1}{2} & \frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{4 + 3i}{2\sqrt{15}} \\ \frac{1}{2} & -\frac{i}{\sqrt{2}} & \frac{8i}{2\sqrt{15}} \end{bmatrix}$$

$$(b) \begin{bmatrix} \frac{1}{2} & \frac{i}{2} & \frac{1-i}{2} \\ \frac{i}{\sqrt{2}} & \frac{-i}{\sqrt{2}} & 0 \\ \frac{1}{2} & \frac{-i}{2} & \frac{-1+i}{2} \end{bmatrix}$$

4. $\begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \end{bmatrix}$ ஐ முதல் நிரலாகக் கொண்ட சமச்சீர் செங்குத்தணியைக் கண்டுபிடி.

6. A என்பது எதிர் ஹெர்மிஷன் அணியாக இருந்தால் $(I-A)(I+A)^{-1}$ ஒரு சிக்கல் செங்குத்தணி என நிரூபி.

இதை உபயோகித்து, பீக் கண்ட எதிர் ஹெர்மிஷன் அணி களிலிருந்து சிக்கல் செங்குத்தணிகளை உருவாக்குக.

$$(i) \begin{bmatrix} i & 1-i \\ -1-i & 8i \end{bmatrix} \quad (ii) \begin{bmatrix} i & 1-i & i \\ -1-i & 8i & i \\ -1 & i & 0 \end{bmatrix}$$

12. இருபடி சமச்சீர்க் கோவைகள் (Quadratic Forms)

12.1. $ax^2 + 2hxy + by^2$ என்பது இரு மாறிகளில் உள்ள இருபடி சமச்சீர்க் கோவையாகும். இதே மாதிரி மூன்று மாறிகளில் உள்ள இருபடி சமச்சீர்க் கோவைவானது $ax^2 + by^2 + cz^2 + 2fyz + 2gzx + 2hxy$ ஆகும். பொதுவாக,

$$\sum_{j=1}^n \sum_{i=1}^n a_{ji} x_i x_j$$

என்பது n மாறிகளில் உள்ள இருபடி சமச்சீர்க் கோவைவாகும். இதில் $a_{ij} = a_{ji}$ ஆக எடுத்துக் கொண்டால்,

$$\sum_{i=1}^n a_{ii} x_i^2 + 2 \sum_{i < j} a_{ij} x_i x_j$$

என்று எழுதலாம்.

12.2. இருபடி சமச்சீர்க் கோவைகளைக் கீழ்க்கண்டவாறு அணிகளின் பெருக்கற் பலனாக எழுதலாம் என்பது நோக்கத்தக்கது.

$$(i) \quad ax^2 + 2hxy + by^2 = [x \ y] \begin{bmatrix} a & h \\ h & b \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix}.$$

$$(ii) \quad ax^2 + by^2 + cz^2 + 2fyz + 2gzx + 2hxy$$

$$= [x \ y \ z] \begin{bmatrix} a & h & g \\ h & b & f \\ g & f & c \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix}$$

(iv) ஆம் உதாரணத்தில் தருகில் உள்ள அணியின் மூலக் கிடை உறுப்புகள் x^2, y^2, z^2 -ன் குணகங்கள் என்றும், மூலக் தீர்மானம் உள்ள எஞ்சிய உறுப்புகளான h, g என்பன மூலத்தையே xy, xz -ன் குணகங்களை 2 ஆல் வகுக்கக் கிடைக்கின்றன என்றும், இரண்டாம் தீர்மானம் உள்ள f ஆனது yz -ன் குணகத்தை 2 ஆல் வகுக்கக் கிடைக்கும் என்பதையும் கவனித்துக் கொள்க.

ஆதலால், ஓர் இருபடி சமச்சீர்க் கோவை கொடுத்தால் அதற்குரிய ஒரு சமச்சீர் அணியைக் கண்டுபிடிக்க முடியும். மேலும், ஒரு சமச்சீர் அணி கொடுக்கப்பட்டால் அதற்குரியதே இருபடி சமச்சீர்க் கோவையையும் கண்டுபிடிக்க முடியும்.

உதாரணம் $1 : 8x^2 + 4y^2 - z^2 + 2yz - 4zx + 6xy$ ஐச் சமச்சீர் அணிக்கோவையாக மாற்று.

இங்கு $a=8, b=4, c=-1, f=1, g=-2, h=3$.

$$\therefore \text{வேண்டிய சமச்சீரணி} = \begin{bmatrix} a & h & g \\ h & b & f \\ g & f & c \end{bmatrix}$$

$$= \begin{bmatrix} 8 & 3 & -2 \\ 3 & 4 & 1 \\ -2 & 1 & -1 \end{bmatrix}$$

12.3. மக்னாக இருபடி சமச்சீர்க் கோவைகள்

(i) **தேர்ந்தேற்கோவை (Positive Definite Form):** இத்தக கோவையின் மதிப்பு $x=0, y=0$ என இருத்தால் மட்டும் மிகச்சிறை இருக்கும். வேறு எல்லா மதிப்புகளுக்கும் தேர்ந்தேற்கோவை (positive) இருக்கும். உதாரணம் :

$$x^2 + y^2 = [x \ y] \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix}$$

(ii) **தேர்ந்தேற்கோவை (Positive Semi-Definite Form):** இத்தக கோவையின் மதிப்பு பூச்சிறைகோவோ, அல்லது தேர்ந்தேற்கோவை இருக்கும். உதாரணம் :

$$\begin{aligned} (x+y)^2 &= x^2 + 2xy + y^2 \\ &= [x \ y] \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix}. \end{aligned}$$

இது $x = -y$ ஆக இருக்கும்போதும், பூச்சியமாவதைக் கவனி.

(iii) **நேர் குறைக் கோவை (Negative Definite Form) :** இதன் மதிப்பு $x=0$, $y=0$ ஆக இருத்தாலொழிய குறைவாக (negative) இருக்கும். உதாரணம் :

$$-x^2 - y^2 = [x \ y] \begin{bmatrix} -1 & 0 \\ 0 & -1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix}$$

(iv) **குறைக் கோவை (Negative Semi Definite Form) :** இதன் மதிப்பு பூச்சியமாகவோ அல்லது குறைவாகவோ இருக்கும். உதாரணம் :

$$-(x+y)^2 = [x \ y] \begin{bmatrix} -1 & -1 \\ -1 & -1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix}$$

(v) **கனையற்ற கோவை (Indefinite Form) :**

இதன் மதிப்பு நேர்வாகவோ குறைவாகவோ இருக்கலாம். உதாரணம் :

$$x^2 - y^2 = [x \ y] \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix}$$

$x > y$ ஆனால் இதன் மதிப்பு நேர்வாகவும்,

$x < y$ ஆனால் இதன் மதிப்பு குறைவாகவும் இருப்பதைக் கவனி.

18.4 வகையான ஓரளவற்ற $ax^2+by^2+cz^2+2fyz+2gzx+2hxy$ ஐ $a'x'^2+b'y'^2+c'z'^2$ ஆக ஒடுக்குதல் (Reduction) :

இதை நாம் ஒரே உதாரணங்களால் விளக்குவோம்.

உதாரணம் 2: $x^2 + 6y^2 + 16z^2 - 4yz + 8zx + 4xy$ ஐ ஒடுக்குக.

$$\begin{aligned} & x^2 + 6y^2 + 16z^2 - 4yz + 8zx + 4xy \\ &= x^2 + 2x(2y+4z) + 6y^2 + 16z^2 \\ &= (x+2y+4z)^2 - (2y+4z)^2 + 6y^2 + 16z^2 \\ &= (x+2y+4z)^2 - 4y^2 - 16yz - 16z^2 + 6y^2 + 16z^2 \\ &= (x+2y+4z)^2 + 2y^2 - 16yz + 2z^2 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
&= (x+2y+4z)^2 + 2[y^2-8yz] + 2z^2 \\
&= (x+2y+4z)^2 + 2[(y-4z)^2-16z^2] + 2z^2 \\
&= (x+2y+4z)^2 + 2(y-4z)^2-30z^2 \\
&= x'^2+2y'^2-30z'^2.
\end{aligned}$$

குறிப்பு 1 : இது ஒரு வரைவகுத (Indefinite form) கோவை.

குறிப்பு 2 : $x' = x + 2y + 4z$

$$y' = y - 4z$$

$$z' = z$$

என்பவை மாறி மாற்றச் சமன்பாடுகள்.

$$\begin{bmatrix} 1 & 2 & 4 \\ 0 & 1 & -4 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \quad \text{என்பது மாறி மாற்ற அணி.}$$

எனவே, ஒருபடிமில் மாறி மாற்றத்தால், இருபடி சமச்சீர்க் கோவைவை, சதுரங்களில் எண்ணி பெருக்கிகளில் கூடுதலாக எழுத முடியும் எனத் தெரிகிறது. இதையே வக்ராபுசே முறைப் படி ஒடுக்கல் (Reduction) என்று சொல்கிறோம்.

உதாரணம் 3 : $xy+yz+zx$ ஐ ஒடுக்குக.

$$\begin{aligned}
&xy+yz+zx \\
&= \frac{(x+y)^2 - (x-y)^2}{4} + yz+zx \\
&= \frac{1}{4} (x+y)^2 - \frac{1}{4} (x-y)^2 + z(x+y) \\
&= \frac{1}{4} [(x+y)^2 + 4(x+y)z] - \frac{1}{4} (x-y)^2 \\
&= \frac{1}{4} [(x+y+2z)^2 - 4z^2] - \frac{1}{4} (x-y)^2 \\
&= \frac{1}{4} (x+y+2z)^2 - \frac{1}{4} (x-y)^2 - z^2 \\
&= \frac{1}{4} x'^2 - \frac{1}{4} y'^2 - z'^2
\end{aligned}$$

இதில், $X' = x + y + 2z$

$$y' = x - y$$

$$z' = z.$$

இதில் ஒரு வரையறுத கோவையே,

$$\begin{bmatrix} 1 & 1 & 2 \\ 1 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \quad \text{இதன் மாற்றமற்ற அணிவாகும்.}$$

12-5. இருபடி சமச்சீர்க் கோவையின் ஒருபடி மாற்றம்
(Linear Transformations of a Quadratic Form)

$X' A X$ என்ற இருபடி சமச்சீர்க் கோவையை எடுத்துக் கொள்வோம். இதில் A ஒரு சமச்சீர் அணி.

$$X = P Y$$

என்பதில் P பூச்சியமில் அணி ஆக இருக்கட்டும்.

$$\begin{aligned} \therefore X' A X &= (P Y)' A P Y \\ &= Y' P' A P Y \\ &= Y' B Y. \end{aligned}$$

[இதில் $B = P' A P$ -ம் சமச்சீர் அணிவாகும்.

$$\because (P' A P)' = P' A' (P')' = P' A P,$$

ஏனெனில், A ஒரு சமச்சீர் அணி.]

ஆகவே A ஐ அணிவாகக் கொண்டு $X' A X$ என்ற கோவையில் $X = P Y$ என்ற மாற்றம் செய்தால், $B = P' A P$ ஐ அணிவாகக் கொண்டு $Y' B Y$ என்ற கோவை கிடைக்கிறது.

12-6. $Q = \sum_{i,j} x_i x_j$ என்பது நிச்சய தேர்வக் கோவையாக இருந்தால்,

$$a_{11} \cdot \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{vmatrix}, \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix}, \dots$$

$$\begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \dots & a_{2n} \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ a_{n1} & a_{n2} & \dots & a_{nn} \end{bmatrix}$$

என்ற அணிக்கோவைகள் நேர்வக (positive) இருக்க வேண்டும்.

நிரூபணம்: $X = [x_1, x_2, \dots, x_n]$ ஆனால்,

$Q = X'AX$ ஆகும். இதில் A ஒரு சமச்சீர் அணிவக இருக்க வேண்டும்.

மேலும், ஒரு மாறீ மாற்றத்தின்படி Q ஐச் சதுரங்களின் எண்ணிப் பெருக்கல்களின் உருவவக எழுத முடியும் என்பது நமக்குத் தெரியும்.

$\therefore X = PY$ எனப் போடு.

இதில் P என்பது மாறீ மாற்ற அணி;

$Y = [y_1, y_2, \dots, y_n]$ ஆக இருக்கட்டும். அப்படியானால்,

$$Q = X'AX = (PY)'A(PY)$$

$$= Y'P'APY$$

$$= Y'BY, \quad \text{இதில் } B = P'AP$$

மேலும், B -ல் மூலமற்ற உறுப்புகள் மட்டுமே இருக்க வேண்டும். $\therefore Q$ ஐ "ஒடுக்கி"விட்டதால் வர்க்கங்கள் மட்டுமே இருக்கும்.

$$\therefore B = P'AP = \begin{bmatrix} \lambda_1 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & \lambda_2 & \dots & 0 \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ 0 & 0 & \dots & \lambda_n \end{bmatrix}$$

$$\therefore |B| = |P'| |A| |P| = \lambda_1 \lambda_2 \dots \lambda_n$$

$$\therefore |P|^{-2} |A| = \lambda_1 \lambda_2 \dots \lambda_n \quad \therefore |P^2| = |P|$$

இப்பொழுது, Q நிச்சய நேர்த்தகோவை ஆதலால் $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_r$ ஒவ்வொன்றும் நேராக (positive) இருக்க வேண்டும். $|P|^2$ நேராக இருக்கும். $\therefore |A| > 0$ ஆக இருக்கவேண்டும்.

இனிமேல், $Q_r = \sum_{i,j=1}^r a_{ij} x_i x_j$ ஐ எடுத்துக்கொள்வோம்.

Q_r -ம் நிச்சய நேர்த்தகோவைவராததால் இருக்கவேண்டும்.

$\therefore$ இவ்வாறாக, $x_1, x_2, \dots, x_r$ -களுக்கு அதே மதிப்புகள் கொடுத்து, x_{r+1}, x_{r+2} முதலானவையுக்கும் பூச்சிய மதிப்புக் கொடுத்தால் Q -ம் குறை (negative) வாகின்றும். ஆனால் Q நிச்சய நேர்த்தகோவை எனக் கொடுக்கப்பட்டுள்ளது.

$\therefore Q_r$ -ம் நிச்சய நேர்த்தகோவை. எனவே, மூன்றாதி

$$\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1r} \\ a_{21} & a_{22} & \dots & a_{2r} \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ a_{r1} & a_{r2} & \dots & a_{rr} \end{vmatrix} > 0$$

என நிரூபித்து விடலாம்.

பயிற்சி 12

1. கீழ்வரும் இருபடி சமச்சீர்க் கோவைகளை $X'AX$ என்றும் குபத்தின் எழுது.

(a) $x^2 + 2y^2 + 8z^2 + 4xy + 6yz + 8zx$.

(b) $8x^2 - y^2 + z^2 - 2yz + 10zx + xy$.

2. கீழ்வரும் கோவைகளை கவிராஜசே முதையப்படி ஒடுக்கி அவை நிச்சய நேர்த்தகோவைகளாக, அல்லவா எனக் கூறு.

(i) $x_1^2 - 4x_1 x_2 + 5x_2^2$

(ii) $8x^2 + 4y^2 + 6z^2 + 6yz + 7zx + 8xy$

(iii) $6x^2 + 8y^2 + 14z^2 + 4yz + 18zx + 4xy$

$$(iv) \quad x^3 + 2y^3 - 7z^3 - 4xy + 8xz$$

$$(v) \quad 8x^3 + 6y^3 + 7z^3 - 8xy + 9yz - 4zx$$

விடை: (i) (iii) (v) ஆம்.

3. 12-ஈன் மறுதலையை நிரூபி.

4. $5x^3 + 8y^3 + 10z^3 + 4yz + 14zx + 6xy$ ஒரு நேர்க்கோவை என நிரூபி. (Positive Semi Definite)

5. A ஒரு நிச்சய நேர்க்கோவைக்கிசைத்த சமச்சரி ஆணி யாகவும், B, C என்பன $B'AB = I$, $A = C'C$ என்பதற்கிணங்கவும் இருத்தால் CB ஒரு செங்குத்தணி என நிரூபி.

$$[(CB)'CB = B'C'CB = B'AB = I]$$

6. $ax^3 - 2bxy + cy^3$ என்பது நிச்சய நேர்க்கோவையாக இருக்க வேண்டிய நிபந்தனைகள் யாவை? [$a > 0$; $ac > b^2$]

அறுபத்தம் அனிக்கோவைகள்

1. ஊராயத்தரவின் ஊராயது :

$$a_1x + b_1y = 0 \quad \dots \quad \dots \quad (1)$$

$$a_2x + b_2y = 0 \quad \dots \quad \dots \quad (2)$$

இவைகளிலிருந்து x, y ஐ நீக்க, கிடைக்கும் நீக்கற் பலன்
(eliminant) $a_1b_2 - a_2b_1 = 0$ ஆகும்.

$$\text{இதனை } \begin{vmatrix} a_1 & b_1 \\ a_2 & b_2 \end{vmatrix} \text{ எனக் குறிப்பிட்டனர்.}$$

$$\text{ஆகவே, } \begin{vmatrix} a_1 & b_1 \\ a_2 & b_2 \end{vmatrix} \text{ என்ற அனிக்கோவை}$$

$a_1b_2 - a_2b_1$ என்ற கோவைவைக் குறிக்கிறது என வரை
பழக்கலாம்.

$$\text{இவ்வாறே, } a_1x + b_1y + c_1z = 0 \quad \dots \quad \dots \quad (1)$$

$$a_2x + b_2y + c_2z = 0 \quad \dots \quad \dots \quad (2)$$

$$a_3x + b_3y + c_3z = 0 \quad \dots \quad \dots \quad (3)$$

என்ற சமன்பாடுகளை எடுத்துக்கொள்வோம்.

(2), (3)-க் இருத்து,

$$\frac{x}{b_2c_3 - b_3c_2} = \frac{y}{-(a_2c_3 - a_3c_2)} = \frac{z}{a_2b_3 - a_3b_2} = K$$

∴ (1)-க் இருத்து

$$K [a_1 (b_2c_3 - b_3c_2) - b_1 (a_2c_3 - a_3c_2) + c_1 (a_2b_3 - a_3b_2)] = 0$$

$$\therefore a_1 (b_2 c_3 - b_3 c_2) - b_1 (a_2 c_3 - a_3 c_2) + c_1 (a_2 b_3 - a_3 b_2) = 0$$

$$\text{இதையே } \begin{vmatrix} a_1 & b_1 & c_1 \\ a_2 & b_2 & c_2 \\ a_3 & b_3 & c_3 \end{vmatrix} = 0 \text{ எனக் குறித்தால்}$$

$$\begin{vmatrix} a_1 & b_1 & c_1 \\ a_2 & b_2 & c_2 \\ a_3 & b_3 & c_3 \end{vmatrix} = a_1 (b_2 c_3 - b_3 c_2) - b_1 (a_2 c_3 - a_3 c_2) + c_1 (a_2 b_3 - a_3 b_2)$$

$$= a_1 \begin{vmatrix} b_2 & c_3 \\ b_3 & c_2 \end{vmatrix} - b_1 \begin{vmatrix} a_2 & c_3 \\ a_3 & c_2 \end{vmatrix} + c_1 \begin{vmatrix} a_2 & b_3 \\ a_3 & b_2 \end{vmatrix}$$

என்பது விளங்கும்.

ஆகவே, மீட்டர் முறைப்படி, (Recursion), ஒரு n -வது அணிமீட்டோவைகளை,

$$\begin{vmatrix} a_1 & b_1 & c_1 & \dots & k_1 & l_1 \\ a_2 & b_2 & c_2 & \dots & k_2 & l_2 \\ a_3 & b_3 & c_3 & \dots & k_3 & l_3 \\ \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots \\ a_n & b_n & c_n & \dots & k_n & l_n \end{vmatrix}$$

$$= a_1 \begin{vmatrix} b_2 & c_2 & \dots & l_2 \\ b_3 & c_3 & \dots & l_3 \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ b_n & c_n & \dots & l_n \end{vmatrix} - b_1 \begin{vmatrix} a_2 & c_2 & \dots & l_2 \\ a_3 & c_3 & \dots & l_3 \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ a_n & c_n & \dots & l_n \end{vmatrix} + \dots$$

$$= \dots + (-1)^n \cdot l_1 \begin{vmatrix} a_2 & b_2 & \dots & k_2 \\ a_3 & b_3 & \dots & k_3 \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ a_n & b_n & \dots & k_n \end{vmatrix}$$

என்று விவரித்திருக்கலாம்.

$$\text{உதாரணம் (i) } \begin{vmatrix} 8 & 4 \\ 5 & 6 \end{vmatrix} = 8 \times 6 - 5 \times 4 = -2$$

$$\begin{aligned} \text{(ii) } \begin{vmatrix} a & b & c \\ h & b & f \\ g & f & c \end{vmatrix} &= a \begin{vmatrix} b & f \\ f & c \end{vmatrix} - b \begin{vmatrix} h & g \\ f & c \end{vmatrix} + c \begin{vmatrix} h & g \\ b & f \end{vmatrix} \\ &= a(bc - f^2) - b(hc - fg) + c(hf - bg) \\ &= abc + 2fgh - af^2 - bg^2 - ch^2 \end{aligned}$$

2. அணிக்கோவைகளின் பண்புகள் (Properties of Determinants)

தேற்றம் 1 : ஒர் அணிக்கோவையின் மதிப்பு, நிரைகளை நிரல்களாகவும், நிரல்களை நிரைகளாகவும் மாற்றியமைப்பதால் மாறாது.

$$\text{அதாவது, } \begin{vmatrix} a_1 & b_1 & c_1 \\ a_2 & b_2 & c_2 \\ a_3 & b_3 & c_3 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} a_1 & a_2 & a_3 \\ b_1 & b_2 & b_3 \\ c_1 & c_2 & c_3 \end{vmatrix}$$

$$\begin{aligned} \text{L.H.S.} &= \text{இ.ப.} = a_1(b_2c_3 - b_3c_2) - b_1(a_2c_3 - a_3c_2) \\ &\quad + c_1(a_2b_3 - a_3b_2) \\ &= a_1(b_2c_3 - b_3c_2) - a_2(b_1c_3 - b_3c_1) + a_3(b_1c_2 - b_2c_1) \\ &= \text{உ.ப.} = \text{R.H.S.} \end{aligned}$$

குறிப்பு : இதிலிருந்து, முதல் நிரலின் அடியாகவோ, அன்றி நிரையின் அடியாகவோ, ஒர் அணிக்கோவையை விரித்தெடுத்தலாம் என்று தெரிகிறது.

தேற்றம் 2 : அடுத்தடுத்த இரு நிரைகளை (நிரல்களை) மாற்றியமைப்பதால், ஒர் அணிக்கோவையின் குறி (sign) மாறுமே தவிர மதிப்பு மாறாது.

$$\begin{vmatrix} a_1 & b_1 & c_1 \\ a_2 & b_2 & c_2 \\ a_3 & b_3 & c_3 \end{vmatrix} = - \begin{vmatrix} a_2 & b_2 & c_2 \\ a_1 & b_1 & c_1 \\ a_3 & b_3 & c_3 \end{vmatrix} \quad \text{என நிரூபிக்க வேண்டும்.}$$

$$\begin{aligned}\text{இ.ப.} &= a_1 (b_2 c_3 - b_3 c_2) - b_1 (a_2 c_3 - a_3 c_2) \\ &\quad + c_1 (a_2 b_3 - a_3 b_2) \\ &= - [a_2 (b_1 c_3 - b_3 c_1) - b_2 (a_1 c_3 - a_3 c_1) \\ &\quad + c_2 (a_1 b_3 - a_3 b_1)] \\ &= \text{வ.ப.}\end{aligned}$$

குறிப்பு : இதிலிருந்து, நாம் விருப்பப்பட்ட நிரையை (நிரை) முதல் நிரை (நிரல்) ஆக்க இயலும் என்பது தெரிகிறது. எனவே, எந்த நிரையின் (நிரலின்) அடிபாகவும் ஓர் அணிக்கோவையை விரித்தெழுதலாம்.

தேற்றம் 3 : ஓர் அணிக்கோவையில் இரு நிரைகள் (நிரல்கள்) முழுதும் ஒத்தவாறு இருந்தால் அதன் மதிப்பு பூச்சியமாகும்.

கொடுக்கப்பட்ட அணிக்கோவையின் மதிப்பு Δ ஆக இருக்கட்டும். ஒத்தவாறுள்ள நிரைகளை [மாத்நியமத்தால் அதன் மதிப்பு 2 ஆம் தேற்றத்தின்படி $-\Delta$ ஆகும். ஆனால் இவை முழுதும் ஒத்த நிரைகள்.

$$\therefore -\Delta = \Delta$$

$$\text{அதாவது } 2\Delta = 0$$

$$\Delta = 0$$

தேற்றம் 4 : ஒரு நிரலில் (நிரலில்) உள்ள ஒவ்வொரு உறுப்பையும் k ஆல் பெருக்கினால், Δ மதிப்புகளான அணிக்கோவையின் மதிப்பு $k\Delta$ ஆகும். அதாவது,

$$\begin{vmatrix} ka_1 & b_1 & c_1 \\ ka_2 & b_2 & c_2 \\ ka_3 & b_3 & c_3 \end{vmatrix} = k \begin{vmatrix} a_1 & b_1 & c_1 \\ a_2 & b_2 & c_2 \\ a_3 & b_3 & c_3 \end{vmatrix}$$

$$\therefore \text{இ.ப.} = ka_1 (b_2 c_3 - b_3 c_2) - ka_2 (b_1 c_3 - b_3 c_1) + ka_3 (b_1 c_2 - b_2 c_1).$$

$$= k [a_1 (b_2 c_3 - b_3 c_2) - a_2 (b_1 c_3 - b_3 c_1) + a_3 (b_1 c_2 - b_2 c_1)]$$

$$= k\Delta.$$

விளைத் தேற்றம் : ஓர் அணிக்கோவையில் ஒரு நிரலில் (நிரலில்) உள்ள உறுப்புகள், மற்றொரு நிரலில் (நிரலில்) உள்ள இசைத்த உறுப்புகளையோல் k மடங்காக இருந்தால், அதன் மதிப்பு k மடங்கமாகும்.

தேற்றம் 5 : ஒரு நிரலில் (நிரலில்) உள்ள ஒவ்வொரு உறுப்பும் இரு உறுப்புகளின் கூடுதலாக இருந்தால் அந்த அணிக் கோவையை இரு அணிக்கோவைகளின் கூடுதலாக எழுதலாம். அதாவது,

$$\begin{vmatrix} a_1 + \alpha_1 & b_1 & c_1 \\ a_2 + \alpha_2 & b_2 & c_2 \\ a_3 + \alpha_3 & b_3 & c_3 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} a_1 & b_1 & c_1 \\ a_2 & b_2 & c_2 \\ a_3 & b_3 & c_3 \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} \alpha_1 & b_1 & c_1 \\ \alpha_2 & b_2 & c_2 \\ \alpha_3 & b_3 & c_3 \end{vmatrix}$$

$$\begin{aligned} \text{இ.ப.} &= (a_1 + \alpha_1)(b_2 c_3 - b_3 c_2) - (a_2 + \alpha_2)(b_1 c_3 - b_3 c_1) \\ &\quad + (a_3 + \alpha_3)(b_1 c_2 - b_2 c_1) \\ &= [a_1(b_2 c_3 - b_3 c_2) - a_2(b_1 c_3 - b_3 c_1) + a_3(b_1 c_2 - b_2 c_1)] \\ &\quad + [\alpha_1(b_2 c_3 - b_3 c_2) - \alpha_2(b_1 c_3 - b_3 c_1) + \alpha_3(b_1 c_2 - b_2 c_1)] \\ &= \text{வ.ப.} \end{aligned}$$

தேற்றம் 6 : ஒரு நிரலில் (நிரலில்) உள்ள ஒவ்வொரு உறுப்பின் மற்றோர் நிரலின் (நிரலின்) இசைத்த உறுப்புகளை k ஆல் பெருக்கிக் கூட்டினால் அணிக்கோவையின் மதிப்பு மாறாது. அதாவது,

$$\begin{vmatrix} a_1 & b_1 & c_1 \\ a_2 & b_2 & c_2 \\ a_3 & b_3 & c_3 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} a_1 + k a_2 & b_1 + k b_2 & c_1 + k c_2 \\ a_2 & b_2 & c_2 \\ a_3 & b_3 & c_3 \end{vmatrix}$$

$$\text{நிரூபணம் : வ.ப.} = \begin{vmatrix} a_1 & b_1 & c_1 \\ a_2 & b_2 & c_2 \\ a_3 & b_3 & c_3 \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} k a_2 & k b_2 & k c_2 \\ a_2 & b_2 & c_2 \\ a_3 & b_3 & c_3 \end{vmatrix}$$

... .. (தேற்றம் 5)

$$= \begin{vmatrix} a_1 & b_1 & c_1 \\ a_2 & b_2 & c_2 \\ a_3 & b_3 & c_3 \end{vmatrix} + k \begin{vmatrix} a_2 & b_2 & c_2 \\ a_2 & b_2 & c_2 \\ a_3 & b_3 & c_3 \end{vmatrix}$$

... .. (தேற்றம் 4)

$$= \begin{vmatrix} a_1 & b_1 & c_1 \\ a_2 & b_2 & c_2 \\ a_3 & b_3 & c_3 \end{vmatrix} + k.0 \dots\dots (\text{தேற்றம் 8})$$

= இ.ப.

தேற்றம் 7: Δ என்ற அணிக்கோவையின் உறுப்புகளில் x -ன் பக்குறியாக கோவைகள் இருக்கட்டும். $x=a$ எனப் பிரதிபிடுகப்போது $\Delta=0$ ஆனது $(x-a)$ ஆனது Δ -ன் காரணியாக இருக்கவேண்டும்.

$\Delta = f(x)$ ஆக இருக்கட்டும்.

$f(a) = 0$... கொடுக்கப்பட்டுள்ளது.

$\therefore$ மீதித் தேற்றத்தின்படி $(x-a)$ ஆனது $f(x)$ -ன் அதாவது Δ -ன் காரணியாகும்.

3. சிற்றணிக் கோவை (Minor):

$$\Delta = \begin{vmatrix} a_1 & b_1 & c_1 \\ a_2 & b_2 & c_2 \\ a_3 & b_3 & c_3 \end{vmatrix} \text{ ஆக இருக்கட்டும். இதில் } a_1 \text{ என்ற}$$

உறுப்பு இருக்கும் நிரலையும், நிரலையும் நீக்கி விட்டால்

$$\begin{vmatrix} b_1 & c_1 \\ b_2 & c_2 \end{vmatrix} \text{ என்ற சிற்றணிக் கோவை கிடைக்கிறது. இதை}$$

a_1 -ன் சிற்றணிக் கோவை என்று அழைப்பதும், A_1' எனக் குறிப்பிடுவதும் உண்டு. இதிலிருந்து $\Delta = a_1 A_1' - b_1 B_1' + c_1 C_1'$ என்பது தெளிவாகிறது.

4. இணைக் காரணி (Co-factor):

$\Delta = a_1 A_1 + b_1 B_1 + c_1 C_1$ ஆக இருந்தால் A_1, B_1, C_1 -ஐ a_1, b_1, c_1 -ன் இணைக் காரணிகள் என்று சொல்வோம்.

3, 4-ல் இருந்து ஓர் உறுப்பின் சிற்றணிக் கோவையும் இணைக் காரணியும் ஒரே மதிப்புடையன என்றும், ஆனால் குறியில் (sign) வேறுபட்டிருக்கலாம் என்றும் அறிகிறோம்.

குறிப்பு: $A_1 = A_1'$; $B_1 = -B_1'$; $c_1 = C_1'$. பொதுவாக எந்தக் குறியை எடுத்து கொள்வது என்பதை,

$$\begin{vmatrix} + & - & + & - & + \\ - & + & - & + & - \\ + & - & + & - & + \\ - & + & - & + & - \\ + & - & + & - & + \end{vmatrix} \quad \text{என்பதிலிருந்து தெரிந்து}$$

கொள்ளலாம். பொதுவாக ஒர் உறுப்பை மேலே இடது மூலைக்குக் கொண்டு வர இரட்டையெண் - தடவை நகர்த்த வேண்டியதாகும். அது + ஆகும். இல்லாவிடில் - ஆகும்.

தேற்றம் 8: ஒரு திரில் (நிரலில்) உள்ள உறுப்புகளை, மற்றொரு திரில் இசைந்த உறுப்புகளின் இணைக் காரணிகளாகக் கொண்டு பெருக்கிக் கூட்ட முக்கியம் கிடைக்கும். அதாவது,

$$\Delta = \begin{vmatrix} a_1 & b_1 & c_1 \\ a_2 & b_2 & c_2 \\ a_3 & b_3 & c_3 \end{vmatrix} \quad \text{ஆனால் } b_1 A_1 + b_2 A_2 + b_3 A_3 = 0$$

$$\text{ஏனெனில் } \begin{vmatrix} a_1 & b_1 & c_1 \\ a_2 & b_2 & c_2 \\ a_3 & b_3 & c_3 \end{vmatrix} = a_1 A_1 + a_2 A_2 + a_3 A_3$$

$$\therefore \begin{vmatrix} b_1 & b_1 & c_1 \\ b_2 & b_2 & c_2 \\ b_3 & b_3 & c_3 \end{vmatrix} = b_1 A_1 + b_2 A_2 + b_3 A_3.$$

$$0 = b_1 A_1 + b_2 A_2 + b_3 A_3 \dots \text{ (தேற்றம் 8)}$$

உதாரணம் 1: பின்வரும் அணிக்கோவைகளின் மதிப்பைக் காட்டுக.

$$\Delta = \begin{vmatrix} 1^2 & 2^2 & 3^2 & 4^2 \\ 2^2 & 3^2 & 4^2 & 5^2 \\ 3^2 & 4^2 & 5^2 & 6^2 \\ 4^2 & 5^2 & 6^2 & 7^2 \end{vmatrix}$$

$$\begin{aligned} \Delta &= \begin{vmatrix} 1 & 4 & 9 & 16 \\ 4 & 9 & 16 & 25 \\ 9 & 16 & 25 & 36 \\ 16 & 25 & 36 & 49 \end{vmatrix} \\ &= \begin{vmatrix} 1 & 4 & 9 & 16 \\ 9 & 6 & 7 & 9 \\ 6 & 7 & 9 & 11 \\ 7 & 9 & 11 & 13 \end{vmatrix} \dots R_2 - R_1; R_3 - R_1; R_4 - R_1. \\ &= \begin{vmatrix} 1 & 4 & 9 & 16 \\ 8 & 5 & 7 & 9 \\ 2 & 2 & 2 & 2 \\ 2 & 2 & 2 & 2 \end{vmatrix} \dots R_2 - R_3; R_4 - R_3 \\ &= 0 \end{aligned}$$

உதாரணம் 2 :

$$\Delta = \begin{vmatrix} 1 & w & w^2 \\ w & w^2 & 1 \\ w^2 & 1 & w \end{vmatrix} = 0$$

என நினைவி. $w = \sqrt[3]{1}$.

$$\Delta = \begin{vmatrix} 1 + w + w^2 & w & w^2 \\ 1 + w + w^2 & w^2 & 1 \\ 1 + w + w^2 & 1 & w \end{vmatrix} \dots \dots c_1 + c_2 + c_3$$

ஆனால் $1 + w + w^2 = 0$ $w^3 - 1 = 0$

$$\therefore \Delta = \begin{vmatrix} 0 & w & w^2 \\ 0 & w^2 & 1 \\ 0 & 1 & w \end{vmatrix} = 0$$

உதாரணம் 3 :

$$\Delta = \begin{vmatrix} x & y & z \\ x^2 & y^2 & z^2 \\ yz & zx & xy \end{vmatrix} \quad \text{இ விரித்தெழுதுக.}$$

Δ -ல் $x = y$ எனப் பிரதிபலிக்கும்.

இது தீர்மானம் முழுவதும் ஒத்தவைகளாகிவிடும்.

$\therefore (x-y)$ ஆனது Δ -ன் காரணி (தேற்றம் 7). இதே விதமாக $(y-z)$, $(z-x)$ -ம் காரணிகள். மேலும் Δ -ன் மூ. 5 என்பதை நோக்குக.

$$\therefore \Delta = (x-y)(y-z)(z-x) [k(x^2 + y^2 + z^2) + l(yz + zx + xy)]$$

இப்பொழுது $x = 0, y = 1, z = 2$ எனப் பிரதிபலித்து.

$$\begin{vmatrix} 0 & 1 & 2 \\ 0 & 1 & 4 \\ 2 & 0 & 0 \end{vmatrix} = (-1)(-1)2 [5k + 2l]$$

$$\therefore 2 = 5k + 2l \quad \dots \quad \dots \quad \dots \quad \dots \quad (1)$$

இதே விதமாக $x = 0, y = 1, z = -1$ ஆனால்

$$-1 = 2k - l \quad \dots \quad \dots \quad \dots \quad \dots \quad (2)$$

(1), (2)-ல் இருந்து $l = 1, k = 0$

$$\therefore \Delta = (x-y)(y-z)(z-x)(xy + yz + zx)$$

$$\text{உதாரணம் 4 : } \Delta = \begin{vmatrix} (b+c)^2 & a^2 & a^2 \\ b^2 & (c+a)^2 & b^2 \\ c^2 & c^2 & (a+b)^2 \end{vmatrix}$$

$= 2abc(a+b+c)^2$ என தீர்வு.

Δ -ல் $a = 0$ எனப் பிரதிபலித்து.

$$\Delta = \begin{vmatrix} (b+c)^2 & 0 & 0 \\ b^2 & c^2 & b^2 \\ c^2 & c^2 & b^2 \end{vmatrix} = c^2 b^2 \begin{vmatrix} (b+c)^2 & 0 & 0 \\ b^2 & 1 & 1 \\ c^2 & 1 & 1 \end{vmatrix} = 0$$

$\therefore a$ ஆனது Δ -ன் காரணி. இதேபோல் b, c -ம் காரணிகள்.

இன்னும் $(b+c) = -a$ எனப் பிரதிபிடு.

$$\Delta = \begin{vmatrix} (-a)^2 & a^2 & a^2 \\ b^2 & (-b)^2 & b^2 \\ c^2 & c^2 & (-c)^2 \end{vmatrix} = a^2 b^2 c^2 \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \end{vmatrix}$$

இதில் மூன்று நிரல்களும் சமமாகியிருக்கின்றன. ஆகையால் $(a+b+c)^2$ காரணியாக இருக்க வேண்டும். மேலும் Δ ஆனது 6 ஆவது படியில் உள்ளது.

$\therefore$ அடுத்த காரணியும் $(a+b+c)$ ஆகத்தான் இருக்க வேண்டும் (சமச்சீர்க் கோவை).

$$\therefore \Delta = k \cdot abc(a+b+c)^2$$

$a=1, b=1, c=1$ எனப் பிரதிபிடுக.

$$\begin{vmatrix} 4 & 1 & 1 \\ 1 & 4 & 1 \\ 1 & 1 & 4 \end{vmatrix} = k \cdot 8^2$$

$$\therefore k=2$$

$$\therefore \Delta = 2 \cdot abc(a+b+c)^2$$

உதாரணம் 5 :

$$\begin{vmatrix} b_1+c_1 & c_1+a_1 & a_1+b_1 \\ b_2+c_2 & c_2+a_2 & a_2+b_2 \\ b_3+c_3 & c_3+a_3 & a_3+b_3 \end{vmatrix} = 2 \begin{vmatrix} a_1 & b_1 & c_1 \\ a_2 & b_2 & c_2 \\ a_3 & b_3 & c_3 \end{vmatrix}$$

என நினை.

$$\begin{aligned}
 \text{இ.ப.} &= \begin{vmatrix} b_1 & c_1+a_1 & a_1+b_1 \\ b_2 & c_2+a_2 & a_2+b_2 \\ b_3 & c_3+a_3 & a_3+b_3 \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} c_1 & c_1+a_1 & a_1+b_1 \\ c_2 & c_2+a_2 & a_2+b_2 \\ c_3 & c_3+a_3 & a_3+b_3 \end{vmatrix} \\
 &= \begin{vmatrix} b_1 & c_1+a_1 & a_1 \\ b_2 & c_2+a_2 & a_2 \\ b_3 & c_3+a_3 & a_3 \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} b_1 & c_1+a_1 & b_1 \\ b_2 & c_2+a_2 & b_2 \\ b_3 & c_3+a_3 & b_3 \end{vmatrix} \\
 &+ \begin{vmatrix} c_1 & c_1 & a_1+b_1 \\ c_2 & c_2 & a_2+b_2 \\ c_3 & c_3 & a_3+b_3 \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} c_1 & a_1 & a_1+b_1 \\ c_2 & a_2 & a_2+b_2 \\ c_3 & a_3 & a_3+b_3 \end{vmatrix} \\
 &= \begin{vmatrix} b_1 & c_1 & a_1 \\ b_2 & c_2 & a_2 \\ b_3 & c_3 & a_3 \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} b_1 & a_1 & a_1 \\ b_2 & a_2 & a_2 \\ b_3 & a_3 & a_3 \end{vmatrix} + 0 \\
 &\quad + 0 + \begin{vmatrix} c_1 & a_1 & a_1 \\ c_2 & a_2 & a_2 \\ c_3 & a_3 & a_3 \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} c_1 & a_1 & b_1 \\ c_2 & a_2 & b_2 \\ c_3 & a_3 & b_3 \end{vmatrix} \\
 &= \begin{vmatrix} a_1 & b_1 & c_1 \\ a_2 & b_2 & c_2 \\ a_3 & b_3 & c_3 \end{vmatrix} + 0 + 0 + 0 + 0 + \begin{vmatrix} a_1 & b_1 & c_1 \\ a_2 & b_2 & c_2 \\ a_3 & b_3 & c_3 \end{vmatrix} \\
 &= 2 \begin{vmatrix} a_1 & b_1 & c_1 \\ a_2 & b_2 & c_2 \\ a_3 & b_3 & c_3 \end{vmatrix}
 \end{aligned}$$

5. அணிக்குறைவைகள் குறுக்கப் பரன்

$$\left. \begin{aligned} a_1X+b_1Y+c_1Z &= 0 \\ a_2X+b_2Y+c_2Z &= 0 \\ a_3X+b_3Y+c_3Z &= 0 \end{aligned} \right\} \quad \dots \quad \dots \quad \dots \quad I$$

என்றும் சமன்பாடுகளில்

$$\left. \begin{aligned} X &= \alpha_1 x + \beta_1 y + \gamma_1 z \\ Y &= \alpha_2 x + \beta_2 y + \gamma_2 z \\ Z &= \alpha_3 x + \beta_3 y + \gamma_3 z \end{aligned} \right\} \quad \dots \quad \dots \quad II$$

ஆக இருக்கட்டும்.

$$I\text{-ல் இருந்து } X=Y=Z=0 \quad \dots \quad \dots \quad (i)$$

அல்லது

$$\Delta_1 = \begin{vmatrix} a_1 & b_1 & c_1 \\ a_2 & b_2 & c_2 \\ a_3 & b_3 & c_3 \end{vmatrix} = 0 \quad \dots \quad \dots \quad (ii)$$

என்பது தெரிகிறது.

$$(i)\text{-ல் இருந்து } \alpha_1 x + \beta_1 y + \gamma_1 z = 0$$

$$\alpha_2 x + \beta_2 y + \gamma_2 z = 0$$

$$\alpha_3 x + \beta_3 y + \gamma_3 z = 0$$

$$\text{ஆக இருக்கவேண்டும். } \therefore x=y=z=0$$

அல்லது

$$\Delta_2 = \begin{vmatrix} \alpha_1 & \beta_1 & \gamma_1 \\ \alpha_2 & \beta_2 & \gamma_2 \\ \alpha_3 & \beta_3 & \gamma_3 \end{vmatrix} = 0$$

ஆகவே, $x=y=z=0$ ஆக இல்லாவிட்டால் I -ல் இருந்து $\Delta_1 = 0$ அல்லது $\Delta_2 = 0$ என்பது பெறப்படுகிறது. ... (அ)

இப்பொழுது II -ல் துணை கொண்டு, I ஐப் பின்வருமாறு எழுதலாம்.

$$(a_1\alpha_1 + b_1\alpha_2 + c_1\alpha_3)x + (a_1\beta_1 + b_1\beta_2 + c_1\beta_3)y + (a_1\gamma_1 + b_1\gamma_2 + c_1\gamma_3)z = 0$$

$$(a_2\alpha_1 + b_2\alpha_2 + c_2\alpha_3)x + (a_2\beta_1 + b_2\beta_2 + c_2\beta_3)y + (a_2\gamma_1 + b_2\gamma_2 + c_2\gamma_3)z = 0.$$

$$(a_1\alpha_1 + b_1\alpha_2 + c_1\alpha_3)x + (a_1\beta_1 + b_1\beta_2 + c_1\beta_3)y + (a_1\gamma_1 + b_1\gamma_2 + c_1\gamma_3)z = 0 \quad \dots \quad III$$

$x = y = z = 0$ ஆக இல்லாவிட்டால், III-ல் இருந்து

$$\Delta = \begin{vmatrix} a_1\alpha_1 + b_1\alpha_2 + c_1\alpha_3 & a_1\beta_1 + b_1\beta_2 + c_1\beta_3 \\ a_2\alpha_1 + b_2\alpha_2 + c_2\alpha_3 & a_2\beta_1 + b_2\beta_2 + c_2\beta_3 \\ a_3\alpha_1 + b_3\alpha_2 + c_3\alpha_3 & a_3\beta_1 + b_3\beta_2 + c_3\beta_3 \end{vmatrix}$$

$$\begin{vmatrix} a_1\gamma_1 + b_1\gamma_2 + c_1\gamma_3 \\ a_2\gamma_1 + b_2\gamma_2 + c_2\gamma_3 \\ a_3\gamma_1 + b_3\gamma_2 + c_3\gamma_3 \end{vmatrix} = 0 \quad \dots \quad (ஆ)$$

ஆக இருக்கவேண்டும் என்பது தெரிகிறது.

ஆனால் III ஆனது I-ல் இருந்து கிடைத்தது தான். ஆகவே, (அ), (ஆ)-ல் இருந்து $\Delta_1 = 0$ அல்லது $\Delta_2 = 0$ ஆனால் $\Delta = 0$ ஆக வேண்டும் என்பது விளங்குகிறது.

$$\therefore \Delta = k \Delta_1 \Delta_2$$

என்று சொல்லலாம். இதில் $a_1, b_1, c_1, \alpha_1, \beta_1, \gamma_1$ -ன் காரணியைக் கொண்டு $k = 1$ என்று சொல்வோம்.

$$\therefore \Delta = \Delta_1 \Delta_2.$$

உதாரணம் 6 (a):

$$A = \begin{vmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 2 & 4 & 3 \\ 3 & 1 & 2 \end{vmatrix}; B = \begin{vmatrix} 3 & -1 & 2 \\ 0 & 1 & 2 \\ 2 & 5 & 3 \end{vmatrix}$$

ஆனால் $|AB| = |A| \times |B|$ என நினை.

$$|AB| = \begin{vmatrix} 1.3+2.0+1.2 & 1(-1)+2.1+1.5 & 1.2+2.2+1.3 \\ 2.3+4.0+3.2 & 2(-1)+4.1+3.5 & 2.2+4.2+3.3 \\ 3.3+1.0+2.2 & 3(-1)+1.1+2.5 & 3.2+1.2+2.3 \end{vmatrix}$$

$$\begin{aligned}
 &= \begin{vmatrix} 5 & 6 & 9 \\ 12 & 17 & 21 \\ 18 & 9 & 14 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 5 & 6 & 9 \\ 2 & 5 & 9 \\ 9 & 2 & 5 \end{vmatrix} \quad \because R_2 - 2R_1 \\
 &\quad \quad \quad R_3 - R_1. \\
 &= 5(25-9) - 2(30-18) + 9(18-45) \\
 &= -145. \quad \dots \quad \dots \quad \dots \quad (1)
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 \text{இப்போழுது, } |A| &= \begin{vmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 2 & 4 & 3 \\ 3 & 1 & 2 \end{vmatrix} \\
 &= 1 \times (8-3) - 2(4-1) + 3(2-4) = 5 \quad \dots \quad (2)
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 |B| &= \begin{vmatrix} 3 & -1 & 2 \\ 0 & 1 & 2 \\ 2 & 5 & 9 \end{vmatrix} \\
 &= 3(9-10) - 0(-2-10) + 2(-2-2) \\
 &= -22 \quad \dots \quad \dots \quad \dots \quad (3)
 \end{aligned}$$

$$\therefore |A| \cdot |B| = 5 \times (-22) = -110 \quad \dots \quad (2) (3)\text{-ல்}$$

$$\text{இருந்து} \quad \dots \quad \dots \quad \dots \quad (4)$$

$\therefore$ (1), (4)-ல் இருந்து

$$|AB| = |A| \cdot |B|.$$

உதாரணம் 6 (b):

$$\begin{vmatrix} 2b_1 + c_1 & c_1 + 3a_1 & 2a_1 + 3b_1 \\ 2b_2 + c_2 & c_2 + 3a_2 & 2a_2 + 3b_2 \\ 2b_3 + c_3 & c_3 + 3a_3 & 2a_3 + 3b_3 \end{vmatrix}$$

$$\text{என்பதைக் காண்க} \quad \begin{vmatrix} a_1 & b_1 & c_1 \\ a_2 & b_2 & c_2 \\ a_3 & b_3 & c_3 \end{vmatrix} \quad \text{என்று தருகிறது.}$$

அதன் அடுத்த காரணி 18 என்றும் திரும்பி.

$$\begin{vmatrix} a_1 & b_1 & c_1 \\ a_2 & b_2 & c_2 \\ a_3 & b_3 & c_3 \end{vmatrix} \times \begin{vmatrix} 0 & 3 & 2 \\ 2 & 0 & 3 \\ 1 & 1 & 0 \end{vmatrix}$$

$$= \begin{vmatrix} 3b_1 + c_1 & c_1 + 3a_1 & 2a_1 + 3b_1 \\ 3b_2 + c_2 & c_2 + 3a_2 & 2a_2 + 3b_2 \\ 3b_3 + c_3 & c_3 + 3a_3 & 2a_3 + 3b_3 \end{vmatrix}$$

∴ அடுத்த காரணி = $-2(0-2) + 1.(9-0) = 18$.

உதாரணம் 7: $A_1, B_1, C_1, \dots$ எம்பன, $a_1, b_1, c_1, \dots$ என்பவைகளின் இணை காரணிகள் ஆகும்,

$$\begin{vmatrix} A_1 & B_1 & C_1 \\ A_2 & B_2 & C_2 \\ A_3 & B_3 & C_3 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} a_1 & b_1 & c_1 \\ a_2 & b_2 & c_2 \\ a_3 & b_3 & c_3 \end{vmatrix}^n$$

$$\Delta = \begin{vmatrix} a_1 & b_1 & c_1 \\ a_2 & b_2 & c_2 \\ a_3 & b_3 & c_3 \end{vmatrix} \quad \text{ஆகவும்; } D = \begin{vmatrix} A_1 & B_1 & C_1 \\ A_2 & B_2 & C_2 \\ A_3 & B_3 & C_3 \end{vmatrix}$$

ஆகவும் இருக்கட்டும், அப்படியானால்,

$$\Delta D = \begin{vmatrix} a_1 & b_1 & c_1 \\ a_2 & b_2 & c_2 \\ a_3 & b_3 & c_3 \end{vmatrix} \times \begin{vmatrix} A_1 & B_1 & C_1 \\ A_2 & B_2 & C_2 \\ A_3 & B_3 & C_3 \end{vmatrix}$$

$$= \begin{vmatrix} a_1A_1 + b_1B_1 + c_1C_1 & a_2A_1 + b_2B_1 + c_2C_1 & a_3A_1 + b_3B_1 + c_3C_1 \\ a_1A_2 + b_1B_2 + c_1C_2 & a_2A_2 + b_2B_2 + c_2C_2 & a_3A_2 + b_3B_2 + c_3C_2 \\ a_1A_3 + b_1B_3 + c_1C_3 & a_2A_3 + b_2B_3 + c_2C_3 & a_3A_3 + b_3B_3 + c_3C_3 \end{vmatrix}$$

$$= \begin{vmatrix} \Delta & 0 & 0 \\ 0 & \Delta & 0 \\ 0 & 0 & \Delta \end{vmatrix} = \Delta^3$$

$$\therefore \Delta D = \Delta^3 \text{ ஆகையு } D = \Delta^2$$

உதாரணம் 8 :

$$\begin{vmatrix} B_1 + C_1 & C_1 + A_1 & A_1 + B_1 \\ B_2 + C_2 & C_2 + A_2 & A_2 + B_2 \\ B_3 + C_3 & C_3 + A_3 & A_3 + B_3 \end{vmatrix} = 2\Delta^3$$

என நினைவி.

$$\text{உதாரணம் 6-ல் உள்ளபடி இ.ப.} = 2 \begin{vmatrix} A_1 & B_1 & C_1 \\ A_2 & B_2 & C_2 \\ A_3 & B_3 & C_3 \end{vmatrix}$$

$$\text{உதாரணம் 7-ல் இருந்து} = 2\Delta^2.$$

(மேலு முறை)

$$\text{இ.ப.} = \begin{vmatrix} 2C_1 & C_1 + A_1 & A_1 + B_1 \\ 2C_2 & C_2 + A_2 & A_2 + B_2 \\ 2C_3 & C_3 + A_3 & A_3 + B_3 \end{vmatrix} = C_1 + C_2 + C_3$$

$$= 2 \begin{vmatrix} C_1 & C_2 + A_2 & A_2 + B_2 \\ C_2 & C_3 + A_3 & A_3 + B_3 \\ C_3 & C_1 + A_1 & A_1 + B_1 \end{vmatrix}$$

$$= 2 \begin{vmatrix} C_1 & A_1 & A_1 + B_1 \\ C_2 & A_2 & A_2 + B_2 \\ C_3 & A_3 & A_3 + B_3 \end{vmatrix} \dots C_1 - C_1.$$

$$= 2 \begin{vmatrix} C_1 & A_1 & B_1 \\ C_2 & A_2 & B_2 \\ C_3 & A_3 & B_3 \end{vmatrix} \dots C_2 - C_2$$

$$= 2 \begin{vmatrix} A_1 & B_1 & C_1 \\ A_2 & B_2 & C_2 \\ A_3 & B_3 & C_3 \end{vmatrix}$$

$= 2 \Delta^2$ (உதாரணம் 7-ல் இருத்து)

உதாரணம் 8 :

$$\begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 \\ \alpha & \beta & \gamma \\ \alpha^2 & \beta^2 & \gamma^2 \end{vmatrix} = (\alpha - \beta)(\beta - \gamma)(\gamma - \alpha)$$

என நிரூபி. $S_1 = \alpha^2 + \beta^2 + \gamma^2$ ஆனால்,

$$\begin{vmatrix} S_1 & S_1 & S_2 \\ S_1 & S_2 & S_3 \\ S_2 & S_3 & S_4 \end{vmatrix} = (\alpha - \beta)^2 (\beta - \gamma)^2 (\gamma - \alpha)^2$$

என நிரூபி.

$$\begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 \\ \alpha & \beta & \gamma \\ \alpha^2 & \beta^2 & \gamma^2 \end{vmatrix} \text{ -ல் } \alpha = \beta \text{ எனப் பிரதிபலித்தால் இது}$$

நிரல்கள் முழுவதும் ஒத்தனவாகின்றன. $\therefore \Delta = 0$.

$\therefore \alpha - \beta$ ஆனது Δ -ன் காரணி. இதே விதமாக, $(\beta - \gamma)$, $(\gamma - \alpha)$ -ம் Δ -ன் காரணிகள்.

மேலும் Δ -ன் படி 3.

$$\therefore \Delta = k(\alpha - \beta)(\beta - \gamma)(\gamma - \alpha).$$

$\beta\gamma^2$ -ன் குணகத்தைக் கணக்கிட, $k = 1$.

$$\therefore \Delta = (\alpha - \beta)(\beta - \gamma)(\gamma - \alpha).$$

இப்பொழுது, $(\alpha - \beta)^2 (\beta - \gamma)^2 (\gamma - \alpha)^2$

$$\begin{aligned}
 &= \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 \\ \alpha & \beta & \gamma \\ \alpha^2 & \beta^2 & \gamma^2 \end{vmatrix} \times \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 \\ \alpha & \beta & \gamma \\ \alpha^2 & \beta^2 & \gamma^2 \end{vmatrix} \\
 &= \begin{vmatrix} 3 & \alpha + \beta + \gamma & \alpha^2 + \beta^2 + \gamma^2 \\ \alpha + \beta + \gamma & \alpha^2 + \beta^2 + \gamma^2 & \alpha^3 + \beta^3 + \gamma^3 \\ \alpha^2 + \beta^2 + \gamma^2 & \alpha^3 + \beta^3 + \gamma^3 & \alpha^4 + \beta^4 + \gamma^4 \end{vmatrix} \\
 &= \begin{vmatrix} S_0 & S_1 & S_2 \\ S_1 & S_2 & S_3 \\ S_2 & S_3 & S_4 \end{vmatrix}
 \end{aligned}$$

உதாரணம் 10 : $u = ax + by + cz$; $v = ay + bz + cx$;
 $w = az + bx + cy$ ஆனால்,

$$\begin{vmatrix} a & b & c \\ b & c & a \\ c & a & b \end{vmatrix} \times \begin{vmatrix} x & y & z \\ y & z & x \\ z & x & y \end{vmatrix} = u^3 + v^3 + w^3 - 3uvw$$

என நினைவி.

$$\begin{aligned}
 \text{இ. ம.} &= \begin{vmatrix} ax + by + cz & ay + bz + cx & az + bx + cy \\ bx + cy + az & by + cz + ax & bz + cx + ay \\ cx + ay + bz & cy + az + bx & cz + ax + by \end{vmatrix} \\
 &= \begin{vmatrix} u & v & w \\ w & u & v \\ v & w & u \end{vmatrix} = u(u^2 - vw) - w(w^2 - uv) + v(v^2 - uw) \\
 &= u^3 + v^3 + w^3 - 3uvw.
 \end{aligned}$$

உதாரணம் 11 :

$$\Delta = \begin{vmatrix} 2bc - a^2 & c^2 & b^2 \\ c^2 & 2ac - b^2 & a^2 \\ b^2 & a^2 & 2ab - c^2 \end{vmatrix}$$

இ இரண்டு அணிக்குறையகனங்களின் பெருக்கற்பலனாக எழுதி அதன் மதிப்பைக் காட்டுகி.

$$\begin{aligned} \Delta &= \begin{vmatrix} -a^2+bc+cb & -ab+c^2+ba & -ac+ac+b^2 \\ -ab+ab+c^2 & -b^2+ca+ac & -bc+a^2+bc \\ -ac+b^2+ac & -bc+bc+a^2 & -c^2+ab+ab \end{vmatrix} \\ &= \begin{vmatrix} a & b & c \\ b & c & a \\ c & a & b \end{vmatrix} \times \begin{vmatrix} -a & c & b \\ -b & a & c \\ -c & b & a \end{vmatrix} \\ &= \begin{vmatrix} a & b & c \\ b & c & a \\ c & a & b \end{vmatrix} \times \begin{vmatrix} a & b & c \\ b & c & a \\ c & a & b \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} a & b & c \\ b & c & a \\ c & a & b \end{vmatrix}^2 \\ &= [a(bc-a^2)-b(b^2-ca)+c(ab-c^2)]^2 \\ &= [3abc-a^3-b^3-c^3]^2 \\ &= [a^3+b^3+c^3-3abc]^2. \end{aligned}$$

உதாரணை 12 :

$$\begin{aligned} &\begin{vmatrix} a+ib & c+id \\ -c+id & a-bi \end{vmatrix} \times \begin{vmatrix} \alpha-i\beta & \gamma-i\delta \\ -\gamma-i\delta & \alpha-i\beta \end{vmatrix} \\ &= \begin{vmatrix} A-iB & C-iD \\ -C-iD & A+iB \end{vmatrix} \text{ என்று காண்க.} \end{aligned}$$

இதிலிருந்து $(0^2+2^2+3^2+4^2)$ $(5^2+6^2+7^2+8^2)$ ஐ நான் குறுகுறுக்கவில்லை கூட்டுவதாக காண்க.

முதல் இரு அணிக்கோவைகளைப் பெருக்கினால்,

$$\begin{aligned} &= \begin{vmatrix} a\alpha + b\beta + c\gamma + d\delta - i(a\beta - b\alpha + c\delta - d\gamma) \\ a\gamma - b\delta - c\alpha - d\beta - i(a\delta + b\gamma - c\beta - d\alpha) \\ -a\gamma + b\delta + c\alpha - d\beta - i(a\delta + b\gamma - c\beta - d\alpha) \\ + a\alpha + b\beta + c\gamma + d\delta + i(a\beta - b\alpha + c\delta + d\gamma) \end{vmatrix} \\ &= \begin{vmatrix} A-iB & C-iD \\ -C-iD & A+iB \end{vmatrix}. \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{இதில் } A &= a\alpha + b\beta + c\gamma + d\delta; \quad B = a\beta - b\alpha + c\delta - d\gamma \\ C &= a\gamma - b\delta - c\alpha + d\beta; \quad D = a\delta + b\gamma - c\beta - d\alpha \dots (1) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{மேலும் } \begin{vmatrix} a + ib & c + id \\ -c + id & a - bi \end{vmatrix} &= a^2 + b^2 + c^2 + d^2 \\ \begin{vmatrix} \alpha - i\beta & \gamma - i\delta \\ -\gamma - i\delta & \alpha + \beta i \end{vmatrix} &= \alpha^2 + \beta^2 + \gamma^2 + \delta^2 \\ \begin{vmatrix} A - iB & C - iD \\ -C - iD & A + iB \end{vmatrix} &= A^2 + B^2 + C^2 + D^2 \end{aligned}$$

$$\therefore (a^2 + b^2 + c^2 + d^2)(\alpha^2 + \beta^2 + \gamma^2 + \delta^2) = A^2 + B^2 + C^2 + D^2$$

இதில் $a=9, b=2, c=3, d=4, \alpha=5, \beta=8, \gamma=7, \delta=8$ எனப் பிரதியிட்டால் $A=110, B=40, C=56, D=48 \dots (1)$

$$\begin{aligned} \therefore (9^2 + 2^2 + 3^2 + 4^2)(5^2 + 8^2 + 7^2 + 8^2) \\ = 110^2 + 40^2 + 56^2 + 48^2. \end{aligned}$$

உதாரணம் 13 :

பின்வரும் (சமச்சரி) அணிக்கோவையின் மதிப்பைக் காட்டுக.

$$\begin{aligned} \Delta &= \begin{vmatrix} a & b & c & d \\ b & a & d & c \\ c & d & a & b \\ d & c & b & a \end{vmatrix} \\ \Delta &= \begin{vmatrix} a+b+c+d & b & c & d \\ a+b+c+d & a & d & c \\ a+b+c+d & d & a & b \\ a+b+c+d & c & b & a \end{vmatrix} \dots C_1 + C_2 + C_3 + C_4. \end{aligned}$$

$\therefore a+b+c+d$ ஆனது Δ -ன் காரணி.

மேலும் $c_1 + c_2 = c_3 + c_4$ இ னடுத்துக்கொண்டு $a+b-c-d$ ஆனது Δ -ன் காரணி என நிரூபிக்கலாம். இதேவிதமாக, $a+c-b-d$ -ம், $a+d-b-c$ -ம் Δ -ன் காரணிகள்.

$$\therefore \Delta = k(a+b+c+d)(a+b-c-d)(a+c-b-d) \\ \times (a+d-b-c).$$

Δ -ன் படி 4 என்பதைக் கவனி. a^4 -ன் குணகத்தைக் கொண்டு $k=1$ எனக் கொள்க.

உதாரணம் 14 : இரட்டைப்பெண் தரமுள்ள அணிக்குகோவை யின் சதுரமானது எதிர்ச்சீரணிக்குகோவை (skew symmetric) என நிரூபி.

ஒரு 4 சதுர அணிக்குகோவையை எடுத்துக்கொள்வோம்,

$$\Delta = \begin{vmatrix} a_1 & b_1 & c_1 & d_1 \\ a_2 & b_2 & c_2 & d_2 \\ a_3 & b_3 & c_3 & d_3 \\ a_4 & b_4 & c_4 & d_4 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} -b_1 & a_1 & -d_1 & c_1 \\ -b_2 & a_2 & -d_2 & c_2 \\ -b_3 & a_3 & -d_3 & c_3 \\ -b_4 & a_4 & -d_4 & c_4 \end{vmatrix}$$

$$\therefore \Delta^2 = \begin{vmatrix} a_1 & b_1 & c_1 & d_1 \\ a_2 & b_2 & c_2 & d_2 \\ a_3 & b_3 & c_3 & d_3 \\ a_4 & b_4 & c_4 & d_4 \end{vmatrix} \times \begin{vmatrix} -b_1 & a_1 & -d_1 & c_1 \\ -b_2 & a_2 & -d_2 & c_2 \\ -b_3 & a_3 & -d_3 & c_3 \\ -b_4 & a_4 & -d_4 & c_4 \end{vmatrix}$$

$$= \begin{vmatrix} 0_1 & A & B & C \\ -A & 0_2 & D & E \\ -B & -D & 0_3 & F \\ -C & -E & -F & 0_4 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 0 & A & B & C \\ -A & 0 & D & E \\ -B & -D & 0 & F \\ -C & -E & -F & 0 \end{vmatrix}$$

$$\text{இதில் } 0_1 = -a_1b_1 + a_1b_1 - c_1d_1 + c_1d_1 = 0$$

$$0_2 = 0_3 = 0_4 = 0.$$

$$\text{மேலும் } A = -a_1b_2 + b_1a_2 - c_1d_2 + c_2d_1$$

$$B = -a_1b_3 + b_1a_3 - c_1d_3 + c_3d_1$$

$$C = -a_1b_4 + b_1a_4 - c_1d_4 + c_4d_1$$

$$D = -a_1 b_3 + b_2 a_3 - c_2 d_1 + c_1 d_2$$

$$E = -a_1 b_4 + b_2 a_4 - c_2 d_4 + c_4 d_1$$

$$F = -a_3 b_4 + b_3 a_4 - c_3 d_4 + c_4 d_3.$$

Δ^2 ஓர் எதிர்ச் சீரணி என்பது தெளிவு.

உதாரணம் 15 : ஒத்ததெய்தை நரமுள்ள ஓர் எதிர்ச் சீரணிக்கு கோணங்களின் மதிப்பு பூச்சியமாகும்.

Δ ஐ 5 சதுர அணிவாக எடுத்துக் கொள்வோம்.

$$\Delta = \begin{vmatrix} 0 & a & b & c & d \\ -a & 0 & e & f & g \\ -b & -e & 0 & h & i \\ -c & -f & -h & 0 & j \\ -d & -g & -i & -j & 0 \end{vmatrix} \quad \dots \quad \dots \quad (1)$$

இதன் நிரல்களையும் நிரல்களையும் மாற்றியமைத்தால் Δ -ன் மதிப்பு மாறுகூ.

$$\therefore \Delta = \begin{vmatrix} 0 & -a & -b & -c & -d \\ a & 0 & -e & -f & -g \\ b & e & 0 & -h & -i \\ c & f & h & 0 & -j \\ d & g & i & j & 0 \end{vmatrix} \quad \dots \quad \dots \quad (2)$$

(2)-ல் ஒவ்வொரு நிரலையும் -1 ஆல் பெருக்குவோம்.

$$(-1)^5 \Delta = \begin{vmatrix} 0 & a & b & c & d \\ -a & 0 & e & f & g \\ -b & -e & 0 & h & i \\ -c & -f & -h & 0 & j \\ -d & -g & -i & -j & 0 \end{vmatrix}$$

அதாவது $-\Delta = \Delta \dots = (1)$ -ல் இருந்து

$$\therefore \Delta = 0.$$

8. நேரணி மூன்றடியை விடுவித்தல்

$$a_1x + b_1y + c_1z = d_1 \quad \dots \quad \dots \quad \dots \quad (1)$$

$$a_2x + b_2y + c_2z = d_2 \quad \dots \quad \dots \quad \dots \quad (2)$$

$$a_3x + b_3y + c_3z = d_3 \quad \dots \quad \dots \quad \dots \quad (3)$$

என்னும் சமன்பாடுகளை எடுத்துக் கொள்வோம்.

$$\Delta = \begin{vmatrix} a_1 & b_1 & c_1 \\ a_2 & b_2 & c_2 \\ a_3 & b_3 & c_3 \end{vmatrix} = \dots \dots \dots (4)$$

ஆக இருக்கட்டும்.

$$\therefore \Delta x = \begin{vmatrix} a_1x & b_1 & c_1 \\ a_2x & b_2 & c_2 \\ a_3x & b_3 & c_3 \end{vmatrix} \quad \dots \quad \dots \quad (5)$$

இப்பொழுது (5)-ல் இரண்டாம் திரை y ஆதும், மூன்றாம் திரை z ஆதும் பெருக்கி, மூதல் திரையுடன் கூட்டினால்

$$\begin{aligned} \Delta x &= \begin{vmatrix} a_1x + b_1y + c_1z & b_1 & c_1 \\ a_2x + b_2y + c_2z & b_2 & c_2 \\ a_3x + b_3y + c_3z & b_3 & c_3 \end{vmatrix} \\ &= \begin{vmatrix} d_1 & b_1 & c_1 \\ d_2 & b_2 & c_2 \\ d_3 & b_3 & c_3 \end{vmatrix} \dots = (1) (2) (3)\text{-ல் இருந்து} \end{aligned}$$

$$\therefore x = \begin{vmatrix} d_1 & b_1 & c_1 \\ d_2 & b_2 & c_2 \\ d_3 & b_3 & c_3 \end{vmatrix} \div \Delta$$

$$\text{இதேதனிதமாக, } y = \begin{vmatrix} a_1 & d_1 & c_1 \\ a_2 & d_2 & c_2 \\ a_3 & d_3 & c_3 \end{vmatrix} + \Delta$$

$$z = \begin{vmatrix} a_1 & b_1 & d_1 \\ a_2 & b_2 & d_2 \\ a_3 & b_3 & d_3 \end{vmatrix} + \Delta.$$

உதாரணம் 16 : கீழ்க்கண்ட முறைப்படி விடுவி.

$$x + y + z = 4$$

$$2x + 5y - 3z = 8$$

$$x + 7y - 3z = 2.$$

$$\Delta = \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 2 & 5 & -3 \\ 1 & 7 & -3 \end{vmatrix} = 12.$$

$$\begin{vmatrix} d_1 & b_1 & c_1 \\ d_2 & b_2 & c_2 \\ d_3 & b_3 & c_3 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 4 & 1 & 1 \\ 8 & 5 & -3 \\ 2 & 7 & -3 \end{vmatrix} = 12.$$

$$\therefore x = \begin{vmatrix} d_1 & b_1 & c_1 \\ d_2 & b_2 & c_2 \\ d_3 & b_3 & c_3 \end{vmatrix} + \Delta = \frac{12}{12} = 1.$$

$$y = \begin{vmatrix} a_1 & d_1 & c_1 \\ a_2 & d_2 & c_2 \\ a_3 & d_3 & c_3 \end{vmatrix} + \Delta$$

$$= \begin{vmatrix} 1 & 4 & 1 \\ 2 & 8 & -3 \\ 1 & 2 & -3 \end{vmatrix} + 12 = \frac{12}{12} = 1.$$

$$z = \begin{vmatrix} a_1 & b_1 & d_1 \\ a_2 & b_2 & d_2 \\ a_3 & b_3 & d_3 \end{vmatrix} + \Delta$$

$$= \begin{vmatrix} 1 & 1 & 4 \\ 2 & 5 & 8 \\ 1 & 7 & 2 \end{vmatrix} + 12$$

$$= 24 + 12 = 36.$$

$$\therefore x = 1, y = 1, z = 36.$$

பயிற்சிகள்

1. பின்வரும் அணிக்குகைகளின் மதிப்பைக் காண்பிப்பீர்.

$$(a) \begin{vmatrix} 235 & 240 & 219 \\ 240 & 225 & 198 \\ 219 & 198 & 181 \end{vmatrix} \quad (b) \begin{vmatrix} 20 & 11 & 20 & 28 \\ 6 & 8 & 0 & 9 \\ 11 & -2 & 33 & 3 \\ 19 & 6 & 17 & 22 \end{vmatrix}$$

$$(c) \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 3 & 4 \\ 1 & 3 & 6 & 10 \\ 1 & 4 & 10 & 20 \end{vmatrix} \quad (d) \begin{vmatrix} 1 & 15 & 14 & 4 \\ 12 & 8 & 7 & 9 \\ 6 & 10 & 11 & 6 \\ 13 & 8 & 2 & 16 \end{vmatrix}$$

$$2. \begin{vmatrix} (a-b-c) & 2a & 2a \\ 2b & (b-c-a) & 2b \\ 2c & 2c & (c-a-b) \end{vmatrix} = (a+b+c)^3$$

என நிரூபி.

$$3. \begin{vmatrix} 1 & a & a^2 & 0 \\ 0 & 1 & a & a^2 \\ a^2 & 0 & 1 & a \\ a & a^2 & 0 & 1 \end{vmatrix} = 1 + a^4 + a^8$$

என நினை.

$$4. \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1+a & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1+b & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 1+c \end{vmatrix} = abc$$

என நினை.

$$5. \begin{vmatrix} 0 & x & y & z \\ -x & 0 & c & b \\ -y & -c & 0 & a \\ -z & -b & -a & 0 \end{vmatrix} = (ax-by+cz)^2$$

என நினை.

$$6. \begin{vmatrix} a & b & c & d \\ -b & a & -d & c \\ -c & d & a & -b \\ -d & -c & b & a \end{vmatrix} = (a^2+b^2+c^2+d^2)^2$$

என நினை.

$$7. \begin{vmatrix} x & y & z \\ x^2 & y^2 & z^2 \\ yz & zx & xy \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 \\ x^2 & y^2 & z^2 \\ x^3 & y^3 & z^3 \end{vmatrix}$$

என நினை.

$$8. \begin{vmatrix} 1+a & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1+b & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1+c & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 1+d \end{vmatrix} \\ = abcd \left(1 + \frac{1}{a} + \frac{1}{b} + \frac{1}{c} + \frac{1}{d} \right) \text{ என நிறுதி.}$$

$$9. \begin{vmatrix} 1 & a & a^2 & a^3 + bcd \\ 1 & b & b^2 & b^3 + cda \\ 1 & c & c^2 & c^3 + dab \\ 1 & d & d^2 & d^3 + abc \end{vmatrix} = 0 \text{ என நிறுதி.}$$

குறிப்பு :

$$\begin{vmatrix} 1 & a & a^2 & a^3 \\ 1 & b & b^2 & b^3 \\ 1 & c & c^2 & c^3 \\ 1 & d & d^2 & d^3 \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} 1 & a & a^2 & bcd \\ 1 & b & b^2 & cda \\ 1 & c & c^2 & dab \\ 1 & d & d^2 & abc \end{vmatrix}$$

எனப் பிரித்துக் கொள்க.

$$10. \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 \\ \sin \alpha & \sin \beta & \sin \gamma \\ \cos \alpha & \cos \beta & \cos \gamma \end{vmatrix} \\ = -4 \sin \frac{\alpha-\beta}{2} \sin \frac{\beta-\gamma}{2} \sin \frac{\gamma-\alpha}{2} \text{ என நிறுதி.}$$

$$11. \begin{vmatrix} 0 & (\alpha-\beta)^2 & (\alpha-\gamma)^2 \\ (\beta-\alpha)^2 & 0 & (\beta-\gamma)^2 \\ (\gamma-\alpha)^2 & (\gamma-\beta)^2 & 0 \end{vmatrix} \\ = 2(\beta-\gamma)^2 (\gamma-\alpha)^2 (\alpha-\beta)^2 \text{ என நிறுதி.}$$

$$12. \begin{vmatrix} 1 & a & a^2 \\ \cos(n-1)x & \cos nx & \cos(n+1)x \\ \sin(n-1)x & \sin nx & \sin(n+1)x \end{vmatrix} \\ = \sin x (1 - 2a \cos x + a^2) \text{ என திருக்கி.}$$

$$13. \begin{vmatrix} 2 \cos \theta & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 2 \cos \theta & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 2 \cos \theta & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 2 \cos \theta \end{vmatrix} = \frac{\sin 5\theta}{\sin \theta}$$

என திருக்கி.

$$14. \begin{vmatrix} 1+x_1 & x_2 & \dots & x_n \\ x_1 & 1+x_2 & \dots & x_n \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ x_1 & x_2 & \dots & 1+x_n \end{vmatrix} = 1+x_1+x_2+\dots+x_n$$

என திருக்கி.

$$15. \begin{vmatrix} \sin \alpha & \sin 2\alpha & \sin 3\alpha \\ \sin \beta & \sin 2\beta & \sin 3\beta \\ \sin \gamma & \sin 2\gamma & \sin 3\gamma \end{vmatrix}$$

$$= 8 \sin \alpha \sin \beta \sin \gamma (\cos \alpha - \cos \beta) (\cos \beta - \cos \gamma) (\cos \gamma - \cos \alpha)$$

என திருக்கி.

குறிப்பு. $C_n - C_1$ ஐ எடுத்துக் கொள்ள.

$$16. \Delta_n = \begin{vmatrix} (1+x^2) & x & 0 & \dots & 0 & 0 \\ x & (1+x^2) & x & \dots & 0 & 0 \\ 0 & x & (1+x^2) & \dots & 0 & 0 \\ \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots \\ 0 & 0 & 0 & \dots & x & (1+x^2) \end{vmatrix}$$

என்பது n -சதுர அணித்தொகையானால்

$$\begin{aligned}\Delta_n &= (1+x^2) \Delta_{n-1} - x^2 \Delta_{n-2} \\ &= 1 + x^2 + x^4 + \dots + x^{2n} \text{ என திருதி.}\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}17. \quad & \begin{vmatrix} a^2 & a^2-(b-c)^2 & bc \\ b^2 & b^2-(c-a)^2 & ca \\ c^2 & c^2-(a-b)^2 & ab \end{vmatrix} \\ &= (a-b)(b-c)(c-a)(a+b+c)(a^2+b^2+c^2) \text{ என திருதி.}\end{aligned}$$

$$18. \quad \begin{vmatrix} 4 & 5 & 6 & x \\ 5 & 6 & 7 & y \\ 6 & 7 & 8 & z \\ x & y & z & 0 \end{vmatrix} = (x-2y+z)^2$$

என திருதி.

குறிப்பு: $R_1 + R_3 - 2R_2$ ஐ எடுத்துக் கொள்ள.

$$\begin{aligned}19. \quad & \begin{vmatrix} a^2+1 & ab & ac & ad \\ ba & b^2+1 & bc & bd \\ ca & cb & c^2+1 & cd \\ da & db & dc & d^2+1 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} a^2+1 & b^2 & c^2 & d^2 \\ a^2 & b^2+1 & c^2 & d^2 \\ a^2 & b^2 & c^2+1 & d^2 \\ a^2 & b^2 & c^2 & d^2+1 \end{vmatrix} \\ & \text{என திருதி.}\end{aligned}$$

$$20. \quad \begin{vmatrix} x & x^2 & 1+x^3 \\ y & y^2 & 1+y^3 \\ z & z^2 & 1+z^3 \end{vmatrix} = 0 \text{ ஆனால்,}$$

$xyz = -1$ என திருதி.

21. விடுவி :

$$\begin{vmatrix} x-2 & 2x-3 & 3x-4 \\ x-4 & 2x-6 & 3x-16 \\ x-6 & 2x-27 & 3x-64 \end{vmatrix} = 0$$

$$22. \begin{vmatrix} 1+x & 1-x & 1-x \\ 1-x & 1+x & 1-x \\ 1-x & 1-x & 1+x \end{vmatrix} = 0.$$

23. விடுவி :

$$\begin{vmatrix} x+3 & 2x+3 & 3x+4 \\ 2x+3 & 3x+4 & 4x+5 \\ 3x+5 & 5x+8 & 10x+17 \end{vmatrix} = 0.$$

குறிப்பு : $R_2 - 2R_1$; $R_3 - 3R_1$ ஐ எடுத்துக் கொள்ள.

24. $a + b + c = 0$ ஆனால்,

$$\begin{vmatrix} a-x & c & b \\ c & b-x & a \\ b & a & c-x \end{vmatrix} = 0 \text{ என்பதன் மூலங்கள்}$$

$$0, \pm \sqrt{\frac{2}{3}(a^2 + b^2 + c^2)} \quad \text{என நிரூபி.}$$

25. விடுவி.

$$\begin{vmatrix} x & -3 & -1 \\ 2 & -3x & x-3 \\ -3 & 2x & x+2 \end{vmatrix} = 0.$$

26. w ஆனது 1-ன் கனமூலம் ஆனால் $a + bw + cw^2$; $a + cw + bw^2$ ஆனவை,

$$\Delta = \begin{vmatrix} a & b & c \\ b & c & a \\ c & a & b \end{vmatrix} \text{ -ன் காரணிகள் என நிரூபி. இதிலிருந்து}$$

$$\begin{aligned} \Delta &= -(a+b+c)(a+bw+cw^2)(a+cw+bw^2) \\ &= 3abc - a^3 - b^3 - c^3 \text{ என நிரூபி.} \end{aligned}$$

குறிப்பு. $C_1 + w^2 C_2 + w C_3$

$$\Delta = \begin{vmatrix} a + bw^2 + cw & b & c \\ b + cw^2 + aw & c & a \\ c + aw^2 + bw & a & b \end{vmatrix}$$

$$= \begin{vmatrix} a + bw^2 + cw & b & c \\ w(a + bw^2 + cw) & c & a \\ w^2(a + bw^2 + cw) & a & b \end{vmatrix}$$

27. $(q-r)^2 \neq (p-r)(p-q)$ ஆகலாம்.

$$\begin{vmatrix} p+x & q+x & r+x \\ q+x & r+x & p+x \\ r+x & p+x & q+x \end{vmatrix} = 0$$

என்பதன் மூலம் $-\frac{p+q+r}{3}$ எனக் காண்க.

$$28. \begin{vmatrix} 0 & c & b \\ c & 0 & a \\ b & a & 0 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} b^2+c^2 & ab & ac \\ ab & c^2+a^2 & bc \\ ac & bc & a^2+b^2 \end{vmatrix}$$

என நிரூபி. இதிலிருந்து வ.ப. = $4b^2c^2a^2$ என நிரூபி.

$$29. \begin{vmatrix} 0 & b & c & 1 \\ a & 0 & c & 1 \\ a & b & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 0 \end{vmatrix}$$

$$= \begin{vmatrix} b^2+c^2+1 & c^2+1 & b^2+1 & b+c \\ c^2+1 & c^2+a^2+1 & a^2+1 & c+a \\ b^2+1 & a^2+1 & a^2+b^2+1 & a+b \\ b+c & c+a & a+b & 3 \end{vmatrix}$$

என நிரூபி. இதிலிருந்து வ.ப. = $(bc+ca+ab)^2$ என நிரூபி.

$$80. \begin{vmatrix} \alpha_1 \alpha_1 + b_1 \beta_1 & \alpha_1 \alpha_1 + b_1 \beta_1 & \alpha_1 \alpha_1 + b_1 \beta_1 \\ \alpha_1 \alpha_2 + b_1 \beta_2 & \alpha_2 \alpha_2 + b_2 \beta_2 & \alpha_2 \alpha_2 + b_2 \beta_2 \\ \alpha_1 \alpha_3 + b_1 \beta_3 & \alpha_1 \alpha_3 + b_1 \beta_3 & \alpha_3 \alpha_3 + b_3 \beta_3 \end{vmatrix}$$

என்பதை இது அணிக்கோவைகளின் பெருக்கத் படிவாக எழுதி அதன் மதிப்பைக் காட்டுகிறது.

$$81. (i) \begin{vmatrix} 1 & a & a^2 \\ 1 & b & b^2 \\ 1 & c & c^2 \end{vmatrix} = (a-b)(b-c)(c-a)$$

$$(ii) \begin{vmatrix} (1+ax)^2 & (1+ay)^2 & (1+az)^2 \\ (1+bx)^2 & (1+by)^2 & (1+bz)^2 \\ (1+cx)^2 & (1+cy)^2 & (1+cz)^2 \end{vmatrix}$$

$$= 2(a-b)(b-c)(c-a)(x-y)(y-z)(z-x).$$

என திருப்தி.

82. w ஆனது 1-ன் மெய்யிலா கன மூலம் ஆனால்,

$$\begin{vmatrix} 1 & w & w^2 & w^3 \\ w & w^2 & w^3 & 1 \\ w^2 & w^3 & 1 & w \\ w^3 & 1 & w & w^2 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 1 & 1 & -2 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & -2 \\ -2 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & -2 & 1 & 1 \end{vmatrix}$$

என திருப்தி.

$$83. (i) \Delta = \begin{vmatrix} x & y & z \\ y & z & x \\ z & x & y \end{vmatrix} \text{ என்ற அணிக்கோவைகளில் } X,$$

Y, Z என்பன x, y, z -ன் இடங்களை மாற்றினால் ஆனால்,

$$\begin{vmatrix} X & Y & Z \\ Y & Z & X \\ Z & X & Y \end{vmatrix} = \Delta^3 \text{ என திருப்தி.}$$

குறிப்பு : உதாரணம் 7 ஐப் பரிசீலிப்போம்.

(ii) $r^2 = x^2 + y^2 + z^2$; $u^2 = yz + zx + xy$ ஆனால்,

$$\Delta^2 = \begin{vmatrix} r^2 & u^2 & u^2 \\ u^2 & r^2 & u^2 \\ u^2 & u^2 & r^2 \end{vmatrix} \text{ எனத் திருக்கிறது.}$$

$$(iii) \begin{vmatrix} yz-x^2 & zx-y^2 & xy-z^2 \\ zx-y^2 & xy-z^2 & yz-x^2 \\ xy-z^2 & yz-x^2 & zx-y^2 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} r^2 & u^2 & u^2 \\ u^2 & r^2 & u^2 \\ u^2 & u^2 & r^2 \end{vmatrix}$$

எனத் திருக்கிறது.

$$34. \begin{vmatrix} x^2+y^2+1 & 2x+xy & 2y+x^2 \\ 2x+xy & 1+y^2 & 2x+xy \\ 2y+x^2 & 2x+xy & x^2+y^2+1 \end{vmatrix}$$

$$= \begin{vmatrix} 1-x^2 & xy-x & x^2-y \\ xy-x & 1-y^2 & xy-x \\ x^2-y & xy-x & 1-x^2 \end{vmatrix} \text{ எனத் திருக்கிறது.}$$

$$35. \begin{vmatrix} a^2+\lambda^2 & ab+c\lambda & ca-b\lambda \\ ab-c\lambda & b^2+\lambda^2 & bc+a\lambda \\ ca+b\lambda & bc-a\lambda & c^2+\lambda^2 \end{vmatrix} \times \begin{vmatrix} \lambda & c & -b \\ -c & \lambda & a \\ b & -a & \lambda \end{vmatrix} \\ = \lambda^2 (a^2+b^2+c^2+\lambda^2)^2 \text{ எனத் திருக்கிறது.}$$

$$36. x_n = \frac{1}{r!} \text{ ஆனால்}$$

$$\begin{vmatrix} x_1 & x_0 & 0 & \dots & 0 \\ x_2 & x_1 & x_0 & \dots & 0 \\ \dots & \dots & \dots & \dots & \dots \\ x_n & x_{n-1} & x_{n-2} & \dots & x_0 \end{vmatrix} = x_n$$

எனத் திருக்கிறது.

$$37. \begin{vmatrix} a & (a-1) & \dots & (a-n) \\ (a-1) & a & \dots & (a-n+1) \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ (a-n) & (a-n+1) & \dots & a \end{vmatrix} = 2^{n-1} (2a-n)$$

என தீர்வு.

$$38. \begin{vmatrix} a^2 & 2a^2 & 2a & 1 \\ a^2 & a^2 + 2a & 2a+1 & 1 \\ a & 2a+1 & a+2 & 1 \\ 1 & 2 & 2 & 1 \end{vmatrix} = (a-1)^2 \text{ என தீர்வு.}$$

$$39. \quad 2x = a + b + c \text{ எனில்,}$$

$$\begin{vmatrix} a^2 & (x-a)^2 & (x-a)^2 \\ (x-b)^2 & b^2 & (x-b)^2 \\ (x-c)^2 & (x-c)^2 & c^2 \end{vmatrix} = 2x^2 (x-a)(x-b)(x-c) \text{ என தீர்வு.}$$

$$0 \quad x \quad y \quad z$$

$$40. \quad \begin{vmatrix} x & 0 & z & y \\ y & z & 0 & x \\ z & y & x & 0 \end{vmatrix}$$

$$= x^4 + y^4 + z^4 - 2x^2y^2 - 2y^2z^2 - 2z^2x^2 \text{ என தீர்வு.}$$

$$41. \quad \text{மேல்க்கு மூன்றடியைத் தீர்க்க:}$$

$$\begin{aligned} \text{(i)} \quad & x + 2y + 3z = 10 \\ & 4x + 5y + 6z = 28 \\ & 7x + 8y + 9z = -4. \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{(ii)} \quad & x + y + z = d \\ & ax + by + cz = d^2 \\ & a^2x + b^2y + c^2z = d^3 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{(iii)} \quad & 2x - y + 3z = 8 \\ & x + y + z = 6 \\ & x - y + z = 2 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{(iv)} \quad & 9x + 7y + 3z = 8 \\ & 5x - y + 4z = 1 \\ & 4x + 9y + 2z = 4 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{(v)} \quad & x + y + z + w = 2 \\ & 2x - y + 2z - w = -6 \\ & 3x + 2y + 3z + 4w = 7 \\ & x - 2y - 3z + 2w = 5. \end{aligned}$$

42. x, y, z -ன் தீக்கற்பலனைக் காண்டுவிட.

$$\begin{aligned} \text{(i)} \quad & ax + by + cz = 0 \\ & bx + cy + az = 0 \\ & cx + ay + bz = 0. \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{(ii)} \quad & x + y + z = 0 \\ & ax + by + cz = 0 \\ & a^2x + b^2y + c^2z = 0. \end{aligned}$$

43. பின்வரும் சமன்பாடுகளில் தீக்கற்பலனைக் காண்டுவிட.

$$a_1x + b_1y + c_1z + d_1w = 0 \quad \dots \quad (1)$$

$$a_2x + b_2y + c_2z + d_2w = 0 \quad \dots \quad (2)$$

$$a_3x + b_3y + c_3z + d_3w = 0 \quad \dots \quad (3)$$

$$a_4x + b_4y + c_4z + d_4w = 0. \quad \dots \quad (4)$$

இதில் x, y, z, w ஆகிய நான்கும் பூச்சியம் என்பது மிக எளிதான (அதனுல் புறக்கணிக்கத்தக்க) தீர்வாகும் (trivial solution). எனவே $w \neq 0$ எனக்கொண்டு (2), (3), (4) ஆகிய சமன்பாடுகளை w ஆல் வகுக்க.

$$a_1 \frac{x}{w} + b_1 \frac{y}{w} + c_1 \left(\frac{z}{w} \right) = -d_1 \quad \dots \quad (5)$$

$$a_2 \frac{x}{w} + b_2 \frac{y}{w} + c_2 \frac{z}{w} = -d_2 \quad \dots \quad (6)$$

$$a_3 \frac{x}{w} + b_3 \frac{y}{w} + c_3 \frac{z}{w} = -d_3 \quad \dots \quad (7)$$

இதை § 6-ல் உள்ள திசோட் முறைப்படி விடுவித்தால்,

$$\begin{array}{c} x/w \\ \hline \left| \begin{array}{ccc} -d_1 & b_1 & c_1 \\ -d_2 & b_2 & c_2 \\ -d_4 & b_4 & c_4 \end{array} \right| \end{array} = \begin{array}{c} y/w \\ \hline \left| \begin{array}{ccc} a_1 & -d_1 & c_1 \\ a_2 & -d_2 & c_2 \\ a_4 & -d_4 & c_4 \end{array} \right| \end{array}$$

$$\begin{array}{c} z/w \\ \hline \left| \begin{array}{ccc} a_1 & b_2 & -d_1 \\ a_2 & b_3 & -d_2 \\ a_4 & b_4 & -d_4 \end{array} \right| \end{array} = \begin{array}{c} 1 \\ \hline \left| \begin{array}{ccc} a_1 & b_1 & c_1 \\ a_2 & b_2 & c_2 \\ a_4 & b_4 & c_4 \end{array} \right| \end{array}$$

எனக் கிடைக்கும். இவற்றை முதல் சமன்பாட்டில் பிரதிபலித்தால்,

$$a_1 \left| \begin{array}{ccc} -d_1 & b_1 & c_1 \\ -d_2 & b_2 & c_2 \\ -d_4 & b_4 & c_4 \end{array} \right| + b_1 \left| \begin{array}{ccc} a_1 & -d_1 & c_2 \\ a_2 & -d_2 & c_3 \\ a_4 & -d_4 & c_4 \end{array} \right|$$

$$+ c_1 \left| \begin{array}{ccc} a_2 & b_2 & -d_1 \\ a_3 & b_3 & -d_2 \\ a_4 & b_4 & -d_4 \end{array} \right| + d_1 \left| \begin{array}{ccc} a_2 & b_2 & c_1 \\ a_3 & b_3 & c_2 \\ a_4 & b_4 & c_4 \end{array} \right| = 0$$

எல்லாவற்றையும் (-1) ஆல் பெருக்கினால்,

$$a_1 \left| \begin{array}{ccc} b_1 & c_1 & d_1 \\ b_2 & c_2 & d_2 \\ b_4 & c_4 & d_4 \end{array} \right| - b_1 \left| \begin{array}{ccc} a_2 & c_2 & d_2 \\ a_3 & c_3 & d_3 \\ a_4 & c_4 & d_4 \end{array} \right|$$

$$+ c_1 \left| \begin{array}{ccc} a_1 & b_1 & d_1 \\ a_2 & b_2 & d_2 \\ a_4 & b_4 & d_4 \end{array} \right| - d_1 \left| \begin{array}{ccc} a_2 & b_2 & c_2 \\ a_3 & b_3 & c_3 \\ a_4 & b_4 & c_4 \end{array} \right| = 0$$

$$\therefore \begin{vmatrix} a_1 & b_1 & c_1 & d_1 \\ a_2 & b_2 & c_2 & d_2 \\ a_3 & b_3 & c_3 & d_3 \\ a_4 & b_4 & c_4 & d_4 \end{vmatrix} = 0.$$

விடைகள்

1. (a) 0; (b) 9; (c) 1; (d) 0.

21. $x=4$. 22. $x=0$, 3. 23. $-2, -1, -1$.

25. 1, 2, -3. 30. 0.

41. (i) $x=2$, $y=2$, $z=1$.

$$(ii) \quad x = \frac{d(c-d)(d-b)}{(c-a)(a-b)}$$

$$y = \frac{d(d-c)(a-d)}{(b-c)(a-b)}$$

$$z = \frac{d(d-a)(b-d)}{(b-c)(c-a)}$$

(iii) 1, 2, 3. (iv) 1, 0, -1. (v) 0, 1, -1, -2.

BIBLIOGRAPHY

1. ALGEBRA ... A text book of Determinants, Matrices and Algebraic Forms. W. L. FERRAR. Clarendon Press.
2. ELEMENTARY MATRICES ... FRAZER—DUNCAN—COLLAR—Cambridge University Press.
3. THEORY OF MATRICES ... C. C. Mac DUFFIE.
4. THEORY OF EQUATIONS ... BURNSIDE AND PANTON.
5. MATRICES ... Theory and Problems of ... FRANK AYRES - Schaum Publishing Co.
6. HIGHER ALGEBRA ... FERRAR. O.U.P.
7. MATRICES ... SHANTI NARAYAN.
8. A SURVEY OF MODERN ALGEBRA ... Garret Birkhoff and Saunders Mac Lane, Macmillan.
9. Introduction to Algebraic Theories ... A. A. ALBERT. University of Chicago Press.
10. Theory of Matrices. S. PERLIS. Addison Wesley Press.

கலைச்சொற்கள்

A

Adjoint Matrix	—	சேர்ப்பு அணி
Algebra	—	இயல் கணிதம்
Algebraic Expression	—	இயற் கணிதக் கோவை
Applied Mathematics	—	பயன் மூலக் கணிதம்
Arrays	—	வரிசைகள்
Associative Law	—	சேர்ப்பு விதி
Augmented Matrix	—	பெரிதாக்கிய அணி
Axes of co-ordinates	—	கிடைநிலை அச்சுகள், ஆயக் கள்

B

Binomial	—	சதுரம்பு
Binomial coefficient	—	.. க்கெழு
Binomial expression	—	.. க்கோவை
Bordered matrix	—	கரையுற்ற அணி
Brackets	—	அடைப்புகள்
Brackets square	—	பல அடைப்புகள்

C

Case	—	வகை
Case general	—	பொது வகை
Change of Basis Vector	—	அடிப்படை வெக்டர் குழு மாற்றம்
Characteristic Equation	—	சிறப்பியல்புச் சமன்பாடு
Characteristic roots	—	.. மூலங்கள்
Cofactor	—	இணைக் காரணி
Cofactor of an element of a determinant	—	ஒரணிக் கோவை மூலகத்தின் இணைக்காரணி
Column	—	நிரல்

Column in a determinant	— ஓரணிக்கோவையின் திரம்
Column matrix	— ஓரணியின் திரம்
Column vector	— திரம் வெக்டர்
Commutative Law	— பரிமாற்று விதி
Complex number	— சிக்கல் எண்
Conditions	— நிபந்தனைகள்
Conditions necessary and sufficient	— வேண்டிய-பொதிய நிபந்தனைகள்
Congruence	— சரிவசமம்
Conjugate matrix	— இணை அணி
Converse	— மறுதலை
Coordinate System	— கூற்றுத் தொகுதி

D

Determinant	— அணிக்கோவை
Determinant constituent of a	— ஓர் அணிக்கோவையின் அங்கம்
Determinant element of a	— ஓர் அணிக்கோவையின் மூலகம்
Determinant of a matrix	— ஓர் அணியின் அணிக்கோவை
Diagonal	— மூலை விட்டம்
Diagonal of a determinant	— அணிக்கோவையின் மூலை விட்டம்
Diagonal of a matrix	— அணியின் மூலை விட்டம்
Dimension	— வகைமையடி
Directed	— திசை தொண்ட
Directed numbers	— திசையெண்கள்
Distributive Law	— பங்கிட்டுவிதி
Dot Product	— புள்ளிப் பெருக்கம்

E

Element	— மூலகம், உறுப்பு
Element of a determinant	— ஓர் அணிக்கோவையின் மூலகம்
Element of a matrix	— ஓர் அணியின் மூலகம்
Eliminant	— நீக்கற்பணை
Eliminate	— நீக்கு
Equation	— சமன்பாடு
Expand	— விரி

Expansion	— விரித்தல்
Expression	— கோவை
Expression homogenous	— ஒருபடித்தான கோவை
Expression linear	— ஒருபடிக் கோவை
Expression quadratic	— இருபடிக் கோவை

F

Factor	— காரணி
Fields (number)	— (எண்) களங்கள்
Function	— சார்பு, சார்புண்

I

Idem factor	— மாற்றுக்காரணி
Indeterminate	— தெரம்பெருத
Inner product	— உட்பெருக்கு
Invariant	— மாற்றமில்
Inverse	— நேர்மாறு

M

Matrix	— அணி
Matrix augmented	— பெரிதாக்கிய அணி
Matrix adjoint	— சேரிப்பு அணி
Matrix column	— நிரல் அணி
Matrix diagonal	— சம மூலை வரை அணி, மூலை விட்ட அணி
Matrix element of a	— ஒர் அணியின் மூலகம்
Matrix inverse	— நேரேதிர் அணி
Matrix non-singular	— பூச்சியமில் கோவை அணி
Matrix null	— முற்றும் பூச்சிய அணி
Matrix order of	— அணியின் தரம்
Matrix orthogonal	— செங்குத்தணி
Matrix regular	— குறுங்கணி
Matrix rank of	— அணி அளவை
Matrix row	— நிரை அணி
Matrix scalar	— மூலைவரை (அளவை) அணி
Matrix skew symmetric	— எதிர்ச்சி அணி
Matrix square	— சதுர அணி

Matrix symmetric	— சமச்சீர் அணி
Matrix transpose	— திருப்பு அணி : நிரை, நிரல் மாற்ற அணி
Matrix reciprocal	— நேரெதிர் அணி
Matrix unity	— அணி அலகு
Matrix zero	— பூச்சிய அணி
Minor of a determinant	— ஓர் அணிக்கோவையின் சித்பு பகுதி
Motion of rotation	— சுழற்சி இயக்கம்

N

Non-rival	— அற்பமல்லாத, நிரணமல்லாத
Notation	— குறியீடு
Null matrix	— மூற்றும் பூச்சிய அணி
Null vector	— பூச்சிய வெக்டர்
Number field	— எண் களம்

P

Position vector	— வெக்டர் நிலை
Principal diagonal of a determinant	— ஓர் அணிக்கோவையின் தலைவாய் மூலைவிட்டம்
Proof by Induction	— தொகுத்தறிமூலம் நிறுவல்

Q

Quotient	— வடி
----------	-------

R

Rank	— தரம், மதிப்பீட்டம்
Reduction	— குடுக்கம்
Resolution	— பிரிப்பு, உறுபாடு
Right handed screw convention	— வலக்கைத் திருகாணி வழக்கு
Rotating axis	— சுழல் அச்ச
Rows and columns	— நிரைகளும் நிரலும்

S

Scalar	— திசைமீட்டி, எண்ணி(அளவை)
Similar	— வடிவொத்த
Simultaneous equations	— ஒரேயேகை (ஒருங்கமை)ச் சமன்பாடுகள்
Solution	— தீர்வு
Solution general	— பொதுத் தீர்வு
Solution particular	— குறிப்பிட்ட தீர்வு
Statistics (as science)	— புள்ளியியல்
Suffix	— கீழ்க்குறி

T

Term	— உறுப்பு
------	-----------

U

Unit Matrix	— அணி அலகு
Unit Vector	— வெக்டர் அலகு
Upper triangular Matrix	— மேல் முக்கோண அணி

V

Variate	— மாறி
---------	--------

தமிழ்நாட்டும் பாடநூல் நிறுவனம்

சென்னை

1977 ஜனவரி வெளியிட்டுள்ள நூல்கள்

பொருளாதாரம்

*1. பொருளாதாரம்—I	...	சி. கோபாலபுதம்	...	ரூ. 50
*1-A " "	...	"	...	9 00
*2. சோனியத் பொருளாதார வளர்ச்சி	...	டாக்டர் எம். சி.ஜி. கே. தவராஜ்	...	4 25
*3. அமெரிக்கப் பொருளாதாரம்	...	"	...	4 50
*4. பொருளாதாரத் திட்டமிடல் வளமு	...	சோனைய்யம்	...	7 00
*5. பன்னாட்டு வணிகம்	...	மு. ஆரோக்கியசாமி	...	6 00
*6. பருமைப் பொருளாதாரக் கருவிகள்	...	திருமதி ஆர். தாமஸ்ராட்சி	...	12 00
*7. பொருளாதாரம்—ஓர் அறிமுகம்—I	...	தி. சி. மோகன்	...	12 00
*8. " "	...	எம். ஏ. அழகர்வாசுதேவன்	...	10 75
*9. பொருளாதாரக் கோட்பாடு வளர்ந்த வளமு	...	க. லக்ஷ்மியாள்	...	7 00
*10. பன்னாட்டில் பங்கிடுதல்—I	...	சி. கோபாலபுதம்	...	6 75
*11. " "	...	"	...	11 20
*12. தமிழ்நாட்டின் இயல்	...	க. வெற்றிவேல்	...	5 00
*13. இந்தியச் சொல்வனியில் பங்கு முறைகள்	...	சி. வி. பூதேவசன்	...	5 50
*14. அளவீடுகள் நிறுவனம்	...	ஆர். சேஷசுந்தரம்	...	4 75

*மூல தரம் (Original Book)

பொருளாதாரம்—(தொடர்ச்சி)

15. இந்தியப் பொருளியல்—I	...	எம். பாலகம்பீரமணியன்	...	10 00
16. " II	...	எம். ஜார்ஜ் நாதன்	...	4 25
17. நவநு பொருளாதாரப் பிரச்சினை—I	...	சி. சுந்தரராஜன்	...	10 75
18. " II	...	எஸ். குழந்தை நாதன்	...	10 50
19. இங்கிலாந்தில் பொருளாதார வரலாறு—I	...	கீ. சி. இராமசாமி	...	6 00
20. " II	...	"	...	6 00
21. அமெரிக்காவில் தனிய பொருளாதார வரலாறு—I	...	தி. சி. கோகன்	...	5 00
22. " II	...	சூ. க. சுப்பிரமணியன்	...	11 00
23. " III	...	பி. வி. ஸ்ரீநிவாசன்	...	6 00
24. " III	...	"	...	6 50
25. அரசாங்க நிதியியலின் பொருளாதாரம்—I	...	மா. குமாரசாமி	...	10 00
26. " II	...	அர். செஷாசாய்	...	9 50
27. இந்தியாவின் பொருளாதார வளர்ச்சி—I	...	தே. வேம்பன்	...	10 00
28. " II	...	ஜி. சிதம்பரம்	...	8 00
29. பணம்—சிறு வணக்கம்	...	கோ. இராமச்சந்திரன்	...	10 00
30. வணிக இயல்பின் தத்துவங்கள்	...	சூ. ஆளுடைய பிள்ளை	...	9 50
31. பத்தொன்பதாம் நூற்றாண்டில் கிரேட் பிரிட்டனில் தொழில்-வாணிகப் புரட்சி	...	இ. பி. கருப்பண்ணன்	...	11 00
32. பென் ஹாம் பொருளாதாரம்—I	...	ஏ. குழந்தை	...	11 00
33. " II	...	எஸ். குழந்தை நாதன்	...	7 00
34. வரவு செலவுத் திட்டம்	...	ஆர். எம். சந்திரன்	...	6 00

35.	பன்னாட்டுப் பொருளாதாரம்—I	...	...	7	50
36.	" " ஆய்வு நூல்—I	...	...	9	00
37.	பொருளாதார ஆய்வு நூல்—I	...	...	7	75
38.	" " II	...	...	7	00
39.	வளர்ச்சியுடைய நாடுகளின் அரசாங்க நிதியியல்	...	...	4	25
40.	வளர்ச்சியுடைய நாடுகளின் நாடுகளின் முதலாளிகள்	...	...	...	...
41.	பற்றிய சிக்கல்கள்	...	...	5	50
42.	1939 முதல் இந்தியாவின் பணவீக்க விலைப் போக்குகள்	...	...	7	50
43.	பொருளாதார வளர்ச்சியுடைய நாடுகளின்	...	...	7	75
44.	இந்தியப் பொருளாதார காலாறு (1837-1958)—I	...	...	7	00
45.	பொருளாதாரம்—ஓர் ஆறிழை	...	...	8	25

வரலாறு

*45.	மிகிட்டன் வரலாறு—I	...	...	4	50
*46.	" " II	...	...	3	50
*47.	" " III	...	...	7	25
*48.	ஐரோப்பிய வரலாறு—I (கி.பி. 525—1500)	...	...	3	75
*49.	" " II (கி.பி. 1500 முதல்)	...	...	5	50
50.	ஐரோப்பா—கடத்த ஐந்து நூற்றாண்டுகளில் சரித்திரம்	...	...	9	50
51.	இங்கிலாந்து வரலாறு—I	...	...	13	00
52.	" " II	...	...	13	00
53.	" " III	...	...	8	00

*மூல நூல் (Original Book)

வரலாறு—(தொடர்ச்சி)

54.	இக்கியாத்த வரலாறு—IV	...	எஸ். ஜே. இராஜகோபால்	8 00
55.	இக்கியாத்தின் வரலாறு—I	...	க. த. திருநாவுக்கரசு	15 00
56.	" II	...	எம். எக்ஸ். பிராண்டர்	8 00
57.	" III	...	"	8 00
58.	இக்கியாத்தின் சிறப்பு வரலாறு—I	...	தி. வெ. குப்புசாமி	7 50
59.	" II	...	ஏ. உ. கல்யாண் செகரீப்	6 00
60.	" III	...	சி. பாண்டிரங்கன்	7 25
61.	கிறித்த நடைஞ் வரலாறு—I	...	சைமன் இ. எஸ். பாக்ஸ்டுரூதன்	7 50
62.	" II	...	"	7 00
63.	" III	...	மீ. இராஜமதுரன் சேதவதாஸ்	7 75
64.	ஆக்சுஃப்ரோர்டின் இத்திய வரலாறு—I	...	தி. வெ. குப்புசாமி	8 25
65.	" II	...	ஏ. உ. கல்யாண் செகரீப்	7 50
66.	" III	...	க. த. திருநாவுக்கரசு	10 50
67.	முஹம்மட் பேரரசு—I	...	ஏ. உ. கல்யாண் செகரீப்,	
		...	எம். எக்ஸ். பிராண்டர்	7 50
68.	" II	...	எம். எக்ஸ். பிராண்டர்,	
		...	பா. மாணிக்கவேலு	7 75
69.	ஆக்கியை ஆரம்பிப்பவர்கள் வரலாறு—I	...	வை. விருத்தகிரீசன்	7 50
70.	" II	...	வை. விருத்தகிரீசன்,	
		...	இரா. அன்ட்ரூஸிய	6 75
71.	" III	...	இரா. அன்ட்ரூஸிய,	
		...	பா. மாணிக்கவேலு	6 50
72.	" IV	...	பா. மாணிக்கவேலு	7 00

73. ஆங்கிலேயரின் சமுதாய வரலாறு—I	...	சி. க. இராமச்சத்திரன்	...	8	50
74. "	II	சி. க. இராமச்சத்திரன்	...	—	—
75. "	III	இர. ஆவாலகத்தரம்	...	6	75
76. இந்தியாவின் மூலமாயரின் ஆட்சி—I	...	ஆர். ஆவாலகத்தரம்	...	8	50
77. "	II	பா. மானிக்கசேவரன்	...	3	00
ஆசியக்		ஏ. உதயமன் வெகரீப்	...	6	00
78. ஆசியக் அமைப்புகள்			...	4	62
79. அரசாங்கத்தின் வரலாறு		ஜெ. இராமச்சத்திரன்	...	7	50
80. இந்திய அரசியலமைப்பு		மேச. கிளார்க், டி. டி. பென்கீன்	...	4	75
81. அரசியலுக்கு முன் அறிமுகம்		லீ. கன்லேயர்	...	8	50
82. தற்கால அரசியல் அமைப்புகள்		டி. செல்லியர்	...	8	50
83. பன்னாட்டு அரசியல்—I		மேச. வர்னாண்ட் கிளார்க்	...	16	00
84. "	II	திருமதி நரசிம்மசுந்தரம் பாண்டி	...	13	25
85. பொதுத்துறை ஆட்சி இயல்—I		"	...	9	00
86. "	II	லீ. கன்லேயர்	...	7	25
87. பொதுத்துறை ஆட்சியியலுக்கு முன் அறிமுகம்—I		அ. ஜெகதீசன்	...	7	50
88. "	II	லீ. கன்லேயர்	...	7	50
89. இந்திய அரசியலமைப்புத் திட்டம்		டி. செல்லியர்	...	7	50
		நி. வெ. குப்புசாமி,	...	9	25
		எஸ். சுப்பிரமணியன்	...	6	25
90. இந்திய ஆட்சி அமைப்புமுறை வளர்ச்சி—I		லீ. கன்லேயர்	...	5	75
91. "	II	லீ. கன்லேயர், டி. ர. அனுமந்தன்	...	—	—

*மூல நகல் (Original Book)

அரசியல்—(தொடர்ச்சி)

ஆ. எண்.	விவரம்	பிர. எண்.	பிர. எண்.
93.	இந்திய ஆட்சி அமைப்புமுறை வளர்ச்சி—III	...	7 55
*93.	மக்கள் ஆட்சி	...	4 25
94.	1919 முதல் சர்வதேச உறவுகளும் உலக அரசியலும்—I...	...	7 75
95.	சமூக, அரசியல் கொள்கைகள் அடிப்படைகள் ...	...	7 00
96.	அரசியலமைப்புச் சட்ட ஆய்வுக்கு ஒர் அறிமுகம்—I...	...	5 75
97.	" II...	...	6 00
98.	" III...	...	5 75

உள்ளியல்

99.	குழந்தை உள்ளியல்—I	...	8 00
100.	" II	...	7 00
101.	உட்கவர் மனம்	...	7 00
102.	இயல்பு உட்கவர் மனம்—I	...	12 00
103.	" II	...	9 00
104.	சமூக உள்ளியல்	...	9 25
105.	பிறப்பியல் உள்ளியல்	...	11 00
106.	பித்தரின் உள்ளம்	...	3 00
*107.	குழை உள்ளம்	...	6 25
*108.	உளநலனியல்	...	6 00

நத்துவம்

109. இத்து சமவத் தத்துவம்
 110. அந்நி ஆராய்ச்சி இயல்
 111. பெரியதாட்டுத் தத்துவம்
 112. அத்தவிக் தத்துவம்
 113. ஆக்கியோவப் பவன்கவிக் கொன்னகவிக்
 114. இத்தியத் தத்துவம்—
 —II
 115. பெயற்பெளனியல்—ஒர் அந்நிமுகம்—I
 116. பெயற்பெளனியல்—ஒர் அந்நிமுகம்—I

அந்நியம்

117. அந்நியம்—ஒர் அந்நிமுகம்

அனையியல்

118. அனையியல்—இதாட்க துல்

மாளியல்

119. மாளியல்
 120. பண்டாட்டுக் கொணிகள்
 121. இத்தியலிக் குடியானவர் வாழ்க்கை

சமூகியல்

122. சமூகியலிக் அடிப்படைக் கோட்பாடுகள்
 மூல துக் (Original Book)

- ... மூ. ராஜாபகதூர்
 ... ஆர். ராமராமுலாச்சாரி
 ... ஆர். எஸ். தேவிகர்
 ... கோ. கோ. காத்தி
 ... கோ. வல்லுவன் கிளார்க்
 ... வ. ஆ. தேவபிரகாசு
 ... ம. தா. சண்முகசுந்தரம்
 ... சி. இராமலிங்கம்

- ... கோ. கோ. காத்தி

- ... கி. ர. அப்பள்ளாச்சாரி

- ... ம. க. கோபாலகிருஷ்ணன்
 ... கி. பி. சுப்பிரமணியன்
 ... என். இலட்சுமி

- ... ஜெ. தாராவணன்

புலிவீயல்	புலிவீயல்	புலிவீயல்	புலிவீயல்
*123. ஆசியா—I	கொ. செஷ. நரசிம்மன்	...	9 50
*124. " II	"	...	8 75
*125. இரோமியக் கண்டத்தின்புலிவீயல்	ஏ. எம். நாராயணன்	...	8 50
*126. தென்கிழக்கு ஆசியா	ஜி. சி. குஷ்ணமூர்த்தி	...	8 50
*127. வட ஆமெரிக்கா	குமாரி இராச. அலெக்சா	...	6 50
*128. தென் ஆமெரிக்கா	எம். எம். பந்தாபன்	...	9 00
*129. தென் கண்டம்—ஆஸ்திரேலியா	திருமதி எம். நிபுன்	...	3 00
*130. " —ஆப்பிரிக்கா	எம். முத்துக்கிஷ்ணக் கணபாயன்	...	3 25
*131. டுமிபுலிவீயல்—II	நா. அனந்தபத்திரன்	...	6 00
*132. செஷ்ஷைப் புலிவீயல்	க. வெங்கடசுந்தரன்	...	5 50
*133. மகிஷபுலிவீயல்	கி. எம். அனந்தபத்திரன்	...	4 75
*134. சமுத்திரவீயல்	கொ. இராமசாமி	...	6 50
135. காலநில இயல்—I	கொ. செஷ. நரசிம்மன்	...	10 00
136. " II	"	...	5 00
*137. காலநில இயல்—I	திருமதி இராதா	...	9 50
*138. " II	"	...	8 00
139. வடமேயுக்கு ஓர் ஆற்றியல்	கொ. இராமசாமி	...	5 50
*140. புலி அமைப்பு இயல்	சி. வி. க. வந்தன்	...	4 75
141. பொதுப் புலிவீயல்	கொ. இராமசாமி	...	6 00
142. சிவகாமியன் வானியல் புலிவீயல்—I	எம். மானிக்கம்	...	9 50
143. " II	ம. கார் தி. கேவன்	...	12 00
144. " III	கொ. செஷ. நரசிம்மன்	...	5 75

புத்திரியை

- *145. புத்திரியை—அறிஞர்
146. புத்திரியை—முறைகள்—1
147. II
148. தம்பையர் சுந்திரியைப் பேரண்டம்

உயர் கவிதை

- *149. அயர்ந்தொய் வடிவகவிதை
*150. வகை நுண் கவிதை
*151. தொலை நுண் கவிதை

வினாக்கள்

- *152. வினாக்கள்

பெயர்க்கவிதை

153. ஒளி நூல்

விஞ்ஞானம்

- *154. வானவெளி வெற்றி
*155. தொழில்
*156. எகல்-கதிர்கள்
*157. பாய்வுகள்
*158. தாவுகள்—வாய்வுகள் வானநூல்
*159. கழிப்பு
*160. தாவரங்களின் வளர்ச்சி

*மூல நூல் (Original Book)

...	சு. வைத்தியநாதன்	...	10	75
...	கோ. சண்முகத்தேவர்	...	10	00
...	கோ. ஆர். இராஜகோபாலன்	...	14	00
...	தி. வி. வடிகாந்திரசுந்தரன்	...	6	50
...	...	...	...	...
...	ஆ. கோ. மணிக்கவாசகம் மீட்டர்	...	4	25
...	...	...	3	00
...	தி. கோவிந்தராசன்	...	3	25
...	...	...	...	...
...	பெ. மச. அன் லுயர், இரா. முருகேசன்	...	12	00
...	...	...	10	00
...	...	...	...	...
...	பாக்கர் எம். ஏ. தங்கராஜ்	...	5	00
...	பாக்கர் பி. திருஞானசம்பந்தம்	...	4	75
...	பெ. நா. அப்பாமி. ரீஜ. பி. மணிக்கம்	...	4	50
...	பெ. மச. அன் லுயர்	...	3	50
...	பாக்கர் கு. சீனிவாசன்	...	8	00
...	பாக்கர் கு. பெரியசாமி	...	4	00
...	எல். சுந்தரம்	...	6	50

மருத்துவம்

*161. திரிழிவு—கலையிரோகம்	...	டாக்டர் ஜி. வெங்கடசாமி, டாக்டர் ஏ. சுதீரேசன்	...	2 50
162. மகப்பேறும் மாதசீதேசவும்	...	டாக்டர் (முனாசி) ந. மணிராமசாமி	...	2 25
*163. பாகவசியா	...	சு. சுந்தரம்	...	2 50
164. புற்றுநோய்	...	ஆ. சுதீரேசன்	...	2 50
165. உடலியக்கியை—1	...	டாக்டர்கள் ஜி. வெங்கடசாமி, டி. சிரோஜினி, என். கே. துரைராஜி, ஆர். ரெது	...	6 75
166. " II	...	"	...	5 50
167. எலிபுருக்கி நோய்	...	டாக்டர் ஆ. சுதீரேசன்	...	7 25
மேற்கியை				
168. திவனே உங்கள் விட்டைக் கட்டலாம்	...	கே. வி. கிருஷ்ணராஜ், சி. ஆர். சுப்பிரமணியம், ஆர். இராமசாமி, கே. வேணுகேசபாபு	...	8 50
கட்டுநாவு				
169. உலகக் கட்டுநாவு இயக்கம்	...	ஆ. வெங்கடசாமி	...	5 50
சட்டம்				
*170. குற்றமில்லாத சட்டம்	...	எம். சண்முகசுப்பிரமணியம்	...	10 00
மேற்கு நூல்கள்				
171. மலாதினா காதல்	...	சாஸ்வதி தங்கையன்	...	3 25
172. விவசாயப் புரட்சி	...	வி. சரத்தாசேகர்	...	8 00
173. மெல்க் மை-தூல்	...	ஆ. சுப்பிரமணியம்	...	2 50
*174. முந்நாந்த கோழி கலையும் சிற்பமும்	...	எஸ். ஆர். பாலசுப்பிரமணியம்	...	9 00

*175. உணவும் ஊட்டமும்	...	தி. வேங்கடகிருஷ்ண அகியங்கர்	...	4	50
*176. பன்னி திருவாக அமைப்பு—அடிப்படைக் கருத்துகள்	...	எஸ். சத்தானம், எம். ஏ. துரைசிங்	...	6	25
புதுமுக (P. U. C.) வகுப்புக்களுக்கூரியவை					
*177. உலக வரலாறு	...	டி. ஆர். இராமச்சந்திரன்	...	4	00
*178. பொருளாதாரம்	...	ஜி. சிதம்பரம்	...	2	75
*179. வணிகவியலுக்கு ஓர் அறிமுகம்—I	...	கு. ஆனாடையரின்ரா	...	2	50
*180. "	...	"	...	2	25
*181. பொளதீகம்	...	டாக்டர் பி. திருநாண சம்பந்தம்,	...		
	...	ஆர். தாகராஜன்	...	6	00
*182. புதுமுக பொளதீகம்	...	டாக்டர் எம். ஏ. தங்கராஜ்	...	5	75
*183. பொளதீகம்—ஓர் அறிமுகம்	...	எஸ். சம்பத்	...	7	00
*184. புதுமுக வகுப்புக்கான அறிமுகம்—I	...	கே. இராஜகோபாலன்	...	7	00
*185. "	...	"	...	8	00
*186. புதுமுக வகுப்புக்கான அறிமுகம்—II	...	டி. கோபிந்தராஜன், முத்துசாமி	...	7	00
*187. "	...	"	...	4	50
*188. அறிமுகம்—ஓர் அறிமுகம்—I	...	ஆர். மனோதேவன்	...	4	75
*189. "	...	"	...	3	25
*190. வேதியியல்	...	பி. டி. முனிவரம்பா, ஆர். முத்துசுலட்சுமி	...	7	00
*191. புதுமுக வேதியியல்	...	சி. ஏ. பதிமதாசன்	...	5	50
*192. விலங்கியல்	...	எஸ். ஆப்ரகாம்	...	4	00
*193. புதுமுக விலங்கியல்	...	பெ. மா. அண்ணாமலை	...	7	25
*194. புதுமுக வகுப்புத் தாவரவியல்	...	எஸ். சுந்தரம்	...	4	00

*மூல நூல் (Original Book).

பட்டப்படிப்பிற்குரிய (பி.எஸ்.ஸி.) நூல்கள்
(அடக்க விலைப் பதிப்புடன்-உழிவு இல்லை)

பெளதிகம்		ஆசிர. தகவல்கள்	ரூ- காசு
ச195.	எத்திரவியல்—சிற்றப்புப் பாடம் (Book I)	...	6 25
ச196.	"	...	3 50
ச197.	வெப்பவியல்—சிற்றப்புப் பாடம்	...	5 25
ச198.	சொல்முறை பெளதிகம்—சிற்றப்புப் பாடம் (Book I)	...	4 50
ச199.	"	...	8 25
ச200.	பெளதிகம்—தூண்பாடம்-I (Book I)	...	8 50
ச201.	"	...	3 00
ச202.	சொல்முறை பெளதிகம்—தூண்பாடம்	...	4 50
ச203.	மிக்னியல் காந்தவியல்—சிற்றப்புப் பாடம்—I	...	4 75
ச204.	"	...	4 50
ச205.	"	...	4 25
ச206.	ஒளியியல்—சிற்றப்புப் பாடம்	...	7 75
ச207.	பெளதிகம்—தூண்பாடம் (பகுதி 2) (முதல் புத்தகம்)	...	6 00
ச208.	பெளதிகம்—தூண்பாடம் (பகுதி 2) (இரண்டாம் புத்தகம்)	...	4 50
ச209.	பொது பெளதிகம்—சிற்றப்புப் பாடம்	...	4 50

*210.	இம்முறை வெளியிடல்—சிறப்புப் பாடம்	...	எம். ஏ. தங்கராஜ்	...	6	75
*211.	ஒளி தூய்—சிறப்புப் பாடம்	...	டி. முருகையன்	...	5	00
வேதியியல்						
*212.	செய்முறை கனிம வேதியியல்—குணைப்பாடம்	...	டாக்டர் என். முத்துக்குமாரசுவாமி	...	2	00
*213.	செய்முறை கனிம வேதியியல்—சிறப்புப் பாடம்...	...	டி. இராமலிங்கம்	...	2	25
*214.	பொனதிக வேதியியல்— சிறப்புப் பாடம் (Book I)	...	டி. சக்திவேலு	...	4	00
*215.	" "	II	"	...	3	50
*216.	கனிம வேதியியல்—குணைப்பாடம்	...	சி. ஏ. பத்மநாயகன்	...	6	00
*217.	கனிம வேதியியல்— சிறப்புப் பாடம் (Book I)	...	டி. ஏ. முனியாண்ட	...	4	00
*218.	" "	II	"	...	4	25
*219.	பொது பொனதிக வேதியியல்—குணைப்பாடம்	...	ஆர். தளசிதாஸ்	...	4	75
*220.	அறிமுகமுறை வேதியியல்—சிறப்புப் பாடம்—I	...	டி. ஆர். குழியநாயகசுண்டன்	...	4	50
*221.	" "	II	"	...	3	75
*222.	செய்முறை கனிம வேதியியல்—சிறப்புப் பாடம்	...	என். ஆறுமுகம்	...	3	50
*223.	அங்கக வேதியியல்—குணைப்பாடம்	...	சுமில். இராமசாமி	...	5	00
*224.	அங்கக வேதியியல்—I	...	எம். ஆப்கொண்டான்	...	3	00
*225.	கனிம வேதியியல்—பகுதி-I (2-ஆம் பத்தகம்)	...	கி. கண்ணப்பிரான்	...	4	75
*226.	" "	(3-ஆம் பத்தகம்)	"	...	3	25
*227.	கனிம வேதியியல்—பகுதி-II (1-ஆம் பத்தகம்)	...	"	...	5	75
*228.	" "	(2-ஆம் பத்தகம்)	"	...	6	00

*மு.க தூய் (Original Book)

கணிதம்

#229.	இயற்கணிதம்—சிதம்பர் பாடம் (Book I)	...	பு. கோவிந்தராஜன், கே. முத்துசாமி	...	4 25
#230.	"	—	"	...	3 25
#231.	தொகுமுறை வரை கணிதம்—சிதம்பர் பாடம்	...	ஆர். மகாதேவன்	...	2 00
#232.	எண்சார் கணிதம்—சிதம்பர் பாடம்	...	எம். எம். இராமசாமி	...	5 50
#233.	திரிவேண கணிதம்—சிதம்பர் பாடம்	...	வி. அரங்கநாதன்	...	3 25
#234.	கணிதம்—துணைப் பாடம்	...	ஆர். அனுமந்தராவ்	...	6 00
#235.	திரிவேணம்—சிதம்பர் பாடம்	...	கே. இராஜகோபாலன்	...	5 00
#236.	முப்பரிமாணப் பகுமுறை வடிவ கணிதம் —சிதம்பர் பாடம்...	...	கே. சிவசுப்பிரமணியன்	...	2 75
#237.	வெக்டர் கணிதம் ஆதம் பவன்பாடுகளுள் —சிதம்பர் பாடம்...	...	ஆர். மகாதேவன்	...	2 00
#238.	கணிதம்-துணைப் பாடம்-பகுதி-2	...	ஆர். அப்பாசாமி	...	5 75
#239.	வானியல்—சிதம்பர் பாடம்—முதல் புத்தகம்	...	தி. கோவிந்தராசன், கே. முத்துசாமி	...	5 50
#240.	"	...	"	...	3 75
#241.	இயக்கவியல்—சிதம்பர் பாடம்	...	ஆர். மகாதேவன், கே. சிவசுப்பிரமணியன்	...	7 00

புள்ளிவியல் (Statistics)

#242.	புள்ளிவியல்—துணைப் பாடம்	...	எம். அருண்மொழி	...	3 50
-------	--------------------------	-----	----------------	-----	------

வினாக்கள்

*242. மதுகொழும்புத்தலை - I சிறப்புப் பாடம்	...	ஆர். முருகேசன்	6 00
*244. " II - சிறப்புப் பாடம்	...	திருமதி எஸ். கே. வள்ளி	6 00
*245. மதுகொழும்புத்தலை - I - சிறப்புப் பாடம்	...	...	...
*246. " II (Book I)	...	திருமதி ராணி சுந்தராணி	5 00
*247. " II (Book II)	...	"	9 75
*248. மதுகொழும்புத்தலை - II - சிறப்புப் பாடம்	...	திருமதி கிருஷ்ணவேணி தாராவணம்	5 75
*249. மதுகொழும்புத்தலை - குணைப் பாடம்	...	எஸ். ஆப்ரகாம்	9 00
*250. மதுகொழும்புத்தலை - குணைப் பாடம்	...	என். இராமலிங்கம்	9 00
*251. செல்வியல் - சிறப்புப் பாடம்	...	எம். ஜே. ஜே.	6 00
*252. மரணியல் - சிறப்புப் பாடம்	...	என். இராமலிங்கம்	5 50
*253. குழந்தைவியல் - உடற்கொள்கை	...	பெ. மா. அண்ணாமலை	5 25
*254. குழந்தைவியல் - உடற்கொள்கை - I	...	டி. ஆர். கிருஷ்ணன்	4 75
*255. பரிணாமம்	...	"	6 50
	...	எஸ். ஆப்ரகாம்	6 25

தாவணியல்

*256. தாவர வேளி உன்னையப்பியல்-அணுப் வணைப்பாட்டியல்-சிறப்புப் பாடம்	...	கே. இராஜசேகரன்	11 00
*257. தாவரப் பற அணுப்பியல் - சிறப்புப் பாடம்	...	கே. பாலசுந்தரனாரை	9 25
*258. தாவர உன்னையப்பியல் - சிறப்புப் பாடம்	...	டாக்டர் ஏ. வெளித்தாராஜா	7 25

*New Book (Original Book)

தாயகவிலை—(தொடர்ச்சி)

*259.	தாலுக்காவின் வரலாறு—சிதம்பர் பாடம்	...	எஸ். சுந்தரம்	...	9 50
*260.	தாலுக்காவில்—தூண்டு பாடம்	...	பா. இராசசுரம்	...	4 50
*261.	தாலுக்காவில்—தூண்டு பாடம், உத்தரகாசி	...	கே. பெரியசாமி	...	4 00
*262.	தூண்டுக்காவில், பரிந்துரை, வரலாறு—	...	கே. ஆர். பாலசுந்தரனார்	...	8 25
*263.	தூண்டுக்காவில், தூண்டுக்காவில்—	...	கே. இராசசுரம்	...	10 25
*264.	தாலுக்காவில் (பாலுக்காவில் தூண்டுக்காவில்)	...	டாக்டர் எம். கே. சுந்தரனார்	...	9 00
*265.	தாலுக்காவில்—தூண்டுக்காவில்	...	ஆ. சம்பந்தம்	...	10 50
*266.	தாலுக்காவில்—தூண்டுக்காவில்	...	கே. இராசசுரம்	...	6 00

*Original Book