

வா னி ய ல்

(முதல் புத்தகம்)

(பட்டர்படிப்புக்குரிய சிறப்புப் பாடம்)

திரு. தி. கோவிந்தராசன்

திரு. கொ. முத்துசாமி

கல்லூரி நூல் வெளியீட்டு இயக்குநரகம்

தமிழ்நாட்டுப் பாடநூல் நிறுவனம்

வா னி ய ல்

(முதல் புத்தகம்)

(பட்டப்படிப்புக்குரிய சிறப்புப் பாடம்)

ஆசிரியர்கள்

திரு. தி. கோவிந்தராசன்,
பேராசிரியர், கணிதத்துறை,
அரசினர் கல்லூரி, சேலம்.

திரு. கொ. முத்துசாமி,
உதவிப் பேராசிரியர், கணிதத்துறை,
அரசினர் கல்லூரி, சேலம்.

கல்லூரி நூல் வெளியீட்டு இயக்குநரகம்

தமிழ்நாட்டுப் பாடநூல் திருவனம்

First Edition—January, 1971

D.C.P. No. 255

© Directorate of Collegiate Publications

ASTRONOMY—MAJOR (BOOK I)

T. GOVINDARAJAN

K. MUTHUSWAMY

Net Price Rs. 5-50

(No discount)

Printed by

Muthukumaran Press,

14-A, Kuppler Street,

Madras-1.

அணரித்துரை

(திரு. இரா. நெடுஞ்செழியன், தமிழகக் கல்வி-கலாநாய அமைச்சர்)

தமிழகக் கல்லூரிக் கல்வி மொழியாக ஆங்கிலப் பத்து ஆண்டுகள் ஆகியிட்டன. குறிப்பிட்ட சில கல்லூரிகளில் கெ.ர. வகுப்பு மாணவர்கள் தங்கள் பாடங்கள் அனைத்தையும் தமிழிலேயே கற்று வந்தனர். 1968ஆம் ஆண்டின் தொடக்கத்தில் புதுமுக வகுப்பிலும் (P.U.C.), 1968ஆம் ஆண்டிலிருந்து பட்டப் படிப்பு வகுப்புகளிலும் விஞ்ஞானப் பாடங்களையும் தமிழிலேயே கற்பிக்க ஏற்பாடு செய்துள்ளோம். 'தமிழிலேயே கற்பிப்போம்' என முன்வந்துள்ள கல்லூரி ஆசிரியர்களின் ஊக்கம், சிறு பல துறைகளிலும் தொண்டு செய்வோர் இதற்கெனத் தந்த உதவியும், தங்கள் சிறப்புத் துறைகளில் தங்கள் எழுதித் தர முன்வந்த ஞானாசிரியர்கள் தொண்டுணர்ச்சி இவற்றின் வரணமாக இத் திட்டம் தம்மிடையே மகிழ்ச்சியும் மனநிறைவும் தரத்தக்க வகையில் நடைபெற்று வருகிறது. இவ்வகையில், கல்லூரிப் பேராசிரியர்கள் கலை, அறிவியல் பாடங்களை மாணவர்களுக்குத் தமிழிலேயே படித்துவிடப்பதற்குத் தேவையான படிநிலையைப் பெறுவதற்கு உதவரைப் பக்கலைக் கழகம் ஆண்டுதோறும் எடுத்துவரும் பெருமூலத்தினைக் குறிப்பிட்டுச் சொல்லவேண்டும்.

பல துறைகளில் பணிபுரியும் பேராசிரியர்கள் எத்தனையோ நெருக்கடிகளுக்கிடையே குறுகிய காலத்தில் அரிய முறையில் தங்கள் எழுதித் தந்துள்ளனர்.

வரலாறு, அரசியல், உளவியல், பொருளாதாரம், தத்துவம், புள்ளியியல், கணிதம், பொருளியல், வேதியியல், உயிரியல், வானியல், புள்ளியியல் ஆகிய எல்லாத் துறைகளிலும் தனி துல்கள், மொழி பெயர்ப்பு துல்கள் என்ற இரு வகையிலும் தமிழ்தாட்டுப் பாடநூல் நிறுவனத்தின் கல்லூரி துல் வெளியிட்டு இயக்குநரகம் துல்களை வெளியிட்டு வருகிறது.

இவற்றுள் ஒன்றான 'வானியல்-I' என்ற இத்துல் தமிழ்தாட்டுப் பாடநூல் நிறுவனம் - கல்லூரி துல் வெளியிட்டு இயக்குநரகத்தின் 255 ஆவது வெளியிடாலும். இதுவரை 290 துல்கள் வெளியத் துள்ளன.

உதழப்பின் வாரா உதழிகள் இக்கலை; ஆதலின், உதழ்த்து வெற்றி காண்போம். தமிழகப் படுதும் மாணவர்கள் உலக மாணவர்களிடையே சிறத்த இடம் பெறவேண்டும்; அதுவே தமிழ்நிலையின் குறிக்கோலுமாகும். தமிழ்தாட்டுப் பக்கலைக் கழகங்களின் பலவகை உதவிகளுக்கும் ஒத்துதழப்புகும் தம் மனம் கலத்த தன்றி உடரித்தாகுக.

இரா. நெடுஞ்செழியன்

பொருளடக்கம்

	பக்கம்
மேற்றுரை	1
1. கோளம் (The Sphere)	6
2. மண்ணுலகம் (The Earth)	26
3. வானககோளம் (The Celestial Sphere)	44
4. மண்ணுலக நகரா இயக்கம்—வானப்பொருள்கள் உதயம், மறைவு—செறிந்த செறிதல் (Diurnal Motion of the Earth—The Rising and Setting of Celestial Bodies—Related facts)...	59
5. மண்ணுலக மண்டலங்கள் — பகல் இரவுப் பொழுதுகள் (The Zones of the Earth—Day and Night durations)	119
6. வான ஒளிக்கதிர்க் கோட்டம் (Astronomical Refraction)	162
7. புவிமையாத் கோற்றப் பிழை (Geocentric Parallax)	198
8. வானவருக் கருவிகள் (Astronomical Instruments)	206
9. மண்ணுலகில் குதிப்பிட்ட ஓர் இடத்தின் அகலங்கு காணல் (Finding the Latitude of a Place on the Earth)	234
10. கதிரவன் பாதை குறித்தல் (Fixing the Ecliptic)	256
11. சந்திரன் (The Moon)	284
12. A. கோளச் சீர்திகள் (Kepler's Laws)	313
B. காலக்குறைந்ததைச் சமன்பாடு (Equation of Time)	337
C. காலக் கணிப்பு முறை—பஞ்சாங்கம் (The Calendar)	362

வா னி ய ல்

(முதல் புத்தகம்)

தோற்றுவாய்

I. வானியல்

1. விண்வெளிப் பொருள்கள்பற்றிய அறிவியற் பகுதி, வானியலாகும்.

2. மண்ணுலகில் வாழும் மனிதன், தொன்றுதொட்டு நன்னீர் சுற்றியிருக்கும் விண் மண்டலத்தில் காட்சியளிக்கும் பொருள்களைப் பற்றி அறிவுப் பேரார்வம் காட்டியதும், இன்னும் காட்டி வருவதும் மனித இயல்பு. எனவே, வானியல் மிகத் தொன்மை வாய்ந்ததோர் அறிவியற் பகுதியாகும்.

3. பண்டைக் காலத்தில் வானியலும் சோதிடமும் ஒன்றுக் கொன்று இணையியது பின்னிக்கொண்டு வளர்த்தகலாகலாகும். [அய்வாரே வேதியியலும் (Chemistry), இரசவாதமும் (Alchemy)] வானியல் ஆற்றல்கள் சிறந்த சோதிடங்களாகவும், சோதிட வல்லுநர்கள் வானியல் மேதைகளாகவும் பல்வேறு நாடுகளில் இயங்கி வந்தனர்.

4. கி. மு. 5000 ஆண்டுகளுக்கு முன்பே, சீனா, இந்தியா, எகிப்து, பாபிலோனியா, கிரீஸ் (Greece), தென் அமெரிக்கா போன்ற உலகின் பல்வேறு பகுதிகளில் வாழ்ந்த மக்கள் வானியலிலும் சோதிடத்திலும் ஆர்வம் காட்டி வந்தனரென்பதற்கு வரலாற்றுச் சான்றுகள் பல இன்னும் கிடைத்தவண்ணமிருக்கின்றன. கத்திரவன், சந்திரன் கிரகணங்களின் (மறைவுகளின்) துட்பய்களைச் செய்வனே அறிந்து, அவை நிகழக்கூடிய காலங்களை துட்பய் தவறாது முன்கூட்டியே கணக்கிட்டுக் கூறும் அறிவாற்றல் முன் கூறிய நாட்டு மக்களிடையே பரவியிருந்தது. பாபிலோனியாவில், சாஸ்டியா (Chaldean) நாட்டினர் வகுத்த 'சாராஸ்' (The Saros of the Chaldeans) என்ற கால வட்டத்தில் இன்னும் சூரிய, சந்திரன் கிரகணங்கள் முறை நிறழாது நேர்வது, 'சிறிய ஆரியா' (Aster

Minor) நாட்டு வானியல் அறிவாற்றலுக்கு எடுத்துக்காட்டு. இந்தியாவிலும், கிரகணங்களை முன்கூட்டியே 'சோதிடம்' சொல்லக்கூடிய வானியல் அறிவு வளர்ந்திருந்தது. சீன நாட்டில் காணப்படும் வானியல் காட்சிக் கூடங்களின் பரமானந்த சின்னங்கள், அத்தாட்டிகளின் வானியல் அறிவுக்கு வரலாறு தரும் சான்றாகும். நென் அமெரிக்காவின் பழங்குடி மக்களான 'மாயர்கன்' (Mayas), 'இங்குகன்' (Incas) நாகரிகம் இருந்த இடம் தெரிவாயல் அழிக்கப்பட்டு, பல நூற்றாண்டுகளுக்குப் பின், நடந்த புதைபொருள் ஆராய்ச்சியின் விளைவாக, மாய, இங்க நாகரிகங்களில் வானியல் அறிவு வளர்ச்சி சிறந்த இடம் பெற்றிருந்த தென மங்குத் தெரிவவகுகிறது.

5 வடமொழிப் பண்டைய நூல்களில் தகவுத்திரம் (star-மீன்), கிரகம் (planet-கோள்), இராசு, கேது (Moon's Nodes-சந்திர கணுக்கள்), தாமகேது (Comet-வால் மீன்மீன்) போன்ற சொற்கள் பரவலாக ஆளப்பட்டு வந்திருக்கின்றன. தொன்மை வாய்ந்த தமிழ் நூல்கள்,

"செஞ்ஞாமிற்றுச் செலவும், அஞ்ஞாமிற்றுப்
பரிப்பும், பரிப்புச் சூழ்ந்த மண்டலமும்,
வளிதிர்தரு திசையும்,
வந்தி நிறுதிய காயலும் என்றிவை
சென்றனத்தறித்தோர் போல என்றும்
இளைத்தென்போரும் உளரே "

என்னும் வரிகள் தோன்றவது காண்க. மேலும் கதிரவன் கதற-கள் (sunspots) தகடும் கால வட்டங்கள் பற்றியும், கதிரவன் ஒளி வெப்ப அலை பரவுதல் (solar radiation) பற்றியும் சீனர், பல நூற்றாண்டுகளுக்கு முன்னர் அறித்திருந்தனர் என சீன நாகரிக வரலாறு நமக்குத் தெரிவிக்கிறது.

6. ஆனால், இன்று நிலவும் கணித, பொருளியல் வேதியியல் விஞ்ஞான முறைப்படி, அன்று வானியல் அறிவு இருந்தது என்று கூறுவது இயலாது. அன்று வானியல் பெரும்பாலும் காட்சிக் குறுத்திய படியும், அனுபவ முறைப்படியும் (Observational and Empirical) வளர்ந்தது.

7. பார்போனியா, சாக்டியா, எகிப்து, இந்தியா ஆகிய நாடுகளிலிருந்து வானியல் அறிவு, கிரேக்கர்களுக்கு ஏற்றுமதியாகிற்று என்று கூறுவது தவறாகாது. ஆனால் கிரேக்க அறிஞர்களும், தத்துவஞானிகளும், தாம் பெற்ற வானியல் அறிவுக்கு விஞ்ஞான

அடிப்படையிலே தந்து ஆக்கமளித்தனர். வடிக் கணித மேதைகள், யூக்ளிடிட் (Euclid), மெனேக்கமஸ் (Menaechnus), அப்போலோனியஸ் (Apollonius) வாழ்ந்த காலம் அது.

8. கிரேக்க அறிஞர் அரிஸ்டார்ச்சஸ் (Aristarchus) நாம் முதல் முதலாக, மண்ணுலகைக் கதிரவனைச் சுற்றி வருகிறது என்ற 'கதிரவன் மையக்' கொள்கையை (Heliocentric Hypothesis) வகுத்தவர். ஆனால் அப்போது அவர் கூற்று எடுபடவில்லை. அறிஞர் தாலமி (Ptolemy) அன்று வகுத்த 'மண்ணுலகை மையக் கொள்கை, கதிரவன் மண்ணுலகைச் சுற்றி வருகிறது' என்ற 'மண்ணுலகை மையக்' கொள்கையே (Geocentric Hypothesis) அறிவுடை மக்களால் ஏற்கப்பட்டது. பனதாற்றுவருடன் வழித்துத் தான், மறுபடியும், கதிரவன் மையக் கொள்கை, கோப்பர்னிக்கஸ் (Copernicus : 1473-1543 கி.பி.) என்பவரால் வகுக்கப்பட்டு தரையில் கொள்கை கைவிடப்பட்டது.

9. கி. மு. முதல் நூற்றாண்டில் வாழ்ந்த கிரேக்க அறிஞர் ஹிப்பார்க்கஸ் (Hipparchus) முதன்முதலாக ஒரு விண்மீன் பட்டியல் தயாரித்தார். அப்பட்டியலில் 1080 விண்மீன்கள் பற்றிய குறிப்புகள் இருந்தன. அத்தூல் (Almagest) ஏறக்குறைய பத்து நூற்றாண்டுகளுக்குத் தனிச்சிறப்புடைய விண்மீன் பட்டியலாக வானியல் உலகில் நிலைத்து வந்தது. இவர்தான் முதற்தராக, கோணகணிதமும் (Trigonometry) வகுத்தவர். மேட, தூலம் புள்ளிகள் ($r =$ எனப்படும், First Point of Aries, First Point of Libra) இரண்டின் பிற்போக்கினைக் கண்டு கூறியவரும் இவரே. இதுபற்றிப் பின்பு, 'சை இரவுப் புள்ளிகள் நகர்ச்சி—அச்சத்திசை யக்சவு—அச்சக்சவு' (Precession of the Equinoxes and Nutation) என்ற பகுதியில் பாசுப்போம். இவரேதான் நாம் 'திங்கன்' (Lunar Month) எனக்கூறும் 'கதிரவனைவெட்டி, சத்திரன் மண்ணுலகைச் சுற்றிவரும் கால வட்டத்தை, ஒரு வினுடி அளவுக்குச் சரியாகக் (Correct to the nearest second) கணித்தவர்.

10. அடுத்தபடியாக முக்கிய கோப்பர்னிக்கஸ் என்பவர் வானியல் அறிவுகளிலே மிகப்பெரிய புரட்சியை ஏற்படுத்தி, 'கதிரவன் மையக்' கொள்கையை நிலைத்துநிறுத்தினார். இவர் இக் கொள்கையைத் தகுந்த ஆதாரங்களுடனும், சான்றுகளுடனும், 'De Revolutionibus Cerebus Coelestium' என்ற நூலில் விளக்கியுள்ளார். ஆனால் அவர் தமது வாழ்நாளில் இக்கொள்கையைப் பரப்ப அஞ்சினார். விதியின் கொடுக்காற்றுக்குச் சான்றாக, இவர் மரணப் படுக்கையில் இருக்கும்போதுதான் இப்பொருளுடைய முதற்பேர்தி இவர் கைக்குக் கிட்டியது.

11. இவருடைய அடிக்கவட்டியே வர்தலர்கள் டைக்கோ பிராஹி (Tycho Brahe: 1546-1601); ஜோஹன் கெப்ளர் (Johan Kepler: 1571-1630); கலீலியோ (Galileo: 1564-1642) என்ற வானியல் அறிஞர்கள். பிராஹி, ஆசிரியர்; கெப்ளர், அவரது மாணவர். ஆசிரியர் 20 ஆண்டுகளாக உடையத்துறைக்குச் சேர்த்த குறிப்புகள் கணிப்புகள் யாவும் ஆசிரியர் மறைந்தபிறகு மாணவரின் சொத்தாயின. இங்ஙனியவர் உடையப்பின் வினைவாகத் தொன்றியவை, கோளியக்க விதிகளாகும் (The Laws of Planetary Motion). முதலிரண்டு விதிகள் அறிவிக்கப்பட்டும் பத்தாண்டு கழித்துத்தான் மூன்றாம் விதி அறிவிக்கப்பட்டது.

கெப்ளரின் சீரிய பெருமை, வானத்தில் பொறிக்கப்பட்டிருக்கிறது; விஞ்ஞான வளர்ச்சி அப்பெருமைமைய மறுக்கவோ மறைக்கவோ முடியாது. கோள்கள் தம் நிலையொழுகு, வானத்தில் இயக்கிக் கொண்டிருக்கும்பணை, அக்கோள்கள் அவர் பெருமைமையப் பாடிக்கொண்டு இருக்கும்' என ஓர் அறிஞர் கெப்ளரின் மகத்தான பணிக்குத் தமது அஞ்சலிமயச் சொல்லுதுகிறார்.

12. கெப்ளர் விதிகளை, 'பிராஹி-கெப்ளர் விதிகள்' என்று கூறுவதே பொருத்தமாதும். இங்ஙனிகளின் அடிப்படையில்தான் நியூடன் (Newton: 1642-1727 கி.பி.) தமது தேவெதீச் இருபடி விதித் தர்ப்பு விதியை (The Law of Inverse Squares) உருவாக்கினார்.

13. கெப்ளருக்குப்பின் கலீலியோ. இவர் வானத் தொலைநோக்கியின் தந்தை, கண்ணுக்குத் தெரியாத பண்புண விண்மீன் களும் மற்ற பண விண் பொருள்களும் வானத் தொலைநோக்கியில் மனிடவர் காட்சிக்குச் சிக்கின. தமது ஆராய்ச்சி ஆறிலும், வானியல் முறைகளும் விரிவுபடுத்தப்பட்டன. கலீலியோ தன் தொலைநோக்கி வழியாக விவரமுறையின் உப கோள்களையும், கதிரவன் கறைகளையும் கண்டறிந்தார்.

14. இவர்களுக்குப் பின்னர், பஸ்தாட்டுப் பேரறிஞர்கள் வானியல் துறைக்கு ஈர்க்கப்பட்டு, அவர்களின் உடையப்பின் வினைவாக, சொந்த மூன்று தூற்றாண்டுகளில் பஸ்புண விவத்தகு செய்ற்களும் தமது அறிவியற் பொதுச் சொத்தாக வழங்கப்பட்டிருக்கின்றன.

15. அழியாப் புகழ் பெற்ற சில வானியல் அறிஞர் பட்டியலொன்று, இத்தூக் பின்தொகுப்பில் கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது. (பெற்றிப்பு I): சில தலைசிறந்த வானியல் மேதைகளின் பெயர் கொடுக்கப்படாதிருந்தால், அக்குறை, இத் தூணாசிரியர்களின் அழியாப் பிழையாகத் தேர்த்த தெனக்கொள்க.

II. வானியற் பகுதிகள்

16. விண்வெளியில் பல கோடிக்கணக்கான விண் பொருள்கள் பரந்து கிடக்கின்றன. நாம் வாழும் மண்ணுலகம் இவ் விண்வெளியில் இயங்கிவரும் ஒரு பொருளாகும். மற்றும் கதிரவன், சந்திரன், கதிரவனைச் சுற்றிவரும் கோள்கள், அக்கோள்களைச் சுற்றி வரும் துணைக்கோள்கள் (Satellites), நிலைத்த விண்மீன்கள் (fixed Stars), விண்மீன் கூட்டங்கள் (Constellations), வால் மீன்கள் (Comets), எரி, வீழ்மீன்கள் (Meteors and Meteorites), ஒண் முகில்கள், ஒண்டுகிறப் படலங்கள் எனப்படும் நெபுலாக்கள் (Nebulae) யாவும் விண்வெளியில் உள்ள பொருள்களாகும். இவைபற்றிய ஆராய்ச்சிகள் மூன்று அல்லது நான்கு பிரிவுகளாக வளர்த்திருக்கின்றன.

1. விளக்கப் பகுதி (Descriptive and Mathematical)
2. ஈர்ப்புப் பகுதி (Gravitational)
3. இயற் பகுதி (Physical)

மற்றும் கதிரியக்க வானியற் பகுதி (Radio Astronomy) இன்று விரைவாக வளர்ந்து வரும் ஒரு அறிவியல் துறையாகும். இத் துறையில் ஆராய்ச்சிகள் நடத்துவதற்கென, இப்போது தமிழ் நாட்டில், உதகமண்டலத்தில் ஒரு ரேடியோ தொலைநோக்கி அமைக்கப்பட்டிருக்கிறது.

இத்துறையில் விளக்கப்பகுதியும் ஈர்ப்புப்பகுதியும் ஈட்டுமே ஓரளவு இடம் பெறுகின்றன. இயற்பியலும் கதிரியக்கப் பிரிவும் இடம் பெறு.

1. கோளம்

(The Sphere)

1-0. கோளம்—அதன் வடிவ கணித, கோண கணிதப் பண்புகள்
(The Sphere—its geometrical and trigonometrical properties)

கோள தூள் படிப்பதற்கு அடிப்படையாகக் கோளத்தைப் பற்றி சில பண்புகள் நமக்கு ஆதிமுக்கியமாகவேண்டும். அவை கருக்கமாக இப் பகுதியில் கொடுக்கப்பட்டிருக்கின்றன. சில முறைப்பாடுகளை நிறுவுவதற்குக்கின்றன; சில நிறுவப்படவில்லை. விவரமாக, நிறுவல் முறைகளோடு. அறிவ விரும்புவோர், இன் கொடுக்கப்பட்டிருக்கும் தூல்களைப் பார்க்கலாம்;

Todhunter : Spherical Trigonometry

Kern and Bland: Solid Mensuration

Smart: Text book on Spherical Astronomy, Chapter I.

1-1. கோளம்—வட்டவடிவம் : வட்டம் எனப்பட்ட ஒரு நிலைத்த புள்ளியிலிருந்து சமதூரத்திலுள்ள புள்ளிகூட்டத்தால் அமைபும் மேற்பரப்புகளைய ஒரு கண் உருகும், கோளம் எனப்படும்.

ஆரம் அத்த (குறிப்பிட்ட) ஓரம் கோளத்தின் ஆரம் (Radius) அல்லது அரைகிட்டம் (Semi-diameter) எனப்படும்.

கிட்டம் : கோளமையத்தின் வழியாகச் செல்லும் எந்த நேர்க்கோளும் கோளத்தின் மேற்பரப்பை இரண்டு புள்ளிகளில் வெட்டும். இவ்விரு புள்ளிகளுக்கிடப்பட்ட நீளம், கோளத்தின் ஒரு கிட்டம் எனப்படும்.

1.2. கோளத்தின் வெட்டுமுகம் (Section of a Sphere)

1. ஒரு கோளத்தை ஒரு சமதளம் (Plane) வெட்டினால், அக் கோளத்தின் வெட்டு முகம் ஒரு வட்டமாகிவிடும். அக்கோளத்தின் ஒரு விட்டம் அத்தளத்திற்குக்குமானால், அவ்வெட்டு முகம் ஒரு பெரு வட்டம் (Great Circle) எனவும், அவ்வாறல்லாத தள வெட்டு முகம் ஒரு சிறு வட்டம் (Small Circle) எனவும் கூறப்படும்.

இரப்பன்மினை வேறு விதத்திலும் கூறலாம் : அக்கோள மையம் வழியாகச் செல்லும் தளவெட்டு முகம் ஒரு பெரு வட்டமாகும் ; மையம் வழியாகச் செல்லாத தள வெட்டு முகம் ஒரு சிறு வட்டமாகும்.

[மையத்தின் வழியாகச் செல்லும் எந்தத் தளமும், கோளத்தின் ஒரு விட்டத்தைத் தாங்கியிருக்கும் என்பது கண்கூடு (படம் 1-1)]

2. ஒரு கோளத்தின் வெட்டு முகமாகவரும் வட்டத்தின் தளத்திற்குச் செங்குத்தாக விருக்கும் கோள விட்டம் அவ்வட்டத்தின் அச்ச (Axis) எனப்படும்.

3. அத்த அச்சின் இரு முனைகளும் (அதாவது அவ்வச்சு, கோளப்பரப்பை வெட்டும் இருபுள்ளிகளும்) அதற்குரிய வட்டத்தின் இரு துருவங்கள் (Poles) எனப்படும். (படம் 1-2)

குறிப்பு : பெருவட்டம், சிறுவட்டம் யாவற்றிற்கும் அச்சங்கள் உண்டு : ஆகவே இருதுருவங்களும் உண்டு.

4. கோள வட்ட மையத்தினின்று வெவ்வேறு தூரங்களிலுள்ள தளவெட்டு வட்டங்களும், மையத்திற்கு மிக அண்மை யிலுள்ள வட்டம் மிகப்பெரிய (பெருவட்டமாக) வட்டமாகவும், மிகதூரத்திலுள்ள வட்டம் மிகச்சிறிய வட்டமாகவும் இருக்கும்.


5. ஒரு பெரு வட்டத்தின் ஆரம் (அரை விட்டம்) கோளத்தின் ஆரத்திற்குச் சமம்; சிறு வட்டத்தின் ஆரம், கோளத்தின் ஆரத்தைவிடச் சிறியதாக இருக்கும்.

6. ஒரு கோளத்தின் இருபெரு வட்டங்கள் ஒன்றையொன்று சமபரப்பாக வெட்டிக்கொள்ளுகின்றன.

7. ஒரு கோளத்தில் எல்லாப்பெரு வட்டங்களும் ஒன்றுக்கொன்று சமம்.

8. ஒவ்வொரு பெருவட்டமும் ஒரு கோளத்தை இருசம பாதியாக (இரு சமமான அரைக்கோளங்களாக) வெட்டுகின்றன.

9. ஒரு கோளத்தின் மேற்பரப்பிலுள்ள இரு புள்ளிகளை இணைக்கும் வளைவில் கோளத்தின் மேற்பரப்பில், வரையப்படும் கோடுகளில், மீச்சிறு தளமுண்டாய வளைகோடு, அய்விறு புள்ளிகள் வழியாகச் செல்லும் பெருவட்டத்தின் சிறு வில்வாகும்.




படம் 1-1

அரை வட்டம்

$$ACB = AC'B$$

$$= ADE$$

$$= A'D'B$$



படம் 1-2

1-3. கோளத்தைப் பற்றிய சிறு வரையறைகள் - முதனிலை வட்டம், துணைக் குத்து வட்டங்கள். (Primary Circle, Secondary Circles)


1-2 (8)-ல் வட்ட துருவங்கள் வரையறுக்கப் பட்டன. படம் 1-3-ல் QR என்ற பெருவட்டத்தின் துருவங்கள் P, P'; அத்துருவங்கள் வழியாக வரையக்கூடிய எல்லாப் பெருவட்டங்களும்

(PNP' , PNP' , PSP') முதற்கூறப்பட்ட வட்டத்தின் (அதாவது QR -ன்) துணைக்குத்து வட்டங்கள் (Secondary Circle) எனக் கூறப்படும். முதல் வட்டம் (QR) யின் கூறப்பட்ட துணை வட்டங்களுக்குரிய முதன்மை வட்டம் எனப்படும்.

1-3-1. கோளகோணங்கள் (Spherical Angles)

இரு பெருவட்டங்களுக்கு இடைப்பட்ட கோணம் அக்வட்டக் கோணம் எனப்படும். தளங்களுக்குக்கிடையிட்ட கோணம் என்பது வரையறை (1).


(1) பக்கத்திலுள்ள படத்தில் $ABDC$, $ABFE$ என்ற இரு தளங்கள் AB என்ற நேர்க்கோட்டில் வெட்டிக்கும். AB -ல் P ஒரு புள்ளி. P வழியாக AB -க்குத் செங்குத்தாக, தளம் $ABDC$ -ல் PM உம், தளம் $ABFE$ -ல் PN உம் வராக.



$\angle MPN$ எனப்படும் இவ்விரு தளங்களுக்கும் இடைப்பட்ட கோணம் என்பது வரையறை.

$\angle MPN$ எனப்படும் இவ்விரு தளங்களுக்கும் இடைப்பட்ட கோணம் என்பது வரையறை.

படம் 1-3-1 (i)



படம் 1-3 (ii)

படம் 1-8, (ii) க், $A A', B B'$ இரு பெருவட்டங்கள்; அவை வெட்டுகிடங்களில் ஒன்று C . $\angle ACB = \theta$ என்பது அவ்விரு பெருவட்டங்களுக்கும் இடைப்பட்ட கோணம் எனக்கொள்ளலாம்; இதிலே வரையறை.

குறிப்பு :

$$\angle A'CB' = \theta; \angle A'CB = 180 - \theta;$$

$$\angle B'CA = 180 - \theta$$

இவை எளிதில் நிறுவப்படலாம்.

1-3-1-1. இரு பெருவட்டங்களுக்கு கிடைப்பட்ட கோணம் பின் வரையறுக்கப்படும் கோணங்களுக்குச் சமம் என எளிதில் நிறுவலாம்.

(i) இரு பெருவட்டங்கள் வெட்டுகிடங்களில் அவ் வட்டங்களுக்கு வரையப்படும் தொடுவறைகளுக்கு கிடைப்பட்ட கோணம்;


(ii) இவ்விரு வட்டங்களிலும் துணைக்குத்து வட்டங்களாகப் பெற்ற முதன்மை வட்டத்தின் மேல் அவ்விரு வட்டங்களுக்கு கிடைப்பட்ட விகி அளவு (1-4-8 தேற்றம் 1 காண்க).

(iii) இவ்விரு வட்டங்களுக்கு குறியதையும், ஒரே பக்கத்திலு முள்ள இரு துருவங்களுக்கு கிடைப்பட்ட விகி அளவு கோணதாரம். (1-4-5 தேற்றம் 3 காண்க)

1-4-1. இன்னவாள் சிறுவட்ட, பெருவட்ட விவிலங்கள்

X என்ற முதன்மை வட்டத்திற்கு $AB'B, AC'C$ என்பவை இரு துணைக்குத்து வட்டங்கள். X' என்பது X க்கு இன்னவாள் சிறு வட்டம்.

விகி $AB' = AB'$ என்ற விகி O இல் தாங்கும் கோணம் $\angle BOA = \theta$ எனவும், X' இன் ஆரம் r எனவும், X இன் ஆரம் R எனவும் கொண்க.



படம் 1-4-1

(பின்னர் கணிதவாக உள்ள குறிப்பு காண்க).

$O'B = OB$; $O'C = OC$; ஏனெனில் அவை இணைத் தளம்
களில் உள்ளன.

$$\therefore \angle B'O'C = \angle BCC.$$

எனில் $B'C' = r \times \angle B'O'C'$ (ஆதரயன் அளவு)

எனில் $BC = R \times \angle BOC$ (ஆதரயன் அளவு)

$$\therefore \frac{\text{எனில் } B'C'}{\text{எனில் } BC} = \frac{r}{R}$$

ஆனால் $\triangle OO'B'$ இல்

$$\begin{aligned} \sin \theta &= \frac{O'B'}{OB} \\ &= \frac{r}{R} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \therefore \frac{r}{R} &= \cos (90 - \theta) \\ &= \cos (AB - AB') \\ &= \cos B'B \end{aligned}$$

$$\therefore \frac{\text{எனில் } B'C'}{\text{எனில் } BC} = \cos B'B$$

$$\therefore \text{எனில் } B'C' = \text{எனில் } BC \times \cos B'B$$

இங்கு $B'B$ என்பது இணையான சிறு, பெரு வட்டங்களுக் கிடையர்
வட்ட எக்தி எளத் தெரிசிறு.


$\therefore$ ஒருசிறு வட்ட எக்தி கோண திளம் : அதற்கு இணையான
பெருவட்ட எக்தி கோண திளம் = இல் விருவட்டங்களுக் கிடையர்
வட்ட எக்தின் cosine அக்திசிறுவட்டத்தின் கோண ஆத்தின்
(angular radius) sine. இது ஒரு முக்கிய வாய்பாடு; பல இடங்
களில் பயன்படும்.

குறிப்பு :

பெரு வட்ட எக்திகளின் அளவு, அவை கோண மையத்தில்
நாங்கும் கோணங்களால் மதிப்பிடப்படுகின்றன. (கோணங்கள்
பாசகவனவிலே, ஆதரயன் அளவிலே இருக்கலாம்)

1.4.2. ஒரு கோளத்தின் கோளப்பரப்பில் AB , AC என்பவை இருவட்ட நாற் கதவுகளாக (Quadrants) BC என்ற பெரு வட்டத்திற்கு A ஒரு துருவம்.

படம் 1.4.2 காண்க.
 தாற்போது $AB = 90^\circ = \angle AOB$;
 $\therefore AC = 90^\circ = \angle AOC$.
 $\therefore AO \perp BO$
 $AO \perp CO$
 $\therefore AO \perp$ தளம் BOC



படம் 1.4.2

$\therefore BC$ என்ற பெருவட்டத்திற்கு A ஒரு துருவமாகிறது.

AO -ன் நீட்டல், கோளப்பரப்பை A' -ல் வெட்டினால், A' என்பது BC -ன் மற்றோர் துருவமாகும்.

1.4.3. தேற்றம் 1: ஒரு முகனிலை வட்டத்திற்கு இருதுணைக் குத்து வட்டங்கள் வரையப்படின், அவ்விரு துணை வட்டங்களுக்கும் செட்டப்பட்ட கோணம், முகனிலை வட்டத்தின்மேல் இவ்விரு துணை வட்டங்களும் துண்டிக்கும் வில்லுக்குச் சமம்.

படம் 1.4.2-ல்,
 தளம் OAB -ல், $OB \perp OA$
 தளம் OAC -ல், $OC \perp OA$
 $\therefore \angle BOC =$ வில் BC .

1.4.4 தேற்றம் 2: ஒரு பெருவட்டத்தின் துருவம் மற்றொரு பெரு வட்டத்தின் மேலிருப்பின், பித்திய பெருவட்டத்தின் துருவம் முத்திய பெருவட்டத்தின் மேலிருக்கும்.

படம் 1.4.2-ல்,
 தளம் BOC -ல், $OB' \perp BO$, $OC' \perp OC$ வராக.
 அவை BC என்ற பெருவட்டத்தை B' , C' என்ற இடங்களில் வெட்டட்டும்.
 AB' , AC' இரண்டும் BC க்குத் துணைக்குத்து வட்டங்களாகும்.

$$\text{மேலும் } \angle BOB' = 90^\circ$$

$$\angle COC' = 90^\circ$$

ஆகவே, BB' உம், CC' உம் வட்டநாத் கூறுகளாகும்.

1.4.2-ன் படி, இரண்டிரண்டு வட்ட நாத்கூறுகள் எடுத்து அவற்றிற்குரிய முதனிலை வட்டங்கள், அம் முதனிலை வட்டம் அனுக்குரிய துருவங்கள் மீள்னர் கொடுக்கப்பட்டிருப்பதைக் காண்க.

இரண்டிரண்டாக வட்டநாத் கூறுகள்.	அவற்றிற்குரிய முதனிலைப் பெருவட்டம்	முதனிலைப் பெருவட்டத்தின் துருவம்
(1) $AB' ; BB'$.	AB	B'
(2) $AB ; AB'$.	$BB' (BC)$	A .
(3) $AC' ; CC'$.	AC	C' .
(4) $AC ; AC'$.	$CC' (BC)$	A .
(5) $AB ; BB'$	AB'	B .
(6) $AC ; CC'$	AC'	C .

(1)-ன்படி, AB -ன் துருவம் B' என்பது BB' -ன் மேலிருக்கிறது.

(2)-ன்படி, BB' -ன் துருவம் A என்பது AB -ன் மேலிருக்கிறது.

(3)-ன்படி, AC -ன் துருவம் C' என்பது CC' -ன் மேலிருக்கிறது.

(4)-ன்படி, CC' -ன் துருவம் A என்பது AC -ன் மேலிருக்கிறது. இவ்வாறே மற்றவைபடி.

1.4.5. தேற்றம் 3: இரு பெரு வட்டங்களுக்கிடையிட்ட கோணம் அவற்றின் துருவங்களுக்கிடையிட்ட மீள் (அல்லது கோணத் தூரம்) மூக்குக் கனம்.

படம் 1-4-2-ல், $BO' \perp OC_1$

$$OC' \perp OC. \text{ (வரிவழி)}$$

$$\therefore \angle BOC = \angle B'OC'$$

$$= \text{மீள் } B' C' \text{ மூக்குக் கனம்}$$

1-4-4-ன் மீ, AB -ன் துருவம் B' ---(1)

AC -ன் துருவம் C' ---(2)

$\therefore AB, AC$ க்கு இடைப்பட்ட கோணம்

$\angle BOC$ என்பது, எக் $B' C'$ (ஆகிறது

$\angle B' C O'$) என்பதற்குச் சமமாகிறது.


1-5. கோள முக்கோணங்கள் (Spherical triangles)

வரையறை: ஒரு கோணத்தின் மேற்பரப்பில் மூன்று பெரு வட்ட சிறு விலகனாக வரம்பிட்ட பரப்பிற்கு ஒரு கோள முக்கோணம் என்று பெயர்.

படம் 1-5-1-ல் சில கோள முக்கோணங்கள் மீள் உதரப்படு வன: $\triangle ABC$; $\triangle A' C' B'$; $\triangle PQS$ (PQ, PS, QS என்பவை பெருவட்ட விலகன்); $\triangle APC$; $\triangle A' PC$, LM, MN, NL என் பவை மூன்று பெருவட்ட விலகனானால், LMN ஒரு கோள முக் கோணம்.

1-5-1. கோள முக்கோணங்களின் உறுப்புகள் (Elements or parts of a Spherical triangle)

ABC என்ற ஒரு கோள முக்கோணத்தைத் தனியாக எடுத்துக் கொள்வோம். (படம்: 1-5-1) இது ஒரு தளத்தின் மேலிருந்து எவ்விதும் கண்ணாடு.



படம் 1-5-1

இதற்கு ஆறு உறுப்புக்கள் உள்ளன. $\angle A$, $\angle B$, $\angle C$ என்ற மூன்று கோணங்கள்; BC , CA , AB என்ற மூன்று பக்கங்கள் (பக்கங்கள்). BC , BA , AB என்ற பக்கங்களின் நீளங்கள் (கோண தூரங்கள்) முறையே a , b , c எனக் குறிக்கப்படும்.

மூலப் பே 1-8-1-ம் வரையறுத்தபடி, AB , AC என்ற பெருவட்டங்களின் தளங்களுக்கு இடைப்பட்ட கோணம் A ; அல்லாதே $\angle B$ ம் $\angle C$ ம். அவற்றின் அளவுகளைப் பாகைகளிலோ (degrees), ஆளவுகளிலோ (Radians) கணக்கிடலாம் (அளக்கலாம்). பக்கங்களும் கோண அளவுகளையே உடைகலாம்; நீட்டலளவுகள் (linear measure) பெற்றவைபல. BC -ன் கோண அளவுமாதெனில் BC என்ற வில், கோண மையத்தில் தாங்கும் கோண அளவுமையம். அல்லாதே CA , AB -ன் அளவுகளும், எனவே, ஒரு கோண முக் கோணத்தின் பக்கங்களும் கோண அளவுமையமையே தவிர சாதாரண தேரீக்கோட்டு முக்கோணங்களின்போல நீட்டல் அளவு பெற்றவைபல. எனவே, ஒரு கோண முக்கோணத்தின் ஆறு உறுப்புக்களும் கோண அளவுமையன. பாகை அல்லது ஆளவுகள் அளவில் அளக்கப்படும்.

1-5-2. கோண முக்கோணத்தின் பண்புகள் :

1. ஏதேனும் இரு பக்கங்கள் சமமாயிருப்பின், அவற்றிற்கு எதிரான இரு கோணங்களும் சமம்; மறுதலையும் உண்மை. ஆய், வானுள முக்கோணம் இரு சமபக்க முக்கோணம் எனப்படும். இருசம பக்க முக்கோணத்தில் AB , AC , சமமானவை, A வாய்வாக BC க்கு வரையப்படும் துணைக்குத்து வட்டம் $\angle A$ ஐயும், பக்கம் BC ஐயும், இருசம பாகங்களாகப் பிரிக்கும்; மறுதலையும் பொருத்தும்.

2. மூன்று பக்கங்களும் சமமாயின் மூன்று கோணங்களும் சமம்; மறுதலையும் உண்மை. அது சமபக்க முக்கோணம்/சம. கோண முக்கோணம் எனப்படும்.

3. இருபக்கங்களின் கூட்டுத்தொகை, மூன்றாம் பக்கத்தை விட அதிகம்; இரு பக்கங்களின் வேறுபாடு, மூன்றாம் பக்கத்தை விடக் குறைவு.

4. இரு பக்கங்கள் சமமில்லாதிருப்பின் பெரிய பக்கத்திற்கு எதிராகப் பெரிய கோணம் அமையும்.

5. ஒரு கோண முக்கோணத்தின் மூன்று கோணங்களின் கூட்டுத்தொகை 180° அல்லது π ஆளவுகளின்க்கு மிகுதியாகும்.

இதுபோலவே வகைபகுதியாகவும் நான்கு அடுத்தடுத்த உறுப்
புகளை பெறுதலாம்.

இரண்டாம், மூன்றாம் இடங்களில் இதுக்கும் உறுப்புகள், உட்
பக்கம்/உட்கோணம் அல்லது உட்கோணம்/உட்பக்கம் எனவும்
மூன்றிலும் கடைசியிலும் உச்சினைவ, மற்றகோணம்/பக்கம் அல்
லது மற்ற பக்கம்/கோணம் எனவும் கூறப்படும். இவைகளுக்கு
கிடைசுப்பட்ட கோண கணிதத்தொடர்புகளையும் பயன்படுவதொள்
லுதும், அத்தொடர்பாவது ;

$$\begin{aligned} & \cos (\text{உட்பக்கம்}) \times \cos (\text{உட்கோணம்}) \\ & = \sin (\text{உட்பக்கம்}) \times \cot (\text{மற்ற பக்கம்}) \\ & = \sin (\text{உட்கோணம்}) \times \cot (\text{மற்ற கோணம்}) \end{aligned}$$

எடுத்துக்காட்டு : A, c, B, a என்ற நான்கு அடுத்தடுத்த
உறுப்புகளை பெடுத்துக்கொண்டால்,

$$\begin{aligned} c, B \text{ மூன்றையே உட்பக்கம், உட்கோணம்;} \\ A, a \text{ மூன்றையே மற்ற கோணம்; மற்ற பக்கம்.} \end{aligned}$$

மேற்கூறிய தொடர்புகள் வாய்ப்பாட்டின்படி,


$$\cos c \cos B = \sin c \cot a = \sin B \cot A.$$

இவ்வாறே மற்ற தொடர்புகளையும் பெறலாம்.

1-6-1. கோணமுக்கோணத்தின் துருவ முக்கோணம்: (The Polar triangle of a spherical triangle)

ABC ஒரு கோணமுக்கோணம். A இறுக்கும் பக்கமே இறுக்கும்
 C என்ற பெரு வட்டத்தின் துருவம் A' எனக்கொள்க. அங்ஙனமே,
 B', C' இரண்டும் முறையே CA, AB ன் துருவங்கள்.

A', B', C' என இவ்வாறமைந்த துருவங்களை, இரண்டிரண்டு
டாகக்கொண்டு அவற்றின் வழியாகப் பெருவட்டங்கள் வரைந்தால்



படம் : 1-6-1

பெறப்படும் முக்கோணம் A', B', C' என்பது ABC ன் துருவ முக்கோண மென்பதும், படம் 1-6-1 காண்க. துருவ முக்கோணத்தின் ஆறு உறுப்புகளும், மூலக் முக்கோணத்தின் ஆறு உறுப்புகளோடு, படத்தில் காட்டியபடி தொடர்புடையவை.

அத்தொடர்புகளை இங்கு காண்க :

	மூலக் முக்கோணம் $\triangle ABC$ (1)	துருவமுக்கோணம் $\triangle A' B' C'$ (2)	துருவ முக்கோணம் $A' B' C'$ ன் துருவ முக்கோணம் (3)
பக்கம்	$a = BC$	$\pi - A = B'C'$	$\pi - (\pi - a) = a$
"	$b = CA$	$\pi - B = C'A'$	$\pi - (\pi - b) = b$
"	$c = AB$	$\pi - C = A'B'$	$\pi - (\pi - c) = c$
கோணம்	$A = \hat{BAC}$	$\pi - a = B'A'C$	$\pi - (\pi - A) = A$
"	$B = \hat{ABC}$	$\pi - b = A'B'C$	$\pi - (\pi - B) = B$
"	$C = \hat{BCA}$	$\pi - c = B'C'A'$	$\pi - (\pi - C) = C$

எனவே,

$\triangle ABC$ க்கு துருவ முக்கோணம் $A'B'C'$ ஆனால், $\triangle A' B' C'$ க்கு துருவ முக்கோணம் ABC .

அதாவது,

BC, CA, AB -இன் துருவங்கள் முறையே

A', B', C' ஆனவை

$B'C', C'A', A'B'$ -இன் துருவங்கள்

முறையே A, B, C .

1-6-2. மூலக் முக்கோணத்திற்குரிய கோண கணிதத் தொடர்பு வாய்பாடுகளை, அதன் துருவமுக்கோணத்திற்கு அமைத்தால், நாம் பெறுவோம் :

$$(i) \frac{\sin(\pi - A)}{\sin(\pi - a)} = \frac{\sin(\pi - B)}{\sin(\pi - b)} = \frac{\sin(\pi - C)}{\sin(\pi - c)}$$

$$\text{ஆதலது } \frac{\sin A}{\sin a} = \frac{\sin B}{\sin b} = \frac{\sin C}{\sin c}$$

இவை முதல் முக்கோணத்திற்குரிய முதல் தொடர்பு வாய்
படாகும்.

$$(ii) \cos (\pi-A)=\cos (\pi-B) \cos (\pi-C)+\sin (\pi-B) \sin (\pi-C) \cos (\pi-a)$$

ஆதலது

$$-\cos A=\cos B \cos C-\sin B \sin C \cos a$$

மற்றும் இது வேண்டு இது சமன்பாடுகள்.

(iii) $\pi-a, \pi-c, \pi-b, \pi-A$ என நான்கு அடுத்தடுத்த
உறுப்புகளை பெடுத்துக்கொள்வோம். வாய்பாட்டின்படி,

$$\cos (\pi-C) \cos (\pi-b)=\sin (\pi-C) \cot (\pi-A) \\ =(\sin -b) \cot (\pi-a)$$

ஆதலது

$$\cos C \cos b=-\sin C \cot A+\sin b \cot a$$

இவ்வாறே மற்ற தொடர்புகளும் பெறலாம்.

1-6-3. செங்கோண முக்கோணங்கள் (Right angled triangles)

ஒரு கோண முக்கோணத்தில் ஒரு கோணம் (பக்கமல்ல) 90° ஆக இருக்குமானால், அது ஒரு செங்கோண முக்கோண மென்பதும்.



படம் 1-6-3

படம் 1-6-3 இல்

$$\angle C=90^{\circ}$$

செம்பக்கம் (hypotenuse) AB

இக்கு 1-6 (i) படி.

$$\frac{\sin a}{\sin A}=\frac{\sin b}{\sin B}=\frac{\sin c}{\sin C}$$

$$=\frac{\sin c}{\sin 90^{\circ}}=\sin c \quad (\because \angle C=90^{\circ})$$

$$\therefore \sin a = \sin A \sin c \quad \dots (1)$$

$$\sin b = \sin B \sin c \quad \dots (2)$$

1.6. (ii) மீ.,

$$\begin{aligned} \cos c &= \cos a \cos b + \sin a \sin b \cos C \\ &= \cos a \cos b \quad (\because \angle C = 90^\circ) \quad \dots (3) \end{aligned}$$

1.6. (iii) மீ.,

$$\begin{aligned} C, B, a, C \text{ எடுத்துக்கொண்டால்,} \\ \cos a \cos B &= \sin a \cot c - \sin B \cot C \\ &= \sin a \cot c \quad (\because \angle C = 90^\circ) \\ \therefore \cos B &= \tan a \cot c \quad \dots (4) \end{aligned}$$

இவ்வாறே,

$$\sin a = \tan b \cot B \quad \dots (5)$$

$$\sin b = \tan a \cot A \quad \dots (6)$$


$$\cos A = \tan b \cot c \quad \dots (7)$$

எனவும் பெறலாம்.

இவ்வாறே, $\triangle ABC$ ன் துருவ கோணமாகிய $\triangle A'B'C'$ எடுத்துக்கொண்டு, $(\pi - C)$ க்கூடிய பக்கம் 90° எனக்கொண்டு சில தொடர்புகளையும் அறியலாம். $\dots (8)$

1.6.3-1. நேப்பியர் விதி (Napier's Rule)

செங்கோண முக்கோணத்தைப் பொருத்தமட்டில், இத்தகச்சான் பகுக்கப் பாவத்தையும், பின் கூறப்படும் நேப்பியர் விதிப்படி, கவனத்தில் வைக்கலாம்.



ஒரு செங்கோண முக்கோணத்தில் செம்பக்கம் c ; செங்கோணம் தாங்கும் பக்கங்கள் a, b ; மற்றவை, முறையாகவுள்ள கோணங்கள்.

படம் 1.6.3-1

ஒரு வட்டம் வளர்த்து அதை நான்கு சமக் கூறுகளாகப் பிரித்துக்கொண்ட 'மடம் 1-8-8-1 யாக்கை'. மேலேயிருக்கும் நான்குகளை மட்டும் இரண்டு பகுதிகளாகப் பிரித்து, அவ்விரண்டு பிரிவுகளிலும் செங்கோணம் நான்கும் பக்கங்கள் a, b ஐ எழுதுக. - கீழேயிருக்கும் தாக்கதில் (90° - செம்பக்கம்), $90^\circ - c$ எழுதிக்கொண்ட. எ-க்கு ஒன்று விட்ட இடத்தில் $90^\circ - A$ உம், c -க்கு ஒன்றுவிட்ட இடத்தில் $90^\circ - B$ உம் எழுதுக.

ஏதாவொரு உறுப்பை, இங்கு தடு உறுப்பு (middle) என எடுத்துக்கொண்டால், அதற்கு இரு பக்கங்களிலும் இருக்கும் உறுப்புகள் 'அடுத்த' (adjacent) உறுப்புகள் எனவும், அமைவிலான உறுப்புகள், 'எதிர்' (opposite) உறுப்புகள் எனவும் கூறப்படும்.

எடுத்துக்காட்டு :

தடு உறுப்பு	'எதிர்' உறுப்புகள்	'அடுத்த' உறுப்புகள்
a	$90^\circ - A$; $90^\circ - C$	b ; $90^\circ - B$
$90^\circ - B$	b ; $90^\circ - A$	a ; $90^\circ - C$
$90^\circ - C$	a ; b	$90^\circ - B$; $90^\circ - A$
$90^\circ - A$	a ; $90^\circ - B$	b ; $90^\circ - C$
b	$90^\circ - B$; $90^\circ - C$	a ; $90^\circ - A$

தேர்வை விதி:

$\sin$ (தடுஉறுப்பு) = 'அடுத்த' உறுப்புகளின் 'tan' களின் பெருக்குத்தொகை
= 'எதிர்' உறுப்புகளின் 'cosine' களின் பெருக்குத்தொகை.

$\sin$ (Middle Part) = Product of tangents of adjacent.
= Product of cosines of opposites.

எடுத்துக்காட்டுகள் :

$$\begin{aligned} \text{(i)} \quad \sin a &= \tan b \tan (90^\circ - B) = \tan b \cot B \quad 1-8-8 \dots (8) \\ &= \cos (90^\circ - A) \cos (90^\circ - C) = \sin A \sin C \\ &\quad 1-8-8 \dots (1) \end{aligned}$$

$$(ii) \sin (90-B) = \tan a \tan (90-C) = \tan a \cot c$$

$$\therefore \cos B = \tan a \cot c. \quad 1-8-8... (4)$$

$$\sin (90-B) = \cos b \cos (90-A)$$

$$\therefore \cos B = \cos b \sin A \quad 1-8-8... (8)$$

இவ்வாறே மற்ற செங்கோண முக்கோணத்திற்குரிய மற்ற தொடர்புகளையும் சரியாத் தருக்கொள்க.

1-8-3-2 ஒரு செங்கோணப் பக்கம் (side) உள்ள முக்கோணத்திற்கு, இவ்வாறே தேர்ச்சி விதி உண்டு.

C செங்கோணப் பக்கம் ; அதாவது C-ன் அளவு ஒரு வட்ட நாற்கூறு. வட்டம் வலவந்து பின்வரும் படத்தில் காட்டியபடி, உறுப்புகளை எழுதிக்கொள்க. [1-8-3-2 (2)]



படம் 1-8-3-2 (2)



1-8-3-2 (1)

விதி, முன் கூறியபடியே,

$$\begin{aligned} \text{sine (நடு)} &= \text{'அடுத்து' உறுப்புகளின்} \\ &\quad \text{'tan' களின் பெருக்குத்தொகை} \\ &= \text{'எதிர்' உறுப்புகளின்} \\ &\quad \text{'cosine' களின் பெருக்குத்தொகை.} \end{aligned}$$

எடுத்துக்காட்டு :

$$\begin{aligned} \sin (C-90^\circ) &= \tan (90-a) \cdot \tan (90-b) \\ &= \cos A \cos B. \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{அதாவது} - \cos C &= \cot a \cot b \\ &= \cos A \cos B. \end{aligned}$$

1-64. பற்றோர் கோண உணர்த விதி :

ABC என்ற ஒரு கோண முக்கோணத்தில்,

$$\sin a \cos B = \cos b \sin c - \sin b \cos c \cos A.$$

$\triangle ABC$ இல்,

BA' ஐ நீட்டி,

$BA' = 90^\circ$ என்ற வகையில்

A' ஐ இடம் குறித்து,

A' ஐவும் C ஐவும் ஒரு பெரு

வட்ட மையமாக இணைக்கவும்.

அப்போது,

$$\angle CAA' = 180 - A;$$

$$\text{பக்கம் } AA' = 90 - c.$$

$\triangle A'BC$ இல்,

$$\cos A'C = \cos A'B \cos BC + \sin A'B \sin BC \cos B$$

$$= 0 + \sin a \cos B \quad (\because A'B = 90^\circ). \quad \dots(1)$$

$\triangle A'AC$ இல்,

$$\cos A'C = \cos A'A \cos AC + \sin A'A \sin AC \cos (180 - A)$$

$$= \sin c \cos b + \cos c \sin b (-\cos A)$$

$$= \sin c \cos b - \cos c \sin b \cos A. \quad \dots(2)$$

(1) உம் (2) உம் சமனதாவின்,

$$\sin a \cos B = \cos b \sin c - \sin b \cos c \cos A$$

இவ்வாறே மற்றைந்து தொடர்புகள்.

$\sin a \cos C, \sin b \cos A, \sin b \cos C, \sin c \cos A, \sin c \cos B$ காணலாம்.

குறிப்பு :


மனப் பாடம் செய்து, உடனுக்குடன் பயன்படுத்த வேண்டிய வாய்பாடுகள் :

(A) 1-6 (i), (ii) (iii), எல்லா முக்கோணங்களுக்கும் பொருத்தமானது.

(B) 1-6-1 முக்கோண உறுப்புகளுக்கும், துருவ முக்கோண உறுப்புகளுக்கும் உள்ள தொடர்புகள்.

(C) 1-6-8-1; 1-6-8-2 செங்கோண முக்கோணம், செம்பக்க முக்கோணம் இவைகளுக்கு சூரிய நேரப்பயர் விதி.

(D) 1-6-4 முறை மட்டும் அறிந்துகொள்ள; முடிந்தால் வாய்பாடும் கூட.



படம் 1-6-4

பயிற்சி 1

1. ABC என்ற கோண முக்கோணத்தில் $\angle C = 90^\circ$; $a = 60^\circ$; $b = 60^\circ$. மற்றைய உறுப்புகளைக் காண்க.

2. ஒன்று வட்ட நாற்கூறுகளால் அமைந்த கோண முக்கோணத்தின் கோணங்கள் என்ன?

3. ZPS என்ற ஒரு கோண முக்கோணத்தில் $ZP = 90 - \phi$; $PS = 90 - \phi$; $ZS = z$ என ஒன்று விடகளின் அளவுகள் கொடுக்கப்பட்டுள்ளன. சமமுக்கோணத்தின் கோணங்களைக் காண்கிறது.

$\phi = 0$ ஆனால், அக் கோணங்கள் என்ன?

4. ABC என்ற கோண முக்கோணத்தில் $\angle C = 90^\circ$; $AB = a$; $BC = b$ ஆனால், மற்ற உறுப்புகளையறிவ.

5. a, b, c, A, B, C என்ற கோண முக்கோண உறுப்புகள், $\Delta a, \Delta b, \dots$ என்ற சிறு மாறுதல்களைப் பெறுகின்றன. அப்போது பின்வரும் சமன்பாடுகளை நிறுவுக.

$$\Delta a = \cos C \cdot \Delta b + \cos B \cdot \Delta c + K \sin b \sin c \cdot \Delta A.$$

$$\Delta b = \cos A \cdot \Delta c + \cos C \cdot \Delta a + K \sin c \sin a \cdot \Delta B.$$

$$\Delta c = \cos B \cdot \Delta a + \cos A \cdot \Delta b + K \sin a \sin b \cdot \Delta C.$$

$$\Delta A = -\cos c \cdot \Delta B - \cos b \cdot \Delta C + \frac{1}{K} \sin B \sin C \cdot \Delta a.$$

$$\Delta B = -\cos a \cdot \Delta C - \cos c \cdot \Delta A + \frac{1}{K} \sin C \sin A \cdot \Delta b.$$

$$\Delta C = -\cos b \cdot \Delta A - \cos a \cdot \Delta B + \frac{1}{K} \sin B \sin A \cdot \Delta c.$$


$$\text{என நிறுவுக. } \left(K = \frac{\sin A}{\sin a} = \frac{\sin B}{\sin b} = \frac{\sin C}{\sin c} \right)$$

2. மண்ணுலகம்

(The Earth)

2-0 பால் மண்டலம் அல்லது ஆகாய கங்கை (The Milky Way)

சத்திரன் இல்லாத ஒரு கனங்கமந்த நன்னிலியே, ஓரியன் விண்மீன் கூட்டம் (The Constellation of Orion) ஏறக்குறைய உச்சியிலிருக்கும்போது வானத்தைப் பார்த்தால், வடமேற்கு இருந்து ஓரியன் கூட்டம்வரை பரந்து கிடக்கும் ஓர் ஒளி வெளியை (Expanse of Light) நாம் காணலாம். இந்த ஒளி வெளியிலே, மிகப்பல கூர்மையான ஒளி வீசும் விண்மீன்களும் சற்று மங்கலாக ஒளி வீசும் விண்மீன்களும் தோன்றும். இவ் வானவெளிக்குப் பால் மண்டலம் அல்லது ஆகாய கங்கை எனப் பெயர். படம் 2-1 இல் இப் பால் மண்டல அகம்மப்பு காட்டப்பட்டுக் கிடந்து.



படம் 2-1

2-1. இப் பால் மண்டலம் ஓர் அண்டம் (Galaxy) எனப்படும்.

இங் வண்டத்தைப் போல பல கோடிக்கணக்கான அண்டங்களும், ஒவ்வொரு அண்டத்திலும் பல கோடிக்கணக்கான விண்மீன்களும் உள்ளன. இங் வண்டங்கள் யாவும் சேர்த்தது பேரண்டம் (The Universe) எனப்படும்.

பால் மண்டலத்தில் வலது கோடியில் S என்ற இடத்தில் (படம் 2-1) சத்திரவன் ஒரு சாதாரண விண்மீன். சத்திரவனை

கத்தி ஒன்பது கோள்கள் குறிப்பிட்ட கால வட்டங்களில் சுற்றி வருகின்றன. ஆக கோள்களில் ஒன்று, இம் மண்ணுலகம். மற்ற கோள்கள், புதன், வெள்ளி, செவ்வாய், வியாழன், சனி, உரேனஸ் (Uranus), நெப்டியூன் (Neptune), புளூட்டோ (Pluto) எனப் பெயர் பெற்றவை; சுதிரலன் குடும்பம் எனப்படும். இக் கோள்களைப் பற்றிப் பின்னர் விவரமாக பார்ப்போம்.

2-2. இப்போது, சிறப்பாக, நாம் வானும் மண்ணுலகத்தையும் பார்ப்போம்.

இம் மண்ணுலகம் கோள வடிவமானது என இப்போது எல்லாரும் அறிவர். பார்ப்பதற்குத் தட்டையாகத் தோற்றம் இம் மண்ணுலகம் கோள வடிவமெனக் கூற என்ன சான்றுகள் உள்ளன? சான்றுகள் பல.

(1) இவ்வுலகத்தை நாம் சுற்றி வரலாம்; அதுவது ஒரு இடத்திலிருந்து புறப்பட்டு, ஒரே திசையில் போய்க்கொண்டிருக்கிறோம், திரும்பவும் நாம் புறப்பட்ட இடத்திற்கே வந்து சேர இவ்வுலகம். இம் மண்ணுலகம் கோள வடிவத்தில் இருப்பதால் நான் இது முடிவிறது. (தன்னத் தவிரவாகவே, அங்கு சில நண்பர்களுடனே உலகஞ் சுற்றுவது, தொன்றுதொட்டு மனிதனின் அஞ்சாதெஞ்சாததிற்கு ஒரு சான்று: அது ஒரு பொழுதுபோக்கும் கூட.)

(2) ஒரு துறைமுகத்தைவிட்டுச் செல்லும் கப்பலைப் பார்த்துக் கொண்டே இருக்கலாம். முதலில் கப்பலின் அடித்தளம் மறையும்; பின்னர் மேல் தளம், புகை போக்கி (பாய்மரக் கப்பலானின் பாய்மரங்கள்) படிப்படியாக மறையும். துறைமுகத்தை நோக்கி வரும் கப்பலைப் பார்த்தால், முதலில் கப்பலின் ஏகையோக்கியும், படிப்படியாக மேல்தளமும் தெரியும். ¹ கப்பல் எந்தத் திசையில் சென்றாலும், எந்தத் திசையிலிருந்து வந்தாலும் இக்காட்சியாறுதல்களைக் காணலாம். இதனால் மண்ணுலகம் கோள வடிவமென முடிவு வட்ட வேண்டியிருக்கிறது.

(3) நம் மூன்றோர்கள், பல்வேறு இடங்களில் விண்மீன்கள் எங்கொரு இடம் மாறிக் காட்சியளிக்கின்றனவென ஊன்றிக் கவனித்து, மண்ணுலகம் கோள வடிவமென்ற முடிவுக்கு வந்தனர்.

¹ இம் மண்ணுலகம் தட்டையாக விருத்தால், தூரத்திற் செல்வதெனக் கப்பல் சிறிதளமொன்றே போகுமென்பதால், எந்தத்திட்டமும், அங்கில் வரும் கப்பல், முதலில் சிறிதளம், பின்னர் கொஞ்சம் கொஞ்சமாகப் பெரிதாவத் தெரிவிக்க வேண்டும் பற்றிப்பகுதியாக விதிவு வட்டியாகிவருவது.

கிறப்பாக, ஒருவன் உலக நடு வரையிலுள்ள ஓர் இடத்திலிருந்து, வடக்கு நோக்கில் செல்லச்செல்ல துருவ நட்சத்திரம் வானத்தில் உயர்ந்து காட்சியளிக்கிறது. அவன் வட துருவத்திற்கே போனால் அது அவன் தலைக்கு நேர் உச்சியில் நோக்கும். இம் மண்ணுலகம் தட்டையாகவிருந்தால் அது துருவ நட்சத்திரம் எங்கிருந்து பார்த்தாலும் ஒரே உயரத்தில்தான் தெரியவேண்டும். இதுவும் மண்ணுலக கோள வடிவத்திற்குச் சான்றுகிறது.

(4) ஐம்பதுக்கு மேற்பட்ட மைல்கள் உயரத்தில் இராக் ரெட்டுகளிலிருந்து (Rocks) எடுக்கப்பட்ட புகைப்படங்கள் மண்ணுலக மேற் பரப்பு கோள வடிவப் பரப்பாக விருப்பதை நிரூபிப்பின்றன.

(5) சத்திரக் கிரகண சமயங்களில் சத்திரவின் மறைவுக்குக் காரணம் மண்ணுலகின் நிழல் சத்திரவின்மேல் படுவதாகும். அந்த நேரங்களிலெல்லாம் இத் நிழல் வட்டவடிவமாக விருக்கிறது. ஒரு கோள வடிவமான பொருளுக்குமட்டுமே வட்ட வடிவமான நிழல் உண்டு. ஒரு பத்தின் நிழலை வெண் கவரில் காண்க.

(6) வான வெளியில் சென்ற செயற்கைக் கோள்கள் எடுத்த புகைப் படங்கள் எல்லாம் இம் மண்ணுலகம் கோள வடிவ மாயிருக்கிற தென்பதை, ஐயத்திரியத, நமக்குக் காட்டுகின்றன.


2.2.1. இம் மண்ணுலகம் ஒரு கோள வடிவம் என்ற அடிப்படையில், மண்ணுலகத்தைப்பற்றிய மற்றும் சில விவரங்களைப் பாப்போம் :

(1) மண்ணுலக கோளத்தின் ஆரம் அல்லது அரை விட்டம் ஏறத்தாழ 3960 மைல் அல்லது 6385 கிலோ மீட்டர்.

மண்ணுலக மேற்பரப்பின்மேல் ஓசிடத்திற்கும் மற்றோசிடத்திற்கும் இடைப்பட்ட பெரு வட்ட தூரம், மேற்கூறிய அரை விட்ட அளவு கொண்டு கணக்கிடப்படுகிறது. ஒரு பெருவட்டத்தின் 1' (ஒருமணி - Minute) அளவுள்ள வில்வின் நீளம் ஒரு கடல் மைல் அல்லது நாவிக் மைல் (Nautical Mile) எனப்படும். அதன் அளவு 6050 அடி.

(2) உலகம் தனது ஒரு விட்டத்தை அச்சாகக் கொண்டு நானொருமுறை சுழன்று வருகிறது. (பின்னர் இதற்குரிய சான்றுகள் கொடுக்கப்பட்டிருக்கின்றன). அங் விட்டத்திற்கு துருவ அச்ச எனப் பெயர் (Polar axis of rotation).

(3) அங் வக்கின் முக்கை, வட துருவம் p , தென் துருவம் p' எனவும் குறிக்கப்படும். படம் 2-2-1 காண்க.



படம் 2-2-1

(4) மண்ணுடை மையம் வழியாக அங் வக்கக்குச் சென்றுத் தான தனம் வெட்டிக் கிடைக்கும் பெரு வட்ட வரம்புக்கோடு மண்ணுடைத்தின் 'நில நடுக்கோடு' அல்லது 'உடை நடுவரை' (Terrestrial Equator) எனப்படும். (இத்தனின் 'நடுவரை' அல்லது 'உடை நடுவரை' என்ற சொல்லையே பயன்படுத்துவோம்).

(5) அப் பெருவட்ட தளத்திற்கு ஒருபோகான தளக்களாக வெட்டப்படும் சிறுவட்ட வரம்புக் கோடுகள் அட்ச ரேகைகள் (Parallels of Latitude) எனப்படும். படம் 2-2-1 இல் AB , CD , $A'B'$, $C'D'$.

(6) இரு துருவங்கள் (p, p') வழியாகச் செல்லும் பெருவட்ட வரம்புக் கோடு தீக்க ரேகைகள் (Meridians of Longitude) எனப்படும். படம் 2-2-1 இல் ppp' , pnp' , pqp' .

7. மண்ணுடை மீள் இடத்தின் அகலங்கு (Latitude) என்பது, உடை நடுவரையிலிருந்து, குறிப்பிட்ட அங்விடம் வழியாகச் செல்லும் அட்சரேகையின் கோண தூரமாகும். A, T, B என்ற மூன்று இடங்களும் ஒரே அகலத்தில் உள்ளன; அந்த அகலங்கு = $\angle QOA$. (படம் 2-2-1).

நடுவரைக்கு வடக்கேயுள்ள இடங்கள் வடக்கு அகலங்கு, உடைவரை (North Latitude) என்றும், (அல்லது வடக்கு அகலங்கில் உள்ளவை) நடுவரைக்குத் தெற்கேயுள்ள இடங்கள்

தெற்கு அகலங்கு உடையவை (South Latitude) எனவும் கூறப்படும்.

நடுவரைநிலை இடங்கள் வரவும் 0° அகலங்கில் உள்ளன (0°):

p இன் அகலங்கு 90° வடக்கு ($90^\circ N$);

p'இன் அகலங்கு 90° தெற்கு ($90^\circ S$)

(8) நெட்டாங்கு (Longitude) அளக்கும் முறை

இங்கிலாந்தில் உள்ள கிரீனிச் (Greenwich) நகரம் வழிவாகச் செல்லும் தீர்க்கரேகையை ஆதிவாகக் கொண்டு, மற்ற இடங்களின் நெட்டாங்குகள் அளவிடப்படுகின்றன. கிரீனிச்சின் நெட்டாங்கு 0° ; கிரீனிச் நகரம் 0° தீர்க்கரேகையில் உள்ளது. படம் 2-2-1 இல் G என்பது கிரீனிச் நகரத்தைக் குறிக்கிறது. pGp' என்பது 0° தீர்க்கரேகை.

ஒர் இடத்தின் நெட்டாங்கு என்பது, கிரீனிச் வழிவாகச் செல்லும் தீர்க்கரேகைக்கும் குறிப்பிட்ட இடத்தின் வழிவாகச் செல்லும் தீர்க்க ரேகைக்கும், இடைப்பட்ட கோணமாகும். கிரீனிச்சுக்குக் கிழக்கேயுள்ள இடங்கள் 0° முதல் 180° கிழக்கு (0° to 180° East) நெட்டாங்கு பெற்றவை. பெனாலம், கிரீனிச் க்கு மேற்கேயுள்ள இடங்கள் 0° முதல் 180° மேற்கே (0° to 180° West) நெட்டாங்கு பெற்றவை.பெனவும் கூறப்படும். உலகம் முழுவதும் 0° முதல் 180° கிழக்கு வரையும் 0° முதல் 180° மேற்கு வரையும் நெட்டாங்குகளில் வந்துளிடும்.


குறிப்பு: அமெரிக்க ஐக்கிய நாடுகளின் தலைநகரான வாஷிங்டன் (U.S.A : Washington) வழிவாகச் செல்லும் தீர்க்கரேகையையும் 0° தீர்க்க ரேகையெனக் கொள்வதும் வழக்கில் வந்துள்ளது.

(9) மண்ணுவகையின் மேல் உள்ள ஓர் இடத்தை, அதன் அகலங்கு, நெட்டாங்கு கொண்டு இடம் குறிக்கலாமென நினைக்க ஆதினிகள்.

2-2-2. மண்ணுவகை மண்டலங்கள் — அட்சரேகை அடிப்படையில் (Zones of the Earth — Latitude basis)

மண்ணுவகையை ஒரு சரியான கோளமெனக் கொண்டு அதன் நடுவரையை நிலைக்கச் செய்த பின்பு, அட்சரேகைப்படி பெனவும் மண்டலங்கள் வழக்கிலுள்ளன. படம். 2-2-2 காண்க.

¹ 180° கிழக்கு தீர்க்க ரேகையும், 180° மேற்கு தீர்க்க ரேகையும் தீர்க்க ரேகையென்பதன் குறிப்புமேற்பது வேண்டும்.



படம் 2-2-2.

அகவாங்கிலை	மண்டலம்
0° முதல் 23 1/2° வடக்கு வரை	வடக்கு வெப்ப மண்டலம் (North Torrid Zone)
வ. 23 1/2° முதல் வ. 66 1/2° வரை	வடக்கு மீத வெப்ப மண்டலம் (North Temperate Zone)
வ. 66 1/2° முதல் வ. 90° வரை	வடக்குக் குளிர் மண்டலம் (North Frigid Zone)
0° முதல் தெற்கு 23 1/2° வரை	தெற்கு வெப்ப மண்டலம் (South Torrid Zone)
தெ. 23 1/2° முதல் தெ. 66 1/2° வரை	தெற்கு மீத வெப்ப மண்டலம் (South Temperate Zone)
தெ. 66 1/2° முதல் தெ. 90° வரை	தெற்குக் குளிர் மண்டலம் (South Frigid Zone)

வ. 23 1/2° அட்சரேகை—கடக ரேகைவென்றும்
(Tropic of Cancer),

வ. 66 1/2° அட்சரேகை—ஆர்க்டிக் வட்ட வென்றும்
(Arctic Circle),

அகவாங்கிலை,

தெ. 23 1/2° அட்சரேகை—மகரரேகை வென்றும்
(Tropic of Capricorn),

தெ. 66 1/2° அட்சரேகை—அண்டர்டிக் வட்ட வென்றும்
(Antarctic Circle).

பெயர் பெறும். இந்த ரேகைகள், ஒரு தட்ப பெயர்ப்பு மண்டலத்தை, மற்றொன்றினின்றும் பிரிக்கும் எல்லை ரேகைகள். இவை யாவும், சுழற்சியை வட்ட வரையாகே.

2.3. மண்ணுலகம் - தினசரிச் சுழற்சியும் ஆண்டு இயக்கமும். (The Earth - Diurnal Rotation and Annual Motion):

மண்ணுலகம், துருவ வழியாகத் தளது விட்டம் PP' ஐ, ஆச்சாகக் கொண்டு,¹ தினசரி ஒரு முழுக்சென்று தன்னைத்தானே சுழற்சி செய்கிறது. இதற்கு மண்ணுலகின் தினசரிச் சுழற்சி பெயர்ப்பு பெயர். இதன் விளைவாக இரவும் பகலும் மாறி மாறி வருகின்றன; மேலும் விண்மீன்கள் தேய்நீர் மதையும் காட்சி. களும் இத்தினசரிச் சுழற்சியின் விளைவாகும்.

இது மட்டுமன்றி, ஆண்டிற்கொருமுறை மண்ணுலகம், சுதரவணிக் சுழற்சிவருகிறது. இது வானடியக்கத்தின் (Annual motion) விளைவாகப் பருவங்கள் ஏற்படுகின்றன - இளவேனிற்காலம் (Spring), முதுவேனிற்காலம் (Summer), இலைபுதிர் காலம் (Autumn), மாரிக் காலம் (Winter). ஒவ்வொரு பருவமும் ஏறக்குறைய மூன்று மாதங்கள் நீடிக்கின்றன. ஆனால் ஒரு பருவத்திற்கும் மற்றொரு பருவத்திற்கும், சிறுசிறு கால வேறுபாடுகளுடன்தான். இது பின்னர் விளக்கப்படும்.

உலகம் தன்னைத் தானே சுழன்று வருகிறது எனக் கூற என்ன சான்றுகள் உண்டன? அச் சான்றுகள் சில, பின்னர் எடுத்துரைக்கப் படுகின்றன. அது மட்டுமன்றி, சில சோதனைகள். செங்கும், மண்ணுலகின் தினசரிச் சுழற்சி நிறுவப்பட்டிருக்கிறது. அவையும், பின்னர் விளக்கப் பட்டிருக்கின்றன.

மண்ணுலகச் சுழற்சிக் குரியசான்றுகள்

(1) மண்ணுலகச் சுழற்சி எம்பக் கூடியதாமிருக்கிறது :

மண்ணுலகம் ஒரு தாளில் தன் விட்டம் ஒன்றை ஆச்சாகக் கொண்டு, ஒரு முழுக்சென்று சுழல்கிறது என்ற வாதத்தைப்போற்றுக் கொண்டாக, மண்ணுலக நடுவணிகின் மேலுள்ள ஓர் இடம் (அகிலது ஒரு புள்ளி) அந்த 24 மணி நேரத்தில் ஏறக்குறைய $2\pi \times 3960$ மைல்கள், அதாவது ஒரு விநாடிக்கு 0.29 மைல் அகிலது 0.46 கி.மீ. வேகத்தில், ஓடுகின்றது. அப்புள்ளி 0 அகிலாக்கில் இருத்தாக, அதன் வேகம் விநாடிக்கு $0.29 \cos \phi$ மைல் (1.41 கால்கள்).

¹ அது என்ற உதரப்பட்டது ஒரு கம்பனை. அகிலாடுத் துருவங்கள், சுழற்சியைச் செங்கும் ஓர் உண்மையான அச்ச ஏழாகும்.

மரகத, மண்ணுலகம் நிலித்து நின்று, விண்மீன்கள் வள வெளியில் சுழல்கின்றன என்ற வாதத்தை யேற்றுக் கொண்டால், வெகு தூரத்திலுள்ள மிகப் பெரிய விண் மீன்கள், வினாடிக்கு இலட்சக் கணக்கான மைல்கள் வேகத்தில் ஓடுகின்றன என்ற முடிவை ஏற்கவேண்டும். மேலும், இம் முடிவை ஏற்றுக்கொண்டு, நிலித்த மண்ணுலகைச் சுற்றி இத்தனை விண் மீன்களும் இவ்வளவு வேகத்தில் சீராகச் சுழன்றுவெண்டிருந்தால், இச் சிறு உலகம், தான் நிலித்திருக்க, நமது சுத்பலிக்கு அப்பாற்பட்ட ஆற்றல் நிறைந்த ஈர்ப்புச் சக்தியைப் பெற்றிருக்கவேண்டும். இது இருக்க முடியாதெனவே நிலிக்கவேண்டியிருக்கிறது. எனவே, இரண்டாவது வாதம் பொருத்த வாதம் என்ற அடிப்படையில், விண் மீன்கள் நிலித்திருக்கின்றன வெனவும், மண்ணுலகம் தாலுக்கொருமுறை தன் விட்டமொன்றை அச்சாகக் கொண்டு சுழல்கிறது என்ற கொள்கையே பொருத்தமெனவும் தெரிகிறது; தம்பக்கடிய வகையிலும் அமைந்திருக்கிறது.

(2) விண்மீன்கள் சுழல்கின்றன என்ற கொள்கையால் ஏற்படும் சில சிக்கல்கள்:


இக் கொள்கையை ஏற்றால், வெய்யுவே தூரங்களில் அமைந்திருக்கும் விண் மீன்கள், ஒரு பெரிய ஆகாயக் கூண்டில் (அல்லது dome - விமானத்தில்) அமைப்பாவண்ணம் நிலித்துத்தப்பட்டு, அங்கிலை கூறு, ஏதோ ஒரு அச்ச மையங்கொண்டு, சீரான வேகத்தில் அகண்டாசாதத்தில் சுழல்கின்றது என்ற முடிவுக்குத் தான் வரவேண்டும். இந்த விண்மண்டல அமைப்பு ஒரு பொருத்தாக் கூற்றாக உள்ளதால் தான், மண்ணுலக திசைச் சுழற்சியை தாம் ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டியிருக்கிறது.

மேலும், அங்கிலை அமைப்பாவண்ணம் விண் மீன்கள் யாவும் ஓர் ஆகாயக் கூண்டில் நிலித்திருக்கவில்லை வெளிப்பதை வலியுறுத்த, ஒன்றையொன்றுகத்திக்கொண்டிருக்கும் இரட்டை மீன்கள் நமது அண்டத்திலிருப்பது போதிய சான்றுகூட.

எனவே, மண்ணுலகச் சுழற்சியே தாம் புரிந்துகொள்ளும் வகையில் விண் பொருள்கள் சுழன்றுவதும் தோற்றக் காட்சிகளை விளக்குகிறது.

(3) கோள்களோடு ஒப்பீடு: சுதிரவனும், சுதிரவனைச் சார்ந்த கோள்களும், சத்திரனும் தங்கன் தங்கன் மைய அச்சக்கள் கொண்டு சுழல்கின்றன எனத் தனிப்பட்ட ஆராய்ச்சிகள் நமக்குத் தெரிவிக்கின்றன. அதேபோல, தம் மண்ணுலகமும், தன் அச்ச மையங்கொண்டு சுழல்கிறது என்ற ஒத்த முடிவுக்கு தாம் வரலாம்.

(4) மண்ணுலக உருவம் காந்து: மண்ணுலகம் ஒரு சரியான கோளமாயிരിക്കும்; ஒரு தீர்வட்டக் கோளமாயிருக்கிற தெளத்தெளிக்கிறது (Oblate Spheroid). இவ்வுருவத்தின் துருவ விட்டம் 7800 மைல்; நடுவரை விட்டம் 7926-5 மைல். இவ்வுருவம், நடுவரைப் பக்கம் சற்று அகன்றும் துருவமுனைகள் அருகில் சற்று தட்டையாயும் உள்ளது. கிச்சலிப்பழம் போன்ற உருவம், படம் 3-8 காண்க.



படம் 3-8

இந்த விட்ட வேறுபாடுகள் கொண்ட உருவ அளவப்பு மண்ணுலகம் தன்னைத்தானே ஒரு மைய அச்ச கொண்டு சுற்றிக் கொண்டிருக்கிற மத்தேய் காண்க.

‘அலை’ கொண்டவையு, மண்ணுலகம் உருவானது கிளவருமது:

பல்கோடி யாண்டுகளுக்கு முன்பு, சுதிரவாரிடமிருந்து சிதறி வந்த ஒரு தீர்வெம்புக் கட்டியே மண்ணுலகமாக உருவாயிற்று. அப்படி, முதலில் ஒரு நெகிழ்பொருளாய்ச் சிதறி வந்த தீர்வெம்புக் கட்டி, கெட்டிப் பொருளாகும் வகையில் தன்னைத்தானே சுற்றிக் கொண்டிருந்தது.

பொதின இயல்பு, கோள வடிவத்திலுள்ள ஒரு நெகிழ்பொருள் தனது விட்ட மொன்றை அச்சாகக் கொண்டு, சுழன்று, கெட்டியாகிக் கொண்டே போகுகளாகும், அப்பொருள் அச்ச முனைகளுக்கருகில் தட்டையாவது இயல்பு.

அதே வகையில், மண்ணுலகம், தான் சுற்றும் அச்ச முனைப் பகுதிகளில் தட்டையாகி, நடுவரைப் பகுதியில் தீர்வட்ட வடிவமடைந்தது என்று முடிவுகட்ட இடமிருக்கிறது.

2.4: சோதனைகளிலும் மண்ணுடைச் சுழற்சி விழுவப்படக் (Experimental proofs for the earth's rotation)

இதுவரை நாம் மண்ணுடைச் சுழல்வதுதான் நம்பக் கூடியதாக விருக்கித்தொன்மும், எல்லாப்புறச் சான்றுகளும் அந்த நம்பிக்கையை உறுதிப்படுத்தும் வகையில் அமைந்திருக்கின்றன எனவும் கண்டோம்.

நேர்முகமாக, சோதனைகள் செய்வப்பட்டு, இச்சுழற்சி ஒருவாறு திறுவப்பட்டிருக்கிறது.

சோதனை (1): எறிபொருள் விசக்கங்கள் (The deviations of projectiles):

மண்ணுடைச் மேற்கிலிருந்து கிழக்கு நோக்கிச் சுழல்கிறது எனக் கொள்வோம். மண்ணுடைச் பரப்பிலுள்ள எல்லாம் சீரான தொகு கோண வேகத்தோடு சுழல்கின்றன. ஆனாலும், நடுவரை மேலுள்ள பொருள் மீட்பெரு நீர் வேகத்துடனும் (Linear Velocity) (வினாடிக்கு 0.29 மைல்), மற்றைய அட்ச ரேகையின் மேலுள்ள பொருள் சற்றுக் குறைவான நீர் வேகத்துடனும் செல்லும். (ஒ என்ற அகலங்கித்திரிய நீர் வேகம் வினாடிக்கு 0.29 Cos ϕ மைல்); [1.4.1; 2.8 (1) காண்க].²

நடுவரைக்கு வடக்கேயோ, தெற்கேயோ, உள்ள ஒரு குறியிலக்கை (mark) நோக்கி, நடுவரையிலிருந்து, ஒரு பொருளை எய்தால், அந்த எறிபொருள் குறியிலக்கத்தைத் தாண்டி, குறியிலக்குக்குக் கிழக்கே ஒரு புள்ளியில் விழும். எறிவப்பட்ட பொருள் மிகுந்த வேகத்தில் செல்லும் பகுதியிலிருந்து குறைந்த வேகத்தில் செல்லும் பகுதிக்குச் சென்று பாய்வதே இதற்குக் காரணமாகும்.

யானு நடுவரைக்கு வடக்கிலிருந்தோ, தெற்கிலிருந்தோ, ஓர் எறிபொருளை நடுவரை மேலேயேயுள்ள ஒரு குறியிலக்கை நோக்கி எய்தால், அறிபொருள் குறியிலக்கைச் சேராமல், அதற்கு மேற்கே புள்ள ஒரு புள்ளியில் விழும் : காரணம் முன் கூறிவந்தது நேர் மாறுதலாகும்.

² இது வட்டக்களின் ஆரங்கள் $r, R, r < R$ எனக் கொள்வோம். இங்கு வட்டக்கள்களின் மேல் சீரான பொருள் ω என்ற சீரான கோண வேகத்தோடு செல்கின்றன வேண்டி கொள்வோம். கீழ்க் வட்டக்கள்களில் செல்லும் பொருளின் நீர் வேகம் (Linear Velocity) rw ; மேல் வட்டக்கள்களில் செல்லும் பொருளின் நீர் வேகம் $R\omega, r < R$ எனக் கொள்ளப்பட்டதால் $r\omega < R\omega$ ஆகும். எனவே இது பொருள்கள்களும் சமமான கோண வேகம் ω ஆல் இருப்பினும், அதற்கின் நீர் வேகங்கள் இவ்வுரு எறிவான வட்டக்கள்களின் ஆரங்கள் வித்தத்தில் உள்ளன வேண்டி காண்க.

படங்கள் 2-4 (1) ம் 2-4 (2) ம், இவற்றை விளக்கும்.

மேலும், மண்ணுலக நடுவரைவை நோக்கி வீசும் வடகிழக்குத் -தென் கிழக்குத் தடக் காற்றுகள் (North-East and South-East Trade Winds) இதற்குச் சான்றாகும். இத்தடக்காற்றுகளின் விளக்கம் மண்ணுலகச் சமுத்திரவை மெய்ப்பிக்கிறது.



படம் 2-4 (1)



படம் 2-4 (2)

சோதனை 2: வீழ்பொருள் கீழ் விளக்கம்—நியூட்டன் சோதனை (The Easterly deviation of a falling body—Newton's Experiment)

மண்ணுலக நடுவரை மேலுள்ள ஓரிடத்தில் h உயரமுள்ள ஒரு கோபுரம் இருப்பதாக வைத்துக் கொள்வோம். அக்கோபுரத்தின் அடித்தளமும், உச்சித்தளமும் ஏறக்குறைய ஒரே பரப்புடைய தெளவும் கொள்வோம்.

மண்ணுலக ஆளா விட்டம் g ; கோண வேகம் ω . அப்போது h உயரமான கோபுர உச்சியில் உள்ள ஒரு பொருள் $(a+k)$ ω என்ற கிழக்கு நோக்கிய நீள் வேகத்தில் உலகத்தோடு செல்லும். அதைக் கீழே விழும்படி விட்டுவிட்டால் அதன் கிடைவேகமான $(a+k)\omega$ மாறாது. எனவே, கோபுரத்தின் பாதத்திலேயே விழாமல் அதற்கு அருகே சற்றுக் கிழக்குத் திசையில் விளகியுள்ள ஒரு இடத்தில் வியும் [ஏனெனில் கோபுரத்தின் பாதம் கிழக்கு நோக்கிச் செல்லும் வேகம் $\omega a < (a+k)\omega$].

இது நடுவரை மேலுள்ள ஓரிடத்தில் செய்ப்பபடும் சோதனை யின் பயனாகும்.

அல்லாது, ஒரு குறிப்பிட்ட அகலாகியுள்ள (ϕ) இடத்தில் இதேவிதமான சோதனை நடத்தினால், விழ்பொருள் கோபுர பாதத்திற்குச் சற்று தள்ளி, கிழக்கு விளக்கம் பெற்ற ஓரிடத்தில் வியும்.

அப்படி, விழும் பொருள், கற்று வழிபடக விழும்போது, கற்றின் எதிர்ப்பும் இருப்பதால், இக்கிழக்கு விசைக்கும் மிகச் சிறிய தாழ்வுக்கும்.


1681ம் ஆண்டு இச் சோதனை 500 அடி உயரத்தில் நடத்தப் பட்டபோது, கிழக்கு விசைக்கும் ஒரு அங்குலம் தான் இருந்ததெனக் கூறப்படுகிறது.

வெகு உயரத்திலிருந்து ஒரு பொருள் விழும்போது, ஏற்படும் இக்கிழக்கு விசைக்கும், மண்ணுலகத்தின் மேற்கு $\rightarrow$ கிழக்குச் சுழற்சிக்கு ஓர் சான்றாகும். இக்கிழக்கு விசைக்கும் மண்ணுலக சுழற்சியால்தான் விளிகின்றது என்பது தவிர, இவ் விசைக்கத்திற்கு வேறொரு காரணமும் காட்டமுடியாது.

சோதனை 3 (i): லு போகாஸ்ட் (Foucault) எப்படியின் ஊசலிச் சோதனை - சோதனைகளின் அடிப்படத் தத்துவம் (Foucault's Pendulum Experiment - the principle of the experiment):

இம் மண்ணுலகம் மேற்கிலிருந்து கிழக்காக வ என்ற கோண வேகத்தில் தன் ஊசலு கொண்டு சுழல்கின்றதெனவைத்துக் கொள்வோம். மண்ணுலக வட துருவத்தில் ஓர் ஊசலினைத் தொக்க விட்டு அதை ஊசலாட்சி செய்வோம். அது ஊசலாடும் திசைக்குத்துத் தளத்தில் (Vertical plane) வேறெந்த விசையும்

அதன் இயக்கத்தை மாற்றுவ தற்கில்லை; ஆகவே ஊச லாடும் தளம் மாறுகிடுக்கும். அதனடிவிலுள்ள மண்ணு லகம், வட - தென் துருவ அச்சை மையப் கொண்டு (pp') மேற்கு-கிழக்காகச் சுழல்கிறது. ஆகவே ஓம் வெகு தீர்க்க ரேகையைத் தாங்கும் தளமும் சுழன்று, ஊசலி, ஊசலாடும் தளத்தோடு இயைத்து, கின்னர் அகன்று போகும். படம். 2'4 (3).




படம் 2'4 (3)

ஊசலிக்குண்டியும் ஓர் ஊசலி பொருத்தப்பட்டு, ஆய்வுசரி ஓர் துருவத்தின் மேல் (p) வைக்கப்பட்ட ஒரு மணல் தூவிய தட்டில் வெகுவிய

கோடுகள் வரையுமாயின், அக்கோடுகள் யாவும், ஒன்றன்மீது ஒன்றாக வலங்குறியாகச் சமன்று, ஒரு நாட் பொழுதில் முதல் வரைந்த கோட்டுக்கே வந்து இயைந்துவிடும்.

சோதனை 3 (ii): இதே ஊசலிச் சோதனையை உலக நடு வரை (qr) மேலுள்ள ஓர் இடத்தில் செய்து, மணல் தட்டில் கோடுகளை வரையச் செய் தால், ஒரே ஒரு கோடு தான் கிடைக்கும். ஏனெ னில், ஊசலிக்குண்டு, மணல் தட்டு, காட்சியா ளன் எல்லாம் அப்படியே உலக நடு வரையீது நகர்த்து செல்லுகின்றன. படம் 2-4 (4) பார்க்க, ஊசலாடும்பொழுதுவதே யுமில்லை; ஊசல் முதலில் கிழித்த கோட்டின் மேலேயே திரும்பத் திரும்ப நகர்த்து அதே கோட்டைத்தான் வரை யும். எனவே மண்ணுல கம் தன்னைத்தானே சுற்று கிறதென்றும், தடுவரைத் தளத்திற்கு மேல் செங்குத் தாக அச்சுதற்க்க இருக்கிறதெனவும் ஊகிக்க இடமிருக்கிறது.



படம் 2-4 (4)

ஈ. பேலாகர்ட் செய்த சோதனையின் அடிப்படைத் தத்துவம் முன்னிரண்டு பத்திகளில் விளக்கப்பட்டது. ஆனால் அவர் அச்சோதனை செய்த இடம், பாரிஸ் நகரத்தில் உள்ள பான் தியன் (Pantheon) கட்டடமாலும், பாரிஸின் வடக்கு அகலங்கு $48^{\circ} 50'$. அக் கட்டடத்தின் விமானத்தினின்று (Dome) 200 அடி தளமுள்ள ஒரு மேல்மைய கம்பியின் துளியில் 80 பவுண்டு எடை யுள்ள குண்டுடன் அவர் ஒரு ஊசலியைத் தொங்கவிட்டார். குண்டை இழுத்துப் பிடித்து ஒரு பட்டு துறால் கவர்டன் கட்டி விட்டார். அக் துறல் எரித்தவுடனே, ஊசலி அங்குள்ள நிலைக் குத்துத் தளத்தில் ஊசலாயிற்று. தரைக்குச் சற்று உயரத்தில் தெக்கு - வடக்காக 12 அடி தூரத்திற்கு இப்படியும் அப்படியும் ஊசலியின் ஆட்டம் இருந்தது. இதே விட்டமுள்ள ஒரு வட்டமான தட்டத்தில் சீராக மணல் தூவப்பட்டு, அத்தட்டம் அங்குசலி யின் கீழே வைக்கப்பட்டது. ஊசலிக் குண்டின் அடியில்

பொருத்தப்பட்டிருந்த செவ்விய ஊசிமுனை, மணலில் பட்ட இடங்களில் கோடுகள் வரைத்துக்கொண்டேயிருந்தது. நேரம் செவ்வச் செவ்வ, அய்யூசி முனைபடும் இடங்கள் தட்டத்திலுள்ள மணல் பரப்பில் ஒரு வட்டவட்டவட்டத்தில் சுழன்று, செவ்வேறு கோடுகளை வரைந்தது. ஊசலியோ ஒரே தளத்தில் ஆடிக்கொண்டிருக்கிறது. கீழேயுள்ள இடம் நகராதிருத்தால், மணலில் ஒரே கோட்டின் மேல்தான் ஊசி முனைபடவேண்டும். ஆனால் கோடுகள் வட்டத்தில் வலஞ்சுழியாக ஊர்வதால், ஊசலியின் கீழேயுள்ள மண்ணுறாகம் இடஞ்சுழியாகச் சுழல்கிறது என்ற முடிவைத் தவிர வேறெந்த முடிவுக்கும் வரமுடியாது.

ஈ போனால், அக்கோடு திரும்பிய கோணத்தையும், திரும்ப எடுத்துக் கொண்ட நேரத்தையும் அளந்து, மீள்வழி நேரப்படி 1 மணிக்கு $11^{\circ}25'$ சுற்றுகிறதெனக் கணக்கிட்டார்.


$$\begin{aligned}\text{இத்தக் கோண வேகம்} &= 15^{\circ} \times \sin \phi \quad (\text{பூரில் அகலங்கு}) \\ &= 15^{\circ} \times \sin 45^{\circ}50' \\ &= 15^{\circ} \times \frac{1}{2} \\ &= 11^{\circ}25' \text{ எனப் பெறப்படுகிறது.}\end{aligned}$$

இக் கோண வேகம் கணித்த முறை:

படம் 2-4 (5) இல் A என்பது பூரில் நகரத்தை மண்ணுறாகின் பரப்பில் மேல் $45^{\circ}50'$ வ. அகலங்கில் இடங்குறிக்கிறது.

$\phi = 45^{\circ} 50'$ எனக் கொள்வோம்.

மண்ணுறாகம் $P'EP$ என்ற அச்ச வட்டங்கொண்டு மீள்வழி 1 மணிக்கு 15° வீதம் சீராகச் சுழல்கிறது. அக்கோண வேகத்தை EB , EA என்ற திசைகளில் பிரித்தால், முறையே $15 \cos \phi$, $15 \sin \phi$ எனக் கிடைக்கும். எனவே, ஊசலி, இரூக்கும் தளம் EA ஐ போட்டி, $15 \sin \phi$ என்ற கோண வேகத்தில் சுழல்கிறதெனப் பெறப்படும். எனவே, மணல் தட்டில் வரையப்படும் ஊசிக் கோட்டின் கோணவேகம்



படம் 2-4 (5)

$15 \sin \phi = 15 \times \frac{3}{4} = 11.25$ ஆகும்.

எனவாடும் தளம் சுழலியது, மண்ணுலகச் சுழற்சியை உறுதிப் படுத்துகிறது.

$$\begin{aligned} \text{முழுச் சுழல்காலம்} &= \frac{860}{15 \sin \phi} \\ &= \frac{860 \times 4}{45} \\ &= 32 \text{ மின்வழி மணிகள்.} \end{aligned}$$

பயிற்சி :

எடுத்துக் காட்டு 1 : மண்ணுலக நடுவரை மேலுள்ள ஓர் இடத்தில் 1 மைல் உயரத்திலிருந்து கிழே விழும் பொருளின் கிழக்கு வீலக்கம் என்ன ?

மண்ணுலக ஆரவரிட்டம் 3960 மைல் எனக் கொள்வோம்.

பொருள் ஒரு மைல் உயரத்திலிருந்து விழுகிறது.

எனவே அப்பொருள் விழுவதற்குமுன், அதன் கிடைவேகம் $= (3960 + 1)y$. இங்கு y என்பது மண்ணுலகச் கோணவேகம் (ஆரவரன் ஆலகல்).

$$\begin{aligned} \text{எனவே அதன் கிடைவேகம்} &= \frac{3961 \times 15 \times \pi}{150} \\ &= \frac{3961 \pi}{12} \text{ மைல்} \\ &\quad \text{(மணிக்கு)} \end{aligned}$$

நடுவரை மேல் நிலப் பரப்பிலுள்ள ஓர் இடத்தின் கிடை

$$\text{வேகம்} = \frac{3960 \pi}{12} \text{ மைல் (மணிக்கு)}$$

∴ ஒரு மணிக்குக் கிழக்கு வீலக்கம்

$$= \frac{3961 \pi}{12} - \frac{3960 \pi}{12} = \frac{\pi}{12} \text{ மைல்.}$$

3250 ஆடி உயரத்திலிருந்து அப்பொருள் விழ எடுத்துக் கொள்ளும் நேரம்

$$\begin{aligned} &= \sqrt{\frac{2 \times 3250}{32}} \quad \left[S = \frac{1}{2} at^2 \right] \\ &= \sqrt{850} \end{aligned}$$

= 18.17 விநாடிகள்.

∴ 18.17 விநாடிகளில் ஏற்படும்

$$\begin{aligned} \text{கிழக்கு விசை} &= \frac{18.17 \times 8.14 \times 6250 \times 12}{12 \times 60 \times 60} \text{ அங்குலம்} \\ &= 84 \text{ அங்குலம்.} \end{aligned}$$

ஏறக்குறைய 7 அடி கிழக்கு விசை மிடுக்கும்.

எடுத்துக்காட்டு 2: ஓர் ஊரில் 30° அகலங்குள்ள ஓரிடத்தில் ஊரவாடுகிறது. ஊரவாடும் தளம் ஒரு முழுச் சுற்றை சுற்ற எவ்வளவு நேரமாகும்?

$$\begin{aligned} 30^\circ \text{ அகலங்கில் ஊரவாடும் தளத்தின் கோண வேகம்} \\ &= 15 \sin 30^\circ \\ &= 7\frac{1}{2} \text{ (மணிக்கு)} \end{aligned}$$

எனவே முழுச் சுற்றுக்கு $\frac{8640}{7\frac{1}{2}} = 48$ மணி (மீள்வழி) நேரமாகும்.

பயிற்சி 2

1. இரு கப்பல்கள் முறையே $45^\circ N$, $15^\circ S$ அட்ச ரேகைகளின்மேல், எப்போதும் ஒரே திசைரேகையில் இருக்கும் வகையில் செல்குகின்றன. முதற்கப்பல் 15 மாலாடு மைல் வேகத்தில் சென்றால், இரண்டாவது கப்பலின் வேகம் காண்க.

$$\left[\text{குறிப்பு: } \frac{15}{\text{வேகம்}} = \frac{\cos 45^\circ}{\cos 15^\circ} \right]$$

2. இரு கப்பல்கள் ஒரே திசை ரேகையின் மேலுள்ள இடங்களில் நிற்கின்றன. ஆனால் ஒன்று $45^\circ N$ அகலங்கிலும், மற்றொன்று $15^\circ S$ அகலங்கிலும் இருக்கின்றன. இரு கப்பல்களுக்கு மிகைப்பட்ட மீச்சிற தூரம் என்ன? (மண்ணுலக அரைவிட்டம் 8000 மைல்.)

3. A, B என்ற இரு இடங்கள் முறையே உலக நடுவரையின் மேலும், $15^\circ S$ அகலங்கிலும் உள்ளன. அவற்றின் தொட்டாங்கு வேறுபாடு 15° . கோளப்பரப்பின்மேல் AB இன் மீச்சிற அளவு 1000 ($2 + \sqrt{3}$) மைல் என நிறுபுக. (மண்ணுலக அரைவிட்டம் 4000 மைல்.)

4. ஒரு கம்பம் ABC என்ற பெருவட்டத்தின்மேல் சென்று கொண்டேயிருக்கிறது. A, B, C -இன் அகலங்களுக்கள் முறையே ϕ_1, ϕ_2, ϕ_3 ; $AB = BC = x$ ஆனால்,

$$x = R \cos^{-1} \left[\frac{\sin \phi_1 + \sin \phi_2}{2 \sin \phi_3} \right] \text{ என நிறுவுக.}$$

(R என்பது மன்னுலக அரைவட்டம்)

[குறிப்பு p மன்னுலக வட்டவருவமெனின்,
 $\cos pA = \sin \phi_1 = \cos pB \cos AB + \sin pB \sin AB \cos pBA$,
 $\cos pC = \sin \phi_2 = \cos pB \cos BC + \sin pB \sin BC \cos pBC$,
 $x = AB = BC$ (கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது.)

$$\angle pBA = 180^\circ - \angle pBC$$

$\therefore$ இது சமன்பாடுகளையும் கூட்டி,

$$\sin \phi_1 + \sin \phi_2 = 2 \cos pB \cos x \quad (\because \cos pBA = -\cos pBC)]$$

$$= 2 \sin \phi_3 \cos x$$

$$\therefore x = \cos^{-1} \left[\frac{\sin \phi_1 + \sin \phi_2}{2 \sin \phi_3} \right]$$

இது கோண விலக்கவு.

$\therefore$ x ன் நீட்டல் அளவு

$$= R \cos^{-1} \left[\frac{\sin \phi_1 + \sin \phi_2}{2 \sin \phi_3} \right]$$

5. மன்னுலகம் பரப்பின்மேல் ϕ என்ற அகலத்தில் A, B இருக்கின்றன. அவ்வீடங்களின் தொட்டாங்கு வேறுபாடு $2l$. AB என்ற பெருவட்டம், உலக கோளத்தை வெட்டிக் கிடைக்கப் படும் மீட்டுபெரு அகலங்கு $\tan^{-1} (\tan \phi \sec l)$ என நிறுவுக. AB என்ற சிறுவட்ட வில்லுக்கும் AB என்ற பெருவட்ட வில்லுக்கும் உட்கு வேறுபாடு,

$$2 \operatorname{cosec} l \left[l \cos \phi - \sin^{-1} (\sin l \cos \phi) \right]$$

மாண்பு விலக்கள் என நிறுவுக.

6. மண்ணுலகை நடுவரை மேலுள்ள ஓர் இடத்தில் 1 கி. மீ. உயரத்திலிருந்து கீழே விழும்பொருளின் கீழ்க்கு விவக்கமென்ன? (உலக விட்டம்: (18760 கி. மீ.)

7. ஒரு ஊசல் 80° அகலங்களின் ஓரிடத்தில் ஊசலாடுகிறது. ஊசலும் தளம் ஒரு சுற்றுச் சுற்ற எல்லையு நேரமாகும்?

2.5. மண்ணுலகம்—கதிரவன் தொடர்பு (The Earth in Relation to the Sun).

விண்வெளிப் பொருள்களுள் நமக்கு மிகுந்த தொடர்புடையது கதிரவனாகும். ஏனெனில் கதிரவன் ஒளியும் வெப்பமும் மண்ணுலகை வழிவிற்கு இன்றியமையாதவை. பண்டைக் காலத்தில், உலகில் பரிநாட்டவரும் (எகிப்து, கிரீஸ், சாஸ்து, இந்தியா) கதிரவனை ஒரு கடவுளாக வழிபட்டனர். சூரிய நமஸ்காரம், இன்றும் இந்தியாவில் ஒரு வழிபாட்டு முறை :


‘ ஞாயிறு போற்றுகும், ஞாயிறு போற்றுகும்,
காவிரி நாடன் திகிர்போகும், பொற்கோட்டு
மேருவைத் திரிதவான் ’

என்பது சிலப்பதிகாரப் பாடல்.

ஆளுதும் அது, சிம்னாண்டமான பால்வழியண்டத்தில் ஒரு சாதாரண விண்மீன் என நாம் அறிகிறோம். அது நமக்கு மிக அண்மையிலிருப்பதால், அது நமக்கு மற் ற விண்மீன்களைவிடப் பெரிதாகத் தெரிகிறது.


மற்றும் நம்மைப் பொறுத்தமட்டில் கதிரவன் தனிச் சிறப்பு யாதெனின், மண்ணுலகம் ஆண்டுதோறும் கதிரவனை ஒரு தீன் வட்டத்தில் சுற்றி வருதலாகும். பின்னர் (பகுதி 12-இல்) செப்டர் விதிவன் என்ற பகுதியில், எக்கோடிகாண்டுகளுக்குட்பட்டு மண்ணுலகம் கதிரவனைச் சுற்றி வருகிறதெனப் பார்ப்போம் :

உண்மையாக மண்ணுலகமானது கதிரவனை ஆண்டுதோறும் சுற்றி வருகிறதாயினும், விண் மீன்கள் பின்னணிப்பில் (in the background of the stars) கதிரவன் மண்ணுலகத்தை, ஆண்டுக் கொஞ்ஞத சுற்றிவருவதுபோல நமக்குத் தோற்றுகிறது. இத் தோற்றத்திற்குக் காரணம் பின்வரும் படிகளாகக் ஒரு சிற்று விளக்கம் பெறும்.



உள்நுழைவு

படம் 2-5 (i)



தோற்ற விலகல்

படம் 2-5 (ii)

$E_1, E_2, E_3, \dots, E_7$ உள் மண்ணுலகத்தைக் குறிக்கின்றன.

$S_1, S_2, S_3, \dots, S_7$ உள் அதிர்வலைக் குறிக்கின்றன.

மண்ணுலகம் அதிர்வலைக்கற்றி வருகிறது என்ற அடிப்படையில், மண்ணுலகத்தின் நிலை, அண்டவெளியில் மாறிக்கொண்டிருக்கும்.

படம் 2-5 (i) இல் S, நிலைத்த அதிர்வலைக் குறிக்கிறது. சுற்றி வரும் உலகம், அதன் பயணவீதியில் $E_1, E_2, \dots$ என்ற இடங்களில் போய்வேறு காலங்களில் இருக்கும். $E_1 S, E_2 S, \dots$ என்பவை மண்ணுலகத்திலிருந்து அதிர்வலை இருக்கும் திசைகளை அளவக்காலங்களில் குறிக்கும்.

ஆனால் நாம் மண்ணுலகிலிருந்து அதிர்வலைப் பார்ப்பதால், நாம் நிலைத்திருப்பதுபோலவும் அதிர்வலை நம்மைச்சுற்றி ஒரு நீள் கூட்டத்தில் வருவதுபோலவும் தோற்றமளிக்கும்.

படம் 2-5 (ii) இல், மண்ணுலகிலிருந்து, அதிர்வலை சுற்றி வரும் தோற்றம் காட்டப்பட்டுள்ளது.

$$E_1 S \parallel E_2 S; \dots$$

இருபடங்களும், ஒன்றுக்கொன்று சர்ப்புடையவை. $E_1, E_2, \dots, E_7$ என்ற மண்ணுலக நிலைகளைச் சார்ந்த வண்ணம் $S_1, S_2, \dots, S_7$ என தோற்றக் அதிர்வலை நிலைகள் உள்ளன.

2-5. நாம் மண்ணுலகில் அணும வானக்காட்சிகள் யாவும்,

(i) மண்ணுலக திளர்ச்சி கழற்சி;

(ii) மண்ணுலகம் ஓராண்டு காலகூட்டத்தில் அதிர்வலைச் சுற்றி வரும் ஆண்டுவாக்கம் என்ற இரு இயக்கங்களின் கூட்டு விளைவாக நமக்குக் கிடைக்கும் தோற்றக்காட்சிகளாகும்.

மேலும் மண்ணுலகம்பற்றிய வேறு சில விவரங்கள் 'அதிர்வலை குடும்பம்' என்ற பகுதியில் காண்க.

3. வான கோளம்

(The Celestial Sphere)

3-0. வானத்தில் விண்மீன்களைப் பார்க்கும் ஒருவனுக்கு, அவையாவும் ஏறக்குறைய ஒரே உயரத்தில் (தூரத்தில்) இருப்பதாகவும் ஒரு விண்மீனுக்கும் மற்றொன்றுக்கும் உள்ள இடைவெளி சிறியதாக இருப்பதுபோலவும் தோன்றுகின்றன. ஏதோ அளவான வெளியில் ஊசி, வீசி எறிவப்பட்டு அங்கே ஒரு கோளப்பரப் பின்மேல் பதிக்கப்பட்டிருப்பதுபோல ஒரு எழிற்காட்சி தோற்றமளிக்கிறது. கொஞ்சநேரம் அவன் இவ்விவத்தை காட்சியைத் தொடர்ந்து உற்று நோக்கிக்கொண்டே இருப்பானாயின், அவன் சில மாறுதல்களைக் காண்கிறான். தனக்கு ஒரு புறமிருக்கும் தொடு வானத்திற்குக் கீழே ஒரு சில விண்மீன்கள் சென்று மறைத்துவிட்டதுபோலவும் மற்றொரு புறமிருக்கும் தொடுவானத்திற்குக் கீழ் ஓத்து ஒரு சில புதித விண்மீன்கள் தன் காட்சிக்கு வந்திருப்பது போலவும், மற்றவை இடம் பெயர்த்து இருப்பதுபோலவும் அவனுக்குத் தோன்றுகிறது. இன்னும் சற்று உற்று நோக்கியல் இடம் பெயர்த்து காட்சியளிக்கும் விண்மீன்கள் தங்களுக்கு இடைப்பட்ட தூரங்கள் மாறாமலே இடம் பெயர்த்திருப்பதுபோலவும் அவனுக்குத் தோன்றுகிறது.

3-1. இக்காட்சியைக் காணும் அவன் பின்வரும் முடிவுக்கு வரான் :

‘தன்னால் கற்றியிருக்கும் ஒரு கோளப்பகுதி, விண்மீன்கள் பலவற்றையும் தாங்கிக்கொண்டு அப்படியே அவற்றின் நிலையாகுது ஏதோ ஒரு அச்சை (axis) சுழல்கொண்டு சுழல்கிறது. ஏதாவது ஒரீண்டு விண்மீன்கள் தம் நிலை பெயராமல் இருந்த இடத்தையே இருக்குமானால், அத்தத் திசையில்தான் அக்கோளத்தின் சுழல்ச்ச இருக்கவேண்டும்; தோற்றம் அப்படித்தான். ஆனால் இம்

மண்ணுலகம் தன் துருவ அச்ச மையம் கொண்டு, தன்னைத் தானே தானுக்கு ஒரு முறை சுற்றிக்கொண்டிருக்கிறது என்ற உண்மை அலுனுக்குத் தெரியுமாதலின், இவ்வின்னமீன்கள் தோன்றி இடம் பெயர்ந்து மறையும் காட்சிகள் வரவும், மண்ணுலக திணை சமுத்திர சின் விளைவாக ஏற்படும் தோற்றமேதன்றி, உண்மையல்ல என்று அவன் அறிந்து கொள்கிறான்


எனினும், அவன் கண்ணும் தோற்றக்காட்சிகளின் அடிப்படையில் தன்னை மையமாகக் கொண்ட, ஒரு சுற்பனைக் கோளத்தின் மேல், விண்மீன்களை வெவ்வேறு பதித்துப் பார்க்கணமென்ற எண்ணம் அவன் உள்ளத்தில் உருவாயின், அக்கற்பனைக் கோளம் அவன் வானியல் அறிவு பெற முற்படுவதற்கு முதற்படியாகும்.

3-1-1. அப்படியாகக் காட்சியளவின் மையம்கொண்டு சுற்பனை செவ்வர்ப்படும் ஒரு பெரிய கோளமே வான கோளம் (Celestial Sphere) எனப்படும். இப்படிப்பட்ட கோளம் எதுவும் உண்மையின்கிடா. ஆனாலும் இக்கற்பனைக் கோளம் வானியலில் அடிப்படையான முக்கியத்துவம் வாய்ந்தது.

குறிப்பு: இத்த முக்கியத்துவம் அமைவதற்குக் காரணம் 'கோளத்தில் நாம் அளக்கும் அளவுகள் வரவும் கோள அளவுகள் தான் என 'கோணம்' என்ற பகுதியில் பார்த்திருக்கிறோம். வானியல் ஆராய்ச்சியில் அளவுகள், தூரத்தின் (Linear distance) அடிப்படையில் அளக்கப்படுவதில்லை; அளவுகள், கோளத்தின் (angle) அடிப்படையில் அளக்கப்படுகின்றன. இது விண்மீன்கள் நம்மிடமிருந்து எவ்வளவு தூரத்திலிருந்தாலும் அவைகளுக்கு இடைப்பட்ட தூரம் 5° என்றோ x° என்றோதான் கூறுவோம். அதாவது அவ்விரு விண்மீன்களையும் காட்சியாளனோடு இணைக்கும் நேர்க்கோடுகள் ஒன்றுக்கொன்று 5° அளவில் அல்லது x° அளவில் சாய்ந்திருக்கிறது என்பது இதன் பொருள். அவ்விரு விண்மீன்கள் எவ்வளவு வேறுபட்ட தூரத்தில் (நீட்டலளவை—linear distance) இருந்தபோதிலும், முன்கூறிய கோண அளவை நாம் கருவி கொண்டு அளந்துவிடமுடியும்.

3-1-2. இத்தக் சுற்பனை வானகோளத்தின்மேல்நான், காட்சியளவின் விண்பொருள்கள் பாவத்தையும் இடங்குறித்து, தனது வானியல் ஆராய்ச்சியைத் தொடங்குகிறான். தன்னையும் விண்பொருள் மையத்தையும் இணைக்கும் நேர்கோடு, எத்த இடத்தில் தன்னுடைய கோளத்தின் மேற்பரப்பை வெட்டுகிறதோ அப்புகளியில் அக்காட்சியாளனுக்கு அவ்விண் பொருளின் இடத்தைக் குறிக்க

கிறது. அப்படி இடங்குறிக்கப்பட்ட வானகோளமே, அக்காட்சி வானத்து விண் பொருள் பட. ஓடு (Atlas of Celestial Object).



படம் 3-1-2

மேற்கண்ட படம் 3-1-2 குறிப்பது ஒரு வான கோளம், அக்காட்சிவானம் இருக்குமிடம் அதன் மையம் O; A, B, C மூன்று விண்மீன்கள் உலகத்திலிருந்து வெவ்வேறு தூரங்களில் உள்ளன. OA, OB, OC என்பவை, வானகோளத்தை மூன்றே a, b, c என்ற புள்ளிகளில் வெட்டுகின்றன. O என்ற மையத்திலிருக்கும் அக்கிவானத்துக்கு அவனுடைய வான கோளத்தின்மேல் a, b, c என்ற புள்ளிகள் A, B, C என்ற விண்மீன்களை இடங்குறித்து நிிற்கின்றன. Bக்கும் Cக்கும் உள்ள தூரம் BOC என்று அளவிடப்படுகிறது. (bc ஒரு பெரு வட்டமில்). கதிரவன் (அல்லது சந்திரன்) DF-யிலுத்தான் வானகோளத்தின்மேல் df என அது இடங்குறிக்கப்படுகிறது.

3-2: வான கோளத்தின் ஆரம் (Radius of the Celestial sphere):


வான கோளத்தின் ஆரம் எதுவாக இருப்பினும் இருக்கலாம்-100 மீட்டர் அல்லது 10^{100} மீட்டர்கள். ஆனால் வான கோள ஆரம் கதிரவனுக்கும் பூமிக்கும் உள்ள தூரத்தைப்போல (93×10^6 மைல்கள் = 149.5×10^6 கி. மீட்டர்) பன்மடங்கு பெரிதாகக்கொள்வது மரபு. அப்போது பன்னாளுக்கமே அங்ஙனம் கோளத்தின்

தடுவில் ஒரு புள்ளி (மையம்) எனக்கொள்ளுமளவிற்குச் சிறியதாக விருக்கும். எனவே மண்ணுலகில் எப்பகுதியில் காட்சியாளன் இருப்பினும் அவன் வானத்தின் மையத்தில் இருப்பதாகக்கொள்ளலாம். ஒரு குறிப்பிட்ட விண்மீன் எப்பகுதியில் உள்ள காட்சியாளருக்கு இணைத்தாலும், அந்தக்கோடு, வான கோளத்தை ஒரேபுள்ளியில் செட்டுமெனவும் கொள்ளலாம். குறிப்பிட்ட திசைகளில் உள்ள நோக்கோடுகள் வரவும், வானகோளத்தில் இடம்பெறும், அவை செட்டுமீடங்கனும் திசைத்தலைவராகும். (Sir Harold Spencer Jones : *General Astronomy*—Chapter I Page I காண்க.)

பெருதிற்பு II என்பதைப் பார்க்கவும்.

3.3 : வானத் தொடுவானம் (The Celestial Horizon)

வான கோள மையம் O. ஆங்கு காட்சியாளன் இருக்கிறான். ஆவ்விடத்தில் தொங்கவிடப்படும் குண்டுதூக் (Plumb line), திசைக்கோடு, ZOZ 'எனக்கொள்க. ஒப்பிவாக ZOZ' ஐத் தவறு செய்குத்துக் கோடாகக்கொண்ட தளம் ஆவ்விடத்திற்குரிய தொடுவான தளம் (Plane of the Celestial Horizon) எனப்படும். படம் 3-3: காண்க.



படம் 3.3

இத்தொடுவான தளம், காட்சியாளனின் வானகோளத்தை வெட்டு முகமான NSO என்றபெருங்கட்டம் ஆகும். இது வானத் தொடு வானம் (Celestial Horizon) எனப்படும்.

O -இன் வழியாக வரையப்படும் கிடைத்தளம் (horizontal plane) தொடுவான தளம் என்றும் கூறலாம்.

O -இன் வழியாக மண்ணுலக கோளத்திற்கு வரையப்படும் தொடுவரைத்தளத்தையும் (Tangent plane) தொடுவான தளமெனக் கொள்ளலாம். (பித்தூதிப்பு II அணுக.) எல்லாம் NS^2 என்ற தொடுவானப் பெருவட்டத்தையே கொடுக்கும்.

ZOZ' என்ற கோடு தீட்டப்பட்டு வான கோளத்தைக் காட்சி யளவன் தலைக்குமேல் வெட்டுமிடம் Z , வான தேர் உச்சிப்புள்ளி (zenith) எனவும், கால் பக்கம் வெட்டுமிடம் Z' , வானதேர்க் கீழ்புள்ளி (Nadir) எனவும் கூறப்படும். (செங்கக் கூறின் O வழியாக வரையப்படும் தேர்க்குத்துக்கோடு (Vertical line) தலைக்குமேல் வான கோளத்தை வெட்டுமிடம் Z , கீழே வெட்டுமிடம் Z' .)

வானகோளம் — கிடைத்த புள்ளிகளும், கிடைத்த பெருவட்டம் — கூறும்:

[1-3, 1-8 இல் தாம் கண்ட கோளப்பண்புகளை ஒரு முறை பார்த்துக் கொள்க.]


pp' என்ற துருவ மையம் கொண்டு இம்மண்ணுலகம் நானொரு முறை தன்னைத் தானே சுற்றிக்கொள்கிறதென தாம் ஆற்றினோம். இவ்வகக்கு இணையாக வான கோள மையம் O வழியாக, ஒரு அச்ச POP' எடுத்துக்கொள்ளோம். இவ்வக வான கோளத்தை P , P' என்ற இரு புள்ளிகளில் வெட்டும். P என்பது வான வட துருவம் (Celestial North Pole), P' என்பது வான தென் துருவம் (Celestial South Pole) எனவும் கூறப்படும். O வழியாக POP' ஐ செங்குத்துக் கோடாகக்கொண்ட தளம் வான கோளத்தை வெட்டு முகம் ஒருபெரு வட்டம் QR எனக் கிடைக்கும். இப்பெருவட்டம் வானநடுவரை (Celestial Equator) எனப்படும்.

குறிப்பு: $pp' \parallel PP'$

எனவே வான நடுவரைத்தளம் qr வான நடுவரைத்தளம் QR . (பித்தூதிப்பு II அணுக.)

3-4 : மண்ணுலகப் பரப்பின்மேல் O என்ற இடத்திலுள்ள காட்சியாளனது வான கோளத்தை எடுத்துக்கொள்வோம்.

இதுவரை வானகோளத்தின்மேல் உள்ள புள்ளிகள், பெருவட்டங்கள் வரவும் மின்னாணும் வட்டங்களில் படம் கொண்டு விளக்கப்படுகிறது.



படம் 3-4

படம் 3-4 கொண்டு பார்க்கவும் :

புள்ளி பெருவட்டம்	பெயர்	விளக்கம்
புள்ளி O	கோளமையம்	காட்சியாளன் இருக்கும் இடம்/மண்ணுலகம்.
புள்ளி Z	(வான) உச்சி (celestial zenith)	O க்கு நேரே உச்சியில் உள்ள வான கோள உச்சிப்புள்ளி Z கருக்கமாக உச்சி எனப்படும். OZ - குண்டுதூக்கு.

புள்ளி பெருவட்டம்	பெயர்	விளக்கம்
புள்ளி Z' பெருவட்டம் NSo	வான கீழ்ப்புள்ளி (Celestial Nadir) OZ' -புவி சுழல்பச் சக்தியின் திசை தொடுவானம்	உச்சிக்கு நேர்க்கிழான வான கோளப் புள்ளி Z' எனப் பெர்த் கீழ்ப் புள்ளி, கருக்கவாக, கீழ்ப் புள்ளி எனப் பெரும். ZZ' என்பது NSo என்ற பெருவட்டத்தின் அச்சு, Z, Z' என்பவை NSo ன் துருவங்கள்.
புள்ளி P பெருவட்டம் QR	வான நடுவரைத் துருவம்(I) வட்டக்கு	மண் ணு வ க ம் தன்னைத் நானே க த் தி க் கொள்ளும் அச்சான pp' க்கு இணை கோடான p'' .
புள்ளி P' பெருவட்டம் QR	வான நடுவரைத் துருவம்(II) தெற்கு வான நடுவரை	வான கோளத்தை வெட்டு மீட்டங்கள். PP' என்பது QR என்ற பெரு வட்டத்தின் அச்சு. P, P' என்பவை QR ன் துரு வங்கள். QR மண்ணுலக நடுவரை p''

மற்றும் சில வரையறைகள்

நிலைக்குத்து வட்டங்கள் (Vertical circles): உச்சி, கீழ்ப்
புள்ளி (Z, Z') என்ற இருபுள்ளிகள் வழியாகச் செல்லும் பெரு
வட்டங்கள் 'நிலைக்குத்து வட்டங்கள்' எனப்படும். அவையாவும்
தொடுவானத்திற்குச் செங்குத்தாக விருக்கும்.

[படம் 8-4: பெருவட்டம் $ZSMZ'$ (முதலிலே வட்டமான
தொடுவானத்திற்குத் துணைக்குத்து வட்டம்)]

உச்சி வட்டம் (Meridian)

உச்சி, ஒரு துருவம் புள்ளி ($Z, p(p')$) வழியாகச் செல்லும்
பெருவட்டம், உச்சி வட்டம் எனப்படும்.

[படம் 8-4: பெருவட்டம் $ZpZ'p'$]

மூலக்குத்து வட்டம் (Prime Vertical): உச்சி வழியாக உச்சி
வட்டத்திற்குச் செங்குத்தாக இருக்கும் பெருவட்டம் மூலக்குத்து
வட்டமெனப்படும். இது Z, Z' வழியாகச் செல்லும் [படம் 8-4
பெருவட்டம் $ZEZ'W$].

வடக்கு, தெற்கு, கிழக்கு, மேற்குப்புள்ளிகள்

உச்சி வட்டமும், தொடுவானமும் வெட்டிக்கொள்ளும்
இடங்கள் N, So முறையே வடப்புள்ளி, தென்புள்ளி யெனவும்;
மூலக்குத்து வட்டமும், தொடுவானமும் வெட்டிக் கொள்ளும்
இடங்கள் E, W முறையே கிழக்குப்புள்ளி, மேற்குப்புள்ளி யென
வும் அமைபும். [படம் 8-4: காண்க] இத்தரங்கு புள்ளிகள்
 N, So, E, W என கோளத்தின் தலைவாய் புள்ளிகள் (Cardinal
points) எனப்படும்.

வீண்வரும் குறிப்புக்கள் கவனத்திற்குரியன

1. வான உச்சி வட்டம், மூலக்குத்து வட்டம் இரண்டும் தொடுவானத்திற்குச் செங்குத்தானவை.

2. E, W என்பவை உச்சி வட்டத்தின் துருவங்கள்.

3. N, S என்பவை மூலக்குத்து வட்டத்தின் துருவங்கள்.

4. நடுவழியின் துருவங்களான p, p' வழியாக உச்சி வட்டம் செல்கிறது.

∴ உச்சி வட்டத்தின் துருவங்களான E, W வழியாக நடுவழி செல்லும்.


∴ தொடுவானமும், நடுவழியும் E, W என்ற இடங்களில் வெட்டிக் கொள்ளும்.

5. நேர்மேடுகள் NS உம் EW உம் தொடுவான தளத்தில் ஒன்றுக் கொன்று செங்குத்தாக விருக்கும்.

3-5. வான கோளத்தில் வான துருவங்கள் (p, p') குறித்தல்

தொடுவானத்திலிருந்து வான துருவ உயரம் (அல்லது வான துருவத்தின் ஏற்றக் கோணம்) அய்விடத்தின் அகலங்களுக்குச் சமம் (அகலங்கு = அட்சரேகை மதிப்பு = latitude of the place)

(The altitude of the celestial pole is equal to the latitude of the place). படம் 3-6 பார்க்க.



படம் 3-6

படம் 3-6-ல் பெருவட்டங்கள் வானமும், அவற்றின் விட்டங்கள் வான குறிக்கப்படுகின்றன. உலக மையம் E ; உலக துருவங்கள் P, P' ; மற்றும் அச்ச PP' ; உலக நடுவழி Q, Q' ; உலகத்தின்

மேற்பரப்பில் O என்ற இடத்தில் வான கோணம், சிறப்பாக வரையப்பட்டிருக்கிறது. O -ன் அகலங்கு $\phi O = \phi \hat{E}O = \phi$ எனக் கொள்ளோம்.

O இன் வான கோணத்தில் P, P' வான துருவங்கள்; PP' வான துருவ அச்சு $|pp'|$ QR வான நடுவரை. OE ன் நீட்சி வான கோணத்தை Z என்ற இடத்தில் லைட்டட்டும். OE -யின் வீசிப்புச் சக்தியின் திசை (direction of the earth's gravity); எனவே Z -உச்சி தொடுவானம்; So $ON \perp EOZ$ (எனவே So ON என்ற தளம், O -ல் உலக கோணத்திற்குத் தொடுவரைத் தளம் மிகுக்கும்)

Z -உச்சி லட்டம். இப்போது தொடுவானத்திலிருந்து P ன் உயரம் அல்லது P ன் ஏற்றக் கோணம் என்பது வில் NP ($=N\hat{O}P$). நாம் இப்போது NP என்ற வில் O என்ற இடத்தில் அகலங்கு ϕ என நிறுவவேண்டும்.

$$\phi = \text{வில் } \phi O = \phi \hat{E}O$$

$$\text{வில் } OP = 90 - \phi \text{ (இதன் அகலங்கு - co-latitude)}$$

$$\text{திசை } OP \perp Ep$$

$$\therefore 90 - \phi = O\hat{E}p$$

$$= Z\hat{O}p$$

$$= \text{வில் } ZP$$

$$\therefore NP = NZ - ZP = 90 - (90 - \phi)$$

$$= \phi.$$

எனவே, லைட்டியானன் உடன் இடத்தில், தொடுவானத்திலிருந்து P ன் உயரம் (அதாவது P ன் ஏற்றம்) அகலிடத்தின் அகலாக கிற்றுச் சமமென நிறுவப்படுகிறது.

3-6. ஒரு குறிப்பிட்ட அகலங்கு ϕ உடன் இடத்தில் வான பொருட்கள் (சிறப்பாக விண்மீன்கள்) வானகோணத்தின் மேற்பரப்பில் இடங்குறித்தல் (Fixing the celestial bodies and stars in position on the celestial sphere in a place of latitude ϕ)

நாம் இயல் வடிவ கணிதத்தில் (Algebraic Geometry) ஒரு தளத்தின் மேல் OX, OY என்ற அச்சங்கள் அடிப்படையில் ஒரு புள்ளியை அதன் (x, y) ஆயத் தொலைவாக, இடக் குறிக்கிறோம்.


அவ்வாறே OX க்கு ஒத்தபடி ஒரு குறிப்பிட்ட முதனிலைப் பெருவட்டத்தையும், OY க்கு ஒத்தபடி அதற்குச் செங்குத்தான மற்ரோ நிலைத் (fixed) பெருவட்டத்தையும் அச்சுகளாகக் கொண்டு ஒரு வான் பொருளை அல்லது விண்மீனை இடங்குறிக்கலாம். இதன் கூறப்பட்ட நிலைத் பெருவட்டம் தலைமைய குத்து வட்டம் (Principal secondary) எனப்படும்.

தாம் எடுத்துக் கொள்ளும் முறையினைப் பெருவாட்டம், தனியாய் குத்துவாட்டம் இரண்டிற்கும் சரித்த வகையில் ஒரு விண்ணின் ஆயத் தொலைகள் வரையறுக்கப்படும். சிறப்பாக நான்கு முறைகள் வரையறுப்படும். அவை ஒன்றையின் ஒன்றாக விளக்கம் செய்யப்படுகின்றன. [குறிப்பு: 1-4-8 க்கு கண்ட முடிவை ஒரு முறை சரித்துக் கொள்ளு].

படம் 8-6 பார்க்க. 8-2 ல் கூறியபடி O என்ற கன்சியஸனனின் மொன கோணத்தில் S என்ற விண்மீன் குறிக்கப்பட்டிருக்கிறது.

தொடுவானம் வரைதல் : 8-8 ம் கூதியடி, Z ஐ இடம் குறித்து ZOZ' என்ற நிலையை நினைத்துத்தனம். O வரையாக வரையப்படும் கிடைத்தனமானது வானகோளத்தை வெட்டுமுதல் பெருகட்டம் NSO என்ற தொடுவானமாவும்.

உச்சிவானம் வரைதல்: NOZ வழியாக வரைவப்படும் தளம், வான கோளத்தை வெட்டும் மூலமான பெருகாட்டம் உச்சி வானத்தைத் தரும். மரபாக, காதித் தளத்தை (the plane of the paper) உச்சி வான தளமாகக் கொள்வதுண்டு. காட்சிவானம் இருக்கும் இடத்தின் அகலங்கு (Terrestrial latitude) ϕ ஆகையால் உச்சி வட்டம் NZ ன் மேல் $NP = \phi$ என அளந்து, P ஐ இடங் குறிக்கலாம். PO ஐ இணைத்து நீட்டி வான கோளத்தை வெட்டிச் செய்தால் P' என்ற மற் ற ஒரு துருவம் கிடைக்கும். POP' ஐ செங்குத்துக் கோடாகக் கொண்ட தளம் QR , என்பது வான கோளத்தை வெட்டும் மூலம் நடுவரையைத் தரும். எனவே O க்குரிய வான கோளத்தின் மேல்,



44 38

- (1) $N\bar{S}o$ என்ற தொடுவானமும்
(2) $So\ ZN$ என்ற உச்சி வானமும்

(8) ϕ யும் தெரிவதால் NZ ன் மேல் P ஐ இடக்குறித்து QR என்ற தடுவரையும் பெறப்படும்.

N So-ம், QR -ம் கிழக்குப் புள்ளி E ஐயும், மேற்குப் புள்ளி W ஐயும் குறிக்கும்.

3-6-1. தொடுவான ஆயத் தொலை முறை—அடிவான தூரமும் கோண ஏற்றமும்: (Horizon System of co.ordinates—the azimuth and the altitude).

முதலிலே வட்டம்: தொடுவானம் NSo ; தலைவளவுக்குத்து வட்டம்: உச்சி வட்டம் $SoZPN$ ($\perp NSo$).

S என்ற விண்மீன்குழியாகத் தொடுவானத்திற்கு ZSM என்ற துணைக்குத்து வட்டம்வரைக. இவ்வட்டம் NSo ஐ M க் வெட்டட்டும். ZSM என்ற துணைக்குத்து வட்டத்திற்கு விண்மீனின் ஏற்றவட்டம் எனப்பெயர் வைத்துக்கொள்வோம்.

S ன் ஆயத்தொலை: அடிவான தூரம் (வரைவறை)

விண்மீனின் ஏற்றவட்டத்திற்கும் உச்சி வட்டத்திற்கும் இடைப்பட்ட கோணம் அடிவான தூரம் எனப்படும். படம் 8-6-ல் அடிவான தூரம் = $SoZS = S^{\circ} ZM$ -ஐக் SoM (1-4-8 படவாக) அல்லது அடிவான தூரம் = $NZS = NZM$ -ஐக் NM .

கோண ஏற்றம் (வரைவறை): - விண்மீனின் ஏற்ற வட்டத்தின் தொடுவானிலிருந்து விண்மீன் இருக்கும் கோண தூரம் ஏற்றக் கோணம் எனப்படும். படம் 8-6 ல் ஏற்றக்கோணம் = ஐக் MS .

3-6-1-1. குறிப்புகள்

அடிவான தூரம்: - 1-48 படவாக $SoZS = SoZM$ -ஐக் SoM , எனவே, அடிவான தூரம் = S -லிருந்து, ஏற்றவட்டத்தின் பாதம் (Foot) வரையில் (M வரையில்) தொடுவானத்தின் மேலுள்ள விகிதமாகும். எனவே அடிவான தூரத்திற்கு மற்றொரு வரைவறை வகுக்கலாம். தொடுவானத்தின்மேல், So -லிருந்துவிண்மீன் ஏற்றவட்டத்தின் பாதம் வரையில் உள்ள தூரம் அடிவான தூரம் எனப்படும். இது So முதல் M வரை வலஞ்சுழியாகவும் 0° முதல் 180° வரையிலும் இடஞ்சுழியாக 0° முதல் -180° வரையிலும் அல்லது S° முதல் மறுபடியும் 180° வரை 0° முதல் 360° வரையிலும் அளக்கப்படலாம். ஆதியாகக் கொண்டு 0° முதல் 360° வரையிலும் அளக்கப்படலாம்.

பயிற்சி

(i) உச்சி வட்டத்தின் மேலேயே ஒரு விண்மீன் இருக்கும்போது அதனுடைய அடிவான தூரம் என்னவெனக் காண்க—அவ்வாறே E , W ன் அடிவான தூரங்கள் என்னவெனக் காண்க.

(ii) உச்சி தூரம் : $90^\circ - SM = Z$ என நமக்குத் தெரிகிறது. Z என்பது, விண்மீன் உச்சிதூரம் (zenith distance) எனப்படும் எனவே விண்மீனின் ஏற்றவட்டத்தில், Z இவ்விருந்து விண்மீன் வரை உள்ள கோணதூரம், அவிண்மீனின் உச்சி தூரம் என வரையறுக்கலாம்.

மேலும் கோண ஏற்றம் + உச்சி தூரம் = 90° எனவே கோண ஏற்றமும் உச்சி தூரமும் ஒன்றுக்கொன்று நிரப்பிகள் (complementary angles). விண்மீன், தொடுவானத்திற்குக் கீழே இருந்தால், கோண ஏற்றத்தைக் குறைவெண்ணாகக் கொள்வது மரபு - (altitude - Negative) அல்லது Z இவ்விருந்து உச்சி தூரத்தை 90° க்கு மேற்பட்டதாகக் கொள்ளலாம். தொடுவானத்தில் உள்ள எந்தப் புள்ளிக்கும் கோண ஏற்றம் = பூச்சியம் ; உச்சி தூரம் = 90° .

பயிற்சி : Z ல் ஒரு விண் மீனினுடைய அதன் கோண ஏற்றமென்ன ? அதன் உச்சி தூரமென்ன வெனக் காண்க.

(iii) S வழியே தொடுவானத்திற்கு இரண்டாக ஒரு சிறுவட்டம் வரைந்தால், அந்தச் சிறு வட்டத்தில் உள்ள எந்த விண் பொருளும் ஒரே கோண ஏற்றம் உடையதாகிவிடுகும்.

$MS = 90^\circ$ எனக்கொண்டால், அச்சிறுவட்டம் 90° உயரத்திலுள்ள இரண்டை மொனப்படும் (parallel of altitude).

(iv) ஒரு குறிப் பிட்ட நிலைக்குத்து வட்டத்தின் மேலுள்ள எந்த விண் பொருளும் ஒரே அடிவான தூரம் பெற்றிருக்கும்.

3-6-2 (1) வான நடுவரை ஆயத்தொலைமுறை : - நேர்க்கோணமும், நடுவரை நிலைக்கமும் : - (Equator System of co-ordinates - hour angle and declination.)

அதே விண்மீன் S க்கு முதலிலே வட்டத்தை, வான நடுவரை யாகக்கொண்டு ஆயத்தொலைகள் வரையறுக்கலாம்.

முதலிலே வட்டம் : வான நடுவரை QR ; தலைவாய்க் குத்து வட்டம், உச்சிவட்டம் $SoZPN$; S -இன் வழியாக QR க்குத் துணைக் குத்து வட்டம் PSM வரைக. இவ்வட்டத்திற்கு விண்மீனின் நடு வரை நிலைக்க வட்டமென்பபெயர் (declination circle of the star). இது நடுவரையை M_1 ல் வெட்டட்டும்.

S ன் ஆயத்தொலைகள் : நேர்க்கோணம் (Hour angle) (வரையறை)

உச்சிவட்டத்திற்கும் விண்மீனின் நடுவரை நிலைக்க வட்டத்திற்கும் இடைப்பட்ட கோணம் நேர்க்கோணம் (hour angle) எனப்படும். 3-6ல் நேர்க்கோணம் = $ZPS = ZPM_1$ = விக் QM_1 (1-4-8).

நடுவரை விலக்கம் (declination) : வரையறை

விண்மீனின் நடுவரை விலக்கம் வட்டத்தின்மேல் நடுவரையிலிருந்து விண்மீனின் கோண தூரம் நடுவரை விலக்கம் எனப்படும். படம் 8-6ல் நடுவரை விலக்கம் = M_1S .

3-6-2-1 குறிப்புகள் :

(i) நேரக்கோணம்: $-1^{\circ}4-8$ ன் படிபாக $ZPM_1 = ZPS =$ வில் PM_1 . எனவே நேரக்கோணம் = டிரைசுத்ரு நடுவரையின் மேல் நடுவரை விலக்க வட்ட பாதம் வரையில் (M_1 வரையில்) உள்ள வில் தளம். எனவே நேரக்கோணத்திற்கு மத்தோர் வரையறை வரையறை, நடுவரையின்மேல் டிரைசுத்ரு விண்மீனின் விலக்க வட்டத்தின் பாதம் வரையில் உள்ளதூரம் நேரக்கோணம் எனப்படும். மரபாக இது டிரைசுத்ரு இடஞ்சூழியாக அளவிடப்படும். ஆனாலும், கிழக்கு நேரக்கோணம் (Eastern hour angle), மேற்கு நேரக்கோணம் (Western hour angle) எனவும் ஹைரையே கிழக்குப் பக்கமும், மேற்குப் பக்கமும் அளவிடப்படுவதும் மத்தோர் மரபாகும். இதைப்பற்றிப் பின்னர் காண்போம். உச்சி வட்டத்தின் மேல் ஒருவிண்மீன் இருக்கும்போது, அதாவது உச்சி வட்டமும் போது, அதன் நேரக்கோணம் பூச்சியம் எனக் காண்க

(ii) வடதுருவ தூரம்: $90^{\circ} - SM_1 = PS$ என நமக்குத் தெரிகிறது. PS என்பது, அதாவது நடுவரை விலக்கத்தின் நிரப்பி (Complement of the declination), விண்மீனின் வடதுருவ தூரம் (North Polar distance) எனப்படும். நடுவரை விலக்கம் + வடதுருவ தூரம் = 90° .

விண்மீன் நடுவரைக்கு மேலிருக்குமாயின் (வடபகுதியில்) அதற்குரிய விலக்கம் கூட்டு மதிப்பிடப்படாது, கீழிருக்குமாயின் (தென்பகுதியில்) குறை மதிப்பிடப்படாது கொள்ளப்படுவது மரபு. அதாவ, ஹைரையே, வடநடுவரை விலக்கம் (North declination +) எனவும், தென்நடுவரை விலக்கம் (South declination -) எனவும் கொள்ளப்படும்.

நடுவரையின் மேலுள்ள எல்லாப் புள்ளிகளுக்கும் நடுவரை விலக்கம் = பூச்சியம்.

(iii) S வழியாக நடுவரைக்கு இணையாக ஒரு சிறு வட்டம் வரைந்தால், அச்சிறு வட்டத்தின்மேல் உள்ள எந்த விண் பொருளும் ஒரே நடுவரை விலக்கம் உடையதாக இருக்கும்.

(iv) நடுவரைக்குரிய ஒரு குறிப்பிட்ட குத்துவட்டத்தின் மேலுள்ள எந்த விண்மெழுகும் ஒரே நேரக்கோணம் பெற்றிருக்கும்.

(v) ஒரு விண்மீனின் ஏற்றவட்டமும் நடுவரை விவக வட்டமும் வெட்டிக்கொள்ளும் கோணம், அப்போது விண்மீனின் இடைக்கோணம் எனப்படும். γ என்ற அலகுதரக் குறிக்கப்படும் ($ZSP = \gamma$).

3-5 2 (2) வான நடுவரை ஆயத்தொலை முறை :

வான ஏற்றமும் நடுவரை விவகமும் (எற்றெருவகை)
[Equator System of co-ordinates (alternate) Right Ascension and declination].

வான நடுவரையினமேல் γ என்ற ஒரு நிலையான புள்ளி கொள்ளப்படும். அதற்கு மேல் முதற்புள்ளி (First point of Aries) எனப்பெயர். இதுபற்றிப் பின்னர் விவரமாகப் பார்ப்போம்:

முதலிலே வட்டம் : QR ; நிலையாகத்தகு வட்டம் : γ என்ற நிலைத்த புள்ளி வழியாக நடுவரைக்கு வரையப்படும் குத்து வட்டம்.

S ன் ஆயத்தொலைகள் (வான ஏற்றம் வரையறை) : விண்மீனின் நடுவரை விவக வட்டத்திற்கும், γ வழியாகக் கொள்ளப்படும் நிலைத்த குத்து வட்டத்திற்கும் இடைப்பட்ட கோணம் வானஏற்றம் எனப்படும். படம் 3-5ல் S ன் வானஏற்றம் $= \gamma PM_1 =$ விகி γM_1 . எனவே தடைமுறைமிக், வான ஏற்றம் பின்வருமாறு வரையறுக்கப் படுகிறது. நடுவரையினமேல், மேல் முதற் புள்ளியிலிருந்து, விண்மீனின் நடுவரை விவகம் வட்டப் பாதம் வரையில் உள்ள தூரம் வானஏற்றம் எனப்படும் (அதாவது $\gamma PM_1 =$ விகி γM_1). இது γ யிருந்து இடஞ்சுழியாக 0° முதல் 90° வரை அளக்கப்படும்.

3-7. மண்ணுறை திசையில் சுழற்சி—சின் வழிவகை.

(Diurnal rotation of the Earth-Sidereal day.)

இம்மண்ணுறைவகம் ஒரு கற்பனை நேர்க்கோட்டை அச்சாகக் கொண்டு தன்னைத்தானே, மேற்கிலிருந்து கிழக்காக நானுக்கொரு முறை சுற்றிவருகிறது என்று நமக்குத் தெரியும். ஆய்வக 3-2 1 (2)ல் கூறப்பட்டது' என்ற புறியுள்ளதும். நாம் ஒரு ரயில் வண்டியில் போய்க்கொண்டிருக்கும்போது, எதிரே உள்ள வீடுகள், மரங்கள், தந்திக்கம்பங்கள், வயல்கள் போன்ற நிலைத்த பொருள்கள் அதே வேகத்தில் நேர் எதிர்த்திசையில் ஓடுவது போன்ற காட்சி நமக்குத் தெரிகிறது. நாம் ரயிலில் போய்க்கொண்டிருக்கிறோம் என்ற நிலைமையின், அவை யாவும் நோற்றமென நம்புகிறோம். ஒரு ரயில் நிலையத்திலிருந்து நாம் ரயிலில் வந்து சேரும்போது மற்ற சில ரயில்கள் வண்டிகள் நின்றுகொண்டோ, ஓடிக்கொண்டோ

இருக்குமானாலும், எந்த ரவிக் போகிறது எந்த ரவிக் நித்திரை எனத் தெரிவாத நிலை நமக்கு ஏற்படுகிறது.

அது போல மேற்கிலிருந்து கிழக்கு நோக்கி பூக்குக்கும் இம்மண்ணுமாக தினசரிச் சுழற்சியின் விளைவாக நாம் நிலைத்து ஒரே இடத்தில் இருப்பது போலவும், மண்ணுமாகம் சுழலும் கோண வேகத்துடனே, அதற்கு நேரெதிர்த்திசையில் (அதாவது கிழக்கிலிருந்து மேற்காக) சுதிரவனும் விண்மீன்களும் சுழன்று வருவதுபோலவும் நமக்குத் தோற்றமளிக்கின்றன. இத்தோற்றம் சுழற்சி கிழக்கிலிருந்து மேற்கு நோக்கியிருப்பதன் விளைவாக, சுதிரவனும் விண் மீன்களும், கிழக்குப் பக்கத்தில் உதித்து மேற்குப் பக்கத்தில் மறைவதுபோலப் பார்க்கிறோம். இந்த அடிப்படையில் 8-1, 8-1-1, 8-1-2 க் கூறப்பட்டதைச் சற்று விவரமாக ஆராய்வோம். 3-7-1: வான கோளத்தின் அடையத்திலுக்கும் காட்சியானது தன்னைச் சுற்றியிருக்கும் கோளமானது விண்மீன்கள் வரவற்றையும் தாங்கிக் கொண்டு, அப்படியே அவற்றின் நிலை மாறுது, ஏதோ ஓர் அச்சம் சுழலும்வொன்று சுழல்வதாகக் காண்கிறான் என்று கூறினோம். அக்காட்சியானதுக்கு, வான கோளக் காட்சிகள் இன்னும் எந்த எந்த விதங்களில் தோற்றமளிக்கின்றனவது பின்னர் கூறப்படுகின்றது.

அத் தோற்றங்களாவன :

(i) மண்ணுமாகச் சுழலக்க pp' க்கு இணையாக உள்ள PP' ஐ அச்சாகக் கொண்டு வான கோளம் கிழக்கு மேற்காகச் சுழலும்.

(ii) அல்லவான கோளத்தில் இடம் குறிக்கப்பட்டிருக்கும் சுதிரவன், விண்மீன்கள் முதலியன யாவும் வான நடுவரை QR மேலும், QR க்கு இணையாக உள்ள சிறு வட்டங்கள் மேலும் கிழக்கு மேற்காகச் சுழலும்.

(iii) விண் மீனுக்கு விண் மீன் உள்ள கோண தூரம் (அல்லது இடைவெளி) மாறாமலிருக்கும்.

(iv) P, P' இதிலிருந்து அங் விண்மீன்களின் துருவ தூரங்கள் மாறுதிருக்கும்; எனவே, அங் விண்மீன்களின் நடுவரை விமைக்கிகள் மாறுதிருக்கும்.


(v) வான கோளம், தன்னைத்தானே ஒரு முறை PP' ஐ அச்சாகக் கொண்டு முழுகத்து, சுற்றும் நேரமும், மண்ணுமாகம் தன்னைத்தானே ஒரு முறை pp' ஐ அச்சாகக் கொண்டு முழுகச் சுற்றும் நேரமும் ஒத்திருக்கும்.

இம் முழுக்சுற்று சுற்றும் நேரம் ஒரு மின்வழி நாள் ஆகும். (Sidereal day).

எனவே, வான கோள மையத்திலுள்ள காட்சியாளன், ஏதோ பொரு விண்மீனைக் கவனிப்பானுள்; அது ஒரு முழுச்செழு சுற்றி, மறுபடியும் அதேவிடத்தில் அவனுக்குக் காட்சியளிக்கும் கால இடைவெளி, மண்ணுடை முழுச் சுழல் ஒன்றுக்கு ஏற்படும் கால இடைவெளிவாகும். அதாவது ஒரு விண்மீன் வழி நாளாகும். இத்தகழ்ச்சி ஆடிப்படைமீதான மீள்வழி நாளும் மீள் வழிக்காலமும் (Sidereal Time) நிலைநாட்டப்படுகின்றன. இது எந்த விண்மீனுக்கும் பொருத்தும் ஒரே உண்மையாகும்.

3-7-2. எனவே, நாம் தேற்றமாகப் பார்க்கும் வானகோளக்காட்சியில், ஒரு விண்மீன் பயணத்தைச் சிறிது விரிவாகப் பார்க்போம் :

பின்வரும் படம் 3-7-2 இதை விளக்கும்.



படம் 3-7-2

NSO —தொடுவானம்; QR —வான நடுவரை; மற்றவை மறுபுறப் படி குறிக்கப்பட்டுள்ளன. ஒரு விண்மீனின் வான கோள (தேற்ற)ப் பாதை $S_1 AS_1' BS_1$. S_1 என்ற விண்மீன் NS என்ற தொடுவானத்தில் வரும்போது, O விளிக்குக்கும் காட்சியளனுக்கு உதயமாகிறது. S_1 உ உதயமாகி $S_1 A$ வழியாக கிழக்குக் வானத்தில் ஏறிச் சென்று, உச்சி வட்டத்தை அடைவும்கோது, அங்குவிண்மீன் A உ மேலுச்சி வடக்கிறது (upper transit); பின்ன, மேற்கு வானத்திலிறங்கி, மறுபடியும் தொடுவானத்தை S_1' உ தொடும் போது, மறைகிறது.

$S_1 AS_1'$ (வலஞ் சுழியாக) என்ற பாதையில் விண்மீன் இரக்கும் வரையில் காட்சியாளன் தொடுவானத்திற்கு மேலிருக்க

கும் S_1 ல் மறைத்து, தொடுவானத்தின் கீழ்ச் சென்று, B என்ற இடத்தில் உச்சி வட்டத்தைக் கடக்கிறது. அப்போது அது கீழுச்சி கடக்கிறது (Lower transit). மீண்டும் கீழ் வானத்திலேறி, மறுபடியும் S_1 ல் உதயமாகிறது.

3-7-1. (v) க் கொடுக்கப்பட்டிருக்கும் வினக்கத்தின் அடிப்படையில், இந்த விண்மீன் ஒரு முழுப் பயணம் செய்து முடிக்கும் நேரம் ஒரு மீன் வழி நாளெனில் அது பொருத்தமாகும். இந்தப் பயணம் சீரான கோண வேகத்திலிருக்கிறபடியால் A இலிருந்து அடுத்து மறுபடியும் A க்கு வரும் இடைக்காலமே, அல்லது தன் பாதையில் ஏதோமொரு புள்ளி S லிருந்து அடுத்து மறுபடியும் S க்கு வரும் இடைக்காலமே, ஒரு மீன்வழி நாளாகும்.

குறிப்பு: விண்மீன்கள், சத்திரன், கதிரவன் வாயும் காட்சி யானனது தொடுவானத்தின் மேற்பகுதியிலிருக்கும்போது, அவன் அவற்றைப் பார்க்கமுடியும். வானத்திற்குக் கீழே சென்ற பிறகு அவன் அவற்றைப் பார்க்க இயலாது.

அங்ஙனமே S, CS, BS , மற்றோர் விண்மீன் பாதை காட்டப் பட்டிருக்கிறது. வான நடுவனுக்குக் கீழே, தெற்குப் பகுதியில் அப்பாதை உள்ளது.

0° நடுவரை விலக்கமுள்ள விண்மீன் பாதை, நடுவரையின் மேலேயே அனுமயம். கதிரவன் தினசரிப் பாதைகளும் இங்ஙனமே அனுமயம்.

3-7-2-1. மீன்வழி நாள் (வரையறை)

மூன் சுற்றப்பட்ட வினக்க அடிப்படையில் நாம் இப்போது ஒரு மீன்வழி நாள் என்ன வென்று வரையறுப்போம்.

ஒரு விண்மீன் அடுத்தடுத்து மேல் உச்சியையோ, கீழுச்சி யையோ கடக்கும் சமயங்களுக்கிடையிட்ட நேரம் ஒரு மீன் வழி நாள்; இது நமக்கு வசதியாக வகுக்கப்பட்டதோர் வரையறை யாகும்.

இத்தான் 24 மீன்வழி மணிகளாகவும் (sidereal hours), ஒவ்வொரு மணியும் 60 மீன்வழி நிமிடங்களாகவும் (sidereal minutes), ஒவ்வொரு நிமிடமும் 60 மீன்வழி வினாடிகளாகவும் (sidereal seconds) பிரிக்கப்பட்டிருக்கின்றன.

3-7-2-2 மீன்வழி நாளும் மீன்வழி நேரமும் :

மூன்பகுதியில் மீன்வழி நாள் என்னவெனப் பொதுவாக வரை யறுக்கப் பட்டது. இப்போது நாம் 3-6-2 (2)ல் வான நடுவரை

மேல் குறிப்பிட்ட γ என்ற நிலைவான மேட மூத்தடிவானைப் பற்றி மேலும் சில குறிப்புகளைப் பார்ப்போம்: γ என்பது ஒரு சுத்பனைப் புள்ளிதான். அதை நாம் ஒரு மின்னியை எனக் கொண்டால், அதன் திணைப்பாவை வான நடுவரைவின் மேல் அமைவும். அதன் உதிக்குமிடம் E , மேல் உச்சி கடத்தற் புள்ளி Q , மனதுபுமிடம் W , கீழ் உச்சி கடத்தற் புள்ளி R . γ மேல் உச்சி கடத்தற் புள்ளி Q இல் இருக்கும்போது மின்வழி நேரம் 0 மணி 0 நிமிடம் 0 வினாடி எனவும், W க்கு வரும்போது 6 மணி என்றும், R க்கு வரும்போது (மின்வழி தள்ளிவு) 12 மணி என்றும், E க்கு வரும்போது 18 மணி என்றும், மறுபடியும் Q க்கு வரும்போது 24 மணி முடித்து, அடுத்த மின்வழி நான் ஆரம்பமாகித்தென்மும் கொள்வது மரபு. γ என்பது 24 மின்வழி மணி நேரத்தில் சீரா 880° பயணம் செய்வதால், ஒரு மணி நேரத்திற்கு 15° ஆகவது 4 நிமிடங்களுக்கு 1° பயணம் செய்கிறது. (மணிக்கு 15°; நிமிடத்திற்கு 15° வினாடிக்கு 15")

எடுத்துக் காட்டாக, படம் 8-7-2ல் மேடமூத்தடிவானி Q இல் கடத்து மேற்கு வானத்தில் γ ல் இருத்தல்களில் $Q\gamma$ ன் கோண அளவு, γ ன் நேரக் கோணமாகிய $H (= ZP\gamma)$ க்குச் சமம். பாகங்களில் (degree) H இன் அளவு கொடுக்கப்பட்டால், அப் போது மின்வழி நேரம் $\frac{H}{15}$ மணிகள். எனவே பாகக் அளவில் கொடுக்கப்படும் γ ன் நேரக் கோணத்தை 15 ஆல் வகுக்க, அப் போதைய மின்வழி நேரம் பெறப்படும்.

குறிப்பு: மேற்கு வானில் γ இருக்கும் போது, அதன் நேரக் கோணம் மேற்கு நேரக்கோண மெளவும் கீழ்க்களில் அதன் நேரக் கோணம் கிழக்கு நேரக்கோண மெளவும் கொள்வதுண்டு. அல்லது Q ல் ஆரம்பித்து, மறுபடியும் Q க்கு வரும்வரையில், அதன் நேரக் கோணம் 0° முதல் 880° வரை உயர்கிற தெனவும் கொள்ளலாம்.

$$Q \rightarrow W : 0^\circ \rightarrow 90^\circ ; 0 \text{ மணி} \rightarrow 6 \text{ மணி} ;$$

$$W \rightarrow R : 90^\circ \rightarrow 180^\circ ; 6 \text{ மணி} \rightarrow 12 \text{ மணி} ;$$

$$R \rightarrow E : 180^\circ \rightarrow 270^\circ ; 12 \text{ மணி} \rightarrow 18 \text{ மணி} ;$$

$$E \rightarrow Q : 270^\circ \rightarrow 360^\circ ; 18 \text{ மணி} \rightarrow 24 \text{ மணி}$$

என்ற மரபுதரங்கள் எளிதில் புலப்படும்.

3-8. கதிரவன் ஆண்டுப் பாதை

'மண்ணுலகம்' என்ற பகுதியில், மண்ணுலகம் கதிரவனை ஆண்டுக் கொழுமுறை ஒரு நீள் வட்டத்தில் சுற்றி வருகிற தெனவும், ஆனால் கதிரவன் ஆண்டுக் கொழுமுறை மண்ணுலகத்தை சுற்றிவருகிறது போன்ற கிட்சிதான் நமது அனுபவமாயிருக்கிறதெனவும் கூறினோம்.

ஓ என்ற வடக்கு அகலத்தில் உள்ள ஓரிடத்தில், ஓரண்டு காலத்தில் கதிரவன் இடம் மாறுகிற கிட்சிகள் எப்படியிருக்கிற தென ஒரு கிட்சியானது கவனித்து வந்தால், அவன் காண்பது சிக்கல் நிறைந்ததாயிருக்கும். மண்ணுலக தினசரி சுழற்சியின் காரணமாக விண்மீன்கள் ஒவ்வொன்றும் வானகோளத்தில் வான நடுவரைபின் மேலோ, அல்லது நடுவரைக்கு இடையான சிறு வட்டங்களின் மேலோ, தத்தமக்குரிய பாதைகளில் தினந்தோறும் முறை பிறழாது இயங்கி வருவதைக் காண்பான். ஆனால் கதிரவனைப் பொறுத்தமட்டில் அவன் காண்பது வேறு விதமாக அமையும்.


3-8-1 கதிரவன் தினந்தோறும் தொடுவானில் உதிக்குமிடங்களின் மாற்றங்கள் இரப்பதையும், மார்ச்சு 21-ல் தேதி, செப்டம்பர் 23-ல் தேதி, என்ற இரு நாட்களிடமும் கதிரவன் நடுவரை மேல் போவதையும் மற்ற நாட்களில் கதிரவன் நடுவரைக்கு மேலும், கீழும், நடுவரைக்கு இடையான சிறு வட்டங்களில் போவதையும் பார்ப்பான்.

மார்ச்சு 21-ல் தேதி கதிரவன் நேர் கிழக்கில் தொடுவானில் உதிப்பதைப் பார்ப்பான். அதற்குப் பின் ஜூன் 22-ல் தேதிவரை உதிக்குமிடம் தொடுவானில் மெல்ல கிழக்கிலிருந்து வடக்கு நோக்கி நகர்ந்து செல்வதைப் பார்ப்பான். எனவே, மார்ச்சு 21-ல் தேதி நடுவரை மேல் செல்லும் கதிரவன், அதற்குப் பின்பு, நடுவரைக்கு இடையான சிறு வட்டங்களில் சென்று கிட்சி நகரும். ஜூன் 22-ல் தேதிக்குப் பின், மறுபடியும் கதிரவன் உதிக்குமிடம் கிழக்கு நோக்கி வந்து, செப்டம்பர் 23-ல் தேதி நேர் கிழக்கிலேயே அமைந்து, அதற்குப் பின்பு கதிரவன் உதிக்குமிடம் மெல்லத் தெற்கு நோக்கி (E-லிருந்து) நகர்ந்து செல்வதையும், டிசம்பர் 22-ல் தேதிக்குப் பின்பு, உதிக்குமிடம் மறுபடியும் கிழக்கு நோக்கி வந்து, மார்ச்சு 21-ல் தேதி நேர் கிழக்கிலேயே அமைவதையும் அவன் காண்பான். எனவே கதிரவன் உதிக்குமிடம் முந்நியன பின்னரும் படத்தில் காட்டியவாறு கிட்சியளிகிலும். படம் 3-8-1 காண்க.

மூன்று இணைகோடுகளும், அத்தந்த நாட்களில் கதிரவன் தினசரிப் பாதை (இப்படம் 3) என்ற ஒரு குறிப்பிட்ட வடக்கு அகலங்கித்தே

பொருத்தும், வெவ்வேறு ஆகலாக்குகளுக்கு வெவ்வேறு விதமாகக் கதிரவன் திசைநிர் பாதை ஆனமையும்)

எனவே, கதிரவன் விண் மீன்கள் பின்னணிவிலே, ஜூன் 22 முதல் டிசம்பர் 22 வரை தெற்கேயும், டிசம்பர் 22 முதல் அடுத்த ஆண்டு ஜூன் 22 வரை வடக்கேயும் சென்றுகொண்டிருப்பதைக் காணலாம்.



படம் 9-5-1.

மேலும், கதிரவன் மேற்கு வானில் மறைவுப்போது கிழக்கு வானில் உதிக்கும் விண்மீன்கள் கோடைகாலத்திலும், மாசிக காலத்திலும் வெவ்வேறு விண்மீன்களாகும். எடுத்துக்காட்டாக ஒரியன் பட்டையிலுள்ள (the belt of Orion) ஒன்று ஒளி மிக விகம் விண்மீன்கள், மாசிககாலத்தில் கிழக்கே உதிக்கின்றன. ஒரு சூரிய்பீட்ட நாளில் ஆவை கதிரவன் மறையும் சமயத்தில் கிழக்கே உதவவானால், சில வரங்க்கள் கழித்து, கதிரவன் மறைவுப்போது அவை உயர் வானில் காணப்படும். இன்னும் சில வரங்க்கள் கழித்து, கதிரவன் மறைவுப்போதும் பிறகு கொஞ்ச நேரத்திற்கும் ஆவை மேற்கு வானில் காணப்படும். எனவே, கதிரவன், விண்மீன்கள் பின்னணியில் மேற்கிலிருந்து கிழக்கு நோக்கி நகர்ந்து செல்வதும் தெரிய வருகிறது. கதிரவன் கிழக்கு நோக்கியே பயணம் ஆண்டுமுழுதும் நடத்து, சரியாக ஓராண்டில், கதிரவன் தான் பயணம் தொடங்கிய இடத்திற்கே மறுபடியும் வந்து சேர்த்துவிடுகிறது. ஆக ஓராண்டு காலத்தில் விண்மீன்கள் பின்னணியில் கதிரவன் கிழக்கு நோக்கி யும், தெற்கு வடக்காகவும் வடக்கு தெற்காகவும் செல்வது உறுதிப் படுகிறது. மேற்கூறிய வண்ணம், ஓராண்டு காலத்தில் கதிரவன் இடம் மாறுவதை, வான கோணத்தில் வரையவேமானால், வரை 'டினலிங்க்' மரவும், வான' நடுவரை'யை, 23° 27' சாய்வில் வெட்டுகும்


ஒரு பெருவட்டத்தில் ஆமைத்திரும்பது வானவாய்; இச்சாய்வு $23^{\circ}.5$ எனத் தோராயமாகக் கூறுவதும் வழக்கிலுண்டு.

இப் பெரு வட்டம் கதிரவன் ஆண்டுப் பாதை (தோற்றம்) (Path of the Sun—Annual, apparent) எனப்படும். இதைச் சுருக்கமாக, கதிரவன் பாதை (the Ecliptic) எனக் கூறுகிறோம். இது தோற்றமே பொழிய உண்மை யல்ல, மண்ணுமுகம் கதிரவனை ஆண்டுக்கொரு முறை சுற்றி வருவதன் விளைவாக, இத் தோற்றப் பாதை நமக்குக் கிடைக்கிறது.

கதிரவன் பாதை (வகரயகை): மண்ணுமுகம், கதிரவனை ஆண்டுக்கொரு முறை சுற்றிவருவதன் விளைவாக, வான கோளத்தின்மேல் பெறப்படும் கதிரவனின் தோற்றப்பாதையே கதிரவன் பாதை வெணப்படும்.

இது ஒரு பெருவட்டம்; வான நடுவகைக்கு $23\frac{1}{2}^{\circ}$ சாய்வில் உள்ளது. இச் சாய்வு கதிரவன் பாதைச் சாய்வு (Obliquity of the Ecliptic) எனப்படும்.

3-8-2. படம் 3-8.2 இல் கதிரவன் பாதை CYL என வான கோளத்தின் மேல் காட்டப்பட்டிருக்கிறது. படத்தில் மற்றவை மரபுப்படி.



படம் 3-8-2

நடுவகை QRக்கும், கதிரவன் பாதை CLக்கும் உள்ள சாய்வு $\omega = 23\frac{1}{2}^{\circ}$.

QRன் துருவங்கள் = P, P';

CLன் துருவங்கள் = K, K';

$\angle PK = PK' = \omega = 23\frac{1}{2}^{\circ}$

கதிரவன் பாதையும், வான நடுவளையும் வெட்டு மிடங்கள் :

(1) γ — மேட முதற்புள்ளி ; (2) ω துணை முதற்புள்ளி. γ க்கு இடது கழியாக 90° தூரத்தில் உள்ள L வேளித்திருப்ப நிலை (Summer Solstice) எனவும், ω க்கு இடதுகழியாக 90° தூரத்தில் உள்ள C மாரித் திருப்ப நிலை (Winter Solstice) எனவும் பெயர் பெறும்.

கதிரவன் ஆண்டுதோறும் γ ஐ மார்ச்சு 21-இலும்

L ஐ ஜூன் 22-இலும்

ω ஐ செப்டம்பர் 23-இலும்

C ஐ டிசம்பர் 22-இலும்

கடக்கிறது. அப்புள்ளிகளைக் கதிரவன் கடக்கின்றபோது பருவங்கள் மாறுவதை பொட்டி அப்புள்ளிகள் முறையே,

γ — இளவேனிற் சம இரவுப் புள்ளி (Vernal Equinox)

L — கோடைத் திருப்பப் புள்ளி

ω — இலைபுதிற் சம இரவுப் புள்ளி (Autumnal Equinox)

C — மாரித் திருப்பப் புள்ளி

எனப் பெயரிடப்பட்டிருக்கின்றன. கதிரவன் ஒரு புள்ளியிலிருந்து அடுத்த புள்ளிக்குப் போக ஏறத்தாழ 8 மாதங்கள் ஆகிற தென்பகைக் காலாக, அப்புள்ளி நிலைகளில் கதிரவன் இருக்கும் போது கதிரவனின் வல ஏற்றங்களும், நடுவளை விளக்கங்களும் ; S -பெட்டியளிக் காலாக.

மார்ச்சு 21 முதல் மறுபடியும் அடுத்த ஆண்டு மார்ச்சு 21 வரை (ஒரண்டுகி) வல ஏற்றம் 0° முதல் 890° வரை வளர்த்து செல்வதையும் அதே கால இடைவெளியில் நடுவளை விளக்கம் முதற்காலாண்டுகி 0° முதல் $28\frac{1}{2}^\circ$ வரை வளர்வதையும், பின்னர் இரண்டாம் காலாண்டுகி $28\frac{1}{2}^\circ$ முதல் 0° வரை குறைவதையும், மூன்றாம் காலாண்டுகி 0° முதல் $-28\frac{1}{2}^\circ$ வரை குறைவதையும், நான்காம் காலாண்டுகி $-28\frac{1}{2}^\circ$ முதல் 0° வரை வளர்வதையும் காண்க.

பட்டியல் 3-8-2

கதிரவனின் (அ, 8) பட்டியல் ஓரான்டு காலம்

பட்டம் 3-8-2 கதிரவன் கடக்கும் புள்ளி	கடக்கும் நாள் (ஏதத்தாழ)	அன்று அ	அன்று ப
S_1 γ -மேடமுதற்புள்ளி அல்லது இளவேனிற் சம இரவு நிலை (Vernal Equinox)	மார்ச்சு 21-ம் தேதி	0	0
S_2 L-வேனித்திருப்ப நிலை	ஜூன் 22-ம் தேதி	90°	$\omega = 28\frac{1}{2}^\circ$
S_3 α - துலாம் முதற்புள்ளி (அல்லது) இலைபுதிர் சம இரவு நிலை (Autumnal Equinox)	செப்டம்பர் 22-ம் தேதி	180°	0
S_4 C-மாசித்திருப்பநிலை	டிசம்பர் 22-ம் தேதி	270°	$-\omega = -28\frac{1}{2}^\circ$
S_5 γ -மேடமுதற் புள்ளி	மார்ச்சு 21-ம் தேதி	360°	0

3-8-3. நடுவரை — கதிரவன் பாதையைப்பொட்டிய பெரு வட்டங்கள் :

பெருவட்டம் $P\gamma P^1$ α அதாவது மேட முதற்புள்ளி துலாம் முதற்புள்ளி வழியாக நடுவரைக்குச் செங்குத்தாக அமைவும் பெரு வட்டம், கதிரவன் நடுநிலைவட்டம் (Equinoctical Colure) எனவும், பெருவட்டம் PLP^1C , அதாவது வேனித்கால, மார்க்கால திருப்பப் புள்ளிகள் வழியாக நடுவரைக்குச் செங்குத்தாக அமைவும் பெரு வட்டம், கதிரவன் திருப்பநிலைவட்டம் (Solstitial Colure) எனவும் பெயருடையன. கதிரவன் நடுநிலைவட்ட துருவங்கள் Q, R கதிரவன் திருப்ப நிலைவட்ட துருவங்கள் Y, γ என அறிக. இவ் விரண்டு வட்டங்களுமே ஒன்றுக்கொன்று, குத்து வட்டங்களாகும் எனவும் அறிக. சந்திக்குமிடங்கள் P, P' எனவும் காண்க.

மூன்று 3-8-2 (2)ல் 7 எனக் குறிப்பிட்ட மேல் மூதறிவுகளில் வல வற்ற ஆயத்தொலைக்கு ஆதிப்புகளில்) இப்போது எது எனத் தெரிந்துகொள்க. அதற்கு 180° அப்பாசி, நடுவரைவிலும், கதிர வன் பாதையிலும் ஒரேயே அமைந்த புள்ளி - எனப்படும் துணை மூதறிவுகளிலாகும்.

3-8-4. இத்தப் பின்னணிகில், கதிரவன் ஓரண்டில் நான் நோரும் உதிக்குமிடங்கள் (வான கோளத்தின்மேல்) எப்படி மாறி மாறி வருகின்றன எனக் காண்போம். 8.5-2 பட்டியல்படி.

மார்ச்சு 21, செப்டம்பர் 23 ஆகிய நாட்களில் கதிரவன் நடு வரை விலக்கம் பூச்சியம் ; எனவே தினசரி இயக்குவழி நடுவரை வின் மேலேயே விடுக்கும். நடுவரையும், தொடுவானமும் வெட்டு மிடத்தில் கதிரவன் உதயமாதளின், கதிரவன் மூன் கூறப்பட்ட இரு நாட்களிலும் தேர்கிறக்கியே உதித்து, ஏறக்குறைய தேர் மேற்கில் மறையும். மார்ச்சு 21-ம் நாளுக்குப் பின்னு 8 வளர்கிறது கூட்டு மதிப் புண்டயது. ஆகவே கதிரவன் பாதை நடுவரைக்குமேல் (வடக் கை) நடுவரைக்கு இணையாக 8 தூரத்திலிருக்கும் ஒரு சிறு வட்டம். எனவே 8 வளரவளர உதிக்குமிடம் கிறக்கிவிடுத்து வடக்குப் பக்கம் தவிர்த்து செல்கிறது. ஆனால் 8-ன் பீப்பெரு மதிப்பு 28½°; அன்று ஜூன் 22-ம் நாள். அன்று கதிரவன் பாதை, நடுவரைக்கு மேல் (வடக்காக) நடுவரைக்கு இணையாக 28½° தூரத்திலுள்ள ஒரு சிறு வட்டம். எனவே, தொடுவானத்தின் உதிக்குமிடம் கிறக் குப் புள்ளிக்கு வடக்கில் தனது உச்சக்கோடிக்கு தவிர்த்து வரு கிறது. அதற்குமேல், வடக்குப்பக்கம், கதிரவன் உதிக்குமிடம் தவிர்த்து செல்லமுடியாது.

ஜூன் 22-ம் நாளுக்குப் பின்னு 8 கூட்டு மதிப்புண்டயதாவிலும், குறைத்துவந்து செப்டம்பர் 23-ம் நாளன்று 0 ஆகிறது. எனவே, பழையபடி உதிக்குமிடம், வடக்குப்பக்கம் அமைந்த கோடியினி லிருந்து, கிறக்குப் பக்கம் மேலே தவிர்த்து, செப்டம்பர் 23-ம் நாள், கிறக்குப் புள்ளியை மறுபடியும் அடைகிறது ; அன்று கிறக்குப் புள் ளியில் உதிக்கிறது.

செப்டம்பர் 23-ம் நாளுக்குப் பிறகு, உதிக்குமிடம் கிறக்கி லிருந்து, தொடுவானத்தின் மேல் தெற்கு நோக்கி தவிர்த்து. டிசம்பர் 22-ம் நாள், கிறக்குப் புள்ளிக்குத் தெற்கில், தனது உச்சக் கோடிக்கு வருகிறது. அன்று கதிரவன் பாதை, நடுவரைக்குக் 40½ (தெற்கில்) நடுவரைக்கு இணையாக 28½° தூரத்திலிருக்கும் சிறு வட்டம். இத்தகுத் தெற்கே, இனிக்கதிரவன் உதிக்குமிடம் தவிர்த்து செல்லமுடியாது.

ஓரானடி, இரண்டு நாட்கள்மட்டுமே அதாவது மார்ச்சு 21-ம் நாள், செப்டம்பர் 23-ம் நாள் கதிரவன் கிழக்கில் உதித்து மேற்கில் மறையும். இரவும் பகலும் சமமாக 12 மணி நேரம் இருக்கும்.

மற்ற நாட்களில் இரவும் பகலும் சமமாகிருக்காது. இத் திருச்சிகளின் விளைவுகள் அடுத்தபகுதியில் விவரமாக எடுத்துக் கூறப்படும். மூன் கூறப்பட்டவை 9 (90) என்ற குறிப்பிட்ட வடக்கு அகலங்கு உள்ள இடத்திற்குமட்டுமே பொருத்துமென்பதைக் கவனத்தில் கொள்க. படம் 3-5-1 பார்த்தால் மூன் கூறப் பட்டிருப்பது விளக்கமுறும்.

3-8-5. ஒரு குறிப்பிட்ட காலில் கதிரவன் வல ஏற்றம் கணித தம் (தோராய மதிப்பு) :—

ஓரானடு காலத்தில் கதிரவன் தன் பாதையில் நகரும்போது ஒரே சீரான கோண வேகத்தில் நகருவதில்லை, எனவே அதன் வல ஏற்றமும், நடுவரை விளக்கமும் சீராக மாறுவதில்லை.

எனினும் பின்வரும் பட்டியல் உதவியோடு, கதிரவன் வலஏற்றம், மார்ச்சு 21-ம் தேதி 0° ஆரம்பித்து திசை சி ஏதக்கூறைய 1° உயர்விறது என்ற அடிப்படையில், தாம் ஏதேனும் குறிப்பிட்ட நாளில் தோராயமான வலஏற்றம் அறிவலாம்.

நாள்	கதிரவன் வலஏற்றம்
மார்ச்சு 21	0°
ஜூன் 22	90°
செப்டம்பர் 23	180°
டிசம்பர் 22	270°
அடுத்த ஆண்டு மார்ச்சு 21	360° (0°)

எடுத்துக்காட்டு

மார்ச்சு 21-ம் நாள் : மார்ச்சு 21-ம் தேதிக்குப் பின்பு 10 நாள் கழித்து வலஏற்றம் = 10°

ஏப்ரல் 15-ம் நாள் : மேலும் 15 நாட்கள் கழித்து, வல ஏற்றம் = 25°.

ஜூன் 1ம் நாள் : ஜூன் 28ம் தேதிக்கு முன்பாக 21 நாட்கள்
வலவர்தம் = $20^{\circ} - 21^{\circ} = 60^{\circ}$.

அக்டோபர் 2ம் நாள் : செப்டம்பர் 28ம் தேதிக்குப் பின்பு
8 நாள், வலவர்தம் = $180^{\circ} + 8^{\circ}$
= 188°

மார்க்சு முதல் தேதி : வலவர்தம் $360^{\circ} - 20^{\circ} = 340^{\circ}$. இவை
யாவும் தோராய மதிப்பீடுகள்.

3-8-5-1. தோற்றக் கதிரவன் நேரம் (Apparent Solar Time) :

ஒரு குறிப்பிட்ட இடத்தில், கதிரவன் உச்சி கடக்கும் சமயம் அக்க இடத்திற்குத் தோற்ற நன்பகல் (Apparent noon for the place) எனப்படும். அடுத்தடுத்து இருநகல்பகலுக்கு இடைப்பட்ட பொழுது, தோற்றக்கதிரவன் நாள் (Apparent Solar day) எனப்படும்.

ஒரு குறிப்பிட்ட நாளில், ஓர் இடத்தில், தோற்ற நன்பகல் சமயத்தில், கதிரவன் வலவர்தம் α எனக் கொள்ளோம். அப்போது மின்வழி நேரம் t . ஆனால், $t = (\alpha \pm h)$ என்ற வாய்பாட்டின்படி, (கதிரவன் உச்சி கடக்கும்போது $h=0$ ஆகையால்) $t = \alpha$ எனப் பெறப்படும். அடுத்த நாள், கதிரவன் உச்சி கடக்கும்போது நாம் 3.8-4ம் கண்டபடி கதிரவனின் வலவர்தம் தினசரி ஏறத்தாழ 1° அதிகமாகவதாக, அன்று உச்சி கடக்கும் நேரம் $t' = \alpha + 1^{\circ}$ எனப் பெறப்படும். எனவே முதல்நாள் கதிரவன் உச்சி கடக்கும் சமயத்திற்கும், அடுத்த நாள் கதிரவன் உச்சி கடக்கும் சமயத்திற்கும் இடைவெளிப்பொழுது, ஒரு மின்வழி நாள் + 1° க்குச் சமமான 4 மின் வழி நிமிடங்களாகும். எனவே, ஒரு தோற்றக்கதிரவன் நாள் = ஒருமின் வழி நாள் + 4 மின்வழி நிமிடங்கள். இது ஒரு தோராயச் சமன்பாடு. பொதுவாகக் கூறுமிடத்து, ஒரு தோற்றக் கதிரவன் நாள் = ஒரு மின் வழிநாள் + தினத்தோறும் ஏற்படும் கதிரவன் வலவர்த உயர்வு எனக் கூறலாம்.


ஒரு தோற்றக்கதிரவன் நாள் 24 தோற்றக்கதிரவன் மணிகளாகவும், ஒரு மணி 60 நிமிடங்களாகவும், ஒரு நிமிடம் 60 விநாடிகளாகவும் பிரிக்கப்பட்டிருக்கிறது. எனவே, ஒரு தோற்றக்கதிரவன் வழி நேர அளவு அகற்று இன்னவாறு மின்வழி நேர அளவைவிட சற்றுப் பெரிது. [தோற்றக்கதிரவன் என்ற சொற்றொடரை 'தோ.க.' என்றும் குறிப்பிடலாம்]. 24 தோ. க. மணி நேரத்தில் நேரக் கோணம் 360° வளர்கிறது; அதாவது ஒரு தோ. க. மணிக்கு 15° வீசிதம் வளர்கிறது.

எனவே, தேர. க. மேற்கு தேரக்கோணம் h° ஆனால், அப் போது காலம் நிற்பகம் $\frac{h}{15}$ மணி; கிழக்கு தேரக்கோணம் h° ஆனால், அப்போது காலம் நிற்பகம்

$$\left[12 - \frac{h}{15} \right] \text{ மணி.}$$

3-8-6. காங்காவது ஆயத்தொலை முறை—கதிரவன் பாதை ஆயத்தொலை முறை—வின் செட்டாங்கு, வின் அகலங்கு; (Fourth System of Co-ordinates—the ecliptic system of co-ordinates—the celestial longitude and the celestial latitude)

8-8-1, 8-8-2-1, 8-8-2-2 என்ற பத்திகளில் மூன்று விதமான ஆயத்தொலை முறைகள் கண்டிடும். நான்காவதாக, கதிரவன் பாதையை முதலிலே வட்டமாகவும், γ வழியாகக்கதிரவன் பாதைக்குரிய குத்து வட்டத்தை, தலைமைய துணை வட்டமாகவும் கொண்டு மற்றோர் ஆயத்தொலை முறை வழக்கிலுள்ளது. படம் 8-5-6ல்,



படம் 8-5-6

முதலில் வட்டம்:—ஞானிற்றுப் பாதை CL; துருவங்கள் K, K'; தலைமையக்குத்து வட்டம் γK என்ற துணைக்குத்து வட்டம், S என்ற விண்மீன் வழியாகத் துணைக்குத்து வட்டம் வரைக.

KSM என்ற துணைக்குத்து வட்டத்திற்கு விண்மீனின் செட்டாங்கு வட்டம் (Longitude Circle) எனப் பெயர் வைத்துக்கொள்வோம்.

3இன் ஆயத்தொலைகள்: வான நெட்டாங்கு (Celestial Longitude):

வரைபகை: விண்மீனின் நெட்டாங்கு வட்டத்திற்கும் γ வரையாக உள்ள துணைக்குத்து வட்டத்திற்கும் இடைபடும் கோணம் வான நெட்டாங்கு எனப்படும். படம் 3-8-6ல் 3இன் வான நெட்டாங்கு = $\gamma R M$ - லில் γM .

வான அகலாங்கு (Celestial Latitude) (வரைபகை): விண்மீனின் நெட்டாங்கு வட்டத்தின்மேல், கதிரவன் பாதையிலிருந்து, விண்மீன்வரை உள்ள கோணதூரம் வான அகலாங்கு எனப்படும்.

படம் 3-8-6ல் வான அகலாங்கு - லில் MS .

3-8-6-1. குறிப்புகள்: (i) வழக்கில் கதிரவன் பாதையின்மேல் γ விலிருந்து விண்மீன் நெட்டாங்கு வட்டப் பாதம் வரையுள்ள தூரம் வான நெட்டாங்கு எனப்படும். இது γ விலிருந்து இடஞ்சுழியாக 0° முதல் 360° வரை அளக்கப்படும்.

(ii) கதிரவன் பாதையும், வான நடுவரையும் வெட்டும் இடங்கள் γ , = ஆகும்.

(iii) கதிரவன் பாதையான CL இன் மேல் கதிரவன் இருப்பதால், கதிரவனுக்கு அகலாங்கு ஆயத் தொலை எப்போதும் பூச்சியம். அதன் நெட்டாங்கு ஒர் ஆண்டில் 0° முதல் 360° வரை வளர்ந்து செல்கிறது. (γ லில் கதிரவன் இருக்கும்போது, கதிரவன் நெட்டாங்கு 0° ; γ ல் இருக்கும்போது 180°). இவ்வாயத் தொலைகள் சிறப்பாகக் கதிரவன் இடங்குறிக்கப்பெரிதும் பயன்படும்.

(iv) பன்னாஸ்கில் எல்லா இடங்களிலும் γ ன் இட நிலையும் கதிரவன் தோற்றப்பாதையும் பொதுவாதனின் விண்மீனுக்கு (இடத்திற்கு இடம்) வான நெட்டாங்கும் அகலாங்கும் மாறுவதில்லை; தினசரிச் சுழலில் γ ல், விண்மீன்களும் ஒரே சீரான வேகமுடைய தாயிருப்பதால், வான நெட்டாங்கும் அகலாங்கும் மாறுவதில்லை. (அச்சத்தினை மாதம், அச்சத்தை இவத்தின் விளிவாக ஏற்படும் சிறு மாறுதல்கள் மீண்டும் பகுதி 18 இல் விவரிக்கக் கிடைக்கும்.)

(v) கதிரவன் விண் நெட்டாங்கு, தோராயமாக நான்கு 1° விதம் வளர்கிறதெனக் கூறலாம். ஆனால் கதிரவன் விண் நெட்டாங்கு வளர்க்கி சீரானதில்லை.

3-8-7. நான்கு ஆயத் தொலைமுறைகள் - ஒப்பீடுகள் - சாதக பாதகங்கள் - (Four Systems of Co-ordinates - Comparisons - Advantages and disadvantages).

(i) தொடுகணம்; உச்சி வட்டம், உச்சிப் புள்ளி, நிலையாய் புள்ளிகள் (கிழக்கு, மேற்கு, வடக்கு, தெற்கு) யாவும் எளிதில் அறிவக்கூடியவை. ஒரு குறிப்பிட்ட அகலாங்குள்ள இடத்தில்

அவற்றை வான கோளத்தின்மேல் நிலைநிறுத்தலாம்; அக்கூட்டத்தைப் பொருத்தப்பட்டிருக்கிற அனைத்து அங்கங்களையும் காட்சியானதுக்கு இடம் பெயராதவைகளாகும். எனவே ஒரு குறிப்பிட்ட இடத்தில், ஒரு குறிப்பிட்ட சமயத்தில், ஏற்றம், உச்சிதூரம், அடிவானதூரம் கொண்டு, ஒரு விண்மீனை வான கோளத்தின் மேல் நிலைக்கச் செய்யலாம். ஆனால் விண்மீனைப் பொருத்தப்பட்டிருக்கிற ஏற்றமும் உச்சி தூரமும் வினாடிக்கு வினாடி மாறிக்கொண்டேயிருக்கும்; இடத்திற்கு இடம், அதாவது வெவ்வேறு மண்ணுலக அகலங்களுக்கு, மண்ணுலக தொட்டாக்கு உள்ள இடங்களில் அவை மாறு மதிப்புகளை ஏற்றும். எனவே, முதல் ஆயத்தொலை முறை, ஒரு குறிப்பிட்ட இடத்தில் குறிப்பிட்ட சமயத்திற்கு மாத்திரமே காட்சியானதுக்குப் பயன்படும்.

(ii) வான நடுவரைவானது இடத்திற்கு இடம், தொடு வானத்திற்கு வெவ்வேறு சாய்வுகளில் இருக்கும். ஆனால் காட்சியானது எங்கு இருப்பினும் நடுவரையின் தளம் மாறாது, ($QR1pp'$, அதாவது $1PP'$) எனவே, எல்லா இடங்களுக்கும், விண்மீனின் நடுவரை விவக்கம்/துருவ தூரம் இரண்டும் மாறாது. ஆனால் வினாடிக்கு வினாடி நேரக்கோணம் மாறும்.

(iii) γ ஒரு நிலைத்த புள்ளியாக நடுவரை மேல் கொள்ளப் படுவதாலும், γ ன் கோண வேகத்தோடு, மற்றெல்லா விண்மீன்களும் நடுவரையின்மேலே அல்லது நடுவரைக்கு இணையான வட்டங்களில் மேலே நகர்வதால், எல்லா விண்மீன்களுக்கும் γ ஐ வொட்டிய தூரம் மாறாது.

எனவே, (அ, பி) என்ற ஆயத் தொலைகள், விண்மீனுக்கு மாறிவித் தொலைகளாக இருக்கின்றன. ஆகவே, பொதுவாக வானியல் காட்சிப் பதிவுகள் செய்யும்போது, இவ்வாயத் தொலைகள் பயன்படுத்தப்படுகின்றன. மாலுமீப் பஞ்சாங்கத்தில் பல விண்மீன்களுக்கு இவ்வாயத்தொலைகள் கொடுக்கப்பட்டிருக்கின்றன. எந்த அகலங்களில் உள்ளவர்களும் இவற்றின் எந்த நேரத்திலும் பயன்படுத்திக்கொள்ளலாம்.

(iv) γ ம் கடிரவன் பாதையும் நிலைத்தவை யாதலின் சிறப்பாக, கடிரவன், கடிரவன் குடும்பக் கோள்கள், சத்திரன் முதலியவற்றின் இடம் குறிக்கப் பயன்படும்.

ஆனாலும் γ , = முதலியவற்றை நாம் வானத்தை நோக்கிப் பார்த்து இடக்குறிக்கமுடியாது. அவையெங்கு இருக்கின்றனவென கற்பனையாகத்தான் அறிவமுடியும். கடிரவன் பாதையும் வரைவது எளிதல்ல. எனவே பல ஏற்றம், நடுவரை விவக்கம்-அல்லது வான தொட்டாக்கு அகலங்களுக்கு கொண்டு, வானத்தைப் பார்த்து இடங்காண முடியாது. ஆனால் அவற்றின் சிறப்புகள்

(ii), (iii), (iv) க் கூறியபடி ஆளமவதால், அவை ஆயத் தொலைகளை வானூராய்ச்சியில் பயன்படுத்தப் படுகின்றன.

3-8-8 ஆயத்தொலை மாற்றங்கள் (Conversion of Co-ordinates)

முதலில் வட்டத்திற் கேற்ப, நாம் நான்கு விதங்களில், ஆயத் தொலைகள் கொண்டு வரப்பொருளை வான கோளத்தில் இடக் குறிக்கக் கொள்க கண்டோம். அவற்றில் ஏதாவொரு முறையில் கொடுக்கப்பட்ட ஆயத் தொலைகளை மற்றோர் முறைக்குரிய ஆயத் தொலைகளாக மாற்றும் வழி வகைகளை இப்போது பார்க்க்போம் :

3-8-8-1 : மீள்வரும் வினக்கங்களில் மரபுப்படி, நாம் ஆயத் தொலைக் குறிப்புகளை ஏற்றுக் கொள்வோம் :


- A — அடி வான தூரம்
- σ — கோண ஏற்றம் (சுருக்கமாக ஏற்றம் எனவும் கூறலாம்)
- Z — உச்சி தூரம் $Z = (90 - \sigma)$
- h — தேரக் கோணம்
- δ — நடுவரை விலக்கம்
- α — வல ஏற்றம்
- λ — வான நெட்டாங்கு
- β — வான அகலங்கு
- ϕ — காட்சியானது உள்ள இடத்தின் மண்ணுலக அகலங்கு.
- r — காட்சி தேரம் — மீள்வழி தேரம்.
- S — விண்மீளிடத்தைக் குறிக்கும்.

ஆயத் தொலை மாற்றம்

(i) (A, σ) ஓ மூன்றாம் கொடுக்கப் பட்டால் (h, δ) வும் (α, β) வும் அதிவது.

மரபுப்படி படம் 3-8-8-1 (i) வரையப் பட்டு, ஆயத் தொலைக் குறிக்கப்பட்டுள்ளன.

$SM = \sigma$; $SoM =$
 $SoZM = A$; $NP = \phi$
 கொடுக்கப்பட்டவை (h, δ) களாக,



படம் 3-8-8-1.

மூலகோணம் ZPS ஐ,

$$PZ = 90 - \phi; PZS = 180 - A; ZS = 90 - \alpha$$

$$SP = 90 - \delta; ZPS = h, \text{ இங்கு } (h, \delta) \text{ தெரிவாகு.}$$

ΔZPS ஐ

$$\cos PS = \cos PZ \cos ZS + \sin PZ \sin ZS \cos PZS \quad \dots [1.6 \text{ (ii)}]$$

$$\therefore \cos (90 - \delta) = \cos (90 - \phi) \cos (90 - \alpha) + \sin (90 - \phi) \sin (90 - \alpha) \cos (180 - A).$$

$$\sin \delta = \sin \phi \sin \alpha - \cos \phi \cos \alpha \cos A \quad \dots (1)$$

இங்கு ϕ, α, A நமக்குக் கொடுக்கப்பட்டிருப்பதால் δ ஐக் கணிக்கலாம்.

நான்கு அடுத்தடுத்த உறுப்புகள்,

$$h; 90 - \phi; 180 - A; 90 - \alpha$$

$\therefore$ 1.6 (iii) இன்படி,

$$\therefore \cos (90 - \phi) \cos (180 - A) = \sin (90 - \phi) \cot (90 - \alpha) - \sin (180 - A) \cot h.$$

$$- \sin \phi \cos A = \cos \phi \tan \alpha - \sin A \cot h.$$

$$\therefore \cot h = \frac{\sin \phi \cos A + \cos \phi \tan \alpha}{\sin A} \quad \dots (2)$$

ϕ, α, A தெரிவுவாதவின் h கணிக்கப்படுகின்றது. $l = \delta - h$ என்ற தேற்றம் கொண்டு, அந்த சமயத்தில் உள்ள l ஐ, மீன்வழி நேரம் காட்டும் கடிகாரம் கொண்டு தெரிந்து, δ அறியலாம். எனவே h, δ, ϕ மூன்றும் α, A என்பவற்றின் சார்பாகப் பெறப்படுகின்றன.

(ii) மறுதலியாக (h, δ) அல்லது (δ, ϕ) கொடுக்கப்பட்டால், (A, α) காணும் முறை.

δ கொடுக்கப்பட்டிருப்பதால் $l = \delta + h$ கொண்டு அப்போது வானபொருளின் h அறியலாம். எனவே h, δ, ϕ நமக்குத் தெரிபுடும்.

ΔZPS ஐ 1.6 (ii) இன்படி.

$$\cos ZS = \cos ZP \cos PS + \sin ZP \sin PS \cos ZPS.$$

$$\begin{aligned}\cos (90-\sigma) &= \cos (90-\phi) \cos (90-\delta) + \\ &\quad \sin (90-\phi) \sin (90-\delta) \cos h \\ \sin \sigma &= \sin \phi \sin \delta + \cos \phi \cos \delta \cos h \quad \dots (3)\end{aligned}$$

$\therefore \sigma$ கணிக்கப்படுகிறது.

நான்கு அடுத்தடுத்த உறுப்புக்கள், $90-\delta$; h ; $90-\phi$; $180-A$ ஆகும். இங்கு A தெரியாது.

$\therefore$ 1-6 (iii) இன்படி,

$$\begin{aligned}\cos (90-\phi) \cos h &= \sin (90-\phi) \cot (90-\delta) \\ &\quad - \sin h \cot (180-A).\end{aligned}$$

$$\therefore \sin \phi \cos h = \cos \phi \tan \delta + \sin h \cot A$$

$$\therefore \cot A = \frac{\sin \phi \cos h - \cos \phi \tan \delta}{\sin h} \quad \dots (4)$$

$\therefore A$ கணிக்கப்படுகிறது.

எனவே, (h, δ) ஆகியது (Δ, δ) கொடுக்கப்பட்டால் (σ, A) இரண்டும் h, δ, ϕ என்பவற்றின் சரிபாகப் பெறப்படுகின்றன.

(iii) (Δ, δ) கொடுக்கப்பட்டால், ஆகவான் பொருளின் (λ, β) வான நெட்டாங்கு, வான அகலாங்கு காண்க.

படம் 8-5-8.1 (iii) மரபுப்படி வரையப்பட்டு உள்ளிகள் குறிக்கப்பட்டிருக்கின்றன.


$$\gamma M = \alpha$$

$$S M = \delta$$

$$\gamma M_1 = \lambda$$

$$S M_1 = \beta$$

$$\begin{aligned}\widehat{R \gamma L} &= \omega = \widehat{P K} = \\ &\text{கதிரவன் மாதிரி சரிவு.}\end{aligned}$$



படம் 8-5-8.1 (iii)

(iv) (λ, β) கொடுக்கப்பட்டால், (α, δ) காணல் :

ΔKPS க்கு,

$$\cos PS = \cos PK \cos KS + \sin PK \sin KS \cos FKS.$$

$$\therefore \cos (90 - \delta) = \cos \omega \cos (90 - \beta) + \sin \omega \sin (90 - \beta) \cos (90 - \lambda).$$

$$\therefore \sin \delta = \cos \omega \sin \beta + \sin \omega \cos \beta \sin \lambda \quad \dots (7)$$

இவ்வாறு δ கணிக்கப்படுகிறது.

ΔKPS க்கு தள்கு அடுத்தடுத்த உறுப்புகள்,

$$90 + \alpha, \omega, 90 - \lambda, 90 - \beta.$$

இங்கு α மட்டும் தெரியாது.

$$\therefore \cos \omega \cos (90 - \lambda) = \sin \omega \cot (90 - \beta) \\ = \sin (90 - \lambda) \cot (90 + \alpha)$$

$$\therefore \cos \omega \sin \lambda = \sin \omega \tan \beta + \cos \lambda \tan \alpha.$$

$$\therefore \tan \alpha = \frac{\cos \omega \sin \lambda - \sin \omega \tan \beta}{\cos \lambda} \quad \dots (8)$$

இவ்வாறு α பெறப்படுகிறது.

எனவே ϕ ஓடு (i, ii) கொடுக்கப்பட்டால் (α, δ) உம், மற்ற நிலையாகவும், ω ஓடு (α, δ) கொடுக்கப்பட்டால் (λ, β) உம் மற்ற நிலையாகவும், கணிக் கும் முறைகளைப் பார்த்தோம்.

ΔZPS ; ΔKPS என்ற கோண முக்கோணங்கள் தமக்கு உதவிபடும் இருந்தன.

(v) மேலும், சிறப்பாக, (iii), (iv) க்கு காட்டிய முறைகள் கதிரவனின் பொருத்தமட்டில் மிக்க பயனுண்டவை. படம் 8-8-8-1 (v) காண்க. ஏனெனில், கதிரவன், தன் பாதையில், செல்லும்போது $\beta = 0$, அதாவது கதிரவனின் அகவாங்கு எப்போதும் பூச்சியம்.

எனவே படம் 8-8-8-1 (v) இல்

YM —வான நடுவரை


YS —கதிரவன் பாதை

S —கதிரவன்

எனக்கொண்டால்,

ΔYSM க்கு,

$\angle SML = 90^\circ$ ஆகும்.



படம் 8-8-8-1 (v)

ஒரு கோணம் SM என்பது அதிசயவின் தடுவரை விவகாரம், தடுவரைக்குச் செங்குத்து வட்டமாகும்.

$YS = \alpha$ = அதிசயவின் தொட்டாங்கு.

$YM = \beta$ = அதிசயவின் வரைதல்

$SM = \delta$ = அதிசயவின் தடுவரை விவகாரம்.

$\therefore$ தொட்டாங்கு விதிப்படி,

$$\sin(90 - \alpha) = \cos \beta \cos \delta$$

$$\therefore \cos \alpha = \cos \beta \cos \delta \quad \dots (9)$$

மேலும், $\sin(90 - \alpha) = \tan \beta \tan(90 - \alpha)$.

$$\therefore \cos \alpha = \tan \beta \cot \alpha$$

$$\therefore \tan \beta = \cos \alpha \tan \alpha \quad \dots (10)$$

மேலும் $\sin \delta = \cos(90 - \alpha) \cos(90 - \alpha)$

$$\therefore \sin \delta = \sin \alpha \sin \alpha \quad \dots (11)$$

(α, β) தொட்டாங்கு (9) இன் வழியாக, α அதிசயவின்

α தொட்டாங்கு (10), (11) இன் வழியாக (α, β) அதிசயவின்

மற்றும் $\sin \beta = \tan \delta \tan(90 - \alpha)$.

$$= \tan \delta \cot \alpha.$$

$$\therefore \tan \alpha = \frac{\tan \delta}{\sin \beta} \text{ என்ற தொடர்பு கிடைக்கிறது.}$$

(vi) அதிசயவின் தொட்டாங்கு, வரை ஏற்றங்களில் சிறு உயர்வு - குறைவுகளில் தொடர்பு.

(10) இன் படி,

$$\tan \beta = \cos \alpha \tan \alpha$$

$\therefore$ வரை துள் கணித முறைப்படி,

$$\sec^2 \beta \Delta \beta = \cos \alpha \sec^2 \alpha \Delta \alpha$$

$$\therefore \Delta \beta = \frac{\cos \alpha \sec^2 \alpha}{\cos^2 \beta} \Delta \alpha$$

$$= \frac{\cos \alpha}{\cos^2 \beta} \Delta \alpha \quad (9) \text{ இன் படி.}$$

குறிப்பு : அதிசயவின் தன் பரணையில் சிறிது தகராறு. அதன் தொட்டாங்கு $\Delta \alpha$ அளவு மாதிரியும் அப்போது, அதிசயவின் வரை

ஏதும் ஏதத்தாழ $\frac{\cos \alpha}{\cos 15^\circ}$ Δ ானதும் எனக் கணிக்கலாம். இது மின்னச் பயன்படுத்தப்படுவதைக் காண்க.

3.9. சத்திரன்: தற்போதிகமாக, சத்திரனைப்பற்றிய பின்வரும் உண்மைகளை ஏற்போம். மின்னச் சத்திரனைப்பற்றிய தனிப்பகுதியில் விவரமாகவும் துணுக்கமாகவும் காண்போம்.

(பகுதி 11 காண்க).

1. சத்திரன் பாதை, ஏதத்தாழ கதிரவன் பாதையோடு ஒருங்கி யிருக்கிறதெனக் கொள்ளலாம்.

2. சத்திரன் ஆர்பாதையில் விண்மீன்கள் பின்னணிமிக், மண்ணுலகத்தை ஒரு முழுச்சுற்று சுற்றிவர $27\frac{1}{3}$ நாட்களாகிறது. எனவே சத்திரனின் தனிக்கோண வேகம் (absolute angular velocity) நானுக்கு $\frac{360^\circ}{27\frac{1}{3}} = 13^\circ 2$.

3. கதிரவன் ஓராண்டில், விண்மீன் பின்னணிமிக், மண்ணுலகத்தை ஒரு முழுச்சுற்று சுற்றி வருகிறது. எனவே கதிரவனின் தனிக்கோண வேகம் நானுக்கு

$$\frac{360^\circ}{365} = 1^\circ \text{ (ஏதத்தாழ)}.$$

4. கதிரவனும் சத்திரனும், கதிரவன் பாதையில் ஒரே திசையில் (இடஞ்சுழியாகச்) செல்கின்றன.

5. எனவே நானுக்குதான், சத்திரன் கதிரவனை, பொதுப் பாதையில் $12^\circ 2$ முத்துகிறது. [அதாவது கதிரவனை பொட்டி, சத்திரனின் திசை வேகம் $12^\circ 2$ (Velocity of the Moon relative to the Sun); எனவே மணிக்கு மணி (hour by hour) சத்திரன் கதிரவனை $\frac{12^\circ 2}{24}$ அகுவது தோராயமாக $1^\circ = 30'$ முத்துகிறது.


6. கதிரவனும், சத்திரனும், பொதுப் பாதையில் (வானகோளத்தின் மேல்) ஒரே இடத்தில் இருக்கும்போது, அவ்விரண்டும் இணைவு நிலையில் உட்களன (in conjunction) எனப்படும். அப்போது, அவ்விரண்டின் விண் நெட்டாங்குசூழும் (Celestial Longitude) சமம்.

7. இணைவு நிலையிலிருந்து, கதிரவனுக்கும் சத்திரனுக்கும் இடைப்படும் தூரம் நானுக்குதான் $12^\circ 2$ யிருப்பாகி (அவற்றின் விண் நெட்டாங்கு வேறுபாடு) அத்தூரம் 180° ஆக $\frac{180^\circ}{12^\circ 2} = 14.75$ நாட்கள் ஆகிறது. அப்போது, கதிரவனும் சத்திரனும் நேநெதிர் நிலையில் உட்களன (in opposition) எனப்படும்.

8. இரண்டி நிலையில் ஆரவாசையும் (New Moon) நேரெதிர் நிலையில் மூழுமதியும் (பெரணம்: Full Moon) ஏற்படுகின்றன. இதில்: ■ இருட்டு. □ வெளிச்சம்.



இரண்டி நிலை (அமாவாசை)



வான கோளம் (அமாவாசை)



வானகோளம் (முழு மதியம்)

9. சத்திரன் வயது (Moon's age) :— அபரவானசெக்குப் பின்னு x நாட்கள் கழித்து, சத்திரன் வயது x நாட்கள் எனப்படும். அன்று கதிரவனுக்கும் சத்திரனுக்கும் இடைப் பட்ட தூரம் = $x \times 12^\circ.2$ ஆகும்.

எனவே, அன்று கதிரவனின் வின் நெட்டாக்கு = ஆனாக, சத்திரனின் வின் நெட்டாக்கு = $+ x \times 12^\circ.2$.

10. சத்திரன் வயது 14.75 ஆனால் சத்திரனுக்கும் கதிரவனுக்கும் இடைப்பட்ட தூரம்,


$$14.75 \times 12.2 = 179.75 \sim 180^\circ$$

(நேரெதிர் திசை—முறு மதிவம்).

எடுத்துக்காட்டுகள் :

3. ௮. வான கோளத்தில் சத்திரன், கதிரவன், வின் மீன்கள் இடங்குறித்தல் :

மண்ணுலகில் ஒரு குறிப்பிட்ட மண்ணுலக அகலங்களுள்ள இடத்தில் (Terrestrial latitude), ஒரு குறிப்பிட்ட நேரத்தில் தேவையப்படும் ஆயத்தொலைவைக் கொடுக்கப்பட்டால், நோயாவ மாசு, வின் பொருள்களின் இடங்குறிக்கணம் இம்முறைகளைப் பயன்போம்;



படம் 8௩.

8. ex. எ. கா. 1. சென்னையில் வட-அகலங்கு 19° , மார்க்க 21ம் தாளன்று, மீத்பகல் 2 மணிக்கு, கதிரவன் இடங்குறிக்க, அன்று முழுச்சத்திரன் தாளானும், சத்திரன் இடங்குறிக்க.

காமிதத்தின் தளம் உச்சி வட்ட தளமெனக் கொள்க. வானக் கோணம் வரைத்து, S, N, Z, Z' இடங்குறிக்க.

(படம் 8. a.) P வடதுருவமாயும் $N^p = 18^\circ$.

(வடதுருவத்தின் ஏற்றம் = இடத்தின் அகலங்கு)

கோள மையம் O வழியாக PP' வரைத்தால் P' தென் துருவம். PP' க்கு $\perp$ ஆக வெருவட்டம் வான நடுவரை QR .

1ஐ—படம் 8. a, 52ம் பக்கம் பார்க்கவும்.


மீத்பகல் 2 மணி ஆதலின், கதிரவன் உச்சி வட்டது நேரக் கோணம் 80° , மேற்கு $ZPS = 80^\circ$; மார்க்க 21ம் தாளத்தின் S (கதிரவன்) நடுவரை மேலிருக்கும். எனவே S என்ற புள்ளி கதிரவனின் இடங்குறிக்கும். அன்று கதிரவனின் வல ஏற்றம் = 0°

$\therefore \gamma$ ம் ம் ஒரே புள்ளியாகும். γ வீலிருந்து, நடுவரையின் மேல் 180° தள்ளி = இவ் இருக்கும்.

அன்று முழுச்சத்திரன் தாளாகவால் கதிரவனுக்கும் சத்திரனுக்கும் கதிரவன் யாதையில் உள்ள இடைவெளி 150° , அதாவது எதிர்த்திசை நிலை. இப்போது கதிரவன் γ ல் இருக்கிறது. கதிரவன் யாதையில் γ வீலிருந்து 180° உள்ள புள்ளி Δ ; இதுவும் ஒரு நடுவரைப் புள்ளியாதலால், Δ இடங்குறிக்கப்பட்ட இடத்தில் சத்திரன் இருக்கும். γ, Δ வழியாக QR க்கு $28\frac{1}{2}^\circ$ சங்கிலி கதிரவன் யாதை இருக்கும். படத்தில் காட்டப்படவில்லை.

3-a. எ. கா. 2: 80° வட அகலங்கு உள்ள இடத்திலிருந்து நேரம் 9 மணிக்கு γ வின் இடங்குறிக்க. அப்போது ($\Delta = 85^\circ$; $\delta = 15^\circ$) என்ற விண்ணின் இடங்குறிக்க.

வான கோணம் வரைத்து NS, Z, Z' இடங்குறிக்க. $NP = 80^\circ$ என்ற முறையில் P வட துருவத்தைக் குறிக்கும்; நேரேதிப் புள்ளி (O வழியாக) P' தென் துருவத்தைக் குறிக்கும். PP' க்கு $\perp$ ஆக வான கோணத்தை வெட்டும் வெருவட்டம் QR என்ற நடுவரையைக் காட்டும். மீள் வழி நேரம் 9 மணிப்பாதலால் நடுவரையின் மேற்குப் புறத்தில் $ZPY = 185^\circ$ என்ற கணக்கில் γ இருக்கும். γ நடுவரையின் மேலுள்ளது. விண்ணின் $\Delta = 85^\circ$ ஆனதால் $\gamma M = 95^\circ$ என இடஞ்சுழியாக, நடுவரையின் மேல் M என்ற புள்ளி



படம் 8.5.


கொண்டால், PM என்ற பெருவட்டம் S ன் தடுவணைவிலக்க வட்டமாகும். S ன் தடுவணை விலக்கம் 15° வடக்காதலின், QR க்கு இணையாக, QR க்கு வடக்கே 15° ஓரத்தில் ஒரு சிறுவட்டம் AB வரைந்தால், AB என்பது அக்வினேலினின் திளசரிப் பாதையாகும். AB ய், PM ய் தடுவணைக்கு மேற்குப் புறத்தில் S என்ற இடத்தில் வெட்டட்டும். S என்பது அப்போது வின்செனின் இடமாகும்.

3.5. எ.கா.3 : 45° வட அகலங்களுள்ள ஓரிடத்தில் அக்னோபர் மாதம் 18ம் நாள் முற்பகல் 10 மணி; அன்று சத்திரன் வயது 15 நாள்; S_1 வின்சென் ($\alpha_1 = 45^\circ$, $\delta_1 = 15^\circ$ வடக்கு). S_2 வின்சென் ($\alpha_2 = 100^\circ$, $\delta_2 = 25^\circ$ தெற்கு); வான கோளம் வரைந்து, கதிரவன், சத்திரன், S_1 , S_2 இடங்குறித்துக் காட்டுக.

வான கோளம் வரைந்து N , S_0 , Z , Z' இடங்குறிக்க. படம் (8.5.) $NP = 45^\circ$ என்றவகையில் P இடங்குறிக்க. P வடதுருவம்; எவ்வ வழியாக P ன் எதிர்முள்ளி P' தென்னுருவம். PP' க்குச் செங்குத்தான தளம், வான கோளத்தை வெட்டட்டும்; அங்கு வெட்டு முகம் QR . என்ற தடுவணை. கதிரவன் கிழக்கு நேரக் கோணம் 80° ; ஏனெனில் நேரம் காலை 10 மணி; உட்கிக்கு இரண்டு மணி முள்ளதாக; எனவே, $ZPM = 80^\circ$ என வரைந்தால் PM அப்போது கதிரவன் தடுவணை விலக்க வட்டம். நேரி, அக்னோபர் 13; எனவே செப்டெம்பர் 28க்குப் பின்டி 20நாள். எனவே கதிரவனின் வல ஏற்றம் ஏறத்தாழ $150^\circ + 20^\circ = 200^\circ$.

எனவே, M விருத்து வயஞ்சுழியாக $MQ\gamma = 200^\circ$ எடுத்து γ ஐ QR ன் மேல் இடங்குறிக்க. ($Q\gamma = 170^\circ$) γ விருத்து தடுவணைத் தளத்திற்கு 28° சாவலில் தளம் எடுத்து, அத்தளம், வான

கோளத்தை $C'L'$ என்ற பெரு வட்டத்தில் வெட்டட்டும், அப்போது $C'YL'$ ஓர் அளவு அதிரவன் பாதை.



படம் 8-2.

பின்னறிப்பு : அதிரவன் γ வைக் கடக்கும்போது, நடுவரைவின் தெற்கிலிருந்து வடக்கே போகிறது ; ω வைக் கடக்கும்போது நடுவரைவின் வடக்கிலிருந்து தெற்கே போகிறது. இந்த அடிப் படைபைப் பயன்படுத்தி γ , ω வழியாக, $28\frac{1}{2}^\circ$ எல்லை, அதிரவன் பாதை வரையவேண்டும்.

அதிரவன் பாதையும் அதிரவன் நடுவரை விலக்க வட்டமாகிய PM உம் ω இல் வெட்டட்டும். அப்போது ω என்ற புள்ளியில் அதிரவன் இடங் குறிக்கப்படுகிறது. அன்று சந்திரன் வயது 18 நாள் ; எனவே, அதிரவனிலிருந்து இடஞ்சுழியாகக் அதிரவன் பாதையேல், சந்திரனின் தூரம் = $18 \times 12.2 = 219.6$. எனவே கீழுந்து இடஞ்சுழியாக $\omega C'YM' = 219.6$ எனக் கொண்டு சந்திரன் இடம் M' எனக் குறிக்க.

S_1 இடங்குறித்தல் : S_1 இன் $\omega = 45^\circ$; எனவே γ கிலிருந்து இடஞ்சுழியாக QR இன்மேல் $YM_1 = 45^\circ$ எடுத்து, PM_1 என்ற பெருவட்டம் வரைக. M_1P இன் மேல் $M_1S_1 = 15^\circ$ என அளந்து S_1 இடங்குறிக்கவும். S_1 இவ்வாறு இடங்குறிக்கப்பட்டது.

S_2 இடங்குறித்தல் : S_2 இன் $\omega = 100^\circ$; எனவே γ கிலிருந்து இடஞ்சுழியாக QR இன் மேல் $YM_2 = 100^\circ$ எடுத்து, PM_2 என்ற பெருவட்டம் வரைக. PM_2 ன் மேல், $M_2S_2 = 25^\circ$ எனத் தெற்குப் பக்கம் அளந்து S_2 இடங் குறிக்கவும். S_2 இவ்வாறு இடங் குறிக்கப்படுகிறது.

M_1 & M_2 மீதேற்றப் பக்கம் இருப்பதையும், அதன் காரணமாக S_1 & S_2 மீதேற்றப் பக்கம் இருப்பதையும் கவனிக்கவும்.

மீதேற்றிப்பு III காண்க, மண்ணுலகத் தென் அகலங்கு பெற்ற இடங்களில் வானகோணம் வரைதல் காட்டப்ப்டிருக்கிறது.

பயிற்சி 3

1. மண்ணுலக நடுவரையிலிருந்து, ஒரு செங்குத்துப்பெறு வட்டவழியாக ஒருவர் 400 கிலோமீட்டர் செல்கிறார். அவன் சேரும் இடத்தில் அகலங்கு காண்க. (மண்ணுலக அரைவிட்டம் 6,400 கி. மீட்டரெனக் கொள்க).

2. ஒருவர் மண்ணுலக நடுவரையிலிருந்து ஒரு பெறுவட்ட வழியாக 10° வடக்கு அகலங்குள்ள ஓர் இடத்திற்குச் செல்கிறார். அவன் சென்ற தூரத்தைக் கிலோமீட்டரில் கணக்கிடுக. (மண்ணுலக அரைவிட்டம் 6400 கிலோமீட்டரெனக் கொள்க.)

3. ஒரு விண்மீனின் வரைதல் 31 ம. 18 நி. 58 செ.; ஆர்போது மீன்வழிநேரம் 8 ம. 58 நி. 48 செ. ஆனால் விண்மீனின் நேரக் கோணம் காண்க. (செப். '80).

4. ஒரு விண்மீனின் வரைதல் அதன் விண் அகலங்குக்குச் சமமானது, அதன் நடுவரை விவக்கமும் விண் நெட்டாகும் சமம் என நிறுவுக. (செப். '80)

5. ஜூன் முதல் நாள் விண்மீன் 'வீகா' (vega) உச்சி கடக்கும் மீன்வழி நேரம் 15 ம. 38 நி. 40 செ. எனவும், அடுத்த நாள் உச்சி கடக்கும் நேரம் 15 ம. 33 நி. 25 செ. எனவும் மீன் வழிக் கடிசாரம் கொண்டு கணிக்கப்படுகிறது. அதே கடிசாரப்படி, ஜூன் 4ம் நாள் மற்றொரு விண்மீன் உச்சி கடக்கும் நேரம் 14 ம. 11 நி. 10 செ. எனத் தெரிகிறது. 'வீகா'யின் வரைதல் 15 ம. 34 நி. 31 செ. ஆனால், இரண்டாவது விண்மீனின் சரியான வரைதல் கணக்கிடுக.

(கடிசாரம் திரியான விவகத்தில் விழப்பட்டிருக்கிறது)

(செப். '88)

6. ϕ அகலங்கு உள்ள ஓர் இடத்தில் h மீட்டர் உயரமான ஒரு கலர், தெற்கு மேற்கே ϕ ல் உள்ளது. ஒரு சம இரவு நாளன்று, அக்கலரின் நிழல் $h \tan \phi \sin \delta$ அளவிற்கு மென் நிறவுக. (செப். '82.)

7. ஒரு விண்மீனின் கீழ்க்கு நேரக் கோணம் 5ம. 51நி. 20செ. அச்சமயம் மீள்வழி நேரம் 4ம. 17நி. 20செ. அங் விண்மீனின் வல ஏற்றம் காண்க.

8. ஒரு விண்மீனின் கீழ்க்கு நேரக் கோணம் $85^{\circ} 11' 15''$; அதன் வல ஏற்றம் 21 ம. 9 நி. 23 செ; அப்போது விண்மீன் நேரம் 14 ம. 56 நி. 25 செ. என நிறுவுக. (செப். '68).

9. 10 ம. 20 நி. வலஏற்றமுள்ள ஒரு விண்மீன் ஜூன் 22-ம் தாளன்று அப்போது உச்சி கடக்கும்? (செப். '68)

10. கீழே குறிப்பிட்ட தேதிகளில் கதிரவனின் வல ஏற்றத்தைத் தோராயமாகக் காண்ககிடுக.

- (1) ஜனவரி முதல் நாள்;
- (1) ஜூன் முதல் நாள்.
- (3) ஜூன் மூன்றாம் நாள்;
- (4) ஏப்ரல் 18ம் நாள்.

11. மீன் கொடுக்கப்பட்ட நிலைகளில், கதிரவன் சந்திர ஜுலையதான நெட்டாங்குகள் காண்க: (i) மார்ச்சு 21ம் நாள்; சந்திரன் வயது 8 நாள். (ii) டிசம்பர் 22ம் நாள்; சந்திரன் வயது 12 நாள்.

12. மண்ணுலக நடுவரை மேலுள்ள ஓர் இடத்தில் மீள்வழித் தடையும் 6 மணி கடக்கும்போது, 30° வல ஏற்றம், 15° வடக்கு நடுவரை விலக்கம் உள்ள ஒரு விண்மீனின் இடம் வான கோளத்தில் குறிக்க. அப்போது அங்விண்மீனின் உச்சி தூரமும், தொடுவான் தூரமும் காண்ககிடுக.

13. மண்ணுலக அகலாக்கு 30° உள்ள ஓர் இடத்தில் (a) மீள்வழி மணி 20க்கு γ ன் இடத்தை வான கோளத்தில் குறிப்பிடுக: (b) γ உச்சி கடக்கும் சமயம், $\alpha = 50^{\circ}$; $\delta = 15^{\circ}$ தெற்கு உள்ள விண்மீனின் நேரக் கோணம் என்ன? அப்போது அங்விண்மீனின் உச்சி தூரமும் காண்க.

14. சென்னைக்கு வட அகலாக்கு 13° வானகோளம் வலஏற்று மீள்வருவனவற்றை இடக்குறிக்க. (i) ஏப்ரல் 10 நாள். காலை 8 மணிக்குக் கதிரவன் இடம் (ii) அன்று 5 நாள் வயதுள்ள சந்திரனின் இடம்; (iii) $\alpha = 40^{\circ}$; $\delta = 15^{\circ}$ வடக்கு உள்ள விண்மீன்; (iv) $\alpha = 120^{\circ}$, $\delta = 15^{\circ}$ தெற்கு உள்ள விண்மீன்.

15. கதிரவனின் வல ஏற்றம் α ; வான நெட்டாங்கு θ ; க கதிரவன் பாகைச் சாய்வு: அப்போது,

$$\sin(\alpha - \theta) = -\tan^2 \frac{\omega}{2} \sin(\alpha + \theta) \text{ என நிறுவுக.}$$

16. கதிரவன் பாதை, தொடுவானத்தோடு இணையும் இடத்திற்குரிய அகலங்கு காண்க.

17. ஊர்ப்புயோமுது (மீன்வழி நேரம்) 6 மணி; அப்போது $22^{\circ} 35'$ வடக்கு அகலங்கு உள்ள இடத்தில், கதிரவன் பாதையை வான கோளத்தில் வரைத்து காட்டுக. கதிரவனின் வரைத்தம் அப்போது 3 மணிவானாக, கதிரவனை அப்பவான கோளத்தில் இடங்குறிக்க. (செப், '82)

18. 18° வட அகலங்கு உள்ள இடத்தில் உள்ள ஒரு காட்சி வானளாது வான கோளம் வரைக. ஏப்ரல் 10 ஆம் நாள் இரவு 8 மணிக்கு, கதிரவன் இருக்கும் இடத்தைக் குறிக்க. அன்று சத்திரன் வயது 5 நாட்கள். சத்திரனையும் ஒரு விண்மீனையும் ($\alpha = 16^{\circ}$, 25° வ., $\delta = 15^{\circ} 17'$ தெற்கு) இடம் குறிக்க. (செப், '85)

19. இரு விண்மீன்கள் (α_1, δ_1), (α_2, δ_2) ஒரே விண் தெட்டாங்கு பெற்றவை. கதிரவன் பாதைச் சங்கு ω ; $\sin(\alpha_1 - \alpha_2) = \tan \omega (\cos \alpha_1 \tan \delta_2 - \cos \alpha_2 \tan \delta_1)$ என திறவுக.

20. தெற்கு அகலங்கு 30° இலுள்ள ஓரிடத்தில் வான கோளம் வரைத்து, மீன்வழி 9 மணிக்கு, γ ன் இடமும் α இன் இடமும் குறிக்க. விண்மீன் ($\alpha = 30^{\circ}$, $\delta = 30^{\circ}$ வடக்கு) இடம் குறிக்க.

4. மண்ணுலக தினசரி இயக்கம்— வான்பொருள்கள் உதயம், மறைவு— சார்ந்த செய்திகள்

(Diurnal Motion of the Earth - The Rising and Setting
of Celestial Bodies - Related facts)

4.0 மண்ணுலக தினசரி இயக்கத்தின் விளைவாக, வான் பொருள்கள் உதயமாகி மறைவது போன்ற தோற்றங்கள் ஏற்படுகின்றனவேனும் நாம் யாத்தோம். அந்த விதமாக, உதயமாகி, மறையும் தோற்றங்களோடு சூரிய பெற்ற சில செய்திகளை இப்போது யார்ப்போம்.

ஒரு விண்மீன் அல்லது கதிரவன் உதயமாகும் சமயமும், மறையும் சமயமும், தொடுவானத்தில் உதயமாகும் இடங்களும், மறையும் இடங்களும், தொடுவானத்தின் மேற்பகுதியில் நமக்குக் காட்சியளிக்கும் காலமும், கீழ்ப்பகுதியில் காட்சிக்கு மறைந்திருக்கும் காலமும், நாம் வானியல் முறைப்படி கணிக்கலாம்.

4-1. உதயமும் மறைவும் (Rising and Setting)

ஒரு தெரிந்த விண்மீன் என்று குறிப்பிடும்போது, அதன் மாறு ஆயத்தொலைகளான, வரை ஏற்றமும் (அ) தடுவரை விலக்கமும் (ஆ) நமக்குத் தெரிந்தவை எனப் பொருள்படும். அவ்வாறே கதிரவனைப் பற்றியுமாகும். இவ்வாயத்தொலைகள் யாவும் ஆண்டுதோறும் வெளிவரும் மாதுமீப் பஞ்சாங்கத்தில் கொடுக்கப்பட்டிருக்கின்றன. அவ்வாயத் தொலைகளின் மாற்றங்கள் சீராக இருப்பின் மாறும் விகிதங்களும் விவிலாக அப்பஞ்சாங்கத்தில் கொடுக்கப்பட்டிருக்கின்றன ; சீராக இல்லாவிட்டால் சராசரி மாற்றங்கள் கொடுக்கப்பட்டிருக்கும். வானியல் ஆய்வுக்குரிய விண்வழிக் காலங்காட்டும் அடிக்காரம் எப்போதும் நம்மிடம் காலங்காட்டத் தயாராக இருக்கிறதெனவே நாம் கொள்கிறோம். நாம் இருக்குமிடத்தின் அகலங்கு. 9-ன் மதிப்பும் நமக்குத் தெரியும்.

உதிக்வும் இடத்தின் அடிவான தூரம்

$$A = \cos^{-1} \left(\frac{\sin \delta}{\cos \phi} \right) \\ = \cos^{-1} (\sin \delta \sec \phi) \quad \dots (4)$$

ϕ , δ , δ மூன்றும் நமக்குத் தெரியாதவின் S என்ற விண்ணின் உதிக்வும் மீள்வழி நேரமும், அது உதயமாலும் தொடுவானம் புள்ளியின் அடிவான தூரமும் கிடைக்கிறது. (அடிவானதூரம் N இல் இருந்து கணக்கிடப்படுகிறது.)

குறிப்பு (1): $\triangle PZS$ கொண்டும், உதயமாலும் போதுள்ள h , A இரண்டையும் கணிக்கலாம்.

$$ZS = 90^\circ; SP = 90 - \delta; PZ = 90 - \phi.$$

$$\angle ZSP = 90 - \theta; \angle SPZ = h; \angle SPZ = A.$$

$$\cos ZS = \cos SP \cos PZ + \sin SP \sin PZ \cos ZPS$$

$$\cos 90^\circ = \sin \delta \sin \phi + \cos \delta \cos \phi \cos h$$

$$\therefore \cos h = -\tan \phi \tan \delta \quad (5) \text{—இது மூன்று பேற்ற, (1)}$$

இம்முறையில் A கணிப்பதைப் பயிற்சியாகக் கொள்க.

* θ° வேண்டுமானாலும் கணித்துக் கொள்ளலாம்.

$$\sin \theta = \sin \phi \sec \delta \text{ எனப்பெறலாம்.}$$

குறிப்பு (2): $ZS=90^\circ$ ஆகையால் 1-882 இல் கொடுக்கப் பட்ட நேர்மீள் விதிகளைப் பயன்படுத்தி, h , A இரண்டையும் கணிக்கலாம். பயிற்சியாகக் கொள்க.

4.1.2. கிணத்தேற்றங்கள்: (1) விண்ணின் மறைபுறமும் படம் 4.11இல்; எனக்காட்டப்பட்டிருக்கிறது. விண்ணின் மேற்குப் புறம் தொடுவானத்தைத் தொட்டு, பின்னர் தொடுவானத்திற்குக் கீழே மறைந்துவிடுகிறது. எனவே தொடுவானத்திற்கு மேல், அப்பவிண்ணின் SSS என்ற பாதைப்பகுதியில் நமக்குத் தெரியும்; zAS என்ற பாதைப் பகுதியில் நமக்குத் தெரியாது மறைந்து விடும்.

$$\triangle PzN = \triangle PzN$$

எனவே $ZPz = h$ ஆகும். ஆக, விண்ணின் மறையும்போதுள்ள அதன் நேரக்கோணம் h ஓ ஆகும். அதாவது ஒழுவிண்ணின் உதய மாலும்போதும், மறையும்போதுமுள்ள நேரக்கோணங்கள் சமம். உதயமாகி, S என்ற புள்ளியில் உச்சி கடக்கும்வரை உள்ள நேரம் $\frac{h}{15}$ மணிகள்; உச்சி கடந்து h ம் மறையும்வரை உள்ள

நேரம் $\frac{h}{15}$ மணிகள். எனவே, இவ்வின்மீன் தொடுவானத்திற்கு மேல் உள்ள மொத்த நேரம் $\frac{2h}{15}$ மணிகள் ; தொடுவானத்திற்குக் கீழ் மறைத்திருக்கும் நேரம் $24 - \frac{2h}{15}$ மணிகள். மணி என்பது மீள்வழி மணியைக் குறிக்கிறது.


(2) வின்மீன் மறை நடுவரைக்குத் தெற்கே இருக்கும் மானால், அதன் நடுவரை விலக்கம் δ , குறை மதிப்பு (negative) எனக்கொள்வது மரபு. அப்படிப்பட்ட வின்மீன் உதிக்கும் நேரமும்

$$\cos h = -\tan \phi \tan \delta \text{ எனவே பெறப்படும்.}$$

ஆனால் இங்கு δ குறை மதிப்புடையதாயிருக்கும்.

$$\text{எனவே, } \cos h = \tan \phi \tan \delta \text{ எனக்கொள்ளலாம்.}$$

(3) $\phi = 0$ — ஆகவது மன்னுடை நடுவரை மேல் காட்டி விடம் உள்ளது. அங்கு வானகோளம், படம் 4.1-2இல் காண்க.



படம் 4.1.2

$N, S_δ$ முறையே P, P' ஓடு ஒருங்குவந்தையும், மூலக்குத்து வட்டம் ZEZ' உம் வான நடுவரை QER உம் ஒருங்குவந்தையும் காண்க.

உதாரணாகும் சமயத்தில், வின்மீனின் கிழக்கு நேரக்கோணம்

$$\begin{aligned} h &= \cos^{-1} (-\tan \phi \tan \delta) \\ &= \cos^{-1} (0) \\ &= 90^\circ = 6 \text{ மணிகள்.} \end{aligned}$$

∴ விண்மீன் உதயமாகும் மீன்வழி நேரம்

$$t = (\alpha - \delta) \text{ மீன்வழி மணி.}$$

குறிப்பு (1). $(\alpha - \delta)$ குறைவெண்ணுமின், 24 மணி சேர்த்து, இன் மதிப்பை அதிக

எ. கா :

$$\alpha = 2 \text{ மணிகள் } (= 30^\circ) \text{ ஆனால்,}$$

$$t = (2 - 6)$$

$$= -4$$

$$= -4 + 24$$

$$= 20 \text{ மீன் வழி மணிவாகும்.}$$

இங்கு விண்மீன் உதிக்கும் சமயத்தில் மேற்கு நேரக்கோணம் $= 270^\circ$ அல்லது 18 மணிகள் என எடுத்துக்கொண்டால்,

$$t = \alpha + \text{மேற்கு நேரக்கோணம்.}$$

$$= (2 + 18) \text{ மணி}$$

$$= 20 \text{ மீன் வழி மணிவென நேரவுயரமும் காணலாம்.}$$

குறிப்பு 2. $\delta = 90^\circ$ அல்லது 6 மணிவாகும், விண்மீன் 12 மணி நேரம், தொடுவானத்திற்கு மேலும், 12 மணி நேரம் தொடுவானத்திற்குக் கீழும் இருக்கும் [கிரேதநேரம் (1)]. எனவே $\phi = 0$ அல்லாக்கில், அதாவது உட்க நடுவணையிலுள்ள எல்லா இடங்களிலும், எப்பொழுதும் எல்லா விண்மீன்களும் (கிரேவன் உட்பட) 12 மணிநேரம் தொடுவானத்திற்கு மேலும் 12 மணி நேரம் தொடுவானத்திற்குக் கீழும் இருக்கும்.

உதிக்குமிடம் :

$$A = \cos^{-1} (\sin \delta \sec \phi)$$

$$= \cos^{-1} (\sin \delta)$$

$$= \cos^{-1} [\cos (90 - \delta)]$$

$$= 90^\circ - \delta.$$

மடத்தில் NS = $90 - \delta$ என்பதைக் காண்க.

வி. 6த (4). $\phi \pm 0$; $\delta = 0$ ஆனால், (அதாவது விண்மீனின் நடுவணையிலுக்கும் 0 ஆனால்) விண்மீன் பாதை கோள நடுவணையின் மேலிருக்கும்.

அப்போதும் $\delta = 90^\circ$ அல்லது ஆறு மணி,

ஆனால் $A = 90^\circ$ ஆகவருகும்.

இந்த விண்மீன் கிழக்குப்புகளிலில் உதிக்கும்.

குறிப்பு : எந்த அகலங்களில் காட்சி இடம் இருத்தபோதிலும் பூச்சிய நடுவரை விசக்களும் விண்மீன்கள் யாவும் 12 மணி நேரம் தொடுவானத்தின்மேலும், 12 மணி நேரம் தொடுவானத்திற்கீழும் இருக்கும்.

கி. தே. (5). விண்மீனுக்குக் கண்ட வாய்பாடுகள் யாவற்றையும் கதிரவனுக்குப் பயன்படுத்தினும், கதிரவன் தொடுவானத்திற்குமேல் இருக்கும் காலமும் (அதாவது பகற்காலமும்) கீழிருக்கும் காலமும் (இரவுக்காலமும்) தாம் கணக்கிடலாம். இதற்குக் கதிரவன் நடுவரை விசக்களும் வளைந்தமும், இடத்தின் அகலங்களும் தமக்குத் தெரிவவேண்டும்.

எடுத்துக்காட்டாக : $\phi = 45^\circ$ என்ற இடத்தில், கதிரவன் கோடை கடத்தப் புகுமீறினிருக்கும்போது,

$$\begin{aligned}\cos h &= -\tan 45^\circ \tan \alpha, \\ &= -\tan 28^\circ 27' \\ &= -.4887\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\therefore h &= 180^\circ - 64^\circ 18' \\ &= 115^\circ 42'\end{aligned}$$

எனவே ஆதானில் (இரவு 22ம் நேரத்) அங்விடத்தில் பகல் நேரம்

$$= \frac{231.4}{15} \text{ மின்வழி மணி நேரம்.}$$

$$= 15 \text{ ம. } 28.6 \text{ நி. } "$$

$$\text{இரவு நேரம்} = 8 \text{ ம. } 34.4 \text{ நி. } "$$

உதிக்கும்போது மின்விழி நேரம்

$$= \frac{1}{15} (90^\circ - 115^\circ 42')$$

$$= -\frac{25.7}{15} \text{ மணி.}$$

$$= -1 \text{ ம. } 42.8 \text{ நி.}$$

$$\text{அதாவது விண்மீன் நேரம்} = -1 \text{ ம. } 42.8 \text{ நி. } + 24 \text{ ம.}$$

$$= 22 \text{ ம. } 17.2 \text{ நி.}$$

கி. தே. (6). இப்போது $\cos h = -\tan \phi \tan \delta$ என்ற வாய்பாட்டின்படி, $\delta = 90^\circ - \phi$ என்ற வகையில் ஒருவிண் மீன் இருக்குமானால்,

$$\cos h = -1 \text{ எனப் பெறப்படும்.}$$

அப்போது $h = 180^\circ$ அல்லது 12 மணி நேரம் எனவே, அங்விண் மீன் 24 மணி நேரமும் தொடுவானத்திற்கு மேலேயேயிருக்கும்.

$$\begin{aligned} A &= \cos^{-1} (\sin \delta \sec \phi) \\ &= \cos^{-1} (\sin \delta \operatorname{cosec} \delta) \\ &= \cos^{-1} (1) \\ &= 0 \end{aligned}$$

அவ்வின்மீன் உதிக்குமிடம் N என்ற வட்டங்களிலேவாகும். வட்டங்களில் உதித்து மறுபடியும் வட்டங்களிலேயே சாயும். அதன் பாதை எப்போதும் தொடுவானத்திற்கு மேலேயே இருக்கும். இது ஒரு மறைவா விண்மீன் (circumpolar star) எனப்படும்.

கி. தே. 7 (a). மேலும் $\cos h = -x < -1$ ஆகவிட்டால், h இன் மதிப்பு கற்பனை மதிப்பாகும். அப்போது விண்மீன் எப்போதும் மறைவாக தொடுவானத்திற்கு மேலேயே இருக்கும். மறைவாவின் மீனாகும். இது எப்படி நேரலமெனக் கீழே குறிப்பு (1) காண்க.

கி. தே. 7 (b). அவ்வாறே, விண்மீன் நடுவரைக்குக் கீழே விடுக்து, $\cos h = x > 1$ ஆகவிட்டால், h இன் மதிப்பு கற்பனை மதிப்பாகும். அப்போது விண்மீன் எப்போதும் மறைத்தே தொடுவானத்திற்குக் கீழேயே இருக்கும். இது எப்போதும் உதிராத விண்மீனாகும். இது எப்படி நேரலமெனக் கீழே குறிப்பு (2) காண்க.

குறிப்பு (1) எப்போதும் மண்ணுலக வடக்கு அகலங்கு $\phi < 90^\circ$ என நமக்குத்தெரியும்; மேலும் $|\delta| < 90^\circ$ எனவும் தெரியும்.

$$-\tan \phi \tan \delta < -1 \text{ ஆகவிட்டால்,}$$

δ வின் மதிப்பு கூட்டு மதிப்பாகிவிடுக்கும்; ($0 < \delta < 90^\circ$).

$$\tan \phi \tan \delta > 1 \text{ ஆகும்.}$$

$$\text{அப்போது } \tan \phi > \cot \delta$$

$$\text{அதாவது } \tan \phi < \tan (90^\circ - \delta).$$

$$\text{அதாவது } \phi + \delta > 90^\circ.$$

குறிப்பு (2)

$$-\tan \phi \tan \delta > 1 \text{ ஆகின்,}$$

δ வின் மதிப்பு குறை மதிப்பாகிவிடுக்கும்; ($0 < |\delta| < 90^\circ$)

அப்போது $\delta = -\delta^1$ எனக் கொள்க; ($0 < \delta^1 < 90^\circ$).

இக்கு δ^1 கூட்டு மதிப்புண்டாவது.

$$\text{அப்போது } \tan \phi \tan \delta^1 > 1 \text{ ஆகும்.}$$

முன்னர் குறிப்பி (1)ல் கண்டபடியே $\phi + \delta^1 > 90^\circ$ ஆகும்.

அ.தே. 8 (a). ϕ -வடக்கு அகலங்கு; δ -வடக்கு +;

$|\cos h| < 1$ எனக் கொள்வோம்.

அப்போது $\cos h = -\tan \phi \tan \delta$.

= குறை மதிப்பி.

$$\therefore 90^\circ < h < 180^\circ.$$

$$\therefore 180^\circ < 2\phi < 360^\circ$$

$$\therefore 12 \text{ மணி} < \frac{2\phi}{15} < 24 \text{ மணி.}$$

இந்த நிலையில் ஆல் லின்யீன் (அதாவது உட்பட) தொடுவானத்திற்கு மேல் 12 மணிக்கு அதிகமான காலமும் தொடுவானத்திற்குக் கீழே 12 மணிக்குக் குறைந்த காலமும் இருக்கும்.

$\phi + \delta = 90^\circ$ என்ற நிலையில்

$\cos h = -1$; 24 மணி நேரமும் தொடுவானத்திற்கு மேலேயே இருக்கும்.

(b) $\delta = 0$ ஆயின், லின்யீன் நடுவரை மேலேயே செல்லும். தொடுவானத்திற்குமேல் 12 மணி நேரம் இருக்கும்; 12 மணி நேரம் கீழே மறைத்திருக்கும்.

(c) $\delta < 0$ ஆயின், அதாவது லின்யீன் திசையில் பாதை நடுவரைக்குத் தெற்கேயிருப்பின் $\cos h$ கூட்டு மதிப்புப் பெறும்; $\cos h$ கூட்டு மதிப்பு பெற்று $\cos \delta < 1$ ஆனால்,


$$0 < h < 90^\circ;$$

$$\therefore 0 < 2h < 180^\circ$$

ஆகவே லின்யீன் தொடுவானத்திற்குமேல் 12 மணிக்குக் குறைந்த காலம் இருக்கும்; 12 மணிக்கு அதிகப்பட்ட காலம் தொடுவானத்தின் கீழ் மறைத்து இருக்கும்.

4-2: தொடுவானத்து அளவையில் தெரிந்த லின்யீன் (δ , δ) ஒரு விகச் சிறிய தூரம் உயர்த்து தொடுவான அளவையற்று எடுத்துக்கொள்ளும் நேரம்;

மேலதில் S_0N தொடுவானம். லின்யீன் தன் பாதையில் S_1 இருந்து S வரை சென்று உதயமாக எடுத்துக்கொள்ளும் நேரம் காணவேண்டும். எடுத்துக் குறிகள் மரபுப்படி உள்ளன.



49

A Z P S. 10

$$\cos ZS_1 = \cos Z = \cos = P \cos PS_1 + \sin \alpha P \sin PS_1 \cos ZPS_1$$

$\Delta \cos x = \sin \phi \sin \delta + \cos \phi \cos \delta \cos h$. இங்கு ϕ , δ மாதிரி
 கள்; x , h மாதிரிகள்; இது பக்கங்களுக்கும் 3° ஐ ஒட்டி வரை நான்
 செய்த கணனம் வரைகிறது.

$$= \sin x = -\cos \phi \cos \delta \sin h \frac{dh}{dx}.$$

$$\therefore \frac{dh}{dz} = \frac{\sin \alpha}{\cos \phi \cos \delta \sin A}$$

$$\Delta h = \frac{\sin \alpha \Delta x}{\cos \phi \cos \beta \sin h} \quad (\text{எலக்ட்ரிக் மோனிடரிங்})$$

with $\alpha = 0.05$ (1).

எனவே, தொடுவானத்தின் அருகே விண்மீன் ஒரு சிறிய தூரம் Δx உயர்ந்து, தொடுவானத்தை அடைய எடுத்துக்கொள்ளும் நேரம் Δt , ஆளையன் அளவில் பெறப்படுகிறது. உயர வேண்டிய தூரம் x' (விக்கிரகம்).

ஆனால் $\Delta x = \frac{\pi \times \pi}{60 \times 60 \times 180}$ ஆகையின்காரணம்.

(1) படி. அ. க. (அலுவலர் ஆரணம்)

$$= \frac{\sin z \times x \times \pi}{60 \times 60 \times 180 \times \cos \phi \cos \delta \sin A}$$

இதை கால அளவிற்கு மாற்றினால், x' உயர்வதற்கு எடுத்துக் கொள்ளும் நேரம் கிடைக்கும்.

4. $\triangle h$ (வினாக்கள் அளவில்)

$$= \frac{\sin z \times x \times \pi \times 180 \times 60 \times 60 \text{ வினாக்கள்}}{60 \times 60 \times 180 \cos \phi \cos \delta \sin h \times \pi \times 15}$$

$$= \frac{x \sin z}{15 \cos \phi \cos \delta \sin h} \text{ வினாக்கள்}$$

தொடுவானத்தருகில், உதயவாரும் சமயத்தில் $z = 90^\circ$, $\cos h = -\tan \phi \tan \delta$ என தமக்குத் தெரியும். ஆகவே தொடுவானத்தருகே x' உயர எடுத்துக்கொள்ளும் நேரம்

$$= \frac{x \sin 90^\circ}{15 \cos \phi \cos \delta \sqrt{1 - \frac{\sin^2 \phi \sin^2 \delta}{\cos^2 \phi \cos^2 \delta}}} \text{ வினாக்கள்}$$

$$= \frac{x}{15 \sqrt{\cos^2 \phi \cos^2 \delta - \sin^2 \phi \sin^2 \delta}} \text{ வினாக்கள்.}$$

$$= \frac{x}{\sqrt{15 \cos^2 \phi (1 - \sin^2 \delta) - (1 - \cos^2 \phi) \sin^2 \delta}} \text{ வினாக்கள்}$$

$$= \frac{x}{15 \sqrt{\cos^2 \phi - \sin^2 \delta}} \text{ வினாக்கள்.}$$

எனவே, x கோண விகிதங்களில் கொடுக்கப்பட்டால் வினாவின் (அ. 8), ϕ அகலங்களுள்ள இடத்தில் தொடுவானத்திற்குக் கீழ்க்குது x' உயர்த்து தொடுவானத்தை அடைய எடுத்துக்கொள்ளும் நேரம்

$$= \frac{x}{15 \sqrt{\cos^2 \phi - \sin^2 \delta}} \text{ வினாக்களாகும்.}$$

தொடுவானத்திலிருந்து இதே அளவு x' கீழே செல்ல, இதே அளவு நேரம் ஆகும். ஆனால் x' மிகச் சிறியதாயிருக்க வேண்டும். 1° அல்லது 2° க்கு மேற்படாமலிருப்பது நல்ல.


4.2-1: வி.தே: கடிரவன் கோண விட்டம் D' ஆனால் கடிரவன் தொடுவானத்தின் முழுவதும் ஏறுவதற்கும் முழுவதும் இறங்குவதற்கும் எடுத்துக் கொள்ளும் நேரம்

$$\frac{D}{15 \sqrt{\cos^2 \phi - \sin^2 \delta}} \text{ வினாக்கள்.}$$

குறிப்பு: ஒரு காட்சியாளன் பார்வையில் கடிரவன் விட்டம் தாங்கும் கோணம், கடிரவன் கோணவிட்டம் எனப்படும்; அவ்வாறே, சந்திரன் கோண விட்டமும் அளக்கப்படும்.

‘டாஸண்ட்’ என்பவர் செய்த ‘நவீனியா மீட்டர்’ என்ற கருவியால், சுதிரவன் கோண விட்டத்தை அளக்கலாம். இக்கருவி பற்றிய குறிப்பு ‘வானியல் கருவிகள்’ என்ற பகுதியில் காண்க.

பின்வரும் படம் ஒருவாறு, கோணவிட்டம், கோண ஆர விட்டம் என்பதை விளக்கும்.



சுதிரவன் தன் கோண ஆரவிட்டம் $x = \angle AES$;

சுதிரவன் ஆரவிட்டம் r ;

சுதிரவன் தூரம் d , எனக் கொண்டால்,

$$\begin{aligned}\sin x &= \frac{r}{d} \\ &= \frac{4,32,000}{98,000,000} = 0.00445.\end{aligned}$$

இது மிகச் சிறியதாகலின்


$$\begin{aligned}x &= 0.00445 \text{ ஆரவன்} \\ &= 16' \text{ கிலாகன் (16 arc minutes).}\end{aligned}$$

இவ்வாறே சந்திரனின் கோண ஆரவிட்டம் x' எனக் கொண்டால்,

$$\begin{aligned}\sin x' &= \frac{\text{சந்திரன் ஆரவிட்டம்}}{\text{சந்திரன் தூரம்}} \\ &= \frac{1050}{2,40,000}\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\therefore x' &= 0.0045 \text{ ஆரவன்;} \\ &= ஏறக்குறைய 16 கிலாகன்;\end{aligned}$$

சுதிரவன் முழுவதும் உதயமாக எடுத்துக் கொள்ளும் நேரம் காண, பின்வரும் படம் காண்க.



கதிரவன் மேற்பகுதி தொடுவானம் S_0N ஐத் தொடும்போது கதிரவன் உதய ஆரம்பம்; அப்போது கதிரவன் மையம் S_1 , கதிரவன் கீழ்ப்பகுதி தொடுவானத்தைத் தொடும்போது கதிரவன் முழுவதும் உதயமாகிவிட்டதெனக் கூறப்படும். அப்போது கதிரவன் மையம் S_2 . எனவே, கதிரவன் முழுவதும் உதயமாக, கதிரவன் மையம் தொடுவானத்து அண்மையில் S_1S_2 என்ற தூரம் உயரவேண்டும். S_1S_2 என்பது கதிரவன் கோண விட்டத்திற்குச் சமம். எனவே, கதிரவன் தொடுவானத்தில் முழுவதும் உயர எடுத்துக்கொள்ளும் நேரம் கதிரவன் விட்டம் (விக்கம்) $\frac{15 \sqrt{\cos \phi - \sin \phi}}{15 \sqrt{\cos \phi - \sin \phi}}$ வினாடிகள்

ஆகும். இதுவே தொடுவானத்தில் முழுவதும் மறைவதற்குப் பொருத்தும். கதிரவன் விட்டம் D' எனக் கொண்டால், $\phi = 0$ என்ற இடங்களில் அதாவது மண்ணுலக நடுவனரையில் உள்ள இடங்களில், கதிரவன் முழுவதும் உதயமாக

$$\frac{D}{15 \sqrt{1 - \sin \phi}} = \frac{D}{15 \cos \phi} \text{ வினாடிகள் ஆகிறது. அந்த}$$

இடங்களில் கதிரவன், $\phi = 0$ னில்களில் இருக்கும்போது

$$\text{நேரம்} = \frac{D}{15} \text{ வினாடிகள் } (\phi = 0). \text{ கதிரவன், கோடைத் திருப்ப}$$

நிலையிலும், மாரித் திருப்ப நிலையிலும் இருக்கும்போது,

$$\text{அந்த நேரம்} = \frac{D}{15 \cos w} > \frac{D}{15}. \text{ எனவே மண்ணுலக நடுவனர}$$

யின் மேலுள்ள இடங்களில், மாரித் 21ம் நாள், செப்டம்பர் 23ம் நாள், இரண்டிலும் கதிரவன் முழு உதயமாக மிச்சிது நேரமாகிறது; கோடைத் திருப்ப நிலையிலும், மாரித் திருப்ப நிலையிலும் முழு உதயமாக மிப்பெரு நேரம் எடுத்துக் கொள்கிறது. மேலும், மண்ணுலகில் ஒரு குறிப்பிட்ட அகலங்களுள்ள இடங்களில், $\gamma = 0$ இல் கதிரவன் இருக்கும்போது, அங்குவிட்டம் பொருத்த மட்டில் கதிரவன் உதயமாக மிச்சிது நேரமும், கோடை, மாரித்

திருப்ப நீலகனிக் உள்ளபோது உதயமாக மீப்பெரு தேரழம் ஆகிறது. $\delta = 0$ ஆனும் ஒரு உதயமாக தேரம்

$$\frac{D}{15 \cos \phi} \text{ விநாடிகள்.}$$

$\delta = \omega$ ஆனும், ஒரு உதயமாக தேரம் $\frac{D}{15 \sqrt{\cos^2 \phi - \sin^2 \omega}}$ விநாடிகள்.

பயிற்சி 4 (i)

[δ = நடுவரை விவக்கம் ; ϕ = வல ஏதம் ;

ϕ = இடத்தில் அகலங்கு]

1. $\phi = 80^\circ N$ உள்ள ஓர் இடத்தில் வின்மீன் ($\phi = 45^\circ$, $\delta = 50^\circ$) உதக்கும் தேரழம், மனறவும் தேரழம், அது தொடு வானத்திற்கு மேலிருக்கும் காலமும் காண்க.

2. ϕ வட அகலங்கு உள்ள இடத்தில், வின்மீன் (ϕ , δ) உதயமாகும்போது, அதன் தேரக்கோணம் h எவ்வாக,

$$\tan^2 \frac{h}{2} = \frac{\cos(\phi - \delta)}{\cos(\phi + \delta)} \text{ என நிறுவுக.} \quad (செ)$$

3. ஜூன் 22ம் நாள் சென்னை (அகலங்கு $28^\circ 28' N$) கதிரவன் உதயமாகும்போது மீன் வழி மணி என்ன? (செ)

4. ϕ வட அகலங்கு உள்ள இடத்தில் இரு வின்மீன்கள் ஒரே சமயத்தில் உதயமாகி, பின்னர் ஒரு சமயத்தில் ஒரே சூத்து வட்டத்தில் இருப்பதாகக் காட்சிப் பதிவாகின்றன. $\phi < 45^\circ$ என நிறுவுக. உதயமாவதற்கும் காட்சிப் பதிவாகும் சமயத்திற்கும் இடைவெளி தேரம் $\delta + \frac{1}{15} \tan^{-1} (\tan^2 \phi)$ மணிகள் என நிறுவுக. (செ)

5. குறிப்பிட்ட அகலங்கு உள்ள எந்த இடத்திலும் கதிரவன் முழுவதும் உதயமாகும் காலம், கோடை, மாரித் திருப்பங்களில் மீப்பெரு மதிப்பையும், $\gamma = \omega$ வில் மீச்சிறு மதிப்பையும் பெறுகின்றனவென நிறுவுக. (செ)

6. வட அகலங்கு ϕ உள்ள இடத்தில், கதிரவன் நடுவரை விவக்கம் $15^\circ S$ (தெற்கு) உள்ள நாளன்று, தன்பகலுக்கு இரண்டு மணி தேரம் முன்பாக உதயமாகிறது. $\phi = \tan^{-1} \left(\frac{\delta + \delta/\delta}{2} \right)$ என நிறுவுக. (செ)

7. இது விண்மீன்கள் ஒரே சமயத்தில் உதயமாகின்றன. அப்போது அவற்றின் அடிவான தூரங்கள் மூன்றையே $A, 150 - A$, அவற்றின் நடுவரை விலக்கங்கள் எண்ணளவில் சமம்; ஆனால் ஒன்று 'வடக்கு', மற்றொன்று 'தெற்கு' என நிறவுக. மேலும், ஒரு விண்மீன் தொடுவானத்திற்கு மேலிருக்கும் காலம் மற்றொன்று தொடுவானத்திற்குக் கீழிருக்கும் காலத்திற்குச் சமம் என நிறவுக. (செ)

8. இது விண்மீன்கள் (δ, δ' நடுவரை விலக்கங்களுள்ளவை) ஒரே சமயத்தில் உதயமாகின்றன. இரண்டாவது விண்மீன் மறையும்போது, முதல் விண்மீன் உச்சி வடக்கிறது. $\tan \phi \tan \delta = 1 - \tan \phi \tan \delta'$ என நிறவுக. (செ)

9. ஒரு விண்மீன் (δ, δ') உதயமாகும்போது அதன் திசைநிப்பாதை, தொடுவானத்திற்கு θ அளவு சாய்ந்திருக்கிறது. அப்போது, $\cos \theta = \sin \phi \sec \delta$ என நிறவுக.


10. ஒரு விண்மீன் (δ, δ') தனது பாதையில் ஓரிடத்தில் H என்ற கோணமளம் பெறும்போது, அதன் உச்சி தூரம் z ; $\tan x = \cot \delta \cos H$; $\sin y = \cos \delta \sin H$ என்ற இரு சமன் பாடுகள் x, y என்ற இரு இராசிகளை இணைக்கின்றன. அப்போது, $90 - \phi = x + \cos^{-1} (\cos z \sec y)$ என நிறவுக.

11. மூன்று விண்மீன்கள் $S_1, (-\delta, \delta); S_2, (0, \delta); S_3, (+\delta, \delta)$; S_1 உதிப்பதற்கும் S_3 உதிப்பதற்கும் உள்ள இடைவெளிகளையும், S_2 உதிப்பதற்கும் S_3 உதிப்பதற்கும் உள்ள இடைவெளிக் காலத்திற்குச் சமமென நிறவுக. (செ)

12. ஒரு வட்டியானது $20-7-1870$ ஆண்டு கதிரவனிடும், கதிரவன் குடும்பத்தைச் சேர்ந்த ஒரு கோளிடும், தனது தொடுவானத்தில் ஒரே இடத்தில் உதிப்பதைப் பார்க்கிறான். கோள் முதலில் உதயமாகிற்று என நிறவுக. (முதலில் கதிரவன் உதித்திருந்தால் அவன் நேர உதயமாகும் கோளைப் பார்க்க முடியாது) 4:3 : மறைய விண்மீன்கள்; உதய விண்மீன்கள் (Circumpolar Stars):

அகலங்கு ϕ உள்ள ஓரிடத்தில், ஒரு விண்மீனின் திசைநிப்பாக்கப் பாதை முழுவதும் வானகோளத்தின் தொடுவானத்திற்கு மேலேயே நான் முழுவதும் அமைப்புமாயின் அது அந்த இடத்திற்கு ஒரு மறைய விண்மீன் (Circumpolar Star that never sets) எனப்படும். தேர்மானாக, ஒரு விண்மீனின் திசைநிப்பாக்கப் பாதை முழுவதும் அந்த இடத்தில் வானகோளத்தின் தொடுவானத்திற்குக் கீழேயே நான் முழுவதும் அமைப்புமாயின் அது அந்த இடத்திற்கு

ஒர் உதிரா விண்மீன் (Circumpolar star that never rises) எனப்படும்.



படம் 4-8

மீன்களாகும். அங்கு எவ்விண்மீனும், முன்கூறப்பட்ட மறைபா அல்லது உதிரா வகைப்படாது.

படத்தில் (படம் 4-8) A_1, B_1, A_2, B_2 என்ற இயக்கப் பாதைகள் உள்ள விண்மீன்கள் முதல் வகைப்படும்; அதாவது மறைபா விண்மீன்களாகும். A_3, B_3, A_4, B_4 என்ற இயக்கப் பாதைகள் உள்ள, விண்மீன்கள் இரண்டாம் வகைப்படும்; அதாவது தெரியா விண்மீன்களாகும். மண்ணுலகநடுவரை மீன் மேல் உள்ள இடங்களில், ($\phi = 0$) எல்லா விண்மீன்களும் உதவலாகி, மறைபா விண்

4-3-1 ϕ என்ற அகலங்குள்ள இடங்களில், விண்மீன் (α, δ) மறைபா விண்மீனாக இருப்பின் ϕ, δ க்குள்ள தொடர்பு.
உதிரா விண்மீனாக

1. மறைபா விண்மீன்: AB என்ற பாதையுடைய விண்மீன் மறைபா விண்மீன் (படம் 4.3.1.) அப்படியாயின், அவ்விண்மீன் கீழுள்ள கடக்கும் புள்ளி B , தொடுவானத்திற்கு மேல் இருக்க வேண்டும்.

அப்போது $PB < PN$

அதாவது $90 - \delta < \phi$, அதாவது $\phi + \delta > 90^\circ \dots (1)$

எனவே, ϕ அகலங்கிலுள்ள இடங்களில்,


$\delta > 90 - \phi$ ஆனால் மறைபா விண் மீன்.

$\delta = 90 - \phi$, ஆனால் N இல் உதித்து, N க் மறைந்து, தொடுவானத்தைத் தொடும்.

$\delta < 90 - \phi$ ஆனால், உதித்து மறைபா விண் மீன்.

2. உதிரா விண்மீன்: இதன் திசைநிப் பாதை முழுவதும் தொடுவானத்திற்குக் கீழே அமைந்திருக்கும். A_1, B_1 என்ற பாதையுடைய விண்மீன் அப்படிப்பட்ட ஒரு விண்மீன் ஆகும்.

(படம் 4.8.1). இது நடுவரைக்குத் தெற்கிலிருப்பதால், இதன் நடுவரை விசக்கம் δ , குறைவெண் மதிப்புடையது; $-\delta$ கூட்டு மதிப்புடையது.



படம் 4.8.1

உதயா விண்மீனுக்குக் கட்டுப்பாடு :

$$P'A_1 < P'S_0 \text{ (படம் 4.8.1)}$$

அதாவது

$$90 - A_1 Q < \phi$$

$$90 + \delta < \phi$$

அதாவது

$$\phi - \delta > 90^\circ \text{ [அல்லது } \phi + |\delta| > 90^\circ]$$

இங்கு $-\delta$ கூட்டு மதிப்புடையதென்பதைக் கவனத்திற் கொள்க.

எனவே, ϕ அகணக்குள்ள இடங்களில், δ குறைமதிப்புப் பெறின்,

$$|\delta| > 90 - \phi \text{ ஆனால், உதயா விண் மீன்}$$

$|\delta| = 90 - \phi$ ஆனால், S_0 உதித்து, அங்கேயே மேலுச்சி கடக்கும்.

$|\delta| < 90 - \phi$ ஆனால், உதித்து மறையும் விண் மீன், ஆக, கடக்கு நடுவரை விசக்க விண்மீன்கள் மறைவா விண் மீன்களாகியுக்க வாகப்பயண்டு, அவ் வாகப்பய ன் மதிப்பைப் போட்டியதாரும்; தெற்கு நடுவரை விசக்க விண்மீன்கள் உதயா விண்மீன்களாகியுக்க வாகப்பயண்டு.

4-3-2 மறையா விண்ணின் மீப்பெரு, மீச்சிறு கோண ஏற்றங்கள்
படம் 4-8-1 கி மறையா விண் மீன் மாத AB. அது A-ல்
மேதுச்சி உடக்கும் போது அதன் கோண ஏற்றம்

$$\begin{aligned} NA &= NP + PA, \\ &= \phi + (90^\circ - \delta) \\ &= 90^\circ + (\phi - \delta) \end{aligned}$$

இதுவே அம்மீனின் மீப்பெரு கோண ஏற்றம். அது B-ல்
மீதுச்சி உடக்கும்போது அதன் கோண ஏற்றம்

$$\begin{aligned} NB &= NP - PB \\ &= \phi - (90^\circ - \delta) \\ &= \phi + \delta - 90^\circ \end{aligned}$$

இதுவே அம்மீனின் மீச் சிறு கோண ஏற்றம்.

4-3-3 : மீன்வரும் தொடர்புகள் எளிதில் விளங்கும், அவை
மூக்கியமானவை.

$$\begin{aligned} (1) \quad NA + NB &= (NP + PA) + (NP - BP) \\ &= 2NP \quad (\because PA = BP = 90^\circ - \delta) \\ &= 2\phi. \end{aligned}$$

ஒரு மறையா விண்ணின் மீப்பெரு, மீச்சிறு ஏற்றக் கோணங்களின்
சராசரி, காட்சியிடத்தின் அகலங்கு என்பதை ஒரு தேற்ற
மாகக் கொள்ளலாம்.

(2) மேலும்,

$$\begin{aligned} NA - NB &= (NP + PA) - (NP - BP) \\ &= 2PA, \\ &= 2(90^\circ - \delta). \end{aligned}$$

மீப்பெரு ஏற்றத்திலிருந்து மீச்சிறு ஏற்றத்தைக் கழித்தால்,
விண் மீனின் மூன்று தூரத்தின் இரு மடங்கு கிடைக்கும்.

$$\begin{aligned} (3) \quad ZB + ZA &= (ZP + PB) + (ZP - AP) \\ &= 2ZP \\ &= 2(90^\circ - \phi). \end{aligned}$$

மீப்பெரு உச்சி தூரத்தோடு மீச்சிறு உச்சி தூரத்தைக்
கூட்டினால், காட்சி இடத்தின் இணையகவாக்கின் இரு மடங்கு,
கிடைக்கும்.

$$\begin{aligned}
 ZB - ZA &= (ZP + PB) - (ZP - AP), \\
 &= 2 AP \\
 &= 2 (90 - \phi).
 \end{aligned}$$

மீப்பெயரு உச்சி தூரத்திலிருந்து மீச்சிறு உச்சி தூரத்தைக் கழித்தால், விண்மீனின் துருவ தூரத்தின் இருமடங்கு கிடைக்கும். எனவே, நாம் உரிய வானியல் கருவி கொண்டு * ஒரு மறைபா விண்மீன் இரு முறை உச்சி கடக்கும் போதும் அதன் உச்சி தூரங்களை Z_1 , Z_2 எனச் சரியாக அளக்க முடியுமானால், இவ்விரு காட்சிப் பதிவுகளிலிருந்தும்,

$$2 (90 - \phi) = Z_1 + Z_2 \quad \dots \dots (a)$$

$$2 (90 - \psi) = Z_1 - Z_2 \quad \dots \dots (b)$$

எனக் கணித்து, காட்சியிடத்தின் அகலங்களையும், விண்மீனின் நடுவரை விசைத்திறையும் கணிக்கலாம். ஓசிடத்தின் அகலங்களைக் கணிக்கவும் முறைகளில் இதுவும் ஒன்றாகும் (பகுதி 9 இல் 9-21 காண்க)

4.3-4: மண்ணுக்க அகலங்களும், மறைபா விண் மீன்களும் :

ஒரு விண்மீனின் நடுவரை விசைகம் $\delta > 90^\circ - \phi$ ஆக இருந்தாக்தான் அவ்விண்மீன் மறைபா விண்மீனாகும் என்ற அடிப்படையில், ϕ அதிகமாக, அதிகமாக, மறைபா விண்மீன்களின் எண்ணிக்கை உயர்ந்து செல்லும். $\phi = 0^\circ$ உள்ள இடங்களில் மறைபா விண்மீன்களே இருக்காது; எல்லா விண்மீன்களும் தோன்றி மறைவும், $\phi = +90^\circ$ ஆனால், வானத் தொடுவரையும், வான நடுவரையும் ஒருங்கும். காட்டு நடுவரை விசை முள்ள விண்மீன்கள் $(\delta + 90^\circ)$ யாவும் மறைபா விண்மீன்கள்; குறை நடுவரை விசைக்குள்ள விண்மீன்கள் $(\delta - 90^\circ)$ யாவும் உதியா விண் மீன்கள், $\delta = 0^\circ$ பெற்ற விண்மீன்கள், தொடுவானத்தின் மேலேயே தவழ்ந்துகொண்டிருக்கும். இவ்வே முறைகளில் உதியா விண்மீன்கள் எண்ணிக்கையும், உயர்ந்த அகலங்களுள்ள இடங்களில் மீறும் என அறியலாம்.

பயிற்சி : $\phi = 0^\circ$, $\phi = 10^\circ$, $\phi = 30^\circ$, $\phi = 50^\circ$, $\phi = 45^\circ$, $\phi = 60^\circ$ $\phi = 80^\circ$ உள்ள இடங்களில் வான கோளம் வரைந்து, மறைபா விண்மீன்கள், உதியா விண்மீன்கள் உள்ள பகுதிகள் காண்க. அப்படங்களை மேற்குறிப்பவற்றைத் தெளிவுபடுத்துக.

* பகுதி 8 : வானியல் கருவிகள். உச்சி கடத்தல் கான தொலைபேசிக் இப்பதிவுகளுக்கான கருவியாகும்.

பயிற்சி 4 (ii)

1. ஒரு வின் மீனின் நடுவரை விலக்கம் δ ; மண்ணுவகின் வட்டவரையில் ஓர் இடத்தில் அகலங்கு ϕ .

(i) $\phi + \delta > 90^\circ$ ஆனால், அகலின்மீன் மதறயா வின்மீன் எனவும்,

(ii) $\phi - \delta > 90^\circ$ ஆனால், அது தெரியா, வின்மீன் எனவும்,

(iii) $\phi \pm \delta < 90^\circ$ ஆனால் அது தோன்றி மதறயும் வின் மீன் எனவும், படக்கல் வரைத்து நிறுவுக.

2. 'வீகா' என்ற வின் மீன் ($\alpha = 15^h. 38^m$ தி., $\delta = 35^\circ 41'$) எத்த அகலங்களுள்ள இடங்களில் (1) மதறயா வின்மீனாகவும் (ii) தோன்றி மதறயும் வின்மீனாகவும் இருக்குமெனக் கணக்கிடுக.

3. மண்ணுவக நடுவரை மேலுள்ள இடங்களில் எல்லா வின் மீன்களும் தோன்றி மதறயும் எனப்படும் வரைத்து நிறுவுக.

4.3.5 : மதறயாக் கதிரவன், உதிரவாக் கதிரவன் (Circumpolar Sun)

முன்பு மதறயா, உதிரா வின்மீன்கள் பற்றி தாமறித்த முடிவுகள் உதவி கொண்டு, கதிரவன் எத்த இடங்களிலாவது அகலங்கு தான் முழுவதும் மதறயாமதறும் (முழுப்பகல்-Perpetual day) அகலங்கு தான் முழுவதும் உதிராமதறும் (முழு இரவு-Perpetual night) இருக்க முடியுமா எனப் பார்க்கலாம்.

வின்வரும் பட்டியலில் கண்ட உண்மைகள் நீங்கள் அறித்ததே.


காலம்	கதிரவன் நடுவரை விலக்க மாதறதல்.
மார்ச்சு 21 முதல்ஜூன் 22 வரை	0° முதல் $23\frac{1}{2}^\circ$ வரை உயர்வு.
ஜூன் 22 முதல் செப்டெம்பர் 23 வரை	$23\frac{1}{2}^\circ$ முதல் 0° வரை குதறவு.
செப்டெம்பர் 23 முதல் டிசெம்பர் 22 வரை	0° முதல் $-23\frac{1}{2}^\circ$ வரை குதறவு
டிசெம்பர் 22 முதல் மார்ச்சு 21 வரை	$-23\frac{1}{2}^\circ$ முதல் 0° வரை உயர்வு

ஒரு விண்மீனின் $\delta > 80^\circ$ —ஓ ஆனாலும், அம்விண்மீன் மறைவா விண்மீன் ஆகும் என நாமறிசோம். இதே கட்டுப்பாட்டை $\phi > 80 - \delta$ எனவும் எழுதலாம். கதிரவனைப் பொருத்தமட்டில் $80 - \delta$ ன் மீச்சிறு மதிப்பு $80 - \pi = 68\frac{1}{2}^\circ$.


எனவே, $68\frac{1}{2}^\circ$ அகலாங்கில், அல்லது அதற்கு மேற்பட்ட அகலாங்கில் உள்ள மண்ணுடைப் பகுதியில் மட்டுமே கதிரவன் ஒரு மறைவா விண்மீனாக இருக்க வாய்ப்புக்கள் உண்டு. இவ் வாய்ப்புக்கள் மண்ணுடைக் வட்டத்தென்குனிச் மண்டலங்களிலும் ($\phi > 68\frac{1}{2}^\circ N$), தென்குனிச் மண்டலங்களிலும் ($\phi > 68\frac{1}{2}^\circ S$) ஏற்படும். சிறப்பாக $\phi = 68\frac{1}{2}^\circ N$ என்ற அகலாங்கில் உள்ள இடங்களில் ஐந்தன் 21 அல்லது 22 தேதியில், கதிரவன் $\delta = 28\frac{1}{2}^\circ$ ஆகும்போது, கதிரவன் நான் முழுவதும் தொடுவானத்திற்கு மேலிருக்கும். N என்ற வட்டங்களில் உதித்து, N என்ற புள்ளிக்குச் சற்றுத் தள்ளி மறைவும். நோன்றுவதற்கும் மறைவதற்கும் உள்ள இடைவெளி நேரம் சில நிமிடங்களாக இருக்காது. ஆன்று முழுப்பகல் நான். அங்வாறே ஏ.செப். 21 அல்லது 22 தேதியில் அம்விடங்களில் கதிரவன் தொடுவானத்திற்கு மேலேயே வராது; அன்று முழு இரவு நான். விரிவாக இதுபற்றி அடுத்த பகுதியில் பார்க்கோம்.

4.4 : ஒரு வானில் விண்மீன் ஏற்றக் கோணத்திலும் அடிவான ஞாத்திலும் ஏற்படும் மாறுதல்கள் : (Changes in the Altitude and Azimuth of a star in the course of a day)

(i) ஏற்றக் கோண மாறுதல்கள் :
விண்மீன் பட்டகளைப் பார்க்கவும்.



படம் 4-4 (i)



படம் 4-4 (ii)

வினாக்கள் இடம்	சந்தர்ப்பகாலம்	ஒழுங்கமைப்பு	அடிவரையின் பெயர் மற்றும்
உட்காந்த S செய்துள்ள உட்காந்த A மேற்புற S^1 புதுக்க உட்காந்த B	0° $AS_0 = AQ + QS_0$ $= \delta + (90 - \phi)$ 0° $-NB = -(NR - BR)$ $= -(90 - \phi - \delta)$	$N \rightarrow S_0 \rightarrow N$ வரையின் சுழற்சி: 0° முதல் 880° வரை $NS = \cos^{-1}(\sin \delta \sec \phi)$ 180° $880^\circ - \cos^{-1}(\sin \delta \sec \phi)$ 880° (அல்லது 0°)	$N \rightarrow S_0$ வரையின் 0° முதல் 180° வரை. $N \rightarrow S_0$ இடையேயுள்ள 0° முதல் -180° வரை. $\cos^{-1}(\sin \delta \sec \phi)$ 180° $-\cos^{-1}(\sin \delta \sec \phi)$ 0.

படம் 4-4 (i) க் தோன்றி மறைபுரம் விண்மீன்பாதை AB , S க் உதிக்ஞம்விண்மீன் S, A, S', B , இக் இருக்கும்போது உள்ள ஏற்றக் கோணங்கள் அடிவானத் தூரங்கள் பக்கம் 10° க் கொடுக்கப் பட்டிருக்கின்றன. விளக்கம் படத்தில் காண்டு கொள்க. உதிக்ஞம் போதும் மறைபுரம்போதும் ஏற்றக் கோணம் பூச்சியம்; உச்சி தூரம் 90° . படம் 4-4 (ii) க், A, B , ஒரு மறைவா விண்மீன் பாதை. அதன் மீப்பெரு ஏற்றம், A , இக் மேல் உச்சி கடக்கும்போது

$$\begin{aligned} NA_1 &= NP + PA_1 \\ &= \phi + 90^\circ - \delta; \end{aligned}$$

மீச்சிது ஏற்றம் B_1 க் கீழ்க் உச்சி கடக்கும்போது

$$\begin{aligned} NB_1 &= NP - B_1P \\ &= \phi - (90^\circ - \delta) \\ &= \phi + \delta - 90^\circ. \end{aligned}$$

இதற்கு 0° ஏற்றம் எப்போதும் இக்கூல.

பரிந்துரி

ஒரு உதியா விண்மீனின் ஏற்றத்தில் மாற்றங்கள் காண்டதிக.

(ii) அடிவான தூர மாறுதல்கள்

ஒரு விண்மீன் (α, δ) உதிக்ஞமிடத்தில் அடிவான தூரம் N க்குத் $\cos^{-1} (\sin \delta \sec \phi)$ என தாம் 4-1-1 (4) இக் கண்டோம். ஸூன்ய கொடுக்கப்பட்டிருக்கும் பட்டியல் மற்ற மாற்றங்களை விளக்கும்.

இம்மாறுதல்கள் படம் 4-4 (i) க் உள்ளபடி உச்சி (Z) க்குத் தெற்கில் மேலுச்சி கடக்கும் விண்மீன்களுக்கு எட்டுமே பொருத்தும்.

ஆனால் படம் 4-4 (ii) க் AB ; A, B , என்ற பாதைகளில் சென்று Z க்கு கடக்கே உச்சி கடக்கும் விண்மீன்களுக்குப் பட்டியலில் காண்டமாறுதல்கள் பொருத்தப்பட்டா.

(குறிப்பு: A, B , பாதையில் செல்வது மறைவா விண்மீன்). இவ்வகைப்பட்ட விண்மீனின் அடிவானத் தொலை O° முதல் 90° வரை உயர்த்து; இதன் மாறுதல்களைப் பின்வருமாறு விளக்கலாம்:

AB என்ற சிறுவட்டத்தைத் தொடும் வகையில் ZS, M என்ற ஒரு குத்துப் பெருவட்டம் வரைக. விண்மீன் S , இக் இருக்கும் போதுதான், அதன் அடிவான தூரம் மீப்பெரு மதிப்பைப் பெறுகிறது. மீப்பெருமதிப்பு NM . இதே மாதிரி, வானகோளத்தில்

மேற்குப் புறத்திலும் விண்மீன் ஒரு இடத்தில் இருக்கும்போது, அதன் வழியாக AB என்ற மாதையின் மேற்குப் பகுதியைத்தொடும் வகையில் ஒரு குத்துப் பெருவட்டம் வரைய இயலும். அது தொடுவானத்தை, M க் வெட்டினால், (மடத்தில் காட்டப் படவில்லை) அந்தப் பக்கத்தில் உள்ள NM_1 ம் NM ம் சமமாக இருக்கும். எனவே, இப்படிப்பட்ட விண்மீனுக்கு (Z க்கு வட புறத்தில் உச்சியடக்கும் விண்மீன்) அடிவான தூரம் கிழக்குப்புறம் O மூலம் NM வரையிலும், மேற்குப் புறம் அடிவானமே O மூலம் NM_1 வரையிலும், மாறிக்கொண்டேயிருக்கும். எனவே NM கண்டு பிடித்தால் போதுமானது.

$$\Delta ZPS_1 \text{ க், } \angle PZS_1 = NM \text{ (விக்).}$$

$$\angle ZS_1P = 90^\circ \text{ (தொடுவட்டப் பண்டி).}$$

$$PS_1 = 90 - \delta$$

$$ZP = 90 - \phi$$

$$\angle ZPS_1 = \text{அப்போதுள்ள } h \text{ (நேரக்கோணம்)}$$

தேர்மீயர் விதிப்படி, செக்கோண மூக்கோணம் ZPS_1 க்

$$\cos \delta = \cos \phi \sin PZS_1$$

$$= \cos \phi \sin NM.$$

$$\therefore \sin NM = \cos \delta \sec \phi.$$

$$\therefore NM = \sin^{-1} (\cos \delta \sec \phi).$$

எனவே, அடிவான தூரம், O விவிர்த்து $\sin^{-1} (\cos \delta \sec \phi)$ வரை N க்குக் கிழக்கிலும் மேற்கிலும் ஊசலாகும். மீப் பெரு அடிவான தூரம் $\sin^{-1} (\cos \delta \sec \phi)$.

வி. நே (1) $\delta = \phi$ ஆனால், $VM = \sin^{-1}(1) = 90^\circ$.


விண்மீனின் தடுவரை விவக்கம் மண்ணுடை அடிவாக்விற்றாக் சமமாயின், விண்மீனின் திசையில் மாதை Z வழியாகச் செல்லும்; மீப் பெரு அடிவான தூரம் 90° .

வி. நே. (2) படம் 4.4(ii) க் காட்டப்பட்ட மாதையா விண்மீனுக்கும், (மாதை A_1B_1) அடிவான தூரம் O விவிர்த்து $\sin^{-1} (\cos \delta \sec \phi)$ வரை N க்குக் கிழக்கிலும் மேற்கிலும் ஊசலாகும்.

4.5 : விண்மீன் நேர்விலக்கிலும் நேர் மேற்கிலும் இருப்பது

ஒரு விண்மீன், தன்மாதை, மூலக்குத்து வட்டத்தை வெட்டு மிடத்தில், இருக்கும்போது அடிவிண்மீன் காட்சியாளனுக்கு நேர்

கிழக்கில் அல்லது தேர் மேற்கில் தோன்றும். ஏனெனில் மூலக் குத்து வட்டம், கிழக்கு மேற்குப் புள்ளிகளின் வழியாகச் செல்லும் பெருவட்டமாகும். அப்படி, ஒரு விண்மீன் (α , δ) தேர் கிழக்கில் அல்லது தேர் மேற்கிலிருக்கும் சமயத்தை நாம் கணிக்கலாம்.



படம் 4-5.

யதாபுர்படி கணையப்பட்டுக்கும் படம் 4-5 காண்க. AB-வின் மீள்பாதை; ZE மூலக்குத்து வட்டம். S என்ற புள்ளியில் அங் விண்மீன் இருக்கும் சமயம், அங் விண்மீன் காட்சி யானதுக்கு தேர் கிழக்கிலிருக் கிறது. அவ்வாறே தொடு வான மேற்குப் புறத்தில் ABல் ZWல் வெட்டுகிடத்தில் விண் மீன் இருக்கும்போது அது காட்சியானதுக்கு தேர் மேற் கில் இருக்கிறது.

தேர் கிழக்கில் விண்மீன் (α , δ) இருக்கும் விண்மீன் தேரம்

ΔZPS = ஒரு செங்கோண முக்கோணம்.

$\angle PZS = 90^\circ$; $\angle ZSP = \eta$ (விண்மீன் இடைக் கோணம்)

$ZP = 90 - \phi$

$ZS =$ உச்சி தூரம் Z

$PS = 90 - \delta$.

$\angle ZPS = H$ (தேர் கிழக்கிலுள்ளபோது தேரக் கோணம்)

$\therefore$ தேர்மீள் விதிப்படி,

$$\cos H = \tan \delta \cot \phi \quad \dots (1)$$

$$\sin \delta = \cos Z \sin \phi \quad \dots (2)$$

$$H = \cos^{-1} (\tan \delta \cot \phi) \quad \dots (3)$$

$$Z = \cos^{-1} (\sin \delta \operatorname{cosec} \phi) \quad \dots (4)$$

$\therefore$ தேர் கிழக்கிலிருக்கும்போது,

விண்மீன் தேரம் $t = \alpha - \frac{\cos^{-1} (\tan \delta \cot \phi)}{15}$ (மீ.கா. தேரம்)

தேர் மேற்கிலிருக்கும்போது,

விண்மீன் தேரம் $t_1 = \alpha + \frac{\cos^{-1} (\tan \delta \cot \phi)}{15}$ (மீ.கா.)


நேர் கிழக்கிலிருக்கும்போது, நாம் வின்மீனின் உச்சி தாரத்தை உரிய கருவிகொண்டு சரியாக அளக்கமுடியுமானால், $\sin \phi = \frac{\sin \delta}{\cos Z}$ என்ற சமன்பாடு கொண்டு, δ , Z இன் மதிப்பீடு செய்து அங்விடத்தின் அகலங்களைக் கணிக்கலாம். ஓர் இடத்தின் அகலங்கு கணிக்க இம் முறையும் பயன்படும் (பகுதி 3-இல், 3-3-2 காண்க)

உ.க: ϕ அகலங்களுள்ள ஓரிடத்தில் ஒரு வின்மீன் இடைக் கோணத்தின் மீப்பெரு மதிப்பு $\sin^{-1} (\sec \delta \cos \phi)$ என திறவுக.

மரபுப்படி, $\triangle ZPS$ ல்

$$\frac{\sin \eta}{\sin(90-\phi)} = \frac{\sin PZS}{\sin(90-\delta)}$$

$$\therefore \frac{\sin \eta}{\cos \phi} = \frac{\sin(\text{அடிவான தூரம்})}{\cos \delta}$$



$$\therefore \sin \eta = \frac{\cos \phi}{\cos \delta} \sin (\text{அடிவான தூரம்}).$$

ϕ , δ மறவிகள். எனவே $\sin \eta$ இன் மீப்பெரு மதிப்பு, அடிவான தூரம் 90° ஆக இருக்கும்போது பெறப்படும்.

$\therefore \eta$ இன் மீப்பெரு மதிப்பு $= \sin^{-1} (\cos \phi \sec \delta)$. அப்போது, வின்மீனின் அடிவான தூரம் 90° ; அதாவது வின்மீன் நன் பாதையில் செல்லும்போது, நேர் கிழக்கில் நோன்றும் சமயத்தில், η மீப்பெரு மதிப்பைப் பெறுகிறது.

4-6: காலை வின்மீன்கள், மாலை வின்மீன்கள் : (Morning stars and Evening stars)

சில வின்மீன்கள் காலைக் கதிரவன் உதயமாவதற்குச் சற்று முன்பாகக் கிழக்கு வானில் உதயமாகி, கதிரவன் உதயமான பின்பு காட்சிக்குத் தெரியாமல் போய்விடும். அவை காலை வின்மீன்கள் எனப்படும்.

சில விண்மீன்கள் மாணியில் கதிரவன் மறைத்ததன்படி, மேற்கு வானில் காட்சி கொடுத்துக் கொஞ்ச நேரத்தில் மேல் வானில் மறைத்துவிடும். அவை மாணியின்மீள்களெனப்படும்.

இவற்றையெப்படி ஆதிவண்மெனப் பார்ப்போம். S_1, S_2 , என்ற இரு விண்மீன்கள் ஏறக்குறைய ஒரே நடுவரை விடைக்க முடையனவாக, ஆனால் ஏறக்குறைய 10° அகலது 40 நி. வல ஏற்ற வேறுபாடுடையனவாக உள்ளனவெனக் கொள்வோம்.

S_1 (α, δ): S_2 ($\alpha+40$ நி. δ) என்பவை இரு விண்மீன்கள். ϕ அகலங்களுள்ள ஒரு இடம். அவை ஒரே நடுவரை விடைக்கமுடையனவாகவதின், ஒரே இடத்தில் உதயமாகும். ($\cos A = \sin \delta \sec \phi$). ஆனால் S_2 உதயமாகும் விண்மீன் நேரம் $t_1 = \alpha - \frac{1}{15} \cos^{-1} (\tan \phi \tan \delta)$; S_1 உதயமாகும் நேரம் $t_2 = \alpha + 40$ நி. $\frac{1}{15} \cos^{-1} (-\tan \phi \tan \delta)$. எனவே, S_1 உதயமாகி 40 நிமிடங்களுக்குப்பின் S_2 உதயமாகும். இதே மாதிரி S_1 மறைவும் விண்மீன் நேரம் $t_3 = \alpha + \frac{1}{15} \cos^{-1} (-\tan \phi \tan \delta)$; S_2 மறைவும் நேரம் $t_4 = \alpha + 40$ நி. $+\frac{1}{15} \cos^{-1} (-\tan \phi \tan \delta)$ எனவே S_2 மறைத்து, 40 நிமிடங்களுக்குப்பின் S_1 மறைவும்.

இப்போது S_1 ஒரு விண்மீன் எனவும் S_2 கதிரவன் எனவும் கொள்க. முதலில் நிறுவியபடி, S_1 உதயமாகி 40 நிமிடங்களுக்குப்பின் கதிரவன் உதயமாகும். கதிரவன் உதயமான பின்பு, S_2 காட்சிக்கு மறைத்துவிடும். எனவே, S_1 ஒரு காரண விண்மீன்; அது கதிரவன் உதயமானவதற்கு 40 நிமிடம் முன்பு உதயமாகி, கதிரவன் உதயமானவுடன் காட்சிக்குத் தெரியாது. மற்றும் S_2 கதிரவன் எனவும், S_1 விண்மீன் எனவும் கொள்க. இரண்டாவதாக நிறுவியபடி, S_1 மறைத்து 40 நிமிடங்களுக்கு, S_2 மேல் வானில் காட்சித்து, தானும் மறைத்துவிடும். எனவே, S_2 ஒரு மாணியின்மீன்; அது கதிரவன் மறைத்தபின் காட்சிக்குத் தெரித்து, கொஞ்ச நேரம் (40 நி.) கழித்து மறைத்துவிடும். எனவே ஒரு விண்மீன் காரண விண்மீனுயிருக்க வேண்டுமாயின்,

1. விண்மீன் நடுவரை விடைக்கவும், கதிரவன் நடுவரை விடைக்கும் ஏறக்குறைய சமமாக இருக்கவேண்டும்;

2. விண்மீனின் வல ஏற்றம் கதிரவன் வல ஏற்றத்தையவிட, ஏறக்குறைய 10° அகலது 40 நி. குறைவாக இருக்கவேண்டும்.

மற்று, ஒரு விண் மீன் மாலை விண்மீனாகியுக்க வேண்டுமாயின்,

(1) தடுவரை விலக்கங்கள் ஏறக்குறைய சமமாக இருக்க வேண்டும்;

(2) விண் மீனின் வல ஏற்றம் கதிரவன் வல ஏற்றத்தைவிட, ஏறக்குறைய 10° ஆகவது 40 நி. அதிகமாக இருக்க வேண்டும்.

கதிரவன் வல ஏற்றம் ஓராண்டு காலத்தில் 0° முதல் 860° வரை வளர்ந்து வருவதாலும் விண் மீன்களின் வல ஏற்றங்கள் எப்போதும் மாறுபடுகின்றனவாகவும், முன் பெறப்பட்ட சுட்டுப் பாடுகளைப்போட்டி, காலை விண்மீன் மாலை விண் மீனாகவும், மாலை விண்மீன் காலை விண்மீனாகவும், மாறிமாறிக் காட்சி யளிக்கக் கூடும். இம்மாறுதல்களுக்கு முறையே சுமார் 845 நாட்களும், 20 நாட்களும் ஆகுமெனப் பின்வரும் எடுத்துக் காட்டி விடுத்து புலப்படும்.

எ. கா : ஜூன் 22ம் தேதி கதிரவன் தடுவரை விலக்கம் $28\frac{1}{2}^\circ$; வலஏற்றம் 90° ; அப்போது, S_1 ($\Delta = 100^\circ$, $\delta = 28^\circ.5$). என்ற விண்மீன் ஒரு மாலை விண் மீன். ஜூன் 22ம் தேதிக்குப் பிறகு சில நாட்கள் S_1 ஒரு மாலை விண் மீனாகவேயிருக்கும்.

ஜூலை 2ம் தேதி, கதிரவன் தடுவரை விலக்கம் $28\frac{1}{2}^\circ$ விட சற்று குறைவு; வல ஏற்றம் ஏறக்குறைய 100° . அப்போது S_1 -ம் கதிரவனும் ஏறக்குறைய ஒரே சமயத்தில் மறைவும், நம் காட்சிக்குப் படாமலே S_1 மறைந்துவிடும். இன்னும் 10 நாள் கழித்து, ஜூலை 12ம் தேதி, கதிரவன் தடுவரை விலக்கம், இன்னும் $28\frac{1}{2}^\circ$ விடச் சற்றுக் குறைவு; வல ஏற்றம் 110° .

அப்போது S_1 ஒரு காலை விண்மீனாகி விடும். இவ்வாறு ஒரு மாலை விண்மீன் காலை விண்மீனாக மாறுவது விண்மீன்க ளினையே கதிரவன் கிழக்கு நோக்கிய நகர்ச்சி பெற்றுள்ளது. என்பதை அறிவிக்கிறது.

பயிற்சி 4 (ii)

1. ஓர் இடத்தில் கதிரவன் ஒரு நாள் நன்முகக் கட்சி கடக்கும்போது அதன் ஏற்றம் 38° ; நன்விரவு ஏற்றம் $5^\circ 10'$. இந்த இடவெளிப்போடில் கதிரவனின் தடுவரை விலக்கம் மணிக்கு $44'$ விவிரம் குறைவுமானால், அவ்விடத்தின் அகவரங்கு என்ன?

(செ)

2. ஒரு விண்மீன் ($\alpha = 21$ மணி, $\delta = 30^\circ$) மூலக்குத்து வட்டத்தைக் கடக்கும்போது, அதன் உச்சி தூரம் 45° . அங் விடத்தின் அகலங்கு என்ன? (செ)

3. ஒரு தாள் இரவு 9 மணிக்கு ஒரு விண்மீன் ($\alpha = 18$ மணி 22 நி.) உச்சி கடக்குமாயின், அத்தத் தேதியைத் தோராயமாகக் காண்க. (செ)

4. ஒரு விண்மீன் நெடுவானில் வடக்கிழக்கும் புள்ளியில் உதயமாகிறது. அது மூலக்குத்து வட்டத்தைக் கடக்கும்போது, அதன் ஏற்றக்கோணம் 60° . அங்விடத்தின் அகலங்கையும் விண்மீனின் நடுவரை விவக்கத்தையும் காண்க. விண்மீன் தேர் கிழக்கிலும், தேர் மேற்கிலும் உள்ளபோது அதன் நேரக் கோணங்கள் என்ன?

5. ஒரு விண்மீன் நடுவரை விவக்கம் $39^\circ 30'$ வடக்கு. எத்த அகலங்குள்ள இடங்களில் அது மறைவா அல்லது உதிவா விண் மீனாகும்? தென் அகலங்கு 8° உள்ள இடத்தில் அது உச்சி கடக்கும்போது அதன் ஏற்றக் கோணமென்ன? படங்கள் கொண்டு விளக்குக. (செ)

6. ஒரு விண்மீன் தேர் கிழக்கில் உள்ளபோது அதன் ஏற்றக் கோணம் 80° ; மூன்று மணி தேரம் சென்று அது உச்சி கடக்கிறது. அங்விடத்தின் அகலங்கென்ன? (செ)

7. ஒரு மறைவா விண்மீன் (α, δ) ஒரு குறிப்பிட்ட குத்து வட்டத்தைக் கடக்கும்போது, அதன் ஏற்றக்கோணங்கள் ϕ_1, ϕ_2 ; உச்சி கடக்குமிடம் ிக்கு வடக்கிலுள்ளது. அங்விடத்தின் அகலங்கு ின் மதிப்பு,

$$\sin \left(\frac{\phi_1 + \phi_2}{2} \right) \sin \delta = \sin \phi \cos \left(\frac{\phi_1 - \phi_2}{2} \right) \quad \text{என்ற சமன்பாட்டால் பெறப்படுமென நிறுவுக.}$$

(அ)

8. விண் மீன் (α, δ) உதயமாகும்போது நேரக் கோணம் h ; மூலக்குத்து வட்டத்தின் மேலிருக்கும்போது நேரக் கோணம்— h' , அங்விடத்தின் அகலங்கு ϕ ஆனால், $\tan^2 \phi + \cos h' = \cos h$. = 0 என நிறுவுக. (செ)

9. விண்மீன் (α, δ) இன் பாதைக்கும் மூலக்குத்து வட்டத் திற்கும் இடைப்பட்ட கோணம் $\cos^{-1} (\cos \phi \sec \delta)$ என நிறுவுக.

10. மன்னுலக நடுவரையின் மேல் உள்ள ஓர் இடத்தில் (i) 20° வடக்கு நடுவரை விவக்கம் (ii) 20° தெற்கு நடுவரை

விஸக்கம் உள்ள விண்மீன்களின் ஏற்றக் கோணம், அடிவான தூரங்களில் திணத்தோறும் ஏற்படும் மாறுதல்களை ஆராய்க.

11. கட அகலங்கு 10° உள்ள ஓர் இடத்தில், 30° வடக்கு நடுவரை விஸக்கமுள்ள விண்மீனின் ஏற்றம், அடிவான தூரம் இரண்டிலும் திண்சரி ஏற்படும் மாறுதல்களைக் காண்க.

12. 45° அகலங்குள்ள இடத்தில் ஒரு விண்மீன் உதிர் பதற்கும், அது தேர் மேற்கில் வருவதற்கும் இடைப்பட்ட காலம் 12 மின்வழி மணி நேரமென நிறுவ.

13. ϕ என்ற கட அகலங்குள்ள ஓர் இடத்தில் h நேரக் கோணத்தில் உதிக்கும் ஒரு விண்மீனின் நடுவரை விஸக்கம் (δ), அச்சமயத்தில் அதன் அடிவான தூரம் (A), அக்வினோனின் இடைக்கோணம் (η) மூன்றினையும் காண்க.

ϕ , h கொடுக்கப்பட்டிருக்கின்றன.

δ , A , η காணவேண்டும்.

$$\cos h = -\tan \phi \tan \delta \text{ என நமக்குத் தெரியும்.}$$

$$\text{எனவே } \delta = \tan^{-1} \left(-\frac{\cos h}{\tan \phi} \right)$$

$\triangle PNS$ க் (படம் 4.1-1 காண்க)

$$\angle PNS = 90^\circ; \quad PS = 90 - \delta; \quad PN = \phi$$

$$\angle SPN = 180 - h; \quad \angle PSN = 90^\circ$$

நேரமீயர் விதிப்படி வேண்டிய தொடர்களை அறிக.

14. இரு விண்மீன்கள் தேர் கிழக்கே ஒரே சமயத்தில் நோன்றி ஒரே சமயத்தில் மறைவுமானால் காட்சியீடம் 45° அகலங்கிலுள்ளது என நிறுவ.

15. மார்ச்சு 31ம் நாள் கதிரவனின் வல ஏற்றம் ஏறக்குறைய என்னயிருக்கும்? அந்தநாளில் ஆல்பேட் (Altair) $\alpha = 19$ ம. 45 நி.) உச்சி கடக்குத் நேரமென்ன? (அ)

16. பிப்ரவரி 1ம் நாள், கதிரவனின் வல ஏற்றம் ஏறக்குறைய என்னயிருக்கும்? அன்று இரவு எத்த நேரத்தில் 5 ம. 44 நி. வல ஏற்றமுள்ள ஒரு விண்மீன் உச்சி கடக்குமெனக் காண்க. (அ)

17. மாஸ்கோப் பஞ்சாங்கம் கொண்டு, கடலுளில் மண்டலத்தில் எவ்வளவு காலம் கதிரவன் தொடுவானத்திற்கு மேலேயே பயணம் செய்துமொன்றுக்குமொனக் கணக்கும் மூறையை விளக்குக.

18. A , B என்ற இடங்கள் ஒரே அகலங்கு ϕ ல் இருக்கின்றன. அவ்விடங்களின் தொட்டாங்கு வேறுபாடு 3λ .

அடுத்து B க்குப் பெருவட்டம் AB வழியாகப் போதும் தூரம் x மைல்கள்; A லிருந்து B க்குக் கிழக்கு-மேற்காகப் போதும் தூரம் (ஆதாவது மண்ணுடை நடுவரைக்கு இணைச்சிது வட்டம் AB வழியாக) Y ;

$Y - x = 2 [\lambda \cos \phi - \sin^{-1} (\sin \lambda \cos \phi)] \operatorname{cosec} 1'$ மாலையி மைல்கள் என நிறுவுக.

AB என்ற பெருவட்டம் செல்லும் பாதையில் ϕ' என்ற மீட்பெரு அகலங்களுள்ள இடம் இருக்குமானால், $\tan \phi' = \tan \phi \sec \lambda$ என நிறுவுக.

AB என்ற பெருவட்டத்திற்கும் மண்ணுடை வடதுருவம் தக்கும் இடைப்பட்ட கோணதூரம், ஏதாவது ஒரு நாள் கதிரவன் நடுவரை விவக்கத்திற்குச் சமமானால், அந்த நாளன்று, A, B என்ற இரண்டு இடங்களிலும் இரவு நேரம் $\frac{2\lambda}{15}$ எனவும் நிறுவுக. (செ)

19. கனூப்ஸ் (Canopus) என்ற விண்மீன் நடுவரை விவக்கம் $52^\circ 51'$ தெற்கு. எந்த வடக்கு அகலங்களுள்ள இடத்தில் அது உச்சி வடக்கும்போது உச்சி தூரம் 50° இருக்கும்? (அ)

20. 14 ம. 12 நி. 35 வி. வல ஏற்றமூள்ள ஒரு விண்மீன், எந்த நாளன்று, நள்ளிரவு 12 மணிக்கு உச்சிவடக்குமெனக் கணிக்க.

21. டுலிபெரே (டு லிபிரே) என்ற விண்மீனின் வல ஏற்றம் 16 மணி; நடுவரை விவக்கம் 25° தெ. அது 15° வடக்கு அகலங்களுள்ள இடத்தில் ஜூன் 22ம் நாள் உதிக்கும்போது நேர்தரக் கதிரவன் நேரமும், உதிக்குமிடத்தின் அடிவான தூரமும் காண்க. (செ)

22. மாரீசை 21ம் நாள், ஸ்பைசா (Spica) என்ற விண்மீன் உச்சி வடக்கும் நேரம் விடியற்காலம் 1 ம. 20 நி. ஓரண்டில் எத்தப் பகுதியில் அது ஒரு கால விண்மீனுக்கக் காட்சியளிக்கும்?

23. (அ = 7 ம. 35 நி. 51 வி. $\delta = 5^\circ 24'$ வ) உள்ள ஒரு விண்மீன் ஓரண்டில் எத்தெத்தப் பகுதிகளில் (1) கால விண் மீனாக (2) மாரீசை விண் மீனுக்கக் காட்சியளிக்கும்?

24. மூன் கேள்வியில், (அ = 10 ம. 4 நி; $\delta = 12^\circ 21'$ வ) என்ற விண்மீனைக் கொண்டு விடை காண்க.

5. மண்ணுலக மண்டலங்கள் பகல் இரவுப் பொழுதுகள்

(The Zones of the Earth—Day and Night durations)

5-0 நாம் முன்பு 4-1-1இல், பொதுவாக ஒரு வின்யின் (ϕ , θ) உதயமாரும் இடத்தையும், அங் வின்யின் தொடுவானத்திற்கு மேல் இருக்கும் காலத்தையும் தொடுவானத்திற்குக் கீழிருக்கும் காலத்தையும் கணிக்கமுடியுமெனப் பார்த்தோம். அப்போது குறிப்பாக, இவை யாவும் கதிரவனுக்கும் பொருத்து வெணக் கூறிலேயும். ஆனால் கதிரவனின் ϕ , மாநிக் கோண்டேயிருப்பதால் (ஒரண்டில் ϕ என்பது 0° முதல் 880° வரைக்கும்; θ என்பது $-23\frac{1}{2}^\circ$ முதல் $23\frac{1}{2}^\circ$ வரைக்கும்) கதிரவன் உதிக்மும் நேரம், இடம், பகல், இரவுப் பொழுதுகள், யாவும் நானுக்கு நானும் சார்ந்திருக்கும். மேலும் குறிப்பாக மண்ணுலகத்தில் $\phi < 88\frac{1}{2}^\circ$ உள்ள பகுதிகளில், முழுப்பகல், முழு இரவு ஏற்படக்கூடிய வாய்ப்புகள் ஏற்படுகின்றன வெவ்வேறு கோண்டோம் ($4-8-5$ காண்க). இப்பகுதியில் இன்னும் விரிவாக, மண்ணுலகில் பல்வேறு இடங்களில் கதிரவன் பகல், இரவுப் பொழுதுகள் எப்படி மாறி வருகின்றனவெனப் பார்ப்போம்.

ஒரண்டு காலவட்டத்தில், மண்ணுலகில் பல்வேறு பகுதிகளில் பகல் இரவுப் பொழுதுகளில் மாறுபாடுகள் காணல் :

வடக்கு அகலங்கு உள்ள இடங்களில் இம்மாறுதல்கள் பத்தி ஆரம்பலாம் : இதே முறைகள் தெற்கு அகலங்கு உள்ள இடங்களிலும் பயன்படும். மண்ணுலகில் உள்ள தட்பவெப்ப மண்டலங்கள் அடிப்படையை நாம் எடுத்துக் கொள்வோம்.

1. மண்ணுலக நடுவண்ணின் மேலுள்ள இடங்கள் ($\phi = 0^\circ$).
2. வட வெப்ப மண்டலம் ($0 < \phi < 23\frac{1}{2}^\circ$)
3. வடக ரேகை ($\phi = 23\frac{1}{2}^\circ$),

4. வடமீத வெப்ப மண்டலம் ($28\frac{1}{2}^{\circ} < \phi < 66\frac{1}{2}^{\circ}$)
5. ஆர்க்டிக் வட்டம் ($\phi = 66\frac{1}{2}^{\circ}$)
6. வடகுளிர் மண்டலம் ($66\frac{1}{2}^{\circ} < \phi < 90^{\circ}$)
7. வடதுருவம் ($\phi = 90^{\circ}$).

முதலாவது, இப்பகுதிகளில், பகல் இரவுப் பொழுதுகள் எப்படி ஓராண்டு காலத்தில் மாறுகின்றன எனக் கணக்கிட்டுப் பார்ப்போம். கதிரவன் (δ) மாறுதல்கள் நமக்குத் தேவைப்படு மாதிரி அவை கொடுக்கப்பட்டுள்ள 3-6-2. பட்டியலில் ஒரு முறை பார்த்துக் கொள்க.

5:1 : மண்ணுலக நடுவளையின்மீதுள்ள ஒரிடம் ($\phi = 0$).

மண்ணுலக நடுவளையில் எந்த ஓர் இடத்தை எடுத்துக் கொண்டாலும் அங்கிடத்தில் அகலங்கு ϕ பூச்சியமாகும். எனவே, வான வட, தென் துருவப் புள்ளிகள் P, P' இரண்டும் முறையே வட, தென்புள்ளிகள் N, S , உடன் இணைந்துவிடுகின்றன. அப்போது வான நடுவளையும்கூட வட்டத்துடன் இணைந்து விடுகிறது. மார்ச்சு 21, செப்டம்பர் 23 ஆகிய இரு தினங்களிலும் கதிரவனின் நடுவளையிலுள்ள பூச்சியமாகும். எனவே, இவ்விரு தினங்களிலும் கதிரவனின் திசைரிப்பாதை வானநடுவளையு (இங்கு மூலக்குத்து வட்டம்)யாகும். இவ்விரு தினங்களிலும் கதிரவன் கிழக்குப் புள்ளியில் உதிக்கிறது. மேற்குப் புள்ளியில் மறைகிறது. எனவே, இவ்விரு நாட்களிலும் கதிரவனுதயத்தின் நேரக்கோணம் $\angle ZNE = 90^{\circ}$; எனவே பகற்காலம் 12 மணி; இரவுக்காலமும் 12 மணி. மேலும் $\phi = 0$ ஆகையால்,

$\cos h = -\tan \phi \tan \delta$ என்ற வாய்பாட்டின்படி, ஆண்டு முழுவதும்,

$$\cos h = 0 \text{ ஆகிறது } h = 90^{\circ}$$

எனவே, δ எதுவாகவிருந்த போதிலும், ஆண்டு முழுவதும் கதிரவன் பகற்பொழுது (தொடுவரணத்திற்கு மேலிருக்கும் காலம்) தினத்தொறும் 12 மணி நேரம், உதிக்கும் இடங்கள் மட்டுமே மாறும்.

$$\cos A = \sin \phi \sec \delta \text{ என்ற வாய்பாட்டின்படி,}$$

$$\begin{aligned} \cos A &= \sin : & (\because \sec \phi &= \sec 0 = 1), \\ &= \cos (90 - \delta). \end{aligned}$$


$\therefore$ தொடுவரண தூரம் $A = (90 - \delta)$ ஆகவிருக்கும்.

உதிக்ரும் இடத்தின் தொடுவான தூரம்

மார்க்க 21 : $NS_1 = A = 90^\circ$ ஆதாவது E	படம் 5-1 காண்க. N இலிருந்து வலஞ்சுழியாக
ஜூன் 22 : $NS_2 = A = 66\frac{1}{2}^\circ$	
செப்டம்பர் 23 : $NS_3 = A = 90^\circ$ (S_2 ம் S_1 ம்)	
டிசம்பர் 22 : $NS_4 = A = 116\frac{1}{2}^\circ$	

மறுபடியும் மார்க்க 21 : $NS_1 = A = 90^\circ$

படம் 5-1 உதிக்ருமிடங்களைக் காட்டும். அவை படத்தில்
முறையே S_1, S_2, S_3, S_4, S_1



படம் 5-1

விசுவக் கோக்குமிடத்து, மார்க்க 21க்குப் பின் நாட்கள் செல்வச்
செய்ய சுதிரவனின் நடுவரைவிலக்கம் அதிகரிக்கிறது. எனவே,
இந்நாட்களில் சுதிரவன் தினசரிப்பாதை வான நடுவரைக்கு
வடக்கே வான நடுவரைக்கு இவ்வளவான சிறு வட்டங்களாக
அமைவும். அப்போது சுதிரவன், கிழக்குப் புள்ளி Eக்கு வடக்கே
உதயமாகிறது. உச்சி Z-க்கு வடக்கே உச்சி கடக்கிறது. மேற்குப்
புள்ளி Wக்கு வடக்கே மறைகிறது. ஜூன் 22-ம் தேதி சுதிரவனின்
நடுவரை விலக்கம் மீட்பெரு மதிப்பு Wஐப் பெறுகிறது. அன்றைய
சுதிரவனின் தினசரி இயக்கத்தை S_2, S', B' எனக் குறிப்பிடுவோம்.
அன்றுதான் சுதிரவன் வான நடுவரைக்கு வடக்கே மிக அதிக


தூரத்தில் உள்ளது. ஜூன் 22க்குப் பின் கதிரவன் வந்த வழியே திரும்பி மீண்டும் செப்டம்பர் 28த் தேதி வான நடுவரை மேல் செல்கிறது.

செப்டம்பர் 28ம் தேதிக்குப் பின்பு கதிரவனின் நடுவரை விலக்கம் குறைகிறது. அதாவது கதிரவனின் தென் நடுவரை விலக்கம் அதிகரிக்கிறது. அப்போது கதிரவனின் தினசரிப்பாதை வான நடுவரைக்குத் தெற்கே அதற்கு இணையான சிறு வட்டக் களாக அமைகின்றது. இத்தாட்களில் கதிரவன் கிழக்குப் புள்ளிகளுக்குத் தெற்கே உதித்து, உச்சிப் புள்ளி Zக்கு தெற்கே உச்சி கடத்து மேற்குப் புள்ளி Wக்குத் தெற்கே மறைகிறது. டிசம்பர் 22ம் தேதி கதிரவனின் நடுவரை விலக்கம் மீட்சிறு மதிப்பைப் (-28°) பெறுவதால் கதிரவனின் பாதை இத்தத் தேதியில் வான நடுவரைக்குத் தெற்கே மீப்பெரு தொலைவில் உள்ளது. இத்தேதிக்குப் பின்னர் கதிரவன் வந்த வழியே திரும்பி மீண்டும் மார்ச்சு 21ம் தேதி வான நடுவரையை அடைகிறது. அப்போது அதன் நடுவரை விலக்கம் பூச்சிய மதிப்பைப் பெறுகிறது.

இவ்வாறாக ஆண்டு முழுவதும் ஏற்படும் கதிரவனின் தினசரிப் பாதைகள் தொடுவானத்திற்குச் செங்குத்தாகவும் மூலக்குத்து வட்டத்துடன் இணைந்தோ அல்லது இணையாகவோ அமைகின்றன. எனவே, அவ்வட்டங்கள் தொடுவானத்தால் இரு சம கூறுக்கப் படுகின்றன. எனவே, கதிரவன் தொடுவானத்திற்கு மேலே எவ்வளவு நேரம் உள்ளதோ அவ்வளவு நேரம் தொடு வானத்திற்குக் கீழே உள்ளது. எனவே, மண்ணுலக நடுவரை மீதுள்ள இடங்களில் இரவு பகல் சமமாகி, ஒவ்வொன்றும் 12 மணிப்படுகிறது. மேலும் இவ்விடங்களில் கதிரவன் மார்ச்சு 21, செப்டம்பர் 28 ஆகிய தேதிகளில் உச்சி வழியாகச் செல்கிறது; கதிரவன் உச்சி கடக்கும் தூரமானது, $-W$ இனிருத்து $+W$ வரை வேறுபடுகிறது.

5:1:1: வட வெப்ப மண்டலத்தில் உள்ள இடங்களில் பகல் இரவு நேரம் காணல் ($0 < \phi < 28^{\circ}$);

வட வெப்ப மண்டலத்தில் உள்ள இடங்களின் அமைவது பூச்சியத்திற்கு அதிகமாகவும், Wக்குக் குறைவாகவும் இருக்கும். மார்ச்சு 21ம் தேதியன்று கதிரவன் மேடும் உற் புள்ளியில் உள்ளது. எனவே அன்று கதிரவன் நடுவரை விலக்கம் பூச்சியம். கதிரவனின் அளவறைய தினசரி இயக்கம் வானநடுவரைபுடன் இணைகிறது. கதிரவன் கிழக்குப் புள்ளியில் உதிக்கின்றது, படம் 5.1.1 காண்க.



மட்டம் 5:1:1

மேற்கூறு புள்ளியில் மறைகின்றது.

கதிரவன் உதிக்கும்பொழுது நேரக்கோணம்

$$\angle ZPE = \angle QPE = \angle QE = 90^\circ; \text{ எனவே,}$$

$$\text{பகல் நேரம்} = \frac{24}{16} \text{ மணிகள்}$$

$$= \frac{2 \times 90}{16} \text{ மணிகள்}$$

$$= 12 \text{ மணிகள்.}$$

இரவு நேரமும் 12 மணிவாக இருக்கும். மார்க்க 21ம் தேதிக்குப் பின் கதிரவனின் நடுவரை விலக்கம் அதிகரிக்கிறது. எனவே மார்க்க 21ம் தேதிக்குப் பின்பு, ஜூன் 22 வரை 8 கூட்டு மதிப்புப் பெற்றிருப்பதாக,

$\cos h = -\tan \delta \tan \theta$ என்ற வாய்பாட்டின்படி, $\cos h$ குறைவடைகிறது.

$$\text{பகற்பொழுது } \frac{24}{16} > 12 \text{ மணிவாகும்.}$$

எனவே, மார்க்க 21ம் தேதியிலிருந்து தானுக்குள்ளே பகற்பொழுது 12 மணிக்கு அதிகமாகிக்கொண்டும் இரவுப் பொழுது 12 மணிக்கு குறைவாகிக் கொண்டும் செல்லும். ஜூன் 22ம் தாள், கதிரவன்

தனது மீர்பெரு வடக்கு நடுவரை விவக்கமான $= \tan 28\frac{1}{2}^\circ$ ஐப் பெறுகிறது. எனவே அன்று $\cos h = \tan \phi \tan \alpha$ மீர்பெரு மதிப்பைப் பெறும்; எனவே $\cos^{-1}(-\tan \phi \tan \alpha)$ என்பது h ன் மீர்பெரு மதிப்பாகும். அன்றைய பகற்பொழுது $\frac{2h}{15}$ மணிகள், அதாவது

$\frac{2}{15} \cos^{-1}(-\tan \phi \tan \alpha)$ மணிகள்). இதுவே அந்த அகலங்களுள்ள இடங்களில் மீர்பெரு பகற்பொழுதாகும். ஜூன் 2-ம் நாள், மீர்பெரு பகற்பொழுதும் மீச்சிறு இரப்பொழுதும் ஏற்படும். இந்தக் காலண்டர் டி., கதிரவனின் திசைநிப் பாதை வான நடுவரைக்கு வடக்கே அதற்கு இணையான சிறு வட்டங்களாக அமைகின்றன. உதயமாலு மிடம் கிழக்குப் புள்ளிக்கு வடக்கே நகர்த்து சென்று, ஜூன் 22ம் நாள், கிழக்குப் புள்ளியிலிருந்து மீர்பெரு தூரத்திலிருக்கும். அதற்கு மேல், உதயமாலுமிடம் நகர்த்து செலவது. மார்ச்சு 21ம் நாளுக்கும் ஜூன் 22ம் நாளுக்கும் இடையில் ஏதாவதொரு நாள், கதிரவன் நடுவரை விவக்கம், வடக்கிலிருந்து அகலங்களை டிக்கு சமமாகும். ($\therefore 0 < \phi < 28\frac{1}{2}^\circ$) அந்த நாளன்று கதிரவன் பாதை, QRக்கு இணையாக ϕ தூரமுள்ள ஒரு சிறு வட்டமாகும். $\phi = QZ$ ஆகையால் அன்று கதிரவன் தலைநேர் உச்சி Z வழியாக உச்சி கடக்கும்.

ஜூன் 22ம் தேதிக்குப் பின்னர் கதிரவனின் நடுவரை விவக்கம், குறைவதாகி கதிரவன் வந்த வழியே திரும்பிச் செல்கிறது. எனவே, பகல் நேரம் குறைத்து இரவு நேரம் அதிகமாகிறது. செப்டெம்பர் 22ம் தேதி மீண்டும் வான நடுவரையே கதிரவன் பாதையாக அமைகின்றது. அத்தாளில் இரவும் பகலும் சமநேரம், 12 மணி கொண்டதாக உள்ளது. இந்த ஜூன் 22ம் நாள் முதல் செப்டம்பர் 22ம் நாள்வரை உள்ள இடைவெளியில், மற்றுமோர் முறை, கதிரவன் நடுவரை விவக்கம், வடக்கிலிருந்து அகலங்கிலிருந்து சமமாகி, கதிரவன் தலை நேர் உச்சி Z வழியாக உச்சி கடக்கும்.

செப்டெம்பர் 22 முதல் அக்டோபர் 22 வரை 8 குறைமதிப்புப் பெற்றிருப்பதாக,

$\cos h = -\tan \phi \tan \delta$ இன் மதிப்பு கூட்டு மதிப்பைப் பெற்று, $h < 90^\circ$ ஆகும்; h இன் மதிப்பும் குறைந்துகொண்டே போகும்.

$\therefore \frac{2h}{15} < 12$ மணியாகும். எனவே, செப்டம்பர் 22ம்


தேதியிலிருந்து நாளுக்குநாள் பகற்பொழுது 12 மணிக்குக் குறைவாகிக் கொண்டும் இரவுப்பொழுது 12 மணிக்கு அதிகமாகிக் கொண்டும் செல்லும். இத் நாட்களில் கதிரவனின் திசைநிப் பாதைகள் வான நடுவரைக்குத் தெற்கே, அதற்கு இணையான சிறு வட்டங்களாக அமைகின்றன. அக்டோபர் 22ம் தேதி கதிரவனின்

நடுவரை விவக்கம் — w , அன்று கதிரவன் பாதை A, S, B , கதிரவனுதயத்தின்போது cos மீப்பெரு கூட்டு மதிப்பிற் பெறும்; ஆகவே நேரக் கோணம் மீச்சிறு மதிப்பைப் பெறுகிறது. எனவே அந்தான் மீச்சிறு பகல்நேரம் கொண்ட நாள்; டிசெம்பர் 22க்குப் பின்னர் கதிரவன் வந்த வழியே திரும்பி மீண்டும் மார்க்ச 21ம் தேதி வராத நடுவரையை அடைகிறது.

எனவே, வடவெப்ப மண்டலத்திலுள்ள இடங்களில் இரு நாட்கள்; மார்க்ச 21, செப்டெம்பர் 23 ஆகிய தேதிகளில் பகல் இரவு சமமாகி ஒவ்வொன்றும் 12 மணிவாகிறது. மேலும் ஜூன் 22ம் தேதி பகல் நேரம் மிக அதிகமாகவும் டிசெம்பர் 22ம் தேதி பகல் நேரம் மிகக் குறைவாகவும் இருக்கிறது. இம்மண்டலத்தில் உள்ள இடங்களில், ஜூன் 22க்கு முன்பு ஒரு நாளும் பின்பு ஒரு நாளும், கதிரவன் நடுவரை விவக்கம் அல்லிடத்தின் அகலங்கிற்றுச் சமமான நாட்களில், கதிரவன் தங்கு நேர் மேலே Z இல் உச்சி நடக்கிறது.

5:1:2: கடக ரேகையின்மீதுள்ள இடங்களின் பகல் இரவு நேரம் காணல்:

கடக ரேகையின்மீதுள்ள இடங்களின் அகலங்கு W க்குச் சமம் ($\phi = w = 23\frac{1}{2}^\circ$) இல்லிடங்களிலும் வடவெப்ப மண்டலத்தில் உள்ள இடங்களில் ஏற்பட்டது போலவே பகல், இரவு நேரங்களில் மாறுதல்கள் ஏற்படும். எனவே, மார்க்ச 21, செப்டெம்பர் 23 ஆகிய இரு திங்கள்களிலும் பகல் இரவு சமமாக, ஒவ்வொன்றும் 12 மணிவாக இருக்கும். மேலும் ஜூன் 22ம் தேதி பகல் நேரம் மிக அதிகமாகவும் டிசெம்பர் 22ம் தேதி பகல்நேரம் மிகக் குறைவாகவும் இருக்கிறது. இல்லிடங்களில் ஜூன் 22ம் தேதி கதிரவன் அகலங்கு ($\phi = \delta = w$) ஆகிற படிவால் அது வான உச்சி Z வழியாகச் செல்கிறது. அன்று ஒரு நாள் மட்டுமே அல்லிடங்களில் தன்பகலில் கதிரவன் தங்கு நேர் மேலே சென்று உச்சி கடக்கும். அன்று கதிரவன் பாதை $SZBC$; Z வழியாகச் செல்லும். (படம் 5.12)



படம் 5.12

படிவால் அது வான உச்சி Z வழியாகச் செல்கிறது. அன்று ஒரு நாள் மட்டுமே அல்லிடங்களில் தன்பகலில் கதிரவன் தங்கு நேர் மேலே சென்று உச்சி கடக்கும். அன்று கதிரவன் பாதை $SZBC$; Z வழியாகச் செல்லும். (படம் 5:1:2).


5.1-3 : வட்ட மீதவெப்ப மண்டலத்தில் உள்ள இடங்களில் பகல் இரவு நேரம் காணல் :

வட்ட மீத வெப்ப மண்டலத்தில் உள்ள இடங்களின் ஆகலாக்கு வக்து அதிகமாகவும் (90-ய)க்கு குறைவாகவும் இருக்கும்: [$-\infty < \phi < 90^\circ$]. மார்க் 21ம் தேதியன்று கதிரவன் மேட முதற் புள்ளியில் உள்ளது. எனவே, அன்று கதிரவன் தடுவரை விலக்கம் பூச்சியம். கதிரவன் ஆன்றைய தினசரி இயக்கம் வான தடுவரை படல் இணைகிறது. கதிரவன் சிழக்குப் புள்ளியில் உதிக்கிறது. மேற்குப் புள்ளியில் மறைகிறது. கதிரவன் உதிக்கும்போது நேரக்கோணம் $\angle ZPE = \angle QPE = 90^\circ$; எனவே, பகல் நேரம்

$$= \frac{2h}{15} \text{ மணிகள்}$$

$$= \frac{2 \times 90}{15} \text{ மணிகள்} = 12 \text{ மணிகள்}$$

எனவே இரவு நேரமும் 12 மணியாகவே இருக்கும். மார்க் 21ம் தேதிக்குப் பின் கதிரவனின் தடுவரைவிலக்கம் அதிகரிக்கிறது. எனவே கதிரவனின் தினசரி பாதை வான தடுவரைக்கு வடக்கே ஆகற்று இணையான சிறு வட்டங்களாக அமைகின்றன. அப்போது கதிரவன் சிழக்குப் புள்ளிக்கு வடக்கே உதிக்கிறது. மேற்குப் புள்ளிக்கு வடக்கே மறைகிறது.



படம் 5.1-3

ஆந்நாட்களில் கதிரவனுடைய நேரக் கோணம் 90° க்கு மேலே துரிதமாக அதிகரிக்கிறது. இதிலிருந்து பகல் நேரம் 12 மணிக்கு மேல்வியலில் அதிகரிக்கிறது என்பதும் இரவுநேரம் 12 மணிக்குக் குறைவாக விளவனில் குறைகிறதென்றும் பெறப்படுகிறது. இரின் 22ம் தேதி கதிரவன் பாதை மிகவும் வடக்கே நகலி இருக்கிறது. அன்று கதிரவனுடைய நேரக் கோணம் மீப்பெரு மதிப்பைப் பெறுகிறது. அன்று பகல்நேரம் மிகவும் அதிகமாகவும் இரவு நேரம் மிகக் குறைவாகவும் இருக்கிறது. எனவே ஆந்நாள் மீப்பெரு பகல் நேரம் கொண்ட நாள் என்று குறிப்பிடப்படுகிறது. அப்போதின் ஆகலாக்கு ϕ என்பது கதிரவனின் மீப்பெரு தடுவரை விலக்கம் $\delta = 23^\circ$ க்கு அதிகமாகலாகக் கதிரவன், வான உச்சிக்குத் தெற்கே

Aஇல் உச்சி கடக்கிறது. அன்று கதிரவன் பாதை $SABC$ (படம் 5-1-8).

ஜூன் 22ம் தேதிக்குப் பின்னர் கதிரவனின் நடுவரை விலக்கம் குறைவதால் கதிரவன் வந்த வழியே திரும்பிச் செல்கிறது. எனவே பகல் நேரம் குறைவவும் இரவு நேரம் அதிகரிக்கவும் தொடங்குகிறது. செப்டெம்பர் 22ம் தேதி மீண்டும் வான நடுவரையே கதிரவன் பாதையாக அடையகின்றது. ஆத்தாளில் இரவும் பகலும் சமநேரம்; 12 மணி செண்டதாக உள்ளது.

செப்டெம்பர் 22ம் தேதிக்குப் பின்னர் நடுவரை விலக்கம் மேலும் குறைகிறது. அதாவது தென் நடுவரை விலக்கம் அதிகரிக்கிறது. இத்தாட்களில் கதிரவனின் திசையில் பாதைகள் வரன் நடுவரைக்குத் தெற்கே, அதற்கு நேரையான சிது வட்டங்களாக அடையகின்றன. அப்போது கதிரவன் உதயத்தின்போது அதன் நேரக் கோணம் 90° -க்கு குறைந்து வேகமாகச் சரிகிறது. எனவே பகல் நேரம் 12 மணிப் பொழுதினிலுந்து வேகமாகக் குறைந்து வருகிறது. எதிர்மாறாக இரவு நேரம் 12 மணிப் பொழுதினிலுந்து வேகமாக மிதந்து வருகிறது. டிசெம்பர் 22ம் தேதி கதிரவன் நடுவரை விலக்கம் - ω அன்று கதிரவன் பாதை $S_1A_1B_1C_1$ கதிரவன் உதயத்தின்போது அதன் நேரக் கோணம் மீட்கிறது மதிப்பைப் பெறுகிறது. எனவே அன்று பகல் நேரம் மிகக் குறைவாகிறது. எனவே ஆத்தான் மீட்கிற பகல் நேரம் கொண்ட நான் என்று குறிப்பிடப்படுகிறது. அன்று இரவு நேரம் அதிகமாகும். டிசெம்பர் 22க்குப் பின்னர் கதிரவன் வந்த வழியே திரும்பி மீண்டும் மார்த்க 21ம் தேதி மேடமுதற் புள்ளியை அடைகிறது. அன்று வான நடுவரையே கதிரவன் பாதையாகும். எனவே, வடமேல் வெப்ப மண்டலத்திலுள்ள இடங்களில் இரு நாட்கள் மார்த்க 21, செப்டெம்பர் 22 ஆகிய தேதிகளில் பகல் இரவு சமமாகி, ஒன்றுவான்றும் 12 மணியாகிறது. மேலும் ஜூன் 22ம் தேதி பகல் நேரம் மிக அதிகமாகவும், டிசெம்பர் 22ம் தேதி பகல் நேரம் மிகக் குறைவாகவும் இருக்கிறது. இம் மண்டலத்தில் உள்ள இடங்களில் ஒரு நாளும் கதிரவன் தலைக்கு நேரே Zஇல் தோன்றுவதில்லை. கதிரவன் வான உச்சிக்குத் தெற்கே உச்சி கடக்கிறது.

5-1.4: ஆர்க்டிக் வட்டத்தின் மேலுள்ள இடங்கள்:

ஆர்க்டிக் வட்டத்தின் மீதுள்ள இடங்களின் அகலங்கு 90° -க்குச் சமம் [$\phi = 90^\circ - \omega$]. மார்த்க 21ம் தேதி கதிரவன் மேடமுதற் புள்ளியில் உள்ளது. எனவே, அன்று வான நடுவரை RQ கதிரவன் பாதையாகும்; கிழக்குப் புள்ளி E உச்சித்தின்றது. மேற்குப் புள்ளி N இல் மறைகின்றது. கதிரவன் உதயத்தின்போது

தெரிகிறது. அன்று பகல் நேரம் 24 மணிவரையில் இரவு கிடைப்பது. ஜூன் 22ம் தேதிக்குப் பின் அதிரவின் தடுவரை நிலக்கம் குறைத்து வருவதால் அதிரவன் வந்த வறியே திரும்பிச் செல்கிறது. எனவே பகல் நேரம் நான்குநாள் குறைபத் தொடங்குகிறது; இரவு நேரத்தொடர்த்து அதிகமாக ஆரம்பிக்கிறது. செப்டெம்பர் 28ம் தேதியை இது தொடர்ந்து நடத்து, செப்டெம்பர் 28ம் தேதி அதிரவன் துறை முகத் புள்ளியில் இருப்பதால் பகல் இரவு சமமாகி ஒய்வொன்றும் 12 மணிவரையில். செப்டெம்பர் 28ம் தேதிக்குப் பின் அதிரவன் வான தடுவரைக்குத் தெற்கே செல்கிறது. எனவே, இந்தாட்களில் பகல் நேரம் குறைந்து இரவு நேரம் அதிகமாகிறது.

$$\cos h = -\tan 66\frac{1}{2}^\circ = \tan (-23\frac{1}{2}^\circ).$$

$$= 1$$

$$h = 0$$


$$\text{பகற்பொழுது} = \frac{0}{15} = 0 \text{ மணி.}$$

அன்று அதிரவன் பாதை தொடுவானத்தை S_1 க் தொட்டுக் கொண்டு சென்று, தொடுவானத்திற்குக் கீழே இருக்கின்றது. [$\therefore QS_1 = 0$; $ZQ = 90 - 0$; $ZS_1 = 90^\circ$]. அன்று அதிரவன் தொடுவானத்திற்குக் கீழேயே உள்ளது. எனவே அன்று முழுவதும் இரவாகவே உள்ளது. பகல் இல்லை; டிசம்பர் 22க்குப் பின்னர் அதிரவன் வானதடுவரையை நோக்கி வருவதால் நான்கு நாள் பகல் அதிகரிக்கவும் இரவு குறையவும் செல்கிறது. இது தொடர்ந்து மார்ச்சு 21 வரை நீடித்து, அன்று வானதடுவரையே அதிரவன் பாதையாவதால் இரவு பகல் சமமாகிறது.

ஆர்க்டிக் வட்டத்தின் மேலுள்ள இடங்களில் மார்ச்சு 21, செப்டம்பர் 22 ஆகிய இருதினங்களிலும் பகல் இரவு ஒய்வொன்றும் 12 மணிக்குச் சமமாகிறது. ஜூன் 22ம் தேதி பகலளவை 24 மணி; இரவில்லை. டிசம்பர் 22ம் தேதி பகலில்லை; இரவுக் காலம் 24 மணி. இஸ்மிடங்களிலும் அதிரவன் வான உச்சிக்குத் தெற்கேயே எப்போதும் உச்சி கடக்கிறது.

5-1-5: வடகுளிர் மண்டலத்தில் உள்ள இடங்களின் பகல்—இரவு நேரம் காலம் :

வடகுளிர் மண்டலத்தில் உள்ள இடங்களின் அகலங்கு $50 - 0$ க்கு அதிகமாகவும் 90° க்குக் குறைவாகவும் இருக்கும். ($50 - 0 < \phi < 90$)



படம் 5-1-5

மரீச்ச 21ம் தேதி கதிரவன் மேடழகுத் புள்ளியில் உட்கள்தாள் ஆன்று வானநடுவரை QR -யே கதிரவன் பாதையாகும். அப் போது கதிரவன் கிழக்குப் புள்ளி E -ல் உதிக்கிறது. மேற்குப் புள்ளி W -ல் மறைகிறது. கதிரவன் உதயத்தின்போது நேரக் கோணம் 90° ஆகலால் பகல் இரவு நேரங்கள் சமமாகி ஒவ்வொன்றும் 12 மணி யாகிறது. மரீச்ச 21ம் தேதிக்குப் பின் கதிரவன் நடுவரை விவக்கம் உயர்வதால் கதிரவன் வான நடுவரைக்கு வடக்கே செல்கிறது. இடத்தின் ஆகலாக்கு மிகவும் அதிகமாக (90° க்கு அருகில்) இருப்பதால் கதிரவன் பாதை தொடுவானத்திற்கு மிகச் சிறிய அளவிலேதான் சங்கத்திடுக்கும். எனவே, மரீச்ச 21 க்குப் பின் நாட்கள் செல்லச் செல்ல கதிரவனுடைய நேரக் கோணம் 90° க்கு மேல் மிக வேகமாக அதிகரிக்கிறது. எனவே பகல் நேரம் மிக மிக வேகமாக வளர்கிறது. அப்படி, மிகுந்து செல்லும்போது ஏதாவது ஒருநாள் கதிரவனின் நடுவரை விவக்கம் ($90 - \phi$) க்குச் சமமாகும். ஆன்று $\cos h = -1$; பகல் பொழுது 24 மணி; இரவில்லை. ஆன்று கதிரவன் தினசரிப் பாதை NN' தொடுவானத்திற்கு முற்றிலும் மேலேயேயிருக்கும்; தொடுவானத்தைத் தொட்டுச் செல்லும்.

$$[\because PN = \phi; PR = 90^\circ; \phi = NR = PR - PN = 90 - \phi].$$

இதற்குப்பின்னரும் கதிரவன் நடுவரை விடைக்கம் ஆதிகரிப் பதால் கதிரவன் தினசரிப் பாதை தொடர்ந்து தொடுவானத்திற்கு மேலேயே அமைகிறது. எனவே தொடர்ந்து பகற்பொழுதே நீடிக்கிறது; இரவேயிராது. (படம் 8-1-5 காண்க). ஐரன் 28ம் தேதி கதிரவனின் நடுவரை விடைக்கம் மீப்பெரு மதிப்பைப் பெறுவதால் அன்று கதிரவன் தினசரிப் பாதை AB வான நடுவரைக்கு மீப்பெரு தொலைவில் உள்ளது. இதற்குப் பின்னர் கதிரவன் நடுவரை விடைக்கம் குறைவத் தொடங்குகிறது. எனவே கதிரவன் தினசரிப் பாதை வத்தவழியே திரும்புகிறது. மீண்டும் கதிரவன் நடுவரை விடைக்கம் (90 - ϕ) க்குச் சமமாகும் நாளன்று NN' கதிரவன் தினசரிப் பாதையாகிறது.

நடுவரை விடைக்கம் (90 - ϕ) யிலிருந்து உயர்ந்து யவை அடைந்து மீண்டும் (90 - ϕ) என்ற மதிப்புக்குத் குறையும் நாளவரை பகலாகவே உள்ளது. இத்தாட்களை நிரந்தர பகற்காலம் (Perpetual day) கொண்ட நாட்கள் என்று கூறப்படுகிறது. இக் காலத்திற்கு ஐரன் 28ம் நாள் மைய நாளாகும். இதற்குப்பின்னர் இரவும் பகலும் ஏற்பட ஆரம்பித்து, நான்கு நாள் பகல் நேரம் குறையவும் இரவு நேரம் ஆதிக்கமும் தொடங்குகிறது. கதிரவன் செப்டெம்பர் 28ம் தேதி துணை மூதற் புள்ளியில் (வான நடுவரையில்) இருப்பதால் வான நடுவரையே கதிரவன் தினசரிப் பாதையாகும்.


செப்டெம்பர் 28ம் தேதிக்குப்பின் கதிரவனின் நடுவரை விடைக்கம் குறைந்து வசுவதால் (தென் நடுவரை விடைக்கம் வளர்வதால்) கதிரவனின் தினசரிப் பாதைகள் வான நடுவரைக்குத் தெற்கே அமைகின்றன. இப்போதும் ஏதாவதொரு நாள் கதிரவன் தென் நடுவரை விடைக்கம் 90 - ϕ மதிப்பைப் பெறும் போது $\cos k = 1$ ஆகிப் பகற் பொழுது 0 ஆகும். இரப்பொழுது 24 மணிக்கு. அன்று அப்பாதை ($S_0 S_0'$) தெற்கு வானத்திற்கு முற்றிலும் கீழே அமைந்து அதைத் தொட்டுக் கொண்டு இருக்கும். அன்று கதிரவன் தொடுவானத்திற்கு மேலே தெரிவதற்கில்லை. எனவே பகல் என்பதே கிடையாது. 24 மணி நேரமும் இரவாகவேயிருக்கும். இத்தானுக்கும் பின்னரும் தொடர்ந்து கதிரவனின் தென் நடுவரை விடைக்கம் வளர்வதால் கதிரவன் பாதை மேலும் தொடுவானத்திற்குக் கீழேயே அமைவும். கதிரவன் தெரியவே தெரியாது. எப்பொழுதும் இரவே நீடிக்கும். டிசம்பர் 28ம் தேதி நடுவரை விடைக்கம் - ∞ ஆகையால், $A_1 B_1'$ கதிரவன் தினசரிப் பாதையாகிறது. ($Q_1 A_1 = \infty$) இதற்குக்கீழே, கதிரவன் தினசரிப்பாதை அமைவ இயலாது. டிசம்பர் 28ம் நாளுக்குப்பின் மறுபடியும் கதிரவன் பாதை, QR ஐ நோக்கி வத்தவடியே திரும்பும். இடைமில் ஏதாவதொரு நாளில் கதிரவன் தென் நடுவரை விடைக்கம்

மறுபடியும் 90° — ϕ ஆகும். அன்று கதிரவன் பாதை திரும்பவும் S_2, S_2' ஆகும்.

அதாவது முதலில் கதிரவன் பாதை S_2, S_2' இல் அமைந்த நான் மூதனாக, A, B_1 இல் இறங்கியமைந்து, திரும்பவும் S_2, S_2' இல் அமைவும் வரையில், கதிரவன் தொடுவானத்திற்கு மேலேயே தெரியாது. இவ்விடைவெளிக் காலம் முழுவதும் நிலைத்த இரவுக் காலம் (Perpetual night) கொண்ட நாட்கள் எனப்படும். இக் காலத்திற்கு டிசம்பர் 22ம் நாள் மைய நாளாகும். இதற்குப் பின்னர் இரவும் பகலும் ஏற்பட ஆரம்பித்தும் பகல் தேரம் அதிகரிக்கவும் இரவு தேரம் குறையவும் தொடங்குகிறது. இத்திறை தொடர்ந்து ஏற்பட்டு மார்ச்சு 21ம் தேதி கதிரவன் மீண்டும் துவரம் மூத்த புள்ளியை அடைகிறது.

இவ்வாறாக, வடகுளிர் மண்டலத்தில் உள்ள இடங்களில் மார்ச்சு 21ம் தேதியும் செப்டம்பர் 22ம் தேதியும் சம பகலிரவு கொண்ட நாட்களாய் அமைகின்றது. ஜூன் 22ம் தேதியை மையமாகக் கொண்ட நிலைத்த பகல் காலம் கொண்ட நாட்களும், டிசெம்பர் 22ம் தேதியை மையமாகக் கொண்ட நிலைத்த இரவுக் காலம் கொண்ட நாட்களும் ஏற்படுகின்றன. மிக நீண்ட பகல் காலங்களும் மிகக் குறைந்த இரவுக் காலங்களும், அல்லது மிகக் குறைந்த பகல் காலங்களும், மிகநீண்ட இரவுக் காலங்களும், நிலைத்த பகல், நிலைத்த இரவுக் காலங்களும் இப்பகுதிகில் சிறப்பானவை.

5-1-6: வடதுருவத்தில் பகல் இரவு காலம் : ($\phi = 90^\circ$).



படம் 5-1-6

படம் 5-1-6 காண்க. வடதுருவத்தில் உள்ள இடத்தின் அகலங்கு 90° . எனவே, வானவட்ட துருவப் புள்ளி (P) வரை உச்சிப் புள்ளியுடன் (Z) இணைகிறது; வான நடுவரை QR , ஆனது தொடுவானத்துடன் (NS_0) இணைகிறது. கதிரவன் வட நடுவரை விலக்கம் பெற்றுள்ள காலமான மார்ச்சு 21ம் தேதிமுதல் செப்டெம்பர் 23ம் தேதி வரை கதிரவன் தொடுவானத்திற்கு மேலே இருக்கும். கதிரவன் பாதைகள் S_0N அல்லது QR க்கு மேலே QR க்கு இடையான சிறு வட்டங்களாகும். ஜூன் 22ம் தேதி கதிரவன் பாதை AB ($QA = \omega$). இக்காலம் முழுவதும் அதாவது ஆறு மாதங்கள் முழுவதும் நிலைத்த பகற்காலம் கொண்ட நாட்களாகும்.


கதிரவன் தென் நடுவரை விலக்கம் பெற்றுள்ள காலமான செப்டெம்பர் 23ம் தேதி முதல் மார்ச்சு 21ம் தேதிவரை கதிரவன் தொடுவானத்திற்குக் கீழே உள்ளது. எனவே, இக்காலம் முழுவதும் நிலைத்த இரவுக் காலம் கொண்ட நாட்களாகும். கதிரவன் பாதைகள் S_0N அல்லது QR க்குக் கீழே QR க்கு இடையான சிறு வட்டங்களாகும். டிசெம்பர் 23ம் தேதி கதிரவன் பாதை A, B , ($QA_1 = -\omega$).

(மண்ணுவகைத்தின் தென்பகுதியிலுள்ள எந்த ஓர் இடத்தில் ஏற்படும் பகல் இரவு நேரங்களின் வேறுபாட்டையும் இவ்வாறே ஆராயலாம்.)

குறிப்பு: நிலைத்த இரவுக் காலம் எனப்படும் ஆறுமாத காலத்தில், முழு இருட்டாகவிருக்காது. அக்காலத்தில் ஒரு பெரும் பகுதியில், கதிரவன் தொடுவானத்திற்குக் கீழே இருப்பினும் மெய்கொளி (Twilight) காரணமாகக் கதிரவன் தொடுவானத்திற்குக் கீழ் 15° தாழும் வரையிலும், அதற்கு இடையாக, மறுபடி 18° தாழ்விட இருத்து, கதிரவன் தொடுவானத்தை அண்டியவரையிலும், ஒரு இயேசான ஒளி அங்கு நிகழும். முழு இருட்டுக் காலம் (Total darkness) ஆறு மாதத்தில் கொஞ்ச காலமே நீடித்திருக்கும்.

5-2: க்கவாங்கு $\phi > 90 - \omega$ உள்ள இடத்தில் நிலைத்த பகற்காலம் கிடைக்க (To find the duration of perpetual day at a place of latitude $\phi > 90 - \omega$)

$\phi > 69\frac{1}{2}^\circ$ உள்ள இடங்களில்தான் நிலைத்த பகல், நிலைத்த இரவு ஏற்பட வாய்ப்புகள் உண்டு என 5-1-5, 5-1-6இல் நாம் கண்டோம்.



படம் 6-2

5-1-6இல் காட்டபடி, கதிரவனின் நடுவரை விலக்கம் $(90 - \phi)$ க்குச் சமமாகும்போது முதல் மூலப் பக்கநாள் ஆரம்பிக் கிறது. அப்போது நிலைத்த முழுப்பக்க ஆரம்பித்து, கதிரவன் நடுவரை விலக்கம் $\omega (= 23\frac{1}{2})$ ஆகும் வரையும் நீடித்து, பின்னும் தொடர்ந்து நீடித்து, மறுபடியும் நடுவரை விலக்கம் $90 - \phi$ ஆகும் போது முடிகிறது. கதிரவன் நடுவரை விலக்கம் $(90 - \phi)$ ஆக உள்ளபோது, கதிரவனின் வின் நெட்டாக்கு $\circ$ எனக் கொண்டால் படம் 6-2இன்படி.

$$\frac{\sin \circ}{\sin 90^\circ} = \frac{\sin (90 - \phi)}{\sin \omega}$$

$$\therefore \sin \circ = \cos \phi \operatorname{cosec} \omega$$

$$\therefore \circ = \sin^{-1} (\cos \phi \operatorname{cosec} \omega)$$

கதிரவன் நடுவரை விலக்கம் $\circ$ ஆகும் போது, அதன் வின் நெட்டாக்கு $\frac{\pi}{2}$ (ஜூன் 22); எனவே நிலைத்த பக்க ஆரம்பிக்கும் நாள் முதல் ஜூன் 22ம் நாள் வரை, கதிரவன் தனது பாதையில் பயணம் செய்பவ் நெட்டாக்கு தூரம்

$$= \frac{\pi}{2} - \sin^{-1} (\cos \phi \operatorname{cosec} \omega)$$

$$= \cos^{-1} (\cos \phi \operatorname{cosec} \omega).$$

ஜூன் 22ம் நாள் முதல், மேலும் ஒரு முறை கதிரவன் நடுவரை விலக்கம் $(90 - \phi)$ ஆகும்வரை, கதிரவன் தன் பாதையில் பயணம் செய்பவ் நெட்டாக்கு தூரம்,

$$\text{மறுபடியும்} = \frac{\pi}{2} - \sin^{-1} (\cos \phi \operatorname{cosec} \omega)$$

$$= \cos^{-1} (\cos \phi \operatorname{cosec} \omega).$$

எனவே, திறைத்த பகல் நீடிக்கும் காலம் கதிரவன் தனது பாதையில், $2 \cos^{-1} (\cos \phi \cos \delta)$ ம) கோண தூரம் பயணம் செய்வும் காலத்திற்குச் சமம். ஓராண்டில் கதிரவன் நெட்டாங்குரம் பயணம் 2π ஆகும்,

$$\begin{aligned} 2 \cos^{-1} (\cos \phi \cos \delta) \text{ ம) பயணம் செய்ய எடுத்துக் கொள்ளும்} \\ \text{காலம்} &= \frac{365 \cdot 25}{2\pi} \times 2 \cos^{-1} (\cos \phi \cos \delta) \text{ ம).} \\ &= \frac{365 \cdot 25}{\pi} \times \cos^{-1} (\cos \phi \cos \delta) \text{ ம).} \end{aligned}$$

நாட்களாகும். இதுவே திறைத்த பகற்காலம் நீடிக்கும் நாட்களின் எண்ணிக்கையாகும்.

குறிப்பு: $\cos^{-1} (\cos \phi \cos \delta)$ ஆராயன் அளவில் எடுக்கப் படவேண்டும்; அதைப் பாகையளவில் எடுத்தால், மூலம்பகல் காலம்

$$= \frac{365 \cdot 25}{150} \times \cos^{-1} (\cos \phi \cos \delta) \text{ நாட்கள்}$$

இத்த எண்ணிக்கையே, டிசம்பர் 22ம் நாள் காலம் கொண்ட திறைத்த இரவுக் காலம் நீடிக்கும் நாட்களின் எண்ணிக்கையுமாகும். 5-3 (i) : எ.கா. 1 : 45° வ. அகலங்கு உள்ள இடத்தில் ஜூன் 22ம் தேதியும், டிசம்பர் 22ம் தேதியும் பகல் இரவுக் காலங்களைக் கணிக்க. மேலும் கதிரவன் நடுவரை விலக்கம் 10° வ. உள்ள நாளில் பகல் இரவுக் காலங்களைக் கணிக்க (ய = $28^\circ 30'$).

ஜூன் 22ம் தேதி கதிரவன் நடுவரை விலக்கம் = $23^\circ 30'$.
டிசம்பர் 22ம் தேதி கதிரவன் நடுவரை விலக்கம் = $-23^\circ 30'$.
எனவே, ஜூன் 22ம் நாள் கதிரவன் உதிக்கும்போதுள்ள நேரக் கோணம் $\cos h = -\tan \phi \tan \delta$.

$$\begin{aligned} &= -\tan 45^\circ \tan 28^\circ 30' \\ &= -.4848 \end{aligned}$$

$$\therefore h = (18^\circ - 64' 14'') = 115^\circ 46'.$$

$$\therefore \text{ஜூன் 22 பகற்காலம்} = \frac{281 \cdot 58}{15}$$

$$= 18 \text{ மணி } 56 \text{ நி. } 7 \text{ வி.}$$

$$\text{இரவுக் காலம்} = 8 \text{ மணி } 58 \text{ நி. } 53 \text{ வி.}$$

$$\text{டிசம்பர் 22 பகற் காலம்} = 8 \text{ மணி } 58 \text{ நி. } 53 \text{ வி}$$

$$\text{இரவுக் காலம்} = 16 \text{ ம } 26 \text{ நி. } 7 \text{ வி.}$$

$$\delta = 10^\circ$$

$$\begin{aligned}\cos h &= -\tan 48^\circ \tan 10^\circ \\ &= -.1768 \\ h &= (180 - 78^\circ 51') \\ &= 100^\circ 9'\end{aligned}$$

$$\therefore \text{பகற்காலம்} = \frac{360.8}{15} = 18 \text{ மணி } 21 \text{ நி. } 12 \text{ வி.}$$

$$\text{இரவுக் காலம்} = 10 \text{ மணி } 35 \text{ நி. } 12 \text{ வி.}$$

குறிப்பு : $\delta = -10^\circ$ ஆகும்போது, பகற்காலம் இரவுக் காலமாகவும், இரவுக் காலம் பகற்காலமாகவும் மாறி வருவதைக் காண்க.

எ.கா. 2 : 15° வடக்கு அகலங்களுள்ள ஓரிடத்தில், மீர்பெரு பகற்காலம் எவ்வளவு எனக் காண்க.

ஆரண் மாதம் 22ம் நாள், அதிரவன் கிழக்குப் புள்ளிக்கு மீர்பெரு நூரத்திலிருக்கும்போது மீர்பெரு பகற்காலம் எற்படும்.

$$\phi = 15^\circ ; \quad \delta = 29^\circ - 5'$$

$$\begin{aligned}\cos h &= -\tan \phi \tan \delta \\ &= -.2879 \times .4846 \\ &= -.1165\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\therefore h &= 180 - 58^\circ 19' \\ &= 98^\circ 41'\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\therefore \text{மீர்பெரு பகற்காலம்} &= \frac{188.87}{15} \\ &= 12 \text{ மணி } 53 \text{ நி. } 29 \text{ வி.}\end{aligned}$$

[குறிப்பு (1) : டிசம்பர் 22ம் நாள் மீர்பெரு இரவுக் காலம் 12 மணி 53 நி. 29 வி.]

குறிப்பு (2) : ஓராண்டு காலத்தில், ஒரு குறிப்பிட்ட இடத்தில், அதிரவன் எவ்வளவு காலம் தொடுவானத்திற்கு மேல் இருக்கிறதோ, அவ்வளவுகாலம் தொடுவானத்திற்குக் கீழிருக்கும். இதை, பொதுவாக நிறுவனதைப் பயிற்சியாகக் கொள்க.

எ. கா. 3 : ஆசிக்ஷக் மண்டலத்தில், ஓரிடத்தில் நிலைத்த பகற்காலம் 60 நாட்கள் நீடிக்கிறது. அங்கிலத்தின் அகலம் கொண் ?

5-2 இன்படி, நிலைத்த பகற்காலம்

$$\begin{aligned}60 &= \frac{365}{150} \times \cos^{-1} \left[\frac{\cos \phi}{\sin \omega} \right] \\ &= \frac{365}{150} \times \cos^{-1} \left[\frac{\cos \delta}{.8987} \right]\end{aligned}$$

$$\therefore \cos^{-1} \left[\frac{\cos \phi}{.8987} \right] = \frac{60 \times 180}{866} = 39^{\circ}.59$$

$$\therefore \cos (39^{\circ}.59) = \frac{\cos \phi}{.8987}$$

$$\therefore \cos \phi = .8987 \times .8987 = .807$$

$$\therefore \phi = 36^{\circ}.48'$$

$$\text{அங்விடத்தின் அகலங்கு} = 36^{\circ}.48'$$

பயிற்சி 5 (i)

1. தம்பகனில் கதிரவன் வரன் உச்சியில் (:) உச்சி கடக்கும் இடங்கன் யாவை? அவற்றின் அகலங்கு எத்த இடைவெளியில் இருக்கவேண்டும்? (செ)

2. 60° வடக்கு அகலங்கில் உள்ள இடத்தில் மீப்பெரு பதப்பொழுதும், மீப்பெரு இரப்பொழுதும் காண்கிறது.

3. வரன் நடுவரையும் கதிரவன் யாவையும் ஒருங்கிடுப்பின் மண்ணுலகில் இரப்ப பதப் பொழுதுகள் எப்படி மாறலாம்?

4. $\cos h = - \tan \phi \tan \phi$ என்ற வாய்பாடு கொண்டு, (1) வட அகலங்கு 75° (2) தென் அகலங்கு 75° உள்ள இடங்களில் ஆண்டு முழுதும் ஏற்படும் பகல் இரவுக் கால மாறுதல்களை ஆய்க.

5. $\phi = 46^{\circ}$ வடக்கிலுள்ள ஓரிடத்தில் ஒரு நாள், பதப் பொழுது 8 மணி தேரம். அன்று கதிரவனின் நடுவரை விலக்கம் தெற்கில் $\tan^{-1} (4)$ என நிறவுக. மற்றொரு நாள் இரப்பொழுது 8 மணி தேரம், அன்று கதிரவனின் நடுவரை விலக்கம் என்ன வாக விருக்கும்?

6. ஓரிடத்தில் மீப்பெரு பதக்காலம் 15 மணி தேரம். அங்விடத்தின் அகலங்கு காண்க.

7. ஓரிடத்தில் மீச்சிறு பதக்காலம் இருக்கும் நாளன்று கதிரவன் காலை 5 மணிக்கு மறைந்தது. அங்விடத்தின் அகலங்கு காண்க.

8. ஓரிடத்தில் மீச்சிறு பதக்காலம் இருக்கும் நாளன்று, கதிரவன் காலை 5 மணிக்கு உதயமாயிற்று. அங்விடத்தின் அகலங்கு காண்க.

9. ஓரிடத்தில் மீப்பெருநாள் பதக்கால தேரம், அங்விடத்தில் மீச்சிறுநாள் பதக்காலத்தைப்போல் இருமடங்கு நீடித்தது. அங்விடத்தின் அகலங்கு காண்க.

10. கதிரவன் காணாண்டு, தொடர்ச்சியாக தொடுவானத்திற்கு மேலேயே இருக்கவேண்டுமாயின், அங்விடத்தின் மீச்சிறு அகலங்கு $\cos^{-1} \left(\frac{\sin \omega}{\sqrt{2}} \right)$ என நிறுவுக.

பொதுவாக $\frac{1}{n}$ ஆண்டு தொடர்ச்சியாகத் தொடுவானத்திற்கு மேலேயே இருக்கவேண்டுமாயின், அங்விடத்தின் அகலங்கு $\cos^{-1} \left(\sin \omega \cos \frac{\pi}{n} \right)$ க்குக் குறைபாடில் இருக்கவேண்டுமென நிறுவுக.

$n=2$ என்ற மதிப்புக்கு இம்முடிவின் பொருளை விளக்குக. $n \rightarrow \infty$ என்ற எல்லைக் இம்முடிவு எப்படி விளக்கப்படலாம்?

11. 75° வடக்கு அகலங்கிலுள்ள இடத்தில் தோராயமாக எத்தத் தேதியில் ஸூரியாகல் நேரம் ஆரம்பமாகும்? (செ).

12. கதிரவன் நடுவரை விலக்கம் $8^\circ 30'$ உள்ள நாளன்று மண்ணுலகில் எத்த இடங்களில் கதிரவன் மறைவாது? (செ)

13. வடகுளிர் மண்டலத்திலுள்ள ஓரிடத்தில், கதிரவன் மறையும் இடங்களில் நான்குநாள் ஏற்படும் வேறுபாடு, ஒரு நாளில் கதிரவன் தொடங்குகல் ஏற்படும் வேறுபாட்டுக்குச் சமமென நிறுவுக.

14. ஆர்க்டிக் வட்டத்தின் மேலுள்ள ஓரிடத்தில் டிசெம்பர் 21 முதல் ஜூன் 20 வரை, மின்வழி நேரம் 15 மணிக்குக் கதிரவன் உதிக்கிறதெனவும், ஜூன் 20 முதல் டிசம்பர் 21 வரை மின் வழி நேரம் 15 மணிக்கு மறைகிறதெனவும் நிறுவுக.

15. ஒரு நாள் கதிரவனின் வடக்கு நடுவரை விலக்கம் δ எனக்கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது. மண்ணுலகில் எத்த எத்த இடங்களில் கதிரவன் (1) தொடுவானத்திற்குமேல் 24 மணி நேரமும் இருக்கும்? (2) 12 மணி நேரங்குக்கும்? (3) 16 மணி நேரங்குக்கும்?

16. ϕ' அகலங்குள்ள ஓர் இடத்தில் மீப்பெரு பகற்காலம், δ அகலங்குள்ள மற்பேரீ இடத்தில் ஆகல்கு மாதம் 22ம் தேதி வந்துள்ள பகற் காலத்திற்குச் சமமானும், $\tan \delta = \tan \delta^{-1} (1 + 8 \sec^2 \omega)$ நிறுவுக. (இது தோராயமாகச் சமம்)

5-4 : மெக்லெளளி (Twilight)

விடியற்காலையில், கதிரவன் அடிவானத்தில் உதயமாவதற்குச் சற்று முன்னரே, உலகத்தைக் கனித்திருக்கும் இருள் படிப்படியாக விலகுவதை நாம் பார்க்கிறோம். அங்நேரம் மாலைப்பொழுதில்,

மாலை மெல்வொனி, அதிரவன் உதிக்குமுன் தொடுவானத்தின் கீழ் 15° உள்வாயோடு ஆரம்பித்து, அதிரவன் தொடுவானத்தில் உதிக்கும்வரையில் நீடிக்கும்; அங்ஙனமே மாலை மெல்வொனி அதிரவன் தொடுவானத்திற்குக் கீழே 15° இறங்கும்வரையில் நீடிக்கும். இந்த அடிப்படையில், ϕ என்ற அகலங்கு உள்ள இடத்தில் ஒரு குறிப்பிட்ட நாளில் மெல்வொனிக் தாதுத்தைக் கணியிற் போம். படம் 8-4-1 காண்க.

அங்ஙனம் குறிப்பிட்ட நாளில் அதிரவன் நடுவரை விடைகம் ϕ எனக் கொள்வோம், அன்று AB அதிரவன் நினைநிர் பாதையைக் குறிக்கட்டும். NS_0 தொடுவானத்தையும் NS_1 தொடுவானத்திற்கு இணையாக, அதற்குக் கீழே 15° இறக்கத்தில் உள்ள சிறு வட்டத்தையும் குறிக்கட்டும். NS_0 -ஐவும் NS_1 -ஐவும் AB முறையே S, S' ல் வெட்டட்டும். இங்கு $ZS = 90^\circ$; $ZS' = 105^\circ$. அதிரவன் S' இல் இருக்கும்போது மெல்வொனி ஆரம்பிக்கிறது. அப்போது அதிரவன் நேரக் கோணம் $ZPS' = H$ எனக்கொள்வோம். அதிரவன் S -இல் இருக்கும்போது அதிரவனுக்கும் நடுணம்.

அப்போது அதிரவன் நேரக் கோணம் $ZPS = h$ எனக் கொள்வோம், அதிரவன் S' விடுத்து S செல்லும்வரை மெல்வொனி நீடிக்கும். எனவே மெல்வொனிநீடிக்கும் காலம்

$$t = \frac{H-h}{15} \text{ மணிநேர்.}$$

கோணங்க்கோணம் $PS'Z$ ல்

$$\cos ZS' = \cos PZ \cos PS' + \sin PZ \sin PS' \cos ZPS'$$

$$\text{அதாவது } \cos 105^\circ = \cos (90^\circ - \phi) \cos (90^\circ - \delta) + \sin (90^\circ - \phi) \sin (90^\circ - \delta) \cos H,$$

$$\text{அதாவது } -\sin 15^\circ = \sin \phi \sin \delta + \cos \phi \cos \delta \cos H$$

$$\therefore \cos H = - \left(\frac{\sin 15^\circ + \sin \phi \sin \delta}{\cos \phi \cos \delta} \right)$$

$$\therefore H = \cos^{-1} \left[- \left(\frac{\sin 15^\circ + \sin \phi \sin \delta}{\cos \phi \cos \delta} \right) \right] \quad \dots (1)$$

குறிப்பு: எல்லாச் சந்தி நடு வளி வட்டமும் இருப்பது இம் மெல்வொனிக் நடு வரானம். இருண்டிருக்கும் ϕ அகலில் நிகழ்வது நடு வளிக்கு சந்திநிலை. இதன் உட்கேள் கிண்புது போனவும், அகலிவகணவகித்தால் இதன் உட்கேள் கிண்புது போனவும், அகலிவகணவகித்த காலம், நிகழ்வது நளி போதிது. நிகழ்வது இதன் குறும்பெறும்.

$$= \pi - \cos^{-1} \left(\frac{\sin 18^\circ + \sin \phi \sin \delta}{\cos \phi \cos \delta} \right) \quad \dots (1)$$

மேலும் கதிரவன் உதிக்கும்போதுள்ள நேரக் கோணம்

$$\cos h = -\tan \phi \tan \delta \text{ என்ற வாய்பாடு வழியாகப் பெறலாம்}$$

அதாவது

$$h = \cos^{-1} [-\tan \phi \tan \delta] \quad \dots (2)$$

$$= \pi - \cos^{-1} [\delta \tan \phi \tan \delta] \quad \dots (2')$$

(1), (2) சமன்பாடுகளிலிருந்து H, h ன் மதிப்புக்களைக் கணித்து மெக்லொனிக் காலம்

$$t = \frac{H-h}{15} \text{ மணிகள் எனக் கணக்கிடலாம். இவ்வாறே மாலை}$$

மெக்லொனிக் காலமும் $t = \frac{H-h}{15}$ மணிகள் என்று கணக்கிட்டதி

யலாம். எனவே ஒரு நாட்பொழுதில் மெக்லொனிக் காலம்

$$2t = 2 \left(\frac{H-h}{15} \right) \text{ மணிகள்.}$$


H, h இரண்டும் ϕ, δ என்பவற்றைச் சார்ந்திருப்பதால், இவ்விரு மதிப்புக்களையொட்டியே மெக்லொனிக் காலம் அறியப்படும்.

எனவே ஒரு குறிப்பிட்ட நாளில் வெவ்வேறு அகலங்களிலுள்ள இடங்களில் மெக்லொனிக் காலம் வெவ்வேறாகும். மற்றும் ஒரே இடத்தில் நான்கு நாள் கதிரவனின் நடுவரை விலக்கம் மாறுவதால், மெக்லொனிக் காலமும் மாறும்.

5-4-2 : மண்ணுடைக நடுவரையின்மேல் உள்ள இடங்களில் மெக்லொனிக் கால அளவு மீச்சிறு மதிப்புடையதாகும் :

மண்ணுடைக நடுவரையினின் $\phi = 0$ அங்கெனக் கதிரவன் திசையில் பாதை தொடுவானத்திற்குச் செங்குத்தாக இருக்கும். எனவே கதிரவன் தொடுவானத்திற்கு 18° கீழே செல்வதால், அவ்வது 15° கீழிருந்து தொடுவானத்தை வந்தடையவோ ஏற்படும் காலம் மிகச் சிறியதாகும். இடத்தின் அகலங்கு அதிகம் ஆக ஆகத் தொடுவானத்துடன் கதிரவன் திசையில் பாதைச் சாய்வு குறைந்துகொண்டே வரும் என நாம் அறிவோம். அந்த நிலைகளில் கதிரவன் தொடுவானத்திலிருந்து 18° செங்குத்துபடி தூரம் கீழ்ச்செல்வதால் அவ்வது 15° கீழிருந்து தொடுவானத்திற்கு

வரவே எடுத்துக்கொள்ளும் தேரம் அதிலுள்ளதும் என்பது உண்மை.



படம் 5-4-2 (i): $\phi = 0$ படம் 5-4-2 (ii): $\phi =$ ஒரு பெரு மதிப்பு

படம் 5-4-2 (i) இல் $\phi = 0$ உள்ள இடங்களுக்கும், படம் 5-4-2 (ii) இல் மற்ற ஒரு பெரு மதிப்பு ϕ உள்ள இடங்களுக்கும் உரிய வான கோளங்களின் மேல், ஒரு குறிப்பிட்ட நாளில் (அதாவது கதிரவன் நடுவரை விலக்கம் δ ஆக இருக்கும்போது) AB கதிரவன் பாதையைக் குறிக்கிறது; NS₀ தொடுகோணம்; NS₁ தொடுகோணத்திற்குக் கீழே 15° இரக்கத்தில் அதற்கு இணையாக வரையப் பட்ட சிறு வட்டம். NS₀, NS₁ இரண்டையும் AB லுமையே S, S' இல் வெட்டுகிறது. எனவே இரு இடங்களிலும் கதிரவன் S' விருத்து S செல்லும்வரை மெல்மொளியிற் தீங்கும். படம் 5-4-2 (ii) ல் உள்ள SS'ன் தீளம், படம் 5-4-2 (i) இல் உள்ள SS' இன் தீளத்தை விட அதிகம் என்பது தெரிகிறது. ஆகவே, படம் 5-4-2 (i) இல் SS' என்ற தூரத்தைக் கடக்கக் கதிரவன் எடுத்துக் கொள்ளும் தேரம் குறைவாகும். எனவே, மண்ணுலக நடுவரை யில் உள்ள இடங்களில் ஏற்படும் மெல்மொளியின் கால அளவு மிக்சிறு மதிப்புடையது என்பது பெறப்படுகிறது.

5-4-3 : மண்ணுலக நடுவரையில் உள்ள ஓர் இடத்தில் கதிரவன் நடுவரை விலக்கம் δ ஆகவிருக்கும் காலில் மெல்மொளியின் கால அளவு :

மண்ணுலக நடுவரை உள்ள ஓர் இடத்தின் அகலங்கு $\phi = 0$. படம் 5-4-3 காண்க. மூன் கண்டப்படியே NS₀ உம் NS₁ உம் கொள்க. S' கதிரவன் துருக்கும்போது மெல்மொளியி ஆரம்பிக்கும் ; S' இல் கதிரவன் இருக்கும்போது மெல்மொளியி முடியும் ;

குறிப்பு:

$\phi \neq 0$ உள்ள நாட்களில்

$$\sin H = \sin 18^\circ \sec \delta$$

$\sec \delta =$ எப்போதும் > 1 ஆகையால்,

$$\sin 18^\circ \sec \delta > \sin 18^\circ$$

$$\therefore \sin H > \sin 18^\circ$$

$$\therefore H > 18^\circ$$

$$\therefore \frac{H}{15} \text{ மணிகள்} > \frac{18}{15} \text{ மணிகள்.}$$

அதாவது மெல்லுளிக் காலம், தடுவரை இடங்களில் மத்திய நாட்களில் 72 நிமிடங்களுக்கு மேற்பட்டதெனத் தெரிகிறது. மூன்றாம் 5.4-1 இல் கண்ட வாய்பாட்டின்படிவும், $\phi=0$ என்ற இடங்களில் மெல்லுளிக் காலம் கணிக்கலாம்.

5.4-1. (1) (3)ன் படி, $\phi=0$ ஆனால்,


$$\begin{aligned} \text{மெல்லுளிக் காலம்} &= \left(\frac{H - h}{15} \right) \\ &= \frac{1}{15} \left[\cos^{-1} \left(-\frac{\sin 18^\circ}{\sin \delta} \right) - \frac{\pi}{2} \right] \\ &= \frac{1}{15} \left[\frac{\pi}{2} + \sin^{-1} \left(\frac{\sin 18^\circ}{\cos \delta} \right) - \frac{\pi}{2} \right] \\ &= \frac{1}{15} \left[\sin^{-1} (\sin 18^\circ \sec \delta) \right] \text{ மணிகள்.} \end{aligned}$$

இங்கு $\delta = 0$ ஆனால், மெல்லுளிக் காலம் $= \frac{1}{15} \sin^{-1} (\sin 18^\circ)$
 $= \frac{1}{15} \times 18$ மணிகள்.
 $= 72$ நிமிடங்கள்.

குறிப்பு:- நல்ல கதிரவன் வெளிச்சம் தேவைப்படும் வேலைகள் வானியல், கதிரவன் தொடுவானத்திற்குக் கீழ் 6° வரையதற்கு மூன்று ஆரம்பிக்க முடியாது; மாலைநில கதிரவன் தொடுவானத்திற்குக் கீழ் 6° க்கு இறங்கியவுடனும் தொடர்ந்து செல்வமுடியாது. இந்த 6° இறங்கத்தில் கணிக்கப்படும் மெல்லுளிக் காலம் நடைமுறை மெல்லுளிக் காலம் (Civil Twilight) எனப்படும். ஆகவே 12° இறங்கத்திற்குரிய மெல்லுளிக் காலம் மாலை

மெர்லொனிக் காலம் (Nautical Twilight) எனப்படும். நாம் கணித்த 18° இறக்கத்திற்குரிய மெர்லொனிக் காலம் வானியல் மெர்லொனிக் காலம் (Astronomical Twilight) எனப்படும். 15° க்குப் பதிலாக 6° ஆகவுது 12° *கு சொல்வ, இவ்வித மெர்லொனிக் காலம் கிடைக்கப் பெறும்.

5-4-4 சில இடங்களில், சில காலங்களில், கதிரவன் மாலை மறைந்து காலைமீள் உதயமாகும் வரையில் இம் மெர்லொனி நிலவலாம். ஆர்ப்படி மெர்லொனி இரவு முழுதும் நிலவ வேண்டுமானின், என்ன கட்டுப்பாடுகள் தேவை எனப் பார்ப்போம்.



படம் 5-4-4.

மெர்லொனி ! இரவு முழுதும் நிலவியிருக்கவேண்டுமானால் கதிரவன் தன் திசையில் பாதையில் கீழ்க்கி கூடக்கும் புள்ளி தொடுவானத்திற்குக் கீழே 18° க்கு மேற்படாமல் இருக்கவேண்டும். படம் 5-4-4 இல் NS, தொடுவானம். AB கதிரவன் பாதை எனக் கொண்டால் இரவு முழுதும் மெர்லொனி நிலவியிருக்கவேண்டிய கட்டுப்பாடு, $NB < 18^\circ$ எனப் பெறப்படுகிறது.

அதாவது $PB - PN < 18^\circ$ ஆகவது $PR - RB - PN < 18^\circ$

$$\therefore 90^\circ - \delta - \phi < 18^\circ$$

அதாவது $72^\circ - \delta < \phi$

அகல்வது $\phi > 72^\circ - \delta$ ஆக இருக்கவேண்டும். அதிரவன் மீப் பெரு நடுவரை விலக்கம் $\delta = y$ எனக் கொண்டால் கீழடக்கும் கட்டுப்பாடு

$$\phi > 72^\circ - y.$$

எனவே $\phi > 48\frac{1}{2}^\circ$ உள்ள இடங்களில் மட்டுமே, இரவு முழு வதும் மெல்லொளி பரவியிருக்க வாய்ப்புக்கள் உண்டு. இதற்குக் குறைந்த அகலங்களிலுள்ள இடங்களில் இந்த நிலை ஏற்பட சாத்திய மில்லை. ஆக, $\phi > 48\frac{1}{2}^\circ$ என்ற இடங்களில் அதிரவன் நடுவரை விலக்கம் $\delta > 72^\circ - \phi$ இருக்கும் நாட்கள் யாவும், இரவு முழுதும் மெல்லொளி நாட்களாகும். எடுத்துக் காட்டாக, $\phi = 80^\circ$ உள்ள இடங்களில் அதிரவன் நடுவரை விலக்கம் 12° ஆக இருக்கும் நாளில் இருந்து இரவு முழுதும் மெல்லொளி படத்திருக்கும் நாட்கள் ஆரம்பமாகும். இந்த நாட்கள், நடுவரை விலக்கம் $22\frac{1}{2}^\circ$ க்கு உயரும் வரையில் நீடித்து, மீண்டும் $\delta = 12^\circ$ ஆகக் குறையும் வரையில் நீடிக்கும். இக்காலக் கூறின் மைய நாள் இரவின் 22 என்பது தெளிவு.

5.4.5: இதுவரை நாம் ஆராய்ந்து அதிரவன் கட நடுவரை விலக்கம் பெற்ற கால வட்டமான மார்க்சு 21 முதல் செப்டம்பர் 23 வரையாகும். இந்த முறைப்படியே, அதிரவன் தெற்கு நடுவரை விலக்கம் பெறும் கால வட்டத்திற்குரிய கட்டுப்பாடுகளையும் காண வாம். அப்போது அதிரவன் பாதை A, B_1 எனக் கொள்க. அது நடுவரைக்குக் கீழேயிருக்கும். நடுவரை விலக்கம் δ குறைமதிப் புண்டவது.

$$\begin{aligned} \text{அப்போது } NB_1 &= NR + RB_1 \\ &= NR + |\delta| \\ &= 90 - \phi + |\delta| \end{aligned}$$

எனவே கட்டுப்பாடு யாதெனில்

$$\begin{aligned} 90 - \phi + |\delta| &< 18^\circ \\ 72 &< \phi - |\delta| \end{aligned}$$

$$\text{அதாவது } \phi - |\delta| > 72^\circ$$

$-|\delta|$ என்பது குறைமதிப்புண்டய அதிரவன் நடுவரை விலக்கமான δ நான். எனவே, δ குறைமதிப்புண்டயதெனக் கொண்டால்

$$\phi + \delta < 72^\circ$$

என்ற கட்டுப்பாடு மறுபடியும் கிடைக்கிறது. எனவே, $\phi + \delta > 72^\circ$ என்ற கட்டுப்பாடு ஆண்டு முழுதிற்கும் பொருத்தமானதும், ஆனது தெற்கு தடுவரை விவக்கம் குறைமதிப்புடையதாகப் பயன் படுத்தப்பட வேண்டும்.


குறிப்பு (1). $\phi = 50^\circ$ ஆனது, δ ன் மதிப்பு -15° க்குக் குறைவாக இருக்கும் கால, மெல்பொர்ன இரவு முழுதும் நீடிக்கும். $\delta < -15^\circ$ ஆன பிறகு $\delta = -28\frac{1}{2}^\circ$ வரைக்கும்; மறுபடியும் $\delta = -15^\circ$ ஆனது வரையில் முழு இருள் சூழும். இது மன்னுலகத்தில் வடதுருவத்தில் ஏற்படும் நிகழ்ச்சியாகும். (5.1.6 காண்க)

(2) $\phi = 72^\circ$ ஆகியது மேற்பட்ட அகலங்களானது, மார்ச்சு 21 முதல் செப்டம்பர் 23 வரையில், சில நாட்கள் நிலைத்த முழுப்பகல் நாட்களாகவும், மீதி நாட்களில் இரவு முழுதும் மெல்பொர்ன பரவியும் இருக்கும்.

(3) தெற்கு அகலங்கு ϕ இல் உள்ள இடங்களில் δ தென்னின் $\phi + \delta > 72^\circ$ என்ற கட்டுப்பாட்டில் முழு இரவு மெல்பொர்ன படர்த்திருக்கும்; δ வடக்கின் $\phi - \delta > 72^\circ$ என்ற கட்டுப்பாட்டில், முழு இரவு மெல்பொர்ன படர்த்திருக்கும்.

5.4.6: மெல்பொர்ன இரவுமுழுதும் தொடர்ந்து நிலவும் நாட்களின் எண்ணிக்கை: ஓரீடத்தில் இரவு முழுதும் மெல்பொர்ன படர்த்திருக்கவேண்டுமெனின் ஆய்விடத்தின் அகலங்கு $\phi > 72 - \delta$ ஆக இருக்கவேண்டுமென்ப பார்த்தோம். மேலும் δ ன் மீள்பெரு மதிப்பு $28\frac{1}{2}^\circ$ ஆகையால், ϕ ன் மதிப்பு $= (72 - 28\frac{1}{2}) = 43\frac{1}{2}$ க்குக் குறைவாக இரக்க வேண்டுமெனவும் பார்த்தோம்.

$\phi > 43\frac{1}{2}^\circ$ உள்ள ஓர் இடத்தில், தொடர்ந்து எத்தனை நாட்கள், இரவு முழுதும் மெல்பொர்ன படர்த்து இருக்குமெனக் கணிக்கலாம்.



படம் 5.4.6

கதிரவனின் தடுவரை விவக்கம் $72^\circ - \phi$ இருக்கும் தானன்று, முதல் முதலாக மெல்பொர்ன இரவு முழுதும் படர ஆரம்பிக்கிறது. அதற்குப்

பின்டி தன் மதிப்பு உயராதவர, மூல இரவு மெய்கொளி நாட்கள் தொடர்ந்து நீடிக்கும். பின்னர் ϕ தன் மீம்பெரு மதிப்பான $28\frac{1}{2}^\circ$ அடைந்து, மறுபடியும் தன் மதிப்பு குறைந்து $72^\circ - \phi$ ஆகும்போது மூல இரவு மெய்கொளிக் காலம் முடிவடைகிறது. கதிரவன் தடுவரை விளக்கம் $72^\circ - \phi$ ஆக இருக்கும்போது, கதிரவனின் நெட்டாக்கு $\alpha = \sin^{-1} [\sin (72^\circ - \phi) \operatorname{cosec} \omega]$ ஆகும். படம் 5-4-6 பார்க்க.

$$\frac{\sin (72^\circ - \phi)}{\sin \omega} = \frac{\sin \alpha}{\sin 90^\circ}$$


$$\therefore \alpha = \sin^{-1} [\sin (72^\circ - \phi) \operatorname{cosec} \omega].$$

கதிரவன் தடுவரை விளக்கம் ω ஆகும்போது, அதன் நெட்டாக்கு $\frac{\pi}{2}$ (ஜூன் 22); எனவே, முதல் மூல இரவு மெய்கொளி நாள் முதல், ஜூன் 22வரை, கதிரவன் தன் பாதையில் பயணம் செய்யும் நெட்டாக்கு தூரம்

$$= \frac{\pi}{2} - \sin^{-1} [\sin (72^\circ - \phi) \operatorname{cosec} \omega]$$

$$= \cos^{-1} [\sin (72^\circ - \phi) \operatorname{cosec} \omega]$$

மறுபடியும் ஜூன் 22 முதல், மத்தோர் முறை, கதிரவன் தடுவரை விளக்கம் $72^\circ - \phi$ ஆகும்வரை, கதிரவன் தன் பாதையில் பயணம் செய்யும் நெட்டாக்கு தூரம் இதே $\cos^{-1} [\sin (72^\circ - \phi) \operatorname{cosec} \omega]$. இத்தம் பயணக்காலமே, மூல இரவு மெய்கொளி நீடிப்புக் காலமாகும். இதையே மின்வரும் படம் 5-4-6 (i) விளக்குகிறது. விளக்கம் ஒன்றே.



படம் 5-4-6 (i)

$$YS_1 = \alpha; S_1S = \frac{\pi}{2} - \alpha = \frac{\pi}{2} - \sin^{-1} [\sin (72^\circ - \phi) \operatorname{cosec} \omega]$$

$$= \cos^{-1} [\sin (72^\circ - \phi) \operatorname{cosec} \omega]$$

$$SS_1 = SS_3 = \cos^{-1} [\sin (72^\circ - \phi) \operatorname{cosec} \omega]$$

எனவே, முழு மெக்லொனி நிலவும் மொத்த காலத்தில் கதிரவன் தன் பாதையில் S_1 இலிருந்து S_2 க்குச் சென்று இருக்கிறது, எனவே முழு மெக்லொனிக் காலம்

= கதிரவன் $S_1 S_2$ என்ற தூரம் பயணம்

செல்லும் காலம் = $\frac{865}{360} \times S_1 S_2$ நாட்கள்.

= $\frac{865}{360} \times 2 \cos^{-1} [\sin (72^\circ - \phi) \operatorname{cosec} m]$.

= $\frac{78}{36} \times \cos^{-1} [\sin (72^\circ - \phi) \operatorname{cosec} m]$

நாட்கள். இம்மதிப்பு முழு எண்ணுக்குக் வேண்டுமென்ற அளியுமில்லை, எனவே இம்மதிப்பின் முழு எண் பகுதியையே அல்லது அடுத்த அடுத்த எண்ணையே எடுத்துக்கொண்டால் தமக்கு வேண்டிய நாட்கள் கிடைக்கப் பெறும்.

பயிற்சி 5 (ii)

1. ϕ வடக்கு அகலங்களுள்ள ஓர் இடத்தில், கதிரவன் நடுவரை விலக்கம் δ (வடக்கு) உள்ள நாளன்று மெக்லொனிக் காலம், $\frac{1}{15} [\cos^{-1} (\tan \phi \tan \delta) - \cos^{-1} (\sin 15^\circ \sec \phi \sec \delta + \tan \phi \tan \delta)]$ என திறவுக. $\phi = 0$ உள்ள இடங்களில், இம் மெக்லொனிக் காலம், அன்று $\frac{1}{15} [\frac{\pi}{2} - \cos^{-1} (\sin 15^\circ \sec \delta)]$ எனப் பெறுக.

2. மண்ணுலக நடுவரையின் மேல் உள்ள இடங்களில், கதிரவன், மேடமுதற்புள்ளி அல்லது துணம் முதற்புள்ளியில் இருக்கும் நாளன்று, மொத்தமாக (i) நடைமுறை மெக்லொனிக் காலம் 45 நி. நிடிக்குமெனவும், (ii) மாதும் மெக்லொனிக் காலம் 90 நி. நிடிக்குமெனவும் திறவுக.

3. கதிரவன் நடுவரை விலக்கம் 10° (வடக்கு) இருக்கும் நாளில், மண்ணுலகில் எப்பகுதிகளில், மெக்லொனி இரவு முழுதும் நீடிக்கும்?

4. கதிரவன் நடுவரை விலக்கம் 15° தெற்கு இருக்கும் நாளில், மண்ணுலகில் எப்பகுதிகளில், மெக்லொனி இரவு முழுதும் நீடிக்கும்?

6. ஆர்க்டிக் வட்டத்தின் மேல் உள்ள ஓர் இடத்தில், தோராயமாக எத்த நாளன்று (பஞ்சாங்கப்படி) முழு மெல்வொளிக் காலம் ஆரம்பிக்கு மெனக் காண்க.

6. கதிரவனின் தடுவரை விலக்கம் 15° க்குக் குறைவாயுள்ள வரையில் மண்ணுலகில் எல்லா இடங்களிலும், மெல்வொளி உட்பட 12 மணிக்கு மேல் நீண்ட ஒரு பகற்பொழுதேனு முள்ளது என நிறுவுக.

7. A, B என்ற இடங்கள் முறையே $\phi; \phi + 15^\circ$ அகலங்கிலுள்ளன. A என்பது கடலுளில் மண்டத்திலுள்ளது. இவ்விடத்தில் ஒரு நாள் முழுப்பகல் நாளாயிருக்கும்போது, B இல் அத்தாள் இரவு முழுதும் மெல்வொளி நீடிக்கும் என நிறுவுக.

$\phi = 72^\circ$ ஆனால், அது எத்தாளெனக் காண்க.

5.5 : அடிவானத் தாழ்வு (Dip of the Horizon)

விஞ்ஞானத் துறைகளில் நாம் சோதனைகள் செய்து காட்சிப் பதிவுகள் செய்யும்போது சில விழைகள் ஏற்படலாம். அப்பிழைகள் எப்படி, எத்த அளவிற்கு ஏற்படுகின்றனவெனத் தெரித்து, அப்பிழைகளைத் திருத்திய ரின்பே நாம் ஆக்காட்சிப் பதிவுகளைப் பயன்படுத்தவேண்டுமென நாம் அறிவோம். வானியல் காட்சியாளன் கையாளும் கருவிகளில் உள்ள விழைகள் ஒரு புற மிருக்க, சூழ்நிலை காரணமாக, இயற்கையாக ஏற்படும் சில விழை களும் உண்டு. அப்பிழைகள் எவ்விதங்களில் எத்த அளவிற்குத் தன் காட்சிப் பதிவுகளைப் பாதிக்கின்றன வென்பதைக் கண்டு, அவ்வாறான விழைகளைத் திருத்தியபின்பே, ஒரு காட்சியாளன் தான் செய்த பதிவுகளைப் பயன்படுத்தவேண்டும். விரிவாக, ஒன்றாகியே ஒன்றாக நாம் இப்பிழைத் திருத்தங்களைப் பற்றி ரின்பே பாசும்போம்.


முதன் முதலாக 'அடிவானத்தாழ்வு' என்ற விழைவைப் பற்றிப் பாசும்போம்: இது மண்ணுலகம் கோளவடிவத்திலி இருப்பதால் ஏற்படும் ஒருவிதப் பிழையாகும். கடலில் பயணம் செய்யும் மாலுமீ தன் கப்பலிலிருந்து செய்யும் காட்சிப் பதிவுகள், இவ்விதப் பிழைக்கு உட்படும். ஏனெனில் ஒரு பொருளின் ஏற்றக் கோணத்தைப் பதிவு செய்யும்போது, அவன் பதிவு செய்வார் கோணம், அப்பொருளிலிருந்து, அவனுடைய தொடுவானத்திற்கும் அல்லது கடல் வான தடுவரைக்கும் (sea-line) உள்ள கோண தூரமாக இருக்கும். மண்ணுலகம் கோள வடிவத்திலிருப்பதால்,

no other agencies under contract

அவனுடைய காட்சியில் உள்ள தொடுவானமும் வானியல் கணிப்பீற்றிய சரியான தொடுவானமும் (வானகோளத் தொடுவானம்) ஒரேயாக இருப்பேறுமா? அவன் கடல் மட்டத்திலிருந்து எவ்வளவு உயரத்திலிருந்து காட்சிப் பதிவு செய்கிறான் என்பதைச் சார்ந்திருக்கும். ஒரு காட்சியாளன் காட்சிக்குப்பரம் தொடுவானத்திற்கும் சரியான தொடுவானத்திற்கும் உள்ள கோண வேறுபாடே, 'அடிவானத் தாழ்வு' எனப்படும். (அது அக்காட்சி விடத்துக்கு மட்டுமே பொருத்தம்).

குறிப்பு : இந்த வேறுபாடு, கூடல் மட்டத்திற்கு மேல், உள்ள குள்தின் மேலோ, கோபுரத்தின்மேலோ இருந்து பதிவு செய்யப் படும் பதிவுகள் சிவவந்தரையும் கூடப் பாதிக்கும்.

5.5.1 : அடிவானத் தாழ்வு—விளக்கம்.



WLB 5-5-1

படம் 5-5-1 இல் 0-மெட்ரிக்ஸ் காட்டும்.

A-மன்றத்தின் மேல் கடம்பட்டத்தில் உள் ஓட்டம். A இல் தொடுவான திசை ANLOA. ZAO-அம்மிடத்தின் புவி அட்டத்திசை.

வி. OA இன் நீட்டலில் A க்கு மேல் h உயரத்தில் ஒரு காட்சியான B இரூக்கிற்குள் எனக் கொள்க. அவனுடைய நேர் உச்சிப் புள்ளியும் Z தான். OB க்கு குத்துக் கோடான BN' ($\perp AN$) என்பதுதான், B இலுள்ள காட்சியானது சரியான வான தொடுவானம் (True Celestial Horizon). BC என்பது B இலிருந்து மண்ணுலகத்திற்கு வரையப்படும் ஒரு தொடுவரை. B இலிருக்கும் காட்சியானது வானத் தொடுவரை BC என்ற திசையில் இருக்கும்; ஏனெனில் BC என்ற திசைக்கு மேலே உள்ள எல்லா வான பொருள்களும் அவர் காட்சிக்குக் கிடைக்கும், (எடுத்துக்காட்டாக BC க்கு மேலே உள்ள P என்ற வான பொருள் B இலுள்ள காட்சியானது கண்ணிற் படும்; ஆனால் அவனது சரியான தொடுவரை BN' க்குக் கீழேதான் அந்தப் பொருள் P இருக்கிறதென்பதைக் காண்க.)

S என்ற ஒரு விண்மீனின் சரியான ஏற்றக் கோணம் $\angle B'N'$ $= \alpha$. ஆனால் B என்ற காட்சியானது S இன் ஏற்றக் கோணத்தை $\angle B'C = \alpha'$ எனப் பதிவு செய்கிறான். (ஏனெனில் B இன் தொடுவானத்தை BC) பதிவு செய்த ஏற்றக் கோணம், உண்மையான ஏற்றக் கோணத்தை விட அதிகம்; எவ்வளவு அதிகமெனில் $N'BC = D$ அதிகம். D என்பதே, B இன் அடிவானத் தாழ்வு எனப்படும். இது காட்சித் தொடுவானத்திற்கும் இடைப்பட்ட தாழ்வு எனக் கண்டு கொள்க.

$$\begin{aligned} \angle B'N' &= \alpha \text{ (சரியான ஏற்றக் கோணம்).} \\ &= \angle B'C - N'BC \\ &= \alpha' - D \end{aligned}$$

எனவே காட்சிப் பதிவான ஏற்றக் கோணத்திலிருந்து, காட்சி விடத்திற்குரிய அடிவானத் தாழ்விற்குக் கழிக்க, S இன் சரியான ஏற்றக் கோணம் கிடைக்கும்.

இதை மற்ரோ விதத்தில் கூறுவது:

'அடிவானத் தாழ்வின் விளைவாக, ஒரு விண் பொருளின் உண்மையான (வானியலுக்குச் சரியான) ஏற்றக் கோணம் மிகுதியாகப்படுகிறது'.

5.5.2 : அடிவானத் தாழ்வு— D இன் அளவு

மண்ணுலகின் அளவரிட்டம் a எனக் கொள்வோம். BA இன் நீட்டல் மண்ணுலகின் எதிர்ப்பக்கத்தை E இல் வெட்டிடும்.

மூ.த்திலிருந்து (5;5:1 மூ.ம்)

$$\begin{aligned} BC^2 &= BA \cdot BE \\ &= BA \cdot (BA + AE) \\ &= BA \cdot (BA + 2a), \\ &= h(h + 2a), \\ &= h^2 + 2ah, \\ &= 2ah \left(1 + \frac{h}{2a} \right), \\ &= 2ah \text{ (தொடரவதாக).} \end{aligned}$$

[ஏனெனில் எஇன் மதிப்பை போக்கும்போது h மிகச் சிறியதாகும்..

$\frac{h}{2a}$ மிக மிகச் சிறியதாகலின் அதனை விட்டுவிடலாம்.]

$$\text{எனவே } BC = \sqrt{2ah}$$

$$\triangle OBC \text{ இல், } \angle OBC = D$$

$$\therefore \tan D = \frac{EC}{OC}$$

$$= \frac{\sqrt{2ah}}{a}$$

$\therefore D$ மிகச் சிறியதாகலில்

$$D = \sqrt{\frac{2h}{a}} \text{ ஆகையாகும். (தொடரவதாக).}$$

மூன்று ஒற்றைகள் :

$$\cos D = \frac{OC}{OB}$$

$$1 - 2 \sin^2 \left(\frac{D}{2} \right) = \frac{a}{a+h}$$

$$\therefore 2 \sin^2 \left(\frac{D}{2} \right) = 1 - \frac{a}{a+h}$$

$$= \frac{h}{a+h}$$

$$\sin^2 \left(\frac{D}{2} \right) = \frac{h}{2(a+h)}$$

$$\sin \left(\frac{D}{2} \right) = \sqrt{\frac{h}{2(a+h)}}$$

D மிகவும் சிறியதாகலின் ஆதரையின் அளவில் $\frac{D}{2} \sim \sin \frac{D}{2}$

$$\therefore \frac{D}{2} = \sqrt{\frac{2h}{a(a+h)}}$$

$$\begin{aligned} \therefore D &= \sqrt{\frac{2h}{a(a+h)}} \\ &= \sqrt{\frac{2h}{a}} \quad (\text{தோராயமாக ஆதரையின் அளவில்}) \end{aligned}$$

ஆதலால் (1) $D = \sqrt{\frac{2h}{a}} \times \frac{180 \times 60 \times 60}{\pi}$ விசைநிலைகள்.

(2) $h = \frac{1}{\pi} a$ எனக் கொண்டால்,

$$D = \frac{180 \times 60 \times 60}{\pi} \sqrt{\frac{2}{\pi}}$$
 விசைநிலைகள்.

எ. கா (1) 1. கி.மீ. உயரமுள்ள ஒரு குன்றின்மேலிருந்து ஒரு விண்மீனின் ஏற்றக் கோணம் $80^\circ 45' 32''$ எனப் பதிவாகிற்று. மண்ணிலுமின் ஆரம் 6400 கி.மீ. எனின், அம் விண்மீனின் சரியான ஏற்றக் கோணம் காண்க.

மேற்கண்ட ஆதரையின்படி,

$$\begin{aligned} D &= \sqrt{\frac{2}{6400}} \times \frac{180 \times 60 \times 60}{\pi} \\ &= 38' 49'' \quad (\text{விசைநிலைகள்}) \\ &= 1^\circ 0' 49'' \end{aligned}$$

எனவே சரியான ஏற்றக் கோணம்

$$\begin{aligned} &= 80^\circ 45' 32'' - 1^\circ 0' 49'' \\ &= 79^\circ 44' 43''. \end{aligned}$$

5-6: அடிவானத் தாழ்வின விசைவுகள்

(1) அடிவானத் தாழ்வின விசைவாகத் தொடுவானம் சிதித்து கீழே அழுத்தப்படுகிறது. இது நமக்குத் தெரிவதில்லை. ஆனால் இதன் காரணமாகத் தொடுவானத்திற்குச் சிதித்து D அளவு கீழே உள்ள விண்மீன்களாகத் தொடுவானத்திலேயே இருப்பது

போலத் தெரியும். அதாவது விண்மொருள்கள் எல்லாம் ஊன உச்சியை நோக்கி D உயரம் சென்றுள்ளதுபோலக் காணப்படும்.

(2) அடிவானத் தாழ்வின் விண்வாக விண்மீனின் தொடு வான தூரம் மாறுவதில்லை; ஏனெனில் விண்மீனின் ஏதற்க கோண வட்டம் இடம் மாறுவதில்லை.

(3) மற்றொரு விண்வு ஒரு விண்மீன் சரிவான கிழக்குத் தொடுவானத்திற்குக் கீழே D' உள்னபோதே, தொடுவானத்தில் உதிப்பதுபோலத் தோன்றும்; சரிவான மேற்குத் தொடு வானத்திற்குக் கீழே D' இறங்கியவையுதான், மற்றவதுபோலத் தோன்றும். D' அளவு தொடுவானத்திற்குக் கீழுள்ள ஒரு விண் மொருள் தொடுவானத்திற்கு வர எடுத்துக்கொள்ளும் நேரம்

$$= \frac{D}{15 \sqrt{\cos^2 \phi - \sin^2 \delta}} \quad (\phi \text{ இடத்தின் அகலங்கு, } \delta \text{ விண்}$$

மொருளின் நடுவரை விளக்கம்.) இவ்வாறே தொடுவானத்தி னிருந்து D' கீழே செல்ல எடுத்துக்கொள்ளும் நேரம்

$$= \frac{D}{15 \sqrt{\cos^2 \phi - \sin^2 \delta}} \text{ வினாடிகள் என நமக்குத் தெரியும்.}$$

எனவே தோற்ற உதயம் $= \frac{D}{15 \sqrt{\cos^2 \phi - \sin^2 \delta}}$ வினாடிகள், வழக்கமான தோற்றத்திற் றூள்பாகவும், தோற்ற மறைவு,

$\frac{D}{15 \sqrt{\cos^2 \phi - \sin^2 \delta}}$ வினாடிகள், வழக்கமான நேரத்திற்குப் பின் பாகவும் ஏற்படும். ஆகையால் அடிவானத்தாழ்வின் விண்வாக, ஒரு விண்மீன் (α, δ) தொடுவானத்திற்குமேல் இருக்கும் தோற்றக்காலம்

ஹரையாகக் கணித்ததை விட $\frac{D}{15 \sqrt{\cos^2 \phi - \sin^2 \delta}}$ வினாடிகள் மிகுதியாகிறது. உதிரவணப்பொருத்தமட்டில் அடிவானத்தாழவு D' ஆனால், உதிரவண $\frac{D}{15 \sqrt{\cos^2 \phi - \sin^2 \delta}}$ வினாடிகள் ஹரையாக உதிக்கும்.

$$\frac{D}{15 \sqrt{\cos^2 \phi - \sin^2 \delta}} \text{ வினாடிகள் நாமதயாக மறைவும்.}$$

எனவே இதன் காரணமாக பகற்காலம் $\frac{2D}{15 \sqrt{\cos^2 \phi - \sin^2 \delta}}$ வினாடிகள் அதிகமாகும். இரவு காலம் அதே அளவு குறையும்.

குறிப்பு: (1) $\phi = 0$ ஆனால், பகற்காலம் $\frac{2D}{15 \cos \delta}$ விநாடிகள் அதிகமாகும்.

மேலும் $\delta = 0$ ஆனால் (அதாவது மார்க்ச 21ம் நாள், செப்டம்பர் 23ம் நாள்) பகற்காலம் $\frac{2D}{15}$ விநாடிகள் அதிகமாகும்.

(2) ஒரு குறிப்பிட்ட ஆகஸ்தில், $\delta = 0$ ஆனால், பகற்காலம் $\frac{2D}{15 \cos \phi}$ விநாடிகள் அதிகமாகும்; $\delta = w$ ஆனால், பகற்காலம் $\frac{2D}{15 \sqrt{\cos^2 \phi - \sin^2 w}}$ விநாடிகள் அதிகமாகும். இவ்

விரண்டு காலங்களில், மீப்பெரு மதிப்பு $\frac{2D}{15 \sqrt{\cos^2 \phi - \sin^2 w}}$;

மீச்சிறு மதிப்பு $\frac{2D}{15 \cos \phi}$.

எ.கா. (2) கடல் மட்டத்திற்குமேல், ஒரே குத்துக் கோட்டில் a, b உயரமுள்ள இரு இடங்களிலிருந்து நேரடியாக அளக்கப்பட்ட ஒரு வின் மீவின் ஏற்றக் கோணங்கள் முறையே α, β ஆனால், மண்ணுவக ஆரம் $\frac{(\sqrt{2b} - \sqrt{2a})^2}{(\beta - \alpha)^2}$ என நிறுவ. (செ) அங்விண்ணின் சரிவான ஏற்றக் கோணம் θ எனக்கொண்டால்,

$\theta = \alpha$ - முதலிடத்தின் அடிவானத்தாழ்வு.

$\theta = \beta$ - இரண்டாமிடத்தின் அடிவானத்தாழ்வு.
மண்ணுவக ஆரம் R ஆனால்,

$$\begin{aligned}\theta &= \alpha - \sqrt{\frac{2a}{R}} \\ &= \beta - \sqrt{\frac{2b}{R}} \\ \therefore \alpha - \sqrt{\frac{2a}{R}} &= \beta - \sqrt{\frac{2b}{R}} \\ \therefore R &= \frac{(\sqrt{2b} - \sqrt{2a})^2}{(\beta - \alpha)^2}\end{aligned}$$

எ.கா. (3)

கடல் மட்டத்திற்குமேல் $\frac{n}{\pi}$ உயரத்தில் உள்ள ஒரு காட்சி யானதுக்கு, உதிரவன் $\frac{12}{\pi} \frac{\sec \delta}{\sin \phi} \sqrt{\frac{2}{n}}$ மணி நேரம் முன்னதாகவே உதயமாகிறதென நிறுவ.


(δ -கதிரவன் தடுவரை விலக்கம்; α -மண்ணுவகை ஆரம்;
 ϕ -கதிரவன் பாதத்திலும், தொடுவானத்தில்தரும் உள்சை சாய்வு).

$$\begin{aligned} \text{அடிவானத் தாழ்வு } D &= \sqrt{\frac{Rk}{a}} = \sqrt{\frac{R\alpha}{na}} = \sqrt{\frac{R}{n}} \\ &\quad \text{ஆரவயல்} \\ &= \sqrt{\frac{R}{n}} \times \frac{180 \times 60 \times 60}{\pi} \text{ விலக்கம்} \end{aligned}$$

ஆகவே, கதிரவனுதகம் துரிதமாகும் நேரம்

$$\begin{aligned} &= \frac{D \text{ (விலக்கம்)}}{15 \sqrt{\cos^2 \phi - \sin^2 \delta}} \text{ விநாடிகள்.} \\ &= \sqrt{\frac{R}{n}} \times \frac{180 \times 60 \times 60}{\pi \times 15 \sqrt{\cos^2 \phi - \sin^2 \delta}} \text{ விநாடிகள்.} \\ &= \sqrt{\frac{R}{n}} \times \frac{180 \times 60 \times 60}{\pi \times 15 \sqrt{\cos^2 \phi - \sin^2 \delta}} \\ &\quad \times \frac{1}{60} \times \frac{1}{60} \text{ மணி.} \\ &= \frac{12}{\pi} \sqrt{\frac{R}{n}} \cdot \frac{1}{\sqrt{\cos^2 \phi - \sin^2 \delta}} \text{ மணிதன்.} \end{aligned}$$

இப்போது, ϕ , θ , δ மூன்றினிடம்பட்ட தொட்கையைக் காண்போம்.



படம் 5-6 (1)

படத்தில் NS தொடுவான். தொடுவானத்தில் அதிர்வன் உதிக்கும்படி S. [படம் 5-8 (1)] ASB என்பது அதிர்வன் பாதை.

$$\angle SN = \theta \text{ (கொடுக்கப்பட்டது)}$$

$$\therefore \angle PSN = 90^\circ - \theta.$$

$\therefore$ முக்கோணம் SPN இல்,

$$\frac{\sin \phi}{\sin (90^\circ - \theta)} = \frac{\sin (90^\circ - \delta)}{\sin 90^\circ}$$

$$\therefore \sin \phi = \cos \theta \cos \delta$$

$$\begin{aligned} \therefore \sqrt{\cos^2 \phi - \sin^2 \delta} &= \sqrt{1 - \cos^2 \theta \cos^2 \delta - \sin^2 \delta} \\ &= \sqrt{1 - (1 - \sin^2 \theta) (1 - \sin^2 \delta) - \sin^2 \delta} \\ &= \sqrt{\sin^2 \theta - \sin^2 \theta \sin^2 \delta} \\ &= \sin \theta \cos \delta. \end{aligned}$$

$\therefore$ அதிர்வன் உதவும் தூரத்தையும் நேரம்

$$\begin{aligned} &= \frac{12}{\pi} \sqrt{\frac{2}{n}} \cdot \frac{1}{\sqrt{\cos^2 \phi - \sin^2 \delta}} \\ &= \frac{12}{\pi} \sqrt{\frac{2}{n}} \cdot \frac{1}{\sin \theta \cos \delta} \\ &= \frac{12}{\pi} \frac{\sec \delta}{\sin \phi} \sqrt{\frac{2}{n}} \text{ மணிகள்} \end{aligned}$$

என நினைப்படுகிறது.

குறிப்பு (1). $\theta = 90^\circ$ ஆனால், ஒரு 'δ'க்கு, இத் நேரம் $= \frac{12}{\pi} \sec \delta \sqrt{\frac{2}{n}}$ என்ற மிச்சிது மதிப்பைப் பெறுகிறது.

(2) மேலும் $\delta = 0$ ஆனால், இதன் மதிப்பு

$$\frac{12}{\pi} \sqrt{\frac{2}{n}} \text{ மணிவாகும்.}$$

பயிற்சி 5 (iii)

1. இரு குன்றுகளின் உயரம் முறையே k, k' ; மண்ணுலக-ஆரம் a . இவ்விரு குன்றுகளுக் கிடையப்பட்ட தூரம் $\sqrt{2a^2 + \sqrt{2a^2}}$ ஆனும், ஒரு குன்றில் இருந்து மற்றொன்று தெரிய வாய்ப்புண்டு என நிறுவுக.

2. கடல் மட்டத்திற்குமேல் 80அடி உயரத்திலுள்ள ஒரு கப்பல் பாய்மரத்தில் உச்சியிலிருந்து கடல் மட்டத்திற்கு 100 அடி உயரத்திலுள்ள ஒரு கலங்கரை விளக்கு தெரிகின்றதானும், கப்பலுக்கும், கலங்கரை விளக்குக்கும் உள்ள தூரமென்ன? (முன் கணக்கு இங்கு பயன்படும்).

3. 32 மைல் சுற்றளவுக்கு ஒரு கலங்கரை விளக்கம் தெரியுமானால் அது என்ன உயரத்திலிருக்க வேண்டும்? 32 அடி உயரமான ஒரு கப்பல் பாய்மர உச்சியில் இருந்து அது தெரியுமேயானால், கப்பலுக்கும் கலங்கரை விளக்கத்திற்குமுள்ள தூரமென்ன?

4. எடுத்துக் காட்டு (8)இல், 45° அகலங்களில் உள்ள இடத்தில் 3 மைல் உயரத்திலிருந்து பார்த்தால், கடிரவன் உதிக்கும் நேரம் எவ்வளவு துரிதமாகிறதெனக் கணக்கிடுக. (மண்ணுலக ஆரம் 3960 மைல்கள் எனக் கொள்க).

5. எடுத்துக் காட்டு (8)ல்: ϕ அகலங்களுள்ள ஓர் இடத்தில், மார்க் 21, அல்லது செப்டம்பர் 22இல், அந்த நேரம்.

$$\left(-\frac{12}{\pi \cos \phi} \right) \sqrt{\frac{8}{\pi}} \text{ மணிமணி என நிறுவுக.}$$

6. எடுத்துக்காட்டு (3)ல், 80° அகலங்களிலுள்ள ஓரிடத்தில், 66அடி உயரத்தில் அந்த நேரம் 69 விநாடிகளென நிறுவுக. (மண்ணுலக ஆரம் 4000 மைல்களெனக் கொள்க).

7. A, B இரு குன்றுகள். A இன் உயரம் a . அதன் உச்சியில் இருந்து B ன் உச்சி A இன் தொலைவானத்திற்கு மேல் ஏற்றக் கோணம் r இல் தெரியுமானால், அதன் உயரம் தோராயமாக,

$$a + cd + d \left(\frac{d}{2c} - \frac{\sqrt{2a}}{r} \right) \text{ என நிறுவுக.}$$

[மண்ணுலக ஆரம் r ; A, B க்கு இடைப்பட்ட தூரம் d எனக் கொள்க].

படம் 5-6 (2) காண்க.

AM —முதற்குன்று; $AM = a$; BPQ — இரண்டாம் குன்று. $BP = a'$ எனவும் $PQ = x$ எனவும் கொள்க.

[1 மரட்டி சுமம் = $\frac{\pi \times 1 \times \pi}{60 \times 180}$; π மண்ணுவகை ஆகும்,

$$\therefore D (\text{விசைகளில்}) = \sqrt{\frac{2\pi\pi}{60 \times 180 \mu n}} \times \frac{150 \times 60 \times 80}{\pi}$$

$$= \frac{9600\sqrt{6}}{\sqrt{\pi n}} \text{ விசைகள்.}$$

$\phi = 45^\circ$; செங்குத்துத் தூரம் = 45° ; ஆகவே

$$\sin \delta = \cos A \cos \delta = \frac{1}{2} \Big].$$

6. வான ஒளிக்கதிர்க் கோட்டம் (ASTRONOMICAL REFRACTION)

5:0 வானியல் ஆரம்பச்சீட்டில், மண்ணுலகக் கோள அமைப்பின் காரணமாக, அடிவானத்தாழ்வு என்ற பிழை ஏற்பட வாய்ப்பிருக்கிறதெனவும், அதன் தன்மைகளையும், அதற்குரிய பிழை திருத்தங்கள் எவ்வாறு அமைகிறதெனவும் 5:5 இல் பார்த்தோம்.


மண்ணுலகைச் சுற்றி ஒரு வளிமண்டலம் பரந்துள்ளது. இவ்வளி மண்டலம் வழியாக விண்வெளிப் பொருள்களின் ஒளிக்கதிர்கள் பாய்ந்தோடி வந்து, காட்சியாளனைச் சந்திக்கின்றன. ஓர் ஊடகம் விட்டு மற்றோர் ஊடகம் வழியாகப் பாய்ந்து வரும் போது ஒளிக்கதிர்கள் இயற்கையாகத் திசை மாறுகின்றன. இத்திசை மாற்றத்தின் விளைவாகக் காட்சியாளன் செய்யும் சில வானியல் பதிவுகள் பிழைப்படுகின்றன. அப்பிழைகளின் தன்மைகளையும் அவை திருத்தப்படும் முறைகளையும் அதைச் சார்ந்த சில விளைவுகளையும் பற்றி இப்பகுதியில் காண்போம்.

6.1: வான ஒளிக்கதிர்க் கோட்டம் (Astronomical Refraction)

ஒரு படித்தான (homogeneous) ஊடகத்தில் (Medium) ஒளிக்கதிர் செல்லும்போது அது ஒரு நேர்க்கோட்டுப் பாதையில் செல்கிறது. ஆனால் ஓர் ஊடகத்திலிருந்து, மற்றோர் ஊடகத்தில் பாயும்போது, அப்பிழை ஊடகங்களுக்கும் பொதுவான பிரதானத்தில் (plane of separation) அதன் திசை மாறுகிறது. இத்திசை மாற்றம் ஒளிக்கோட்டம் அல்லது ஒளிக்கதிர்க்கோட்டம் எனப்படும். இது இயற்கை விளைவு.

ஒளியியலிலே, இத்திசை மாற்றம் பற்றி மூன்று விதிகள் நிறுவப் பட்டிருக்கின்றன. பழமுக வகுப்பிலே நீங்கள் இவ்விதிகளை அறிந்திருக்கலாம்.

சமதளத்தில் ஒளிக்கோட்டம் (Refraction in a Plane Surface)



படம் 6.1 (i)



படம் 6.1 (ii)

ஊடகங்களுக்கிடையே, அடர்மிகு (dense) ஊடகங்கள் எனவும், அடர்தகுறை (rare) ஊடகங்களெனவும் உறவு வகைகள் உண்டு; காற்றைவிட, கண்ணாடி அடர்மிகு ஊடகம்; வெற்றிடத் தைவிட (vacuum) காற்று அடர்தகுறை எந்த ஒளிபுகு ஊடகமும் அடர்த்தியானது; இதன் மறுதலையும் பொருத்தும்.

படம் 6.1 (i)ல் காற்று ஊடகத்திலிருந்து IO என்ற ஒரு ஒளிக் கதிர் AB என்ற சமதளம் கொண்ட ஒரு கண்ணாடி ஊடகத்தில் O என்ற இடத்தில் படவந்து, OR என்ற பாதைக்குத்திரும்பிவிடுகிறது. AB இவ்விரு ஊடகங்களுக்கும் பிரிக்கும் சமதளம் (பிரிதளம்—plane of separation). OR என்ற ஒளிக்கதிர் கோட்டமடைத்திருப்பதைக் காண்க.

IO என்பது படுகதிர் (Incident Ray); O என்பது படும் இடம் (Point of Incidence); NN' என்பது படும் இடத்தில், பொதுவாக அமைந்த சமதளம் ABக்குச் செங்கோடு (Normal to the surface at the point of incidence);

OR—திசைமாநிய (கோட்ட மடைத்த) ஒளிக்கதிர் (Refracted Ray).

$\angle ION = i$, படுகோணம் (Angle of incidence)

$\angle N'OR = r$, கோட்டக் கோணம் (Angle of refraction).

படம் 6.1 (ii)ல் கண்ணாடி ஊடகத்திலிருந்து காற்று ஊடகத்தில் படவந்து திசைமாநிய ஒளிக்கதிரைக் காண்க.

6.1-1: ஒளிக்கோட்ட விதிகள் (Laws of Refraction)

(1) ஒரு ஒளிக்கதிர் ஒர் அடர்தகுறை ஊடகத்திலிருந்து ஒர் அடர்மிகு ஊடகத்தில் படும்போது, அக்கதிர் செங்கோட்டுப்பக்கம்

சாங்கிறது. மறுபடியாக ஒரு ஒளிக்கதிர் ஒரு அடர்மிகு ஊடகத்திலிருந்து, ஒர் அடர்த்தை ஊடகத்தில் பாயும்போது, அக்கதிர், செங்கோட்டிக்கு அப்பாற்பட்ட பக்கம் சாங்கிறது.


(2) படுகதிர், கோட்டக்கதிர், படுகிடத்தில் பிரிதளத்திற்கு வரையப்பட்ட செங்கோடு ஆகிய மூன்றும் ஒரே தளத்தில் அமையும் (are coplanar).

(3) ஒரு வகை நிறமூட்டைய ஒளி, ஒரு குதிப்பிட்ட ஊடகத்திலிருந்து மற்றோர் குதிப்பிட்ட ஊடகத்தில் பாய்ந்து ஒளிக் கோட்ட மூட்டையும்போது, படுகோணத்தின் *sine*-க்கும் கோட்டக் கோணத்தின் *sine*-க்கும் உச்ச விகிதம் ஒரு மாறிலி (constant). அம்மாறிலிக்கு, அம்மிகு ஊடகத்திற்குமிடப்பட்ட கோட்ட எண் எனப் பெயர். ஒளியின் நிறமும், ஊடகங்களும் மாறுமவிருக்கும்வரை, அதற்குரிய கோட்ட எண் ஒரு மாறிலி.

$$\frac{\sin i}{\sin r} = \frac{\text{கோட்ட எண் (மாறிலி)}}{(\text{Index of Refraction})}$$

குதிப்பு

ஒளியின் நிறம் மாறினாலும், ஏதாவது ஒரு ஊடகம் மாறினாலும், அவற்றிற்குரிய கோட்ட எண் வேறொரு (மாறிலி) கோட்ட எண்ணாகும்.



படம் 6.11 (1) காண்க. IO என்ற படுகதிர் வெற்றிடத்திலிருந்து AB ஆல் பிரிக்கப்படும் ஒர் ஊடகத்தில் பாய்ந்து மறுபடியும் $O_1 I_1$ என்ற பாதையில் வெற்றிடத்தில் பாய்கிறது. மற்ற விபரங்கள் படத்தில் விளக்கமாகக் காண்கொள்க. (தளங்கள் AB ம் CD ம் இணைத்தளங்கள்.)

முதற் பாய்ச்சல்: (வெற்றிடத்திலிருந்து, ஊடகம் வழியாக)

$$IO - \text{படுகதிர்}; IO N = i \text{ (படுகோணம்)}$$

$$OO_1 - \text{கோட்டக்கதிர்}; N \hat{O} O_1 = r \text{ (கோட்டக் கோணம்)}$$

இரண்டாவது பாய்ச்சல்: (ஊடகத்திலிருந்து, வெற்றிடத்திற்கு)

$$OO_1 - \text{படுகதிர்}; O \hat{O}_1 N_1 = r \text{ (படுகோணம்)}$$

$$O_1 I_1 - \text{கோட்டக்கதிர்}; N_1 \hat{O}_1 I_1 = i \text{ (கோட்டக் கோணம்)}$$

இவ்விரண்டாவது பாய்ச்சல்கள் தலைகீழாகப் பாய்தலாக, (வலப்புறம் உள்ள கதிர் பாதையைப் பார்க்க)

$$I_1 O_1 - \text{படுகதிர்}; I_1 \hat{O}_1 N_1 = i \text{ (படுகோணம்)}$$

$$O_1 O - \text{கோட்டக்கதிர்}; N_1 \hat{O}_1 O = r \text{ (கோட்டக் கோணம்)}$$

$$\frac{\sin i}{\sin r} = \mu \text{ (வெற்றிடத்திற்கும் குறிப்பிட்ட ஊடகத்திற்கும் இடைய் மட்ட கோட்ட எண்.)}$$

இதிலிருந்து புலனாவது யாதெனில் ஒர் ஒளிக்கதிர் வெற்றிடத்திலிருந்து (வேறு ஊடகமாகிடுப்பினும் இருக்கலாம்,) வேறோர் இணைப்பக்கங்களையுடைய ஊடகத்தில் பாய்ந்து மறுபடியும் வெற்றிடத்தில் பாயுமானால் (முதல்கூறிய ஊடகத்திலே மறுபடியும் பாயுமானால்) முதற் படுகதிரும், கடைசியாகக் கிடைத்த கோட்டக் கதிரும் இணையோடுகளாகும்.

6.1.2: ஒன்றுக்கு மேற்பட்ட ஊடகங்கள்


(படம் 6.1.2ஐப் பக்கம் 166ல் காண்க)

வெற்றிடத்தைப்போட்டி μ_1, μ_2 கோட்ட எண்களுடைய ஊடகங்கள் $ABCD, CDEF$ என முறைப்பாகக் கொள்க. AB, CD, EF யாவும் இணைத்தளங்கள்.

படத்தைக் கொண்டு

$$\frac{\sin \phi}{\sin \phi_1} = \mu_1$$

$$\frac{\sin \phi}{\sin \phi_2} = \mu_2$$



படம் 6.1-2

$$\therefore \sin \phi = \mu_1 \sin \phi_1 = \mu_2 \sin \phi_2 \quad \dots (1)$$

இங்ஙனமே, வெற்றிடத்திலிருந்து, முறையே வெற்றிடத்தோடு இணைந்த $\mu_1, \mu_2, \dots, \mu_n$ கோட்ட எண்கள் உள்ள ஊடகங்கள் வழியாக, ஒரு ஒளிக்கதிர் பாய்ந்து கருமாவின் $\mu_1 \sin \phi_1 = \mu_2 \sin \phi_2 = \dots = \mu_n \sin \phi_n = \sin \phi$ எனப் பொதுப் படுத்தியெழுதலாம்.

6-2 : வான ஒளிக்கதிர்க் கோட்டம்

இம்மண்ணுலகத்தை ஒரு சரியான கோளமெனக் கொள்வோம். இதைச் சுற்றி ஏறத்தாழ 160 கி. மீ. உயரத்திற்கு ஓவியல்பாகக் குறைத்துக்கொண்டே போகும் அடர்த்தியான வளி மண்டலம் பரவியிருக்கிறது. மண்ணுலக தளத்தில் மிக அடர்த்தியாக உள்ள இங்ஙனி மண்டலம் உயரமாகச் செல்லச் செல்ல தளர்த்து, தளர்த்து போல் ஏறத்தாழ 160 கி. மீட்டர் உயரத்திற்குப்பால், வெற்றிட மெனக்கொள்ளும் அளவிற்கு செறிவற்றது போகிறது. அதற்கொப்ப உயரச் செல்லச் செல்ல, தளர்த்த அடுக்குகளாக (layers) உள்ள படுகைகளின் கோட்ட எண்களும் குறைந்து கொண்டே போகின்றன. எனவே, விண்மீனிலிருந்து புறப்படும் ஒளிக்கதிர் வெற்று வெளியில் பல கோடிக்கணக்கான கி. மீட்டர் தூரம் தேர்க் கோட்டில் வானவெளிப் பயணம் செல்லு ஏறத்தாழ 160 கி. மீட்டர் உயரத்திலுள்ள முதற்படுகையில் படுகின்றது. மீண்டும், பல மாறுபட்ட, உயர்த்துகொண்டே வரும், கோட்ட எண்கள் பெற்ற

படுகைகள் வழியாக அக்கதிர் ஊடுறுவி வந்து காட்சியாளன் நோக்கில் படுகிறது. இந்த ஊடுறுவல் மூலவதும் ஒளிக்கோட்ட விதிகளுக்குப்பட்டு தடைபெறுகின்றது. மேலிருந்து கீழ் வருவதாக, கோட்ட எண்கள் வளர்கின்றன. ஆகவே, ஒளிக்கதிர், வளி மண்டலப் படுகைகள் வழியாக ஊடுறுவி வருகின்றபோது, மேலும் மேலும் செங்கோட்டின் பக்கமே சாய்ந்து சாய்த்துப் பயணம் செய்கிறது.

எனவே, விண்மீனிலிருந்து ஒளிக்கதிர் புறப்படும் திசை பொருளாகவும், காட்சியாளனைச் சந்திக்கும் திசை மற்றொருவாகவும் அமைகிறது.

ஆகவே, காட்சியாளன் ஆர்விண்மீன்க்காணும் திசை-விண்மீனின் உண்மையான திசையகில, வேறுபட்டதோர் திசையாகும்.

இப்படி, வளிமண்டலம் வழியாக, வளிந்துவளிந்து பயணம் செய்துவந்த விண்மீன் கதிசைக் காட்சியாளன்யார்க்கும் திசைக்கும் ஆம்மீனின் உண்மையான திசைக்கும் உள்ள வேறுபாடு அரிலது திசையாற்றமே ஆர்விண்மீனின் வான ஒளிக்கதிர்க் கோட்ட மெளப் பறும். இது வளிமண்டலம்வரணயாக ஏற்படும் ஒரு தோற்றம் என்பதை மறந்துவிடக்கூடாது.


6-3 : ஒளிக்கோட்ட டாண்டுக்ட் (இருக்கை) வாய்பாடு (Tangent Formula for Refraction)

படம் 6-8 பார்க்க.

வெகு தொலைவிலுள்ள S என்ற விண்மீனிலிருந்து புறப்படும் S.A, என்ற ஒளிக்கதிர் வெற்றிடம் வழியாக பலகோடி கி.மீட்டர்கள் பயணம் செய்து, வளிமண்டலத்தின் மிக உயர்த்த (160 கி.மீ. உயரத்திற்) படுகையான A_1 என்ற படுகையில் A_1 என்ற இடத்தில் படுகிறது; பிறகு, ஒய்வொரு படுகை வழியாக, ஒளிக் கோட்ட விதிப்படி, செங்கோட்டின் பக்கம் சாய்ந்து சாய்த்து, A என்ற இடத்தில் உள்ள மண்ணுவகைக் காட்சியாளன் யார்க்கு வருகிறது. படுகைகள் $A_1, A_2, \dots, A_n$ எனக் காட்டப்பட்டிருக்கின்றன; அவை சிறு சிறுகளும் (thickness) உள்ள படுகைகள். சிறிய சிறிய படுகைகளாதலின், அவை ஒய்வொன்றும் ஒருபடித்தான ஊடகங்கள் என்று கொள்வதில் திறழவேறுபடில்லை.

அவத்திற்கும் வெற்றிடத்திற்குமுள்ள கோட்ட எண்கள் மூன்றையே $\mu_1, \mu_2, \dots, \mu_n$ எனவும் கடைசியாக உள்ள காட்சியாளனின் படுகையின் கோட்ட எண் μ எனவும் கொள்வோம். $A_1, A_2, A_3, A_4, \dots, A_n, A$ யாவும் கோட்டமடைத்த ஊடகப்பாதைகள்,

தோடுகளோடுகள்; $\phi_1, \phi_2, \dots$ கோட்டக் கோணங்கள்; $A_1, A_2, A_3, A_4, \dots$ யாவும் சிறுசிறு கோடுகளாதலால், இவை யாவற்றையும்



படம் 6-8

$A_1, A_2, A_3, \dots, A_n, A$ என்ற மெய்வரைவாக (smooth curve) இணைக்கலாம். இம்மெய் வரைக்கு A என்ற இடத்தில் ஒரு தொடுகோடு (tangent) வரைத்து நீட்டினால் (AS'); அந்தத் திசையில்நான், அதாவது $S'A$ என்ற திசையில்நான், வட்சியானதுக்கு அம்மெய்வரைவாகத் தொற்றமளிக்கலாம்.

S கோடுக்கணக்கான திரை மீட்டர் தூரத்திலிருப்பதால், A புடன் S ஐ இணைக்கும் கோடும், A_1S ம் ஏறக்குறைய இணைகோடாகவேயிருக்கும். அதாவது $AS \parallel A_1S$.

A மீளிருந்து S என்ற மின்னீசர் தொற்றத்திசை AS' என்ற திசையேதான்.

AS என்ற திசையில் உண்மையாக இருக்கவேண்டிய S எனும் மின்னீசர், AS' என்ற திசையில் இருப்பதுபோலத் தொற்றமளிக்கிறது. எனவே ஒளிக்கதிர்க் கோட்டம் $S'AS$ ஆகும். (படத்தில் மிகப் பெரிதாக உள்ளதே பொழிய, அது மிகமிகச் சிறிய அளவுடையதுதான். இது மீளினர் கோடுக்கப்படும்.)

இப்போது A இலிருந்து AZ என்ற குத்துக்கோடும், A_1 லிருந்து A_1Z_1 என்ற குத்துக்கோடும் வரைக. AZ , AS' , AS மூன்றும் ஒளிக் கோட்ட விதிப்படி, ஒரே தளத்திலிருக்கும். Z என்பது A என்ற காட்சியாளனின் கனன கோள உச்சி; எனவே S என்ற விண்மீன், அவனுக்கு AS' என்ற திசையில் இருப்பதுபோலத் தோற்றமளிப்பதால்,

$\angle ZAS' = z =$ விண்மீனின் தோற்றகனன உச்சி தூரம்,

ஒளிக்கோட்டம் $S'AS = r$ எனக் கொள்வோமாயினும்,

$\angle ZAS = z = r =$ விண்மீனின் உண்மையான கனன உச்சித்தூரம்.

AZ , A_1Z_1 இரண்டும் இணைகோடுகள்;

AS , A_1S இரண்டும் இணைகோடுகள்.

எனவே,

$$z + r = \angle SAZ = \angle SA_1Z_1.$$

இப்போது விண்மீனின் மூலக் படுகதிர்க் கோணம்

$$= \angle SA_1Z_1 = z + r$$

கடைசிக் கோட்டக் கோணம் $= z$.

கடைசியாக உகன காட்சியாளன் படுகையின் கோட்டக்கெழு μ எனக் கொண்டிருக்கிறோம்.

எனவே, மூலக்கடை 0.1-2 மூடிவின்படி,

$$\sin(z + r) = \mu_1 \sin \phi_1 = \mu_2 \sin \phi_2 = \dots = \mu \sin z$$

$$\therefore \frac{\sin(z + r)}{\sin z} = \mu.$$

$$\therefore \sin z \cos r + \cos z \sin r = \mu \sin z$$

r மிகச் சிறியதொகையால், r ஐ ஆரையன் ஆகியக் கொள்ளும் போது $\cos r = 1$, $\sin r = r$ என்பவற்றிற்குப் பொருத்த,

$$\sin z + r \cos z = \mu \sin z$$

$$r = \frac{(\mu - 1) \sin z}{\cos z}$$

$$= k \tan z \quad \dots (2)$$

இங்கு $k = [(\mu - 1)]$ என்ற மாறிலி

$k = (\mu - 1)$ என்பது கோட்ட மாறிலி ஆகலது ஒளிக் கோட்டக் கெழு (Constant of Refraction) எனப்படும்,

குறிப்பு: (1) கோட்ட எண்ணிற்கும், கோட்டமாறிலிக்கும் உகன தொடர்பையறித.

எனவே, ஒரு விண்மீனின் தோற்ற உச்சி தூரம் (apparent or observed zenith distance) z ஆனால், அதன் உண்மையான உச்சி தூரம் $z+r = z+k \tan z$ என நமக்குத் தெரிகிறது. ஆக, ஒளிக் கோட்டத்தில் விளைகாக, உண்மையான உச்சி தூரம் குறைகிறது; குறை $k \tan z$. எனவே உண்மை உச்சி தூரம் அறிய z எனக் காணும் உச்சி தூரத்தோடு (தோற்ற உச்சி தூரம்) கூட்ட வேண்டிய திருத்தம் $k \tan z$ (additive correction or error).

குறிப்பு (2) நாம் பெற்ற டான்னுன்ட் (இருக்கை) வாய்பாடு, மீள் கூறப்படும் மூன்று மேற்கோள்களின் (assumptions) அடிப்படையில் பெறப்படுகிறது என்பதை நாம் கவனிக்கவேண்டும்.

(i) காட்சியான உள் இடத்தில் மண்ணுலகக் கோளப் பரப்பு (ஏறத்தாழ) ஒரே தளத்தில் (வளைத்திராமல்) அமைந்திருக்கிறது;

(ii) ஒளிக் கோட்டத்திற்குக் காரணமாகிவிடும் வளிமண்டலம் ஏறக்குறைய 180 கி.மீ. உயரம் வரை பரந்திருக்கிறது; அதற்குமேல் அது மிகவும் சோசாக இருப்பதால், வெற்று வெளிக்குச் சமமான தெளிவே கொள்ளப்படுகிறது;

(iii) அக் வளிமண்டலம் காட்சியான உள் தளத்திற்கு இரண்டான பல படிவங்களாகப் பிரிக்கப்படலாம்; அப்படிப் பிரிக்கப்பட்ட ஒவ்வொரு படிவமும் ஒரு படித்தான தன்மை பெற்றன.

இவ்வடிப்படையில் டான்னுன்ட் வாய்பாடு பெறப்படுகிறது.

6.3.1: ஒளிக் கோட்டத்தால், விண்மீனின் ஆயத் தொலைகளில் ஏற்படும் விளைவுகள் (Effects of Refraction on the Coordinates of a star.)

z ஒரு விண்மீனின் தோற்ற உச்சி தூரம் ஆனால் $z+r = z+k \tan z$, அக் விண்மீனின் உண்மையான உச்சி தூரமாகும் எனக் கண்டோம். இதன் விளைவை, வானகோளத்தில் பொருத்திப் பார்க்கும்போது, (படம் 6-8.1 காண்க)

S - விண்மீனின் சரியான இடம்;

S' - அக் விண்மீனின் தோற்ற இடம்;

$ZS = z$ - தோற்ற உச்சி தூரம்.

$S'S = k \tan z$.


$\therefore ZS =$ விண்மீனின் சரியான உச்சி தூரம்.

$= ZS' + S'S$.

$= z + k \tan z$ எனக் கிடைக்கிறது

...(8)

இதன் விளைவாக வினாயன் வானகோளத்தில், தன்னுடைய சரியான நிலையிலிருந்து 6 மணி உயரத்திற்கு அதே குத்துகி.



449-9-2-1

கோட்டில் 2ஐ கோக்கி உயர்த்தப்படுகிறது. அதே குத்துக் கோட்டில் உயர்த்தப்படுவதால், அதன் அடிவான தூரம் மாறுவதில்லை.

உத்தரவு எண்: 100/2019

ஏற்றக்கோணம் $\theta = 90^\circ - \alpha$, எனில் வரையறுக்கோணம்

S.M. = a former employee of the company.

S'M₁ = சேர்ப்பு எந்தச் சேரணி.

$$S^*M_1 \geq SM_1$$

எனவே, தோற்ற ஏற்றிக்கோணம், δ 19.9 ஆகிறது.

$k \tan (90^\circ - \alpha) = k \cot \alpha$ ஆனதில், சரியான ஏற்றக் கோணத்தைக் கிடைக்கப்பெற்றது.

ஆகவே (i) ஒளிக்கோட்டி வினாவாகத் தோற்ற உச்சி நூல் $x = k \tan z$; (ii) தோற்ற ஏற்றக்கோணம் a ஆனால் சிவான ஏற்றக்கோணம் $a - k \cot a$; (iii) அடி நூல்க்கிற் மாற்றாதிக்க.

6-3-2: இப்போது (α, δ)ல் என்ன மாற்றங்களெனக் காண்போம்.

$PSM, PS'M'$ முறையே S வழிவாகவும் S' வழிவாகவும் வரையப்பட்ட நடுவரை விலக்க வட்டங்கள்.

எனவே சரிவான நடுவரை விலக்கம் SM

தோற்ற நடுவரை விலக்கம் $S'M'$

$S'L$ என்ற சிறுவட்டம் நடுவரை QR க்கு இரண்டாக வரையப்படுமானால், $SM = S'M' - LS$; ஆதலால் நடுவரை விலக்கத்திருத்தம் $= LS$ (தோற்ற நடுவிலக்கத்திருத்து குறைக்கவேண்டிய திருத்தம்.)

சரிவான நேரக்கோணம் $k = \angle ZPS$

தோற்ற நேரக் கோணம் $k_1 = \angle ZPS'$

இங்கு $\angle ZPS = \angle ZPS' + \angle S'PS$.

$\therefore$ நேரக்கோணத்திருத்தம் $= \angle S'PS$.

$= M'M$ (தோற்றநேரக்

கோணத்துடன் கூட்டவேண்டிய திருத்தம்)

இப்போது LS ஐயும் (நடுவரை விலக்கத்திருத்தம்) $M'M$ ஐயும் (நேரக் கோண திருத்தம்) இரண்டையும் கணிப்போம்.

இதற்கு, இதுபெரு வட்டங்களாலும் ஒரு சிறு வட்டத்தாலும் பெறப்படும் $S'LS$ என்ற முக்கோணத்தை ஒரு சிறுதள முக்கோணம் (small plane triangle) எனக் கொள்ளலாம். திருத்தங்கள் யாவும் மிகமிகச் சிறியதாக இருக்குமாதலின். இக் கொள்கையினால், மிகுமையுமில்லாதது.

$\triangle S'LS$ என்ற ஒரு-தள முக்கோணத்தில்,

$$LS = SS' \cos S'ZL$$

$$= SS' \cos ZSL$$

$$= SS' \cos ZSP$$

$$= k \tan z \eta \dots \dots$$

.. (4)

η = வினாயின் இடைக்கோணம் (Parallactic angle)

எனவே நடுவரை விலக்கத் திருத்தம் $= k \tan z \cos \eta$

இதைத் தோற்ற நடுவரை விலக்கத்திருத்து குறைக்க, சரிவான நடுவரை விலக்கம் பெறப்படும்.

மேலும், $S'L = SS' S \sin ZSP$

$$= k \tan z \sin \eta$$

ஆனால் $M'M = S'L \sec S'M'$

$$= k \tan z \sin \eta \sec \delta \dots \dots$$

(5)

(1-4-1 காண்க)

எனவே நேரக்கோணத் திருத்தம் $= k \tan z \sin \eta \sec \delta$.

இதைத் தோற்ற நேரக்கோணத்தொடுசெய்க்க, சரியான நேரக் கோணம் k கிடைக்கும்.

ஆனால் $k = \alpha \pm h$ ஆகையால்,

விண்மீன் நேரம் t கொண்டு, சரியான α -அதாவது வரை ஏற்றம் கவனிக்கலாம்,

$$\begin{aligned} \text{சரியான வரை ஏற்றம்} &= \gamma M \\ &= \gamma M' + M'M \\ &= \text{தோற்ற வரை ஏற்றம்} + k \tan z \sin \eta \sec \delta. \end{aligned}$$

எனப் பெறப்படும்,

$$\text{வரை ஏற்றத் திருத்தம்} = k \tan z \sin \eta \sec \delta.$$

ஒளிக் கோட்டத்தின் விளைவாக ஏற்படும் ஆயத்தொலை மாற்றங்களைப் பின்வரும் ஆட்டவரிசையில் காண்க.

தோற்ற ஆயத்தொலை	சரியான ஆயத்தொலை பெற திருத்தம் $\pm$
1. தொடுவான தூரம் A	மாற்றமில்லை
2. உச்சி தூரம் z	$+ k \tan z$
3. ஏற்றக் கோணம் σ	$- \sigma \cot \sigma$
4. நடுவரை விசுக்கம் δ	$- k \tan z \cos \eta$
5. நேரக் கோணம் h	$+ k \tan z \sin \eta \sec \delta$
6. வரை ஏற்றம் α	$+ k \tan z \sin \eta \sec \delta$

இவற்றுள் (1), (3), (5) மட்டும் கவனத்திற்குப்பின் போவதுமானது.

மேலும், ஒரு விண்மீன், உச்சி வட்டத்தைக் கடக்கும் நேரம் மாறுதல் இடம் பெயர்ந்து, z பக்கமாக மட்டும் உயர்க்கதிருக்கும்.


மட்டம் 0-0.1 பாகை;

S_1 — உச்சி வட்டம் தாண்டுகூடம் (சரியானது)

S_1' — உச்சி வட்டம் தாண்டுகூடம். (தோற்றம்)

குறிப்பு: ஒளிக்கோட்டம் வளிமண்டலத்தின் பல படுகைகளின் அடர்த்தியின் விளைவாதலின், அது வளிமண்டலத்தின் அழுத்தத்தையும் தட்ப வெப்ப நிலைமையையும் பொறுத்திருக்கும்.

6-4 : கோட்ட மாதிரியின் மதிப்பதையும் குறை :



படம் 6-4

மற்றவாத விண்மீன் ஒன்று சரிவாக உச்சி கடக்கும் இடங்கள் A, B எனப் படத்தில் காட்டப்பட்டிருக்கிறது; அவை தோற்றவாகக் காட்சியளிக்கும் உச்சி கடக்கும் இடங்கள் A', B' எனக் கொள்க.

அது உச்சி கடக்கும் தோற்றத்தில் $ZA' = z_1$ எனவும், $ZB' = z_2$ எனவும், உரிவ வானியல் அகலங்கள் கொண்டு கணித்திருப்பதாகக் கொள்க.

அப்போது சரிவான உச்சி தூரங்கள்,

$$ZA = z_1 + k \tan z_1$$

$$ZB = z_2 + k \tan z_2$$

அப்போது, P , வட துருவமெனின்,

$$ZA + ZB = (ZP - PA) + (ZP + PB)$$

$$= 2 ZP$$

$$= 2 (90^\circ - \sigma)$$

$$\therefore z_1 + z_2 + k (\tan z_1 + \tan z_2) = 2 (90^\circ - \phi) \dots\dots (6)$$

இங்கு, காட்சியானவின் அகலங்கு ϕ தாமக்குத் தெரியுமாயின், k இன் மதிப்பையறியலாம்.

குறிப்பு (i): தாமக்குத் தெரியாவிடும், மற்றோர், மற்றவா விண்மீனுக்கும், இவ்வாதே உச்சி கடக்கும்போதுள்ள உச்சி தூரத்தைக் கருவிகள் கொண்டு பெறலாம்.

அதன் தோற்ற உச்சி தூரங்கள் x_1, x_2 ஆகும்.

$$x_1 + x_2 + k (\tan x_1 + \tan x_2) = 2 (90^\circ - \phi) \dots\dots (6a)$$

(6) உம், (6a) உம் ஒரேயகலம் சமன்பாடுகளாகக் கொண்டு, k இன் மதிப்பையும் அறியலாம்.

குறிப்பு (ii): பல மறைபாடு விண்ணின் உச்சி உட்குழங்கால் உட்குழங்கு தோற்ற உச்சி தூரங்களைவளத்து பெறப்படும் k மதிப்புகளை அறித்து, அம்மதிப்புகளின் கட்டுச் சராசரி அறிவணம்.

சாதாரண தட்ப வெப்ப அழுத்த நிலையில், (Normal temperature and pressure) k ன் மதிப்பு $58^\circ 2$ (விக்கிஸ் அளவு) என அறிவப்படுகிறது. அதாவது ஒரு விண்ணின் உச்சி தூரம் 45° ஆக இருக்கும்போது, அதன் ஒளிக்கோட்டம் $55^\circ 2$ எனக் கொள்ளப்படும். ($k \tan 45^\circ = k$) அந்த சமவத்தில் அவிண்ணின் உச்சி பக்கமாக அதன் ஏற்ற வட்டத்தில் $55^\circ 2$ உயர்த்திப்படுவது போலத் தோற்றமளிக்கும்.

வளி மண்டல அழுத்தம் 76 cm உம், வெப்ப நிலை 10° சென்டிகிரேடும் இருக்கும் நிலைக்கு $k = 59.2$ எனக் கொள்ளலாம்.

வளி மண்டல அழுத்தம் b cm உம், வெப்ப நிலை / சென்டிகிரேடும் இருக்கும் நிலைக்கு, ஒளிக்கோட்டம் r_1 பெறப்படும், வாய்பாடு,

$$r_1 = \frac{76.5 \times b}{(428 + t)} = \frac{76.5}{(428 + t)} \times k \tan z$$


இது வானத்திற்குரிய வாய்பாடாகக் கொள்ளவேண்டிய தெனாவியாகும்.

$r = k \tan z$ என்ற வாய்பாடு $z = 75^\circ$ வரையில் பொருத்தும், விண்ணின் தொடுவானத்திற்கு அருகிலிருக்கும்மாயின் z இன் மதிப்பு 90° க்கு அண்மையிலிருக்கும்; அப்போது $\tan z$ இன் மதிப்பு மிகப் பெரியதாகிவிடுகின்றதால், $z > 75^\circ$ க்கு இவ்வாய்பாடு ஏற்படாததன்று; காரணம் வாதெனின் தாம் மண்ணுலகத்தின் வளைதன்மையை (curvature) ஒதுக்கிவிட்டே, மதிப்பு கண்டோம். மேலும் முக்கிய காரணம் என்னவென்றால், $z \rightarrow 90^\circ$ ஆனால் $132 z \rightarrow \infty$.

6-4-1: $z > 75^\circ$ என்ற நிலையில், அதாவது விண்ணின் தொடுவானத்திற்கு அருகாமையில் இருக்கும்மாயின், ஒரு தெரித்த விண்ணினைப்பற்றிய கட்டிப் பதிவுகள் செய்தே ஒளிக்கோட்டம் அளவப்போது கணித்துக் கொள்ளவேண்டும்.

கணிக்கும் முறை: (α, δ) ஆயத் தொலைகள் (தெரித்தவை) உட்குழங்கு ஒரு விண்ணின் தொடுவானத்தின் அருகில் உட்குழங்கு, அதன் தோற்ற உச்சி தூரத்தையும் (z), அந்த சமயம் t என்ற மீன் வழி தோறும் பதிவு செய்துகொள்க. தோற்ற உச்சி தூரம் தான், திசை உயரமானி என்ற கருவி பயன்படும். (வானஞ்ச்சிக் கருவிகள்

என்ற பகுதியில் காண்க.); t காண மின்வழிக் கருவாரம் பயன்படும்.



படம் 6-4-1

Z : உத்தர மூக்கோணத்தில்,

$P = 90 - \phi$ (தெரியும்)

$PS = 90 - \delta$ (தெரியும்)

$ZPS = h$ = நேரக் கோணம்.

$t = \pm h$ என்ற வாய்பாடு கொண்டு சரிவான h அதிக.

எனவே,

$$\cos ZS = \cos ZP \cos PS + \sin ZP \sin PS \cos h$$

என்ற வாய்பாடு கொண்டு, சரிவான ZS கணக்கிடுக. நேரத் தக்சரி

தூரம் z தாம் முதலில் திசை உபரமாளி கொண்டு கண்டிருக்கிறோம். எனவே, கணிக்கப்பட்ட சரிவான ZS — நேரத் $z =$ ஒளிக்கோட்டம் எனக் கணக்கிடுக. இந்த மூலையில், 90° முதல் 50° வரையில் ஒவ்வொரு $5'$ (நிலைகள்) வேறுபாட்டிற்கும், 50° முதல் 38° வரை இன்னும் அதிகமான வேறுபாட்டிற்கும், 38° முதல் 0° வரை ஒவ்வொரு 1° (பாகை) வேறுபாட்டிற்கும் ஒளிக்கோட்ட மாநிலிகள் மட்டியானாகக் கொடுக்கப்பட்டிருக்கின்றன. அவை 15°C வெப்ப நிலைக்கும், வளிமண்டல அழுத்தம் 76 செ.கீ.மும் பொருத்தமானவை; மற்ற வெப்ப நிலைகளுக்கும், அழுத்த நிலைகளுக்கும் பயன்படுமாறு, மற்றும் உதவிப் பட்டியல்கள் உள்ளன. எடுத்துக்காட்டாக,

$z = 90^\circ, K = 33'$ (நேரக் கோணம் பூச்சிவம்)

$z = 89^\circ 30', K = 26'28''$ (நேரக் கோணம் $0^\circ 30'$)

$z = 89^\circ 25', K = 27'41''$ (நேரக் கோணம் $0^\circ 35'$)

என்ற மூலையில் ஒளிக்கோட்டங்கள் வேகமாகக் குறைந்துவரும்.

$z = 75^\circ$ இலிருந்து, $K = 55'.2$ என்ற மாநிலி மதிப்பையே கொள்ளலாம்.

$z = 0$ ஆகும்போது, ஒளிக்கோட்டம் K லா z பூச்சிவமாகும்.

6-5: ஒளிக் கோட்ட விண்வகை, விண்மீன் உதிக்கும், மறையும் நேரங்களில் ஏற்படும் மாறுபாடு :

ஒளிக்கோட்டம் காரணமாக விண்மீன் நேரத்தமாக உதிக்கும் நேரம் மூன்றேனும்; நேரத்தமாக மறையும் நேரம் மின்னடைபும். ஏனெனில், தொடுவான நிலையில் 1° (விண்) ஒளிக்கோட்டமானால்,

விண்மீன் தொடுவானின் கீழே r' (விக்கி) இருக்கும்போதே, அது தொடுவானில் உதிப்பதுபோல் தோற்றமெற்படும். (ஒளிக் கோட்டத்தின் விளைவு, விண்மீனை z பக்கம் உயர்த்துவது.) அங்ஙனமே, விண்மீன் r' (விக்கி) தொடுவானின் கீழிருக்கும் வரை, தொடுவானின் மேல் இருப்பதுபோல் தோற்றமளித்து, r' (விக்கி) இறங்கியபிறகு தான் மறைவதுபோல் தோன்றும். இதன் விளைவாக விண்மீன் தோன்றும் தோற்ம் $\frac{r}{15\sqrt{\cos^2\phi - \sin^2\delta}}$ வினாடி.

அக் முன்னேறி, மறையும் தோற்ம் $\frac{r}{15\sqrt{\cos^2\phi - \sin^2\delta}}$ வினாடிகள் பின்னடைபும். எனவே, தோற்றப்படி, விண்மீன் தொடுவானுக்கு மேலே இருக்கும் தோற்ம்,

$$\frac{2r}{15\sqrt{\cos^2\phi - \sin^2\delta}} \text{ வினாடிகள் அதிகமாகும்.} \quad \dots(7)$$

$r = 33'$ எனக் கொண்டால்,


தோற்ற உதயம் $\frac{33 \times 60}{15\sqrt{\cos^2\phi - \sin^2\delta}}$ வினாடிகள் முன்னேறி, தோற்ற மறைவு, அதே அளவு பின்னடைபும்.

மொத்தம் $\frac{2 \times 33 \times 60}{15\sqrt{\cos^2\phi - \sin^2\delta}}$ வினாடிகள் அதிகமாக தொடுவானுக்கு

மேலே இருப்பதாகத் தோற்றமளிக்கும்.

6.5 1: மத்தும் சில ஒளிக்கோட்ட விளைவுகள்:

(i) ஒரு குத்துவட்ட விக் PQ உம்,



படம் 6-5-1 (i)

(ii) தொடுவானத்திற்கு இணையான சிறுவட்டம், வில் PQ உடம், எந்த அளவில் ஒளிக்கோட்டத்தின் விளிவாக மாறுகின்றன என்று பார்ப்போம்.

பட்டம் 8-5-1 (i) காண்க:

(i) குத்துவட்டம் வில் PQ = D

S_1N - தொடுவானம்;

Z - வான உச்சி;

ZM - ஒரு குத்துவட்டம்,

ZM இல், PQ = D, ஒரு சிறுவில், (கோண அளவு),

ஒளிக்கோட்ட விளிவாக P என்பது P' இலும், Q என்பது Q' இலும் உயர்ந்து நோற்றமளிக்கும்.

$ZQ' = z$ (Q இன் நோற்ற உச்சி தூரம்) எனவும்,

$P'Q' = D'$ (PQ இன் நோற்ற மாறுதல்) எனவும், கொள்க,

அப்போது $ZP' = z - D'$ (P இன் நோற்ற உச்சி தூரம்)

$D - D' = PQ - P'Q'$

$$= (Q'Q - Q'P) - (P'P - Q'P)$$

$$= Q'Q - P'P$$

$$= K \tan z - K \tan (z - D')$$

$$= K \frac{\sin D'}{\cos z \cos (Z - D')}$$

$$= K \frac{\sin D'}{\cos^2 z} \text{ (ஏறக்குறைய)}$$

$$= K D' \sec^2 z \begin{cases} D \text{ சிறியதாகையால்,} \\ \text{ஆகையால் அளவில்} \\ \sin D' = D' \text{ (நோர்வாயாக)} \end{cases}$$

∴ P'Q' என, ஒளிக்கோட்ட விளிவாக மாறிய வில் அளவு D' ஆகையால்,

$$D - D' = K D' \sec^2 z$$

$$\therefore D = D' (1 + K \sec^2 z)$$

$$\therefore D' = \frac{D}{1 + K \sec^2 z}$$

$$= D (1 + K \sec^2 z)^{-1}$$

$$= D (1 - K \sec^2 z) \text{ நோர்வாயாக.}$$

ஆகவே PQ என்ற குத்துக் கோட்டுச் சிறிய வில் $1 : (1 - K \sec^2 z)$ என்ற விகிதத்தில் குன்றித் நோற்றமளிக்கிறது.

(ii) PQ-தொடுவானத்திற்கு இணையான சிறு வட்டத்தில் D அளவுள்ள ஒரு விம்.

ஒளிக்கோட்ட விளைவாக, P என்பது P'க்கும், Q என்பது Q'க்கும் வான உச்சிப் பக்கம் உயர்ந்து நோன்றும், படம் 6-5-1 (ii) பார்க்க.

$ZP' = ZQ' = z$ எனவும்

$P'Q'$ இன் அளவு D' எனவும்,

$PZQ = A$ எனவும் கொள்க.

ஒளிக்கோட்ட விதிப்படி,

$$PP' = K \tan ZP' = K \tan z$$

$$QQ' = K \tan ZQ' = K \tan z.$$

$$\Delta ZP = ZQ = z + K \tan z.$$

$$\therefore PQ = A \sin (z + K \tan z) \quad (1.4-1 \text{ ஸ்கை})$$

$$P'Q' = A \sin z.$$

$$\Delta PQ : P'Q' = \sin (z + K \tan z) : \sin z.$$

$K \tan z$ சிறியதானால்,

படம் 6.51 (ii)

$$\begin{aligned} \sin (z + K \tan z) &= \sin z \cos (K \tan z) + \cos z \sin (K \tan z) \\ &= \sin z + \cos z \cdot K \tan z \\ &= \sin z + K \sin z \end{aligned}$$

$$\Delta PQ : P'Q' = \sin z (1 + K) : \sin z \quad \text{---(9)}$$

$$\Delta D : D' = (1 + K) : 1$$

$$\Delta D = D' (1 + K)$$

$$\Delta D' = \frac{D}{1 + K}$$

$$= D (1 + K)^{-1}$$

$$= D (1 - K) \text{ நோன்றும்.}$$

ஆகவே PQ என்பது $1 : (1 - K)$ என்ற விகிதத்தில் குன்றித் தொற்றமளிக்கிறது.



முன் கண்டபடி,

$$O'Q' = s \cos \theta (1 - k \sec^2 \alpha)$$

$$P'Q' = s \sin \theta (1 - k).$$

$$z = ZQ' = ZP'.$$

O' வழியாக $O'X$ என்ற சிறு நேர்க்கோடு (O தொடு வானம்) வரைக; $O'Z$ இல் $O'Y$ என்ற ஒரு சிறு நேர்க்கோடு செலிக்க;

$O'X$, $O'Y$ ஆகிய அச்சங்களாகக் கொண்டால்,

P' இன் ஆயத்தொலைவான

$$x = P'Q' = s \sin 2 (1 - k)$$

$$y = O'Q' = s \cos \theta (1 - k \sec^2 \alpha)$$

$$\text{எனவே, } \frac{x^2}{s^2 (1 - k)^2} + \frac{y^2}{s^2 (1 - k \sec^2 \alpha)^2}$$

$$= \sin^2 \theta + \cos^2 \theta = 1.$$

ΔP இன் தொற்றமாயிய P' ஒரு நீள் வட்டத்தின் மேலுள்ளது எனவும், அதன் மையம்,

O இன் தொற்றமாயிய O' இல் இருக்கிறது எனவும், நீள் வட்டத்தின் அரை அச்சங்கள் முறையே $s(1 - k)$; $s(1 - k \sec^2 \alpha)$ எனவும் புலப்படுகிறது;

எனவே, கதிரவன் உதிக்கும்போதுள்ள தொற்றம் ஒரு நீள் வட்டம்; அப்போதே முழுச்சத்திரவின் தொற்றமும்.

6° 5' 12": கதிரவன், சந்திரன் உதிக்கும்போது நீள் வட்டத் தொற்றம்.

நேர்க்குறிய முறைக்கிர, சின் உறப்படும் முறைகளும் நீள் வட்டத் தொற்றத்தை விளக்கலாம்.

கதிரவன் (சந்திரன்) வட்டம், ஊடு நோக்கி உயர்த்தப்படுகிறது என நாம் அறிவோம். வானுச்சி உயரம் குறைவக்குறைவ ஒளிக் கோட்டமும் குறைகின்றது. மறுதலையாக, வானுச்சி உயரம் மிக மிக, ஒளிக்கோட்டமும் அதிகமாகிறது. எனவே, கதிரவன் உதிக்கும்போது அதன் அடி வரம்பு மேல் வரம்பைவிட அதிகமாக உயர்வதாக, கதிரவனின் நெடுவிட்டம் (vertical diameter) சுருக்கியிருப்பதுபோல தொன்றுகிறது. இடை விட்டம் (horizontal diameter) குறிப்பிடத்தக்க அந்த அளவுக்குச் சுருக்குவதில்லை. எனவே கதிரவன் வட்டம் ஒரு நீள் வட்டவடிவின் தொன்றுகிறது.

இன்றும், முறைப்படி பாரப்போமானால் சரியாகத்தொடுவானத்தில் ($\alpha = 50^\circ$) ஒளிக்கோட்டம் $25'$; தொடுவானத்திலிருந்து 50° ; உயரம்போது, ஒளிக்கோட்டம் $28' 28''$; $55'$ உயரத்தில் ஒளிக் கோட்டம் $27' 41''$.

எனவே கதிரவனின் (ஆல்ஹு சத்திரனின்) கோண விட்டம் 82' எனக்கொண்டால் தொடுவானில் ஒளிக்கோட்ட விரிவாகக் கதிரவனின் கிழவரம்பு மேல் வரம்பைவிட 5' ஆகவளாக உயர்த்தப்பட்டுத் தோற்றமளிக்கிறது. ஆக நெடுவிட்டம் ஏறக்குறைய 6' கருவி, கிடைவிட்டம் ஏறக்குறைய 82' ஆக நமக்குத் தோன்றுகிறது. அப்போது தோராயமாக நெடுவிட்டம் : 87 : 82 என்ற விகிதத்தில் இருக்கிறது. எனவே நீள வட்டத்தோற்றம்.

ஆனாலும் கிடைவிட்டமும் ஒளிக்கோட்ட விரிவாகக் கருவித்தான் சொல்கிறது ; ஆனால் அக்கருவிகம் எத்த உச்சி உயரத்திற்கும் ஏறத்தாழ 0' 5 தான்.

குறிப்பு: தொடுவானத்தின் மிக அண்மையில் (குறைவான ஏற்றக்கோணம்) இருக்கும்போது, கதிரவனும், சத்திரனும் பெரிதாகக் காட்சியளிப்பது போலவும், வானத்தில் ஏற ஏறச் சிறியதாக விடுவது போலவும், நாம் பார்க்கிறோம். இது தோற்றமே மெய்யிய உண்மை வகை. மேலும் இதற்கும், ஒளிக்கோட்டத்திற்கும் ஒரு விதத் தொடர்பும் இல்லை. முறைப்படி கருவிகள் கொண்டு (டாலன் டுன் ஹெய்லிட்டர்) கதிரவனின், சத்திரனின் கோணவிட்டங்களை அளந்தால் அப்பிட்ட அளவுகள் ஒரு மாறுதலையும் காட்டுவதில்லை. ஆனால் நாம் கதிரவனையும் சத்திரனையும் பார்க்கும் போது, அருகாமையிலுள்ள மரங்கள் முதலியனவோடு, ஒப்பிட்டு, பெரிது எனக்கூறுகிறோம். அதை வானவெளியில் உயர்த்துவிட்ட பொழுது, எத்தப் பொருள்களோடும் அவற்றை ஒப்பிட்டுப் பார்க்க முடியாத நிலையில், நாமே. அவை, சிறிதாகத் தோற்ற மளிப்பது போல நினைத்துக்கொள்கிறோம். இம்மாற்றங்கள் யாவும் தோற்ற மெய்யொழிய வேறகலை.


6-6: காசினி வாய்பாடு (ஒளிக்கோட்டம்)

மற்றோர் அடிப்படையில் காசினி (Cassini) என்றும் வானியல் ஆறிஞர், விண்மீன் ஒளிக்கோட்ட வாய்பாடு ஒன்றின் திறனியுள்ளார். அவர் அடிப்படையாகக் கொண்டவை :

(1) பூமிக்கு மேலே செல்லச்செல்ல, செறிவு குறைத்து போகும் இயற்கைவளி மண்டலத்திற்குப் பதிலாக ஒரேபடித்தான (homogeneous) ஒரு வளிமண்டலம் ஒன்று கற்பித்து, மண்ணுலக தனித்திலுள்ள அடர்த்தியும் கோட்ட எண்ணும் அக்கற்பனை மண்டலம் முழுவதற்கும் பொருத்தும் வகையில் கொள்ளுதல்.

(2) இக்கற்பனை வளிமண்டலத்தால் ஏற்படக்கூடிய அழுத்தத்தை இயற்கை வளிமண்டல மொத்த அழுத்தத்திற்குச் சமமாகும் வகையில், கற்பனை வளிமண்டலத்தின் உயரத்தைச் சரிக்கடிக்க கொள்ளுதல்.

இவ்விரு கோள்களின் அடிப்படையில் அமையும் கற்பனை வளிமண்டலம், மண்ணுலகத் தளத்திற்குமேல் h (h -தெரிவாறு) கிலோ மீட்டர்கள் ஒரேபடித்தான தன்மையுடையதாய்ப் பரவி யிருக்கும் எனக் கொள்ளலாம். இதன் வழியாக ஒளிக்கதிர் பாய்ந்து வருவதால் ஏற்படும் கோட்டத்தை அவர் ஊடகமாக அமைத்தனர். இதன் சிறப்புப்பன்மை யாதெனின், இது உச்சி உயரம் 50° வரையில் பொருத்துமென அவர் நினைவுகூர்னர்.




படம் 6-6-1

6-6-1: O ஐ மையம் கொண்ட மண்ணுலகத்தின்மேல் A என்ற பது காட்சியானது இருக்குமிடம், மண்ணுலக அரைவட்டம் a கி. மீட்டர்கள். அதற்குமேல் h கி.மீட்டர் உயரத்திற்று, காசினி வகுத்த அடிப்படையிலமைந்த ஒரேபடித்தான ஒரு கற்பனை வளிமண்டலம், மண்ணுலக கோளத்தைச் சூழ்ந்திருக்கிறது. படம் 6-6-1 காண்க.

OA இன் நீட்டல், A இல் வான உச்சி Z . S என்ற விண் மீனிலிருந்துவரும் ஒளிக்கதிர், கற்பனை வளிமண்டலத்தை, நீதித் தித்து (ஒருபடித்தான ஊடகமாகநினை) ஒரே கோட்டமடைந்து BA என்ற திசையில் A க்குப் புலனாகிறது.

இப்போது B இல் உள்ள ஒளிக்கதிர் தளியாகப் படம் 6-6-1(i) இல் பிரித்துக் காட்டியிருப்பதைக் காண்க.



படம் 6-6-1 (i)

படம் 6-6-1ல் B என்ற படுமிடத்தில், மண்ணுலக கோளத்திற்குத் தொடுதளம் வரைந்தால் அதற்குச் செங்கோடு CB என்ற ஆரம்; நீட்டல் OBD .

எனவே, பிரிதளத்தில் ஒளிக்கதிர் படுமிடத்தில்கண் அமையும் செங்கோடு OBD என்பது புலனாகிறது.

எனவே $\angle SBD$ - படுகோணம்

$\angle ABO$ - கோட்டக் கோணம் = θ எனக்கொள்க.

$\angle RBA$ - கோட்டம் = r எனக்கொள்க.

ஆனால், $\angle RBA = \angle CBS = r$ [6-6-1 இலும் 6-6-1 (i) இலும்].

எனவே, $\angle SBD = \angle DBC + \angle CBS$.

= $\angle ABO + \angle RBA$ (நேரெதிர்க் கோணங்கள் சமம்)

= $\theta + r$.

∴ ஒளிகோட்ட விதர்ப்படி,

$$\frac{\sin(\theta + r)}{\sin \theta} = \mu \text{ (கோட்ட எண்-மாறிலி).}$$

r , மிகச் சிறியதாக விருக்குவதின்,

$\sin r = r$ எனவும், $\cos r = 1$ எனவும் கொள்ளவும்.

எனவே $\sin \theta \cos r + \cos \theta \sin r = \mu \sin \theta$.

$\therefore \sin \theta + r \cos \theta = \mu \sin \theta$ (தொடராமரைக)

$$r = \frac{(\mu - 1) \sin \theta}{\cos \theta} \\ = k \tan \theta \quad \dots(10)$$

ஆனால் இங்கு r தங்குத் தெரியாது.

(எனவே $k \tan r = k \tan \theta$ எனத் தவறுதக் கொள்ளக்கூடாது).

இப்போது $\tan \theta$ -ஐக் கணிப்போம். கனிகளுக்குள் h என்பது n புடன் ஒயிடும்போது மிகச் சிறியதானின் $\frac{h}{a} < 1$; மேலும் $\frac{h}{a}$

மிகச் சிறியதாயிருக்கும் ; $\left(\frac{h}{a}\right)^2, \left(\frac{h}{a}\right)^3, \dots$ முதலியவை, அதக் கனிக்கத்தக்க ஆளவிற்குச் சிறியதாய்விடும் என்பவற்றை கவனத்திற் வைக்கவேண்டும்.

இப்போது மட்டம் 6-6-1ல்,

S என்றவின்பின் தொடர் மூச்சுதூரம்

$\angle BAZ = z$ எனக் கொள்வோம்.

$\triangle OAB$ -ல், $OA = a$; $OB = a + h$; $\angle OAB = 180 - z$

$$\therefore \frac{a + h}{\sin(180 - z)} = \frac{a}{\sin \theta}$$

$$\frac{(a + h)}{a} = \frac{\sin z}{\sin \theta}.$$

$$\sin \theta = \frac{a}{a + h} \sin z.$$

$$= \frac{a}{\left(1 + \frac{h}{a}\right)} \sin z$$

$$= \left(1 + \frac{h}{a}\right) \sin z$$

$$= \left(1 + \frac{h}{a}\right)^{-1} \sin z$$

$$= \left(1 - \frac{h}{a}\right) \sin z \text{ (தொடராமரைக)}$$

$$\cos \theta = \sqrt{1 - \left(1 - \frac{h}{a}\right)^2 \sin^2 x} \quad (\text{தேர்மானம்})$$

$$= \sqrt{1 - \left[1 - \frac{2h}{a} + \frac{h^2}{a^2}\right] \sin^2 x} \quad "$$

$$= \sqrt{1 - \sin^2 x + \frac{2h}{a} \sin^2 x} \quad "$$

$$= \sqrt{\cos^2 x + \frac{2h}{a} \sin^2 x}$$

$$= \cos x \left(1 + \frac{2h}{a} \tan^2 x\right)^{\frac{1}{2}} \text{தேர்மானம்}$$

$$\therefore \tan \theta = \frac{\left(1 - \frac{h}{a}\right) \sin x}{\cos x \left(1 + \frac{2h}{a} \tan^2 x\right)^{\frac{1}{2}}}$$

$$= \tan x \left(1 - \frac{h}{a}\right) \left(1 - \frac{h}{a} \tan^2 x\right)$$

தேர்மானம்...(11)

$$= A_1 \tan x + B_1 \tan^3 x \quad \text{என்ற அமைப்பில் வரும்.}$$

மூன்றண்ட கோட்டம் $r = k \tan \theta$.

$$= k(A_1 \tan x + B_1 \tan^3 x)$$

$$= A \tan x + B \tan^3 x. \quad \dots(12)$$

என்ற அமைப்பில் பெறப்படும்; A, B மாநிலிகள்; இதுவே கச்சினி யின் ஒளிக்கோட்ட வாய்பாடு.

குறிப்பு: (11) இதின்கூற்று

$$\tan \theta = \tan x \left[1 - \frac{h}{a} \left\{1 + \tan^2 x + \dots \dots\right\}\right]$$

எனப்பெற்று,

$$\tan \theta = \tan x [1 - n \sec^2 x] \quad \text{எனவும் எழுதலாம்.}$$

அப்போது $r = (\mu - 1) \tan \theta$

$$= (\mu - 1) \tan x (1 - n \sec^2 x) \quad \dots(13)$$

எனவும் எழுதலாம். இங்கு μ, n மாநிலிகள்.

6-6-2 : காரினி வாய்பாட்டினுள்ள A, B காணல் :

ஒன்று மறைபடாத விண்மீன்கள், மழுச்சி, கீழ்ச்சி கடக்கும் போது அவற்றின் தோற்ற உச்சி தூரங்களைக் காண்க.

முதல் விண்மீன் $S_1 : x_1, x_2$ (மேலுச்சி, கீழ்ச்சி தூரங்கள்.)

இரண்டாவது விண்மீன் $S_2 : y_1, y_2$ (" ")

மூன்றாவது விண்மீன் $S_3 : z_1, z_2$ (" ")

இவைவரையும் தோற்ற தூரங்கள்.

காரினி வாய்பாடு கொண்டு, உரிய திருத்தங்களைக் கூட்டி, சரியான மேலுச்சி, கீழ்ச்சி தூரங்களைப் பற்றி 6-4 (2)க் கண்ட முறைப்படி, செல்வோமானால்,

$$x_1 + A \tan x_1 + B \tan^2 x_1 + x_2 + A \tan x_2 + B \tan^2 x_2 = 150 - 2\phi$$

$$y_1 + A \tan y_1 + B \tan^2 y_1 + y_2 + A \tan y_2 + B \tan^2 y_2 = 150 - 2\phi$$

$$z_1 + A \tan z_1 + B \tan^2 z_1 + z_2 + A \tan z_2 + B \tan^2 z_2 = 150 - 2\phi$$

என ஒன்று சமன்பாடுகள் வரும்.

தெரியாத இராகிகள் A, B, ϕ ஆகும்.

இம்மூன்று ஒருங்கமை சமன்பாடுகளையும் தீர்த்து, A, B, ϕ -ன் மதிப்புகளைக் கணிக்கலாம்.

ஒளிக்கோட்டம்—முடிவுகள் கருக்கம் :

இரு வாய்பாடுகள்

1. $r = k \tan z$ ($z=0^\circ$ முதல் 75° வரை பொருத்தும்).

$r = A \tan z + B \tan^2 z$ ($z=0^\circ$ முதல் 80° வரை பொருத்தும்).

2. ஒளிக்கோட்ட விளைவாக,

(i) விண்மீன்கள், Z -ஐ நோக்கித் தங்கள் குத்துக் கோடுகளிலேயே உயர்த்தப்பட்டுக் காட்சியளிக்கும்;

(ii) கருவி கொண்டு அளத்த உச்சி தூரத்தோடு ஒளிக்கோட்டத் திருத்தத்தைக் கூட்டினால், சரியான உச்சி தூரம் பெறப்படும்;

(iii) Z ஐ நோக்கிச் செல்லச் செல்ல, ஒளிக்கோட்டம் குறைபும்;

(iv) Z -ல் ஒரு விண்வெளிகுமிழின், அதன் ஒளிக்கோட்டம் பூச்சியாம்;

(v) 75° ஆகிறது 80° க்கு மேற்பட்ட உச்சி தூரங்களுக்கு. மேற்கூறிய இரு வாய்பாடுகளும் பொருத்தமாய், தனிப்பட்டவாகவிதான் காணவேண்டும்;

(vi) $z = 80^\circ$ க்கு, அதாவது, தொடுவானத்திற்குரிய ஒளிக்கோட்டம் 89° ;

(vii) $z = 0^\circ$ முதல் $z = 75^\circ$ வரை $r = k \tan z$ ல் $k=59.2^\circ$ எனக் கொள்ளலாம்;

(viii) மறைபா விண்மீன்கள் வான உச்சி கடக்கும்போது, கருவிகள் கொண்டு உச்சி தூரங்களை அளந்து, K , A , B யாவற்றையும் கணிக்கலாம்;

(ix) ஒளிக்கோட்ட விண்வாக அடிவான தூரத்திலும், உச்சி கடக்கும் நேரத்திலும் மாற்றம் ஏதும் ஏற்படாது;

(x) நடுவரை விலக்கம், வலஏற்றம் என்ற ஆயத்தொலைகள் சிறிது மாறும்; உரிய திருத்தங்களைக் கணிக்கலாம்;

(xi) கதிரவன் உதிக்கும்மறையும், நேரங்கள் சற்றுமுன்னேறுவது போலவும், பின்னடைவதுபோலவும் தோற்றம் ஏற்படும். கதிரவன் தொடுவானத்திற்கு மேல் இருக்கும் பகற்பொழுது

$2r'$
 $15\sqrt{\cos^2 \phi - \sin^2 \delta}$ வினாடிகள் அதிகமாகவது போலத் தோன்றும்;

(xii) கதிரவனும், முழுநிலவும் உதிக்குங்காலம் நீள் வட்ட வடிவத்திலிருப்பதுபோலத் தோன்றும்.

6.6.3: பரிநிக் கணக்குகள்

எ.கா. 1.

ஞர் இடத்தின் அகலங்கு $45^\circ 20' 33''$ டி உச்சே மைனூரில் (Ursae Minoris) என்ற விண்மீனின் கீழுச்சி, மேலுச்சி கடத்தல் தோற்ற ஏற்றக் கோணங்கள் முறையே $29^\circ 55' 15''$; $60^\circ 45' 8''$. ஒளிக்கோட்ட மாநிலி காண்க.

கீழுச்சி கடக்குங்கால், தோற்ற உச்சி தூரம்

$$= 90^\circ - 29^\circ 55' 15''.$$

$$= 60^\circ 1' 45''$$

மேலுச்சி கடக்குங்கால், தோற்ற உச்சி தூரம்

$$= 90^\circ - 60^\circ 45' 8''$$

$$= 29^\circ 14' 5' 57''$$

ஒளிக்கோட்ட மாநிலி K எனக் கொண்டால், சரியான கீழுச்சி மேலுச்சி கடக்குங்கால், உச்சி தூரங்கள்,

$$60^\circ 1' 45'' + K \tan 60^\circ 1' 45''$$

$$29^\circ 14' 57'' + K \tan 29^\circ 14' 57''.$$

6.4 (2) ல் கண்டபடி,

$$89^\circ 18' 42'' + K (1.7345 + 0.5601) = 180^\circ - 60^\circ 41' 6'' \\ = 89^\circ 18' 54''.$$

$$\Delta \quad 2:2946 \ K = 2'.13'' \\ = 192''.$$

$$\Delta \quad K = \frac{182}{2:2946} = 57'.51''$$

எ.கா. 2

உச்சி கடற்பதற்குமுன் அல்லது கடத்தலின் அளக்கப்பட்ட ஒரு விண்மீனின் நடுவரை விலக்கம் ஒளிக்கோட்டத்தால் பிழைபட விரியவாயும், அம்விண்மீன் வானதுருவத்திற்கும், வான உச்சிக்கும் இடையில் உச்சி கடக்குமென நினைவுக. மேலும், அக் குறிப்பிட்ட சமயத்தில் அதன் அடிவான தூரம் மீப்பெருமதற்புப் பெருகிறது எனவும் நினைவுக;

6:2:2 (1)-ன் படி நடுவரை விலக்க மாற்றம்,

$= -K \tan z \cos \eta$ என தாம் அதிலோம். இது பூச்சிய வானும், $\cos \eta = 0$ ஆகவேண்டும். ஏனெனில் $z \neq 0$ எனக் கொடுக்கப்பெயிருக்கிறது.

$\Delta \quad \eta = 90^\circ$. அதாவது, அம்விண்மீனின் நடுவரை விலக்க வட்டமும் ஏற்றக்கோணவட்டமும் 90° இல் வெட்டிக் கொள்கின்றன.

$$\Delta \quad \text{ZPS க், } \sin \phi = \cos z \sin \delta + \sin z \cos \delta \cos \eta. \\ = \cos z \sin \delta \quad (\text{ஏனெனில் } \cos \eta = 0)$$

$$\Delta \quad \sin \phi < \sin \delta$$


$$\phi < \delta$$

எனவே $90 - \phi > 90 - \delta$.

அதாவது உச்சி கடக்கும் சமயத்தில் S-இன் இடம், $ZP > SP$ என்ற சமனின்மைக்குப் பொருத்தமாயிருக்கும். ஆகவே S உச்சிகடர்பது Z-க்கும் P-க்கும் இடையில் இருக்கும். அப்படியுப் பட்ட விண்மீனுக்கு மீப்பெரு அடிவான தூரம் $\eta = 90^\circ$ என்ற நேரத்திற்குதான். (அதாவது நடுவரை விலக்கம் ஒளிக்கோட்டத்தால் பிழைபடாத நகுணத்திற்குதான்) என 4:4 (ii) காட்டப்பெயிருக்கிறது.

எ.கா. 3

$28^\circ 18'$ நடுவரை விலக்கமுள்ள ஒரு விண்மீன், வான உச்சிக்குத் தெற்கில் $52^\circ 18'$ இல் உச்சி கடக்கிறது. ஒளிக்கோட்ட மாற்றம் $55'.2$ ஆனும், அம்விடத்தின் அடிவான தூரம். $\tan 52^\circ 18' = 1.3285$ படம் 6:6:3 (3) காண்க.



ملف 9-9:9 (9)

$$23^{\circ} (\text{පැහැදිලි}) = 52^{\circ} 19'$$

... *... ..*

$$\begin{aligned} &= 52^{\circ} 15' + K \tan \alpha; \\ &= 52^{\circ} 15' + 59^{\circ} 2' \times 1.2986; \\ &= 52^{\circ} 19' 15''. \end{aligned}$$

$\rightarrow$ Z3 $- 53^{\circ} 19' 16''.8$

3Q 28 15

$$\begin{aligned}\therefore ZQ &= ZS + SQ \\ &= 78^\circ 34' 15''\end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \angle ZQ &= 90^\circ - \angle ZP = 90^\circ - (90^\circ - \angle NP) \\ &= \angle NP = \phi. \end{aligned}$$

நாடு கடல் அகலம் 79° 34' 15".9.

ஒளிக்கதிரைக் கோட்டம்

width = 6

1. காற்றின் ஒளிக்கோட்ட எண் 1.0003 ஆனால், வானவல் ஒளிக்கோட்ட மாதிரி 61°-9 என திறவுக.

3. வான் உச்சிக் கருவாயைவிட இரூக்கும் விண்மீன்களுக்கு ஒளிக்கோட்டம் உச்சித் தூரத்தோடு தகவடைபடுதல் நிறுவக் கூடியதாய்வு. விண்மீன்களுக்கு ஒளிக்கோட்டம் ஏதத்தாய்வு உச்சித் தூரத்தில் உள்ள பானைகள் எண்ணிக்கைக்குச் சமமான விதிகைகள் என நிறுவக். (ஒளிக்கோட்ட மாதிரி = 57")

8. ஒரு விண்மீனின் தோற்ற ஏற்றக் கோணம் 60° . கோட்ட மாறிலி $55^\circ 2'$ எனக் கொண்டால், அதன் சரியான ஏற்றக் கோணம் காண்க. (செ.)

4. ஒரு விண்மீனின் தோற்ற ஏற்றக் கோணம் $\sin^{-1}(\frac{1}{2})$; K $55^\circ 2'$ எனக்கொண்டு அக்வினார்னின் சரியான ஏற்றக் கோணம் காண்க. (செ.)

5. $44^\circ 55' 53''$ வடக்கு அகலங்களுள்ள ஓர் இடத்தின் ஒரு மறைவா விண்மீன் மேஜூச்சி, கீஜூச்சி கடக்கும்போது அளக்கப் பட்ட உச்சி தூரங்கள் 60° ; 80° கோட்ட மாறிலியைக் காண்க. (செ.)

6. விண்மீனின் ஏற்றக்கோணம் உயர, உயர ஒளிக் கோட்டம் குறைகிறது எனவும், விண்மீன் வானூச்சியெழும்பின் ஒளிக்கோட்டம் இல்லவேஇல்லை எனவும் நிறவுக.

7. ஒளிக்கோட்ட விளைவாகவும், கதிரவன் ஒரு புள்ளியாக மட்டுமில்லாததின் விளைவாகவும், $45^\circ N$ அகலங்களுள்ள ஓர் இடத்தில் செபம்பர் 25ஆம் நாள், கதிரவனொளி $\frac{20\sqrt{2}}{8}$ நிமிடங்கள் அதிகமாக விளகிறது என நிறவுக. (தொடுவான ஒளிக் கோட்டம் 85° எனவும் கதிரவன் கோணவிட்டம் = 80° எனவும் கொள்க.)

8. தொடுவான ஒளிக்கோட்டம் r° ஆனால், கதிரவன் உதிக்குமிடம் தொடுவானத்தில் $\frac{r^\circ \sin \phi}{\sqrt{\cos^2 \phi + \sin^2 \delta}}$ அளவுக்கு நகர்த்திநகர்கிறதென நிறவுக. (ϕ —இடத்தின் அகலங்கு)

9. மண்ணுலகத்தில் தடுவணைநிலை இடங்களில், கதிரவன் மேட முதற்புள்ளி, தூரம் முதற்புள்ளிகளில் வரும்போது, கதிரவன் ஒளிக்கோட்ட விளைவின் பயனாக 4-5 நிமிடங்கள் முன் கூட்டியே உதர்ப்பதுபோலத் தோன்றுகிறதென நிறவுக.

(அ. 6) ஆவந்தொலைகள் உள்ள ஒரு விண்மீன் தொடுவானத் திற்றுகி கீழ் 6 அளவு நகர்த்திநகர்கின்றது. அப்போது அதன்

தேரக்கோணம் δ ஆனால், $\cos^2 \frac{\delta}{2} = \sec \phi$, $\sec \delta$.

$$\times \cos \left[\frac{\pi}{4} + \frac{\phi + \delta}{2} \right] \times \sin \left[\frac{\pi}{4} - \frac{\phi + \delta}{2} \right]$$

என நிறவுக.

இதைப் பயன்படுத்தி (i) சுதிரவன் மையம் எப்போது தொடுவானத்தில் உதிப்பதுபோல் தோன்றுகிறது எனக் காண்க. (தொடுவான ஒளிக்கோட்டம் 85°)

(ii) எப்போது மெக்ஸுவெலி ஆரம்பிக்கிற தெனவும் காண்க.

குறிப்பு: $\triangle ZPS$ -ல் $ZP = 90 - \phi$; $PS = 90 - \delta$; $ZS = 90 + \theta$ எனக்கொண்டு $\cos ZS$ எழுதி, தேவைக்குத் தகுந்தபடி சுருக்குக.

மேலும் $\theta = 85^\circ$ அதாவது $\theta = \frac{85 \times \pi}{60 \times 180}$ ஆரவளங்கள்

எனவும் கொண்டு, $\cos \theta = 1$; $\sin \theta = \frac{85 \pi}{10500}$ எனவும்

கொண்டு சுருக்கி விடை காண்க.

11. சுதிரவனின் கோணவிட்டம் D ; அதன் மையத்தின் உச்சிநூரம் z ; அச்சமயத்தில் கிடைதலை (horizontal) விட்டச் சுருக்கம் KD ஆனவும், நெடுதலை (Vertical) விட்டச் சுருக்கம் $K \sec z \cdot D$ ஆனவும் உள்ளதுபோல் தோன்றுகிறதென நிறுவுக.

(K -ஒளிக்கோட்ட மாநிலி.)

12. $45^\circ N$ அகலத்தில் உள்ள ஓர் இடத்தில் ஒளிக்கோட்ட விளைவாக, ஒரு விண்மீனின் தோற்ற நடுவரை விலக்கம், ஒரு நாளில் எப்படியெப்படி மாறுகிறதென ஆய்க; (சரியான நடுவரை விலக்கம் $50^\circ N$). அம்விண்மீனின் வயல்தரம் 45° ஆனால், ஒளிக்கோட்டப் பிழை நடுவரை விலக்கத்தை இரண்டு குறிப்பிட்ட தருணங்களில் யாதிரக்காதென நிறுவி அத்தருணங்களை விண்மீன் வழிநேரத்தில் அறிக.

- [குறிப்பு: மீச்சிறு உச்சிநூரம் 5° ; மீப்பெரு உச்சி நூரம் 55° ; $\eta = 90^\circ$ ஆனால்போது ஒளிக்கோட்டப் பிழை பூச்சியமாகும்; அதற்குரிய k கண்டு, $t = \frac{1}{k}$ க்கு k என்ற வாய்பாட்டைப் பயன்படுத்தி, t அறிக].


7. புவிமையத் தோற்றப் பிழை (GEOCENTRIC PARALLAX)

7-0 : ஒரு வான் பொருளைத் திட்டமாகக் குறிப்பிட்ட ஒரு புள்ளியிலிருந்து பார்க்கும் திசைக்கும், மண்ணுலகில் ஏதாவோர் இடத்தில் காட்சியாளன் அப்பொருளைப் பார்க்கும் திசைக்கும் உள்ள வேறுபாடு அங்வான்பொருளின் 'தோற்றப் பிழை' எனப்படும்.

மண்ணுலகில் பல்வேறு இடங்களிலிருந்து வான்பொருளின் ஆயத்தொலைவைப் பதிவு செய்கப்படுகின்றன. அவற்றினை ஒழுங்கு படுத்துவான் வேண்டி, புவிமையத்தை ஒரு திட்டமான புள்ளியாகக் கொண்டு, அங்கீடத்திற்குப் பொருத்தும் வகையில் ஆயத்தொலைவைச் சீர்படுத்தப் படுகின்றன. இந்த அடிப்படையில் புவிமையத்திலிருந்து ஒரு வான் பொருள் இருக்கும் திசைக்கும், புவிவின் மேல் ஓரீடத்திலிருந்து அப்பொருள்தோன்றும் திசைக்கும், உள்ள வேறுபாடு புவிமையத் தோற்றப் பிழை பெயர்ப்படும். இது வழக்கமாக p எனக் குறிப்பிடப்படும்.

7-1 : பல்வேறு கிரேஸீட்டர்களுக்கு அப்பாலுள்ள விண்மீன்கள் இப்பிழையால் பாதிக்கப்படுவதில்லை. ஏனெனில் புவிமையத்திலிருந்து அவற்றினைப் பார்க்கும் திசையும், காட்சியாளன் பார்க்கும் திசையும், ஏறக்குறைய இணைதிசைகளாகவே அமைந்து விடுகின்றன. ஆனால் கதிரவனும் சந்திரனும் சில கோள்களும் விண்மீன்கள் உள்ள அளவு அதிகமான தூரத்தில் இல்லையாதலின், இப்பொருள்களைப் பொருத்தமட்டில் புவிமையப் பிழைகள் கணக்கில் எடுக்கக்கூடிய அளவுக்கு இருப்பதால், அவை (மிக மிகச் சித்யதரமினும்) கணிக்கப்படுகின்றன. நடவடழுதறையில், கதிரவன் சந்திரன் என்பவற்றிற்குமட்டுமே, புவிமையப் பிழைகள் ஏற்றுக்கொள்ளப்படுகின்றன.

7.2 : புவிமையப் பிழை :



படம் 7.2

படம் 7.2 இல் புவிமையப் மேற்பரப்பில் A ஒரு இடம்.

E புவிமையப் மையம்; M ஒரு வானப்பொருள். புவிமையமான E இல் காட்சியாளன் இருப்பின், அவன் M ஐப் பார்க்கும் திசை EM. இது அய்வான் பொருளின் சரியான திசையெனப்படும். A இல் உள்ள காட்சியாளன் M ஐப் பார்க்கும் திசை AM. இது அய்வான் பொருளின் தோற்றத்திசை எனப்படும். இவ்விரு திசைகளின் வேறுபாட்டுக்கோணமான EMA, என்பது A என்ற காட்சியாளனது புவிமையப் பிழையாகும். எனவே ஒரு வானப்பொருளின் புவிமையப் பிழையளவு, யாதெனின் காட்சியாளன் உள்ள இடத்தை புவிமையத் தோடு இணக்கும் புவிமைய அளவீட்டம் ($AE = a$) அய்வான் பொருள் M இல் வீழ்த்தும் கோணம் (எதிர்கொள் கோணம்) எனப் அழைப்படுகிறது. அய்வான் பொருளைத் திட்ட இடமான புவிமையத் திணித்து தோக்கினால், என்ன ஆவத்தொலைகள் இருக்குமோ அவற்றைப் பெற, உரிய புவிமையப் பிழைத்திருத்தங்கள் செய்து கொள்ளவேண்டும். இத்திருத்தங்கள் புவிமையத் தோற்றப் பிழைத்திருத்தங்கள் எனப்படும்.

உச்சி தூரத்தில் எத்படும் புவிமையப் விதத்திருத்தம்
மடம் 7-2 இல் A' வழியாக, $AM_1 \parallel EM$ வரைக. E இனிக்குது
 M இன் சரியான உச்சித் தூரம்

$$\angle E'M = \angle \hat{A}M_1 (\because AM_1 \parallel EM)$$

தோற்ற உச்சித்தூரம் $z = \angle \hat{A}M$
எனவே சரியான உச்சித்தூரமான

$$\angle \hat{A}M_1 = \angle \hat{A}M - \angle M_1 \hat{A}M$$

$$= \angle \hat{A}M - \angle \hat{A}ME$$

$$= z - p$$

$$= \text{தோற்ற உச்சிதூரம்} - \text{புவிமையப்பிதம்}$$

அதாவது தோற்ற உச்சித்தூரத்திலிருந்து p ஐக் கழித்தால் சரியான
உச்சித் தூரம் கிடைக்கும். எனவே, பிதம் p கழிக்கவேண்டிய
அளவாகும்.

மண்ணுடைக ஆரம் ' a ' எனவும், E இலிருந்து வான்வெளவின்
தூரம் d எனவும் கொள்வோம். a -உம், d -உம் தெரிந்தால், p இன்
மதிப்பை அளவிடலாம்.

$\triangle EAM$ இல்

$$\frac{a}{\sin p} = \frac{d}{\sin \angle \hat{A}M} = \frac{d}{\sin (180^\circ - z)} = \frac{d}{\sin z}$$

$$\therefore \sin p = \frac{a}{d} \sin z$$

" a " — புடல் ஒப்பிடும்பொழுது d மிகப் பெரியதாக இருப்பின்
 $\frac{a}{d} \sin z$ — இன் மதிப்பு மிகச் சிறியதாக இருக்கும்.

$\therefore p$ ஆனவன் அளவில் கொடுக்கப்படின்

$$\sin p \sim p$$

ஆகவே, புவிமையப்பிதம் (p ஆனவன் அளவில் தோராயமாக)

$\frac{a}{d} \sin z$ எனப் பெறப்படுகிறது.

$$\therefore p = \frac{a}{d} \sin z \text{ என்ற வாய்படு கிடைக்கிறது ... (1)}$$

இங்கு $z = 90^\circ$ ஆனால் p தன்னு மீப்பெரு மதிப்பாகிய $\frac{a}{d}$
என்ற மதிப்பைப் பெறுகிறது. இம் மீப்பெருமதிப்பை P எனக்

குறிப்பு: செவ்வகம், P என்பது, தொடுவான புவிமையங்கீழ் (Horizontal Geocentric Parallax) எனப்படும்.

$$\therefore p = p \sin z \text{ எனவும்,} \quad \dots(2)$$

புவிமையங்கீழ் வரம்பாட்டை எழுதலாம்.

ஒரு வானப்பொருளின் பதிவுசெய்த உச்சித்தூரம் z ஆனால், சிவான உச்சித்தூரம்

$$z - P \sin z \text{ எனப் பெறப்படும்.} \quad \dots(3)$$

d என்ற ஒரு குறிப்பிட்ட தூரத்தில் உள்ள வான பொருளுக்கு

$$p = \frac{d}{d'} \text{ ஒரு மாறிலியாகும்.}$$

7-2-1: எடுத்துக்காட்டாக சத்திரனின் தொடுவான புவிமையங்கீழ்

$$\begin{aligned} P &= \frac{3960}{2,40,000} \text{ (ஆரைவன் அளவில்)} \\ &= \frac{3960}{2,40,000} \times \frac{180}{\pi} \times 60 \times 60 \text{ விக்கெசு} \\ &= 8408 \text{ விக்கெசு} \\ &\hookrightarrow 57' \text{ (விக்கெசு)} \end{aligned}$$

ஏதக்குறைய 1° எனவே கொள்ளலாம்.

குறிப்பு: சத்திரனிலிருந்து, இம்மண்ணுலகத்தைப் பார்க்கலாம். இம்மண்ணுலகம் ஏதத்தூர 1° கோண அரைவிட்டமுள்ள 'சத்திர வானப்பொருளாக' (Lunar Celestial Object)க் காட்சியளிக்கும்.

7-2-2: கதிர்வன் தொடுவான புவிமையங்கீழ்

$$\begin{aligned} P &= \frac{3960}{98 \times 10^3} \text{ (ஆரைவன் அளவில்)} \\ &= \frac{3960}{98 \times 10^3} \times \frac{180}{\pi} \times 60 \times 60 \text{ (விக்கெசு)} \\ &\hookrightarrow 8'' \text{ (விக்கெசு)} \end{aligned}$$

கதிர்வன், சத்திரன் மறைப்புக்கப்பற்றி நாம் அறிய முற்படும் பொழுது இப்புவிமையத் தோற்றப் பிழைகள் பயன்படும்.

குறிப்பு 1: இங்கு, சத்திரன், கதிர்வன் சராசரி தூரம் கொண்டு, அவற்றின் புவிமையத் தோற்றப் பிழை கணிக்கப்

மட்டது. எனவே மூன்று கணிக்கப்பட்டவை, சராசரி புவிமையத் தோற்றப் பிழையெனப் படும்.

குறிப்பு 2: சத்திரனது தூரத்தோடு ஒப்பிடும்போது அதிரவன் தூரம் ஏறக்குறைய 400 மடங்கு அதிகமாகலின், அதிரவன் தோற்றப் பிழை மிகச் சித்திராக உள்ளது ($1 : 400$ என்ற தோராய விகிதத்தில் உள்ளது).

குறிப்பு 3: அதிரவன் இம்மண்ணுலகத்தைச் சுற்றிவரும் தோற்றப்பாதை, ஒரு நீள்வட்ட மெனவும் அதன் $e = \frac{1}{10}$ எனவும் தாம் அறிவேம். மண்ணுலகத்திற்கும் அதிரவனுக்கும் உள்ள தூரம் ஒரு மாதிரி அகல்; மீப்பெகு தூரம் $a(1+e)$; மீச்சிறு தூரம் $a(1-e)$. ஆகவே, அதிரவனின் புவிமையத் தோற்றப்பிழை மாறும் தன்மை உடையது.

$a(1+e)$ தூரம் உள்ளபொழுது, அதிரவனின் மீச்சிறு

$$\begin{aligned} \text{புவிமையப் பிழை} &= \frac{P}{1+e} = P(1+e)^{-1} \simeq P(1-e) \\ &= 9(1-\frac{1}{10}) \\ &= 8^{\circ}.65 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{மீப்பெகு புவிமையப்பிழை} &= \frac{P}{1-e} = P(1-e)^{-1} \\ &\simeq P(1+e) \\ &= 9(1+\frac{1}{10}) \\ &= 9^{\circ}.15 \end{aligned}$$

அகலாதே, சத்திரனின் மீச்சிறு புவிமையப் பிழை

$$\begin{aligned} &= \frac{87^{\circ}}{1+\frac{1}{10}} \\ &\simeq 87(1-\frac{1}{10}) \\ &= 88^{\circ}.8. \end{aligned}$$


சத்திரனின் மீப்பெகு புவிமையப்பிழை

$$\begin{aligned} &= \frac{87^{\circ}}{1-\frac{1}{10}} \\ &\simeq 87(1+\frac{1}{10}) \\ &= 89^{\circ}.2 \end{aligned}$$

இவை 'அதிரவன், சத்திரன் மறைப்படி' பகுதியில் பவன் படும்.

7.3: புவிணையத் தோற்றப் பிழையில் விளைவாக மண்ணுடைமையத்திலிருந்து ஒரு வான் பொருளைப் பார்ப்பதற்கும், மண்ணுடைப் பரப்பின் மேலிருந்து அதே வான் பொருளைப் பார்ப்பதற்கும் உள்ள தோற்ற வேறுபாடுகள்.

வானகோளத்தின் மேல் இதன் விளைவு எப்படியிருக்கும் எனக் காண்போம்.



படம் 7.3

படம் 7.3 இதை விளக்கும்.

$ZS' = z$: A இலிருந்து பதிவு செய்த தூரம்

$SS' = p$: புவிணையப் பிழை = $P \sin ZS' = P \sin z$

ஃ சரிவான உச்சி தூரம் $ZS = ZS' - SS'$

$$= z - P$$

$$= z - P \sin z$$

எனவே, S என்ற விண்மொருள், தொடுவானம் பக்கமாக இறங்கிக் காட்சியளிக்கிறது.

ஆகவே, E இலிருப்பவன் ஒரு வான்மொருள் தொடுவானத்தில் உதயமாவதைப் பார்க்கும்போது, A இலிருப்பவனுக்கு அது உதயமாகிவிடுகிறது. ஒன்றித் தாம் 4.2 இல் கண்டபடி, E இலிருப்பவன் வான்மொருள் உதயம் கண்ட பிறகு

$$\frac{P}{15\sqrt{\cos^2 \phi - \sin^2 \delta}}$$


வினாடிகள் அழிந்தே, A இலிருப்பவனுக்கு ஆர்வான்மொருள் உதயமாகும். (P ஃ விசையளவில் கொடுக்கப்பட வேண்டும்). எனவே, A இலிருப்பவனுக்கு வான் மொருள் உதயமாவதம் தாமதமாகி, அத்நிக் காலம் துரிதமாகிறது. ஆகவே A இலிருப்பவனுக்கு ஒரு வான் மொருள் தொடு வானத்திற்கு மேல் இருக்கும் மொத்த காலம், E இலிருப்பவனுக்கு உட்கள்ளதைவிட

$$\frac{2P}{15\sqrt{\cos^2\phi + \sin^2\theta}} \text{ வினாடிகள் குறைகிறது.}$$

ஆனால் உச்சி கடக்கும் காலம் இருவருக்கும் ஒன்றே.
மேலும் z, ϕ, θ' ஒன்றும் ஒரே பெருங்குத்து வட்டத்தின் மேலிருப்பதால், தொடுவான தூரத்தில் பிழையேதும் ஏற்படாது.
7.4: ஒளிக்கோட்ட விளைவுகள்—புவித்தோற்றப்பிழை விளைவுகள்—ஒப்பீடு.

ஒளிக்கோட்ட விளைவுகள்	புனிமமயத் தோற்ற விளைவுகள்
தோற்றம் - z பக்கம் உயர்கிறது	தோற்றம்: தொடுவானம் பக்கம் தாழ்கிறது
பிழை: கூட்ட வேண்டியது $K \tan z$	பிழை: சுழிக்கவேண்டியது $P \sin z$
K -வளி மண்டல நிலையைப் பொருத்தது. எல்லா வளி பொருளுக்கும் குறிப்பிட்ட வளிமண்டல நிலையில் K மாறிலி மதிப்புடையது.	P இன் மதிப்பு வளிபொருளின் தூரத்தின் நேர்மாறு விகிதத்தில் உள்ளது ($= \frac{1}{\text{தூரம்}}$); எனவே P ஒரு மாறிலி. வளி மண்டல நிலைக்குத் தொடர்பில்லை
விண்மீன்கள், கதிர்வன் சத்திரன் முதலிய எல்லா வளி பொருள்களும் பாதிக்கப்படும்.	கதிர்வன், கோள்கள், சத்திரன் மட்டுமே பாதிக்கப்படும்; விண்மீன்கள் பாதிக்கப்படுவதில்லை.
தொடுவானத்திற்கு மேலுள்ள காலம் அதிகமாகிறது	தொடுவானத்திற்கு மேலுள்ள காலம் குறைகிறது
தொடுவான தூரம், உச்சி கடத்தல் நேரம் மாறுது	தொடுவான தூரம், உச்சி கடத்தல் நேரம் மாறுது.
மாறுதல்கள் தோற்றமே.	மாறுதல்கள் தோற்றமே.
உச்சி தூரத்தைப் பொருத்தது.	உச்சி தூரத்தைப் பொருத்தது.

7.5: புவிமையத் தோற்றப்பிழை - நடுவரை விலக்கத்திலும் கோக் கோணத்திலும் ஏற்படும் மாறுதல்கள்



படம் 7-5.

படம் 7-5 இல் E புவிமையம், மத்தவை முறைப்படி, S என்பது E இலிருந்து பார்க்கப்படும் வான் பொருளிடம் (உண்மை வானது).

S' -மண்ணுலகப் பரப்பில் A என்ற ஓர் இடத்திலிருந்து பார்க்கப்படும் அம் வான்பொருளிடம்,

இங்கு $ZS'P = \varphi$ (வான் பொருளிடக் கோணம்)

$ZS' = z$ (தோற்ற உச்சி தூரம்)

$SS' = P \sin ZS'$ (புவிமையத் தோற்றப் பிழை)

PSM, PSM_1 என்பவை முறையே S, S' வழிவாக வரையப்படும் நடுவரை விலக்கப் பெருவட்டங்கள்

தோற்ற நடுவரை விலக்கம் $S'M_1 = \delta$

சரிவரை (E மையம்) நடுவரை விலக்கம் $SM = \delta'$

S' இலிருந்து $S' L \perp PS$ வரைக (அதாவது $\parallel QR$)

நடுவரை விலக்கப்பிழை = SL

$\Delta SS'L$ ஒரு தள முக்கோணம் எனக் கொள்ளலாம்; ஏனெனில் SS' மிகச் சிறிய அளவுடையது. எனவே நடுவரை விலக்கப்பிழை

$$\begin{aligned} SL &= SS' \cos S \quad \hat{S}L \\ &= SS' \cos Z\hat{S}P \\ &= P \sin z \cos \eta \end{aligned} \quad \dots (4)$$

$$\begin{aligned} \text{தேரக் கோணப் பிழை} &= MPM_1 \\ &= \text{விண் } MM_1 \\ \text{விண் } MM_1 &= S'L \sec \delta \quad (\because S'M_1 = \delta) \\ \text{ஆனால் } S'L &= SS' \sin \eta = P \sin \delta \sin \eta \\ \therefore MM_1 &= P \sin z \sin \eta \sec \delta \\ &= \text{தேரக் கோணப் பிழை} \\ &= \text{வல ஏற்றப்பிழை} \end{aligned} \quad \dots (5)$$

ஆனால்

$$\triangle ZSP \text{ இல், } \frac{\sin ZP}{\sin \eta} = \frac{\sin ZS}{\sin ZPS}$$

$$\text{அதாவது, } \frac{\cos \phi}{\sin \eta} = \frac{\sin z}{\sin h}$$

$$\therefore \sin z \sin \eta = \cos \phi \sin h$$

$$\begin{aligned} \therefore \text{தேரக் கோணப் பிழை} \\ &= \text{வல ஏற்றப்பிழை} \\ &= P \sin z \sin \eta \sec \delta \\ &= P \cos \phi \sin h \sec \delta \end{aligned} \quad \dots (6)$$

7.6: உச்சி கடத்தல் அளவுகளைக் கொண்டு சந்திரனின் புவிமையப் பிழை அறிதல்.

ஒரே மண்ணுலக நெட்டாங்கில் உள்ள A, B என்ற இரண்டு இடங்கள், A உயர்த்த வட அகலங்கு பெற்றதாயும், B உயர்த்த தென் அகலங்கு பெற்றதாயும் எடுத்துக்கொள்வோம்.

ஒரே நெட்டாங்கில் இரண்டிடங்களிலும் காலம் காட்டும் கடிகாரங்கள் ஒரு குறிப்பிட்ட சமயத்தில் ஒரே நேரத்தான் காட்டும்.

காட்சிப் பதிவு செவ்வும் தானன்று, சந்திரனுக்குரிய வல ஏற்றம் பெற்று, நடுவரை விடைகம் ஏறக்குறைய சமவரையும் உள்ள ஒரு விண்மீன் S (மரணுமீப் பஞ்சாங்கம் கொண்டு) தேர்த்தெடுத்துக் கொள்வோம்.

படம் 7-6 காண்க. A, B என்ற இரு இடங்களும் ஒரே மண்ணுலக நெட்டாங்கிலிருப்பதாக, சந்திரன் M உம் அப்பவிண்மீன் S உம் ஒரே சமயத்தில் உச்சி கடக்கும். அப்போது இரு இடங்களிலும் சந்திர மையத்தின் உச்சித்தூரம் குறித்துக்கொள்க.

படத்தில் Z_1 $AM = z_1$; Z_2 $BM = z_2$

அதே சமயத்தில் சத்திரனுக்கும் விண்மீன் ஈக்கும் இடைப்பட்ட கோண தூரம் $\angle SAM = \alpha$, $\angle SBM = \beta$, அளந்து கொள்ள, S வெகு தூரத்திலிருப்பதால் $AS \parallel BS$ எனக் கொள்ளலாம்.

$AM' \parallel BM$ என வரைந்துகொள்வோம்.

$$\angle SAM' = \angle SBM = \beta \quad (\because AM' \parallel BM)$$


$$\text{மேலும், } \angle M'AM = \alpha + \beta = \angle AMB \quad (\because AM' \parallel BM)$$

$$\text{மேலும் } \angle AME = p_1 = P \sin z_1$$

$$\angle BME = p_2 = P \sin z_2$$

இங்கு P என்பது சத்திரனின் புவிமையத் தொடு வரைத் தொற்றின் மீதுவரலும்.

$$\begin{aligned} \therefore \alpha + \beta &= \angle AMB = \angle AME + \angle BME \\ &= P \sin z_1 + P \sin z_2 \\ &= P (\sin z_1 + \sin z_2) \end{aligned}$$



படம் 7-6

$$\therefore P = \frac{\alpha + \beta}{\sin z_1 + \sin z_2} \text{ எனப் பெறப்படும்.}$$

ASக்கும் கீழே AM' அமைப்பானால்

$$P = \frac{\alpha - \beta}{\sin z_1 + \sin z_2} \text{ எனப் பெறப்படும்.}$$

தாம் ஹர்னசே 7-2-1இல் சத்திரனின் புவிமையத்தொடுவானத் தோற்றப்பிழை ஏறத்தாழ 57° (கோகல்) எனக் கணித்திருப் பதைக் காண்க. இங்ஙனே எந்தக் கோல்களின் புவிமையத் தொடுவானத் தோற்றப்பிழையையும் கணக்கிடலாம். ஆனால் சத்திரவான்பிழையாகக் கணக்கிடுதல் இம்முறைப்படி இயலாது; ஏனெனில் S என்ற எந்த ஒரு விண்மீனையும் கூட்டாகக்கொண்டு சத்திரவான்பு பார்க்க இயலாது.

ஆனால் இடங்கள் வேறு, பார்ப்போர்கள் வேறு, கருவிகள் வேறு ஆதலால் இம்முறைப்படி, Pஐக் கணக்கிடுதல் அரிவனவு. செம்மையான அளவுகளாகக் கொடுக்கமாட்டா.

வான்பொருள்கள் கருக்கம்

தொடுவானப் புவிமையத் தோற்றப் பிழை = $\frac{d}{d}$

(α , மண்ணுலக ஆரம், d , வான்பொருள் தூரம்)

சத்திரவான்புவிமையப்பிழை (சராசரி) = 9°

சத்திரவான்புவிமையப் பிழை (சராசரி) = 57°

$$\text{காட்சி தேரக் குறைவு} = \frac{2P}{16 \sqrt{\cos^2 \phi - \sin^2 \delta}}$$

$$\text{என எந்தப்பிழை} = P \sin z \sin \alpha \sec \delta$$

$$= P \cos \phi \sin h \sec \delta$$

$$\text{நடுவரை விவக்கப்பிழை} = P \sin z \cos \alpha$$

பயிற்சி 7

(பின்வரும் கணக்குகளில் வேவென்றும் மாறுகக் கூறப்படா விடத்து மண்ணுலகின் ஆரம் 3960 மைல்களெனக் கொள்க.)

1. புவிமையத் தோற்றப்பிழையும் கோட்டப் பிழையும் ஒரங்கே கணக்கிலெடுத்தால், சத்திரனின் உதய தேரம் என்ன மாறுதலடைபும்?

2. சத்திர மையத்திலிருந்து, இம்மண்ணுலகின் சத்திரமையத் தோற்றப் பிழையென்ன?

3. சுதிரவனின் புவிமையத் தொற்றப்பிழை 8° . கோணவிட்டம் $32'$ சுதிரவனின் விட்டத்தையும் சுதிரவனுக்கும் மண்ணுலகத்திற்கும் உள்ள தூரத்தையும் கணக்கிடுக.

4. சத்திரவனின் புவிமையத் தொற்றப் பிழை $55'$. கோணவிட்டம் $32'$. சத்திரவனின் விட்டத்தையும் சத்திரவனுக்கும் மண்ணுலகிற்கும் உள்ள தூரத்தையும் கணக்கிடுக.

5. மண்ணுலகிற்கு ஆன்மை, சேம்மைநிலைகளிலுள்ளபோது சத்திரவனின் புவிமையத் தொற்றப்பிழைகள் முறையே 1° உம் $0^{\circ}54'$ உம் ஆகும். சத்திரவனாகையின் குவிமையப் பிறழ்வென்ன?

6. சத்திரவனின் கோள அரைவிட்டம் $15'$ ஆக இருக்கும்போது ஆதன் புவிமையத் தொற்றப்பிழை $54'9$. கோள அரைவிட்டம் $16'-6$ ஆக இருக்கும்போது, அதன் புவிமையத் தொற்றப்பிழை யென்ன?

7. பின்வரும் காட்சிப்பதிவுகள் கொண்டு காட்சிவிடத்தின் அகவாங்கு கணிக்க.

சுதிரவன் கீழ்வீலிய்பு உச்சி கடக்கும்	} $62^{\circ}24'45''$ தெற்கு
கால் உச்சி தூரம்	
அகவாங்குதூரம்	$4'$
சுதிரவன் மைய நடுவரை விவக்கம்	$+ 20^{\circ} 55' 10''$
சுதிரவன் கோள அரைவிட்டம்	$15' 47''$
காட்சிவிடத்தில் புவிமையத்தொற்றப் பிழை	} $5'$
ஒளிக்கோட்டம்	
	$80'$

(செம்)

8. வானியல் கருவிகள் (ASTRONOMICAL INSTRUMENTS)

8-0 : வானியல் கருவிகளைக் கண்டு, இடங்குறித்து, அவற்றின் ஆயத் தொலைகள், மற்ற அளவுகள் முதலியன பரிவு செய்வானியல் கருவிகள் பயன் படுகின்றன. இக்கருவிகள் பற்றி விரிவான முறையில் அறிய வேண்டுமானால், அதற்கென இயந்திரப் பட்டிக்குடும் நூல்களைத்தான் நாடவேண்டும். கருவிகள் செய்வதனும், அவற்றின் அறிதல்ப ஆராய்ச்சிக்குப் பயன்படுத்தும் வகையில் அமைப்பதும், அக்கருவிகள் கொண்டு துண்காட்சிகள் காண்பதும், தேவைப்படும் அளவுகளைப் பரிவு செய்வதும் பிழைகள் தோராவண்ணம் முன்னெச்சரிக்கையாக அவை நீக்குதற் குரிய ஏற்பாடுகள் செய்வதும், தனித்தனிக் கலைகளாகும். இவை பற்றிய விரிவான விளக்கங்கள் இந்நூலில் இடம் பெறுவதற்கில்லை. சில முக்கியமான கருவிகள் எந்த அடிப்படையில் அமைக்கப் படுகின்றன, எந்தெந்த அளவுகள் காண அவை பயன்படுத்தப் படுகின்றன என்பவை மட்டுமே இந்நூலில் குறிப்பாக விளக்கப் பட்டும்.

8-1 : தொலைநோக்கி (Telescope): வானியல் ஆறிவு வளர்வதற்கு முதன்முதலாகப் பயன்பட்டது தொலை நோக்கி; இன்றும் தேவைப்படுவது தொலை நோக்கி. இதன் பெயருக்கு ஏற்றதாயே இக் கருவி, காணக் கண்ணாடி காண இயலாது, பெரு நூர்திநூலின் பெருங்கண்ணாடிகளின் எளிதில் காணுவதற்கென, ஏற்பட்ட ஒருவகை ஒளியியல் (காட்சி) கருவியாகும் (Optical instrument). 1608ம் ஆண்டு, மூக்குக் கண்ணாடித் தொழில் செய்து வந்த 'லிப்பர்ஷே' (Lippershey) என்பவர்தான் முதன்முதலில் தொலைநோக்கிக் கருவி செய்தவராவார். அவர் கட்டிய இக்கருவியைக் கண்ட கலீலியோ அம்விதக் கருவியில் சில புத்தியாலித்தனமான மாறுபாடுகள் செய்து, அதை வான துண்காட்சிக்குப் பயன்படுத்தும்.

வகையில் திருத்தியமைத்தார். இவ்வித தொலைநோக்கி கொண்டு தான் கலீலியோ தன் வானூரங்கிகளைத் தொடர்ந்து செய்து வந்தார். ஹெய், நீயூட்டன், ஹால் (Hall), டாலண்ட் (Dollond) இன்னும் மத்தையோர் பெரு முயற்சியால், தொலை நோக்கிகளின் திறனும், ஆற்றலும் வளர்க்கப்பட்டன.

பொதுவாகத் தொலைநோக்கிகள் இரு வகைப்படும்.

(i) ஒளிக்கோட்ட முறைத் தொலை நோக்கி (Refracting telescope)

(ii) ஒளி திரும்பு முறைத் தொலை நோக்கி (Reflecting telescope)

8-1-1 : தொலைநோக்கிகள் (Telescopes) அடிப்படையணுமயு :


நீண்டதொரு குவிய தூரம் கொண்ட ஒரு குவிவெள்ளல் (குவி லிங்கோ - Convex lens) அல்லது ஒரு குழி ஆடிவயப் (Concave mirror) பயன்படுத்தி எகிலியத்த தொலைவிற்குக்கும் ஒரு பொருளின் வெளிப்படும் முறையில் பெறப்படுகிறது. மின்னர் இந்த வெளிப் பிம்பத்தை ஒரு குவிவெள்ளலின் குவியத்தில் அல்லது குவிய தூரத்திற்குள் விழுவது செய்து அப்பொருளின்மைய பிம்பத்தினைப் பண்டவக்கு உருப்பெருக்கத்துடன் பெறலாம். பொருளுக்கு அருகே உள்ளது ஒரு குவிவெள்ளலானால் அது ஒளிக்கோட்ட முறை தொலை நோக்கி (Refractor) எனவும், அது ஒரு குழி ஆடி ஆனால் அது ஒளி திரும்பு முறை தொலை நோக்கி (Reflector) எனவும் பெயர்பெறும். ஒவ்வொரு வகைக்கும் சில சிறப்பியல் களும் சில குறைபாடுகளும் உண்டு.

8-1-2 : வானியல் தொலைநோக்கியின் (Astrophysical Telescope) அமைப்பு :

வானியல் தொலைநோக்கி, நீண்ட குவியதூரமுள்ள ஒரு குவிவெள்ளல் பொருளாகு வெள்ளைகளும் (Objective or objective glass), குறைத்த குவியத் தூரமுள்ள மற்றொரு வெள்ளைக் கண்ணாகு வெள்ளைகளும் (Eye-piece) கொண்டது. இவை இரண்டும் ஒரு உயோகக் குழாயின் இரு முனிகளில் அமைக்கப்பட்டுள்ளன. இவ்வித வெள்ளைகளுக்கும் இடையே உள்ள தொலைவை சிறிதளவு கூட்டவே குறைக்கவே செய்வதற் காக ஒரு திருகு பக்கவாட்டில் அமைக்கப்பட்டிருக்கிறது.

செயல்படுமுறை : தொலைவில் இருக்கும் ஒரு பொருளின்மேல் ABC என்றும் ஒரு இணை ஒளிக்கற்றை பொருளாகு வெள்ளைமீது விழத்து அவை வெள்ளின் முக்கிய குவியத்தில்

(Principal focus) குறிக்கப்படுகின்றன. அங்கு பொருளின் மெய்ப்பிம்பம் I , ஒன்று சிதிய அளவில் தலைகீழாகக் கிடைக்கிறது. இந்த மெய்ப்பிம்பம் கண்ணருகு ஹென்ஸிற்றப் பொருளாக (Object) செயல்படுகிறது. இந்த மெய்ப்பிம்பம் கண்ணருகு ஹென்ஸின் முக்கிய குவியத்திற்குள் இருப்பதால் உருப்பெருக்கம்




படம் 8-1-2

ஆனதால் பெற்ற பொருளின் ஒரு போலிப்பிம்பம் (virtual image) உண்டாக்கப்படுகிறது. முதல் பிம்பம் கண்ணருகு ஹென்ஸின் முக்கிய குவியத்திலேயே விழும்படி அமைத்தால் இறுதி போலி பிம்பம் எல்லையற்ற தொலைவில் கிடைப்பதாகக் கொள்ளப் படுகிறது.

8-1-3 : உருப்பெருக்கம் (Magnification)

பொதுவாக உருப்பெருக்கமானது (m) பிம்பமும் பொருளும் கண்ணில் உண்டாகும் கோணங்களுக்கு இடையே உள்ள தகவாகும்.

[கோணங்களும் கோடுகளின் நீளங்களும் தெளிவாக இருக்கும் பொழுட்டு ஓர் ஒத்தாடு கதிரைக் கொண்ட ஒரு எளிய படத்திரை எடுத்துக் கொள்ளோம்] படம் 8-1-3 காண்க. பொருளருகு வெள்ளர் மத்தும் கண்ணருகு வெள்ளர்களின் ஒளியியல் மையங்கள் (Optic centres) மூன்றையே O_1 மற்றும் O_2 ஆக இருக்கட்டும்.



படம் 8-1-3

பொருள் எல்லையற்ற தொலைவில் இருப்பதால் அது கண்ணருகு வெள்ளரினோ பொருளருகு வெள்ளரினோ உண்டாகும் கோணங்

கணுக்குள் மிகுந்த வேறுபாடு இல்லை. பொருளின் முதல் ரிம்பம் (மெய் ரிம்பம்) பொருளாகு வெள்ளின் முக்கிய குவியத்திக் ஆகவது F_1 இல் கிடைப்பதாக $O_1 M_1$ அதன் குவிய தூரத்திற்கு (f_1) சமமாகும். கண்ணாறு வெள்ளிற்கு எதிரியற்ற தொலைவில் இறுதி ரிம்பம் (போஸ் ரிம்பம்) உண்டாவதாக இருந்தால் முதல் ரிம்பத்திற்கும் கண்ணாறு வெள்ளிற்கும் இடையே உச்ச தொலைவு ($F_1 O_2$) கண்ணாறு வெள்ளின் குவிய தூரம் (F_2) ஆகும்.

பொருள், பொருளாகு வெள்ளில் உண்டாகும் கோணம் α -ஆகவும், ரிம்பம் கண்ணாறு வெள்ளில் உண்டாகும் கோணம் β -ஆகவும் இருக்கட்டும்.

$$\begin{aligned} \text{உருப்பெருக்கம் (m)} &= \frac{\text{ரிம்பம் கண்ணில் உண்டாகும் கோணம்}}{\text{பொருள் கண்ணில் உண்டாகும் கோணம்}} \\ &= \frac{\beta}{\alpha} \end{aligned}$$

கோணங்கள் சிறியனாக இருப்பதால்

$$\begin{aligned} m &= \frac{\beta}{\alpha} = \frac{I_2 M_2 / f_2}{I_1 M_1 / f_1} \\ &= \frac{f_1}{f_2} \end{aligned}$$

$$\text{ஆகவது, உருப்பெருக்கம்} = \frac{\text{பொருளாகு வெள்ளின் குவியதூரம்}}{\text{கண்ணாறு வெள்ளின் குவியதூரம்}}$$

கலிலியோ தொலைக்கோக்கி (Galilean Telescope)

ஒரு சாதாரண வானியல் தொலைக்கோக்கியில் இறுதி ரிம்பம் தலைகீழாகக் கிடைக்கிறது. கலிலியோ தொலைக்கோக்கியில் ஒரு குழி வெள்ளைக் கண்ணாறு வெள்ளைப் படிப்படுத்தி, ஒரு தோள போஸ் ரிம்பம் பெறப்படுகிறது. இவ்வகைத் தொலைக்கோக்கிகளுள்ள மற்றொரு சிறப்பு யாதெனின் இதன் நீளம் குறைவு, அதன் காரணமாக ஒளியிறப்பின் அளவும் குறைகிறது.

8-2 : ஒளிக்கோட்ட மற்றும் ஒளித்திரும்புமுறைத் தொலைக்கோக்கிகள் கீழ்க்கண்டவகைகளில் வேறுபடுகின்றன.

பொருள்மீக்க ரிம்பம் கிடைக்கவேண்டுமானாலும் பொருளின் துண்ணிய பாகங்களித்தெளிவாகக் கானவேண்டுமானாலும் தொலைக்கோக்கியின் ஒளி நுழைவாயில் (aperture) பெரியதாக இருக்க வேண்டும். இதற்கு வெள்ளின் அளவு பெரியதாக இருக்கவேண்டும்.

ஆனால் பகுதிக்குப்பகுதி ஒளிக்கோட்ட எண் மாறுமல் பெரியதொரு வெள்ளம் செங்குத்து அடினமாகும்.

இந்தக் குறைபாடு பெரிய துறையாகிய கொண்ட பெரியதொரு குழியாகியுள்ளதில் அல்லவாக இல்லை. மற்றும் ஒளிக் கோட்ட எண்ணின் மாறுபாடும் அதன் விளைவாக எழும் இரட்டை ஒளிக் கோட்டமும் இல்லை.

கொண்டின் வழியே தளிக்கோட்டமுறைமில் மின்பகொண்டைப் பெறுமியோது பெரும் பகுதி ஒளி ஆற்றல் மேல் வளைதளத்தில் ஒளித் திரிப்பு முறையால் சிதறிக் சென்றுவிடுவதோடல்லாமல் வெள்ளை (கண்ணாடியானதால்) அக சிகப்பு (Infra-red) மற்றும் புற ஊதா (Ultra-violet) பகுதிகளுக்கான ஆற்றலை உட்கொண்டு விடுகிறது. எனவே மீம்பத்தின் பொலிவு வெகுமூலக் குறைகிறது.

ஒரு குழியாக (பளபளப்பாக்கப்பட்ட உலோகத்தனம்) ஒளி சேகரிப்புத்திறன் (light gathering power) அதிகமாகப் பெற்றிருப்பதாலும், ஆடியின்மீது விழும் ஒளியில் சுமார் 90% மீம்பத்தை உண்டாக்கப் பயன்படுவதாலும் கொண்டின் பொலிவான மீம்பத்தைப் பெறலாம்.

கொண்டினில் நிறப் பிரிற்சி (Chromatic aberration) மற்றும் கோளக் பிரிற்சி (Spherical aberration) ஆகியவற்றை ஓரளவுக்குத்தான் குறைக்கமுடியுமேதனின் முழுதும் நீக்க முடியாது.

ஆடியினால் உண்டாக்கப்பட்ட மீம்பங்களில் இயனிதக்குறை பாடுகள் வெகுமூலக் குறைக்கமுடியும்.

ஒரு குறிப்பிட்ட உருப்பெருக்கறும் பொலிவும் கொண்ட மீம்பத்தைப் பெறவேண்டிய கொண்டின் விலையைக் காட்டிலும் ஆடியின் விலை மிகவும் மலிவாகும்.


ஆனால் குழியாடியினால் பளபளப்பு மங்காமல் இருக்க அடிக்கடி அதைப் புதுப்பிக்க வேண்டும். மற்றும் உலோகத்தால் ஆக்கப்பட்ட குழியாக வெப்பநிலை மாற்றத்தால் பாதிக்கப் படுகிறது.

சுமார் 125 செ. மீட்டருக்கு (50 அங்குலம்) அதிகமாக ஒளி துறையாகிய இருக்கும்படியான ஒளித்திரிப்புமுறைத் தொலை நோக்கிகள் தேரிடப்படான மற்றும் முகைபட்டமுறை காட்சிப் பதிவுகட்டு மிகவும் பயனுள்ளதாகும்.

8-2-1 : கலிபோர்னியாவிலுள்ள பாலமார் மலையில் (Palomar mountain) கீழ்க்கண்ட 500 அங்குல ஹேல் (Hale) தொலைநோக்கியை உட்கொண்டுவந்ததில் மிகப் பெரியதாகும். கலிபோர்னியாவிலுள்ள லாமரில்டன் மலையிலிருந்துள்ள லிக் ஆப்ஸர்வேட்டரியில் (Lick Observatory) இருக்கும் 120" தொலைநோக்கி அதற்கடுத்த பெரிய தொன்றாகும். இந்த இரு குறைவான ஒளி துறையாவில் கொண்ட இன்னும் பல ஒளித்திருப்புமுறை தொலைநோக்கிகள் இன்று பல்வேறு உள்ளன. எரிகல் ஆப்ஸர்வேட்டரியில் (Verkes Observatory) இருக்கும் 40" ஒளி துறையாவில் கொண்ட ஒளிக் கோட்ட முறை தொலைநோக்கியே இல்லாதவையில் பெரிய தொலைநோக்கியாகும்.

8-3 ஹேட்லேயின் செக்சுடன்ட் (Hadley's Sextant)

ஒளி நெதிர்ப்பத்தின் தத்துவத்தின் அடிப்படையில் அளக்கப்பெற்றுள்ள ஹேட்லேயின் செக்சுடன்ட் என்றும் இக் கருவியானது ஏதேனும் ஓரீடத்தில் இரு புள்ளிகள் நாளும் கோண அளவைக் கண்டு அதனின்றும் விண்மீன்களின் தொலைவு மற்றும் கதிர்வன், சத்திரன், கோள்கள் முதலிய வானப்பொருள்களின் கோண விட்டம் போன்ற அளவுகளைக் கணக்கிடப் பெரிதும் பயன்படுகிறது.



படம் 8-8

இதில் OA மற்றும் OB என்னும் சம நீளமுள்ள இரு உலோகச் சட்டங்கள், O என்னும் புள்ளியில் $\angle AOB$ ஏறத்தாழ 60° இருக்கு.

மரது இணைக்கப்பட்டுள்ளன. AB என்றும் வட்ட வில் போன்ற மற்ொரு சட்டம் பாணகனாகப் பிரிக்கப்பட்டிருக்கிறது. இதை முக்கிய அளவுகோல் (Main scale) என்று கூறலாம். OV என்றும் மற்ொரு சட்டம் OAB என்றும் உலோகச்சட்ட அமைப்புக்குச் செங்குத்தாகவும், O லின் வழியே செல்லக்கூடியதுமான ஒரு அச்சுப்பற்றிக் கூறலாம் வண்ணம் அமைக்கப்பட்டுள்ளது. V என்றும் முனைவிக் ஒரு வெர்னியர் அளவுகோல் (vernier scale) இணைக்கப்பட்டு, அது OB லின் மீது வரையப்பட்டுள்ள முக்கிய அளவுகோலின் மீது நகலுமாறு அமைக்கப்பட்டுள்ளது. M_1 என்றும் ஒரு சமதள ஆடி (Index mirror) OV -லின் O -என்ற முனைவிக் OV -புடன் சேர்த்துப் போலேயே சுழலுமாறு OAB க்குச் செங்குத்தாக அமைக்கப்பட்டுள்ளது. M_2 என்றும் மற்ொரு நிலையான சமதள ஆடி (horizon glass) OA -லின் மையத்தில் ஏதத்தாழ OB க்கு இணையாக இருக்குமாறு செங்குத்தாக அமைக்கப்பட்டுள்ளது. M_1 -லின் கீழ்பாதி மட்டும் ஒளியைப் பிரதிபலிக்கத் தக்கதாகவும், மேல்பாதி ஒளிபுகும் கண்ணாடியாகவும் அமைந்துள்ளது. OB -லில் T என்றும் ஒரு தொலைநோக்கி அதன் அச்சு M_1 -லின் மையத்தில் வழியே செல்லுமாறும் M_2 -லின் செங்குத்துக் கோட்டுடன் 80° கோணம் தாங்கும்படியாகவும் அமைக்கப்பட்டுள்ளது.

OV , OB புடன் ஒன்றித்திருக்கும்போது வெர்னியர் அளவுகோல் மத்தும் முக்கிய அளவுகோல்களின் அளவுகள் பூச்சியமாக இருக்கும். இத் நிலையில் M_1 மத்தும் M_2 -லின் தளங்கள் இணையாகவும் இருக்கும். அதிரவிய செக்சுடன்டண்டின் வழியே காணும் போது M_1 அல்லது M_2 -லிக்கு முன்னால் நிறவடிசட்டிகளை (coloured filters) பயன்படுத்துவதுண்டு.

செக்சுடன்டண்டின் தத்துவம் : S_1 மத்தும் S_2 என்றும் இரு விண்மீன்கள் ஒரு புள்ளியில் உண்டாகும் அல்லது தங்கும் வேணத்தைப் பின்வரும் முறையில் கணக்கிடலாம் :

S_1 , S_2 வை இணைக்கும் தளத்தில் செக்சுடன்டண்டை வைத்துக் கொண்டு S_2 வை M_1 வினுள்ள கண்ணாடியின் வழியே நேரிடையாகத் தொலைநோக்கியில் தெரியுமாறு அதை நிறுத்திக்கொள்ள வேண்டும். பின் OV என்றும் சட்டத்தை மெதுவாகச் சுழற்றினால் (அதாவது M_1 துச் சுழற்றினால்) M_1 -ன் ஒரு குறிப்பிட்ட நிலையில் S_1 -லிருந்து வரும் ஒளிக்கதிர் M_1 , M_2 ள்கில் பிரதிபலிக்கப்பட்டு தொலைநோக்கியின் வழியே செல்லுகிறது. அதாவது இப்போது தொலைநோக்கியில் S_1 ம் S_2 ம் ஒன்றித்திருப்பதாகத் தோன்றுகிறது. இத்தகு OV -வை துவக்க நிலையிலிருந்து நிறுப்பிய கோணம் ($\angle BOV$) θ ஆக இருக்கும் M_1 மத்தும் M_2 க்கு வரையப்பட்டு

குத்துக் கோடுகள் Fஇல் சந்திக்கட்டும். OV-யின் தூவக்க நிலையில் இரு ஆகுகளின் குத்துக் கோடுகளும் இணையாக இருத்து. இப்போது M_1, θ கோணம் திருப்பப்பட்டிருப்பதால் அதன் குத்துக்கோடும் θ கோணம் திருப்பப்பட்டிரு $\angle OFM_1, \theta$ ஆகிறது. S_1 -யிலுத்து வரும் ஒளிக்கதிருக்கு M_1 -ல் α என்பது படுகோணம். மற்றும் பிரதிபலித்த கோணமாகவும் மற்றும் M_2 ல் β என்பது அதே கோணம் எனாகவும் இருக்கட்டும். $\triangle OFM_1$ -ல் $\alpha = \beta + \theta$ அல்லது $\theta = \alpha - \beta$. S_1, O -வையும் S_2, T -வையும் இழுத்துவிட அவை E-ல் சந்திப்பதாகக் கொள்வோம்.

எனவே $\triangle OEM_1$ -ல் $2\alpha = \angle OEM_1 + 2\beta$

அல்லது $\angle OEM_1 = 2(\alpha - \beta)$

$$= 2\theta$$

அதாவது $\angle S_1ES_2 = 2\theta$

அதாவது S_1 மற்றும் S_2, E -ல் தாங்கும் கோணம் OV சட்டம் திருப்பப்பட்ட கோணத்தைப் போல் இரு மடங்காகும். $\angle S_1ES_2$ -வை நெரிமையாக அறித்துக்கொள்ளும்பொழுட்டு AB சட்டத்தில் கோணங்கள் இருமடங்காக்கப்பட்ட அளவிடுகோணமேயே குறிக்கப் பட்டிருக்கும்.

மேலவரும் கணக்கிட்டின் மூலம் தூரத்திலிருக்கும் பொருள்கள் தரைக்கோட்டிலிருத்து உண்டாகும் உயரத்தை (h) செக்ஸ்டன்டின் உதவியால் கணக்கிடலாம்.

தரைக்கோட்டிலும் பொருளுக்கும் இடையே உள்ள கோணத்தை 2θ என்று அளத்து கொண்டு பொருளுக்கும் E-க்கும் உள்ள தொலைவை d -என்றும் வைத்துக்கொண்டால்

$$h = d \tan 2\theta \text{ ஆகும்}$$

d -யின் மதிப்பு நெரியாமலிருத்தால், செக்ஸ்டன்ட் 1-தொலைவு பொருளை நோக்கி நகர்த்திச் சென்று இன்னொரு முறை கோணத்தை ($2\theta_1$) அளத்தால்

$$h = (d-x) \tan 2\theta_1 \text{ ஆகும்.}$$

இவ்விரு சமன்பாடுகளிலிருத்து


$$x = h (\cot 2\theta - \cot 2\theta_1) \text{ என்றும்,}$$

அல்லது $h = \frac{x}{\cot 2\theta - \cot 2\theta_1}$ என்றும் பெறலாம்.

தரைக்குமேலே இருக்கும் ஒரு பொருளின் உயரத்தைக் கணக்கிட பொருளை S_1 ஆகவும், S_2 -வைத் தரையின் வழியாகவும் எடுத்துக்கொள்ளவேண்டும். எவ்வாறு ஓரிடத்தில் தரைக்கோடு

சரியாக திண்ணிக்க முடியாமலிருந்தால் பதரசத்தை ஒரு செயற்கைத் தளமாகக் கொண்டு, பொருளையும் பாதரசத்தில் அதன் மின்பத்தையும் மூறையே S_1 மற்றும் S_2 ஆகக் கொண்டு E -ல் S_1 , S_2 தாங்கும் கோணத்தை அளக்கவேண்டும். இதில் பாதியே உண்மையில் தேவைப்படும் கோணமாகும். சத்திரன் அல்லது கதிரவனின் விட்டத்தை அளக்க அதன் இரு விளிம்புகளையும் S_1 மற்றும் S_2 ஆக எண்ணிக்கொள்ளவேண்டும்.

8-4 : ஐஜாஸ்கோப் (Gyroscope): போகாசுல்ட் (Foucault) தானே அமைத்த ஐஜாஸ்கோப் என்ற கருவி கொண்டு மண்ணுலக திண்சரி சுழற்சியை நாம் கண்ணொளிரே பார்க்கும் வகையில் செய்து காட்டியிருக்கிறார். இக்கருவியின் அடிப்படை யான எழல் இயக்க விதி பின்வருமாறு.



படம் 8-4

ஒரு சமச்சீரான ஆகை மையப் கொண்டு ஒரு வெளியில் (Space) சுழலும் ஒரு பொருள் எப்போதும் அவ்வெளியிலே திண்மமாகச் சுழன்றுகொண்டே இருக்கமுடியும்; அதாவது அது இயங்கும் அச்ச, திணமாகவு இருக்கமுடியும். இதுதான் தன்

திசையாமுமல் உள்ள ஒரு சமச் சீர்தசை மையம் கொண்டு மண்ணுலகம், திசைச் சுழன்று வரும் இயல்பான நிலையம்.

8-4-1 : ஐஜாஸ்கோப்சிச் பகுதிகளும் அவற்றின் சுழற்சிகளும்

1. புறத்தே A என்ற வளைபுத் துருத்தளத்தில் S என்ற நிலை மேட்டில் நிறுத்தப்பட்டிருக்கிறது.

2. B_1 -ம் C_1 -ம் இரண்டு உள்வளைபுக்கள். B என்ற வளைபுத் A_1 A_2 என்ற ஆச்சில் சுழலக்கூடும்; C என்ற வளைபுத் B_1 B_2 என்ற ஆச்சில் சுழலக்கூடும்.

3. D என்ற ஒரு சக்கரம் PP' என்ற ஆச்சில் சுழலக்கூடும்.

4. எனவே PP' என்ற ஆச்சு எந்தத் திசையிலும் நிறுப்பி வைக்கக்கூடிய அமைப்பில் உள்ளது.

5. அப்போது நாம் வேண்டும் திசையில் PP' -ஐ நிலை நிறுத்திய பின்னர், D என்ற சக்கரத்தை ஒரு மின்சார மேட்டாபோடு இணைத்து வேகமாகச் சுழலச்செய்தால் PP' என்ற ஆச்சின் திசையாமுமல் அச்சக்கரம் சுழன்றுகொண்டே இருக்கும்.

போட்டோகிராட் ஆச்சு PP' -ஐ வட்டவடிவப் பக்கமாக நோக்கும் படி வைத்து D என்ற சக்கரத்தை வேகமாகச் சுழற்றிவிட்டபோது, PP' திசையாமுமல் சுற்றிக்கொண்டேயிருக்கிறது. PP' ஐ ஒரு மின் மின் திசையில் நிலைநிறுத்தி, அச்சக்கரத்தை வேகமாகச் சுழற்றி விட்டால், அப்போது அவ்வச்சு, அவ்விண்ணோடு சுற்றி வந்ததைக் கண்டால், எப்போதும் அவ்விண்ணின் நோக்கியே PP' இருக்குவதற்கு. இவ்வாறு மண்ணுலகம், தூதவ ஆச்சு மையம் கொண்டு தன்னைத்தானே சுழல்கிறதெனவும், விண்மீன்கள் விண் வெளியில் நிலைத்திருக்கின்றனவெனவும், மண்ணுலக திசைச் சுழற்சியின் விளைவாகவே விண்மீன்கள் வானவெளியில் சுற்றி வரும் நோற்றம் நமக்குத் தெரிகிறதெனவும் அக்கருவி கொண்டு போட்டோகிராட் விளக்கினார்.

5-5 : வானியல் கடிகாரம் அல்லது நிகர்வழிக் கடிகாரம் (The Astronomical or sidereal clock) : இந்த கடிகாரம் சாதாரண கடிகாரம் போன்றதுதான். ஆனால் இது துட்பமாகக் காலம் காட்ட வேண்டியிருப்பதால், தட்ப வெப்பநிலை மாறுதல்களால், இது காட்டும் காலம் தவறுதிருக்கவேண்டிய முறைகளில் அமைக்கப்பட்டிருக்கிறது. இவ்வமைப்பின் அடிப்படை யாதெனில், தட்ப வெப்ப மாறுதல்களால் ஏற்படும் வேறுபாடுகள், கூர்மறி கொண்ட யுனித் திறத்தால் சரிசெய்தப்படுகின்றன.

வாறுபடித் தகுதிகள்

ஹரிசன் (Harrison) புனைந்த கிரிடையர்ஸ் (Gridiron) ஊசலையும், கிரஹம் (Graham) புனைந்த பாதரச ஊசலையும் மேற் கூறிய அடிப்படையில் சரிசெய்துகொடுக்கக் கூடிய ஊசலிகள் (Compensating Pendulums).

இவ்வகைப்படுத்தலின் கீழ்ப்படி யாதெனின் எல்லா தட்டை வெட்டி நிறுத்தலும், ஆலை வலயத்திற்கும் (Centre of Oscillation) தொங்கல் வலயத்திற்கும் (Centre of Suspension) உள்ள தூரம் ஒரு மாநிலியாக இருக்கும். எனவே ஆலை நேரம் மாநிலியாகி விடுகிறது.

தட்டை வெட்டி மாறுதலின் விளைவுகளைக் கூடிய அளவு குறைக்கும் வகையில், துத்தநாகம் எஃகு கலப்பை உலோகத்தாகக் ஊசலிகள் ஆமைப்படுத்துண்டு ஆலையை இன்வார் (Invar) எனப்படும் எஃகு திடீர்த் கலப்பை உலோகத்தாலும் ஊசலிகள் செய்வதுண்டு. இன்னும் ஒன்றைச் சரித்தவராக, இக்கடிவாரம் தட்டை வெட்டி மாறுதல்களால் பெரிதும் பாதிக்கப்படாமல், பூமிக்குக் கீழ் ஒரு குகையறையில் வைக்கப்படுகிறது.

இக்கடிவாரம் 0 மணி முதல் 24 மணி வரையில் காலம் காட்டும். கடிவாரமுகம் 0 முதல் 24 வரை எண்கள் தாங்கியிருக்கும். இவ்வாறியல் கடிவாரம் மீள்வழிக்காலம் காட்டுவதற்கென ஆமைக்கப்படுகிறது. மேடமுதற்புள்ளி (r) உச்சி கடக்கும்போது இக்கடிவாரம் 0 ம 0 நி 0 வி காட்டும். அதாவது மணி முள்ளும் திமிட முள்ளும் 24 என்ற எண்ணில் ஒருங்கமைத்திருக்கும். மறு படியும் அடுத்து மேட முதற்புள்ளி உச்சிகடக்கும்போது இக்கடிவாரம் 24 ம 0 நி 0 வி காட்டும். இத்தக்கால இடைவெளி (அதாவது அடுத்தடுத்து γ உச்சிகடக்கும் சமயங்களுக்குக்கிடையே பட்டது) 24 சமபாகங்களாகப் பிரிக்கப்பட்டு, ஒவ்வொரு இடைவெளியும் ஒரு மீள்வழி எனப்படும்.

60 மீள்வழி வினாடிகள்	= 1 மீள்வழி நிமிடம்
60 மீள்வழி நிமிடங்கள்	= 1 மீள்வழி மணி.
24 மீள்வழி மணிகள்	= 1 மீள்வழி நாள்.

இம்மண்ணுலகம் தள்ளித்தானே விண்மீன்கள் பின்னணியில் ஒரு முழுச்சுற்று சுழன்றுவதும் காலம் ஒருமீள்வழி நாளாகும். இம் மண்ணுலகம் சுற்றுவளைச்சுற்றி, விண்மீன்கள் பின்னணியில் ஒரு முழுச்சுற்று சுற்றிவரக்கூடிய காலம் ஒருமீள் வழி ஆண்டு எனப்படும்.

இக்கடிவாரப்படி, γ வானகோளத்தில் மேற்புள்ளியில் (W) சுழன்றுபோது மீள்வழி மணி 6 ; γ வானகோளத்தில் தொடுவானத்

திற்குக் கீழ் அடிவானத்தில் உச்சி கடக்கும்போது மின்வழி மணி 12. 7, கீழ்ப்புகளினிமி (E) உதயமாகும்போது மின்வழி மணி 18; உச்சி கடக்கும்போது 24 மணி; ஒரு மின்வழி நாளொழுத்து அடுத்த விண்மீன் தான் ஆரம்பிக்கிறது. இது மின்வழி நண்பகலெனப்படும்.

சாதாரண கடிகாரத்தில் ஓர் அளவு அலைவுக் காலம் (vibration) அளவு வினாடிக்காலம்; முழு அலைவுக் காலம் (oscillation) ஒரு வினாடிக்காலம். ஆனால் விண்மீன் கடிகாரத்தில் ஓர் அளவு அலைவிற்கு ஒரு வினாடிக்காலம் என்ற காலையில், விண்மீன் கடிகாரம் இயற்றப்பட்டிருக்கிறது. $1 = 1 + 2$ என்ற வாக் பாட்டின் படி, ஒரு விண்மீன் உச்சி கடக்கும்போது இக்கடிகாரம் காட்டும் காலம், அளவிண்மீனின் வல ஏற்றமாகும். ஒரு குறிப்பிட்ட சமயத்தில் காட்டப்படும் காலம், அந்த சமயத்தில் γ -ன் நேரக் கோணமாகும்.

γ ஐ இடங்குறிக்கும் முறை, பகுதி 10 இல் விளக்கப்பட்டிருக்கிறது; ஒரு விண்மீன் உச்சி கடக்கும் மின்வழி நேரத்தை அறியும் முறை இப்பகுதியில் 5-8 இவற்றுக்கு 5-5-8 வரை விளக்கப்பட்டிருக்கிறது.

மிகவும் துட்பமாக இக்கடிகாரம் செயல்பட்டிருந்தாலும், இதற்குச் சில குறைகள் ஏற்படலாம். நமது பொது வழக்கிலுள்ள கடிகாரங்கள் சற்று வேகமாகவோ, சற்று வேகம் குறைவாகவோ, ஒருவதாக ஏற்படும் பிழைகள், விண்மீன் கடிகாரங்களிலும் ஏற்படலாம். (மிக துட்பமாகவும், இறை பிசகாத வகையிலும் செயல்படுவதாகப் பெரும் பிழைகள் ஏற்பட வாய்ப்புகள் இல்லாவிடினும், சிறுபிழைகள் ஏற்படக்கூடும்). ஒரு குறிப்பிட்ட சமயத்தில் சரியான காலம் அறிய, கடிகாரம் காட்டும் காலத்திற்குக் கூட்டவேண்டிய திருத்தம், கடிகாரப் பிழை (error of the clock) எனப்படும். (சில சமயங்களில் பிழை அளிக்கப்பட வேண்டியிருக்கும்). சில கடிகாரங்கள் ஒரு தாளிக்கு x ன் வீதம் வேகமாகவோ, அல்லது x ன் வீதம் வேகம் குறைவாகவோ போகலாம். இந்த x என்பது, கடிகாரத்தின் வேக வீக்கம் (rate of the clock) ஆகும். இந்த வீக்கம் ஒரு சீராக இருக்கும்வரையில் இடைபூறுகள் ஏற்படா.

8-5-1: கிரீனிச் கடிகாரம் (Chronometer Greenwich Watch)

கிரானுபீட்டர் எனப்படும் இக் கடிகாரம் மிக துட்பமாகச் செயல்பட்ட ஒரு பெரிய கடிகாரத்தான். இது 'கிரீனிச் காலம்' காட்டும். இதன் துடிப்பியக்கச் சக்கரம் (balance wheel) தட்ப வெப்ப நிலை மாறுவதிலும் ஏற்படும் விளைவுகளைச் சரிசெய்க.

கொள்ளும் வகையில் புனையப்பட்டிருக்கிறது. (விசுவான வினாக்கம்: மற்ற நாட்களில் காண்க). கப்பல் மாலுமிகளுக்கு இக்கடிசாரம் மிகவும் தேவைப்படுகிறது. சிறு சிறு கைமுனைத் தனிக்கட, ஒவ்வொரு கப்பலிலும் மூன்று, நான்கு கடிசாரங்கள் இருக்கும். அவைகூட்டும் சராசரி தேரத்தில் மிகை இராமு. தனது தந்திரமிட மாலுமிகளுக்கு, நான்கு இருக்கு மிடத்தை அறித்துக்கொள்ள (இருக்கும் இடத்தில் அகலாங்கு, நெட்டாங்கு கணிக்க) கிரீனிச் காலம் மிகவும் இன்றியமையாதது. கப்பலில் இக்கடிசாரம் ஆடாமு அசையாமு மட்டமாக இருப்பதற்காக 'கிம்பாங்கு' எனப்படும் ஓர் ஆச்சிசியேல் பொருத்தப்பட்டிருக்கும். திரைநிலை இருக்கும் போது, உலர்ந்த இடத்தில் எச்சரிக்கையாகப் பொருத்தப் பட்டிருக்கவேண்டும்.

எவ்வளவு வானியல் ஆய்வுக் கூடங்களிலும் கிரீனிச் கடிசாரம் கூட்டாவும் இருக்கும். சிறப்பாக, பூமி ஆதிச்சியைல் பாதிக்கப்படும் நாடுகளில், இது மிகவும் இன்றியமையாததாகும்; ஏனெனில் சிறு சிறு பூமியதிச்சிகளால் கூட ஊசலியோடுள்ள கடிசாரங்கள் பாதிக்கப்படுகின்றன.


கிரானுமிட்டரை திரிமாணித்தவர் தவாரிஸன்; இவர்தாம் 'கிரிடையர்' ஊசலியையும் வழக்கில் கொண்டு வந்தவர். கிரானுமிட்டர்கள் கிரீனிச் காலம் காட்டும்—அதாவது 0° நெட்டாங்கு உள்ள இடத்தில் உள்ள காலமாகும்.

வானியல் ஆராய்ச்சியில் காலம் காணல் மிகத் துல்லியமாக விருக்கவேண்டியிருப்பதால், எத்தனையோ கூர்மையான புனையுமர்புகள் செய்து, சரியான காலம் காட்டும் கடிசாரங்கள் செய்யப்படுகின்றன. வளி அறக்கம், தட்ப வெப்ப நிலை மூலவிய வற்றின் விளைவாக ஏற்படும் குறைக்கெனிலைம் தீக்கப்பட்ட கடிசாரங்கள் செய்யப்படுகின்றன.

8-6: உச்சி கடத்தல் காண் தொலைவோக்கி: (The Transit Instrument):

இதன் பெயர் அறிவிப்பது போல, விண்மீன்கள், மற்ற வளி பொருள்கள் உச்சி கடக்கும் நேரம் அறிவ இக்கருவி பயன்படுகிறது. இது ஒரு நிலையான வானியல் கூடத்தில் நிலைநிறுத்தப் பட்டிருக்கும். சரியானபடி, கிடையாக (horizontally) கீழ்க்கு மேலாகப் பொருத்தப்பட்ட உட்புறமுள்ள உருளை (hollow cylinder) E-ன் மத்தியில் T-என்ற ஓர் ஒளிக்கூட்டத் தொலைவோக்கி உருளைவின் அச்சுக்குச் செங்குத்தாக அமைப்பது கெட்டியாக இணைக்கப் பட்டிருக்கிறது. உருளைவின் அச்சு, சரியான

கிழக்கு மேற்கில் இருக்கும். உருளைவின் இரு முனைகளும் உடையதிலே தாங்கக் கடைய Y-வடிவமுள்ள இரண்டு தாங்குதளம்




படம் 8-8

களில் வைக்கப்பட்டிருக்கும். இவ்விரு 'Y' களும் முற்றிலும் ஒரே மாதிரியாக இருக்கும். இரண்டு சம உயரங்களுள்ள தூண்டலின் (PP) மேல் இவ்விரு 'Y' களும் பதிக்கப்பட்டிருக்கும். 'Y' களில் உடைய அறிவுநிலையம் இருக்கும்வகையில், ஒருபுனைவு ஏற்பாடு செய்யப் பட்டிருக்கும். அக்க பலமாக இருக்கவேண்டும். தொலை நோக்கிக் குழாய் வளைவு, தெளிவு ஏற்படாவண்ணம் அழுத்தமாக இருக்கவேண்டும். Y-களில் பொருத்தும் பளுதகக் சரியான உருளைகளாக இருக்கவேண்டும்; அவை சமமாகவும் ஒரே அச்சமடைய தாங்கும் இருக்கவேண்டும். இவ்வளவு பண்டுகளும் இருந்தால் தான், துண்டாட்சி அளவைகளில் பிறகு ஏதும் ஏற்படாது.

இப்படிப் பதிக்கப்பட்ட அச்சை மையம் கொண்டு, அத்தொலை நோக்கி சுழலும்போது, அது உச்சி வட்டத்தில் சுழல்கின்றது. அதாவது, அத்தொலைநோக்கியின் வழியாக வானகோள உச்சி வட்டத்தில் வந்து கடக்கும் வின்பொருள்கள் வரவும் காட்சிக்குக் கிடைக்கும். பொருள்களு ளென்கின் (காட்சி விக்கியின்) (Focal plane of the objective glass) குவிமையத் தளத்தில்,

ரெட்டிகிள் (reticle) எனப்படும் ஒரு வட்டப் பின்னல் வரி F வகைப் பட்டிருக்கிறது.



படம் 8-6 (1)


படம் 8-6 (1) காண்க. இவ் வட்டத்தில் ஒற்றைப் படை செக்குத்துக்கம்பிகள் சமதூரங்களில் (5 அல்லது 7) பதிக்கப் பட்டிருக்கின்றன; மத்தியில் இருக்கும் கம்பி, செக்குத்து விட்டத் தோடு பொருத்தியிருக்கிறது. மேலும் இரண்டு கிடைக்கம்பிகள் (horizontal wires) பதிக்கப்பட்டுள்ளன. அவற்றுள் ஒன்று (H) கிடை விட்டத்தோடு ஒரேயே நிலையாகப் பொருத்தப்பட்டுக்கிறது; மற்றொன்று H_1 , நிலையாகப் பொருத்தப்பட்ட கம்பிக்கு இரண்டாக மேலும் கீழும் நகர்த்தும் வகையில் அமைக்கப்பட்டு இருக்கிறது. நகர்த்துவதற்கு ஒரு துள் அளவை மாணித் திருவணி, M (micrometer screw head) உதவி செய்கிறது. பெரும்பாலும் காட்சி ஆய்வுகள் இரண்டு செய்வவேண்டியிருக்கும். ஆகலாக, EW -க்கருகில் வரையான ஓட்டத்தில் ஒரு விளக்கு அமைத்து அங்கு ஒரு சமதள ஆடி (Plane Mirror) வைத்து அங் வெளிச்சம் வாயிலாக ரெட்டிகிள்களில் உட்காண் செல்லிய கம்பிப் பகுதியை ஒளிபெறச் செய்யலாம்.

8-6-1 தொலைதோக்கிவின் கேள் வரிப்பாடு (Line of Collimation): மிகச் சரியாக இக்கருவி அமைக்கப்பட்டிருக்குமானால், காட்சி விசையின் ஒளியமைப்பை (Optical centre) நடு செக்குத்துக் கம்பியின் வாயத்தோடு இணைக்கும் நேர்க்கோடு, நாம் தொலைதோக்கியைச் சுழற்றும்போது உச்சி வட்டத்தில் சுழல்கிறது. இக் கோட்டிற்குத் தொலைதோக்கிவின் நேர்வரிப்பாடு (line of collimation) எனப் பெயர்.

8-5-2 : கால வரிப்படம் (Chronograph)

உச்சிக் கடத்தல் கால தொலை நோக்கிகொண்டு மின் மீள்கள் உச்சி கடக்கும் சமயத்தைப் பதிவு செய்வதற்காகத்தானே இயங்கும் சில பொறி அமைவுகள் செவ்வப்பட்டிருக்கின்றன. (இப் பொறி அமைவு மின்னல் தாம் காண இருக்கும் திசை உயர மாணி (alt. azimuth) என்ற கருவியிலும் பயன்படுத்தப்படும்). ஒரு 40 செ.மீ நீளம், சில செ.மீ. விட்டமுள்ள உருளைவச் சுற்றி ஒரு காகிதம் சுருட்டப்பட்டு, மின்னியல் சாதனம் ஒன்றோடு இணைக்கப் பட்டிருக்கிறது. இச் சாதன உதவியால் ஆக்காகிதத்தில் ஒரு வினாடிக்கு ஒரு முறை, அல்லது 2 வினாடிகளுக்கு ஒருமுறை ஒரு குறிவிடம் வகையில் ஒரு பேரூ பெருகுத்தப்பட்டிருக்கிறது. ஒரு மின்மீளை உற்று நோக்கிக்கொண்டிருக்கும் காட்சியாளன், அம்மீள ஒள்கொரு (ஒட்டிகளில் உள்ள) கம்பி கடக்கும்போதும் ஒரு தட்டு தட்டுகிறான். அது மின்னியல் சாதன உதவியால், ஆக்காகிதத்தில் ஒரு குறிவாக இடம் குறிக்கப்படுகிறது. சோதனை முடிந்தவுடன், ஆக்காகிதத்தை எடுத்து, பதிவு செவ்வப்பட்ட குறிக்கை கொண்டு, தனக்கு வேண்டிய கால அளவுகளைக் குறித்துக் கொள்கிறான்.

ஒரு கால வரிப்படம் காசிதத்தில் வரையப்பட்ட வகையில் மின்னல் காட்டப்பட்டிருக்கிறது.



(1), (2), (3), (4), (5), (6) என்ற குறிகள் காலக் குறிப்பவை.

S_1 S_2 S_3 S_4 S_5 என்ற குறிகள் மின்மீள ஒள்கொரு கம்பியைக் கடக்கும்போதும், காட்சியாளன் தட்டிய காரணமாக இடப்பட்ட குறிகள். முதல் கம்பியைக் கடக்கும் சமயமும் 10-55-0 என்ற மணிமூலம் இணைத்திருக்கின்றன. எனவே முதல் கம்பியைக் கடந்த நேரம் 10ம 55நி 0வி. S_1 —இரண்டாவது கம்பியைக் கடந்த சமயம் 10ம 55நி 2வி. க்கும் 10ம 55நி 4வி. க்கும் இடைப்பட்ட நேரம்; (3)→(S_3)ஐ அளந்து அச்சமயம் என்ன நேரம் என துடயமாகக் கணிக்கலாம் [(3) முதல் S_1 வரை நீளம்].

8.6.3: உச்சிக் கடத்தல்வான் தொலைநோக்கியில் மின்வழிப் பிழைகள் ஏற்படலாம். அவற்றை முதலிலேயே கண்டு, மின்னாச் சாட்சி முடிந்ததேற, வேண்டிய திருத்தங்கள் செய்துகொள்ளலாம்.

(1) மட்டப்பிழை (Level Error): *EW*-சீவன கிடைவாக (horizontal) இல்லாததன் விளைவாக ஏற்படும் பிழை.

(2) தேக்கிப் பட்டுப் பிழை (Collimation Error): தேக்கிப்பாடு, *EW*க்குச் செங்குத்தாக இல்லாததன் விளைவாக ஏற்படும் பிழை.

(3) திருப்பப் பிழை அல்லது தொடுவான தூரப்பிழை (Deviation Error or Azimuth Error): *EW*, கிழக்கு தேற்கில் இல்லாத காரணத்தால் ஏற்படும் பிழை. இவைகளுக்குரிய பிழை திருத்தங்கள் அதித்து சாட்சியாளன் தான் பதிவு செய்திருக்கும் அளவைகளுக்குத் திருத்தங்கள் செய்துகொள்ளவேண்டும்.

B.7: உச்சி வட்டம் (The Transit Circle or Meridian Circle)

முன்னர் தாம் கண்ட உச்சி கடத்தல் வான் தொலைநோக்கியோடு, நுள்புடனாக அளவுக் கூறுகள் குறிக்கப்பட்ட ஒரு வட்டம் (Graduated circle) இணைக்கப்பட்ட ஒரு கருவியே உச்சி வட்டம் என்ற கருவியாகும். உச்சி கடத்தல் வான் தொலைநோக்கி கொண்டு விண்ணீன்கள் உச்சி கடத்தல் நேரத்தை மட்டுமே தாம் பதிவுசெய்யமுடியும். உச்சி வட்ட உதவியால் அது மட்டுமன்றி விண்ணீன்களின் நடுவரை விளக்கம் அல்லது கடதுருவ தூரம் காணமுடியும். இதற்காக, அளவுக் கூறுகள் குறிக்கப்பட்ட ஒரு வட்டம், தொலைநோக்கியோடு சுழலும் வாகையில், செட்டியாக அச்சில் இணைக்கப்பட்டிருக்கிறது. இவ் வட்டத்தின் அச்சம், உருளைவின் அச்சம் ஒன்றே. படம் 5-6 இல் G. C. என்பது இப்பொழுது சொல்லப்பட்ட அளவுக் கூறுகள் கொண்ட வட்டமாகும்.

தான் ஒன்றின்மேல், அளவுக்கூறுடைய வட்டத்தைப்போல மற்றொரு வட்டம் (அதே அளவுடையது), அதே உயரத்தில் நிலைநிறுத்தப்பட்டிருக்கிறது. பின்கூறிய வட்டத்தின் வரம்பில் சம இடைவெளிகளில் 6 பூதக் கண்ணாடிகள் (microscopes) பொருத்தப் பட்டிருக்கின்றன. சற்று குறைந்த உருப்பெருக்க ஆற்றலுள்ள (Low magnifying power) மற்றோர் பூதக் கண்ணாடியும் இத்தக குத்து வட்டத்தின்மேல் பொருத்தப்பட்டிருக்கிறது. இப்பூதக் கண்ணாடிக்குச் சுட்டிக் காட்டி (Pointer) எனப் பெயர்.

அச்ச சுழலும்போது, அநோடு, தொலைநோக்கியும், அளவுக் கூறு வட்டமும் அப்படியே சுழலும். சுழலும்போது, அளவுக் கூறு வட்டத்தின் மேலுள்ள அளவுக் கூறுகள், பூதக் கண்ணாடிக்கு மூன்று ஓடுவதாக, அப்பூதக் கண்ணாடிகளின் குவிமையத் தளத்தில் உருப் பெருக்கம் பெற்றது தோன்றும்.

வேண்டிய விண்மீன் காட்சிக்குக் கிடைத்ததென்பு, விண்மீன் கிடைக் கம்பிக்கு அருகில் வரும்வரை காத்திருத்து அருகில் வந்தவுடனே, தொலைநோக்கியை அதே நிலையில் இறுக்கிப் பிடித்துக் காட்சியாளன் நிலைதிறுத்திடவேண்டும். மின்னச் பூதக் கண்ணாடிகளிலுள்ள திருகாணியைத் திருவி செங்குத்துக் கம்பியும் கிடைக்கம்பியும் வெட்டும் இடத்தில் விண்மீன் காட்சியளிக்கும் படி செவ்வியவேண்டும். தொலைநோக்கியை இறுகப் பிடித்து நிலை திருத்திவிட்டபடியால், இப்போது மூதல் வட்டத்தில் காட்டப் பட்ட அளவை, பூதக் கண்ணாடிகள் வழியாக அறித்து, தேவைப் படி, அகிவனவுகளின் சராசரியைக் கண்டால் நமக்குத் திருத்தமான அளவு கிடைக்கும். இப்போது, அந்த வட்டத்தில் பதிவான அளவைக் கொண்டு, நடுவரை விவக்கம் காண, நமக்கு மத்தேய அளவு வேண்டும். அதாவது, தொலைநோக்கியின் தேர் வரிப்பாடு ஒரு குறித்த திசையில் இருக்கும்போது, வட்டத்தில் பதிவாகும் அளவு வேண்டும்.

8.7.1 : உச்சிப் புள்ளிப்பதிவு : தேர் வரிப்பாடு உச்சியை நோக்கியிருக்கும்போது, வட்டத்தில் காணப்படும் பதிவு உச்சிப் புள்ளி (zenith point) எனப்படும்.

கீழ் உச்சிப் புள்ளிப் பதிவு : தேர் வரிப்பாடு, கீழ் உச்சியை நோக்கியிருக்கும் போது, வட்டத்தில் காணப்படும் பதிவு, கீழ் உச்சிப்புள்ளி (Nadir point) எனப்படும்.

துருவப் புள்ளிப்பதிவு : தேர்வரிப்பாடு, வடதுருவம் நோக்கி யிருக்கும் போது, வட்டத்தில் காணப்படும் பதிவு, துருவப்புள்ளி (Polar point) எனப்படும்.

கீழ் உச்சிப் புள்ளி : தொலைநோக்கியின் அடியில், அதாவது இரண்டு தூண்டுகுக்கு மிடையே ஒரு பாதரசம் நிறைந்த தட்டம் ஒன்று வைக்கவும். இப்போது தொலைநோக்கியைச் சுழத்தி, ரெட்டிக்கிளவில் உள்ள மையக் குத்துக் கம்பியும், பாதரசத்தில் விழும் அதன் சிதறும் ஒருங்குமாறு தொலைநோக்கியை வைக்கவும். அப்போது தேர் வரிப்பாடு கீழுச்சியை நோக்கி இருக்கும். இப்போது அளவுக்கூறு வட்டம் காட்டும் அளவு, கீழுச்சிக் குவிய அளவாகும். இந்த அளவே கீழுச்சிப்புள்ளி என

வரையறுக்கப்படும். இந்த அளவுக்கு 180° ஐக் கூட்டினாலோ, கழித்தாலோ மேல் உச்சிக் குரிய அளவு பெறப்படும். இந்த அளவு உச்சியுள்ளி எனப்படும்.

துருவப் புள்ளிப் பதிவு: தொலைநோக்கியைக் கொண்டு, ஒரு 'மதறயா விண்டின்' இருமுறை தொடுவானத்திற்கு மேல் உச்சி கடக்கும்போது, அளவுக் கூறு வட்டத்தில் காட்டப்படும் அளவுகளைக் குறித்துக்கொண்ட, மதறயா விண்டின் உச்சி கடக்கும், திசைகளுக் கிடைப்பட்ட நோணத்தைத் துருவத்தின் திசை இரு சம பகுதிகளாகப் பிரிப்பதால், இவ்விரு அளவுகளின் சராசரி, துருவப் புள்ளிக் குரிய அளவாகும். இத்தச் சராசரி அளவே துருவப்புள்ளி (Polar point) என வரையறுக்கப் படுகிறது.

முதலில் நாம் வேண்டிய விண்டினைக் காட்சிக்குக் கொண்டு வந்து, அங் விண்டின் செங்குத்துக் கம்பியும் கிடைக்கம்பியும் வெட்டுமிடத்தில் நோன்றுப்போது, அளவுக் கூறு வட்டம் காட்டும் அளவைப் பதிவு செய்திருக்கிறோம். ($\dots 8 \cdot 7 \dots$ காண்க). இத்தப் பதிவு C_1 எனக் கொண்க; துருவப் புள்ளி C_2 எனக் கொண்க, C_1 என்பது 90° நடுவரை விலக்கத்திற்குப் போகுத்து, மாநளின், அதையொட்டி, C_1 ன் மதிப்பறித்தால், அதுவே, விண்டின் நடுவரை விலக்கமாகும்.

எடுத்துக்காட்டாக,

விண்டின் காட்சியின்போது வட்டப்பதிவு C_1 .

துருவப்புள்ளி C_2 .

$$C_2 + x = 90$$

$$\therefore x = 90 - C_2$$

எனவே நாம் எடுத்துக் கொண்ட விண்டின் நடுவரை விலக்கம், x எனக் கொண்டால்

$$C_1 + x = 90 \text{ எனப் பெறப்படும்.}$$

$$\therefore 90 = C_1 + 90 - C_2$$

$$= 90 - (C_2 - C_1)$$

$$= 90 - \text{வடதுருவ தூரம்}$$


எனவே $(C_2 - C_1) = \text{வடதுருவ தூரம்}$ எனவும் கணிக்கலாம். அவ்வாறே உச்சிப் புள்ளி C_2 என நாம் வட்டப் பகுதியில் பெறுவதாகக் கொள்வோம். $|C_1 - C_2|$ ன் மதிப்பு, அங்விண்டின் உச்சிக் கடக்கும் சமவத்திலுள்ள உச்ச தூரம் ஆகும்.

எனவே உச்ச வட்டம் உதவி கொண்டு, ஒரு விண்மீனின் நடுவரை விலக்கத்தையும், அது உச்சிக் கடக்கும் சமயத்திலுள்ள உச்சி ஓரத்தையும், அளவுக் கருவட்டப் பதிவளவுகளைக் கொண்டு கணிக்கலாம்.

கதிரவன், சந்திரனுடைய மையத்தின் நடுவரை விலக்கம், உச்சி கடக்கும் சமயத்திலுள்ள உச்சி ஓரம் கணிக்கவேண்டுமானால், கதிரவன், சந்திரனுடைய மேல் பகுதி அல்லது கீழ்ப்பகுதி உச்சி கடக்கும் சமயத்தில், விண்மீனுக்குச் செவ்வாய்போல் அளவுக் கரு வட்டப் பகுதிகளைக் கொண்டு, கணிக்கப்படவேண்டிய அளவுகளைக் கண்டு, அவற்றோடு, கதிரவன் அல்லது சந்திரனது கோண அரைவட்டத்தைக் கட்டியோ கழித்தோ அவற்றின் மையங்களின் நடுவரை விலக்கமோ அல்லது ஏதிரமோ அறிவலாம்.

8.7.2: மூலக் குத்து வட்டக்கருவி (The Prime Vertical Instrument): உச்சிக் கடத்தல்களை தொலைநோக்கிகள் ஆகவாதெற்கு - வடக்காகத் திருப்பி வைத்தால், தொலைநோக்கிகள் தேர்வாகிப்பாடு, மூலக்குத்து வட்டத்தில் கழுவும். எனவே விண்மீன் மூலக்குத்து வட்டத்தைக் கடக்கும்போது விண்மீன் காலத்தையும், அச்சமையமுள்ள உச்சி ஓரத்தையும் காணலாம்.

8-9. கடுவரைத் தொலை நோக்கி



படம் 8-9.

வானியல் கருவிகள்

(The Equatorial) : இதுவரை நாம் கண்டவாணியல் கருவிகள் வாயும், உச்சி கடக்கும் நேரம் அல்லது மூலக்குத்து வட்டம் கடக்கும் நேரம் காணவும், வான் பொருள்களின் ஏற்றம் அல்லது நடுவரை நிலக்கம் காணவும்தான் பயன்படும். இக்கருவிகள் கொண்டு வான்பொருள்களைச் சிந்து நேரத்தின் காட்சியில் வைத்து இருக்கமுடியும். (சில வினாடிகள் மட்டுமே). ஆனால் சில சமயங்களில், எடுத்துக்காட்டாக, கிரகண சமயத்தில், நாம் ஒரு விண்மொருளை தெருநேரம் காட்சியில் வைத்து இருக்கவேண்டிய தேவை ஏற்படுகிறது. இதற்காகத் தொலைநோக்கியை நாம் நடுவரை உயர்த்தியில் (Equatorial Mounting) வைக்க வேண்டியிருக்கிறது. படம் 8.9 பார்க்க.

மூலக் கோட்பாடு (Fundamental Principle)

மண்ணுலக துருவ நிலையில் ஓர் அச்சப் பொருத்தப்பட்டிருக்கிறது. அச்சத்தின் சுழல்கள் கூடியது. மண்ணுலகம் தன்னைத் தானே சுற்றுவதும் அச்சக்கு இணையான திசையுடையது. இது துருவ அச்ச (Polar axis) எனப்படும். இந்த அச்சோடு கெட்டியாக இகத்துச் செங்குத்தாக மற்றொரு அச்ச இணைக்கப்பட்டிருக்கிறது. (மூலக் அச்ச, தனது தங்கு தளத்தில் சுழலும்போது இரண்டாவது அச்சம் அதற்கு எப்போதும் செங்குத்தாகவே அதனுடன் சுழலும்). இரண்டாவது அச்ச, நடுவரை நிலக்க அச்ச (declination axis) எனப்படும். இரண்டாவது அச்சின் முனையில் ஒரு தொலைநோக்கி இணைக்கப்பட்டிருக்கிறது. தொலை நோக்கியின் ஒளி அச்ச (optical axis) இரண்டாவது அச்சக்குச் செங்குத்தாகப் பொருத்தப்பட்டிருக்கிறது. தொலைநோக்கியை இரண்டாவது அச்சின் மையமாகச் சுழற்றலாம். முதலிரண்டு அச்சகளை முதறவாகச் சுழற்றி, எந்த விண்மீனையும் தொலைநோக்கியின் காட்சிக்குக் கொண்டு வரமுடியும். கடினாரம்போலவே தானாகவே ஒழுங்காக இயலும் ஒரு பொறி அமைப்பு கொண்டு துருவ அச்சைப் பூமியின் வேகத்திற்குச் சமமான வேகத்தில் சுழல வைக்கலாம். எனவே, பூமியின் சுழற்சியின் விளைவு முதற்றிலும் சரிக்கட்டப்படுகிறது. விண் பொருள்கள் எக்லிப்தைத் தாங்குகளிலிருப்பதால், இப்பொறியமைப்பின் விளைவாக எப்போதும் ஒரு குறிப்பிட்ட விண் பொருளை, தொலை நோக்கியில் தாமது காட்சியிலேயே வைத்திருக்கலாம்.


துருவ அச்சில் ஓர் அளவுக் கூறுடைய வட்டம் பொருத்தப் பட்டிருக்கிறது. அளவுக் கூறுகள், மணி, நிமிடம். இவ்வட்டம் மணி-வட்டம் அல்லது ஹை ஏற்ற வட்டம் (H.C.), எனப்படும்.

நடுவரை நிலக்க அச்ச கிடை நிலையில் உள்ளபோது, தொலை நோக்கி உச்சி வட்டத்தின் இருக்கும். அப்போது துருவ அச்சில்

அமைத்திருக்கும் அளவுக் கூறு வட்டத்தோடு இணைக்கப்பட்ட வெர்னியர் 0ம் 0தி காட்டும். தொலைநோக்கியின் காட்சியில் ஒரு விண்டின் மட்டுமேயோ, மணி-வட்டப் பதிவு அம்மிவின் நேரக் கோணத்தைக் காட்டும். $t = \mu \pm n$ என்ற வாய்பாடு கொண்டு அப்போது விண்டின் காலம் கண்டு, வல ஏற்றம் கணிக்கலாம்.

ஒரு தெரித்த விண்டின் காலவேண்டுமானால், துருவ அச்சத் திருப்பி, மணி வட்டத்தை (தெரித்த) நோல கோணம் காட்டும் இடத்தில் நிறுத்தி, நடுவரை வச்சைத் திருப்பி, நடுவரை வட்டத்தை (D.C.) (தெரித்த) நடுவரை விலக்கம் காட்டும் இடத்தில் நிறுத்தினால், விண்டின் தொலை நோக்கியில் காட்சிக்குப்படும்.

8.9 (a) படம் 8.9 (a)இல் மற்றொரு வகையான நடுவரைத் தொலை நோக்கி காட்டப்பட்டிருக்கிறது. இதன் அடிப்படத் தத்துவம் முன் கூறப்பட்டதேயாம். ஆனால் இதன் உயர்ச்சியமைப்பி



படம் 8.9 (a).

(Mounting) மாறுபட்டது. PP' என்ற துருவ நிசையச்ச, முனைப் பகுதிகளில் பதிக்கப்படாமல், உயர்நிலைத் தாக்கக் கூடிய இரு பொறிவமைப்புகளில் அமைக்கிறது. ஒரு தூணில் நிறுத்தப் பட்டிருக்கிறது.

வாழும்புக் கருவிகள்

இதில்,

H.C. என்பது மணி-வட்டம்,

D.A- என்பது நடுவரை விலக்க அச்சு.

T- என்பது தொலைநோக்கி.

T உம் D.C. உம் ஒரே அச்சில் நிறுத்தப்பட்டிருக்கின்றன.

D. Aஐச் சுழற்றி, தொலைநோக்கியை நாம் விரும்பும் துருவ ஆரத்திற்கு இலையுயர நிறுத்திக் கொள்ளலாம்.

புள் போலவே P P' இன் சுழற்சி, மண்ணுலக மீள்வழி நான் சுழற்சியோடு இயைபுறவிடும் வகையில் ஒரு பொறிவமைப்பிண்டு.

நடுவரைத் தொலைநோக்கிகள் கொண்டுநான் புதிய கோள் அளும் வாய் விளையின்றனும் கண்டுபிடிக்கப்படுகின்றன. நிழற் படக் காட்சிகள் செய்ய இத் நடுவரைத் தொலைநோக்கிகள் பயன்படும்.


8-9-1. திசை உயரமானி (The alt-azimuth)

ஒரு விண்மொருள் உச்சி கடக்கும் சமயமல்லாது மற்ற சமயங்களில் அதைத் தாண்டவேண்டுமானின், உச்சி வட்டத்தில் மட்டுமே சுழலும், உச்சி கடத்தல் தான் தொலைநோக்கியும், உச்சிவட்டமும் பயன்படாது. எனவே மற்ற சமயங்களில் விண்மொருள் தாண்டி, திசை உயரமானி என்னுமோர் கருவி பயன்படுகிறது. இக்கருவி, ஒரு விண்மொருள் வானத்தில் எங்கிருப்பினும் அதன் ஏற்றம், அடிவான தூரம் இரண்டும் அளவும் வகையில் இயற்றப்பட்டிருக்கிறது. நடுவரைத் தொலை நோக்கியின் அச்சு, துருவக் கோட்டில் இருப்பதற்குப் பதிலாகச் செங்குத்தாகப் பொருத்தப்பட்டிருக்கிறது. அப் போது மணி-வட்டம் கிடைநிலையில் அமைந்துவிடும். இருவட்டங்களையும் சுழற்றி, ஒரு விண்மொருளைக் காட்சிக்குக் கொண்டு வந்துவிட்டால், செங்குத்துவட்டம் விண்மொருளின் ஏற்றத்தையும், கிடைநிலைவட்டம் அடிவான தூரத்தையும் காட்டும்.

கிடை நிலை வட்டமும், செங்குத்து வட்டமும் முறையே கிடைநிலையிலும் செங்குத்தாகவும் இருக்கவேண்டும். தொலைநோக்கியின் தேர் விரிப்பாடு உச்சியை நோக்கி இருக்கும்போது, இருவட்டங்களும் பூச்சியம், பூச்சியம் (zero, zero) என்ற அளவுகளைக் காட்டவேண்டும்.

8-9-3. கதிரவன் விட்டளவுக்கருவி: (விட்டம் காட்டி- Helionmeter): ஒளிக்கோட்ட முறைத் தொலைவாட்டியின் காட்சி விளக்க இருபுறக் குவிசென்னாக இருக்குமென நாமறிவோம். இவ்விருபுறக் குவிசென்னாது, இரண்டு சமபாகங்களாக வெட்டி, ஒரு

அளவு கூறுதலய திருகாணி அமைப்பில் இருபகுதிகளும் ஒன்றின் மேலொன்று அவற்றின் பொதுவிட்டத்தின்மேல் தகரும் வகையில் ஒரு புனைவு செய்வோம். படம் 8-9-3.



படம் 8-9-3.

LM , $L'M'$ இரண்டு வெட்டப்படாத குவியல்களின் இருசம பகுதிகள். பொதுவிட்டம் $LL'MN$ மேல் தனித்தனிகூடிய முறையில் அமைக்கப்பட்டு திருகாணியோடு உயர்த்தவும், தாழ்த்தவும் கூடிய வகையில் புனைவொன்று செயற்பட்டிருக்கிறது. AB கதிரவன். கதிரவன் தோக்கி இவ்விரு பகுதி லென்சுகளும் அவற்றின் பொதுவிட்டத்தின்மேல் தனித்தற்படுகின்றன. அப்போது கதிரவனின் இரு பிம்பங்கள் பெறப்படும். படத்தில் காட்டியுள்ளபடி, a , a' என்ற இருபிம்பங்களும் ஒன்றையொன்று தொடும் வகையில் [(a, a') என்ற இடத்தில்] இரு லென்ஸ் பகுதிகளும் ஒன்றின் மேல் ஒன்று தனித்தற்பட்டு அத்தினைவிடம் பொருத்தப்படுகின்றன. அப்போது இருலென்ஸ் பகுதிகளின் மையங்கள் O, O' க்கு இடைப்பட்ட தூரம், திருகாணி எத்தனைமுறை திருகப்பட்டது என்ற எண்ணிக்கையிலிருந்து அறியலாம். of என்பது லென்ஸின் குவிய தூரம் (focal length). எனவே, $\angle obo'$ அதாவது கதிரவனின் கோணவிட்டம் கணிக்கப்படுகிறது.

8-9-3-1 : கதிரவன் காழிக்கோல் (The Sun dial)

கதிரவன் தோற்றத்தை காட்டும் கருவி இத்தாழிக்கோல் ஆகும். ஒரு தாழிக்கோல் தகுந்த முறையில் பதியவைத்து, அதன் நிழல் ஓர் அளவுக் கூறுத்தட்டின்மேல் விழும்போது, அத்தட்டில் நிழல் காட்டும் அளவையே, அந்த சமயத்தில் கதிரவன் தோளாகும்.

8-9-4. ஒரு விடைநிலை கதிரவன் காழிக்கோல் அமைப்பு

கடிகாரச்சுள் வழக்கிலிருந்து காலத்தில் கதிரவனின் நிழல் அளந்துதான் தோளாயமாகக் காலம் கணிக்கப்பட்டது. அப்படியும்

கனரகமும் முதலதையப் பல நாட்டினர் ஓர் ஒழுங்குபடுத்தி, உதிரவன் நாழிக்கோடுள்ள ஒரு கருவியைப் படைத்துக்கொண்டனர். அப் படைப்புக்கு அடிப்படையான தத்துவம் பின்னர் விளக்கப்பட்டிருக்கிறது.

U.S. 9-9-41

கிடைத்ததில் S_2N என்ற ஒரு பெரிய வட்டத் தட்டம், ஆளவுக் கூறுகள் காட்டவேண்டிய வகையில் அவக்கொண்டிருக்கிறது. S_2N —தெற்று வட்டம் திசைக் கோட்டிலுள்ளது.


0-244.07 00000000

உச்சி வட்ட தளத்தில், அடிவட்டத்தில் அகலமாகான ϕ அளவு, சாய்வாக, 0.4 என்ற ஒரு கோல் (அளவை C இல்) பதிக் கப் பட்டிருக்கிறது.

எனவே ஆக்கோல் வான கோள வட்டவடிவம் P இல் கோக்கி விடுக்கிறது. அதாவது உச்சிவட்டத்தின் சமவட்டம், கோளின் திசை ON இன் மேல் விழும்.

பின்னர் அதேவகை உச்சி கடத்து வர, வர் என்ற இடங்களுக்கு வரும்போது, கோலன் திறல் வனஞாழியாகச் சென்று தட்டத்தில் விழும்.

$ZP \alpha_s = h =$ அதிர்வளின் நேரக் கோணம் (அதிர்வன் α_s இல் உள்ளபேரது)



UL 8.9-4

∴ P என்பது தடுவாளரின் கைகளைப் தொடுவானத்தை α இல் வெட்டிவிட்டும், அப்போது, கதிரவன் α இல் உள்ள சமயம், கோளின் நிழல் O α இல் மேல் விழும். $\angle NO\alpha = \theta$ எனக் கொள்க.


செங்கோண முக்கோணம் NP_2 இல், $\angle NP_2 = h$ ஆகும்.

∴ $\sin \phi = \tan \theta \cot h$ என்ற தொடர்பு கிடைக்கும்; இதை $\tan \theta = \sin \phi \tan h$ எனவும் எழுதலாம்.

இஹு அளந்துகொண்டால், ϕ தமக்குத் தெரியுமாதலின் h இன் மதிப்பைக் கணிக்கலாம். h தெரியுமானால், அதிரவன் காலத்ததைக் கணிக்கலாம். இதுவே அதிரவன் நாழிக் கோளின் கொள்கை யாகும்.

நாழிக் கோளையென்பில் மூன் பெறப்பட்ட $\tan \theta = \sin \phi \tan h$ என்ற தொடர்பே பயன்படுத்தப் படுகிறது. பின்னர் 8-8-6இல் காண்க.

8-9-5 : படம் 8-9-5இல் ஓர் அளவுக் கூறுத் தட்டத்தில், அளவுக் கூறுகள் பிரிக்கப்பட்டிருப்பதைக் காணலாம். விரிவான விளக்கம், வானியல் கருவிகள் (பண்டைக் காலத்தவை) பற்றியுள்ள தனி நூல்களில் காண்க. இப்போது அவை, பழங்காலப் பொருட் காட்சி சாலைகளில் (Museums) வைக்கப்பட்டிருக்கின்றன.



படம் 8-9-5

கருக்கமமாக, ஒரு குறிப்பிட்ட அகலங்கு (வ) ϕ உள்ள இடத்தில் அய்விடத்திற்குரிய நாழிக்கோல் அமைக்கும் முறை விளக்கப் படலாம்; முறை எளிதேயாகும்.

நாழிக்கோலின் பாதத்தை மையங்கொண்ட ஏதாவொரு வட்டம் கிடைத்தளத்தில் வரைக, அதாவது, நாழிக் கோலின் பாதம் O எனில் (படம் 8-9-5) O மையங்கொண்டு ஒரு வட்டம் கிடைத்தளத்தில் வரைப்படுகிறது.

கதிரவன் உச்சி கடக்கும் தருணத்தில், நாழிக் கோலின் நிழல் OA என்ற கோட்டில் (நினைவில்) விழுவதாக வைத்துக்கொள்வோம். படத்தில் காட்டியுள்ளபடி, OAஐ Bக்கு நீட்டி, $AB = OA \sin \phi$ என்ற வகையில் Bஐ இடங்குறிக்கவும். A வழியாக, அதே கிடைத்தளத்தில் ABக்குச் செங்குத்தாக, C'AC என்ற கோடு வரைக.

B வழியாக, $\angle ABA_1 = 15^\circ$
 $\angle ABA_2 = 30^\circ$
 $\angle ABA_3 = 45^\circ$

.....

என்றபடி, $BA_1, BA_2, BA_3, \dots$ என்ற கோடுகள் வரைக. அவை முறையே, C'ACஐ, A_1, A_2, A_3 என்ற இடங்களில் சந்திக் கட்டும். இப்போது, $A_1, A_2, A_3, \dots$ என்ற புள்ளிகளை Oவுடன் இணைத்துவிடுக.

நாழிக் கோலின் நிழல் OA_1 புடன் ஒருங்கும் போது, நிழற்பகல் 1 மணி; OA_2 புடன் ஒருங்கும்போது நிழற்பகல் 2 மணி, ... எனக் கூறலாம். ஏனெனில்;

$$\begin{aligned} \tan 15^\circ &= \frac{AA_1}{AB} \\ &= \frac{AA_1}{OA \sin \phi} \\ &= \frac{\tan AOA_1}{\sin \phi} \end{aligned}$$

$$\therefore \tan AOA_1 = \sin \phi \tan 15^\circ$$

எனவே $\angle AOA_1$ என்பது $\tan \theta = \sin \phi \tan \theta$ என நாம் 8-9-4இன் இறுதியில் கண்ட சமன்பாட்டின்படி, $\theta = 15^\circ$ க்குரியவர்க்கு குறிக்கும். ஆகவே, கதிரவன் உச்சி கடத்து 1 மணி நேரத்திற்குப் பின்பு OA_1 உடன், நாழிக்கோலின் நிழல் ஒருங்கும் அய்வாறாகவே, $OA_1, OA_2, \dots$

... உட்கர் நாழிக்கோலின் நிழல்கள் மூன்றையே நெப்பகல் மீறணி, மீறணி...—அளவில் ஒருங்கும்.

மேலும் $A_1 B A_1$, $A_1 B A_1$,... என்ற கோணங்களை, இன்னும் சிறிய சம்பாக்கங்களாகப் பிரித்து மணிப்பகுதிகளையும் கணிதிகலாம்.

பயிற்சி 8

1. மே மாதம் 25-ம் தேதி ஒரு விண் மீன் (வல ஏற்றம் 19 ம 48 நி 4 வி) உச்சி கடத்த நேரம் 19 ம 46 நி 52 வி. அடுத்த நாள் அதே விண்மீன் உச்சி கடத்த நேரம் 19 ம 40 வி. இத்தப் பதிலுக்குக் காலம் காட்டிய விண்மீன் கடிக்காரப்படி, மே மாதம் 29-ம் தேதி மத்திரே விண்மீன் உச்சி கடத்த நேரம் 18 ம 23 நி 20 வி. எனப்பதிவு செய்யப்பட்டது இரண்டாவது விண்மீனின் சரியான வல ஏற்றம் என்ன? (அக்)

2. ஒரு விண்மீன் ($\alpha = 15$ ம. 10 நி. 72 வி.) மார்க்க மூதல் தேதி உச்சி கடக்கும் நேரம் விண் மீன் கடிக்காரப்படி 15 ம. 9 நி. 6 வி.; 3-ம் தேதி உச்சி கடக்கும் நேரம் 15 ம 9 நி 4 வி. 78. ஒன்பொரு நாளும் கடிக்காரப் பிறை என்ன? கடிக்காரம் வேகமாக ஓடுகிறதா? அல்லது வேகக் குறைவாக ஓடுகிறதா? (செப்)

3. இது விண் மீன்கள் உச்சிகடக்கும் நேரங்களில் உள்ள வேறுபாடு 5 ம 33 நி 42 வி (மீன் வழிக்காலம்); மூதல் விண் மீனின் வல ஏற்றம் 4 ம. 7 நி. 15 வி. எனில், இரண்டாவது விண் மீனின் வல ஏற்றம் என்ன?

4. மண்ணுடை நடுவரை மேலுள்ள ஓட்டத்தில் ஒரு நாழிக் கோல் அமைப்பது எப்படியென விளக்குக.

5. லடதுருவத்தில் ஒரு நாழிக் கோல் அமைப்பது எப்படியென விளக்குக.

6. ஒரு நாட்பொழுதில், ஒரு கிடைத்தன நாழிக் கோலின் நிழல் முகிலாக இயங்குவதில் ஒரு கூம்பின் பெட்டு மூலக் கோடு என நிறுவி, அதன் குவியையப் பிறழவு ஏதக்குறைய $\cos \phi$ $\cos \alpha$ ϕ எனக்கூட்டுக. (ϕ என்பது இடத்தில் அகலங்கு; ϕ என்பது அந்தளில் கதிர்வன் நடுவரை விளக்கம்.)

7. செவ்வாய்க்கோலின் நோத்தக் கோண விட்டம் 20° ஆகும், யர்க்கஸ் (Yerkes) வானியல் ஆய்வுக் கூடத்திலுள்ள, 19-38 விட்டகக் குவிய நூலுள்ள ஒளிக்கோட்ட மூன்றந் தொலை நோக்கி வழியாக அதன் பிம்பம் என்ன அளவிற்கும்? (செப்)

பி. ϕ அகலங்களான ஓசிடத்தில், கதிரவன் நேரக் கோணங்கள் h_1, h_2 ஆக உள்ளபோது விழுந் திறந் கோடுகளுக்கிடையிட்ட கோணம் x , ஆனால் x இன் மதிப்பு காண்க.

$$\text{குறிப்பு: } \tan \theta = \sin \phi \tan h_1 ; \quad \text{---(1)}$$

$$\tan (\theta + x) = \sin \phi \tan h_2 \quad \text{---(2)}$$

(1), (2) இதிலிருந்து '0' ஐ விலக்க x இன் மதிப்பு கிடைக்கும்

$$\text{அதாவது } \frac{\sin \phi \tan h_1 + \tan x}{1 - \sin \phi \tan h_1 \tan x} = \sin \phi \tan h_2 \quad \text{என்ற}$$

சமன்பாட்டிலிருந்து $\tan x$ இன் மதிப்பறித்து x மதிப்பறிக்க

9. மண்ணுலகில் குறிப்பிட்ட ஓர் இடத்தின் அகலாங்கு காணல் (FINDING THE LATITUDE OF A PLACE ON THE EARTH)

9-0: மண்ணுலகில் ஓர் இடத்தைக் குறிக்கும் ஆயத் தொலைகள் (1) மண்ணுலக நேட்டாங்கு (Longitude), (2) மண்ணுலக அகலாங்கு (Latitude). ஒரு குறிப்பிட்ட இடத்தில் உரிய வானியல் கருவிகளைக் கொண்டு, விண்மீன்களின் தூரங்களை அளந்து, அம்மிடத்தின் அகலாங்கைக் கணிக்கவும் முறைகள் சிலவற்றை இப்பகுதியில் பாசர்போம் வானியல் காட்சிக்கூடங்களில் வானிலை ஆர்வு செய்வப் பல நுட்பமான கருவிகள் உள்ளன. அவை ஆக்கப்படும் அடிப்படையான மூலக்கோட்பாடுகள் பகுதி 8 இல் கருக்கமாக விளக்கப்பட்டன. சில கருவிகளை நாம் வானியல் காட்சிக்கூடங்களின்து வெளியே எடுத்துச் செல்ல முடியாது; அவை அங்கேயே பதிக்கப்பட்டிருக்கும். சில கருவிகள் வெளியே எடுத்துச் செல்லலாம். கப்பலில் செல்லும் மாழுவீயும், வானக் கப்பலில் செல்லும் வான மாழுவீயும் சிலசில முக்கிய கருவிகளை கப்பல்களில் வைத்திருப்பார்கள். அக்கருவிகள் கொண்டு அளவுகள் வான்மொருங்களை நோக்கி, வேண்டிய காட்சிப் பதிவுகள் செய்யலாம்.

அகலாங்கு காணும் வழிவகைகள் இரண்டு பரந்த பிரிவுகளாகும். (1) நிலத்தின் மேல் ஓர்டத்தில் (2) கடலில் கப்பல் நிற்றும் ஓர் இடத்தில் சில முறைகள், நிலத்திற்கும் கடலுக்கும் பொதுவாக வசதியாகவிருக்கும்; சில நிலத்திற்கு மட்டுமே; வேறு சில கடலுக்கு மட்டுமே வசதியாக விருக்கும்.

குறிப்பு (1): பின்னர் இம்முறைகள் விளக்கம் செய்யப்படும் போது, பொதுவாக, 'காணல்' ஆகவது 'பதிவு செய்தல்' எனின் வானியல் கருவிகள் கொண்டு, அளந்து, பதிவு செய்து, வேண்டிய பிழைதிருத்தங்கள் செய்து (ஒளிக் கோட்டம்,

தொடுவானத் தாழவு, கருவியின் ஆதிப்பிழை (zero error) முதலியன) சரியான அளவுகளைக் கணித்தல் எனக் கொள்க.

சில இடங்களில் பிழை அளவுகளும் உடனடியாகக் கொடுக்கப் பட்டிருக்குமானால், 'பதிவு செய்தல்' என்பது வெறும் பதிவான அளவைக் குறித்தல் எனவும், பிழைகள் திருத்தப்படவேண்டும் எனவும், சந்தர்ப்பத்திற்குத் தகுந்தாற்போல் எடுத்துக்கொள்க. எப்போதும் எல்லாப் பிழை திருத்தங்களும் செய்யப்பட்ட காட்சிப் பதிவுகளே பயன்படுத்தப்படும்.

குறிப்பு (2): ஒருவின் பொருளின் ஏற்றத்தைப் பதிவு செய்தால் அதன் உச்சி தூரம் கணிக்கலாம்; தூரத்தைப் பதிவு செய்தால், அதன் ஏற்றத்தைக் கணிக்கலாம். ஏனெனில் உச்சி தூரம் + ஏற்றம் = 90° .

குறிப்பு (3): தெரிந்த வின்மீனெனில் அதன் (அ, ப) தமக்குத் தெரியுமெனக் கொள்ளவேண்டும்.

9.1 : வானியல் அடிப்படையில் அகலங்கு கணித்தல்

A. உச்சி கடக்கும் சமயத்தில் உச்சி தூரம் பதிவு செய்து அகலங்கு கணித்தல் (Meridian Observations)

(1) மறைபா வின்மீன் உச்சிக் கடக்கும்போது உச்சி தூரங்கள் பதிவு செய்து அகலங்கு கணித்தல்.

(2) ஒரு தெரிந்த வின்மீன் அல்லது கதிரவன் உச்சி கடக்கும் போது, அதனுடைய உச்சி தூரம் பதிவு செய்து அகலங்கு கணித்தல்.

(3) வானுச்சிக்கு இரு பக்கத்திலும், வடக்கே உச்சி கடக்கும் ஒரு தெரிந்த வின்மீனும், தெற்கே உச்சி கடக்கும் மற்றொரு தெரிந்த வின்மீனும் உச்சி கடக்கும்போது, அவற்றின் உச்சி தூரங்கள் பதிவு செய்து அகலங்கு கணித்தல்.

B. உச்சி கடக்காத நேரத்தில் உச்சி தூரப்பதிவு செய்து அகலங்கு கணித்தல் (Ex-meridian Observations)

(4) இரண்டு தெரிந்த வின்மீன்களின் உச்சி தூரங்கள் பதிவு செய்து அகலங்கு கணித்தல்;

(5) ஒரு தெரிந்த வின்மீன் மூலக்குத்து வட்டம் கடக்கும் போது உச்சி தூரம் பதிவு செய்து அகலங்கு கணித்தல்.

(6) ஒரு தெரிந்த வின்மீனின் உச்சி தூரமும் அப்போதுள்ள வின்மீன் நேரமும் இருமுறை பதிவு செய்து அகலங்கு கணித்தல்.

(a) ஒரு தெரிந்த விண்மீன் உச்சி கடப்பதற்கு சற்று முன்பு அதன் உச்சி தூரமும் விண்மீன் நேரமும் பதிவு செய்து அதனாக் கதிதல்.

(b) துருவ விண்மீனின் உச்சி தூரம் கண்டு ஆகனாக் கதிதல்-
9-2-1 : மதையா விண்மீன் உச்சி கடக்கும்போது மேஜ்ச்சி, கீழ் உச்சி தூரம் பதிவு செய்து, அதனங்கு கணித்தல் முறை :

'மண்ணுலகத் தினசரி இயக்கம்' என்ற பகுதியிலும் இம்முறை விளக்கப்பட்டிருப்பதைக் காண்க. உச்சி தூரங்கள் கண்டு 'ஒளிக் கோட்டப்பிறை', 'தொடுவானத் தாழ்வு' இவற்றின் விண்வாக ஏற்படும் கிழைகளை உரிய முறையில் திருத்திய பிற்பு.

$$ZA + ZB = 2 (90 - \phi).$$


ZA, ZB முறையே மேஜ்ச்சி, கீழ் உச்சி கடக்கும்போது பதிவு செய்யப்பட்ட உச்சி தூரங்கள், (6.4 காண்க).

குறிப்புக்கள் :

(1) இரு விண்மீன்கள் உச்சி கடக்கும் காலம் உள்ள உச்சி தூரங்களைப் பதிவு செய்தால் ஒளிக் கோட்டப் பிறை திருத்தமும், அதனங்கும் ஆதியலாம்.

(2) ஏற்றக் கோணம் கண்டால், $\frac{\pi}{2}$ - ஏற்றக் கோணம் = உச்சி தூரம் என்ற வாய்பாட்டைப் பயன்படுத்தலாம்.

(3) படத்தில் உள்ளபடி, மேஜ்ச்சி கடக்கும் புள்ளி Zக்குத் தெற்கிலும், கீழ்ச்சி கடக்கும் புள்ளி Zக்கு வடக்கிலும் இருப்பின், பின்வரும் முறைகளைக் காண்க. ZA, ZB பதிவு செய்த உச்சி தூரங்களாகக் கொள்க.



படம் 9-2-1

$$ZA = z_1; ZB = z_2$$

$$z_1 = ZA = ZQ - AQ$$

$$= \phi - \delta;$$

$$\begin{aligned} z_1 &= ZB = ZP + PB = (90 - \phi) + (90 - \delta) \\ &= 180 - (\phi + \delta) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \therefore z_1 - z_2 &= 180 - \phi - \delta - \phi + \delta \\ &= 180 - 2\phi \end{aligned}$$

இனி ϕ இன் மதிப்பைக் கணிக்கவும்.

(4) தொடுவானத் தாழ்வு இருப்பின், அதற்குரிய திருத்தம் செய்து கொள்க.

(5) மண்ணுலக நடுவரைக்கு மிக அருகாமையில் உள்ள இடங்களில் 'மறையா' விண்மீன்கள் அரிதானும், அப்போது இம்முறை பயன்படாது.

(6) இம்முறை நிலத்தில்தான் கையாளமுடியும். கடலில் 12 மணி நேரம் ஒரே இடத்தில் இருந்தால்தான் இவ்விரண்டு உச்சி தூரங்களைக் காணலாம். எனவே கடப்பில் இது உதவாது.

பயிற்சி 9 (i)

1. ஓரிடத்தில் ஒரு மறையா விண்மீன், மேல், கீழ் உச்சிகள் கடக்கும்போது, அதனுடைய உச்சி தூரங்கள் மூன்றாவே $47^\circ 15'$, $22^\circ 18'$; ஒளிக்கோட்ட மாதிரி $58^\circ 2$ ஆனால், அங்விடத்தின் அகலங்களையும், அங்விண்மீனின் நடுவரை விலக்கத்தையும் அறிக.

2. ஓரிடத்தில் கதிரவன் நண்பகல் உச்சி கடக்கும்வாலை உச்சி தூரம் 35° ; அன்று நள்ளிரவு உச்சி கடக்கும்வாலை உச்சி தூரம் $0^\circ 9'$; கதிரவனின் நடுவரை விலக்கம் அன்று மணிக்கு $45''$ வேகத்தில் வளர்ந்து சென்றதெனின், அங்விடத்தின் அகலங்கு, காண்க. (சொ.)

3. ஓரிடத்தில், பீர்பெரு பகற்பொழுது இருத்த நாளன்று, நண்பகலில் ஒரு மறையா விண்மீன், உச்சி கடக்கும்போது, கதிரவனின் மையமும், அங்விண்மீனின் மையமும் சமமான உச்சி தூரம் கொண்டிருத்தன; அன்று நள்ளிரவு அங்விண் மீன் தொடுவானத்தைத் தொட்டுச் சென்றது. அங்விடத்தின் அகலங்கு, காண்க.

குறிப்பு: பீர்பெரு பகற்பொழுது நாளன்று கதிரவனின் நடுவரை விலக்கம் $= \omega = 23^\circ 30'$, எனவே, நண்பகலில் கதிரவன் உச்சிதூரம் (Zக்குத் தெற்கு) $\phi - 23^\circ 30'$. கொடுக்கப்பட்ட படி விண்மீனின் மேலுச்சி தூரம் $\phi - 23^\circ 30'$ (Zக்கு வடக்கு). கொடுக்கப்பட்டபடி விண்மீனின் கீழுச்சி தூரம் 90° (Zக்கு

வடக்கு). எனவே $90 + (\phi - 28^{\circ} 30') = 160 - 2\phi$
மதிப்பு = $37^{\circ} 50'$ எனக் கொள்க.

4. தெற்கு அகலங்கில் உள்ள ஓரிடத்தில் ஒரு விண் மீனின், மேல், கீழ் உச்சிகள் கடக்கும்போதுள்ள சரிவான உச்சி தூரங்கள் $30^{\circ} 18' 40''$ ம், $64^{\circ} 24' 50''$ ம்; ஆய்விடத்தின் தெற்கு அகலங்கு காண்க. (தெற்கு அகலங்குள்ள இடத்திற்குரிய வான கோளப்படம் வரைத்து விடைவதிக).

9-2-2: ஒரு தெரிந்த விண்மீன் அல்லது உதிரவன் உச்சி கடக்கும் போது அதனுடைய ஏற்றக் கோணம் பதிவு செய்து அகலங்கறிதல்: (இம்முறை 'கிவம்', 'கடல்' இரண்டிற்கும் வசதியானது)

முதலில் விண்மீன் உச்சி கடக்கும்போது உரிய கருவி கொண்டு ஏற்றக்கோணம் பதிவு செய்து, அதன் சரிவான உச்சி தூரத்தைக் கணிக்கலாம்.

முறையே $\delta_1, \delta_2, \delta_3$ நடுவரைவிலக்கமுள்ள (படம். 9-2-2இல்) மூன்று விண்மீன்கள் உச்சி கடக்கும்போது, சரிவான (திருத்தம் களுக்குப்பெயர்) கடத்தடங்கள் A_1, A_2, A_3 எனக் காட்டப் படுகின்றன.


மேலும் $QA_1 = \delta_1$, $QA_2 = \delta_2, QA_3 = \delta_3$ எனக் கொள்க. ($\delta_1, \delta_2, \delta_3$ தெரிந்தவை). முதல் விண் மீன் உச்சி கடக்குமிடம் A_1 , நடுவரைக்கு வடக்கே Zக்குத் தெற்கே உள்ளது.

பதிவு செய்த உச்சி தூரம் $ZA_1 = z_1$ எனக் கொள்க. கடத்தில், $\phi = ZQ$

$$= ZA_1 + A_1Q \\ = z_1 + \delta_1$$

'தெரிந்த' விண் மீனான δ_1 தெரியும். எனவே, அகலங்கு = உச்சி கடக்கும்சமய உச்சி தூரம் + வடக்கு நடுவரை விலக்கம் (வாங்கு I)

= (I)



படம் 9-2-2

இரண்டாவது விண்ணின் : உச்சி கடக்குமிடம் A_2 , நடுவரைக்கும் Z க்கும் தெற்கேயுள்ளது. பதிவு செய்த உச்சி தூரம் $ZA_2 = z_2$ எனக்கொள்க.

மரபுப்படி δ_2 , குறைமதிப்புடையதாகும் : $-\delta_2$ கூட்டு

$$\begin{aligned}\phi &= ZQ \\ &= ZA_2 - QA_2 \\ &= z_2 - |\delta_2| \\ &= z_2 + \delta_2.\end{aligned}$$

எனவே அகலங்கு = உச்சி கடக்குமிடத்தை உச்சி தூரம் +

தெற்கு நடுவரை வினக்கம் (வான்பாடு II) ... (2)

மூன்றாவது விண்ணின் : உச்சி கடக்குமிடம் A_3 ; நடுவரைக்கும் Z க்கும் வடக்கேயுள்ளது. பதிவு செய்த உச்சி தூரம் $ZA_3 = z_3$ எனக்கொள்க.

$$\begin{aligned}\phi &= ZQ \\ &= A_3Q - ZA_3 \\ &= \delta_3 - z_3\end{aligned}$$

எனவே, அகலங்கு = நடுவரை வினக்கம் - உச்சி கடக்கும்
காலம் உச்சி தூரம் (வான்பாடு III). ... (3)

இப்போது மரபு வழக்காக, விண்ணின் Z க்குத் தெற்கே உச்சி கடத்தால் உச்சி தூரம் கூட்டு மதிப்புடையது எனவும், (+); Z க்கு வடக்கே கடத்தால், குறைமதிப்புடையது எனவும் (-); விண்ணின், நடுவரைக்கு வடக்கேயிருப்பின், நடுவரை வினக்கம் கூட்டு மதிப்புடையது எனவும் (+); தெற்கேயிருப்பின் குறைமதிப்புடையது எனவும் (-) கொள்ளப்படுகிறது.

ஆகவே வான்பாடு I, II, III மூன்றாமே $\phi = z + \delta$ என்ற ஒரே வான்பாட்டில் அடங்கும் எனக் கண்டுகொள்க. (உரிய இடங்களில் உரிய குறிகளைக் கொள்க).

குறிப்புக்கள் : (1) கப்பலிலிருந்து அளவுகள் பதிவு செய்தால், தொடுவானத்தாழ்வு திருத்தம் செய்யவேண்டும்.

(2) கதிரவன் உச்சிகடக்கும்போது, அதன்மேல் விளிம்பு உச்சி கடக்கும்போது, மேல் விளிம்பின் உச்சி தூரம் பதிவு செய்தால், பதிவுத் தொகையோடு கதிரவனின் கோண அரைவிட்ட அளவைக் கூட்டினால் கதிரவன் அமயத்தின் உச்சி தூரம் கிடைக்கும்; கீழ் விளிம்பின் உச்சி தூரம் பதிவு செய்தால், பதிவுத் தொகையிலிருந்து கோண அரைவிட்ட அளவைக் கழித்தால்

மேயத்தின் உச்சி தூரம் கிடைக்கும். உச்சி கடக்கும் நேரத்திற் குரிய நடுவரை விலக்கம், மாதுமீப் பஞ்சாங்கம் கொண்டு கணித்துக் கொள்க.

(3) ஒளிக் கோட்டமிகுப்பின் ஒளிக் கோட்டத் திருத்தம் செய்து கொள்க.

எ.கா : 1

ஒரு விண்மீன் உச்சி கடக்கும்போது பதிவு செய்யப்பட்ட ஏற்றக்கோணம் $67^{\circ} 35' 10''$; ஒளிக் கோட்ட மாதிரி $65^{\circ} 2'$; நடுவரை விலக்கம் $5^{\circ} 15'$ வடக்கு. அங்விடத்தின் அகலாங்கத்தினை

$$\begin{aligned}\text{தேற்ற உச்சி தூரம்} &= 90^{\circ} - 67^{\circ} 35' 10'' \\ &= 22^{\circ} 24' 50''.\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\therefore \text{சீவான உச்சி தூரம்} &= 22^{\circ} 24' 50'' + 65^{\circ} 2' \\ &\quad \times \tan 22^{\circ} 24' 50'' \\ &= 22^{\circ} 24' 50'' + 24'' \\ &= 22^{\circ} 25' 14'' \\ \therefore \text{அகலாங்கு} &= 22^{\circ} 25' 14'' + 5^{\circ} 15' \\ &= 27^{\circ} 40' 14''\end{aligned}$$

எ.கா : 2

ஏப்ரல் 7ம் தேதி அதிரவன் கிழ்வினிப்பு உச்சி கடக்கும்காலே உச்சி தூரம் $88^{\circ} 12'$. கிரேசிச் சராசரி நேரம் காட்டும் கடிகாரம் அப்போது மணி 5ந், 12வி. காட்டியது. அதற்கு முன் கிரேசிசில் அதிரவன் நண்பகல் உச்சி கடக்கும் போது நடுவரை விலக்கம் $8^{\circ} 29' 3.4''$; மணிக்கு மணி நடுவரை விலக்க மாதிரம் $56^{\circ} 55'$; அதிரவனின் கோணவிட்டம் 82° ; ஒளிக் கோட்ட மாதிரி 55° அங்விடத்தின் அகலாங்கு காண்க. கடிகாரப்பிழை $+ 8$ நி. 20வி. எனக் கொள்க.

கடிகாரப்பிழை மதிப்பைக் கொண்டு, உச்சி கடக்கும் சீவான நேரம் 6ம. 5ந், 12 வி.—8ந், 20வி.
= 6ம 1ந் 52வி (கிரேசிச் சராசரி நேரம்).

15ம 1ந் 52வி முன்பு, அதிரவன் நடுவரைவிலக்கம் $= 8^{\circ} 29' 3.4''$ வடக்கு நடுவரை விலக்கம் 0° முதல் $23^{\circ} 1'$ வரை வளர்ந்து செல்லும் பருவத்தில் ஏப்ரல் 7ஆம் நாள் உள்ளது. எனவே, 15ம. 1ந். 52 வினாடிகளில் நடுவரை விலக்க வளர்ச்சி $= 18.08 \times 56^{\circ} 55'$
 $= 1021''$ (ஏறத்தாழ)
 $= 17' 1''$

$\therefore$ அந்த உச்சி கடக்கும் சமயத்தில் வடக்கு நடுவரை விலக்கம் $= 8^{\circ} 29' 3.4'' + 17' 1'' = 0^{\circ} 46' 4''.4$.

$$\begin{aligned}\text{உதிரவன் கைய உச்சி தூரம் (பதவானது)} &= 85^{\circ} 12' - 18' \\ &= 85^{\circ} 58'\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\text{சியான உச்சி தூரம்} &= 85^{\circ} 58' + 55' \times \tan 55^{\circ} 58' \\ &= 85^{\circ} 58' + 42^{\circ} 04' \\ &= 85^{\circ} 58' 42^{\circ} 04'\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\therefore \text{அகலங்கு} &= 85^{\circ} 58' 42^{\circ} 04' + 6^{\circ} 46' 4^{\circ} 4' \\ &= 42^{\circ} 42' 48^{\circ} 44'\end{aligned}$$

பயிற்சி 9 (ii)

1. ஒரு விண்மீன் உச்சி கடக்கும்காலம் தோற்ற உச்சி தூரம் $18^{\circ} 20' 8''$ தெற்கு; ஒளிக்கோட்ட மாதிரி 55° . 02, அதனுடைய நடுவரை விலக்கம் $15^{\circ} 27' 48''$ வடக்கு. இடத்தின் அகலங்கு காண்க.

2. $51^{\circ} 25'$ வடக்கு அகலங்கு உள்ள இடத்தில் ஒரு விண்மீன் உச்சி கடக்கும்காலம் தோற்ற உச்சி தூரம் $18^{\circ} 20'$ தெற்கு; அதே விண்மீன் $88^{\circ} 58'$ தெற்கு அகலங்கு உள்ள இடத்தில் உச்சி கடக்கும்காலம் தோற்ற உச்சி தூரம் $69^{\circ} 1' 50''$ வடக்கு. பின்னூட்ட வாய்பாடுபடி, ஒளிக்கோட்ட மாதிரி காண்க.


3. ஜூன் 22ம் தேதி $58^{\circ} 10'$ அகலங்கு உள்ள இடத்தில் உதிரவன் உச்சி கடக்கும்காலம் உச்சி உயரம் என்ன? (செ).

4. ஒரு விண்மீன் உச்சி கடக்கும்காலம் அதன் ஏற்றக் கோணம் $49^{\circ} 37'$ (தெற்கு); அதன் நடுவரை விலக்கம் $+5^{\circ} 18'$. ஏற்றக் கோணப்பதிலு கடல் மட்டத்திற்கு 55 கி. மீட்டர் உயரத்தில் செல்கப்பட்டது. அங்கிலத்தின் அகலங்கு காண்க. (மண்ணில்க ஆரம் 8000 கி.மீ எனக் கொள்க.)

5. ஆகஸ்டு 10ம் தேதி, உதிரவன் Z க்குத் தெற்கே உச்சி கடக்கும்போது ஏற்றக் கோணம் $55^{\circ} 31'$; அப்போது கிரேசித் தூரம் 4 ம 7 தி. 12வி; அன்று றுன் தள்ளிரவில் கிரேசிசிகல், நடுவரை விலக்கம் $15^{\circ} 48' 41''$ வடக்கு; மணிக்கு மணி மாற்றம்— 48° . 48; அங்கிலத்தின் அகலங்கு காண்க.

6. வடக்கு அகலங்குள்ள ஓர் இடத்தில், ஒரு மறையா விண்மீனும், 10° வடக்கு நடுவரை விலக்கமுள்ள ஒரு விண்மீனும், மூன்றையே வான உச்சிக்கு வடக்கிலும் தெற்கிலும் சம தூரத்தில் உச்சி கடக்கின்றன. மறையா விண்மீன் கீழுச்சி கடக்கும்போது, தொடுவானத்தாத் தொட்டுச் செல்கிறது. அங்கிலத்தின் அகலங்கு $88^{\circ} 50'$ என திதுவுக.

7. ஒரு செங்குத்தான சூச்சியை நிலத்தில் நட்டு, ஞானம் ஞானவதிலும், தினத்தோறும் அதிரவன் உச்சி கடக்கும்போது, அக் சூச்சியின் நிழலின் நீளங்களை அளந்து அவற்றில் மீச்சிது, மீப்பெரு அளவுகளைக் கொண்டு அம்மிடத்தில் அகலங்களையும், அதிரவன் பாதைச் சாங்கலையும் கணிக்கலாமென நிறுவும்.



[குறிப்பு: l —சூச்சி உயரம்.

o —அதிரவன் உச்சி கடக்கும் இடம்

OB —நிழலின் நீளம்.

$$\angle ABO = 90 - z$$

$$\therefore OB = x \text{ ஆகும், } \frac{x}{l} = \cot(90 - z)$$

$$x = l \tan z.$$

$\therefore$ நிழல் நீளம் $= l \tan z$; ϕ —அதிரவன் நடுவரை விடக்க வானம் $z = \phi - \delta$;

$\delta = 0$ ஆகும், z இன் மீச்சிது மதிப்பு $= \phi - 0$;

$\delta = -\omega$ ஆகும் z இன் மீப் பெருமதிப்பு $= \phi + \omega$.

$\therefore \tan z$ இன் மீச்சிது மதிப்பு $= \tan(\phi - \omega)$

$$= \frac{\text{மீச்சிது நிழல் நீளம்}}{\text{சூச்சி நீளம்}} \quad \dots (1)$$

$\tan z$ இன் மீச்சிது மதிப்பு $= \tan(\phi + \omega)$

$$= \frac{\text{மீப்பெரு நிழல் நீளம்}}{\text{சூச்சி நீளம்}} \quad \dots (2)$$

(1)உம் (2)உம் கொண்டு, ϕ , ω இரண்டையும் தோராயமாகக் கணிக்கலாம்.

9.2.3: வானுச்சிக்கு இரு பக்கத்திலும் வடக்கே உச்சி கடக்கும் ஒரு தெரித்த விண்மீனும், தெற்கே உச்சி கடக்கும் மற்றொரு தெரித்த விண்மீனும், உச்சி கடக்கும்போது அவற்றின் உச்சி தூரங்கள் பதிவு செய்து அகலாங்குறித்தல்: (சிவத்திக் பட்டுமே பயன்படக்கூடியது).

படம் 9-2-2 பார்க்க. Z க்கு வடக்கே A_1 -ல் உச்சி கடக்கும் விண்மீனுக்குத் திருத்தமின்றிப் பதிவான உச்சி தூரம் z_1 ; தெரித்த தடுவரை விவக்கம் δ_1 . Z க்குத் தெற்கே A_2 -ல் உச்சி கடக்கும் விண்மீனுக்குத் திருத்தமின்றிப் பதிவான உச்சி தூரம் z_2 ; தெரித்த தடுவரை விவக்கம் δ_2 . முதல் விண்மீனுக்குச் சரிவான உச்சி தூரம் = $z_1 + K \tan z_2$. இரண்டாவது விண்மீனுக்குச் சரிவான உச்சி தூரம் = $z_2 + K \tan z_1$.

அவ்விடத்தின் அகலாங்கு ϕ ஆனும்

$$(i) \quad \phi = \delta_1 + z_1 + K \tan z_1$$

$$(ii) \quad \phi = \delta_2 - z_2 - K \tan z_2. \text{ இரண்டையும் கூட்ட}$$

$$2\phi = (\delta_1 + \delta_2) + (z_1 - z_2) + K(\tan z_1 - \tan z_2).$$

z_1 ம் z_2 ம் ஏறக்குறைய சமமாக இருக்கும்படியாக, இரண்டு விண்மீன்களை நாம் பார்க்கலுக்கு எடுத்துக்கொண்டால் $\tan z_1 - \tan z_2$ ஏறக்குறைய பூச்சியமாகிவிடும். எனவே ஒலிக்கோட்டப் பிழைகள் தானே விவக்கப்பட்டு, $2\phi = (\delta_1 + \delta_2) + (z_1 - z_2)$ என நமக்குக் கிடைக்கும்; அதாவது பதிவு செய்யப்பட்ட Z_1, Z_2 இரண்டையுமே அப்படியே பிழைத்திருத்தமின்றிப் பயன்படுத்தலாம்.

குறிப்பு: ஏறக்குறைய அத்த இடத்தின் அகலாங்கை நாம் அறிவோமானால், $2\phi = \delta_1 + \delta_2$ என்ற மூலையில் δ_1, δ_2 பெற்ற இரு விண்மீன்கள், மாஜாபீர் பஞ்சாங்கம் கொண்டு தேர்த்தெடுக்கலாம்.


9.3-1: உச்சி கடக்காத நேரத்தில் ஏற்றக் கோணம் பதிவு செய்து அகலாங்கு கணித்தல்:

(4) இரண்டு தெரித்த விண்மீன்களின் ஏற்றக் கோணங்களை ஒரே சமயத்தில் பதிவு செய்து அகலாங்கு கணித்தல்: (நியம், கடல் இரண்டிற்கும் வரதீவானது).

குறிப்பிட்ட ஒரே சமயத்தில் மீள்வழி தேரம் t பதிவு செய்து கொண்டு, இரண்டு விண்மீன்கள் S_1, S_2 உச்சி தூரங்கள் ZS_1, ZS_2 எனக் கண்டுபிடிக்கவும். தெரித்த விண்மீன்களாதலால் $(\alpha_1, \delta_1); (\alpha_2, \delta_2)$ நமக்குத் தெரியும். படம் 9-3-1 காண்க.

$$\therefore PS_1 = 90 - \delta_1 \text{ (தெரியும்)}$$

$$\therefore PS_2 = 90 - \delta_2 \text{ (தெரியும்)}$$



படம் 9-8-1

கிழக்கு $h_1 = Z\hat{P}S_1 = \alpha_1 - i$ (தெரியும்).

கிழக்கு $h_2 = Z\hat{P}S_2 = \alpha_2 - i$ (தெரியும்)

$$\therefore S_1\hat{P}S_2 = (\alpha_2 - i) - (\alpha_1 - i)$$

$$= (\alpha_2 - \alpha_1) \text{ தெரியும்}$$

$NP = \phi$ கண்டுபிடிக்கவேண்டும்.

$ZP = 90^\circ - \phi$ கண்டு பிடித்தால் ϕ ஐக் கணக்கிடலாம்.

(i) $\triangle S_1PS_2$ இல்,

$$\begin{aligned} \cos S_1S_2 &= \cos PS_1 \cdot \cos PS_2 + \sin PS_1 \cdot \sin PS_2 \cos S_1PS_2 \\ &= \sin \delta_1 \sin \delta_2 + \cos \delta_1 \cos \delta_2 \cos (\alpha_2 - \alpha_1). \end{aligned}$$

$\therefore S_1S_2$ மதிப்பறியப்படுகிறது.

... (i)

(ii) அதே முக்கோணத்தில் S_1P , $S_1\hat{P}S_1$, PS_1 , $\hat{P}S_1S_2$ என்ற நான்கு அடுத்தடுத்த உறுப்புகளை பெருத்துக் கொள்ள,

$$\therefore \cos PS_1 \cos S_1\hat{P}S_2 = \sin PS_1 \cot PS_2 - \sin S_1\hat{P}S_2 \cot \hat{P}S_1S_2$$

$$\therefore \sin \delta_1 \cos (\alpha_2 - \alpha_1) = \cos \delta_2 \tan \delta_2 - \sin (\alpha_2 - \alpha_1) \cot PS_1S_2$$

$\therefore PS_1S_2$ மதிப்பறியப்படுகிறது

... (ii)

(iii) $\triangle ZS_1S_2$ இல்,

$$\cos ZS_2 = \cos ZS_1 \cos S_1S_2 + \sin ZS_1 \sin S_1S_2 \cos ZS_1S_2$$

$$\therefore \cos ZS_2 = \cos Z \cos S_1S_2 + \sin Z \sin S_1S_2 \cos ZS_1S_2$$

இங்கு Z , Z_1 , S_1S_2 [(i)ல் கணக்கிடப்பட்டது] மூன்றும் தெரிய

மாதிரி Z , S_1S_2 மதிப்பறியப்படுகிறது

... (iii)

(iv) (ii), (iii) இரண்டையும் பயன்படுத்தினால்,

$$\begin{aligned} PS_1 Z &= PS S_1 - ZS_1 S_2 \text{ என்ற வகையில்,} \\ PS_1 Z &\text{ கணிக்கப்படுகிறது} \end{aligned} \quad \dots (iv)$$

ΔZPS_1 இல்,

$$\cos ZP = \cos ZS_1 \cos PS_1 + \sin ZS_1 \sin PS_1 \cos PS_1 Z$$

$$\therefore \sin \phi = \cos Z_1 \sin \delta_1 + \sin Z_1 \cos \delta_1 \cos PS_1 Z$$

(iv)ல் கண்ட $PS_1 Z$ மதிப்பைப் பயன்படுத்த, ϕ மதிப்பு பெறப்படுகிறது. இந்தச் சோதனையில் இரண்டு வாட்சியான்கள் வேண்டும்.

9-3-1-1 : இரண்டு பேர் இவ்வளவையில், ஒரேவரே S_1 என்ற விண்மீன், முதலில் ' i_1 ' மின்வழி நேரத்தில் நோக்கி உரிய Z_1 ஐவும், சிறிது நேரம் கழித்து i_2 மின் வழி நேரத்தில் மத்தோர் விண்மீன் S_2 ன் Z_2 ஐவும், மத்தோர் முறை சிறிது நேரம் கழித்து i_3 மின் வழி நேரத்தில் முதல் விண்மீன் S_1 ன் Z_3 ஐவும் பதிவுசெய்துகொண்டு, வேண்டிய திருத்தம் செய்து, Z_1, Z_2, Z_3 என்ற சரியான உச்சி தூரத்தைக் கணித்துக் கொள்க. $i_2 - i_1$ என்ற நேர இடைவெளியில், $Z_2 - Z_1$ என்ற அளவில் S_1 ன் உச்சிதூரம் வேறுபடுகிறது. நேரமும் உச்சிதூரமும் ஒரே விகிதத்தில் மாறுபடுகின்றது என்ற அடிப்படையில், $i_2 - i_1$ என்ற நேர இடைவெளியில் S_1 ன் உச்சி தூர வேறுபாடு $x = \frac{i_2 - i_1}{i_2 - i_1} \times (Z_2 - Z_1)$ எனக் கணக்கிடலாம்.

எனவே, i_3 என்ற மின்வழி நேரத்தில், S_1 ன் சரியான உச்சி தூரம் $= Z_1 + x$ எனக் கிடைக்கும். அதே i_2 என்ற மின்வழி நேரத்தில், S_2 ன் சரியான உச்சி தூரம் $= Z_2$ என முதலிலேயே கணக்கிடப்பட்டிருக்கிறது. அதற்குமேல் ϕ அறிவ[9-3-1இல் கூறிய முறையைக் கவனிக்க.

9-3-1-2 : மின்வழும் முறைமீளும், ஒரு விண்மீன் அல்லது கதிரவன் நோக்கி, உச்சி தூரங்கள் பதிவு செய்து, உரிய திருத்தங்கள் செய்து, ஓர் இடத்தின் அகலங்களைக் கணிக்கலாம்.

i_1, i_2 என்ற பதிவு செய்கப்பட்ட மின்வழி நேரங்களில், ஒரு விண்மீன், அல்லது கதிரவன் உச்சி தூரங்கள் (திருத்தப்பட்டவை) Z_1, Z_2 என கணிக்கப்பட்டிருக்கின்றன.

i_1 நேரத்தில் S_1 - விண்மீன் இடம்/(கதிரவன்)

i_2 நேரத்தில் S_2 - விண்மீன் இடம்/(கதிரவன்)

$$PS_1 = 90 - \delta = PS_2$$

$\triangle PS_1S_2$ ஓர் இரு சமபக்க முக் கோணம்.

S_1S_2 ஐ M இல் இருசமபாகமாகி, MP என்ற பெரு வட்டத்தில் வரைக.

$$\widehat{PMS_1} = 90^\circ = \widehat{PMS_2}$$

$$\therefore S_1PM = MP S_2 = \frac{1}{2}(I_2 - I_1) \text{ மணி அளவில்}$$

$$= \frac{1}{2}(I_2 - I_1) \text{ கோண அளவில் (பாகங்கள்)}$$

$\triangle PS_1M$ எடுத்துக் கொள்க.

(படம் 9-8-1-2)



படம் 9-8-1-2

அது செங்கோண முக்கோணம் ; $\widehat{PMS_1} = 90^\circ$

$$\frac{\sin MS_1}{\sin S_1 PM} = \frac{\sin PS_1}{\sin 90^\circ}$$


$$\therefore \sin MS_1 = \cos \delta \sin \frac{1}{2}(I_2 - I_1),$$

$\therefore MS_1$ கிடைக்கிறது.

$\therefore 2MS_1 = S_1S_2$ கிடைக்கிறது (ii)

மேலும் ϕ அறிய, 9-8-1 இல் கூறிய முறையைக் கையாள்வோம்.

9-32 : விண்மீள் அல்லது கதிரவன் மூலக்குத்து வட்டம் கடக்கும் பொது உச்சிதூரம் கண்டு, அதனைத் தவிர்த்தல். (நிலம், கடல் திரண்டித்தும் பொருந்தும்)



படம் 9-8-2

இம்முறை 'மண்ணுலக திசை இயக்கம்' என்ற பகுதியில் விளக்கப்பட்டிருப்பதைக் காண்க.

ஒரு விண்மீன் மூலக்குத்து வட்டம் கடக்கும்போது, உச்சி தூரம் பதிவு செய்ய, மூலக்குத்து வட்ட நோக்கி (Prime Vertical Instrument) பயன்படுத்தப்படும்.

இ $\sin \phi \sin \delta = \sec Z$ (மட்டம் $90^\circ - Z$) எனக்கண்டு, ϕ கணிக்கலாம்.

மற்றோர் முறை: விண்மீன் (திரவன்) மூலக்குத்து வட்டம் கடக்கும்போது, மீனவழிநேரம் t ஐ அறிந்தால், $ZPS = \alpha - t$ அல்லது $t - \alpha$ எனக் கண்டு கொண்டு, நெபியர் விதிப்படி,

$$\cos h = \tan \delta \cot \phi.$$

$\therefore \tan \phi = \tan \delta \sec h$ எனக் கண்டு, ϕ ன் மதிப்பைக் கணிக்கலாம்.

இங்கு, அக்வினார்ன், தொடுவானத்திற்குக் கிழக்கிலும், மேற்கிலும், மூலக்குத்து வட்டம் கடக்கும்போது, t_1, t_2 என்ற விண்மீன் நேரங்களைப் பதிவு செய்தால் $t_2 - t_1 = 2h$ எனக் கிடைக்கும். இம்முறையில் விண்மீன் கடினாரத்தின் நேர விளக்கப்பட்டு விடும்.

பயிற்சி 9 (iii)

1. ஒரு விண்மீனின் நேரக்கோணம் 6° மனியாவிற்குக்கும் போது, அதன் ஏற்றக் கோணம் α_1 ; அது மூலக்குத்து வட்டத்தைக் கடக்கும்போது, அதன் ஏற்றக் கோணம் α_2 . அதன் நடுவரை விளக்கம் $\sin \delta = \sin \alpha_1 \sin \alpha_2$ என்ற தொடர்பால்

கிடைக்கிறதென நிறுவுக. $\sin \phi = \frac{\sin \alpha_1}{\sin \alpha_2}$ எனவும் நிறுவுக.

[குறிப்பு: $\sin \alpha_1 = \sin \phi \sin \delta$; $\sin \alpha_2 = \sin \delta \cos \phi$].

2. $\alpha = 315^\circ$; $\delta = +30^\circ$ உள்ள ஒரு விண்மீன் மூலக்குத்து வட்டம் கடக்கும்போது, உச்சிதூரம் 42° . அக்விடத்தின் அகலங்க கற்க.

3. திரவனின் $\delta = 15^\circ +$; அது மூலக்குத்து வட்டம் கடக்கும்போது கிழக்கு உச்சி தூரம் 81° அக்விடத்தின் அகலங்க கற்க.

4. திரவன் வான நெட்டாங்குட்டி இருக்கும்போது, நேர கிழக்கே (அதாவது மூலக்குத்து வட்டத்தைக் கடக்கும்காலத்தில்)

2 என்ற ஏற்றக் கோணத்தில் தோன்றுகிறது. அங்விடத்தின் அகலங்கு $\sin \phi + \sin a = \sin c = \sin \angle$ என்றதொடர்பால் கிடைக்கிற தென நிறவுக.

5. ஒரு விண்மீன், கிழக்கே குத்துவட்டத்தைக் கடத்தலுக்கும் மேற்கே குத்துவட்டத்தைக் கடத்தலுக்கும் உள்ள இடைவெளி 4 மணி நேரம்; அதன் நடுவரை விவக்கம் $\tan^{-1}(\frac{1}{2})$. அங்விடத்தின் அகலங்கு 80° என நிறவுக.

9-3-3: (6) ஒரு தெரிந்த விண்மீனின் உச்சிதூரம், அப்போது மீள்வழி நேரம் இரண்டும் பதிவு செய்து அகலங்குறிதம்:

$\triangle ZPS$ என்ற முக்கோணம் எடுத்துக் கொள்க, $ZPS =$ நேரக் கோணம் $h = \alpha - \delta$ அல்லது $\delta - \alpha$. இங்கு α தெரியும்; நோக்கும் விண்மீன் நேரம் δ பதிவு செய்தால், அப்போது h அறியலாம்.

$$ZP = 90 - \phi \quad (\text{தெரியாது})$$

$$ZS = Z - \text{பதிவு செய்து நிகுத்தப்பட்ட உச்சி தூரம்.}$$

$$PS = 90 - \theta \quad (\text{தெரியும்})$$

$$\cos ZS = \cos ZP \cos PS + \sin ZP \sin PS \cos ZPS.$$

$$\cos Z = \sin \phi + \sin \theta + \cos \phi \cos \theta \cos h \quad \dots (1)$$

இங்கு Z , α , θ , h தெரியும்; எனவே, ϕ கணிக்கலாம். ϕ அறிய, $\sin \theta = A \cos \theta$ எனவும், $\cos \theta \cos h = A \sin \theta$ எனவும் கொள்க. ... (2)

$$A = \sqrt{(\sin^2 \theta + \cos^2 \theta \cos^2 h)}$$

$$\begin{aligned} \theta &= \tan^{-1} \left(\frac{\cos \theta \cos h}{\sin \theta} \right) \\ &= \tan^{-1} (\cos \theta \cos h) \end{aligned}$$

$\therefore A$, θ மதிப்புக்களை அறியலாம்.

(1)ல் (2)ஐ ஈடு செய்து,


$$\begin{aligned} \cos Z &= A \cos \theta \sin \phi + A \sin \theta \cos \phi \\ &= A \sin (\theta + \phi) \end{aligned}$$

Z , A , θ தெரியுமாலால் ϕ கணிக்கலாம்.

குறிப்பு: கதிரவன் நோக்கியும் கணிக்கலாம். ஆனால் இன்னும் சில யாத்ரங்கள் தேவைப்படும்.

9-3-4: 6 (A) தெரிந்த விண்மீன் உச்சி கடப்பதத்தச் சற்று முன்பு, அதன் உச்சி தூரம் அளந்து, அகலங்கு காணல். (கிடை, கடல் இரண்டிற்கும் பொருத்தும்.)

இது 9-3-3 இல் காட்ட முறைப்படி ஒரு சிறிய வகையில் அளவாகும். S என்ற இடத்தில் உச்சி கடக்கும் விண்ணின் (ϕ , δ) நமக்குத் தெரியும். அது உச்சி கடத்ததற்குச் சற்று முன்பு S -ல் உள்ளது. அப்போட பதிவு செய்து திருத்திய உச்சி தூரம்



படம் 9-3-4

Z_1 எனக் கொள்வோம். அப்போது $h = ZPS = i - \alpha$ ஆகிறது $\alpha = i$ எனக் கணக்கிட்டு விடலாம். (i -அப்போது மீள்வழி தோரம்) உச்சி கடக்கும்போது உச்சி தூரம் $Z-x$ எனக் கொள். x நாம் கணவெண்டிய சிறு அளவு. (படம் 9-3-4 காண்க).

$$\begin{aligned} \triangle ZPS \text{ இல், } \cos ZS &= \cos PZ \cos PS + \sin PZ \sin PS \cos h \\ &= \cos PZ \cos PS + \sin PZ \sin PS \left(1 - 2 \sin^2 \frac{h}{2}\right) \\ &= \cos (PS - PZ) - 2 \sin PZ \sin PS \sin^2 \frac{h}{2} \\ &= \cos (PS' - PZ) - 2 \sin PZ \sin PS \sin^2 \frac{h}{2} \\ &\quad (\because PS' = PS) \\ &= \cos (Z - x) - 2 \cos \phi \cos \delta \sin^2 \frac{h}{2} \end{aligned}$$

$$\therefore \cos (Z - x) - \cos Z = 2 \sin \frac{x}{2} \sin \left(Z - \frac{x}{2}\right)$$

$$= 2 \cos \phi \cos \delta \sin^2 \frac{h}{2} \quad \dots (i)$$

x ம், h ம் மிகச் சிறியதாகையால், x , h இரண்டையும் ஆள வாய் ஆளவில் கொண்டால்,

$$2 \cdot \frac{x}{2} \sin Z = 2 \cos \phi \cos \delta \cdot \frac{h^2}{4} \quad (\text{தோராவமாக})$$

$$\therefore x = \frac{h^2 \cos \phi \cos \delta}{2 \sin Z} \text{ எனப் பெறப்படும்} \quad \dots (ii)$$

ஆனால் ϕ நமக்குத் தெரியாததாகையால், தோராவமாக

$$\begin{aligned} \phi &= ZS' + \delta \\ &= Z - x + \delta \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 \cos z &= \cos z \cos \Delta + \sin z \sin \Delta \cos h \\
 &= \cos (z + x) \cos \Delta + \sin (z + x) \sin \Delta \cos h \\
 &= (\cos z \cos x - \sin z \sin x) \cos \Delta \\
 &\quad + (\sin z \cos x + \cos z \sin x) \sin \Delta \cos h \\
 &= \left[\cos z \left(1 - \frac{x^2}{2} \right) - \sin z \left(x - \frac{x^3}{6} \right) \right] \\
 &\quad \times \left(1 - \frac{\Delta^2}{6} \right) \\
 &\quad + \left[\sin z \left(1 - \frac{x^2}{2} \right) + \cos z \left(x - \frac{x^3}{6} \right) \right] \\
 &\quad \left(\Delta - \frac{\Delta^3}{6} \right) \cos h
 \end{aligned}$$

மேற்கூறிய படி காரணம் சிதைய மதிப்புக்களைக் கொள்ளும்,

$$\begin{aligned}
 \cos z &= \cos z - \frac{x^2}{2} \cos z - \frac{\Delta^2}{2} \cos z - x \sin z \\
 &\quad + \frac{x \Delta^2}{2} \sin z + \frac{x}{6} \sin z \\
 &\quad + \Delta \sin z \cos h - \frac{\Delta x^2}{2} \sin z \cos h - \frac{\Delta^3}{6} \cos h \sin z \\
 &\quad + x \Delta \cos z \cos h
 \end{aligned}$$

இரு பக்கங்களையும் $\cos z$ ஆல் வகுக்க,

$$\begin{aligned}
 1 &= 1 - \frac{x^2}{2} - \frac{\Delta^2}{2} - x \tan z + \frac{x \Delta^2}{2} \tan z + \frac{x^3}{6} \tan z \\
 &\quad + \Delta \tan z \cos h - \Delta \frac{x^2}{2} \tan z \cos h - \frac{\Delta^3}{6} \tan z \cos h \\
 &\quad + x \Delta \cos h \\
 &= 1 - \frac{x^2}{2} - \frac{\Delta^2}{2} + \tan z (\Delta \cos h - x) + x \Delta \cos h \\
 &\quad + \tan z \left(\frac{x \Delta^2}{2} + \frac{x^3}{6} \right) - \frac{\Delta^3}{6} \tan z \cos h - \frac{\Delta x^2}{2} \tan z \cos h
 \end{aligned}$$

இருபக்கங்களிலும் '1' ஐ நீக்கி, $\tan z$ ஆல் வகுத்து, பக்கம் மொத்தி எழுதினும்,

$$\begin{aligned}
 x - \Delta \cos h &= -\frac{1}{2} \cot z (x^2 + \Delta^2 - 2x \cos h) \\
 &\quad + \left[\frac{x \Delta^2}{2} + \frac{x^3}{6} - \frac{\Delta^3}{6} \cos h - \frac{x^2 \Delta}{2} \cos h \right]
 \end{aligned}$$

x இன் தோராய மதிப்பு முதல்முதலாக,

$$x = \Delta \cos h = 0 \text{ எனக் கொண்டு } x = \Delta \cos h \quad \dots (1)$$

எனப் பெறலாம்; இங்கு x , Δ என்ற சிறு மதிப்புகளின் இரண்டாம், மூன்றாம் மடிகள் கணக்கில் எடுக்கப்படாமல் விவக்கம் பட்டன.

அன் இரண்டாவது தோராய மதிப்பு, சிறு அளவுகளான Δ , x ன் மூப்படிகளை விவக்கி, $x = \Delta \cos h$ என்ற முதல் தோராய மதிப்பைப் பயன்படுத்தி,

$$\begin{aligned} x &= \Delta \cos h = \frac{1}{2} \cot x (\Delta^2 \cos^2 h + \Delta^2 - 2\Delta^2 \cos^2 h) \\ &= \Delta \cos h - \frac{1}{2} \cot x (\Delta^2 \sin^2 h) \\ &= \Delta \cos h - \frac{\Delta^2}{6} \cot x \sin^2 h \quad \dots (2) \end{aligned}$$

Δ தமக்குத் தெரியும்; மீள்வழிதேரம் t ஆனால் $h = t - \alpha$ அல்லது $(\alpha - t)$ என கணித்துக் கொள்ளலாம்.

$$\begin{aligned} \Delta 90 - \phi &= c = Z + x \\ &= Z + \Delta \cos h \text{ (முதல் தோராய மதிப்பு)} \end{aligned}$$

மேலும் $c = Z + \Delta \cos h - \frac{\Delta^2}{2} \cot Z \sin^2 h$ என்ற இரண்டாவது தோராய மதிப்பும் கிடைக்கும். முன் விவரக் கூறப்பட்ட முறைகளிலே திகத்திலோ, கடனிலோ, வசதிக் கேற்றவாறு பொழுதை வீண் கழிக்காமலிருக்கும் வகையில் விண்மீன் உச்சி தூரம் அல்லது கதிரவன் உச்சி தூரம் (உச்சி கடக்கும்போது, அல்லது கடக்காத போது) பதிவு செய்து, அகலங்கு அறிவலாம்.

பயிற்சி 9 (iv)

1. ஒரு மலை உச்சியிலிருந்து $35^\circ 26'$; $55^\circ 15'$ தடுவரை விவக்கமுள்ள இரு விண்மீன்கள், ஒன்று உச்சிக்குத் தெற்கிலும் மற்றொன்று உச்சிக்கு வடக்கிலும், உச்சி கடப்பதாகத் தெரிகிறது. அப்போது அவற்றின் உச்சி தூரங்கள் முறையே $26^\circ 20'$, $26^\circ 30'$ எனத் தெரிகிறதென்றும் அங்விடத்தின் அகலங்கு காண்க.

2. கதிரவன் ஒரு குறிப்பிட்ட நாளில் உதிக் கும் இடத்தின் தொடுவான தூரம் (A) கணிக்கப்படுகிறது; அன்று, கதிரவன் உச்சி கடக்கும்போது ஒரு செங்குத்தாக நிற்கும் குச்சியின் நீளமும் அதன் நிழல் நீளமும், அளக்கப்படுகின்றன. இவ்விரு அளவுகளைக் கொண்டு அங்விடத்தின் அகலங்கு காண்பது எப்படி?

குறிப்பு: $\sin \delta = \cos \phi \cos A$

$$k = \frac{\text{நிறல் நீளம்}}{\text{குச்சி நீளம்}} = \tan z = \tan (\phi - \delta)$$

மூலத் சமன்பாட்டில் δ , ϕ தேராக்களியங்கள்;

இரண்டாம் சமன்பாட்டில் $\tan (\phi - \delta) = k$ என்ற மதிப்பு கொண்டு $(\phi - \delta)$ ன் மதிப்பை யறிக.

$\phi - \delta = \alpha$ ஆனால், $\delta = \phi - \alpha$ என மூலத் சமன்பாட்டில் $\sin (\phi - \alpha) = \cos \phi \cos A$ பெறப்படும். இங்கு α , A மதிப்புகள் தெரியுமாதலின், ϕ மதிப்பு காணலாம்.

3. ஒரு விண்மீன் உச்சிகடக்கும்போதும், மூலக்குத்து வட்டத்தைக் கடக்கும்போதும், அதன் ஏற்றக்கோணங்கள் முறையே x -உம் x' -உம் ஆகும்.

$$\cot \delta = \sec x \cos x' - \tan x \text{ எனவும்,}$$

$$\cot \phi = \tan x - \sec x' \sin x' \text{ எனவும் திறவுக.}$$

4. ஒரே நெட்டாங்கில் உள்ள மூன்று இடங்களின் அகலங்குகள் முறையே ϕ_1 , ϕ_2 , ϕ_3 , ஆம்மூன்று இடங்களிலும், ஒரு குறிப்பிட்ட நாளில் மூன்று சம உயரமான குச்சிகள் நட்டு, அதிர்வன் உச்சி கடக்கும்போது அவற்றின் நிறல் நீளங்கள் முறையே h_1 , h_2 , h_3 என அளக்கப்படுகின்றன. அப்போது,

$$\sum h_i (h_i - h_j)^2 \cot (\phi_i - \phi_j) = 0 \text{ என திறவுக.}$$

$$\text{குறிப்பு: } \left. \begin{array}{l} h_1 = a \tan z_1 \\ h_2 = a \tan z_2 \\ h_3 = a \tan z_3 \end{array} \right\} \begin{array}{l} \phi_1 = z_1 + \delta \\ \phi_2 = z_2 + \delta \\ \phi_3 = z_3 + \delta \end{array}$$

$$\cot (\phi_2 - \phi_3) = \cot (z_1 - z_3) = \frac{1 + \tan z_1 \tan z_3}{\tan z_1 - \tan z_3}$$

$$\begin{aligned} &= \frac{1 + \frac{h_1}{a} \frac{h_3}{a}}{\frac{h_1}{a} - \frac{h_3}{a}} \\ &= \frac{a^2 + h_1 h_3}{a (h_1 - h_3)} \end{aligned}$$

$$\sum h_i (h_i - h_j)^2 \cot (\phi_i - \phi_j)$$

$$= \sum \frac{h_i (a^2 + h_i h_j) (h_i - h_j)}{a} = 0 \text{ என திறவுக.}$$

5. ஒரு நாள் 20° வடக்கு அகலங்கு உள்ள இடத்தில் அதிர்வன் உச்சி கடக்கும்போது, செங்குத்தாக நிறுத்தப்பட்ட ஒரு

குச்சியின் திழல் விழவில்லை. (திழல் திழல் முச்சியம்); அன்று காலை 9 மணிக்கு திழல் தீனம் 5 மீட்டர். அக்குச்சியின் தீனமென்ன? ஏதக்குறைய, எந்த நாளில் இது நிகழும்?

திழலெயில்லையாதலின், அதிரவன் z என்ற புள்ளியிலேயே உச்சி உடக்கிறது. ஆகவே அன்று அதிரவனின் நடுவரை விவக்கம் 20° வடக்கு எனத்தெரிகிறது. 9 மணிக்குக் அதிரவனின் கிழக்கு நேரக்கோணம் 45° . அப்போது உச்சி தூரம் z ஆகும், $\cos z = \cos^2 70^\circ + \sin^2 70^\circ \cos 45^\circ = k$ எனக் கொள்வோம்.

$$\therefore \tan z = \frac{\sqrt{1-k^2}}{k} \text{ எனப் பெறப்படும்.}$$

$$\frac{\text{திழல் தீனம்}}{\text{குச்சி உயரம்}} = \frac{\sqrt{1-k^2}}{k} \text{ இதிலிருந்து குச்சி உயரம்} \\ = \frac{5k}{\sqrt{1-k^2}} \text{ மீட்டர்கள் என அறியலாம்.}$$

அன்று $\sin \phi = \frac{\sin \delta}{\sin w}$ என்ற தொடர்பிலிருந்து, ϕ கண்டு வேண்டிய நாளை அறிக.

8. பின்வரும் மட்டியலில் கோடிட்ட இடங்களை நிரப்புக:

அதிரவன் மையம்/விண்மீன் உச்சி தூரம் (உச்சிகடக்கும்போது)	இடத்தின் அகலங்கு	நடுவரை விவக்கம்	ஒரு குச்சி உயரம்	ஒரு குச்சியின் திழல் தீனம்	நேதி.
அதிரவன் —	80° வ	—	3 மீட்டர்	—	23, மார்ச்
விண்மீன் 25°	—	12° தெ			
விண்மீன் 15°	40° வ	—			
விண்மீன் 25°	—	15° தெ			
அதிரவன் —	60° வ	—	—	3 மீட்டர்	ஜூன் 28,
அதிரவன் 80°	—	—			23, அகம்பர்

7. மண்ணுலகின் ஒரு பெரு வட்டத்தின்மேலுள்ள மூன்று இடங்களின் அகலங்களுள் மூன்றையே ϕ_1, ϕ_2, ϕ_3 ; நெட்டாங்கு-கள் மூன்றையே $\lambda_1, \lambda_2, \lambda_3$; அப்போது $3 \tan \phi_1, \sin (\lambda_2 - \lambda_3) = 0$ என நினைவுக,

8. ஒரு குறிப்பிட்ட நேரத்தில் ஒரு விண்மீனின் உச்சி தூரம் x_1 ; 11 மீன்வழி மணிக்குப் பிறகு, அது உச்சி கடக்கும்போது அதன் தூரம் x_2 . அங்விடத்தின் அகலங்கு பின்வரும் சமன்பாட்டால் தொகுக்கப்படுகிறதென நினைவுக :

$$\cos (2\phi - x_2) \sin^2 \frac{h}{2} = \cos x_2 \cos^2 \frac{h}{2} - \cos x_1$$

9. ஒருவிண்மீன் மூலக்குத்து வட்டம் கடக்கும்போது அதன் உச்சிதூரம் 45° ; உச்சி கடக்கும்போது உச்சி தூரம் 30° , அங்விடத்தின் அகலங்கு எவ்வளவு? அங்விண்மீனின் தடுவணு எவ்வளவு?

10. ஓரிடத்தில் இருவர் 360° தேதி நம்பகத்தில் நிலத்தில் செங்குத்தாக நிறை நிறுத்தப்பட்ட ஒரு குச்சியின் நிழல் நீளம், அக்குச்சியின் நீளத்திற்குச் சமமாகின், அங்விடத்தின் அகலங்கு எவ்வளவு? அன்று நகரிலில் கதிரவன் கிண்சி தூரம் எவ்வளவு?

(செப்.)

10. கதிரவன் பாதை குறித்தல்

(FIXING THE ECLIPTIC)


10.0: வான கோளத்தின்மேல் வான நடுவரைக்கு $23\frac{1}{2}^{\circ}$ சாய்வில் கதிரவன் பாதை இருப்பதை நாம் ஆறிவேம். வான நடுவரையும் கதிரவன் பாதையும் வெட்டுகிடக்கள் γ (மேட முதற்புள்ளி), ψ (துலம் முதற் புள்ளி). γ வும் ψ வும் வான நடுவரைமேல், வின் மீன் நாய் ஒன்றுக்கு ஒரு முழுச்சுற்று சுற்றிக்கொண்டிருப்பதால் கதிரவன் பாதை எப்போதும் வானகோளத்தின்மேல் தன்னிலை மாறிக் கொண்டே இருக்கிறது. எனவே ஒரு குறிப்பிட்ட சமயத்தில் கதிரவன் பாதை இருக்குமிடத்தை நாம் எண்ணப்பார்க்க முடியாது போகிறது.

10.1: ஒரு குறிப்பிட்ட சமயத்தில் வானகோளத்தின்மேல் கதிரவன் பாதை இருக்குமிடம் அறிதல்.

ஒரு குறிப்பிட்ட அகலங்கு பெற்ற இடத்தில் வான வடதுறாவை P நிலைவாக இடம் குறிக்கப்படுகிறதென நாம் ஆறிவேம், அப்படி P இடம் குறிக்கப்பட்ட பின், $\omega = 23\frac{1}{2}^{\circ}$ கோண அளவுவிட்டதாக உடைய சிறு வட்டம், கதிரவன் பாதையின் துருவமான K-ன் இயங்கு பாதையாகும். ஏனெனில் நடுவரையும் கதிரவன் பாதையும் ஒன்றுக்கொன்று $23\frac{1}{2}^{\circ}$ சாய்வில் உள்ளன.

10.2: குறிப்பிட்ட காலம் மீள்வழிக் காலம் ' γ ' எனக் கொள். அச்சமயத்தில் ϕ அகலங்கு உள்ள இடத்தில் வான கோளத்தில் γ CA கதிரவன் பாதையையும் $\gamma \phi$ E வான நடுவரையையும் குறிக் கட்டும் (படம் 10.2). அச்சமயத்தில் கதிரவன் பாதை கிழக்குத் தொடுவானத்தை A-யிலும், மேற்குத் தொடுவானத்தை B-யிலும் வெட்டட்டும். (B படத்தில் காட்டப்படவில்லை). A, B என்ற இரு புள்ளிகளும் முறையே ஏறுபுள்ளி (Ascending point) இறங்குபுள்ளி (Descending point) எனக் கூறப்படுகின்றன. வான நடுவரையும் கதிரவன் பாதையும் உச்சி வட்டத்தை முறையே Q-இலும் C-இலும்

கொட்டப்படும். C என்பது உயர் புள்ளி (culminating point) எனப்படும். குறிப்பிட்ட சமயம் மீள்வழி தேதம் 't' ஆகையால் $Q = 15^\circ$ ஆகும்.



UL 10-9

அச்சமயத்தில் $EA = x$ எனவும், தொடுவானத்துடன் அதிர்வன்
மாதையின் சங்கு $\angle CAE = \theta$ எனவும் வைத்துக் கொள்வோம்.
 x, θ -ன் மதிப்புக்களைக் கணக்கிட்டு, நித்தாய அப்போது அதிர்வன்
மாதையின் இ-ம் காலநேரம்.

4950 cup

✪ www.dailymotion.com/video/x333333

apd/Chambersh YEA—Gals

$$\begin{aligned} E_y &= E_Q + QY \\ &= 90^\circ + 15^\circ \end{aligned}$$

$$\angle YEA = \angle YEN = OZ + ZN = \phi + 90^\circ$$

$$EA = x(E\text{gen}(\pi))$$

$$\angle EA Y = \theta \quad (\text{Given})$$

$$\angle EYA = 90^\circ$$

எனவே

$\cos \gamma E \cos \angle \gamma EA = \sin \gamma E \cdot \cot EA - \sin \angle \gamma EA \cdot \cot \angle EYA$ ஆகாவது

$$\cos (90 + 15r) \cdot \cos (90 + \phi) = \sin (90 + 15r) \cot x \\ - \sin (90 + \phi) \cdot \cot y$$

$$\therefore \sin 15r \sin \phi = \cos 15r \cot x - \cos \phi \cot y$$

$$\therefore \cot x = \tan 15r \sin \phi + \cos \phi \cot y \sec 15r$$

எனவே x -ன் மதிப்பை நாம் பெறுகின்றோம்; ஆகாவது குறிப்பிட்ட சமயத்தில் கதிரவன் பாதை E இலிருந்து தொடுவானத்தை வெட்டு விடத்தின் தூரம் பெறப்படுகிறது.

0-ன் மதிப்பறிதல்

இம் மதிப்பறிதல், நின் கூறப்படும் கோளப் பண்டுகள் பயன்படும் முக்கோணம் ZPK.

	பெருவட்டம்	துருவங்கள்	காரணம்
1.	ZK	A, B	A, தொடு வானத்திற்கும் கதிரவன் பாதைக்கும் பொதுவான புள்ளி. $\therefore AZ = AK = 90^\circ$
2.	PK	Y, =	Y, வான நடுவரைக்கும் கதிரவன் பாதைக்கும் பொதுவான புள்ளி. $\therefore YP = YK = 90^\circ$
3.	ZP	E, W	E தொடு வானத்திற்கும் வான நடுவரைக்கும் பொதுவான புள்ளி. $\therefore EZ = EP = 90^\circ$

கொடுக்கப்பட்ட சமயத்தில் K-கதிரவன் பாதையின் ஒரு துருவம் எனக் கொள்வோம்.

கோள முக்கோணம் PZK-ல்,

ZK = தொடுவானம், கதிரவன் பாதை இரண்டின் துருவக் கனுக்கும் இடைப்பட்ட தூரம்.

= தொடுவானம், கதிரவன் பாதைக்கும் இடைப்பட்ட கோணம்

$$= \theta \quad \quad \quad = (4)$$

இப்போது $\angle KZP$ = பெரு வட்டங்கள் ZK , ZP -களுக்கு இடைப்பட்ட கோணம்.

= அளவகளின் துருவங்களுக்கு இடைப்பட்ட தூரம்

= $AE \dots$ (மட்டியளில் (1), (8) காண்க)

$$= x \dots \dots \dots = (5)$$

$\angle ZPK$ = பெருவட்டங்கள் ZP , PK -களுக்கு இடைப்பட்ட கோணம்

= அளவகளின் துருவங்களுக்கு இடைப்பட்ட தூரம்

= $EY \dots$ (மட்டியளில் (2) (8) காண்க)

$$= 90 + 15r \dots \dots \dots (6)$$

விட PK = வான நடுவரை, கதிரவன் பாதைகளின் துருவங்களுக்கு இடைப்பட்ட தூரம்

= வான நடுவரை கதிரவன் பாதைகளுக்கு இடைப்பட்ட கோணம்

$$= w \dots \dots \dots (7)$$

$\triangle ZPK$ இல்

$$\cos ZK = \cos ZP \cos PK + \sin ZP \sin PK \cos \angle ZPK$$

அதாவது,

$$\cos \theta = \cos (90 - \phi) \cos w + \sin (90 - \phi) \sin w \cos (90 + 15r)$$

$$\cos \theta = \sin \phi \cos w - \cos \phi \sin w \sin 15r$$

இதிலிருந்து θ -இன் மதிப்பு பெறப்படுகிறது.

எனவே E என்ற புள்ளியிலிருந்து தொடுவானத்தின் மேல் x -தூரமுள்ள புள்ளி A -ன் வழியாகத் தொடுவானத்திற்கு ϕ சாக் வட்டம் பெருவட்டமே அந்த சமயத்தில் கதிரவன் பாதையாகும்.

10'2'1 இரண்டாவது வழி

இப்போது முதல் வட்டிய வழியில் கூறியவற்று A -ன் இடம் குறித்ததன்படி, கதிரவன் பாதை, உச்சி வட்டத்தை வெட்டும் புள்ளியான C -ன் துடங்குறித்து விட்டால், A , C வழியாக வரையப்படும் பெருவட்டம் நமக்குக் கதிரவன் பாதையைக் காட்டும்.

இப்போது C யின் இடம் காண்போம்

கோண முக்கோணம் QYC-இல், $\angle YQC = 90^\circ$

∴ தேர்ச்சிப் விதிப்படி

$$\sin YQ = \tan QC \cot \omega.$$

∴ $\tan QC = \sin 15^\circ \tan \omega$ எனப் பெறலாம்.

∴ QC இன் அளவு பெறப்படும்.

$$\begin{aligned} \text{ஆனால் } ZC &= ZQ - QC \\ &= \phi - QC \end{aligned}$$

எனவே உச்சி வட்டத்தின்மேல் Z-வீர்த்து ZC அளவுள்ள இடத்தில் C அமைவும். இப்போது தமக்கு A-ம் C-ம் இரத்தும்பிடம் தெரியும். A, C வழியாக வரையப்படும் பெருவட்டமே அந்த சமவத்தில் கதிரவன் பாதையாகும்.

10-2-2: பெருவட்டம் ZK-ன் நீட்டல் கதிரவன் பாதையை N-ல் சந்திக்கட்டும். அப்போது வட்டத்திற்கு A ஒரு துருவமாகி AN' = 90° . N' தான் கதிரவன் பாதையில் உயர்ந்த புள்ளியாகும். அப்புள்ளியின் ஏற்றக்கோணம் ϕ' ஆகும். N' என்ற புள்ளியை (அச்சமவத்தில் கதிரவனின் பாதையின்) உச்சிப்புள்ளி (Nonagesimal point) என்று குறிப்பிடுகின்றோம்.


10-3 : மண்ணுலகில் பல்வேறு மண்டலங்களில் ஒரு நாட் போக்கில் கதிரவன் பாதை நிலையில் வேறுபாடுகள் (Variations in the position of the Ecliptic in the course of a day in the various zones of the earth.)

முதலில், ஒரு நாட் போக்கில் மண்ணுலகில் பல்வேறு மண்டலப் பகுதிகளில் α -ல் ஏற்படும் மாற்ற மறிதல்.

(1) வெப்ப, மிதவெப்ப மண்டலங்களிலுள்ள இடங்கள்

$$[0 < \phi < 90 - \omega]. \text{—படம் 10-3 (i)}$$

கதிரவன் பாதையின் ஒரு துருவமான K-ன் திசைநிர் பாதை அறிய வரனகோணத்தின் ஒரு துருவம் Pஐ கையாமாகவைத்து ω கோண அளவிலிட்டம் கொண்டு ஒரு சிறுவட்டம் வரைத்தால் அது கதிரவன் பாதையின் துருவம் K-யின் திசைநிர் பாதையென முன்னர் கூறியிருக்கின்றோம். அங்ஙனம் K_1, K_2, K_3, K_4 எனக் கொள்வ.



WLD 10-9 (1)

ஒரு குறிப்பிட்ட பின்வழி நேரம் '1' இல் அதிகமான பாதைகளில் தரலாம் K-ல் இருக்கிறது எனக் கொள்வோம்.

$$\angle KZP = \angle A$$

- I STOW 10-2 (5) 1960 - 1970

ஆனால் $\angle KZP$ என்பதை K ில் அடிவரை நுழைக்க செல்ல வாய் (N-விருத்தி).

எனவே E-க்கும் A என்ற ஏது புள்ளிக்கும் இடையேயுள்ள தூரம்

= அச்சமயத்தில் K-ன் அடிவான தூரம்
என்ற சமன்பாடு கிடைக்கிறது.

இப்பொழுது மீதவெப்ப மண்டலத்தில் உள்ள ஓர் இடத்தில் ($90^\circ < \phi < 80^\circ - w$) K-ன் திசைநிர்யாதை உச்சிவட்டத்தை K_1, K_2 என்ற இடங்களில் உச்சிக்கு (Z) வடக்கே வெட்டுகிற தென்க் கொள்வோம், $[ZP \ 80^\circ - \phi > w]$. மேலும் K-ன் திசைநிர்யாதைவ ZK என்ற குத்துவட்டம் K_1, K_2 என்ற இடங்களில் தொடரும்.

இப்போது கதிரவன் பாதைத் துருவம் K_1 -இலும் K_2 -இலும் இருக்கும்போது, K -ன் அடிவானத்தாரம் மீப்பெருமதிப்பைப் பெறுகிறது. அம்மீப்பெருமதிப்பு

$$= \sin^{-1} (\sin \omega \sec \phi)$$

என நிறுவலாம்.

கோணமூக்கோணம் ZPK_1 -ல்

$$\angle ZK_1P = 90^\circ$$

∴ நேர்மேல் விதிப்படி

$$\sin \omega = \cos \phi \sin \angle PZK_1$$

∴ $\angle PZK_1 = \sin^{-1} (\sin \omega \sec \phi)$

அடிவானமே,

$$K_1ZP = \sin^{-1} (\sin \omega \sec \phi) \quad [4.4 \text{ (ii) காண்க}]$$

எனவே,

$x = AE = \angle KZP$ எனப் பொதுவாக நிறுவியதைப் பொட்டி.

x -ன் மீப்பெருமதிப்பு $\sin^{-1} (\sin \omega \sec \phi)$ எனக் கிடைக்கப் பெறுகிறோம்.

ஆகவே கதிரவன் பாதைத் துருவம் K_1 -ல் இருக்கும்போது, ஏறுபுள்ளி A , E க்குத் தெற்கே மீப்பெருத் தூரத்தில் உள்ளது (இடம் A_1).

மேற்கு K தனது திசைநிலைப் பாதையில் செல்லச் செல்ல x -ன் மதிப்பு குறைகிறது. எனவே, புள்ளி A -ல் கிழக்குப் புள்ளியை நோக்கி நகருகிறது. மேற்கு K_2 என்ற இடத்தை K அடைபயம் பொழுது K_1 -ன் அடிவான தூரம் = 0. அப்போது $x = 0$; ஆகையால் A என்ற புள்ளி E ஓடு ஒருங்குகின்றது. மீண்டும் கதிரவன் பாதைத் துருவம் K_2 -ஐ அடைபயம் வரையில் x -ன் மதிப்பு வளர்ந்து சென்று, K_1 -ல் கதிரவன் துருவம் அடையும்கொழுது x தனது மீப்பெரு மதிப்பைப் பெற்று, அதன் காரணமாக E க்கு வடக்கே மீப்பெரு தூரத்தில் A என்ற ஏறுபுள்ளி அமைகிறது (இடம் A_2).

மேற்கு K என்பது K_2 -ஐ அடைபயம்வரையில், A நிறும்பவும் E -ஐ நோக்கிச் சென்று, K_1 -ல் கதிரவன் பாதைத் துருவம் இருக்கும் போது E -ல் A -ல் ஒருங்குகின்றன. மேலும் K_2 -ஐ நான்கு, K நேரடிப்போக, x வளர்கிறது; எனவே A ம் E -யினிந்து மீண்டும் மறுபடியும் K_1 -க்குக் கதிரவன் பாதைத் துருவம் வரும்போது, A , E

யிலிருந்து மறுபடியும் ஃரீபெரூத் தூரத்தில் E -க்குத் தெற்கே அமைகிறது (A_1).

இவ்வாறு ஒரு தாளில் ஏறுபுள்ளி A கிழக்குப் புள்ளியின் இரு புறங்களிலும் $\sin^{-1} (\sin \psi \sec \phi)$ என்ற தூரத்திற்கு வசவாடு கிறது. இவ்வாறே அதற்கு நேரெதிர்த் புள்ளியான இரங்கு புள்ளி B யும் மேற்குப் புள்ளியின் இருமருங்கிலும் $\sin^{-1} (\sin \psi \sec \phi)$ என்ற தூரத்திற்கு வசவாடும்.

$\angle ZPK_1 = h$ ஆனால், சதிரவன் பாதையின் துருவம், K_1 - லிருந்து K_2 -க்குச் செல்ல எடுத்துக்கொள்ளும் நேரம் $\frac{24}{15}$ மணி ஆகும். இவ்வேகங்களில் ஏறுபுள்ளி தென்சோடியிலிருந்து வட சோடியுக்குச் செல்கிறது.

கோள முக்கோணம் ZPK_1 -ல்,

$$\angle ZK_1P = 90^\circ$$


$\therefore$ நேர்மயச் சிதிர்ப்படி

$$\cos h = \tan \psi \tan \phi$$

$$\therefore h = \cos^{-1} (\tan \psi \tan \phi)$$

எனவே ஏறுபுள்ளி தென்சோடியிலிருந்து வடசோடியுக்குச் செல்ல எடுத்துக் கொள்ளும் நேரம்

$$\therefore \cos^{-1} (\tan \psi \tan \phi) \text{ மணி ஆகும்.}$$



படம் 10-8 (2)

மேலும் வடகோடியிலிருந்து தென் கோடிக்குத் திரும்பி வரும் நேரம்

$$24 - \frac{1}{15} \cos^{-1} \{ \tan \omega \tan \phi \} \text{ எனப் பெறப்படுகிறது.}$$

(2) குளிர் மண்டலத்திலுள்ள இடங்கள் ($90 - \omega < \phi < 90$).

படம் 10-8 (3) காண்க.

குளிர் மண்டலத்திலுள்ள இடங்களில் கதிரவன் பாதையின் ஒரு துருவமான K-யின் திணைப்பாதை, உச்சி வட்டத்தை, உச்சியின் (Z) இரு புறங்களிலும் வெட்டுகின்றது ($\because ZP = 90 - \phi < \omega$) இப்போது K-யின் அடிமான தூரம் 0° முதல் 90° வரை மாறி வருகிறது. எனவே x-ன் அளவும் ($x = AE$) 0° முதல் 90° வரை மாறும். எனவே இவ்விடங்களில் ஏறுபுள்ளியும் இறங்கு புள்ளியும் தொடுவானத்தின்மேல் முழுச்சுற்று சுற்றி வரும் எனப் பெறப்படும்.

(3) கடகரேகையின்மீதுள்ள இடங்கள் ($\phi = \omega$)

இவ்விடங்களில் K-ன் திணைப்பாதை தொடுவானத்தை வடக்குப் புள்ளியில் தொட்டுக்கொண்டு செல்கிறது. K, வடக்குப் புள்ளியைத் தொடும்பொழுது ஏறுபுள்ளி A, கிழக்குப் புள்ளி Eயுடன் இணைந்து இருக்கிறது. அப்போது கதிரவன் பாதை மூக்குத்து வட்டத்துடன் இணைகிறது. ஏறுபுள்ளி A மூன் கண்டபடியே Eக்கு இருபுறங்களிலும் $\sin^{-1} (\sin \omega \sec \phi)$


$$= \sin^{-1} (\sin \omega \sec \omega)$$

$$= \sin^{-1} (\tan \omega)$$

தூரத்திற்கு அடிகிறது.

(4) வெப்ப மண்டலத்திலுள்ள இடங்கள் ($\phi < \omega$).

படம் 10-8 (4) காண்க.



படம் 10-8 (4)

வெப்ப மண்டலத்தில் உள்ள இடங்களில் K-ன் திசைநிர்-
பாதை தொடுவானத்தை K_1 , K_2 -ல் வெட்டுகிறதெனக் கொள்-
வோம். ($\angle NP = \phi < \omega$).

கதிரவன் பாதையின் ஒரு துருவம் K_1 தொடுவானத்தின்
மேலிருக்கும்பொழுது $K_1Z = 90^\circ$. எனவே அப்போது கதிரவன்
பாதை Z வழியாகச் செல்கிறது. இத்தக் காரணமே K_1 -ற்கும்
பொருத்தும். அங்னிரு சமயங்களிலும் கதிரவனின் பாதை
செங்குத்தாக அமையும்.

$\angle K_1PZ = h$ எனின், K என்ற துருவம் K_1 -லிருந்து K_2 -லிற்கு
வர எடுத்துக்கொள்ளும் தேரம் $\frac{2h}{15}$ மணிவாரும்.

கோளமுக்கோணம் K_1PN -ல், $\angle PNK_1 = 90^\circ$

$\therefore$ தேய்சிய விதிப்படி.

$$h = \cos^{-1} \{ -\tan \phi \cot \omega \}.$$

அதாவது வெப்ப மண்டலத்திலுள்ள இடங்களில் தினத்தோறும்
இருமுறை கதிரவன் பாதை தொடுவானத்திற்குச் செங்குத்தாக
அமரவிரது. இங்னிரு நிலைகளுக்கும் இடைப்பட்ட தேரம்
 $\frac{1}{15} \cos^{-1} \{ -\tan \phi \cot \omega \}$ மணிகளாகும்.

10.5 : 6-ன் மதிப்பில் மாறுதல்கள் காரணம்

ϕ = தொடுவானம், கதிரவன் பாதைகளுக்கு இடைப்பட்ட
கோணம்

= அப்பெரு வட்டங்களின் துருவங்களுக்கு இடைப்பட்ட
துரம்

$$= ZK_1 \dots \dots \dots [10.1 (4) \text{ காரணம்}].$$

K_1 -ல் K இருக்கும்பொழுது $ZK = \phi$ தனது மீச் சிறுமதிப்பைப்
பெறுகிறது. K_2 -ல் K இருக்கும்பொழுது $ZK = \phi$ தனது மீப் பெரு-
மதிப்பைப் பெறுகிறது. [படம் 10-2 காரணம்]

$$\begin{aligned} \therefore 6\text{-ன் மீப் பெருமதிப்பு} &= ZK_1 \\ &= ZP + PK_1 \\ &= 90 - \phi + \omega \\ \text{மேலும் } 6\text{-ன் மீச்சிறு மதிப்பு} &= ZK_2 \\ &= ZP - PK_2 \\ &= 90 - \phi - \omega \end{aligned}$$

$\phi > \gamma$ ஆக இருக்கும் போது ϕ -ன் மீப்பெருமதிப்பு $90 - \phi + \gamma < 90^\circ$. எனவே கதிரவன் பாதை எப்போதும் தொடுவானத்தைச் செங்குத்தாக வெட்டுவதில்லை. $\phi = \gamma$ ஆக இருக்கும்பொழுது ϕ -ன் மீப்பெருமதிப்பு $90 - \phi + \gamma = 90^\circ$. எனவே ஒருநாட் போக்கில் ஒரே ஒருசமயத்தில் மரத்திரம் கதிரவன் பாதை தொடுவானத்திற்குச் செங்குத்தாக அமைகின்றது.

$\phi < \gamma$ ஆக இருக்கும்பொழுது ϕ -ன் மீப்பெருமதிப்பு $90 - \phi + \gamma > 90$, எனவே கதிரவன் பாதை இருசமயங்களில் தொடுவானத்திற்குச் செங்குத்தாக அமைகிறது.

அதாவது

(1) வெப்ப மண்டலத்திற்கு அப்பாற்பட்ட இடங்களில் கதிரவன் பாதை ஒருபோதும் தொடுவானத்திற்குச் செங்குத்தாக அமையாது;

(2) கடகரேகையில் ($\phi = \gamma$) உள்ள இடங்களில் ஒருநாள், ஒருமுறை, கதிரவன் பாதை தொடுவானத்திற்குச் செங்குத்தாக இருக்கும்; அப்போது மூலக்குத்து வட்டத்தோடு ஒருங்கியிருக்கும்;

(3) வெப்பமண்டலத்தில் ஒருநாளில் இருமுறை கதிரவன் பாதை, தொடுவானத்திற்குச் செங்குத்தாக இருக்கும்.

10-6 : கதிரவன் பாதைச் சரிவை நிர்ணயித்தல் (Determination of the Obliquity of the Ecliptic)

கதிரவன் கோடைத்திருப்ப நிலைக்கு வரும்போது அதன் நடுவரை விலக்கம் γ , வர ஏற்றம் 90° ஆகியது மெணி. மேல் உச்சி கடத்தல் மூன்றியில் கதிரவன் இருக்கும்பொழுது மீள்வழிநேரம் மெணியானால் கதிரவன் சரியாகக் கோடைத்திருப்பத்தில் இருக்கிற தென்பது உறுதி; ஆனால் கதிரவன் உச்சிகடக்கும் நேரமும் கோடைத் திருப்ப நிலையை அடையும் நேரமும் ஒன்றாக இருக்க வேண்டும் என்பது இன்றியமையாததல்ல. கதிரவன் உச்சிக் கடப்பதற்குச் சற்று முன்னே, பின்னே கோடைத்திருப்ப நிலையைக் கடக்கக்கூடும். எனவே ஐரன் 22-ம் தேதியன்று, கதிரவன் உச்சி கடக்கும்போது, அதன் உச்சி தூரமும் (x) மீள்வழிநேரமும் (t) பதிவுசெய்வதாகக் கொள்வோம்.

$\phi = x + \delta$ என்ற வாய்பாடு கொண்டு δ -வின் மதிப்பையும்,
 $t = x'$ (உச்சிகடக்கும் சமயம்)


என்ற மதிப்பையும் கணிக்கலாம். உச்சிகடக்கும்போது,

$$\therefore \delta = \phi - x$$

$= \gamma - x$ எனக்கொள்க. (படம் 10-6 காண்க)

$\alpha' = 90 + \alpha$ எனக் கொள்க.

எனவே δ உம், α உம் நமக்குத் தெரியும். மேலும் α, x விசச்சிறிய ஆளவுகளே.



மடம் 10-6

வரையறுக்க கோணங்கோணம் YMS ல் (மடம் 10-6)

$$\sin (90 \pm \alpha) = \tan \delta \cot \omega$$

$$\therefore \cos \alpha = \frac{\tan \delta}{\tan \omega} \quad \dots (A)$$

$$\text{ஆதலால் } \frac{\cos \alpha}{1} = \frac{\tan \delta}{\tan \omega}$$

$$\therefore \frac{1 - \cos \alpha}{1 + \cos \alpha} = \frac{\tan \omega - \tan \delta}{\tan \omega + \tan \delta}$$

$$\tan^2 \frac{\alpha}{2} = \frac{\sin (\omega - \delta)}{\sin (\omega + \delta)}$$

$$\therefore \sin (\omega - \delta) = \sin (\omega + \delta) \tan^2 \alpha / 2$$

$\omega - \delta = x$ விசச்சிறியது; α சிறியது; ω வும் δ வும் ஏறக்குறைய சமம்.

$\therefore (\omega + \delta)$ -உம் 2δ -ம் ஏறக்குறைய சமம்;

எல்லாக் கோணங்களையும் ஆரையன் அளவில் கொண்டால்,

$$x = \frac{\alpha^2}{4} \sin 2\delta$$

δ -உம், α -உம் நமக்கு அளக்கப்பட்டிருப்பதால் ω இன் மதிப்பைக் காணக்கூடும்.

$$\therefore \omega = \delta + \frac{\alpha^2}{4} \sin 2\delta \text{ எனப் பெறுகிறோம்; ஆனால்}$$

α ஆரையன் அளவில் உள்ளது.

$\dots (B)$

$w = \theta + \frac{\theta^2}{4} \sin 2\theta$ என்ற மதிப்பை, மீள் கொடுக்கப்

படும் பொது வாய்பாட்டினின்றும் பெறலாம். அப்போது வாய்பாடு, திறவப்படுவதைக் காண்க.

10.7 பொது வாய்பாடு

$\tan y = \left(\frac{1+i}{1-i} \right) \tan x$ என்ற சமன்பாடு வாயிலாக,

$$y = x + i \sin x + \frac{i^3}{3} \sin 3x + \dots \infty$$

என்ற கத்தழித் தொடர் பெறப்படுகிறது. இது சில இடங்களில் பயன்படுத்தப்படுவதால், இங்கு அதை திறவுகோல், கொடுக்கப் பட்ட சமன்பாடு,

$$\tan y = \left(\frac{1+i}{1-i} \right) \tan x$$

$$\therefore \frac{e^{iy} - e^{-iy}}{e^{iy} + e^{-iy}} = \frac{(1+i)(e^{ix} - e^{-ix})}{(1-i)(e^{ix} + e^{-ix})}$$

$$\therefore \frac{e^{2iy} - 1}{e^{2iy} + 1} = \frac{(1+i)(e^{ix} - 1)}{(1-i)(e^{ix} + 1)}$$

$$\begin{aligned} \therefore e^{2iy} &= \frac{(1+i)(e^{ix} - 1) + (1-i)(e^{ix} + 1)}{(1-i)(e^{ix} + 1) - (1+i)(e^{ix} - 1)} \\ &= e^{2ix} \left(\frac{1 - ie^{-ix}}{1 - ie^{ix}} \right) \end{aligned}$$

இரு பக்கங்களிலும் மடக்கை (log) எடுக்க,

$$2iy = 2ix + \log(1 - ie^{-ix}) - \log(1 - ie^{ix})$$

$$\begin{aligned} &= 2ix - \left(ie^{-ix} + \frac{i^3}{3} e^{-3ix} + \frac{i^5}{5} e^{-5ix} + \dots \right) \\ &\quad + \left(ie^{ix} + \frac{i^3}{3} e^{3ix} + \frac{i^5}{5} e^{5ix} + \dots \right) \\ &= 2ix + i(e^{ix} - e^{-ix}) \\ &\quad + \frac{i^3}{3}(e^{3ix} - e^{-3ix}) \\ &\quad + \frac{i^5}{5}(e^{5ix} - e^{-5ix}) \dots \dots \dots \end{aligned}$$

$$= 2ix + 2i \left[i \sin 2x + \frac{i^3}{2} \sin 4x + \frac{i^5}{8} \sin 6x + \dots \right]$$

∴ இது பக்கக்கண்ணாடி 2i ஆக வகுக்க,

$$y = x + i \sin 2x + \frac{i^3}{2} \sin 4x + \frac{i^5}{8} \sin 6x + \dots$$

என்ற சமன்பாடு பெறப்படும்.

... (1)

இப்போது,

$$\tan y = \left(\frac{1-i}{1+i} \right) \tan x \text{ எனக் கொண்டால்,}$$

$$y = x - i \sin 2x + \frac{i^3}{2} \sin 4x - \frac{i^5}{8} \sin 6x + \dots$$

என்ற சமன்பாடு பெறப்படும்.

... (2)

இப்போது, 10-6 (A) வழியாக,

$$\tan w = \frac{\tan \delta}{\cos \alpha} = \frac{\tan \delta}{1 - \tan^2 \alpha/2} \cdot \frac{1 + \tan^2 \alpha/2}{1 + \tan^2 \alpha/2}$$

$\tan^2 \alpha/2 = t$ என கடுசெய்வ,

$$\tan w = \left(\frac{1+t}{1-t} \right) \tan \delta \text{ எனப் பெறப்படும்.}$$

எனவே,

$$w = \delta + i \sin 2\delta + \frac{i^3}{2} \sin 4\delta + \frac{i^5}{8} \sin 6\delta + \dots$$

என்ற சமன்பாடு பெறப்படும்.

1 இன் மதிப்பு மிகச் சிறிதானால்,

$$w = \delta + i \sin 2\delta \text{ (தோராயமாக)}$$

$$10-6 (B) \text{ கானால், } \therefore w = \delta + \tan^2 \frac{\alpha}{2} \sin 2\delta$$


$$= \delta + \frac{\alpha^2}{4} \sin 2\delta \left(\frac{\alpha - \text{மிகச் சிறிதானால்}}{4} \right)$$

10-6 : மேட குதற்புள்ளியின் நிலை காணல் (Fixing the Position of the first point of Aries)

ஒரு விண்மீன் உச்சிவடக்கும்பொழுது, அதன் வல ஏற்றம், அச்சமவத்திலுள்ள மீன்வழிக் காலத்திற்குச் சமமாகும் என நாம் அறிவோம். ($t = \alpha \pm h$; $h = 0$) எனவே, விண்மீன்களின் வல

ஏதற்க்கிற நாம் சரியாகக் கணக்கிடவேண்டுமானால் மேட்டூதற் புள்ளி (γ) உச்சிகடக்கும்பொழுது நம்மிடமுள்ள விண்மீன் கடிசாரம் மே. 0.தி. 0.வி. கூட்டவேண்டும். ஆனால் மேட்டூதற்புள்ளி γ ஒரு கற்பனைப் புள்ளியாதலின் அதுகடக்கும் நேரத்தைக் கண்டு, மீன் வழிநேரம் காட்டும் கடிசாரத்தைத் திருத்தமுடியாது. மீன் வழிக் கடிசாரத்தைத் திருத்தப் பின்வரும் வழிகளைக் காண்போம்.

10-8-1 : முதல் வழி



படம் 10-8-1

படம் 10-8-1 காண்க.

S ஒரு விண்மீன்; SM அதன் நடுவரை விலக்கப் பெறுவட்டம். M என்பது அக்வட்டத்தின் மாதம். CL , கதிரவன் மாறை; பொதுவாகக் கதிரவன் நடுப்பக்கத்தின் γ ஐக் கடக்கும் என்று ஏற்கமுடியாது. ஆனால் அது எப்போதாவது ஏற்படலாம். இப்போது CL -ல் S_1 என்பது கதிரவன் γ ஐக் கடப்பதற்கு முன்னுள்ள நடுப்பக்க நிலை. S_2 என்பது γ ஐக் கடத்திவிடுவதன் அடுத்த நடுப்பக்க நிலை. இவ்விரு நிலைகளிலும் கதிரவன் உச்சிகடக்கும் விண்மீன் நேரங்களைப் பதிவுசெய்து கொள்ளவேண்டும். படத்தில் M_1 உம் M_2 உம் S_1, S_2 வழிவாகவரைவப்படும் நடுவரை விலக்கப் பெறுவட்டங்களின் மாதங்கள். வானியல் கூடம் இருக்கும் இடத்தின் அகலங்கு ϕ எனக் கொள்வோம். கதிரவன் S_1 ல் உச்சிகடக்கும்போது அதன் உச்சி தூரம் Z_1 என அளந்து $\phi = Z_1 + \delta_1$ என்ற வாய்பாட்டினைப் பயன்படுத்தி δ_1 -ன் மதிப்பை அறிவலாம். இவ்வு நடுவரை விலக்கம் δ_1 குறைக்குறி பெற்றிக்கும். அன்று S என்ற விண்மீன் உச்சிகடக்கும் மீன்வழி நேரத்தைப் பதிவுசெய்துகொள்ளவேண்டும். அந்தாள் கதிரவன் உச்சிகடக்கும் சமயத்திற்கும் விண்மீன் உச்சிகடக்கும் சமயத்திற்கும் இடைபட

யட்ட தேரம் ஏன்வெனக் கணித்துக்கொள்ளலாம். இவ்விடை வெளிவெளி எனக்கொள்க. அடிதாரம் சரிவரக் காலம் காட்டவில்லை யாயினும் இடைவெளி x சரிவாகவே இருக்கும். இதனைப் பாதைக்கு மாற்றினால் M_1M -ன் பாதை அளவு கிடைக்கும். M_1M -என்பது கதிரவன், விண்மீன் இரண்டிற்கும் உள்ள வல ஏற்றத்தின் வேறுபாடாகும். அடுத்த நாள் நடுப்பகையில் கதிரவன் γ -ஐத் தாண்டி S_1 -ல் இருக்கும்போது கதிரவனின் நடுவரை விவக்கம் (δ_1) கூட்டு மதிப்புடையதாக இருக்கும். கதிரவன் S_1 -ல் இருக்கும்போது உச்சிவட்டத்தில் உச்சித்தூரம் Z_1 என அளந்து $\phi = Z_1 - \delta_1$ என்ற வாய்பாட்டினைப் பயன்படுத்தி δ_1 -ன் மதிப்பை அறிவலாம்.

மேலும் விண்வழிநாள் கூட்டும் அடிதாரம் கொண்டு இரண்டாவது நாளும் விண்மீன் S உச்சிவட்டத்தும் நேரத்தைப் பதிவு செய்துகொள்ளவேண்டும். அன்று கதிரவனும் விண்மீனும் உச்சிவட்டத்தும் சமவகைக்கு இடைப்பட்ட தேரம் y -எனக் கணித்துக் கொள்ளலாம். இதனைப் பாதைக்கு மாற்ற M_1M -ன் பாதை அளவு கிடைக்கும். இது இரண்டாம் நாள் கதிரவன், விண்மீன் இரண்டிற்கும் உள்ள வல ஏற்றத்தின் வேறுபாடாகும்.

கதிரவனின் வல ஏற்றமும் நடுவரை விவக்கமும் அவ்வொரு நாள் இடைவெளியில் சீராக மாறுகிறதெனக் கொள்வோம். ஒரு நாளில் நடுவரை விவக்கத்தில் ஏற்பட்ட மாறுதல் $|\delta_1| + \delta_1$ ஆகும். இம்மாறுதல் கதிரவன் S_1 -லிருந்து S_2 -க்குச் செல்லும் கால இடைவெளியில் ஏற்பட்டதாகும். எனவே S_1 -லிருந்து கதிரவன் γ -ய்க்கு வர எடுத்துக்கொண்ட தேரம் $|\delta_1|/\delta_1| + \delta_1$ ஆகும்.

S_1 -லிருந்து S_2 -க்குச் செல்லும்போது வல ஏற்றத்தில்

$$\begin{aligned} \text{மாறுதல்} &= M_1M_2 \\ &= M_1M - M_2M \\ &= x - y \end{aligned}$$

அதாவது ஒருநாளில் கதிரவன் வல ஏற்றத்தில் ஏற்படும் மாறுதல் $x - y$. எனவே கதிரவன் S_1 -லிருந்து γ வரும் நேர இடைவெளியில் ஏற்படும் வல ஏற்ற மாறுதல்

$$(x - y) / |\delta_1| / |\delta_1| + \delta_1$$

இது $M_1\gamma$ -க்குச் சமமாகும்.

எனவே விண்மீன் S இன் சரிவாகக் கணிக்கப்பட்ட வல ஏற்றம்

$$\begin{aligned} \Delta &= \gamma M \\ &= M_1M - M_1\gamma \end{aligned}$$

கதிரவன் பாதை குறித்தல்

பதிலும் செய்து, γ -ன் இடத்தைக் கணிப்பதோடும்பொழுது கதிரவன் பாதைச்சாய்வையும் கணிக்கலாம்.

கதிரவன் γ -ஐத் தண்ணிலுச்சென்ற சில நாட்களுக்கும் பின்பு, ஒரு நாள் கதிரவன் உச்சிகடக்கும் சமயம், மீள்வரும் காட்சிப் பதிவுகள் செல்வோம்:

(1) கதிரவன் S_1 உச்சி கடக்கும் மீள்வழி நேரம் t_1 .

(2) உச்சி கடக்கும் சமயத்தில் கதிரவனின் உச்சித்தரம். அன்று ஒரு வினாமின் δ உச்சி கடக்கும் சமயம், மீள் வழி நேரம் t_2 உம் பதிவு செல்வோம். அங்விடத்தின் அகலங்கு ϕ என இருப்பின் $\phi = x_1 + \delta_1$ என்ற வாய்பாடு கொண்டு δ_1 (கதிரவன் நடுவரை நிலைமம்) கணிக்கலாம். $|t_1 - t_2| = x_1$ எனக் கொள்வோம்.

படத்தில்

$$S_1 M_1 = \delta_1; M_1 M = x_1$$

சில நாட்கள் கழித்து, மற்கொரு நாள், கதிரவனுக்கும் அதே விண் பிணுக்கும், ஒத்தகூறிய பதிவுகள் செய்து $S_2 M_2 = \delta_2; M_2 M = x_2$ எனப் பெறலாம்.

ஒர்த் காட்சிப் பதிவு நாளன்று கதிரவன் வல ஏற்றம் α எனவும், இரண்டாம் காட்சிப் பதிவு நாளன்று கதிரவன் வல ஏற்றம் $\alpha + x$ எனவும் கொண்டால்,

$$\gamma M_1 = \alpha; \gamma M_2 = \alpha + x$$

ஆகும். x_1, x_2 மதிப்புகள் நமக்குத் தெரிவுமாகவால்

$$\begin{aligned} x_1 - x_2 &= M_1 M - M_2 M \\ &= M_1 M_2 \\ &= x \end{aligned}$$

என்ற அளவு கிடைக்கும்.

கோள மூக்கோணம் $S_1 \gamma M_1$ விஞ்சுது

$$\sin \alpha = \cot \omega \tan \delta_1 \text{ என்ற சமன்பாடும்} \quad \dots (1)$$

கோளமூக்கோணம் $S_2 \gamma M_2$ விஞ்சுது

$$\sin (\alpha + x) = \cot \omega \tan \delta_2 \text{ என்ற சமன்பாடும் பெறப்படும்.} \quad \dots (2)$$

எனவே,

$$\frac{\tan \delta_1}{\tan \delta_2} = \frac{\sin \alpha}{\sin (\alpha + x)}$$

அதாவது

$$\begin{aligned} \frac{\tan \delta_1}{\tan \delta_2} &= \frac{\sin \alpha \cos x + \cos \alpha \sin x}{\sin \alpha} \\ &= \cos x + \sin x \cot \alpha. \end{aligned}$$

கதிரவன் பாதை சூறித்தல்

($\rho = x_1 + \delta_1$). அன்று கதிரவனும் விண்மீன் S' -ம் உச்சி கடக்கும் நேரங்களைப் பதிவு செய்து, அவ்விரு நேரங்களின் வேறுபாடு, x_1 எனக் கொள்வோம். அன்று, விண்மீன் S' -ன் வல ஏற்றத்திற்கும், கதிரவன் வல ஏற்றத்திற்கும் உள்ள வேறுபாடு படத்தில் காட்டப் படி $M_1 M'$. எனவே $M_1 M' = x_1$ எனப் பெறப்படுகிறது. கதிரவன் பாதை மீது S என்ற புள்ளி $\gamma S_1 = S$ என்றிருக்குமாறு குறித்துக் கொள்வோம். அப்போது S -ன் நடுவரை விலக்கம் SM என்பது δ_1 -க்குச் சமமாகும். (ஏனெனில் $\triangle \gamma S_1 M_1 = \triangle S M$). கதிரவன் S -ல் இருக்கும்பொழுது உச்சிகடத்தல் நிலையானிருக்கும் என்று கொள்ளமுடியாது. S என்ற நிலைக்குக் கதிரவன் வருவதற்கு முத்திய நண்பகலில் S_2 -இலும், அடுத்த நண்பகலில் S_3 -இலும் உச்சி கடப்பதாகக் கொள்வோம். $S_2 M_2 = \delta_2$; $S_3 M_3 = \delta_3$ என்பன முறையே அம்விரு நாட்களில் கதிரவனின் நடுவரை விலக்கத்தைக் குறிக்கின்றன. δ_1 பெற்ற முறைப்படியே δ_2 -உம் δ_3 -உம் அவ்விரு நாட்களிலும் பெறப்படவேண்டும். அவ்விரு நாட்களிலும் கதிரவனும் விண்மீன் S' -உம் உச்சி கடக்கும் நேரங்களின் வேறுபாடுகள் முறையே x_2, x_3 எனக் (x_1 கணக்கிட்ட படி) கணக்கிடலாம். எனவே படத்தில் $M_2 M' = x_2$ எனவும் $M_3 M' = x_3$ எனவும் பெறப்படும்.

ஒரு தாளில் கதிரவன் நடுவரை விலக்கத்தில் மாறுதல் $= \delta_2 - \delta_1$

S_1 -விருந்து S_2 -க்குச் செல்லும் வரை } $\delta_2 - \delta_1$
விலக்கத்தில் மாறுதல்

எனவே நடுவரை விலக்கம் ($\delta_2 - \delta_1$) மாறுதலுக்கு எடுத்துக் கொள்ளப்பட்ட நேரம் $\frac{\delta_2 - \delta_1}{\delta_3 - \delta_2}$ தான். (A)

ஒரு தாளில் கதிரவன் வல ஏற்றத்தில் } $M_2 M_3$
ஏற்பட்ட மாறுதல் } $M_2 M' - M_3 M'$
} $x_2 - x_3$

எனவே $\frac{\delta_2 - \delta_1}{\delta_3 - \delta_2}$ தாளில் கதிரவன் வல } $\frac{\delta_2 - \delta_1}{\delta_3 - \delta_2} (x_2 - x_3)$
ஏற்றத்தில் ஏற்பட்ட மாறுதல் }

அதாவது,

$$M_2 M = \frac{\delta_2 - \delta_1}{\delta_3 - \delta_2} (x_2 - x_3)$$

$$\begin{aligned}
 \therefore M_1 M &= M_1 M_2 + M_2 M \\
 &= M_1 M' - M_1 M' + M_2 M \\
 &= x_1 - x_2 + \frac{s_2 - s_1}{s_2 - s_3} (x_1 - x_2)
 \end{aligned}$$

r = இன் மையப் புள்ளி 0.

$$\therefore \triangle \gamma S_1 M_1 = \triangle \triangle S M$$

$$\gamma M_1 = M \triangle$$

$\therefore M_1 M$ இன் மையப் புள்ளி 0 தான்.

எனவே $M_1 O = \frac{1}{2} M_1 M$

$$= \frac{1}{2} \left\{ (x_1 - x_2) + \frac{s_2 - s_1}{s_2 - s_3} (x_1 - x_2) \right\}$$

முதல் தாவி பதினெட்டுவது கதிரவனின் வல ஏற்றம் :

$$= \gamma M_1$$

$$= \gamma O - M_1 O$$

$$= 0^{\circ} - \frac{1}{2} \left\{ (x_1 - x_2) + \frac{s_2 - s_1}{s_2 - s_3} (x_1 - x_2) \right\} \text{ மணிசுள்}$$

எனவே மின்மீள் S^1 -ன் வல ஏற்றம்

$$= \gamma M'$$

$$= \gamma M_1 + M_1 M'$$

$$= \gamma O - M_1 O + M_1 M'$$

$$= 0^{\circ} - \frac{1}{2} \left\{ (x_1 - x_2) + \frac{s_2 - s_1}{s_2 - s_3} (x_1 - x_2) \right\} \text{ ம} + x_1 \text{ ம.}$$

முன்போலவே இங்கும் இம் மதிப்பைப் பயன்படுத்தி மின்வழிக் கடினாத்தைத் திருத்திக் கொள்ளலாம்.

குறிப்பு : பளாம்பட்ட முறைவினாள் அனுபவங்கள்

(1) 10.5-8 (A) இல் $\frac{s_2 - s_1}{s_2 - s_3}$ என்று கொள்ளப்படும் அளவுக்கு

தாம் உச்சி தூரங்கள் பதிவு செய்தபடி, $\frac{x_1 - x_2}{x_2 - x_3}$ என்ற அளவைப் பயன்படுத்தலாம். அப்போது நமக்கு அவ்விடத்தின் அகலங்கு ϕ இன் மதிப்பு தேவைப்படாது.

(2) s_1, s_2, s_3 ஒன்றும் ஏறக்குறைய சமமாதலால், x_1, x_2, x_3 ஒன்றும் ஏறக்குறைய சமமாகிவிடும். ஆகவே, $(x_1 - x_2)$ என்ற அளவிலும் $(x_1 - x_3)$ என்ற அளவிலும் கதிரிக்கோட்டப் பிழையை

கதிரவன் பாதை குறித்தல்

விடைக்கிடைக்கும் பதிலு சொல்லு பெற்ற அளவுகளையே ஏற்றுக் கொள்ளலாம்.

(3) குறிப்பிட்ட விண்மீனின் சரியான வல ஏற்றம் நாம் கண்டு பிடிப்பதால், மீன்வழிக் கடினாரத்திலுள்ள தனிப் பிறை, வேகம் அல்லது வேகக் குறைவுப் பிறை விதிதம் யாவும் கணித்தாகிவிடலாம்.

(4) கதிரவனும், விண்மீனும் உச்சி கடக்கும் நேரங்களின் மாறுபாடுகளையுடனே நாம் கணக்கிடுவதற்குரியதலால், மீன் வழிக் கடினாரத்திலுள்ள பிறைகள் ஒன்றுக்கொன்று சரிக்கட்டிப் போகும்.

எனவே, இம்முறை பற்றிக் முறைகளிடை விரும்பற்பாலது. ஆனால் சோதனை ஏதக்குறைய ஆறு மாத காலம் கொள்ளும். அளவது கதிரவன் γ விளிந்து இக்கு வரும் அளவையண்டுக் காலமாகும்.


10.9:

எ.கா.1: கதிரவன் நடுவரை விடைக்கங்கள் 8, 8' ஆக இருக்கும் பொழுது கதிரவன் வல ஏற்றத்திற்கும் ஒரு விண்மீன் வல ஏற்றத் துக்கும் உள்ள வேறுபாடும் முறையே α , α' . அப்போது விண் மீனின் வல ஏற்றம்

$$\tan^{-1} \left\{ \frac{\sin \alpha \tan 8' - \sin \alpha' \tan 8}{\cos \alpha \tan 8' - \cos \alpha' \tan 8} \right\}$$

அல்லது இதன் மிகை திரிபுக் கோணம் என நினைவு.

விண்மீனின் வல ஏற்றம் x -எனக் கொள்க.



படம் 10.9 (1)

கதிரவனின் நடுவரை விடைக்கம் 8 ஆனால், அதன் வல ஏற்றம் $x = \alpha$ அல்லது $x + \alpha$ ஆக இருக்கும்.

வல ஏற்றத்தை $x - \alpha$ எனக் கொள்வோம், அப்போது
கோண மூக்கோணம் γ SM-ல்

$$\sin(x - \alpha) \cot \delta = \cot \omega$$

அவ்வாறே

$$\sin(x - \alpha') \cot \delta' = \cot \omega$$

$$\therefore \frac{\sin(x - \alpha)}{\tan \delta} = \frac{\sin(x - \alpha')}{\tan \delta'}$$

$$\begin{aligned} \sin x \cos \alpha - \cos x \sin \alpha \tan \delta' &= (\sin x \cos \alpha' - \cos x \sin \alpha') \tan \delta \\ \sin x (\cos \alpha \tan \delta' - \cos \alpha' \tan \delta) &= \cos x (\sin \alpha \tan \delta' - \sin \alpha' \tan \delta) \end{aligned}$$

$$\therefore \tan x = \frac{\sin \alpha \tan \delta' - \sin \alpha' \tan \delta}{\cos \alpha \tan \delta' - \cos \alpha' \tan \delta}$$


வல ஏற்றத்தை $x + \alpha$ ஆக்கக்கொண்டால் மத்தேரீ மதிப்பு வரும்.

எ.கா. 2.

பின்வரும் அட்டவணைகளிலிருந்து மார்க்சு மாதம் 24ம் தேதி யன்று கதிரவனின் வல ஏற்றத்தைக் கணிக்க. மற்றும் மார்க்சு 24ம் தேதியன்று செப்டெம்பர் 19ம் தேதியன்றும் அடிவரத்தின் பிழைத்திருத்தங்கள் காண்க.

	மார்க்சு 24	செப்டெம்பர் 18	செப்டெம்பர் 19
நடுப்பகல் கதிரவனின் நடுவரை நிலக்கம்.	1° 28' 25"	1° 48' 40"	1° 26' 24"
கதிரவன் உச்சி கடக்கும் நேரம்	0 ம 13 நி 48 வி	11 ம 18 நி 4 வி	11 ம 46 நி 29 வி
விண்மீன் சிவியஸ் உச்சி கடக்கும் நேரம்	6 ம 42 நி 43 வி	6 ம 42 நி 29 வி	6 ம 42 நி 29 வி

படம் 10-9 (2) இல் S' என்பது விண்மீன் சிவியஸ்க்கு குறிக்கட்டும். அதன் நடுவரை நிலக்க லட்டத்தின் மாதம் M', γ ன்ரு இடையே இருக்கும்; (ஏனெனில் சிவியஸ்க்கின் வல ஏற்றம்



படம் 10-9 (2)

6 மணிக்கும் 7 மணிக்கும் இடைப்பட்டிருக்கிறது). காட்சிப் பதிவு செய்யப்பட்ட தேதிகளில் கதிரவனின் நடுவரை விலக்கங்கள்

$$\delta_1 = 1^\circ 25' 25'' \text{ (மார்ச்சு 24)}$$

$$\delta_2 = 1^\circ 49' 40'' \text{ (செப்டெம்பர் 18)}$$

$$\delta_3 = 1^\circ 28' 24'' \text{ (செப்டெம்பர் 19)}$$

இம்மூன்று தேதிகளிலும் நடுப்பகலில் கதிரவன் நிலைகள் S_1 , S_2 , S_3 எனவும், M_1 , M_2 , M_3 என்பவை நுழையு அப்புள்ளிகளின் வழியே வரையப்படும் நடுவரை விலக்க வட்டங்களின் மாதக் கணனையும் கொள்வோம்.

ஆப்போது

$$S_1 M_1 = \delta_1, S_2 M_2 = \delta_2, S_3 M_3 = \delta_3$$

$\therefore S = \gamma S$, என்ற வகையில் S என்ற புள்ளியை எடுத்துக் கொள்ளுவோம். ஆப்போது,

$$S_1 M_1 = SM = \delta_1$$

இம்மூன்று நாட்களிலும் கதிரவன் வல ஏற்றத்திற்கும் வின் மீள் S' ன் வல ஏற்றத்திற்கும் உள்ள வேறுபாடுகள்

$$M_1 M' = 6\text{ ம } 48\text{ நி } 48\text{ வி} - 0\text{ ம } 18\text{ நி } 48\text{ வி} = 6\text{ ம } 28\text{ நி } 55\text{ வி}$$

$$M_2 M' = 11\text{ ம } 48\text{ நி } 4\text{ வி} - 6\text{ ம } 42\text{ நி } 29\text{ வி} = 5\text{ ம } 0\text{ நி } 35\text{ வி}$$

$$M_3 M = 11\text{ ம } 48\text{ நி } 39\text{ வி} - 6\text{ ம } 42\text{ நி } 28\text{ வி} = 5\text{ ம } 4\text{ நி } 10\text{ வி}$$

செப்டெம்பர் 18ம் தேதி நண்பகலிலிருந்து அடுத்த நாள் நண்பகல் வரை ஏற்பட்ட நடுவண்ணிலக்க வேறுபாடு

$$\begin{aligned}
 &= \delta_2 - \delta_1 \\
 &= 1^\circ 49' 40'' - 1^\circ 29' 24'' \\
 &= 0^\circ 20' 16'' \\
 &= 1298''
 \end{aligned}$$

அதிரவன் S_2 விநோது S_2 க்குச் செல்லுதல்களில் ஏற்படும் நடுவண்ணிலக்க வேறுபாடு

$$\begin{aligned}
 &= \delta_2 - \delta_1 \\
 &= 1^\circ 49' 40'' - 1^\circ 28' 26'' \\
 &= 0^\circ 21' 14'' \\
 &= 1275''
 \end{aligned}$$

எனவே அதிரவன் S_2 விநோது S_2 க்குச் செல்ல எடுக்கும் நேரம்

$$= \frac{1275}{1298} \text{ நாள்}$$

ஒரு நாளில் அதிரவனின் வல ஏற்றத்தில் ஏற்படும் வேறுபாடு

$$\begin{aligned}
 &= M_2 M_3 \\
 &= M_2 M' - M_1 M' \\
 &= 5\text{ மீ } 4\text{ நி } 10\text{ வி} - 5\text{ மீ } 0\text{ நி } 35\text{ வி} \\
 &= 0\text{ மீ } 3\text{ நி } 35\text{ வி} \\
 &= 215\text{ வி}
 \end{aligned}$$

எனவே $\left(\frac{1275}{1298} \right)$ நாளில் ஏற்படும் அதிரவன் வல ஏற்ற வேறுபாடு

$$\begin{aligned}
 &= \frac{1275}{1298} \cdot 215 \text{ வி} \\
 &= 196\text{ வி} \\
 &= 3\text{ நி } 16\text{ வி}
 \end{aligned}$$

எனவே

$$\begin{aligned}
 M_2 M &= 3\text{ நி } 16\text{ வி} \\
 M_1 M &= M_1 M_2 + M_2 M \\
 &= M_1 M' + M_2 M' + M_2 M \\
 &= 9\text{ மீ } 28\text{ நி } 55\text{ வி} + 5\text{ மீ } 0\text{ நி } 35\text{ வி} + 3\text{ நி } 16\text{ வி} \\
 &= 11\text{ மீ } 32\text{ நி } 46\text{ வி}
 \end{aligned}$$

கதிரவன் பாதை குறித்தல்

γ இன் மையப்புள்ளி O எனக்கொள்ளலாம்.

$$\begin{aligned} OM_1 &= \frac{1}{2} M_1 M \\ &= \frac{1}{2} (11\text{m } 32\text{ நி } 46\text{ வி}) \\ &= 5\text{m } 46\text{ நி } 23\text{ வி} \end{aligned}$$

மார்ச் 24-ல் கதிரவன் வல ஏற்றம்

$$\begin{aligned} &= \gamma M_1 \\ &= \gamma O - OM_1 \\ &= 6\text{m} - 5\text{m } 46\text{ நி } 23\text{ வி} \\ &= 0\text{m } 13\text{ நி } 37\text{ வி} \end{aligned}$$

சரியாகவில்லை வல ஏற்றம்

$$\begin{aligned} &= \gamma M' \\ &= \gamma M_1 + M_1 M' \\ &= 0\text{m } 13\text{ நி } 37\text{ வி} + 6\text{m } 35\text{ நி } 55\text{ வி} \\ &= 6\text{m } 42\text{ நி } 32\text{ வி} \end{aligned}$$

மார்ச் 24-ல் கடிக்காரத்தில் பிழை = சரியான வல ஏற்றம் - பதிவு
செய்யப்பட்ட கட்சி கடத்தல் நேரம்

$$\begin{aligned} &= 6\text{m } 42\text{ நி } 32\text{ வி} - 6\text{m } 42\text{ நி } 48\text{ வி} \\ &= -16\text{ வி} \end{aligned}$$

செப்டம்பர் 19-ல் கடிக்காரத்தில் பிழை

$$\begin{aligned} &= 6\text{m } 42\text{ நி } 32\text{ வி} - 6\text{m } 42\text{ நி } 29\text{ வி} \\ &= 3\text{ வி} \end{aligned}$$

எனவே மார்ச் 24-ல் 11 விநாடிகள் வேகமாகவும் செப்டெம்பர் 19-ல் 3 விநாடிகள் தாமதமாகவும் சென்றிருக்கிறது. அதாவது 178 நாட்களில் 14 விநாடிகள் தாமதமாகக் காலக்காட்டியிருப்பதால் கடிக்காரத்தின் தினசரி பிழை விதிதம் = $\frac{1}{13}$
= 0.08 வி.

பயிற்சி 10

1. கதிரவன் γ கடத்து சில நாட்களுக்குப் பின் இரண்டு நாட்களில் அதன் வல ஏற்றம் மூன்றாவே (α, δ) ; $(\alpha + \delta, \delta^2)$. இப்பதிவான அளவுகள் கொண்ட γ இடமறிய

$\cot \alpha = \cot \delta \tan \delta' \operatorname{cosec} x = \cot x$ என்ற சமன்பாடு பெறலாம் என நிறுவுக.

செப்டெம்பர் 22ம் தாள், 28ம் தாள் கதிரவன் உச்சி கடக்கும் போழுது செந்த பதிவுகள் கீழ்வருமாறு :

	உச்சி கடக்கும்போழுது நடுவரை நிலக்கம்
22ம் தாள்	17° 25' கடக்கு
28ம் தாள்	6° 21-58" தெற்கு

இவ்விரு உச்சி கடத்தலுக்கும் இடைப்பட்ட மீன் வழிநேரம் 24ம, 8தி, 85-5வி, 28ம் தாள் கதிரவன் வலஏற்றம் என்ன? இந்த மூன்றய்க் மேட முதற்கிலுனி 7 ஐ இடங்குதிப்பதாக என்ன கிணறுகள் ஏற்படுகின்றன?

3. கதிரவன் 7 ஐக் கடத்த சில நாட்களுக்குப் கீழ்பு, விண்மீன் வீகா (vega) உச்சி கடக்கும் நேரத்திற்கும் கதிரவன் உச்சி கடக்கும் நேரத்திற்கும் இடைப்பட்ட காலம் 17ம, 86தி, 85வி, கதிரவன் 2 கடத்த சில நாட்களுக்குப் பிறகு அதே மாதிரி பதிவு செய்வப்பட்ட இடைக்காலம் 7ம, 82தி, இரு நாட்களிலும் கதிரவனின் நடுவரை நிலக்கம் சமமாகிடுத்தன. வீகாவின் வல ஏற்றம் என்ன?


4. மீன் கொடுக்கப்படும் காட்சிப் பதிவுகளிலிருந்து மார்க்ச 24ஆம் தேதி கதிரவனின் வல ஏற்றத்தையும் விண்மீனின் வல ஏற்றத்தையும் கணிக்க.

தேதி	கதிரவன் நடுவரை நிலக்கம்	கதிரவன் உச்சி கடத்த லுக்கும் ஒரு குதிப்பிட்ட விண்மீன் உச்சி கடத்த லுக்கும் இடைப்பட்ட மீன்வழி நேரம்
மார்க்ச 24	1° 29' 5-1"	6 ^ம 1 ^{தி} 84-45 ^{வி}
செப்டெம்பர் 18	1° 49' 30-2"	5 ^ம 27 ^{தி} 82-37 ^{வி}
செப்டெம்பர் 19	1° 28' 12-5"	6 ^ம 31 ^{தி} 8-8 ^{வி}

5. பின் கொடுக்கப்படும் கால்கிப் பதிவுகளிலிருந்து மரக்க 80ம் தேதி கதிரவன் வல ஏததம் காண்க.

தேதி	கதிரவன் தடு வரை விசக்கம்	கதிரவன் உச்சி கடக்கும் பின்வழி தேரம்	அ செப்பென்மூல் உச்சி கடக்கும் பின்வழி தேரம்
மரக்க 80	4° 0' 8.1"	0 ^h 1 ^m 4.47 ^s	15 ^h 1 ^m 54.7 ^s
செப்டெம்பர் 11	4° 20' 55.5"	0 ^h 1 ^m 4.05 ^s	4 ^h 19 ^m 11.35 ^s
செப்டெம்பர் 12	8° 55' 8.0"	0 ^h 1 ^m 4.07 ^s	4 ^h 16 ^m 49.88 ^s

6. ஒரு விண்மீனின் (α, δ) வான அகலங்கு β (ஒரு சித்ய மதிப்பு) கதிரவனின் வல ஏததம் α ஆக இருக்கும்போது, விண்மீனின் அகலங்கித்தும் கதிரவனின் அகலங்கித்தும் உள்ள வேறுபாடு ஏதத்தைய $\beta \sin \delta \cot \alpha$ என நிதுவுக. (செப) படம் 10.௮ காண்க.



படம் 10.௮

$$\begin{aligned}
 \triangle YSM_1 \\
 \sin \delta &= \tan \alpha \cot \theta \\
 SM_1 &= \beta \cot \theta \\
 &= \beta \sin \delta \cot \alpha
 \end{aligned}$$

11. சந்திரன்

(THE MOON)

11-0 : மண்ணுலகில் வரையும் தமக்கும் சந்திரனுக்கும் மிகுந்த தொடர்புண்டு. தமக்கு வானவெளியில் இயற்கையிலேயே அமைந்த ஒரே ஒரு துணைக்கோள் (Satellite) சந்திரனே யாகும்.

11-1 : இதுவரை சந்திரனைப்பற்றிப் பல உண்மைகள் தமக்குத் தெரியும். ஆனால் சந்திரனைப்பற்றிய ஆராய்ச்சியில் (1960-1969) சில ஆண்டுகளாகவே, அமெரிக்காவும் ரஷ்யாவும் செவ்விருக்கும் சாதனைகள் பலப்பல, இத்தப்பத்தான்கு காலத்திலேயேயின் வெளி ஊர்திகள் (Spacecrafts) சந்திரனுக்கு மிக நெருங்கிச்சென்று பல படங்கள் பிடித்திருக்கின்றன. 1968ல் அமெரிக்க ரேஞர் IX (U. S. Ranger IX), சந்திரனுக்கு அண்மையில் (225 கி. மீ. 105 கி. மீ., 20 கி. மீ.) சென்று, வியத்தகு படங்கள் கொண்டு வந்தது. ரஷ்யாவின் வெளி ஊர்திகள் லூனா III (Luna III), லாண்ட் III (Zond III), இதுவரை நம் காட்சிக்கு அப்பாற்பட்டே இருந்துவந்த சந்திரனின் மறுபுறத்தை தமக்குப் படமுலமாக வெளிப்படுத்தியிருக்கின்றன. சிறப்பாக, 1969ல் ஆண்டில் மனிதனும் இயக்கப்படாத ஒரு ரஷ்ய வின் வெளி ஊர்தி லூனா IX (Luna IX) சந்திரன் மேலேயே இறங்கி, சந்திரனுடைய தரையிலிருந்து புதைப் படங்கள் கொடுத்திருக்கின்றது. சந்திரன் தரை மிக மிகுதுலாக இருப்பதால், இவ்ஹூர்தி தரைக்குள் அழுத்திவிடுமோ என்று பயத்தனர். ஆனால் அது தரைமேலேயே நின்றது.

1969ல் ஆண்டில், இரண்டு அப்பலோக்களில் (Apollo XI and Apollo XII) சென்றஅமெரிக்கர்கள், சந்திரனில் அடிமெடுத்து வைத்துத் திரும்பினர். அவர்கள் கொண்டுவிட்ட சந்திரப்பாறைகள் விஞ்ஞானிகள் ஆராய்ச்சிக் கூடங்களில் பரிசோதிக்கப்பட்டு வருகின்றன. இவ்வாராய்ச்சிகளின் முடிவுகளை அறிவுடை மக்கள் எதிர்பார்த்தவண்ணம் இருக்கின்றனர். மேலும் பன்னாற மணி

தன் சத்திரனுக்குச் சென்று திரும்பும் வாய்ப்புக்கள் மலையாளம், சத்திரன் மெயேயே, ஆராய்ச்சிக் கூடங்கள் அமைக்கப்படலாம். குடியும் குடித்தனமும், மனிதர் சிலர் ஆகிய வாழலாம் என்ற கனவு அண்மையிலே நடைபெற்றிருந்தாலும், இத்துறையைத் திரும்பும் காலே தனவாக மாறின் அது விபத்தாகு செய்தியாகாது.

11-1-1: சத்திரனுக்கும் மண்ணுடைத்திற்கும் உள்ள தெருக்கிய தொடர்புக்கு முக்கிய காரணம், யாதெனின் அதுதான் தமக்கு மிக மிக அண்மையில், உள்ள எண்பொருளாகும். தமக்கும் சத்திரனுக்கும் இடைப்பட்டதாம் ஏறத்தாழ, 8,84,000 கி. மீட்டர்கள் (2,40,000 மைல்). அதுவும் பூமியைப்போல் உருண்டை வடிவமுள்ளது. அதன் அரைவிட்டம் ஏறத்தாழ 1780 கி. மீட்டர்கள் (1100 மைல்கள்). நிலத்தளினமீன் மண்டலப் பின்னணியில் சத்திரன் பூமியைச் சுற்றிவரும் நேரம் ஏறக்குறைய 27½ நாட்களாகும் (27 நாட்கள் 7 மணி 43 நிமிடம் 11-5 செகண்டுகள்). சுதிரவின் வொட்டி, அது பூமியைச் சுற்றிவரும் நேரம் ஏறக்குறைய 29½ நாட்களாகும் (29 நாட்கள் 13 மணி 44 நிமிடம் 2-5 செகண்டுகள்). எனவே கோளத்தின்மேல் அதன் தோற்றப்பாதை ஏறக்குறைய சுதிரவன் பாதையோடு இணைந்து இருக்கிறது என நாம் 8-9 (i) இல் ஏற்றுக்கொண்டோம். ஆனால் உண்மையில் சத்திரனின் வான கோளப்பாதை, சுதிரவன் பாதைக்கு ஏறத்தாழ (சராசரி) 5° 9' சாய்ந்திருக்கும், ஒரு வானகோளப் பெருவட்டமாகும். இச்சாய்வும் நிலத்தது அகிலம்; ஓரான்கு காலத்தில் அச்சாய்வு 4°59' முதல் 5° 18' வரை மாறி வருகிறது. சத்திரன் பாதையும் சுதிரவன் பாதையும் வெட்டும் இரு இடங்களும் இருகணுக்கள் (Nodes) எனப்படும்; ஒன்று ஏறகணு (Ascending node—இராகு) எனவும் மற்றொன்று (Descending node—கேது) எனவும் கூறப்படும். இக்கணுக்களுக்காகவே, சுதிரவனும் சத்திரனும் வரும்போது, முழு நிலமே (பென்ட்லாமி) அகலது அமாவாசையோ ஏற்படுமானால், ஒரு சத்திரகிரகணமோ, சுதிரவன் கிரகணமோ ஏற்படத்தக்க சூழ்நிலை உருவாகிறது. இதுபற்றி விவரமாக மனதாழ்த்துகள் அகலது கிரகணங்கள் என்ற பகுதியில் பார்ப்போம்.

11-2: சத்திரன் பூமியைச் சுற்றிவரும் இயக்கம், மிகச் சிக்கல்திறமற்றது. சத்திரன் பூமியைச் சுற்றி ஏறத்தாழ ஒரு வட்டப் பாதையில் செல்கிறதெனப் பொதுவாக நாம் கொண்டோனும், ஒரு படி துட்டமாய்க் பரக்குமிடத்து, சத்திரனியக்கம் வெபர் விதி களுக்கு உட்பட்டு இருக்கிறதெனக் கொள்ளலாம்.

1. மண்ணுடைத்தை ஒரு குவிமையப் புள்ளியாகக் கொண்டதன் வட்டப்பாதையில் சத்திரன் செல்கிறது. (குவிமையப் புள்ளிவு = r_1 அகலது 0-055).

2. மண்ணுலகத்தைச் சந்திரனோடு இணைக்கும் கோட்டின் பரப்பு வேகம் (areal velocity) ஒரு சீரானது.

3. சந்திரனிலிருந்து பார்த்த மண்ணுலகை மையம் வழிவாகச் செல்லும் ஒர் தளத்தில் ஆமைத்திருக்கிறது; அதனும், கதிரவன் பார்த்த தளத்திற்குச் சராசரி $5^{\circ}9'$ சாய்வில் உள்ளது.

ஆனும் இவ்விதிகள் முற்றிலும் சரியெனக் கொள்ளமுடியாது; கதிரவன் சுழிப்புடன் காரணமாக, இவ்விதப்பாதை, வேகம் முதலியன பல்லு பல மாறுதல்களுக்கு உட்படுகின்றன. அவை 'தடு மாற்றங்கள்' (Perturbations) எனப்படும். இத்தடு மாற்றங்கள் (அல்லது உலகவுகள்) வாவற்றையும் கணக்கில் எடுத்துக்கொண்டாக்தான், அந் துட்பாடுகளையும் மிகச் சரியாகவும் சந்திரனிலிருந்து அதைக் கவனித்த முடியும்.

சந்திரன் நீங்குபட்டப்பாதையின் குவிமையப் பிறழ்வு $\frac{1}{18}$ ஆகையால், பூமிக்கு அண்மையுள் புள்ளியும் சேய்மையுள் புள்ளியும் உள்ள குரங்குகள் $1 - \frac{1}{18} : 1 + \frac{1}{18}$ என்ற விகிதத்திலிருக்கும். அப்பள்ளிகளிலிருந்து சந்திரனின் கோணவிட்டங்கள்,

$$1 - \frac{1}{18} : 1 + \frac{1}{18}$$

என்ற விகிதத்திலிருக்கும்.

11:2:1 : விண்மீன் மாதம் — திங்கள் — ஆண்டு — இவைகளுக்கிடப்பட்ட தொடர்புகள் : (Sidereal Month — Lunation — Year.)

விண்மீன் பின்னணியில் சந்திரன் மண்ணுலகைச் சுற்றி வரும் காலவிட்டம் ஒரு விண்மீன் மாதம் (S) எனப்படும். கதிரவனைப் போட்டி, சந்திரன் மண்ணுலகை ஒரு சுற்றுச் சுற்றிவரும் காலவிட்டம் ஒரு திங்கள் அல்லது குரவிற்பு வழி மாதம் (Lunation or Synodic period) எனப்படும் (L). கதிரவன், விண்மீன் பின்னணியில் மண்ணுலகைத் தை ஒரு சுற்று சுற்றிவரும் காலவிட்டம் ஒரு கதிரவன் ஆண்டு (Y) எனப்படும் [இது கோற்றமேயொழிய உண்மையில் மண்ணுலகைத்தான் கதிரவனைச் சுற்றி வருகிறதென நீங்கள் அறிவிக்க.] ஒரு தானிய கதிரவன் தன் பாதையில் விண்மீன் பின்னணியில் பெற்றுள்ள தனித்தோரண வேகம் $\frac{360^{\circ}}{Y}$.

சந்திரன்

ஒரு நாட்கில் சந்திரன், விண்மீன் பின்னணியில் மண்ணுலகைச் சுற்றிவரும்போது பெற்றுள்ள தனித்தோண வேகம் $\frac{360^\circ}{S}$.

எனவே சுதிரவனைப்போட்டி, சந்திரனது சார் வேகம் = $\frac{360^\circ}{S} - \frac{360^\circ}{Y}$

ஆனால், சுதிரவனைப்போட்டி, சந்திரனது சார்வேகம் $\frac{360}{L}$.

$$\therefore \frac{360}{L} = \frac{360}{S} - \frac{360}{Y}.$$

$$\therefore \frac{1}{L} = \frac{1}{S} - \frac{1}{Y}.$$

$L = 29.5$ நாட்கள் ; $Y = 365.25$ நாட்கள் எனக் கொண்டால்,

$$\frac{1}{S} = \frac{1}{L} + \frac{1}{Y}.$$

$$= \frac{1}{29.5} + \frac{1}{365.25}$$

$= 27.30$ நாட்கள் எனப் பெறப்படும்.

எனவே, விண்மீன் பின்னணியில் சந்திரன் மண்ணுலகைச் சுற்றி வரும் காலவட்டம் = 27.30 நாட்கள். சரிவான எண்ணிக்கை = 27 நாட்கள் 7 மணி 43 நி. 11.6 வி.

இக்கால வட்டத்தில், சந்திரன் விண்மீன் பின்னணியில், மண்ணுலகைத் தாது ஒரு முழுச் சுற்றுச் சுற்றி வருகிறது.


11.2.2 : சந்திரனின் சிறையளவுகள் (Phases of the Moon)

அமாவாசைக்குப் பின்பு இரண்டு நாட்கள்கழித்துக் சுதிரவன் மறைத்தபின், மேல் வானத்தில் நாம் சந்திரனை ஒரு சிறு சிறு மையுலகாகப் பார்க்கிறோம். நாளுக்குநாள் இப்பிறை வளர்ந்து, பெரிசெய்வதற்கு சுதிரவன் மறைத்தவுடன் கிழவானில் மூலமதியம் வருவதைப் பார்க்கிறோம். இது சந்திரனின் வளர்நிறைக் காலம் (Waxing phase of the moon) எனப்படும். பெரிசெய்துப் பின்பு நாளுக்குநாள் சந்திரன் குறைத்து வருவதைப் பார்க்கிறோம். அமாவாசையன்று சந்திரன் நமக்குத் தெரிவதில்லை. இது சந்திரனின் தேய்நிறைக் காலம் (Waning phase of the moon) எனப்படும். ஒரு அமாவாசைக்கும் அடுத்த அமாவாசைக்கும் (ஒரு பெரிசெய்தலுக்கும் அடுத்த பெரிசெய்தலுக்கும்) இடைவட்டம் கால வெளி $L = 29.5$ நாட்கள். இந்த இடைவெளியில் (அமாவாசை முதல் அடுத்த அமாவாசைவரை) சந்திரனின் ஒளிப்பாகம் வளர்ந்து மூன்று மதிய நிலைமொத்தி மறுபடி குறைத்து, ஒளிப்பாகம்

இல்லாத நிலைக்கு வருகிறது. இந்த ஒளிப் பாகத்தை அல்லது பிளையாஸ்திகக் கணக்கிலும் ஐதரையை இப்போது பார்ப்போம்.

சத்திரத்துக்கு சுவாமி ஓளியில்லையெனவும், அது ஓர் இறுண்ட உருண்டையெனவும், சத்திரவன் ஓளி அதன்மேல் படுவதால் அது ஓளி பெறுகிறது எனவும், அவ்வாறு கடன் வாங்கிய ஓளி கொண்டு அது மண்ணாவசத்திற்குத் தன் ஓளிக் காட்சியை அளிக்கிறதெனவும் தாம் அறிவேவர். ஒரு தீயனில் சத்திரனது வெவ்வேறு அளவுகள் பிழைக்கை தாம் பார்க்கிறோம். அப்பிழைப்பளவு கண்க்கும் மூன்று பின்வருமாறு

சத்திரன் வயசாய் M ; சுத்திரவன் வயசாய் S ; மன்றன்குலச வயசாய் E எனப் பின்வரும் M - S துறியில் கொள்க (M -ம் 11:3:2).



44.11.02

MS க்குச் சொங்குத்தான தளத்தில் ACB என்ற சத்திரவின் பெரு வட்டம் உள்ளது. ME க்குச் சொங்குத்தான தளத்தில் AFB என சத்திரவின் பெரு வட்டம் உள்ளது. சத்திரன் ஒளி பெரும் பகுதி S பக்கமுள்ள ACB என்ற ஆளக்கோணம். மண்ணுவகித்து சத்திரன் காட்டும் பகுதி E பக்கமுள்ள AFB என்ற ஆளக்கோணம்.

எனவே, மண்ணுலகம் காணும் சத்திரன் ஒளிப்பகுதி ACB க்கும் AFB க்கும் பொதுவாக, இரு விட வளைவுகளுக்குட்பட்ட (விட AF , விட AB) $ABFA$ என்ற கோளப்பிறை (Lane); இது ஒரு கிச்சிவிப் பழச்சினை வடிவத்தில் இருக்கும்.

AFB என்ற தளத்தில் ACB என்ற வட்டத்தின் குத்து விச்சம் (orthogonal projection) ADB எனக் கொண்டால், மண்ணுலகில் உச்சமேலக்கு $AFBDA$ என்ற பரப்பிப் பகுதி ஒளிபெற்றிருப்பதாகத் தெரியும்.

ஒளி பெற்று நமக்குக் காட்சியளிக்கும் சத்திரன் பரப்பிற்கும், சத்திரனின் ஒழுங்கிட்டப் பரப்பிற்கும் உள்ள விவிதம், சத்திரனின் பிறைவளவு (phase) எனப்படும். இப்போது, படம் 11.2-3-இன்படி, தளக்கள் AFB க்கும் ACB க்கும் இடைப்பட்ட கோணம் θ என்பது ($= \angle FMC$) EM ன் நீட்டலுக்கும் MS க்கும் இடைப்பட்ட கோணம் $= \angle EMS$.

$\therefore ACB$ என்ற ஆரவட்டம், AFB என்ற தளத்தின்மேல் வீச்சமடைபதப்போது பெறப்படும் ஆர நீள் வட்டம் ADB ன் பரப்பு, $= \frac{1}{2} \pi r^2 \cos \theta$ (r என்பது சத்திரனது ஆரவட்டம்).

$\therefore$ காட்சியளிக்கும் ஒளிப்பரப்பு $AFBDA$ = ஆரவட்ட AFB ன் பரப்பு - ஆரநீள் வட்ட ADB ன் பரப்பு

$$= \frac{1}{2} \pi r^2 - \frac{1}{2} \pi r^2 \cos \theta.$$

$$= \frac{1}{2} \pi r^2 (1 - \cos \theta).$$

மூன்று வரையறுக்கப்பட்டபடி,

$$\text{பிறைவளவு} = \frac{\pi r^2}{2} \times \frac{(1 - \cos \theta)}{\pi r^2}$$

$$= \frac{1}{2} (1 - \cos \theta) \text{ எனப் பெறப்படும்.}$$

$$\text{ஆரவது பிறைவளவு} = \frac{1}{2} (1 - \cos \theta)$$

$$= \frac{1}{2} (1 - \cos SME)$$

$$= \frac{1}{2} [1 + \cos (\pi - SME)]$$

$$= \frac{1}{2} [1 + \cos EMS].$$

EMS என்பது, M என்ற புள்ளியில் ES தளத்தின் கோணம், ஆரவது மண்ணுலக மையம் E -உம் கதிரவன் மையம் S உம், சத்திரன் மையம் M இடத்திலுள்ள கோணம் EMS ஆகும். இக்கோண தூரம் சத்திர மையத்திலிருந்து கதிரவன்—மண்ணுலக

நீட்சி (அதாவது திசை விலக்கம்) — [Elongation of the Earth's centre from the sun as seen from the Moon's centre] எனப் பெயரிடப்பட்டிருக்கிறது. ES என்ற திசைக்கும், MS என்ற திசைக்கும் இடைப்பட்ட கோணம் 10° க்கு மேற்படாது. எனவே, ES ம் MS ம் இணைகோடுகள் என்றே கொள்ளலாம். மடம் $11^\circ 2' 2.1$ பரக்க.



மடம். $11^\circ 2' 2.1$

(குறிப்பு: ஏறக்குறைய $ES = 400 EM$; அதாவது EM ஐ 1 செ.மீ அளவில் குறித்தால், $ES = 4$ மீட்டராகும்.)

எனவே மடம் $11^\circ 2' 2$ இல் $ES \parallel MS$ எனக் கொண்டால்,

$$\theta = \angle EMS = \angle MES.$$

11.2.3: நீட்சி (Elongation)

$EMS =$ சந்திர மையத்திலிருந்து கதிரவன் - மண்ணுலகை நீட்சி எனக் கூறினோம். அங்குள்ளே SEM என்பது, மண்ணுலகிலிருந்து, கதிரவன் - சந்திர நீட்சி எனக் கூறலாம். (Elongation of the moon's centre from the sun as seen from the Earth's centre).

இங்கு, சந்திரனைப் பொறுத்தவரையில் $EMS = \theta =$ ஏறத்தாழ $MES =$ மண்ணுலகிலிருந்து கதிரவன் - சந்திர நீட்சியெனக் கொண்டால், வான கோளத்தின்மேல் MES என்பது வில் MS க்குச் சமமாக, ஏறக்குறைய கதிரவன் வின் நெட்டாங்கிற்கும், சந்திரனது வின் நெட்டாங்கிற்கும் உள்ள வேறுபாடு என அமையும். (கதிரவனும், சந்திரனும் கதிரவன் பாதைப்போயே செல்கின்றன என்ற அடிப்படையில் இதைக் கொள்க).

எனவே,

$$\text{நெறுபளவு} = \frac{1}{2} (1 - \cos \theta).$$

$$= \frac{1}{2} [1 - \cos (\text{கதிரவன்} \rightarrow \text{சந்திரன் நீட்சி})].$$

$$= \frac{1}{2} [1 - \cos (\text{கதிரவன் வின் நெட்டாங்கிற்கும் சந்திரன் வின் நெட்டாங்கிற்கும் உள்ள வேறுபாடு}).$$


எனவே ஆளவாசைக்கு x நாட்களுக்குப் பின்பு கதிரவன் வின் தொட்டாங்கு α எனவும், சத்திரன் வின் தொட்டாங்கு M எனவும் கொண்டால், ஏதத்தாழ நிலையளவு $= \frac{1}{2} [1 - \cos (M - \alpha)] = \frac{1}{2} [1 - \cos 12.2^\circ]$ எனக் கொள்ளலாம்.

மேலும் ACB , AFB என்ற தளங்களுக்குப் பொதுவான AB என்ற விட்டம், EMS என்ற தளத்திற்குச் செங்குத்தாக இருக்கும். A , B என்பவை நிறைச் சத்திரனின் கொம்புகள் (horn of the moon) எனப்படும்; எனவே, கொம்புகளை இணைக்கும் சத்திர விட்டம் எப்போதும் EMS என்ற தளத்திற்குச் செங்குத்தாக இருக்கும்; அநாவது AB கதிரவன் பாதைக்குச் சந்தேரத்தாழ செங்குத்தாக விருக்கும். (கதிரவன் பாதையும் சத்திரன் பாதையும் ஒன்றே என்ற அடிப்படையில், அநாவது M ன் இடம் கதிரவன் பாதைக்கு மிக அருகாமையில் இருக்கிறதென்ற அடிப்படையில்). மேலும், ஒளி பெற்ற சத்திரன் பகுதி, கதிரவன் பக்கமே திரும்பி விருக்கும்.

11-2-4. வளர்நிறை-தேய்நிறை : 11-2-4 படத்தில் (பக்கம் 294) கதிரவனும் சத்திரனும் இணையம் நினைகில் (தொட்டாங்கு வேறுபாடு பூச்சியம்) E , M_1 , S முறையே மண்ணுலகம், சத்திரன், கதிரவன் எனக் கொள்க. அப்போது பூமிக்கு ஒரே பக்கத்தில் சத்திரனும் கதிரவனும் உள்ளன. கதிரவன் பக்க மிருக்கும் சத்திரனின் அரைக்கோளம், கதிரவனது ஒளிபெறும்; பூமிவின் பக்கமிருக்கும் சத்திரனின் அரைக்கோளம் ஒளி பெரு திருக்கும் காரணத்தால், சத்திரன் பூமிக்குத் தெரியவேதெரியாது. அது ஆளவாசை நாளாகும். கதிரவனை நினைக்க வைத்து, சத்திரன் ஏதத்தாழ நினைசரி சர்வேகமாய் 12.2° விதம் பூமியைச் சுற்றி வரட்டும். சத்திரன் பாதையில், மின்வரும் பட்டியல்படி, பூமிவிசிறித்து, கதிரவன்—மண்ணுலக நீட்சி π இவிர்த்து— π வரை மாறுவதையும் அந்த நினைகளில் நிறையளவுகள் மாறுவதையும் கவனிக்க. சத்திரன் M_1 இருந்து M_2 வரை வளர்நிறையும் (அளவாசை முதல் பெனர்ணயீ வரை) M_2 இருந்து மறுபடியும் M_1 வரை தேய்நிறையும் (பெனர்ணயீ முதல் அளவாசைவரை) இருப்பதைக் கவனிக்க. M_1 இருந்து M_2 வரை கதிரவனுக்கும் சத்திரனுக்கும் உள்ள வின் தொட்டாங்கு வேறுபாடு முதல் π வரை வளர்கிறது; M_2 முதல், கதிரவனுக்கும் சத்திரனுக்கும் உள்ள வின் தொட்டாங்கு வேறுபாடு π முதல் 2π வரை மேலும் வளர்கிறது. M_1 ல் ஆரம்பித்து M_2 க்கு மறுபடியும் வரும் வரையில், சத்திரன், கதிரவனை பொட்டி, ஒரு முழுச் சுற்று சுற்றுகிறது. இந்த இடைவெளிப் பொழுதே 'ஒரு திங்கள்' எனப்படும். இது ஏதத்தாழ 29-6 நாட்களாகும். படம் 11-2-4 பார்க்க.

சந்திரன் இரவுக்கும் இடம்.	படம் 11-2-2ல் $\theta = \text{E'MS}$ = ஏற்கனவுவை MES = ஏற்கனவுவை கதிரவன் வின் தொடர்புக்கும் சந்திரன் வின் தொடர்புக்கும் உள்ள வேறுபாடு. (பூமியிலிருந்து கதிரவன் -> சந்திரன் திசை)	படம் 11-2-2ல் $\text{EMS} = \pi - \theta = \theta_1$ சந்திரனிலிருந்து கதிரவன் -> மண்ணிலிருந்து திசை.	விவரங்கள் $= \frac{(1 - \cos \theta)}{2} = \frac{1 + \cos(\pi - \theta)}{2}$ $= \frac{1 + \cos \text{EMS}}{2}$
M_1	0°	π	0 - அமைச்சை
M_2	$0 < \theta < \frac{\pi}{2}$	(விடுகாணம்) $\pi < \theta_1 < \pi$	அளவு $\angle$
M_3	$\frac{\pi}{2}$	$\frac{\pi}{2}$	அளவு $\frac{\pi}{2}$ அமைச்சை சந்திரன்
M_4	$\frac{\pi}{2} < \theta < \pi$	(குமங்காணம்) $0 < \theta_1 < \frac{\pi}{2}$	அளவு $> \frac{\pi}{2}$ குமங்காணம் (Gibbous Moon).
M_5	π	0	அளவு முழுவதும் - குமங்காணம்.

M_6	$\pi < \theta < \frac{3\pi}{2}$	θ_1 மதிப்பு குறை (—) $ \theta_1 < \frac{\pi}{2}$	அளவு $> \frac{1}{2}$ இயல்புச் சத்திகள்
M_7	$\frac{3\pi}{2}$	θ_1 மதிப்பு குறை (—) $ \theta_1 = \frac{\pi}{2}$	அளவு $\frac{1}{2}$ அளவுவட்டச் சத்திகள்
M_8	$\frac{3\pi}{2} < \theta < 2\pi$	θ_1 மதிப்பு குறை (—) $\frac{\pi}{2} < \theta_1 < \pi$	அளவு $< \frac{1}{2}$
M_1	2π	θ_1 மதிப்பு குறை (—) $ \theta_1 = \pi$	0 — அளவுவரை



படம் 11-2-4

M_1 இருந்து M_2 வரை ஏறத்தாழ $\frac{30}{12.2} = 2.46$ நாட்கள்.

M_2 இருந்து M_3 வரை „ 2.46 „

M_3 இருந்து M_4 வரை „ 2.46 „

M_4 இருந்து M_5 வரை „ 2.46 „

மொத்தம் 29.5 நாட்கள்

அமரவானசை முதல் பெளர்ணமி வரை 14.75 நாட்கள்.

பெளர்ணமி முதல் அமரவானசை வரை 14.75 நாட்கள்.

11-3 : சந்திரனில் வாழவிருக்கும் மக்கள் காணக்கூடிய காட்சிகள் :

சந்திரனுக்குச் சென்றுவர வாய்ப்புபெற்ற மனிதன் ஒருவன் சந்திரனில் சிறிது காலம் தங்கி, அங்குத் தோன்றும் காட்சிகளைக் குறித்து வகுவிருனென வைத்துக்கொள்வோம். தமக்கு மண்ணுலகத்தில் இரவும் பகலும் எப்படி மாறிமாறி வருகிறதோ, அப்படியே அவனுக்கும் இரவும் பகலும் மாறிமாறி வரும். ஆனால் அவனுடைய இரவுக் காலம் ஏறக்குறைய தமது 14 நாட்களுக்குச்

சமயாயிருக்கும். ஏனெனில், பூமி தன்னைத்தானே ஒருமுறை சுற்றி வரும் காலம் 24 மணி நேரம் கொண்ட ஒரு நாளைக் கொண்டால், சத்திரன் தன்னைத் தானே ஒருமுறை சுற்றி வரும் காலம் ஒரு நிமிஷம் ஆகும். அந்த 'சத்திரமண்டல' இரவுப் போழ்தில், குளிர் மிகுதியாயிருக்கும். ஒரு குறிப்பிட்ட சமயத்தில் சுதிரவனுக்கு நேரக் கிரே இருக்கும் புள்ளியில் (சத்திரன் சமயத் தையும், சுதிரவன் சமயத்தையும் இணைக்கும் நேரக்கோடு சத்திரன் பரப்பை வெட்டுமிடம்; இந்தப்புள்ளி அந்த சமயத்திற்குரிய ஞாயிற்றுநேரக் கீழ்ப்புள்ளி—Sub solar point எனப்படும்), வெப்ப நிலை அப்போது ஏறக்குறைய 101°C அல்லது 214°F இருக்கும்; கொதிக்கும் தண்ணீரின் வெப்பநிலையைவிட 1°C அதிகம் ஆனால், அதற்கப்பாற்பட்ட இடங்களில் வெப்பநிலை வேகமாகக் குறைந்து, சுதிரவன் மீடாத பகுதியிலுள்ள இடத்தில் மிகக் குளிர்ந்த தட்பநிலை இருக்கும். சத்திரக்கிரகணம் ஏற்படும்போது, சுதிரவன் வெப்பக் சுதிரிகள், சத்திரன்மேல் விழாது தடுக்கப்படும் நிலையில், கிரகண ஆரம்பத்தில் வெப்பநிலை, ஞாயிற்று நேரக் கீழ்ப் புள்ளியில் 88°C ஆகிறது, சத்திரன் முழுமையும் மறைபடும் போது— 78°C அளவிற்குக் குறைந்து விடுகிறதெனில், சத்திரன் பரப்பின் மேல் தட்ப வெப்பநிலை குறுகிய காலத்திலேயே எவ்வளவு மிகப் பெரிய மாறுதல்கள் அடைகிறதென ஊகித்துப் பார்க்கலாம். குறுகிய காலத்தில் இவ்வளவு பெரிய மாறுதல்களுக்குக் காரணம், சத்திரன் தரையமைப்பைப் பொறுத்திருக்கவேண்டுமென நினைக்க இடமிருக்கிறது. இப்போது மண்ணுலகத்திற்குக் கொண்டு வரப் பட்ட சத்திரப் பாறைகளைப் பற்றிய ஆராய்ச்சிகள், தமக்கு மேலும் சத்திரன் தரையமைப்பைப் பற்றிய விளக்கங்கள் தரக்கூடும்.

சத்திரமண்டலத்தின் சுப்பிச் சக்தி, மண்ணுலக சுப்பிச் சக்தி வாய் போல ஆதில் ஒரு பங்குதான் என இதுவரை கணிக்கப் பட்டிருக்கிறது. ஆகவே சத்திரன் தரையேல் நடக்கும்போது, வான அழுத்த வைத்து நடக்கமுடியாத நிலை ஏற்படுகிறது எனத் தெரிகிறது. நடக்கும் மனிதனின் எடை (Weight) ஆதில் ஒரு பங்காகக் குறைவதால், நடக்க முடியும் மனிதன், பறப்பது போன்ற உணர்ச்சியுடன் நடக்கின்றான். இந்த முடிவுக்கு ஆதாரம் கீழ்க்குறையது :

தமக்கும் ஒரு விண்மீனுக்கும் இடையே சத்திரன் வரும்போது, விண்மீன் தம் காட்சியினின்றும் இடைமறைக்கப்படுகிறது (Occultation of a Star). சத்திரனைச் சுற்றி ஒரு வளி மண்டலம் (தம்மைச் சுற்றியிருக்கும் வளிமண்டலம் போல (Earth's-atmosphere) இருக்குமானால், விண்மீன் ஒளி அகவளிமண்டலத்தில்

தூண்டியும்போதும், அதை விட்டு வெளிவரும்போதும், சற்று மங்கலாகக் காட்சியளிக்கவேண்டும்; இது நடப்பதில்லை. மேலும் சத்திர வளிமண்டலம் (Lunar atmosphere) வழியாக ஆய்வின் மீள் ஒளி பாயும்போது கோட்டமடைந்து, அதன் திசை சற்று மாற வேண்டும். (தமது வளிமண்டலத்தில் கோட்டம் K₁₀₀₀ என நாம் பார்த்தோம்); ஆத்திசை மாற்றமும் ஏற்படுவதில்லை. இவ்விரண்டு நிகழ்ச்சிகளும்—ஒளிக்கோட்டம், மங்கல்—நடப்பதாகத் தெரிவதில்லை. எனவே மண்ணுலகைச் சுற்றியிருக்கும் அழுத்தமான ஒரு வளிமண்டலம் சத்திரனைச் சுற்றி அமைந்திருக்கவில்லையெனத் தெரிகிறது. இந்த அடிப்படையில்தான் சத்திரமண்டல ஈர்ப்புச் சக்தி, உலக ஈர்ப்புச் சக்தியைப் போல, ஏறக்குறைய ஆறிலொரு பங்கு எனக் கணிதீகரிக்கப்பட்டிருக்கிறது.

இப்போது சத்திரனில் சென்றிருக்கும் மனிதன் அங்குச் சில காலம் தங்கக்கூடிய வசதி, ஏற்படுத்திக் கொள்ளமுடியுமானால் சத்திரமண்டல ஊனத்தில் என்ன விதமான காட்சிகளைக் காண இயலும் எனப் பார்ப்போம். நம்முடைய 34 மணி நேரம் கொண்ட தாரிப்போல, தொடர்ந்து 14 நாட்கள் பகலும் (கதிரவனைத் தனது ஊனில் காணும் வாய்ப்பும்) அடுத்து, தொடர்ந்து 14 நாட்கள் இரவும் (கதிரவனைத் தனது ஊனில் காணமுடியாத வாய்ப்பும்) அவனுடைய பகல் இரவுநேரங்களாகும். [பகலில் தாங்கமுடியாத வெப்பமும், இரவில் தாங்கமுடியாத குளிரும் மாறிமாறி வரும். மற்றும் தனக்கு வேண்டிய உயிர் வாயும் (Oxygen) உணவும் போருக்களும், தன்னாலும் அவன் இவ்வுலகத்தில் இருந்துதான் கொண்டுபோகவேண்டும். இவ்வுழம் விண்வெளி உடைகள் (Space suits) மூதலியனாவும் வேண்டும்].

சத்திரமண்டலப் பரப்பில் கடுமையான வேகத்தில் விண்சுதைகள் (Meteorites) மணழபோல் இடைவிட்டு, இடைவிட்டுப் பொழிந்த வண்ணம் இருக்கும். கதிரவனிலிருந்து ஆற்றல்மிக்க புற ஊதாக் கதிர்கள் (Ultra Violet rays) விழும். விண்வெளியிலிருந்து கசியுக் கதிர்கள் நிலாப்பரப்பைத் தாக்கும்.

11-3-1: நாம் 'சத்திர ஒளி'யைப் (Moon shine) பார்ப்பது போல சத்திரனிலிருப்பவர் 'உலக ஒளி'யை (Earthshine) அவனது சத்திர 'இரவில்' பார்க்கலாம். தமது ஊனத்தில் நாம் மூலு மதியத்தையும், மற்ற சத்திரப்பிறைகளையும் பார்ப்பது போல, சத்திரனிலுள்ள மனிதன் 'மூலு உலகத்தையும்' (Full-Earth) 'உலகப் பிறைகளையும்' (Earth's Crescents) அவனுடைய இரவு நேரத்தில் காணமுடியும். நமக்கு அமரவாசை (புதுச்

சத்திரன்) போலச் சத்திரனிலிருப்பவனுக்கும் புதுஉலகம் (New Earth) என்று ஒரு காலமிருக்கும். இக்காட்சிகள் எவ்வெப்போது சத்திர 'மனிதனுக்குத்' தென்படுகின்றனவெனப் பார்ப்போம்.

மண்ணுலக மனிதன் அமாவாசை கொண்டாடும்போது சத்திரனது இரவுப் பகுதியில் உச்சமாய் தனது வானவெளியில் 'முழு உலகம்' காண்பான். ஆம் 'முழு உலகம்' தாம் பார்க்கும் சத்திரனைப்போல, ஏறக்குறைய 3-6 மடங்கு அரைவிட்டமாய் (18 மடங்கு பரப்பின்) ஒரு பெரிய ஒளியிருத்த தங்கத் தாம்பாளம் போலக் காட்சியளிக்கும். சத்திரன் பரப்பின்மேல் "முழு உலகம்" வெளிச்சம், தாம் பெண்ணாயிவாந்து பெறும் வெளிச்சத்தைப்போல 10 மடங்கு அதிகமாக இருக்கும். அந்த ஒளியில் ஒரு செய்தித்தாளை சாதாரணமாகப் படிக்கணம்

11-3-11. சத்திரனிலிருந்து காணக்கூடிய மண்ணுலகப்பாதைகள் (Earth Crescents as seen from the Moon):

சத்திரனிலிருந்து மண்ணுலகத்தைப் பார்த்தால், மண்ணுலகப் பிழையளவு மதிப்பு

$$= \frac{1}{2} (1 + \cos \text{MES}) \quad (\text{படம் 11-2-2})$$

$$= \frac{1}{2} (1 + \cos \theta) \quad (\text{ஏறக்குறைய})$$

அதற்குரிய, அநாவது அந்தகுணத்திற்குரிய சத்திரப் பிழையளவு $= \frac{1}{2} (1 - \cos \theta)$

எனவே, 'θ' இன் எண்ண மதிப்புகளுக்கும், அநாவது, எந்த ஒரு குறிப்பிட்ட தருணத்திலும், சத்திரப் பிழையளவு + மண்ணுலகப் பிழையளவு = 1 எனப் பெறப்படும்.

எனவேதான், 11-8-1 இல் கூறினதுபோல, 'முழு உலகமும்', 'அமாவாசையும்' ஒருங்கும்; 'புது உலகமும்' (New Earth), 'பெண்ணையிழை' ஒருங்கும்.

11-3-2: சத்திரன்மேல் என்ன உண்டு? என்ன இல்லை?

17ஆம் நூற்றாண்டு வானியல் அறிஞர்கள் தங்கள் தொலை நோக்கிகளின் மூலம் கண்ட உண்மைகள் சிலவாவன:

சத்திரனில் வளிமண்டலமில்லை; காந்திரம்; மழையிலில்லை. ஆகவே நீர் எனக்கொள்ளும்பொருள், சத்திரனது பரப்பில் காணப்படாது.

இப்போது சத்திரனிலிருந்து கொண்டு வரப்பட்ட பாறைகளில் கூரம் உள்ளதா என்பதுபற்றி நாம் ஆதீயங்கிடுக்கிறோம். பெரிய பெரிய கடல், ஏரி போன்ற சத்திரன் தரைப்பரப்புக்கும், பலப்பல இலட்சக் கணக்கான சிறுசிறு குழிகளும், சில பெரிய பள்ளத் தாக்குகளும், பல சிறு குன்றுகளும் சத்திரன்மேல் உள்ளன. ஏறக்குறைய 80,000 பன்னம் படு குழிகளுக்கு மேல் அங்கு இருக்கின்றன வென இதுவரை கணக்கிடப்பட்டிருக்கிறது. கடல் அகலது, ஏரி எனக் கூறப்படும் பள்ளங்களில் தண்ணீரில்லை; ஆகவே அவற்றைக் கடலென்றே ஏரிவென்றே கூறுவது பொருத்தாக் கூற்றாகும். சத்திரன் பரப்பின்மேலுள்ள மிகப் பெரிய 'டியர்கடல்' (Ocean of Storms/Oceanus Procellarum). ஏறக்குறைய 20 இலட்சம் சதுரமைல் பரப்புடையது.

இக்கிதமான பரந்த மீருதுவான தரைப் பகுதிகள், சத்திரனுக்கே தனிச் சிறப்பான உரிமைவெனக் கருதப்படுகிறது. 80 மைல் அகலமுள்ள ஒரு பெரும் பள்ளத் தாக்கு, 3×10^6 ஆண்டுகளுக்கு முன்பே, ஒரு பெரும் எரிபின் தாக்குதலால் ஏற்பட்டிருக்கலாமென ஊகிக்கப்படுகிறது. இன்னும் சத்திரனைப் பற்றிப் பலபல வியத்தகு உண்மைகளை குறிப்பு முதியதோர் காலக் கட்டத்தில் நாம் வாழ்த்துவருகிறோம். சத்திரனைப்பற்றிய பல படங்கள் 'Planets; Carl Sagan, Leonard and Editors of Life' என்ற நூலில் பக்கம் 82 முதல் 107 வரை காண்க. இத்தூல் Life Science Library வரிசையில் ஒன்று. இதில் பக்கம் 102 இல், சத்திரன் மறுபுறம் (நாம் மண்ணிலிருந்து பார்க்கமுடியாத பகுதி) படவெடுத்துக் காட்டப்பட்டிருக்கிறது.

11.4 : மெட்டன் கால வட்டம் (Metonic Cycle)

கிரெகரி ஆண்டில் ஜாசரி 885-8425 நாட்கள் ; ஒரு திங்கடில் 29-58088 நாட்கள் ; 19 ஆண்டுகள் = 6989-6076 நாட்கள் ; 285 திங்கட்கள் = 6989-6588 நாட்கள்.

எனவே 19 ஆண்டுகளும் 285 திங்கடும் சமம். (வேறுபாடு 0-0507 நாள் = 1 மணி 56 நிமிடங்கள்). சத்திரன் பிறையளவுகள் உதிரவன், சத்திரன், மண்ணுமைகள் மூன்றின் இடங்களில் பொருத்திருக்கின்றன. எனவே, இன்று அமாவாசைவென்றால், அகிலது இன்று பிறையளவு ; என்றால், அகிலது இன்று பெளர்ணமி வென்றால், 19 ஆண்டுகள் கழித்து (ஏறக்குறைய 1 மணி 56 நிமிட வேறுபாட்டில்) அமாவாசையோ, பிறையளவு ; உள்ள சத்திரனே

முறைப்படி திகழும். இது மெட்டன் காவலட்டம் எனப்படும். இக்காவ லட்டம் மெட்டனுக்கு முன்பாகவே சித்கித்திய நாடு களில் வழக்கிலிருந்தது.

இக்காவ லட்டம் மெட்டன் (Meton) யூக்லெமன் (Euctemon) என்பவர்களால் கணித்கப்பட்டது. மதச்சார்புடைய திருவிழா நாட்கள் பல, சத்திரம் நிறைவளவைவொட்டித் தீர்மானிக்கப் படுவதால், இக்காவ லட்டம் மிகவும் முக்கியத்துவம் வாய்ந்தது. எடுத்துக்காட்டாக, கஸ்டர் பண்டிகை (Easter Festival), மார்ச்சு 21க்கு பின்பு (சுதிரவன் γ கடக்கும் காலம்) திகழும் பெர்னா மிக்கு அடுத்த ஞாயிற்றுக்கிழமையன்றி கஸ்டர் ஞாயிற்றுக் கிழமையாகும் (Easter Sunday). கஸ்டர் ஞாயிற்றுக் கிழமைக்கு இரண்டு நாள் முத்திய வெள்ளிக்கிழமை, நல்ல வெள்ளிக் கிழமையாகும் (Good Friday). பெர்னாமி ஞாயிற்றுக் கிழமையாகவே வாய்ந்ததுவிடின், அதற்கடுத்த ஞாயிற்றுக்கிழமை கஸ்டர் ஞாயிற்றுக் கிழமையாகும்.

1968-மார்ச்சு 21க்குப்பின் பெர்னாமி ஏப்ரல் 2 ஆம் நாள், புதன்கிழமை. நல்ல வெள்ளிக்கிழமை ஏப்ரல் 4 ம் நாள், கஸ்டர் ஞாயிற்றுக்கிழமை ஏப்ரல் 9ம் நாள். 1970 மார்ச்சு 21க்குப் பின் பெர்னாமி, மார்ச்சு 22ம் நாள்; அன்ற ஞாயிற்றுக் கிழமை; எனவே நல்லவெள்ளிக்கிழமை மார்ச்சு 27-ம் நாள், கஸ்டர் ஞாயிற்றுக் கிழமை மார்ச்சு 28ம்நாள்.

எனவே பண்டிகை தினங்களின் முன்கூட்டியதைய பெர்னாமி தினங்கள் தெரிவவேண்டும். பண்டைக் காலத்தில், பொது நிறைவுச் சின்னங்களின்மேல் 19ஆண்டு காலத்திற்குப் பெர்னாமி தினங்கள் போன்றனெழுத்துக்களால் பொறிக்கப்பட்டிருந்தனவாம். மீட்டன் என்ற கிரேக்க அறிஞர் கி. மு. முதலாம் ஆண்டு முதல் 19ஆண்டுகளுக்கும் பெர்னாமி தினங்களை ஓர் ஆதலில் (Athens) ஆலயத்தில் பொறிக்க ஏற்பாடு செய்தனரென நாம் அறிவினோம். மெட்டன் ஏற்பாடுசெய்த பொறிப்புக்களையொட்டிப் பிற்காலத்தவர், பெர்னாமி தினங்களையறித்து: வருகின்றனரென்றும் தெரிய வருகிறது; எடுத்துக்காட்டு : கி.பி. 1-ஆவது ஆண்டுக்கு நாம் பெர்னாமி தினங்கள் காணவேண்டுமெனக் கொகலோம். $(x+1)$ ஐ 19ஆல் வகுத்து வரும் மீதி r என இருக்கட்டும்; r வது ஆண்டுக்காகப் பொறித்து வைக்கப்பட்டுள்ள பெர்னாமி தினக் கள் கி. பி. 1-வது ஆண்டுக்கும் பொருத்தும்.

11-5 : சந்திரனின் ஆசைவுகள் (Lunar Librations)

சந்திரனியக்கம், செப்டர் விதிவனக்குட்பட்டு, மண்ணுடைகத்தைக் குணமையம் கொண்டு, குணமையம் பிறழ்வுடன் ஒரு நீள்வட்டத்தில், சமபரப்பு வேகத்துடன் இயங்குகிறது எனவும், அதன் பாதை கதிரவன் பாதைக்குச் சராசரி $5^{\circ}9'$ சாய்வில் அமைகிறதெனவும் மூன்று கூறிலேயும், ஆனால் பல ஆராய்ச்சிகளின் விளைவாக, இயல்புக்க விதிகள் ஆய்வளவு சரிவராதவை:

1. ஒரே நீள் வட்டத்தில் சந்திரன் சுழல்வதில்லை;
2. ஒரே திசையில் கூட, நீள் வட்டத்தில் மாறுதல்கள் காணப்படுகின்றன.
3. ஒரே திசையில் குணமையம் பிறழ்விடே கூட மாறுதல்கள் காணப்படுகின்றன.

இம்மாறுதல்கள், சந்திரன் ஒரு புறம் மண்ணுடைகத்தினும் ஈர்க்கப்படுவதாலும், மற்றோர் புறம் கதிரவனும் ஈர்க்கப்படுவதாலும், தூரங்கள் மாறுவதாலும் ஏற்படுவன. இவைகளையும் வான தூள்-செய்யுப்பகுதியின்பாற்படுவதான, விரிவாக விளக்கப்படாது விடப்படுகிறது. (Barlow and Bryan : Elementary Mathematical Astronomy—pp 478-477 காண்க). இப்பகுதிகளில் வேறு சில ஆசைவுகளைப்பற்றிப் பார்ப்போம்:

11-5-1. கீழ் மேல் ஆசைவு (Librations in Longitude)

சந்திரனைப் பற்றிய ஒரு முக்கியமான உண்மையானதெனின் எப்போதும் நாம் சந்திரனின் ஒரு பாதிப் பகுதியைப் பார்க்கிறோம். அதன் மற்றொரு பாதிப் பகுதி நமது காட்சிக்கே தெரியாமல் ஒரு மறைந்த புதிராகவே இருக்கிறது. இந்த விதமான திகழ்ச்சி எப்படி, ஏற்படுகின்றதென்பதைப் பின்வரும் எடுத்துக் காட்டு விளக்கும்.

ஒரு பெரிய வட்டம் வரைந்து அதன் மையத்திலே ஒரு விளக்கு வைக்கவும். ஒருவன் அவ்விளக்கை நேராகப் பார்த்துக் கொண்டேயிருக்கும் வகையில், அவ்வட்ட வரையின் நடத்து, வரையானுமின், அவ்விளக்குப் பக்கம், அவன் முதுகுக் காட்சி ஏற்பட முடியாத நிலை? அவன்வட்ட வரையின் ஒரு புள்ளியில் நின்று விளக்கை நேர்முகமாகப் பார்த்துக் கொண்டு, காண்வட்டம் வந்தபிறகு அவன் தன்னைத்தானே 90° சுற்றிக்கொண்டிருப்பான். மூன்று வட்டம் வந்த பிறகு தன்னைத்தானே 360° சுற்றிச் கொண்டிருப்பான். இந்த சுற்றில், அவன் முன்புறம் விளக்குப் பக்கம்

எப்போதும் திரும்பிவிருக்கும்; எப்போதும் அவன் மூலுருப் புறம் விளக்குப் பக்கம் திரும்பிவிருக்காது.

இவ்வாறே சத்திரன் மண்ணுலகத்தை ஒரு சுற்றை சுற்றி வரும் விண் மீன் யாதத்தில் தன்னைத்தானே, தன்மைய அச்சைச் சுற்றி, ஒரு மூன்றை மூலுவதும் சுழன்று வருகிறது. ஆகவேதான், சத்திரனின் ஒரு யாதிப் பகுதியே உலகின் காட்சிக்குக் கிடைக்கிறது. மலுபாதி எப்படியிருக்குமென்றும், அங்கு என்ன புதிர்கள் மறைத்திருக்கின்றனவென்றும், முன்வந்த ரஷ்ய விண்வெளி வீரர்கள் படம்பிடித்துக்காட்டும்வரை மனிதன் அறிந்தாவில்லை.

ஆனாலும், சத்திரன் தன்னைத்தானே சுற்றி வரும் அச்சு, அதன் இயக்கப்பாதைத் தளத்திற்கு செங்குத்தாகச் இருத்து, சத்திரன் கோண வேகமும் ஒரு சீராக இருத்து, இயக்கப்பாதையும் சரிவான வட்டமாக அமைத்திருத்தால், சரிவாக ஒரே யாதி சத்திரகோணமே தம்பக்கம் காட்சியளிக்கும். ஆனால், சுற்ற அச்சு, இயக்கப் பாதைத் தளத்திற்குச் செங்குத்தாக இல்லாமல் ஒரு சிற்று 0°-90° சாங்கத்திற்குக் கிறது; செர்னர் விதிப்படி சத்திரன் ஒரு தீன் வட்டத்தில் செல்வதால், பூமிக்கு அண்மை நிலையில் உட்களமோது (Perigee) கோணவேகம் மீப்பெரு மதிப்பும் பூமிக்குச் சேய்மை நிலையில் (Apogee) உட்களமோது, கோண வேகம் மீச்சிறு மதிப்பும் பெறுகிறது; மேலும் இயக்கம் சரிவான வட்டத்திலில்லை, தீன் வட்டமாக அமைகிறது.

மண்ணுலகத்திற்கு அண்மை நிலையில் சத்திரனின் இயக்க கோண வேகம் (Orbital Velocity) தன்னைத்தானே சுற்றும் வேகத்தைவிட அதிகப்பட்டு, சேய்மை நிலையில் இயக்க கோண வேகம், தன்னைத்தானே சுற்றும் வேகத்தைவிடக் குறைத்து போகிறது. ஆகவே மண்ணுலகத்திற்கு அண்மை நிலையில், சத்திரனின் (மேற்கிலிருந்து கிழக்காக இயக்குவதால்) மேற்குப் பக்கம் சிற்று அதிகமாகத் தெரிகிறது; ஆனால் அந்த அளவிற்கு அதன் கிழக்குப் பக்கம் தெரியாது (அதாவது எந்தக் குறிப்பிட்ட சமயத்திலும் ஒரு சரி யாதிமட்டுமே தான் தெரியும்). அவ்வாறே சேய்மை நிலையில் சத்திரனின் கிழக்குப்பக்கம் சிற்று அதிகமாகத் தெரியும்; அந்த அளவிற்கு அதன் மேற்குப் பக்கம் தெரியாது. எனவே, ஒரு குறிப்பிட்ட சமயத்தில் ஒரு யாதி சத்திர கோணம் மட்டுமே தமது காட்சிக்குக் கிட்டுமாயினும், ஒரு விண் மீன் யாத காலத்தில், மேற்குப் பக்கம் சொஞ்சம் அதிகமாகவும், கிழக்குப் பக்கம் சொஞ்சம் அதிகமாகவும் நமக்குக் காட்சிக்குத் தோன்றி மறைந்து விடும். இந்த அளவே சத்திரன் செட்டாங்கு அளவை (Libration in Latitude) எனப்படும்.

11.5.2 : அகலங்கு அகசவு (Libration in Latitude)

மூன்றாண்டுக்கொருமுறை, சந்திரன் தன்னைத்தானே சுற்றும் அச்ச, தன் இயங்கு தளத்திற்குச் செங்குத்தாக இல்லாமல், செங்குத்துக்கு 6.5° சாய்ந்திருப்பதால், ஒரு சமயத்தில் அவ்வச்சின் ஒரு முனை மண்ணுலகம் பக்கமாகச் சாய்ந்தும், மற்ருேர் சமயத்தில் மற்றமுனை மண்ணுலகம் பக்கமாகச் சாய்ந்தும் இருக்கும். அந்த சமயங்களில் அச்சின் ஒரு முனைவாய் சுற்றி 6.5° கோண அளவிலிட்ட அளவுள்ள கோளப் பகுதி முதலிலும் (Spherical cap of radius 6.5°) மற்ருேர் முனைவாய் சுற்றி 6.5° கோண அளவிலிட்ட அளவுள்ள கோளப் பகுதி மீண்டும் மாறிமாறி மண்ணுலகக் காட்சிக்குக் கிடைக்கிறது. இந்த ஆதிசுப்படியான டாப், அவ்வக்க இயக்க தளத்திற்குச் செங்குத்தாக இருந்தால் தெரியாது. இந்த அகசவு, அகலங்கு அகசவு எனப்படுக.

11.5.3. தினசரி அகசவு (Diurnal Libration)

காட்சியாளன் மண்ணுலக மையத்திலிருந்து, மூலக்ருதிய அகசவுகளின் விளைவுகள், அவனுக்குத் தென்றும். ஆனால் மண்ணுலக மையக் காட்சி, சுற்பனைக் காட்சியெனவும் இருப்பினும் வான ஆராய்ச்சியில் அக் சுற்பனைக் காட்சியின் இன்றியமையாதம் பற்றியும் தாம் 'புவிமையத் தோற்றப் பிழை' யென்ற பகுதியில் கண்டோம். எனவே மண்ணுலகத்தின் மேற்பரப்பில் உள்ள காட்சியாளன், உதவியாகும் சந்திரனின் மேற்குப் புறத்தில், $57'$ (சந்திரனின் புவிமையத் தோற்றப்பிழை) அதிகமாகவும், கிழக்குப் புறத்தில் $57'$ குறைவாகவும் காண்பான்; அவ்வாறே மறையும் சந்திரனின் மேற்குப் புறத்தில் $57'$ குறைவாகவும், கிழக்குப் புறத்தில் $57'$ அதிகமாகவும் காண்பான். இது புவிமையத் தோற்றப் பிழை காரணமாக ஏற்படும் விளைவாகும். இதற்குத் தினசரி அகசவு எனப்பெயர்.

அகலங்கு அகசவு, தெட்டங்கு அகசவு, தினசரி அகசவு இவைகளின் விளைவாக, ஏறக்குறைய சந்திரனின் 59 சதவீதக் காட்சி மொத்தமாக எப்படியாவது கிடைத்து விடுகிறது. ஆனால் ஒரு குறிப்பிட்ட சமயத்தில் 50 சதவீதம் மட்டுமே காட்சிக்குத் தெரியும் என்பதைக் கவனத்தில் கொள்ள.

11.6. சந்திரோதயத்தில் தாமதம்—துசிதம்

சந்திரன் இயக்கம் சிக்கல், திறந்தது எனவும், அச்சிக்கல் களுக்குக் காரணங்கள் என்னவெனவும் 11.2 இல் கண்டோம்.

சத்திரன்

சத்திரன் தனது பாதையில் ஏதக்குறைய $18^{\circ}11'$ வேகத்தில் திசை நகர்த்து செல்வதால், அதன் நடுவரை விவக்கமும், வல ஏற்றமும் வேகமாக மாறுகின்றன. சத்திரவன் பாதையும் சத்திரன் பாதையும் வெட்டுமிடங்களின் ஆனவையில் சத்திரனின் நடுவரை விவக்க மாற்றம் ஏதத்தாழ திசை $\sin 18^{\circ}11' \sin i = 0.2251 \sin i$ என்ற அளவிலிருக்கும் (i -சத்திரவன் பாதைக்கும் சத்திரன் பாதைக்கு மிடையிட்ட கோணம்).

முதலில், சத்திரனின் நடுவரை விவக்கம் திசை மாற்றத்தின் விளைவுகளைப் பார்ப்போம், வல ஏற்றம் மாறுபடாமல், சத்திரன் நடுவரை விவக்கம் மட்டும் மாறுபடின், தொடுவானத்திற்கு மேல் சத்திரன் இருக்கும் காலஅளவு மாறுபடும்; ஆனால் உச்சி கடக்கும் சமயம் மாறுது; ஏனெனில் இம்மாறுபாடு வல ஏற்றத்தை மட்டுமே சார்ந்திருக்கிறது. நடுவரை விவக்கம் உயர்ந்தால், சத்திரன் தொடுவானத்தின் மேலிருக்கும் காலம் அதிகமாகும்; குறைந்தால் அக்காலமும் குறையும் ($\cos h = - \tan \phi \tan \delta$).

ஆனால் நடுவரை விவக்கம் மாறாமல் வல ஏற்றம் மட்டும் உயருமானால், சத்திரன் உதயமாகும் சமயம், உச்சி கடக்கும் சமயம், மறைவும் சமயம் ஒன்றும் வல ஏற்றம் மாறும் காலமில் தாமதமாகும்; இப்போது ஒரு திசையில் சத்திரனுடைய வல ஏற்றம் வளர்த்து கொண்டே போகிறது; நடுவரை விவக்கம் மாறிமறி வளர்த்தும், குறைத்தும்வருகிறது. இவ்விரண்டு மாற்றங்கள் ஒரேவேகத்திலேயே பாதக்கும்போது, ஏற்படும் விளைவுகள் என்னவென ஒருவாறு கூறலாம்.

சத்திரன் மேட முதற்புள்ளியைக் கடக்கும்போது, (1) நடுவரை விவக்கம் வேகமாக உயர்கிறது; (2) வல ஏற்றமும் உயர்கிறது.

எனவே அந்த சமயத்தில் வல ஏற்ற வளர்ச்சி காரணமாக, உதயமாகும் நேரம், காலதாமதமாகும் நிலையில், நடுவரை விவக்க உயர்வு காரணமாக, இத்தாமதம் ஓரளவு சுடு செல்வப்பட்டுத் தாமத அளவு குறைகிறது; ஆனால் மறையும் சமயம் இரு காரணங்களாலும் மிகவும் தாமதமடைகிறது.

சத்திரன் துணை முதற்புள்ளியைக் கடக்கும்போது (1) நடுவரை விவக்கம் குறைகிறது; (2) ஆனால் வல ஏற்றம் உயர்த்து கொண்டே போகிறது.

எனவே அந்த சமயத்தில் சத்திரன் உதயமாகும் நேரம் இரு காரணங்களாலும், மிகவும் தாமதமடைகிறது; ஆனால் மறையும்

தேவதீவோற்படும் தாமதம் ஓரளவு ஈடுசெய்யப்பட்டு, தாமத அளவு குறைகிறது.

ஒரு 'நிங்கன்' காலத்தில், சத்திரன் γ , = என்ற இரு புள்ளி அளையும், ஓரேர் முறை கடக்கிறது. எனவே மேற் கூறிய நிபந்தனைகள் மாதமொருமுறை ஏற்படுகின்றன.

ஆகவே 'நிங்கன்' முழுவதும் நிகழ்ந்தோறும், சத்திரன் உதிக்கும், மறைவும் தேரங்களில் ஏற்படும் தாமதம் ஒரு சீரானதல்ல. ஆனால் சராசரியாக 50 நிமிடங்கள் எனக் கூறலாம். ஆதலால் இன்று கதிரவன் மேற்கில் மறைவும் சமயம், முழுச்சத்திரன் தேர் கிழக்கில் உதயமாகுமாயின், தான், கதிரவன் மறைந்து ஏறக்குறைய 50 நிமிடங்கள் தாமதித்து, குறைச் சத்திரன் கிழக்கு வானில் உதயமாகும். இத்தாமதக் காலம் மாறும் தன்மையுடையது என்பதை நாம் மறைத்துவிடக்கூடாது.

11-6-1. அறுவடைச் சத்திரன் (Harvest Moon)

செப்டம்பர் 28ம் தேதி வாக்கில், இலாபுதிச் காலச்சம இரவுப் புள்ளியைக் கதிரவன் கடக்கும் அளவில், முழுமதியம் ஏற்படின், இக்காலதாமதம் மீச்சிறு மதிப்பையேற்கிறதென்பர் பின்வருமாறு நினைவாகம் :

திருவள்ளூரை மிகச்சுருக்கமாகவே கண்டுக்கொண்டிருக்கிறது. முழுமதியம் ஏறக்குறைய, γ இல் உதயமாகும் எனில், $\pm$ இல் கதிரவன் மறைவும். இது இலாபுதிச் காலத்தில் ஏற்படுவதாகும். மாறாக முழுமதியம் ஏறக்குறைய $\pm$ இல் உதயமாகுமெனில், γ இல் கதிரவன் மறைவும். இது இளவேனிற் காலத்தில் ஏற்படுவதாகும்.



முழுமதியம் - γ இல் உதயம்
அடுத்தநாளுதயம் - m_1 இல்

படம் 11-6 (i)



முழுமதியம் - $\pm$ இல் உதயம்
அடுத்தநாளுதயம் - m_2 இல்

படம் 11-6 (ii)

படம் 11-6 (i) ம், (ii) மரபுப்படி வரையப்பட்டிருக்கின்றன.

படம் 11-6 (i) இலிருந்து காலத் தொடர்புடையது என்பதும்,

படம் 11-6 (ii) இனவேனிற் காலத்தொடர்புடையது என்பதும் படத்தில் விளக்கும். படம் 11-6 (i) க், முழுமதியம் γ இல் உதயம்; எனவே சத்திரவன் மறைவு இல்; இலிருந்து காலம் முழுமதியத்திற்கு அடுத்த நாள் சத்திரன் திரி M_1 (CL இன் மேல் M_1 ; $\gamma M_1 = 18^\circ 11'$); சத்திரன் பாதை M_1 ம் $1QR$, உதய இடம் m_1 ; எனவே உதய தாமதம் = நேரக் கோணம் $m_1 P M_1$. படம் 11-6 (ii) இல், முழுமதியம் $\triangle$ இல் உதயம்; எனவே சத்திரவன் மறைவு γ இல்; இனவேனிற் காலம். அடுத்த நாள் சத்திரன் திரி M_1 (CL இன் மேல் M_1 ; $\triangle M_1 = 18^\circ 11'$); சத்திரன் பாதை M_1 ம் $1QR$, உதய இடம் m_1 ; எனவே உதய தாமதம் = நேரக்கோணம் $m_1 P M_1$, $\angle m_1 P M_1 < \angle m_1 P M_1$ எனத் தெரிகிறது. ... (1)

(கோணம்: 11-6 (i), 11-6 (ii) படங்களில் சத்திரன் பாதை கணக் காண்க). எனவே இலிருந்து காலப் பெளர்ணமிக்கு அடுத்த நாள் சத்திரோதயத்தில் ஏற்படும் காலதாமதம் மிகக்குறைவானவும் இனவேனிற் காலத்தில் அத்தாமதம் அதிகமெனவும் தெரிகிறது. மேற்கூறிய இயற்கை விளைவால் இலிருந்து காலப் பெளர்ணமிக்கு ஒரு தனிச்சிறப்பு வழங்கப்பட்டிருக்கிறது. மேனுட்டவர் அறுவடைக் காலத்தில் இந்த நிகழ்ச்சி ஏற்படுவதால் அவர்கள் இப்பெளர்ணமிக்கு (ஈர்பசி மாதப் பெளர்ணமி), அறுவடைப் பெளர்ணமி (harvest moon) எனப் பெயரிட்டிருக்கின்றனர். அறுவடைக் காலவாதலின், பகற்காலம் குறைவு; இரவுக்காலம் அதிகம். சத்திரவன் சாந்தரின்பு உடனேயே சத்திரோதயம் மிகக்குறைந்த காலதாமதத்தில் ஏற்பட்டு அவர்கள் அறுவடை செய்து களமடக்கும்; வேண்டியக் சத்திரவன் மறைந்த விடும் தொடர்ந்து செய்ய; அச்சத்திரனென உடனடியாகப் பயன் படுவதால், இந்தப் பெளர்ணமிக்கு உழவர் சத்திரன் எனப் பெயர் கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது.

11-6-2: வேடுவர் சத்திரன் (Hunter's Moon)

இதற்கு அடுத்த பெளர்ணமி சமயத்திலும், இக்கால தாமதம் குறைவாகவே இருக்கிறது; அதாவது சராசரித் தாமதம் 50 நிமிடங்களுக்குக் குறைவு. இதற்கு வேடுவர் சத்திரன் எனப் பெயர். ஏனெனில் இது மேனுட்டவர்களின் வேட்டைக்காலம்.

குறிப்பு: (1) உயர்ந்த வட அகலங்களிலுள்ள இடங்களில், சத்திரவன் பாதைக்கும், நடுவரைக்கும் இடையே தொடர்வானம்

இருக்க வாய்ப்பிருக்கிறது. அந்த சமயங்களில் பென்னை 7 இல் ஏற்படுவதும், சத்திரோதயத் தாமதம் மிகவும் குறைவும்.

(2) மண்ணுலக நடுவரையின்மேலுள்ள இடங்களில் 'அறுவடைச் சத்திரன்' ஏற்பட வாய்ப்பெல்லை.

(3) மண்ணுலகத்தில் தென் அகலங்களிலுள்ள இடங்களுக்கு, பென்னை 7 இல் அல்லது 7 க்கு அருகில் திரையும்போது 'அறுவடைச் சத்திரன்' திரையும்.


11.7. பருவங்கள்தோறும் சத்திரனின் பளபளப்பு:

மாரிக் காலத்தில் சத்திரவன் வான நடுவரைக்குத் தெற்கேயும், கோடைக் காலத்தில் வடக்கேயும் இயங்குகிறது. ஒவ்வொரு பென்னையிலும் சத்திரன் சத்திரவனுக்கு நேரெதிரில் இடம் பெறும். எனவே மாரிக்காலப் பென்னையிலே சத்திரன் வான நடுவரைக்கு வடக்கே தன் திசைநிப்பாகையில் செல்கிறது. ஆகவே மாரிக் காலப் பென்னையினால் சத்திரன் வானத்தில் உயர்த்து செல்கிறது; நடுமாரிக்காலப் பென்னையிலே சத்திரன் இன்னும் உயர்த்து செல்கிறபடியால், அப்போது சத்திரன் தொடுவானத்திற்குமேல் அதிக நாழி உடனையும் தனது உச்சி கடக்கும் வேளை ஏற்றம் மீட்பெரு மதிப்பைப் பெற்றும், மிகப் பளபளப்பாகக் காட்சியளிக்கிறது. மாரிக்காலப் பென்னையினால் மிகப் பொலிவாகிப்பெற்ற சூரிய கரணங்கள் மேல் கூறியவைகளும், இதற்கு நேர்மாறான நிலை கோடைக்காலப் பென்னையினுக்கு உருவாகின்றதை நாம் காண்கிறோம்.

மண்ணுலகில் வடக்கு வெப்ப மண்டலத்தில் (0° முதல் 23½° வரை வடக்கு அகலங்கு) உள்ள இடங்களில், வானகோள நடுவரை வான உச்சிக்கு அருகாமையில் இருக்கிறது. எனவே, சத்திரன் திசைநிப்பாகையில் உச்சி கடக்கும்போது, வான உச்சிக்கு அருகில் உச்சி கடக்கிறது; ஆனால் அதிக அகலங்கு உள்ள மண்ணுலகப் பகுதிகளில், வான உச்சிக்கு வெகு தொலைவில் சத்திரன் உச்சி கடக்கிறது. சத்திரன் திசைநிப்பாகை தொடுவானத்திற்கு அருகில் அமைகிறது; உச்சி கடக்கும்போது சத்திரனின் வான ஏற்றமும் மிகக் குறைவு; இந்தக் காரணங்களின் விளைவாக, மேல் நாடுகளில் சத்திர ஒளி மங்கலாகவும், இந்தியா போலக் குறைவான அகலங்களில் அமைந்துள்ள நாடுகளில் சத்திர ஒளி மிகப் பொலிவாகவும், மிகப் பளபளப்பாகவும் இருப்பதை நாம் காணலாம்.

11-8: சத்திர அணுக்களின் சுழற்சி:

சத்திரவன் பாதையும் சத்திரன் பாதையும் 5° ஒன்றுக்கொன்று சாய்வுள்ளதென நாம் பார்க்கிறோம். அவை வெட்டுமிடங்கள் இரண்டும் அணுக்கள் எனப்படும். அங்கிலை அணுக்களும் நிபந்த இடத்திலிருப்பதில்லை. அவை ஆண்டுதோறும் $19^\circ 21'$ வலஞ் சுழியாக, சத்திரவன் பாதையின்மேல் நகர்த்துகொண்டே இருக்கின்றன. இச் சுழற்சிக்கு கால வட்டம் 6,788.4 நாட்கள் அளவு ஏறக்குறைய 18-8 ஆண்டுகளாகும். அதாவது இப்போது ஒரு அணு N_1 என்ற இடத்தில் இருந்தால், அடுத்த ஓராண்டு சுழித்து சத்திரவன் பாதையின் மேல் $19^\circ 21'$ நகர்த்து N_1' என்ற இடத்திலும் அதற்கடுத்த ஆண்டு N_1'' என்ற இடத்திலும் இருக்கும். (படம் 11-8 காண்க)



படம் 11-8.

$$\text{இங்கு } N_1 N_1' = 19^\circ 21' = N_1' N_1''$$

அவ்வாறே N_1 க்கு இன்னொரு N_2 என்ற அணுவும் நகர்த்துகொண்டே செல்லும். சத்திரவன் பாதையின் N_1 ல் உள்ள அணு, மறுபடியும் N_1 க்கு வர $\frac{800}{18.85} = 18.8$ ஆண்டுகள் எனக் கணிக்கலாம்.

11.8-1 சத்திரவன் வழிக்கணுக் காலவட்டம் (Synodic Period of the Nodes)

ஓராண்டில் சத்திரவன் தன் பாதையின் இடஞ்சுழியாக 800 செல்கிறது. சத்திரன் அணுக்கள் ஆண்டுதோறும் $19^\circ 21'$ வீதம் வலஞ்சுழியாக நகர்த்து செல்கின்றன. எனவே, ஒரு அணுவிலிருந்து சத்திரவன் புறப்படுவானின், ஒரு நாளில் அக்கணுவிலிருந்து சத்திரவன்

ஐக்கும் ஏதபடும் தூரம் $\left(\frac{880}{865-25} + \frac{19-85}{865-25} \right)^{\circ}$ ஆகும். எனவே கதிரவனும் அக்கணுவும் மறுபடியும் சந்திக்கும் காலவெளி S நாட்கள் எனக் கொண்டால்,

$$\frac{880}{S} = \frac{880 + 19-85}{865-25}$$

$$\therefore S = \frac{865-25 \times 880}{879-85}$$

$$= 846-62 \text{ நாட்கள் } (846 \frac{1}{2} \text{ நாட்கள்})$$

ஏறக்குறைய)

இக்கால வட்டம் கதிரவன் (ஞாயிற்று) வழிக்குணாக காலவட்டம் எனப்படும். இக்கால வட்டம் கதிரவன், சந்திரன் கிரகணங்கள் உண்டாகும்போது பயன்படும்.

11-9: சந்திரனும் கடல் அலைகளும்


கடல் அலைகள் எப்படி சந்திரன், கதிரவன் சுரப்பு சக்திகளால் உருவாகின்றன வென்பது பற்றி அறிய விரும்புவோர் வான நூல் களில் சுரப்புப் பகுதியில் (Barlow and Bryan—Mathematical Astronomy) விவரமாக காணலாம். (பக்கம் 449 முதல் காண்க). இந்நூலில் மிகச் சுருக்கமாக இவ் வலைகள் எப்படித் தோன்று கின்றனவென்று யார்ப்போம் :

உலகப் பரப்பின்மேலுள்ள கடல் நீர், சந்திரனின் சுரப்புச் சக்தியால், அலைகளாக எழுகிறது. கதிரவன் சுரப்புச் சக்திக்கும் இதில் பங்குண்டு.

உலகம் ஒரு சரிவான கோளவடிவம் பெற்றதெனக் கொள் ளோம். ஒரு குறிப்பிட்ட சமயத்தில் சந்திரன் மையத்தைவும், உலக மையத்தையும் இணைக்கும் கோடு, உலகப் பரப்பை A என்ற புள்ளியில் வெட்டினால், அச்சமயத்தைப் பொறுத்தமட்டில் A என்பது நிலவு நோப்புள்ளி (Sublunar point) எனப்படும். A ஒரு கடற்பரப்பின்மேல் இருக்குமாயின், சந்திரனது சுரப்புச் சக்தியின் காரணமாக, கடல் நீர் A ஐச் சுற்றி வேகமாகக் குவிக்கிறது; மேலும் தண்ணீராதமின் நிலத்தை சுரப்பதைவிடத் தண்ணீரை அதிகமாக அச்சக்தி ஈர்க்கும்; எனவே அலைகள் எழுகின்றன. அதே சமயத்தில், நிலவு நோப்புள்ளிக்கு நேர் எதிராக உலகின்மேல் உள்ள புள்ளி B ஐ எடுத்துக்கொள்ளோம். நக்கு மேலேயிருக்கும்

தண்ணீரையிட, B என்ற இடத்தில் உள்ள தரைப்பாகம், Mக்கு அருகில் உள்ள படியால் சத்திரன் கர்ப்புச் சக்தி B என்ற தரைப் பகுதியில் அதிகமாக இருக்கிறது. அவ்வீட்டுமிடங்களையாக, Bஐச் சத்திரன் தண்ணீர், Bஐ நோக்கி ஓடி வந்து குவிக்கிறது. (படம் 11:8 காண்க)

இப்படி A, B என்ற இடங்களில் கடல்நீர் ஓடிவந்து குவிதலால் அலைகள் ஏற்படுகின்றன*



படம் 11:8

ஒரே நாளில், ஏற்படும் அலைகள் வெவ்வேறு உயரங்கள் பெற்றிருக்கும். மேலும் கடிரவன் கர்ப்புச் சக்தியை சத்திரன் கர்ப்புச் சக்தியோடு சேருகிறது. கடிரவன் சத்திரனைவிடப் பெரிதாக இருப்பினும், அது வெகு தூரத்தில் இருப்பதால் அதற்கு இருக்கும் அலை எழும்பும் ஆற்றல் சத்திரன் ஆற்றலைப்போல் பங்குதான். ஆனால் பென்னை, அராவாசை நாட்டளவில்,

* இது சமூகத்தில் இவ்வளவு எளிதாக விளையப்பெறுகின்றதென்பதால், படியை விடக்கூட சிறந்தது, எத்தனை விவரமான விளக்கங்கள் எந்தெந்த தரங்களில் காணலாம்.

கதிரவன் சக்தியும், சந்திரன் சக்தியும் ஒன்றுசேர்ந்து, ஆலைகள் உயரத்தையும் வேகத்தையும் பெருக்குகின்றன. ஆனால் அரை மதியக் காலங்களில், சந்திரன் சக்தியும், கதிரவன் சக்தியும் மாறுபட்ட திசைகளில் இருப்பதால், ஆலைகளில் ஆலைகள் அய்வளவு உயரமும் வேகமும் பெறுவதில்லை. அமராவாசை, பெண்ணரி காலங்களில் ஏற்படும் உயர்த்த ஆலைகள் ஏற ஆலைகள் (Spring Tides - வேனில் ஆலைகள்) எனவும், அரைமதியக் காலங்களில் ஏற்படும் ஆலைகள் மட்ட ஆலைகள் (Neap Tides) எனவும் பெயர் பெறும். ஏற ஆலைகள் உயரமும், மட்ட ஆலைகள் உயரமும் $11 + 5 : 11 - 5 = 16 : 6 = 8 : 3$ என்ற விகிதத்திலிருக்கும்.

மற்றும் சந்திரன் பாதையின் குவிமையப் பிறழ்வு, $1\frac{1}{2}$ என்ற சந்திரன் பெரிய மதிப்புடையதாகலின், சந்திரன் மண்ணுறை அண்மையில் இருக்கும்போது உயரமான ஆலைகளும், மண்ணுறைச் சேண்மையில் இருக்கும்போது மட்டமான ஆலைகளும் ஏற்படுகின்றன. எனவே, மண்ணுறை அண்மை நிலையில் பெண்ணரி, அமராவாசை நிகழ்மையின், அப்போது ஆலைகள் மிக உயரமாக இருக்கும்.

ஆனால் ஆலைகள் பற்றிய சரியான வினக்கங்கள், நில அண்மப்பு, கடலண்மப்பு முதலியவற்றையும் கணக்கில் எடுத்துப் பார்க்க வேண்டியவைவாலும்.

இப்பகுதியில் கூறப்பட்ட வினக்கம் சிக்கல்கள் நீக்கிக் கூறப் பட்டவைவாலும்,

பயிற்சி 11

1. ஸ்ரீமதியப் பிறையளவு 1 எனக்கொண்டால், அமராவாசைக்கும் அரைமதியத்திற்கும் நடுவே, பிறையளவு ஏறக்குறைய 4 என நிறுவுக. (செப்)

2. படங்கன் வரைந்து, சந்திரன் நீட்சி மாறுதல்களையும், பிறையளவு மாறுதல்களையும், அவற்றிற்கிடப்பட்ட தொடர்புகளையும் விளக்குக. (செப்)

3. சந்திரனின் மீட்பெரு, மீச்சிறு கோணவிட்டங்கள் முறையே $38' : 39'5''$ ஆனால், சந்திரன் நீள்வட்டப் பாதையின் குவிமையப் பிறழ்வு கணிக்க. (செப்)

4. மீன் கொடுக்கப்பட்ட பட்டியல்கள் கொண்டு அமராவாசை நேரத்தைக் கணிக்க :

	சத்திரவன் தெட்டாக்கு	சத்திரன் தெட்டாக்கு
(i) அக் 28, நண்பகல்	215° 4' 30"	212° 0' 0"
" நன்னிரவு	215° 34' 30"	215° 41' 15"
		(அக்)

(ii) ஜூ 28,

நண்பகல்	125° 4' 33"	122° 0' 0"
" நன்னிரவு	125° 34' 30"	125° 41' 15"
		(செப்)

5. மீன் கொடுக்கப்பட்ட பட்டியல் கொண்டு, பென்சனம் நேரத்தைக் கணிக்க.

	சத்திரவன் தெட்டாக்கு	சத்திரன் தெட்டாக்கு
டிசம்பர் 31, நண்பகல்	279° 33' 30"	26° 0' 30"
" நன்னிரவு	280° 7' 0"	102° 1' 30"
		(செப்)

6. ஒரு நாள் இரவு 10 மணிக்குச் சத்திரோதயம்; அன்று சத்திரன் வயதென்ன? நிறையளவு என்ன? சத்திரனின் மேற்குப் புறம் ஒளிபெற்றிருந்ததா, அல்லது கிழக்குப்புறம் ஒளி பெற்றிருந்ததா?

7. ஒரு நிமிஷம் 29.5 நாட்கள்; ஒரு சத்திர நாட்கள், எத்தனை மணி நேரங்கள் சராசரியாக உட்கொள்ள?

8. மீன்வழி மாதத்தில் 27½ நாட்கள். நேற்று சத்திரன் இரவு 8 மணிக்கு உதயமானால், இன்று எப்போது உதயமானால்? நாளைக்கு எப்போது உதயமானால்?

9. ஒரு நாள் சத்திரன் உச்சி கடக்கும்போது, நிறையளவு ½; மேற்குப் பக்கம் ஒளி பெற்றிருந்தது. அப்போது சத்திரன் வயதென்ன? அடிசைக் காலமென்ன? (செப்)

10. சத்திரவன் தூரம் 98×10^6 மைல்கள்; சத்திரன் தூரம் 24×10^6 மைல்கள். சத்திரன் நிறையளவு (i) ½ (ii) ¼ இருக்கும் போது கோணம் ESM ன் மதிப்பைத் தோராயமாகக் கணக்கிடுக.

11. ஓரண்டில் மூலக்க மாதம் 7ம் தேதி அமாவாசை. அந்த ஆண்டில் ஆகஸ்டு மாதம் 7ஆம் தேதி சத்திரன் வயதென்ன? ஆகஸ்டு மாதம் பென்சனம் ஏறக்குறைய எந்த நாளில் வரும்?

12. சத்திரமும் மண்ணுலகமும் வட்டப் பாதையில் சீரான கோண வேகத்தில் செல்கின்றன என்ற அடிப்படையில், சத்திரன் மண்ணுலகச் சுற்றும் கோண வேகம் ω ; மண்ணுலகம் கதிரவனைச் சுற்றும் கோண வேகம் ω' . கதிரவனிலிருந்து மண்ணுலகம்—சத்திரன் நீட்சியின் மீப்பெரு மதிப்பு l ; அடுத்தடுத்து இந்நீட்சி மீப்பெரு மதிப்புகள்பெறும் கால இடைவெளி $\frac{\pi - 2l}{\omega - \omega'}$ ஆகலது

$\frac{\pi + 2l}{\omega - \omega'}$ என நிறுவுக. (l, ω, ω' என்பவை ஆரவளவளவில் இருக்கின்றன.)

13. மண்ணுலகம், நான் மூலமும் 'மறையா மதியம்' நிகழக்கூடிய இடம், குறைத்தது எந்த அகலத்தில் இருக்க முடியும்? (81'24').

14. ஒரு திங்கள் 22-53 நாட்கள் கொண்டது. சத்திரனின் இயக்கப்பாதை ஒரு வட்டமொன்று கொண்டு, அதன் வயது 20-5 நாட்களும்போது அதன் பிறையளவு என்ன எனக் காண்க. 50°வ. அகலங்கு உள்ள ஓரிடத்தில் அன்று சத்திரன் உச்சி வடக்குப் போது எந்த உருவத்தில் சத்திரனிலுக்கும் என்று படம் வரைந்து காட்டுக.

15. அன்னாமலை தலில் ஒரு நாள் சத்திரன் காலை 2 மணிக்கு உதயமானதாகப் பதிவு செய்யப்பட்டது. அப்போது அதன் பிறையளவு என்ன? தொடுவானம் வரைந்து, அதற்கு மேல் சத்திரனது இடக்குறிக்க. அடுத்த நாள் அங்கு சத்திரன் எத்தனை மணிக்கு உதயமாகும்? (அக்)

12 (A). கெப்ளர் விதிகள் (KEPLER'S LAWS)

A

12.0 : முன்னுரையில் கொபர்னிக்கஸ் "கதிரவன் மையக் கொள்கை"வை வகுத்தாரெனவும், அவர் அடிக்கவட்டிலே தோன்றிய டைகோபிராந்தியஸ் அவர் மாணவரான கெப்ளரும், கதிரவனைச் சுற்றிக் கதிரவன் குடும்பக்கோள்கள் எந்த இயந்தக விதிகளுக்குட் பட்டு விண் வெளியில் இயங்கி வருகின்றன என்று அறிவித்தனர் என்றும் கூறினோம். இப்பகுதியில் அங்விதிகள் யாவை யெனவும், அவற்றின் அடிப்படையில் வேறு பல வானியற்செய்திகளும் விளக்கம் பெறுகின்றன.

12.1 : விண்வெளியில் கதிரவனைச் சுற்றி இயங்கிவரும் பெருக்கோள்கள்(Major Planets) ஒன்பதாகும். அவை கதிரவனிடமிருந்துள்ள அண்மை-செய்மை முறைப்படி புதன், வெள்ளி மண்ணுலகம், செவ்வாய், வியாழன், சனி, உரோனஸ், நெப்டியூன், புளூட்டோ - இவைகளின் இயக்கம்பற்றி டைகோ பிராந்தியின் ஆராய்ச்சிக் குறிப்புக்களின் அடிப்படையில் அவரது மாணவர் ஜான் கெப்ளர் (John Kepler) வெளியிட்டுள்ள விதிகள் வருமாறு:

1. ஒவ்வொரு கோளும், கதிரவனை ஒரு குவிமையக் கொண்ட (Focus) ஒரு நீள்வட்டப்பாதையில் (Elliptic orbit) இயங்குகிறது. (Each planet moves in an elliptic orbit, the sun being at one focus of the ellipse)

2. ஒவ்வொரு கோளும் கதிரவனைச் சுற்றிவரும் பாதையில் கதிரவனைவும் அக்கோளைவும் சேர்க்கும் நேர்க்கோடு சமதோள்களில் சமபரப்புக்களைக் கடக்கின்றது; அதாவது அங்வினைக்


கோட்டின் பரப்பு வேகம் (areal velocity) ஒரே சீரானது. (The radius vector joining the sun and a planet traces out equal areas in equal intervals of time; that is, the areal velocity of any planet in its orbit is constant.)

3. கோள்கள், கதிரவனைச் சுற்றிவரும் கால-வட்டங்களின் (Periodic times), இருபடிவனும். அக் கோள்களின் சராசரி தூரம் களின் மூர்ப்படிவனும் ஒரே தேர் விகிதத்தில் உள்ளன. (The squares of the periodic times of the planets are proportional to the cubes of their mean distances from the sun.)

கோள்களில் ஒன்றான மண்ணுலகத்தைப் பொறுத்தமட்டில் முதலிரண்டு விதிகளையும் நாம் சோதனை செய்து நிறுவக்கூடும்; பின்னர் 12.2.4 இல் சோதனை முறை காண்க.


12.2: 'மண்ணுலகம்' என்ற பகுதியில் (2-5இல்) மண்ணுலகம் கதிரவனைச் சுற்றிவரும் உண்மையான இயக்கத்தின் விளைவாக, கதிரவன் மண்ணுலகை ஒரு குவியத்திற்கொண்டு, ஒரு நீள்வட்டப்பாதையில் மண்ணுலகைச் சுற்றி வருவது போன்ற ஒரு தோற்றக்கோட்சி நமது அனுபவமையும் என விளக்கப்பட்டது.

உண்மையான மண்ணுலக இயக்கப்பாதையும் கதிரவன் தோற்ற இயக்கப்பாதையும் முறையே படம் 12.2 (i), (ii) இரண்டிலும் காட்டப்பட்டிருக்கின்றன. ஆர்பட்டங்களில் E மண்ணுலகையும் S கதிரவனையும் குறிக்கிறது. உண்மையான இயக்கப்பாதையில் S குவிமையம்; தோற்றப்பாதையில் E குவிமையம்.



படம் 12.2 (i)

மண்ணுலகப் பாதை



படம் 12.2 (ii)

கதிரவன் தோற்றப்பாதை

மண்ணுலகம் கதிரவனைச் சுற்றிவரும் பாதையில் [12.2 (i)] ஒரு நிலையில், அதாவது P' என்ற நிலையில், அது கதிரவனுக்கு மிக அருகிலும், மற்றோர் நிலை A' இல் அதிக தூரத்திலும் உள்ளது. இங்

கெப்லர் விதிகள்

விரு திண்களையும் மூலையே (கதிரவனிலிருந்து) மண்ணுலகின் அண்மைநிலை (Perihelion) என்றும், மண்ணுலகின் சேய்மை நிலை (Aphelion) என்றும் குறிப்பிடுகிறோம்.

மடம் (i)க்கு இணையானது மடம் (ii). எனவே P', A' என்ற அண்மை, சேய்மை நிலைகளுக்கு இணையாக P, A என்ற இரு இடம் உள் தோற்றப் பாதையில் இருக்கின்றன. இங்கு திணை A ஐ (மண்ணுலகிலிருந்து) கதிரவன் அண்மை நிலை (Perigee) என்றும் அதிக தூரத்தில் உள்ள திணை A ஐ கதிரவன் சேய்மை நிலை (Apogee) என்றும் குறிப்பிடுகின்றோம். இப்புள்ளிகள் P', A' இரண்டும் P, A இரண்டும் அப்பாதைகளின் கவிப்பங்கள் (apses or apsidal) என்று கூறப்படும். தோரோடு $P'A'$ உம் PA உம் அப்பாதைகளின் கவிப்பக்கோடு (Apsidal line) என்றும், திணை $P'A'$ உம் PA உம் கவிப்ப தூரம் எனவும் கூறப்படும்.

12.2.1 : கதிரவன் கோண அளவீட்டம்

மூன்றாம் (4. 2.1இல்) கதிரவனின் கோண அளவீட்டம் x என்னவென வரையறுத்தோம். அதன்படிவாக

$$x = \frac{r}{r_0} \text{ எனப்பெற்றேனும்.}$$

r என்பது கதிரவனின் ஆரம் (மாதிரி); r_0 என்பது காட்சியான விடமிருந்து கதிரவன் மையத்தின் மாறுதூரம். இதனால் கதிரவனின் கோண அளவீட்டம் x உம் கதிரவன்தூரம் r உம் எதிர் விதித்ததில் உள்ளன என்பது புலனாகிறது. கதிரவனின் x மதிப்பைத் தினத்தோறும் நண்பகலில் டாஸன்ட் ஹீஸியாமிட்டர் உதவி கொண்டு பதிவுசெய்துவந்தால் அதன் மதிப்பு ஜனவரி 8ஆம் தேதி மிக அதிகமாகவும், ஜூலை 8ஆம் தேதி மிகக்குறைவாகவும் இருக்கும். இதிலிருந்து கதிரவன் ஜனவரி 8ஆம் தேதி மண்ணுலகிற்கு மிக அண்மை நிலையிலும், ஜூலை 8ஆம் தேதி மிகச் சேய்மை நிலையிலும் உள்ளது என்பது விளங்குகிறது.

12.2.2: கதிரவன் அண்மைநிலையின் கெட்டாங்கு (Longitude of Perigee)

கதிரவன் அண்மைநிலையில் உள்ளபோது அதனுடைய வானகெட்டாங்கு நமக்கு வானியலில் தெரியவேண்டியதொரு பதிவுத் தொகையாகும். இதைப் பின்வருமாறு கணக்கிட்டு அறியலாம்.

புரம்பர் கடைசியில், ஏதேனும் ஒருநாள் நண்பகலில் கதிரவனின் கோண அளவீட்டம் பதிவு செய்ய. அப்போது

எனவே அண்மைநிலை நெட்டாங்கு, $\frac{\phi_1 + \phi_2}{2}$ க்குச் சமமாகிறது.

எனவே ϕ_1, ϕ_2 கணக்கிடமுடியுமாயின், K ஐக் கணிக்கலாம்.

குறிப்பு: ϕ_1, ϕ_2 கணக்கிடும் முறை

அய்விரு நாட்களில், கதிரவன் உச்சி கடக்கும்கால், உச்சி தூரங்கள் Z_1, Z_2 எனக் குறி கொண்டு அளக்கலாம். காட்சி விடத்தின் அகலங்கு ϕ ஆனால், $\phi = Z + \delta$ என்ற வாய்ப்பு கொண்டு, கதிரவன் நடுவரை விலக்கங்கள் δ_1, δ_2 கணிக்கலாம். 2585-11 (v) (ii) இல் கண்டபடி, δ_1, δ_2 க் குரிய கதிரவன் வான நெட்டாங்குகள் ϕ_1, ϕ_2 இரண்டும் முறையே

$$\sin^{-1} \left(\frac{\sin \delta_1}{\sin \phi} \right); \sin^{-1} \left(\frac{\sin \delta_2}{\sin \phi} \right) \text{ ஆகும்.}$$

$$\therefore K = \frac{1}{2} \left[\sin^{-1} \left(\frac{\sin \delta_1}{\sin \phi} \right) + \sin^{-1} \left(\frac{\sin \delta_2}{\sin \phi} \right) \right]$$

எனவே இவ்வாறு கதிரவன் அண்மைநிலை கடப்பதற்கு முன்பும் பின்னும் சமமான கோண ஆரவரிட்ட-முள்ள இரு நாட்களாகக் கொண்டு, அண்மைநிலை வான நெட்டாங்கு கணக்கிடலாம். அண்மைநிலை வான நெட்டாங்கு ஏறக்குறைய 258° எனக் கொள்ளலாம்.

12.2-3. மன்னுலகு, கதிரவனைச் சுற்றிலும் பாதையின் குவிமையப் பிறழ்வு காணல்


மன்னுலகு கதிரவனைச் சுற்றிலும் பாதை, கதிரவனின் நோற்றப் பாதைக்குச் சமமாதலின், இரு நீள்வட்டங்களின் குவிமையப் பிறழ்வுகளும் சமமாயிருக்கும். கதிரவன் அண்மை நிலையிலும் (P) சேங்கை நிலையிலும் (A) உள்வழிபோது கதிரவனது கோண ஆரவரிட்டங்கள் முறையே s_1, s_2 எனக் கொள்வோம். இய்விரு நிலைகளிலும் மன்னுலகிற்குத் து கதிரவனின் தூரம் d_1, d_2 எனக் கொள்வோம். அப்போது,

$$s_1 \propto \frac{1}{d_1}, \quad s_2 \propto \frac{1}{d_2}$$

$$\therefore \frac{s_1}{s_2} = \frac{d_2}{d_1}$$

நீள்வட்டத்தின் குவிமையப் பிறழ்வு e எனவும், மையம் c எனவும் கொள்வோம் (படம் 12-3-3 காண்க).

$$\begin{aligned} \text{அப்போது } d_1 &= EP \\ &= CP - CE \\ &= a - ae = a(1 - e) \end{aligned}$$



மடம் 19-2-8

$$\begin{aligned} d_2 &= EA \\ &= EC + CA \\ &= a + a \\ &= a(1 + e) \end{aligned}$$

$$\therefore \frac{s_1}{s_2} = \frac{1+e}{1-e}$$

$$e = \frac{s_1 - s_2}{s_1 + s_2} \text{ எனப் பெறலாம்,}$$

அளவுப்பதிவுப்படி.

$$s_1 = 82^\circ 36'$$

$$s_2 = 81^\circ 32' \text{ எனக் கொண்டால்}$$

$$e = \frac{82^\circ 36' - 81^\circ 32'}{82^\circ 36' + 81^\circ 32'}$$

$$= \frac{1}{80} \text{ (தோராயமாக) எனப் பெறப்படும்.}$$

2.2.4. பன்னாடுகளும் ஒரு கோளாதலின் அகநடுப் பொருத்தமட்டில் கெப்ளரின் முதல் இரண்டு விதிகள் சரியாவெனக் கோதிக்கும் முறை:

φ அகலங்கு பெற்ற ஓரிடத்தில் தினத்தோறும் கதிரவன் கோள அகலமிட்டம் x எனவும், உச்சி கடக்கும்போது (நன் பகலில்) உச்சி தூரம் z எனவும் பதிவு செய்யப்படுவதாகக் கொள்வோம். அப்போது $\phi = x + z$ என்ற வாய்பாட்டைப் பயன்படுத்தி ஒவ்வொரு தாளிலும் நடுப்பகலில் ϕ இன் மதிப்பைக் கணக்கிடலாம். மேலும் $\sin z = \sin \phi - \sin x$ என்ற தொடர்பைப் பயன்படுத்தி, கதிரவனின் நெட்டாங்கு z ஐயும் கணக்கிட்டு அக்ஷரவுரைப்பீஸ் மீள் வருமானுப் பட்டியலில் குறிக்க.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
பாதி	கதிர்வழி கொள்கை அல்ல விட்டம் ϕ	பகுப்பாய்வு கதிர்வழி பகுப்பாய்வு விட்டம் $\phi = \phi - z$	(3) கதிர்வழி கதிர்வழி பகுப்பாய்வு $\phi = \sin^{-1} \left(\frac{\sin \phi}{\sin \phi} \right)$	பகுப்பாய்வு பகுப்பாய்வு பகுப்பாய்வு $\phi_1 - \phi_2 = \Delta \phi$	$\frac{\Delta \phi}{\phi}$	$\phi = \phi - K$	$\frac{1 + r \cos \phi}{\phi}$

ஐரவரி 3ம் தேதி அளவில், s இன் அளவு s_1 மீப்பெரு மதிப்பையும், ஐரவரி 3ம் தேதி அளவில் s இன் அளவு s_2 மீச்சிறு மதிப்பையும் ஏற்படது காண்க. s ன் மீப்பெரு, மீச்சிறு அளவுகளைக் கொண்டு முன் 12-2-8 இல் கண்டபடி $e = \frac{s_1 - s_2}{s_1 + s_2}$ என்ற e இன் மதிப்பைக் கணிக்க. s ன் அளவு மீப்பெரு மதிப்புப் பெறும்போது, கதிரவன் அண்மையிலிருக்குமாதலின், அன்று அண்மையிலே நெட்டாக்கு K என்னவென திரல் (4) இலிருந்து அறிவலாம். (5), (6), (7), (8) திரல்களில் குறிப்பிட்டபடி உரிய மதிப்புகளைக் கணித்துக் குறிக்க. திரல் (8)இல் உகன் மதிப்புகளை ஏறத்தாழ ஒரு மாநிலமாக இருப்பதைக் காணலாம். அதன் காரணமாக, e என்ற குணியைப் பிறழ்வு பெற்ற ஒரு நீள் வட்டத்தில் கதிரவன் மண்ணுலகை ஒரு குணியைமமாகக் கொண்டு சுற்றுவது (தோற்றம்) நிறுவப்படும்.

எப்படியெனில், கதிரவன் கோண அரைவிட்டமும் கதிரவனுக்கும் மண்ணுலகிற்கும் இடைப்பட்ட தூரமும் எதிர்விதித்தில்

$$\text{இருப்பதால் } \left(s \propto \frac{1}{d} \right) \\ \frac{1 + e \cos \theta}{s} \propto (1 + e \cos \theta) d \text{ என எழுதலாம்.}$$

ஆனால்,

$$\frac{1 + e \cos \theta}{s} \text{ ஒரு மாநிலமாகின், } (1 + e \cos \theta) d =$$

மற்றோர் மாநிலமாகும்.

$$\therefore 1 + e \cos \theta = \frac{1}{d} \text{ என எழுதலாம் (1-மாநில)}$$

$e < 1$ ஆகையால் இது ஒரு நீள் வட்டம் என நிறுவப்படுகிறது. d க்குப் பதிலாக, போலர் ஆயத்தொலை முறைமில் பயன்படுத்தப்படும் r க்கு செய்தால் $\frac{1}{r} = 1 + e \cos \theta$ என்ற நீள்வட்டத்தின் சமன்பாடு கிடைக்கும்.

$$\left[e = \frac{s_1 - s_2}{s_1 + s_2} < 1 \text{ ஏனெனில் } s_1 > s_2 \right]$$

அதாவது கதிரவனின் தோற்றப் பாதை மண்ணுலகைச் சுற்றிவரும் ஒரு நீள்வட்டம், எனவும் மண்ணுலகை ஒரு குணியத்தில் அமைந்து உகன்று எனவும் தெரிகிறது. எனவே மண்ணுலகின் இயக்கு வழி ஒரு நீள்வட்டம் எனவும் கதிரவன் ஒரு குணியத்தில் அமைந்து சுன்று எனவும் பெறப்படும். எனவே செப்ளரின் நீள் வட்ட

இயக்க மூலம் விதி சரிவென நிறுவப்படுகிறது. மேலும் $\frac{\Delta \phi}{s^2}$

என்ற நிரவியுள்ள மதிப்புக்களும் எதக்குறைய ஒரு மாநிலவாகியும் பதைக் காணலாம்.

அதாவது $\Delta \phi \propto s^2$

$$\therefore \Delta \phi \propto \frac{1}{d^2} \left(\because s \propto \frac{1}{d} \right)$$

$\therefore \frac{1}{d^2} \Delta \phi \propto$, அதாவது $\frac{1}{r^2} \Delta \phi \propto$ ஒரு மாநிலி என நிறுவப் படுகிறது. எனவே மண்ணுலகம் சுதிரவனைச் சுற்றி வரும்போது சுதிரவனையும் மண்ணுலகையும் சேர்க்கும் நேர்க்கோடு, சம நேரத்தில் சம பரப்பைக் கடக்கிறது எனப் பெறப்படுகிறது எனவே கெப்ளர் இரண்டாம் விதியின் பொருத்தம் மண்ணுலகையொட்டிய

மட்டில் சரிவென நிறுவப்படுகிறது. $\left(\text{பரப்பு வேகம்} = \frac{1}{2} r^2 \frac{d\theta}{dt} \right)$

12.3. கெப்ளரின் மூன்றாவது விதியின் விளக்கம்

இரு கோள்களின் ஆளப் பேரக்கங்கள் σ_1, σ_2 எனவும் அக் கோள்கள் சுதிரவனை ஒரு மூறை சுற்றி வர எடுத்துக்கொள்ளும் நேரம் T_1, T_2 எனவும் கொள்வோம்.

மூன்றாவது விதி :

$$\frac{T_1^2}{T_2^2} = \frac{\sigma_1^3}{\sigma_2^3}$$

மண்ணுலகம் தவிர, மற்றோர் கோளின் காலகட்டம் நாம் அறிந்தால், இவ்விதியின் உண்மையைச் சரிபார்க்க முடியும்.

12.3.1 : இயக்கு பாதையில் முடுக்கப் பிரிவுகள் : (Component-accelerations in the orbital motion)

ஒரு தளத்தில் $r = f(\theta)$ என்ற போலர் சமன்பாடு பெற்ற பாதையின்மேல் ஒரு பொருள் இயக்குமானால், அதற்குள்ள முடுக்கம் (acceleration) ஒன்றுக்கொன்று செக்குத்தான இரு திசைகளில் பிரிக்கப்படலாம். ஆதிப்புள்ளி O (Pole) எனவும், ஒரு குறிப்பிட்ட சமயம் 't' இல், அப்பொருள் தனது பாதையில் P (r, θ) என்ற புள்ளியில் இருக்கிறதெனவும் கொள்வது அப்போது அதன் முடுக்கங்கள், OP என்ற திசையில் $\frac{d^2 r}{dt^2} - r \left(\frac{d\theta}{dt} \right)^2$ எனவும்,

OPக்குச் செக்குத்தான திசையில் $\frac{1}{r} \frac{d}{dt} \left(r^2 \frac{d\theta}{dt} \right)$ எனவும், மதிப்

புறப்பண்பென்று இயக்கவியலில் (Dynamics) நிறுவப் பட்டிருக்கிறது. OP என்ற திசையிலுள்ள முடுக்கம் ஆரை முடுக்கம் (Radial acceleration) எனவும், OPக்குச் செங்குத்தான திசையில் உள்ள முடுக்கம் குறுக்கு முடுக்கம் (Transverse acceleration) எனவும் கூறப்படுகிறது.

12.3.2. வெள்ளரின் விதிகளிலிருந்து, கீழ்க்கண்ட கண்ட முடிவுகள் :

1. முதல் விதி வழியாக :

தன் பாதையில் இயங்கும் கோள, அதிர்வன் தன் பக்கம் தன்னை நோக்கி வரக்கிறது. ஆய்விதம் ஈர்க்கும் விசை அதிர்வனுக்கும் கோளாக்கும் உள்ள தூரத்தின் இருபடிக்கு எதிர் விகிதத்தில் உள்ளது.

2. இரண்டாம் விதி வழியாக :

தன் பாதையில் இயங்கும் கோள ஈர்க்கும் விசை ஒன்றே ஒன்று ; அது, அதிர்வின் நோக்கி, அதிர்விலையும் அங்கோளையும் இணைக்கும் நேர்கோட்டுத் திசையில் உள்ளது.

3. மூன்றாம் விதி வழியாக :

அதிர்வன் தன்னை நோக்கி அங்கோளையும் ஈர்க்கும் விசையின் விகிதம் ஒரு மாநிலி (தூர இருபடி எதிர் விகிதம்).

முதல் விதியின்படி ஒரு கோளின் இயங்குபாதை அதிர்வின் ஒரு குவியத்தில் கொண்ட ஒரு நீள் வட்டம் எனக் கண்டோம். அத்தீள் வட்டத்தின் சமன்பாடு

$$\frac{l}{r} = 1 + e \cos \theta \text{ எனக்கொள்வோம்.}$$

இரண்டாவது விதியின்படி ஒரு கோள் அதிர்வின்ச் சுற்றி வரும்போது அதிர்விலையும் கோளையும் இணைக்கும் நேர்கோடு, சம நேரங்களில் சம பரப்பிக்களைக் கடக்கிறது. பரப்பு வேகம்

$\frac{1}{2} r^2 \frac{d\theta}{dt}$ என்ற மதிப்புடையது. எனவே $\frac{1}{2} r^2 \frac{d\theta}{dt}$ ஒரு மாநிலி—

அதாவது, $r^2 \frac{d\theta}{dt}$ ஒரு மாநிலி; அதனை h எனக்கொள்வோம். எனவே

குறுக்கு முடுக்கம்,

$$= \frac{1}{r} \cdot \frac{d}{dt} \left(r^2 \frac{d\theta}{dt} \right)$$

$$= \frac{1}{r} \cdot \frac{d}{dt} (h)$$

$$= 0 \text{ எனப் பெறப்படுகிறது.}$$

(1)

ஆகவே ஆரைக்குச் (radius vector) செங்குத்தான திசையில் கோளின் மீது ஏதும் விசை இல்லை என்ற முடிவு பெறப்படுகிறது.

ஆரைத் திசையில் உள்ள முடுக்கம் $= \frac{d^2 r}{dt^2} = r \left(\frac{d\theta}{dt} \right)^2$ மட்டுமே

அக்கோண இயங்கச் செங்கிறது. இப்போது $r = \frac{l}{1 + e \cos \theta}$

என்ற இயங்கு யாதையில் செல்லும் கோளுக்கு ஆரை முடுக்கத்தைக் கணிப்போம்.

$$\begin{aligned} \therefore \frac{dr}{dt} &= \frac{el \sin \theta}{(1 + e \cos \theta)^2} \frac{d\theta}{dt} \\ &= \frac{e \sin \theta}{l} r^2 \frac{d\theta}{dt} \left[\because (1 + e \cos \theta)^2 = \frac{r^2}{l^2} \right] \\ &= \frac{eh}{l} \sin \theta \left(\because r^2 \frac{d\theta}{dt} = h \right) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \therefore \frac{d^2 r}{dt^2} &= \frac{eh}{l} \cos \theta \frac{d\theta}{dt} \\ &= \frac{eh^2}{l^2} \cos \theta \left[\because \frac{d\theta}{dt} = \frac{h}{r^2} \right] \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \therefore \text{ஆரைமுடுக்கம்} &= \frac{d^2 r}{dt^2} = r \left(\frac{d\theta}{dt} \right)^2 \\ &= \frac{e^2 h^2}{l^2} \cos \theta - \frac{h^2}{r^3} \\ &= \frac{h^2}{l^2} \left[e \cos \theta - \frac{l}{r} \right] \\ &= - \frac{h^2}{l^2} \\ &= - \frac{\mu}{r^2} \end{aligned} \quad \dots (2)$$

இங்கு $\frac{h^2}{l} = \mu$ ஒரு மாறிலி; ஏனெனில் ஒரு குறிப்பிட்ட

கோளின் பெருத்தமட்டில், μ உம் l உம் மாறிலிகள். ஆரை முடுக்கம் ஒரு குறைமதிப்பைப் பெறுவதால், அதன் திசை, கதிரவனிலிருந்து கோளை நோக்கி அல்ல; ஆனால் கோளிலிருந்து கதிரவனை நோக்கிய திசையில் உள்ளதெனத் தெரிகிறது. அதாவது இயங்கும் கோள், நிலைத்த கதிரவனை நோக்கி, அக் கோட்டின் திசையில் ஈர்க்கப்படுகிறது.

மேலும் அம்முடுக்கம் $\propto \frac{1}{r}$, ஆக இருப்பதும் தெரிகிறது. எனவே, திபூட்டன் முதல் முடிவு பெறப்படுகிறது.

திபூட்டனின் இரண்டாவது முடிவு 12-8-2 (1)ன் படி $\frac{1}{r} \frac{d}{dt} \left(r^2 \frac{d\theta}{dt} \right) = 0$ என்ற முடிவிலிருந்து பெறப்படுகிறது.

அதாவது அக் கோளின் இயக்கும் முடுக்கம் (விசை) ஒன்றே ஒன்று; அம்முடுக்கம் ஆரைக் கோட்டிலுமட்டுமே கோளிலிருந்து கடிரவரின் நோக்கிய திசையில் இருக்கிறது.

12-3-2-1 : செபன்ஸ் மூன்றாம் விதிவழியாக திபூட்டனின் மூன்றாம் முடிவு :

இரு கோள்கள் மூன்றையே $a_1, b_1; a_2, b_2$ என்ற ஆரைப் பேரகம், சிற்றக்கங்களையும் (semi-major and semi-minor axes) l_1, l_2 என்ற ஆரைச் செங்கவலைகளையும் (semi-latera recta) T_1, T_2 என்ற காலவட்டங்களையும் பெற்றுள்ளன எனக் கொள்வோம். செபன்ஸ் இரண்டாம் விதிப்படி

$$T_1 = \frac{\pi a_1 b_1}{h_1/2} \left[\because \frac{h_1}{2} = \text{பரப்பு வேகம்} \right] \\ = \frac{2\pi a_1 b_1}{h_1}$$

$$\text{அப்படியே } T_2 = \frac{2\pi a_2 b_2}{h_2}$$

$$\therefore T_1^2 = \frac{4\pi^2 a_1^2 b_1^2}{h_1^2} = \frac{4\pi^2 a_1^2 l_1 a_1}{h_1^2} \left[\because l_1 = \frac{b_1^2}{a_1} \right] \\ = \frac{4\pi a_1^3}{\mu_1} \quad (A) \left[\because h_1^2 = l_1 \mu_1 \right]$$

$$\text{அப்படியே } T_2^2 = \frac{4\pi a_2^3}{\mu_2} \quad (B)$$

செபன்ஸ் மூன்றாம் விதிப்படி,

$$\frac{a_1^3}{a_2^3} = \frac{T_1^2}{T_2^2} = \frac{a_1^3 \mu_1}{\mu_2 a_2^3} \quad \left[(A), (B) \text{ ன் படியாக} \right]$$

$$\therefore \mu_1 = \mu_2 = \text{ஒரு மாநிலி}$$

$\therefore$ ஆரைமுடுக்கத்தில் காம் பெற்ற μ [12-8-2(2)] எக்ஸைட் கோள்களுக்கும் சமவதிப்புடையது. இதுவே திபூட்டனின் மூன்றாவது முடிவு.

12-3-2-2. a, b முறையே ஒருகோளின் நீள்வட்ட² அரைப்பேரீச்சு, சிற்றச்சு எனவும் ஆக்ஸென், கதிரவன் ஒருமுறை சுற்றிவர எடுத்துக்கொள்ளும் நேரம் T எனவும் கொள்வோம்.

h என்பது பரப்பு வேகத்தின் இறுமடக்கு என்பது நாம் முன் கொண்டதும்; அதாவது

$$h = \frac{2 \pi a b}{T}$$

l என்பது நீள்வட்டத்தின் அரைச் செவ்வகம்.

$$= \frac{b^2}{a}; \text{ எனவே } \mu = \frac{h^2}{l}$$

$$= \frac{4 \pi^2 a^3 b^3}{T^2} \times \frac{a}{b^3}$$

$$= \frac{4 \pi^2 a^3}{T^2}$$

கெப்ளரின் மூன்றாவது விதியின்படி $\frac{a^3}{T^2}$ ஒரு மாறிலியானதின் $\mu = 4 \pi^2 K$. இது எல்லாக் கோள்களுக்கும் ஒரே மதிப்புடைய தென்ற நிழுட்டன் மூலகம் முன் 12-3-2-1 இல் பார்த்தோம். எனவே K பொருண்மையுள்ள ஒரு கோளாக் கதிரவன் பக்கம் வரக்கும் விசை $\frac{m\mu}{r^3}$ எனப் பெறப்படும்.

12-3-2-3: கோள்கள் கதிரவனை வட்டப் பாதைகளில் சீரான வேகத்தில் சுற்றுகின்றன என்ற அடிப்படையில் நிழுட்டனின் பொது சுரப்பு விதியிலிருந்து நாம் கெப்ளரின் மூன்றாவது விதியைப் பெறலாம்.

நிழுட்டன் பொது சுரப்புவிதி: எந்த ஒரு பொருளும் மற்றொரு பொருளை ஈர்க்கும் விசையானது அவற்றின் பொருண்மையின் (masses) பெருக்குத் தொகைக்கு G எர் விசைத்திறமும் அவ்விரு பொருள்களுக்கும் இடைப்பட்ட தூரத்தின் இருபடிக்கு எதிர் விசைத்திறமும் இருக்கிறது.

m_1, m_2 என்பவை இரு பொருள்களின் பொருண்மை; r இரு பொருள்களுக்கு இடைப்பட்ட தூரம்; F சுரப்பு விசை; G சுரப்பு மாதிவி எனக்கொண்டால் நிழுட்டன் பொது விதிப்படி

$$F = G \frac{m_1 m_2}{r^2}$$

M கதிரவனின் பொருண்மை, m கோளின் பொருண்மை, r கதிரவனுக்கும் கோளிக்கும் இடைப்பட்டதூரம், எனக்

கொண்டால், இது விண்மெய்களுக்கு இடைப்பட்ட விசையானது $G \frac{Mm}{r^2}$, எனவே கதிரவனின் சுற்று விசையின் காரணமாக கோளைக் கதிரவன் தன் பக்கம் வலிக்கும் முடுக்கம் $\frac{GM}{r^2}$.

(ஈ விசை = பொருண்மை $\times$ முடுக்கம்)

சுற்றும் பாதை r ஆரம் கொண்ட ஒரு வட்டப் பாதையெனவும், சுற்றும் பாதையில் கோளின் வேகம் V எனவும் கொண்டால், அப்போது கோளைத்தன் பக்கம் கதிரவன் வலிக்கும் விசை $F = \frac{m V^2}{r}$ (இயக்க இயல் முடிவு); எனவே கதிரவின் நோக்கிக்

கோளின் முடுக்கம் $\frac{V^2}{r}$ ஆகும். (வட்டப் பாதையில்)

$$\therefore \frac{V^2}{r} = \frac{GM}{r^2}$$

$$V^2 = \frac{GM}{r}$$

கோள் கதிரவின் T நாட்களில் ஒருமுறை வட்டப் பாதையில் சுற்றுகிறது

$$V = \frac{2\pi r}{T}$$

$$\text{எனவே, } \frac{4\pi^2 r^3}{T^2} = V^2 = \frac{GM}{r}$$

$$\therefore T^2 = \frac{4\pi^2 r^3}{GM}$$

இங்கு $T^2 \propto r^3$ என கெப்ளரின் மூன்றாவது விதி பெறப்படுகிறது. (ஆனால் அடிப்படையிலும், வட்டப் பாதை என கவனத்தில் கொள்ள).

12-3-2-4 : கெப்ளரின் மூன்றாவது விதியின் சரியான அமைப்பு :

M , கதிரவனின் பொருண்மை, m கோளின் பொருண்மை, r கதிரவனுக்கும் கோளிக்கும் இடைப்பட்ட தூரம் எனக் கொண்டால் இரண்டிற்கும் இடையில் உள்ள சுற்று விசை $G \frac{Mm}{r^2}$ ஆகும். எனவே கதிரவனின் சுற்றியுருவ்கோள், கதிரவின்

நோக்கிய திசையில் சுக்கப்படுகும் முடுக்கம் $\frac{GM}{r^2}$. அகலாதே கோளின் சுற்றியுருவ், கதிரவன், கோளை நோக்கிய திசையில்

சுரக்கப்படும் முடுக்கம் $\frac{Gm}{r^2}$. இவ்விரு விசைகளும் ஒரே நேர்க்கோட்டில் நேரெதிர் திசைகளில் இருக்கின்றன. எனவே கோளின் சரிவு முடுக்கம் (Relative Acceleration) $G \frac{(M+m)}{r^2}$ ஆகும்.

ஆனால் கோள் பெறும் விசையுள் முடுக்கம் (Resultant Acceleration) $\frac{\mu}{r^2}$. இங்கு $\mu = \frac{h^2}{l}$. இவ்விசை சுதிரவரின் நேர்க்கி இயங்கிக் கொண்டு இருக்கின்றது.

எனவே,

$$\frac{G(M+m)}{r^2} = \frac{\mu}{r^2}$$

$$\therefore G(M+m) = \mu = \frac{h^2}{l}$$

$$\therefore G(M+m)l = h^2$$

a , b என்பவை நீள்வட்டத்தின் பேரச்சு, சிற்றச்சில் பாத எனவும், T-சுதிரவரின் ஒரு முறை சுற்றிவர எடுத்துக் கொள்ளும் நேரம் எனவும் கொள்வோம்.

$$\text{அப்போது } l = \frac{b^2}{a}; h = \frac{2\pi ab}{T}$$

$$G(M+m) \frac{b^2}{a} = \frac{4\pi^2 a^3 b^2}{T^2}$$

$$\text{அதாவது } G(M+m) T^2 = 4\pi^2 a^3.$$

m_1 - பொருண்மைவுள்ள மத்தொரு கோளின் எடுத்துக்கொண்டால் இத்தொடர்பு $G(M+m_1) T_1^2 = 4\pi a_1^3$ எனப் பெறப்படும்.

$$\therefore \frac{M+m}{M+m_1} \cdot \frac{T^2}{T_1^2} = \frac{a^3}{a_1^3}.$$

இதுவே கெப்ளரின் மூன்றாவது விதியின் சரியான அமைப்பு ஆகும். ஆனால் சுதிரவரின் பொருண்மையோடு கோள்களின் பொருண்மையை ஒப்பிட்டுப் பார்க்கும்போது கோள் பொருண்மைகள் மிகமிகச் சித்யமையானதாகின்ற $(M+m)$ ம், $(M+m_1)$ ம் ஏறக்குறைய சமமாகும்.

$$\text{அப்போது } \frac{M+m}{M+m_1} \sim 1; \text{ எனவே } \frac{T^2}{T_1^2} = \frac{a^3}{a_1^3} \text{ என்ற}$$

கெப்ளரின் மூன்றாவது விதி பொருத்துகிறது.

12.3.2.5 ஒரு கோளின் பொருண்மை காணும் முறை :

M-கதிர்வளின் பொருண்மை, m = தரம் பொருண்மை கான வேண்டிய கோளின் பொருண்மை; m_1 என்பது கோள் m -ன் உப கோளின் பொருண்மை. a, a_1 முறையே கோளிற்கும் கதிர் வளாக்கும், கோளிற்கும் உபகோளிற்கும் உள்ள தூரங்கள் எனக் கொள். T, T_1 என்பன முறையே, கோள் கதிர்வளிளவும், உப கோள் தன் தாங்க்கோளிலும் ஒருமுறை சுற்றிவர எடுத்துக் கொள்ளும் நேரங்கள் எனக்கொள்வோம். அப்போது,

$$\frac{M+m}{m+m_1} \cdot \frac{T^2}{T_1^2} = \frac{a^3}{a_1^3}$$


M-உடன் ஒப்பிடும்போது m, m_1 இரண்டும் சிறியவைகளாதலின்

$$\frac{M}{m} \cdot \frac{T^2}{T_1^2} = \frac{a^3}{a_1^3} \text{ என்ற தோராயத் தொடர்புகொண்டு}$$

$$m = \frac{T^2 a_1^3}{T_1^2 a^3} M \text{ எனக் கணிக்கலாம்.}$$

குறிப்பு: உபகோள் இல்லாத கோளுக்கு இம்முறை பயன் படாதென ஆகி. (பூதனும், வெள்ளியும் உபகோள்கள் பெற்றவைகளாக).

12.4 : கொடுக்கப்பட்ட ஒரு சமவத்திக் மண்ணுலகின் நிலைபை அதன் பாதையில் நிர்ணயித்தல் :



படம் 12.4

படம் 12.4இல் $P'TA'$ கதிர்வளி மண்ணுலகம் சுற்றிவரும் தன் வட்டப் பாதையில் ஒரு பாதி; $P'A'$ ஆந்தின் வட்டத்தின்

பேரகசு; $P'T_1A'$ என்பது பேரகசு விட்டமாகக் கொண்ட அரை வட்டம். (நீள் வட்டத்தின் துணைவட்டம்—Auxiliary Circle); C நீள் வட்ட மையம்; S —கதிரவன் குவிவரத்தில் இருக்கும் நிலை; E என்ற புள்ளி மண்ணுலகின் நீள்வட்டப் பாதையில் அதன் நிலையை ஒரு குறிப்பிட்ட கருணத்தில் குறிக்கட்டும்; P' அண்மைய புள்ளி; A' சென்மைய புள்ளி; மண்ணுலகம் P' இனிருந்து புறப்படுவதாகக் கொள்க; புறப்பட்டு ' r ' தேரம் கழித்து E இல் இருக்கட்டும்; $SE = r$ எனக் கொள்வோம்; EN -பேரகசுக்குச் செங்குத்தான கோடு; அதன் நீட்டல் துணை வட்டத்தை E_1 இல் வெட்டட்டும்.

இங்கு $\angle SP' = \tau$ என்பது இயல்பு நெறிப் பிறழ்ச்சி (True-Anomaly) எனவும், $\angle E_1CP' = \mu$ என்பது மைய அகற்சி நெறிப் பிறழ்ச்சி (Eccentric Anomaly) எனவும் கூறப்படும் (இவற்றினை, இனி மூன்றாமே இயல்புப் பிறழ்ச்சியெனவும், மையப் பிறழ்ச்சி யெனவும் கூறுவோம்).

SE ன் பரப்பு வேகமான $\frac{1}{2}r^2 \frac{dv}{dt}$ ஒரு மாநிலி. (சாதாரணமாக நாம் $\frac{d\theta}{dt}$ எனக் கொள்ளும் கோண வேகம் இங்கு $\frac{dv}{dt}$ எனக் கொள்ளப்பட்டிருக்கிறது; v ஒரு கோணம்.)

r ஒரு மாநிலியாதலின் $\frac{dr}{dt}$ ம் ஒரு மாநிலியும்; அதாவது இயல்புப் பிறழ்ச்சி r ரான வேகத்தில் மாறுவதில்லை.

இப்போது P' இனிருந்து E புறப்படுமபோது, மற்னொரு கற்பனைப் பொருள் E' மண்ணுலகத்தோடே P' இனிருந்து புறப்பட்டு, r ரான கோண வேகத்தில் [r ரான கோணவேகம் $\frac{2\pi}{y}$] மண்ணுலகப் பாதையிலேயே, மண்ணுலகக் கால வட்டத்தில் (y) செல்வதாகக் கற்பனை செய்துகொள்வோம். எனவே E , E' இரண்டும் P' இனிருந்து புறப்பட்டபின்னு இணைத்து செல்லா.

மூலக்கி E முந்திக்கொள்ளும்; E' பின்தொடரும். இரண்டும் A' இல் ஒருங்குமையும். பின் E' முந்திக் கொள்ளும். E பின் தொடரும். மறுபடியும் இரண்டும் P' இல் ஒருங்குமையும். (ஊரணம் எளிதில் புறப்படுகிறதாதலின் விவராக விளக்கப் படவில்லை.)

மண்ணுலகம் தன் பாதையில் E இல் இருக்கும் சமயம், கற்பனைப் பொருள் அதே பாதையில் E' இல் இருப்பதாகக் கொள்வோம். E' ன் கோணவேகம் மண்ணுலகின் சராசரி கோணவேகமான $\frac{2\pi}{y}$ க்குச்

சமவெண்க்கொண்டோம். E' ஐ நீள்வட்டப் பாதைக் குவியலான கதிரவன் S ஐடு சேர்த்தால் $E'SP' = m$ என்பது சராசரி பிறழ்ச்சி (Mean Anomaly) எனப்படும்.

12.4.1 : பிறழ்ச்சிகளுகிடைப்பட்ட தொடர்புகள்

நீள்வட்டத்தின் பாதைப் பேரத்த a , பாதைச்சிற்றத்த b , குவியலவர்ப் பிறழ்வு e எனக்கொள்க. இவர்க் முறை ஸ்வ வணிதத்தில், வழக்கிலுள்ளபடி, E ன் ஆயத் தொலைகள் ($a \cos u$, $b \sin u$); அதாவது $CN = a \cos u$; $NE = b \sin u$.

(A) இயல்புப் பிறழ்ச்சி (r) க்கும், ஸ்வயம் பிறழ்ச்சி (v) க்கும், இடைப்பட்ட தொடர்பு:

$$\begin{aligned}\triangle SEN \text{ இல், } r \cos v &= SN \\ &= CN - CS \\ &= a \cos u - ae\end{aligned}\quad \dots(1)$$

$$\begin{aligned}\text{மேலும் } r \sin v &= NE \\ &= b \sin u\end{aligned}\quad \dots(2)$$

(1), (2) ஐவும் இருபடிக்கு உயர்த்திக் கூட்டி,

$$\begin{aligned}r^2 &= a^2 \cos^2 u + a^2 e^2 - 2a^2 e \cos u + b^2 \sin^2 u \\ &= a^2 [\cos^2 u + e^2 - 2e \cos u + (1 - e^2) \sin^2 u] \\ &\quad \quad \quad (\because b^2 = a^2 (1 - e^2)) \\ &= a^2 [1 + e^2 \cos^2 u - 2e \cos u] \\ &= a^2 (1 - e \cos u)^2\end{aligned}$$

$$\therefore r = a(1 - e \cos u)\quad \dots(3)$$

(1), (3) இனிகூத்து

$$\begin{aligned}r(1 + \cos v) &= a(1 - \cos u) + (a \cos u - ae) \\ &= a(1 - r)(1 + \cos v)\end{aligned}\quad \dots(4)$$

மேலும் (1), (3) இனிகூத்து

$$\begin{aligned}r(1 - \cos v) &= a(1 - r \cos v) - (a \cos u - ae) \\ &= a(1 + e)(1 - \cos u)\end{aligned}\quad \dots(5)$$

(4), (5) இனிகூத்து

$$\frac{1 - \cos v}{1 + \cos v} = \frac{(1 + e)(1 - \cos u)}{(1 - e)(1 + \cos u)}$$

$$\text{எனவே } \tan^2 \frac{v}{2} = \frac{1 + e}{1 - e} \tan^2 \frac{u}{2}$$

$$\therefore \tan \frac{v}{2} = \sqrt{\frac{1+e}{1-e}} \tan \frac{u}{2} \quad \dots(6)$$

இது கொண்டு, e இன் சார்பாக r இன் தனி மதிப்பைத் தேர்வாயமாகக் கணிப்போம்.

$e < 1$ ஆதலின் $e = \sin \theta$ எனக் கொள்வோம்.

$$\begin{aligned} \frac{1+e}{1-e} &= \frac{1+\sin \theta}{1-\sin \theta} \\ &= \frac{1 + \frac{2t}{1+t^2}}{1 - \frac{2t}{1+t^2}} \left[\text{இங்கு } t = \tan \frac{\theta}{2} \right] \\ &= \frac{(1+t)^2}{(1-t)^2} \end{aligned}$$

(6) இல் இதனைக் கொண்டு செய்வ,

$$\tan \frac{v}{2} = \frac{1+t}{1-t} \tan \frac{u}{2} \text{ எனப் பெறப்படும்.}$$

10.7, வாய்பாடு (1) ஐப் பயன்படுத்தி,

$$r = u + 2t \sin u + t^2 \sin 2u + \dots(7)$$

$e = \sin \theta$ என நாம் முதலில் கொண்டபடியால்,

$$e = \sin \theta = \frac{2t}{1+t^2} \text{ என எழுதலாம்.}$$

$$\therefore et^2 - 2t + e = 0$$

$$\begin{aligned} \therefore t &= \frac{1 \pm (1 - e^2)^{\frac{1}{2}}}{e} \\ &= \frac{1 \pm (1 - \frac{1}{4} e^2 \dots)}{e} \\ &= \frac{e}{2} \text{ (தேர்வாயமாக); } (t < 1) \end{aligned}$$

$$\therefore (7) \text{ இலிருந்து, } r = u + e \sin u + \frac{e^2}{4} \sin 2u + \dots(8)$$

என்ற தொடர்பு, u , ω இரண்டையும் இணைக்கிறது. இது ஒரு தேர்வாய மதிப்பீடு.

(B) மையப் பிறழ்ச்சி (μ) க்கும், சராசரிப் பிறழ்ச்சி (m) க்கும் இடைப்பட்ட தொடர்பு:

மண்ணுலகம் சுதிரஸின் ஒருமுறை சுற்றிய எடுத்துக் கொள்ளும் காலம் y (ஒரண்ட்) எனக்கொள்வோம். மண்ணுலகின் சராசரிகோண வேகம் $n = \frac{2\pi}{y}$.

ஒரு சுதிரஸைப் பொருள் E' சீரான கோண வேகத்தில் சுற்றி கிறதென எடுத்துக்கொண்டோம் (12-4). மண்ணுலகம் P' இலிருந்து தற்போது உட்கள நிலை E க்கு வர எடுத்துக்கொள்ளும் நேரம் t ஆனால், அதே நேரத்தில் E' சுற்றும் கோணம் $\pi t = \frac{2\pi}{y} t$ ஆகும்.

இதுவே நாம் 12-4 இல் கூறிய m எனப்பட்ட சராசரில் நிறுத்தி.

$$\therefore m = \frac{2\pi t}{y} \quad \dots (8)$$

இந்த m இன் மதிப்பைக் கொண்டு, n -க்கும் மக்கும் உட்கள தொடர்பைக் காண்போம்.

$$\text{மையப் நிறுத்தி } u = P'CE_1$$

$$(8) \text{ இன்படி சராசரில் நிறுத்தி } m = \frac{2\pi t}{y}$$

$$y \text{ நேரத்தில் மண்ணுலகம் பயணப் பரப்பு} = \pi ab, \text{ எனவே}$$

$$t \text{ நேரத்தில் மண்ணுலகம் பயணப் பரப்பு } P'SE = \frac{\pi ab}{y};$$

$$= ab \frac{m}{2} [(8) \text{ ன் படி}].$$

$$\frac{\text{நிலைவாட்டப்பகுதி } P'ES \text{ ன் பரப்பு}}{\text{இணைவாட்டப்பகுதி } P'SE \text{ ன் பரப்பு}} = \frac{b}{a}$$

$$\text{எனவே, } P'SE \text{ இன் பரப்பு} = \frac{b}{a} \times P'CE_1 \text{ ன் பரப்பு.}$$

$$= \frac{b}{a} [\text{பரப்பு } P'CE_1 - \text{முககோணம் } CSE_1]$$

$$= \frac{b}{a} \left[\frac{1}{2} a^2 u - \frac{1}{2} ar, \quad a \sin u \right]$$

$$\therefore \text{பரப்பு } P'SE = \frac{ab}{2} (u - r \sin u)$$

$$\text{எனவே } ab \frac{m}{2} = \frac{ab}{2} (u - r \sin u)$$

$$\therefore m = u - r \sin u \quad \dots (10)$$

இச்சமன்பாடு கெப்ளரின் சமன்பாடு எனப்படும். இத் தொடர்பு கொண்டு n இன் தோராய மதிப்பை m இன் தொடர்பாகக் காண்போம்.

மூன்று $m = n - e \sin u$ என நினைவோம்.

$$\therefore u = m + e \sin u.$$

$$\therefore u = m \text{ (முதல் தோராயம்)}$$

$$\therefore u = m + e \sin m \text{ (இரண்டாம் தோராயம்)}$$

$$\therefore \text{மூன்றாம் தோராயமாக,}$$

$$\begin{aligned} u &= m + e \sin (m + e \sin m) \\ &= m + e [\sin m \cos (e \sin m) + \cos m \sin (e \sin m)] \\ &= m + e [\sin m + \cos m \cdot e \sin m] \\ &= m + e \sin m + \frac{e^2}{2} \sin 2m \end{aligned} \quad \dots (11)$$

இது மூன்றாம் தோராயம்.

(C) இயல்புப் பிறந்தி (r)க்கும், சராசரிப் பிறந்தி (m)க்கும் உள்ள தொடர்பு :

(5) இன்பு,

$$r = a + e \sin u + \frac{e^2}{4} \sin 2u.$$

இங்கு (11) இல் கண்ட 'u' இன் மதிப்பை m ஓடு செய்க.

$$\begin{aligned} \therefore r &= m + e \sin m + \frac{e^2}{2} \sin 2m \\ &\quad + e \sin (m + e \sin m + \frac{e^2}{2} \sin 2m) \\ &\quad + \frac{e^2}{4} \sin 2 (m + e \sin m + \frac{e^2}{2} \sin 2m) \end{aligned}$$

e^3 ஐவும், மற் ற உயர்ந்த e இன்புகளையும் விலக்கினால்,

$$\begin{aligned} r &= m + e \sin m + \frac{e^2}{2} \sin 2m \\ &\quad + e [\sin m \cos (e \sin m) \\ &\quad + \cos m \sin (e \sin m)] + \frac{e^2}{4} \sin 2m \\ &\quad \text{(தோராயமாக)} \\ &= m + e \sin m + \frac{e^2}{2} \sin 2m \end{aligned}$$

$$+ e [\sin m + \cos m \cdot e \sin m] + \frac{e^2}{4} \sin 2m$$

$$= m + e \sin m + \frac{e^2}{2} \sin 2m + e \sin m$$

$$+ \frac{e^2}{2} \sin 2m + \frac{e^2}{4} \sin 2m.$$

$$= m + 2e \sin m + \frac{5}{4} e^2 \sin 2m \quad \dots (12')$$

$$\therefore r - m = 2e \sin m + \frac{5}{4} e^2 \sin 2m \quad (12'')$$

இது இயல்புப் பிறழ்ச்சிக்கும், சராசரிப் பிறழ்ச்சிக்கும் உள்ள வேறுபாடு. இது அமைப்புகை (குறை-Equation of Centre) எனப்படும். இது கொண்டு, 'm' இன் தனி மதிப்பை r இன் சார்பாகக் காண்போம்.

$$r = m + 2e \sin m + \frac{5}{4} e^2 \sin 2m$$

$$\therefore m = r - 2e \sin m - \frac{5}{4} e^2 \sin 2m$$

$m = v$ (முதல் தேராயம்)

$$\therefore m = r - 2e \sin v \text{ (இரண்டாம் தேராயம்)}$$

$\therefore$ மூன்றாம் தேராயமாக

$$m = r - 2e \sin (v - 2e \sin v)$$

$$= \frac{1}{4} e^2 \sin 2v$$

$$\mu = v - 2e [\sin v \cos (2e \sin v) - \cos v \sin (2e \sin v)]$$

$$= \frac{5e^2}{4} \sin 2v$$

$$= v - 2e [\sin v - \cos v \cdot 2e \sin v] - \frac{1}{4} e^2 \sin 2v$$

$$= v - 2e \sin v + 2e^2 \sin 2v - \frac{1}{4} e^2 \sin 2v$$

$$\therefore m = v - 2e \sin v + \frac{3}{4} e^2 \sin 2v \quad \dots (13)$$

இதுவரை நாம் u , v , w என்பவற்றை இணைத்துப் பெற்ற தொடர்புகள் :

சரியான வாய்பாடுகள்	தோராய மதிப்புகள்
$I \tan \frac{v}{2} = \frac{\sqrt{1+e}}{1-e} \tan \frac{u}{2}$ (6)	(i) $v = u + e \sin u + \frac{e^2}{4} \sin 2u$ (5) (ii) $w = m + e \sin w + \frac{e^2}{2} \sin 2w$ (11) (iii) $v = m + 2e \sin m + \frac{5e^2}{4} \sin 2m$ (12)
II $m = u - e \sin u$ (10)	(iv) $m = v - 2e \sin v + \frac{9}{4} e^2 \sin 2v$ (13)

பயிற்சி 12 A

1. சுதிரவன் கீப்பெரு, கீச்சிறு விட்டங்கள் மூன்றையுமே $32^{\circ}31'$; $31^{\circ}26'$. மண்ணுலக நீள்வட்டப் பாதையில் குவிமைமயப் பிறழ்வு காண்க. (செ)

2. மண்ணுலகம் தனது நீள்வட்டப் பாதையில் அண்மை, சேய்மை நிலையிலும், மூன்றையே r_1 , r_2 என்ற திசேவகத்துடன் செல்கிறது. குவிமைமயப் பிறழ்வு e எனக்கொண்டால் $\frac{r_1}{r_2} = \frac{1+e}{1-e}$ என நிறுவுக.

3. மண்ணுலக நீள்வட்டப் பாதையில், மரபுப்படி இயல்புப் பிறழ்ச்சி r ; குவிமைமயப் பிறழ்ச்சி u , சராசரிப் பிறழ்ச்சி m எனக் கொண்டு பின் வருவனவற்றை நிறுவுக.

$$(i) v = u + \frac{e^2}{4} \sin 2u + e \sin u$$

$$(ii) \tan \frac{v}{2} = \tan \left(\frac{\pi}{4} + \frac{\phi}{2} \right) \cdot \tan \frac{u}{2} \quad (e = \sin \phi)$$

$$(iii) \cos v = \frac{\cos u - e}{1 - e \cos u}$$

$$\sin v = \frac{\sqrt{1 - e^2} \sin u}{1 - e \cos u}$$

$$(iv) \quad u = m + \frac{e \sin m}{1 - e \cos m} - \frac{1}{2} \left(\frac{e \sin m}{1 + e \cos m} \right)^2$$

(தோராயமாக)

4. ஒரு கோளின் காலவட்டம் T ; பெரிகெம்பாதி a ; பெரிகெம்பாதிமீள் ஒரு சிறு அளவு Δa , மீதுதியானால் காலவட்டம் $\frac{8 T \Delta a}{2a}$ அளவு மீறும் என நிறுவுக.

$$(T^3 = K a^3)$$

இரு பக்கங்களும் மடக்கைமெடுத்து, வகைதவன்மெறுகண்டால்,

$$3 \log T = \log K + 3 \log a$$

$$\therefore \frac{3}{T} \frac{dT}{da} = \frac{3}{a}$$

$$\therefore \Delta T = \frac{dT}{da} \Delta a \text{ என்ற வகையில்}$$

$$\Delta T = \frac{8}{a} \cdot \frac{T}{3} \Delta a \text{ எனப் பெறப்படும். })$$

5. புறூட்டோளின் நீள்வட்டப்பாதையின் குவிமையம் பெறச்சரி 0.25; அதன் காலவட்டம் 248 ஆண்டுகள். சேர்வை நிலையில், அது கதிரவனிலிருந்து உட்கன தூரம் ஏறக்குறைய 50 வானியல் அளவுகள் என நிறுவுக. (செ)

6. கதிரவன் பொருண்மை M எனக் கொண்டால், மண்ணுலகப் பொருண்மை $\frac{1}{33 \times 10^3} M$; சனியின் பொருண்மை

$\frac{1}{8500} M$. கதிரவனிலிருந்து மண்ணுலக தூரம், சனியின் தூரம் = 2 : 19. செப்ளரின் மூன்றாம் விதிவழியாகப் பெறப்படும் சனியின் காலவட்டம், அதன் சரியான காலவட்டத்தைவிட 1-5 நாள் வேறுபடுகிறதென நிறுவுக.

7. மண்ணுலக நீள்வட்டப் பாதையின் செவ்வகம் l_1 ; அதே ஒரு கோளுடையது l_2 . மண்ணுலகப் பரப்பு வேகம் : கோளின் பரப்பு வேகம் = $\sqrt{l_1} : \sqrt{l_2}$ என நிறுவுக. (செ)

B

12.5 : காலக்குறை-கிடைச் சமன்பாடு (Equation of Time)

மேடழகுதழிவுகளியை ஆதாரமாகக்கொண்டு மீள்வழி நேரம் கணக்கிடப்படுகிறது. சூரியமாக மேடழகுதழிவுகளியின் மேற்கு நேரக்கோணமே அத்தகுணத்தில் மீள்வழி நேரமாகும். இந்நேரம் வானவியலில் பெரிதும் பயன்பட்டபோதிலும் தமது அன்றாட வாழ்க்கையில் பயன்படுவதில்லை. மேலும் மணிநேரின் அன்றாட வாழ்க்கை (கதிரவன் ஒளிகொடுக்கும் நேரமான) பகல், (ஒளியற்ற நேரமான) இரவுக்காலங்களின் அடிப்படையில்தான் அமைகிறது. ஆனால் மீள்வழி நேரம் கதிரவன் பகல் இரவுக் காலங்களோடு இணைத்து வராததால், அன்றாட வாழ்க்கைக்கும் பயன்படாது.

எடுத்துக்காட்டாக : ஆண்டு முழுவதும் தினசரி மீள்வழி நேரம் 10 மணிக்கு ஒரு கிலோரி தொடங்கி மீள்வழி நேரம் 18 மணிக்கு முடியவேண்டுமென வைத்துக்கொள்வோம். மீள்வழி நேரம் 10 மணிக்குக் கதிரவன் வலஏற்றம், நேரக்கோணம், கதிரவன் பகல் இரவு நேரம், எப்படி ஓரண்டில் மாறிமாறி வந்து கிடைதென பின்வரும் பட்டியலில் கண்டு வாழ்க்கையை மீள்வழி நேரப்படி திட்டமிட முடியாதென அறிக.

மீள்வழி நேரம் 10 மணிக்குரிய கதிரவன் நேரம் :

நாள்	கதிரவன் வல ஏற்றம் (ஏறக்குறைய)	கதிரவன் பொட்டிய காலம்— நேரம்
மார்ச்சு 21	0°	இரவு 10 மணி
ஏப்ரல் 20	30°	இரவு 8 மணி
ஜூன் 22	60°	மாலை 4 மணி
செப்டம்பர் 22	150°	முற்பகல் 10 மணி
அக்டோபர் 22	210°	காலை 8 மணி
டிசம்பர் 22	270°	விடியற்காலம் 4 மணி
ஜனவரி 21	300°	விடியற்காலம் 2 மணி

12.6 : வான சராசரி கதிரவன் (Astronomical Mean Sun)

இப்போது கதிரவன் வழிநேரம் பற்றிப் பார்ப்போம். உண்மையான கதிரவன் நோற்றவழி நேரம், (True or Apparent Solar Time), நோற்றக்கதிரவன் (True or Apparent Sun) வானிலிருக்கும் இடத்தின் அடிப்படையில் கணக்கிட்டு நிர்ணயிக்கப்பட வேண்டும். ஆனால் கதிரவன் தன் பாதையில் சீரான கோண வேகத்தில் இயங்காத காரணத்தாலும் கதிரவன் பாதை, நடுவரைக்கு $28\frac{1}{2}^\circ$ வளைந்திருப்பதாலும், கதிரவனின் வல ஏற்றம் சீரான வேகத்தில் மாறுவதில்லை. எனவே, ஒரு சீரான இயங்கும் கருவாரம் நோற்றக்கதிரவன் வழிநேரத்தைக் காட்டமுடியாது. இத்தகை சிக்கலை நீக்கி ஒரு சீரானமுறையில் காலம் காட்டும் கருவாரம் கொண்டு, கணிதக்கதை தொழில்சார் முறைபாக்க காலவரைப்பு, ஆமைப்பதற்கு உதவும் வகையில் வானஇயல் நிபுணர்கள், வானசராசரி கதிரவன் (Astronomical Mean Sun) என்ற ஒரு கற்பனைக் கதிரவனை ஆமைத்து. அக்கற்பனைக் கதிரவனின் சீரான வல ஏற்ற மாற்றத்தின் அடிப்படையில் கதிரவன் வழிசராசரி நேரம் (Astronomical Mean Solar Time அல்லது கருக்கமரக Mean Solar Time) வகுத்திருக்கின்றனர்.

நோற்றக் கதிரவனின் இயக்கக் காலவட்டமாகிய ஓராண்டில் இக்கற்பனைக் கதிரவன் வானநடுவரையின்மேல் சீரான கோண வேகத்தில் (அதாவது வல ஏற்ற மாற்றம் சீரான உள்ள வகையில்) ஒரு முழுச்சுற்று சுற்றுகிறது. நோற்றக்கதிரவன் சீரான வேகத்தில் வலஏற்றமாற்றம் பெற்றிருக்காத காரணத்தால் இவ்விரு கதிரவன்களுக்கிடையே வலஏற்ற வேறுபாடு இருக்கத்தான் செய்யும்.

12.6.1 : இயக்க விடைக் கதிரவன் (Dynamical Mean Sun)

வான நடுவரையில் இயங்கும் கற்பனைக்கதிரவனுள் வான சராசரிக் கதிரவன் அல்லாமல் இயக்கவிடைக்கதிரவன் என்ற மற்றொரு கற்பனைக்கதிரவன் சீரான கோண வேகத்தோடு உண்மைக் கதிரவன் பாதையிலேயே இயங்குவதாக எடுத்துக்கொள்கிறோம். உண்மைக்கதிரவன் அண்மை நிலையிலும் சேகன்மை நிலையிலும் உள்ள பொது இயக்கவிடைக் கதிரவனும் அண்மை நிலையிலும் சேகன்மை நிலையிலும் உள்ளது. மேலும் உண்மைக் கதிரவன் காலவட்டத்திலேயே இக்கற்பனைக் கதிரவனும் சரியாக ஒருமுறை சுற்றுகிறது. மேலும், வான சராசரிக் கதிரவனும் இயக்கவிடைக் கதிரவனும், ஒரேயே γ இல் புறப்படுகின்றனவெனக் கொள்ளப்படுகிறது. இவ்விரு கற்பனைக் கதிரவர்களும் (1) γ இன்குத்து ஒரேயேயிருத்து (2) ஒரே காலவட்டத்தில் (ஓராண்டுக் காலம்) 580° பயணம் செய்கின்றன. ஆனால் சராசரிக் கதிரவன் பாதை சீரான

கோண வேகத்தில் வான நடுவற்றையில் அமைந்துள்ளது. இயக்கவிடைக் கதிரவன் பாதை சீரான கோணவேகத்தில் உள் மையான கதிரவன் (தோற்றக் கதிரவன்) பாதையிலேயே அமைந்துள்ளது. எனவே வானநடுவற்றையில் இயங்கும் சராசரிக் கதிரவனின் வலஞ் சந்தர்ப்பம் ஒரு சீரானது; கதிரவன் பாதையிலேயே இயங்கும் இயக்கவிடைக் கதிரவனின் வான நெட்டாங்கு மூற்றம் ஒரே சீரானது. எனவே இயக்கவிடைக்கும் γ -விடத்து ஒருங்கே புறப்படுகின்றனவேனக் கொள்ளப்படுவதால் எந்த சமயத்திலும் இயக்கவிடைக் கதிரவனின் நெட்டாங்கும் சராசரிக் கதிரவனின் வலஞ் சந்தர்ப்பம் சமமாக இருக்கும். (இது ஒரு முக்கியமான முடிவு. இதைத் தெளிவுபடப் புரிந்துகொள்ளுதல் இன்றியமையாதது.)

12-7: காலக் குறை—நிறைச் சமன்பாடு (வகையறை)

ஒரு குறிப்பிட்ட தருணத்தில் தோற்றக் கதிரவன் வழி நோக்கித் தரும் வான சராசரிக் கதிரவன் வழி நோக்கித் தரும் உள்ள் வேறுபாடு, அத்தருணத்திற்குரிய காலக்குறை—நிறைச் சமன்பாடாகும்.

ஒரு குறிப்பிட்ட சமயத்தில் காலச் சமன்பாட்டை E எனக் குறிப்போம்.

அந்த சமயத்தில்,

1. தோற்றக் கதிரவனின் வலஞ் சந்தர்ப்பம் α எனவும்,
2. தோற்றக் கதிரவனின் நெட்டாங்கு ϕ எனவும்,
3. இயக்க விடைக் கதிரவனின் நெட்டாங்கு l எனவும்,
4. சராசரிக் கதிரவனின் வலஞ் சந்தர்ப்பம் α' எனவும்,
5. மின்வழி நேரம் t எனவும் குறிப்போம்.

மூலம் ...12-6-1...இல் காட்டப்படி, $l = \alpha'$

$\therefore$ வகையறைப்படி, காலச்சமன்பாடு

$$\begin{aligned}
 E &= \text{தோற்றக் கதிரவன் வழிநேரம்} - \text{சராசரிக் கதிரவன் வழி நேரம்} \\
 &= \text{தோற்றக் கதிரவனின் நேரக்கோணம்} - \text{சராசரிக் கதிரவனின் நேரக்கோணம்} \\
 &= (\text{மின்வழி நேரம்} - \text{தோற்றக் கதிரவனின் வலஞ் சந்தர்ப்பம்}) \\
 &\quad - (\text{மின் வழிநேரம்} - \text{சராசரிக் கதிரவனின் வலஞ் சந்தர்ப்பம்}) \\
 &= (t - \alpha) - (t - \alpha') \\
 &= \alpha' - \alpha \\
 &= l - \phi \\
 &= (l - \phi) - (\phi - \alpha) \qquad \dots (14) \\
 &= E_1 + E_2, \text{ என இரு கூறுகள்.}
 \end{aligned}$$

ஒரு கற்பனைப் பொருளைப் பொருத்திக் காண்க. இத்தகி கற்பனைப் பொருள் S' என்பது இயக்க விடைக் கதிரவன் என்பது தெனியு.

இப்போது, படம் 12-7, (i)க்குரிய u, m என்ற பிறழ்ச்சிகளைப் படம், 12-7-(ii)இல் பொருத்திக் காண்க.

		படம்
		12-7 (i) 12-7 (ii)
$\left. \begin{aligned} m &= \frac{E\hat{S}P}{r} = \frac{P\hat{E}S'}{r} \\ r &= \frac{E\hat{S}P}{m} = \frac{P\hat{E}S'}{m} \end{aligned} \right\} \therefore$	$\frac{SP^i}{ES}$ $\frac{ES}{ES}$	$\frac{PE}{ES'}$ $\frac{ES}{ES}$

படம் 12-7 (ii)இல் γ, ∞ இடக்குறிக்க. இப்போது முன் கூறிய முடிவுகளைப் பொட்டி $E = E_1 + E_2$ என்ற காலக் சமன்பாட்டின் இரு பகுதிகளைத் தனித்தனியே கணிப்போம்.

12-7-1 : E_1 இல் கதிப்பு காணல்: $[E_1 = (I - o) - 12-7 (14)]$ காண்க

ஒரு குறிப்பிட்ட சமயத்தில், கதிரவன் இயக்க விடைக் கதிரவன் இரண்டும் மூன்றாவது படம், 12-7 (ii)இல், S, S' என்ற புள்ளிகளில் இருக்கட்டும். (இத்தரிகளைப் படம் (i)இல் E, E' க்கு இணைத்த தரிசுகளை கவனத்தில் வைக்கவும்.)

$$\gamma \hat{E}P \dagger = k \text{ (அண்மைநிலை தெட்டாங்கு)}$$

$$\gamma \hat{E}S \dagger = l \text{ (இயக்க விடைக் கதிரவன் தெட்டாங்கு)}$$

$$\gamma \hat{E}S \dagger = o \text{ (உண்மை/தேவதற்கி கதிரவன் தெட்டாங்கு)}$$

சற்று முன்பு 12-7இல், $P\hat{E}S = r$ இயல்புப் பிறழ்ச்சியெனவும் $P\hat{E}S'_i = m$ என்ற சராசரிப் பிறழ்ச்சி எனவும் கண்டோம்.

எனவே படம் 12-7 (ii) இல் $o = \gamma \hat{E}S = \gamma \hat{E}P + P\hat{E}S$
 $= K + r \quad \dots(15)$

மேலும் $[I = \gamma \hat{E}S' = \gamma \hat{E}P + P\hat{E}S'$
 $= K + m \quad \dots(16)$

$$\therefore I - o = m - r$$

மேலும் 12-4-1 (C) (12) இன்படி,

$$r = m + 2c \sin m + \frac{4}{3} c^2 \sin 2m + \dots$$

அதாவது $r = m + 2c \sin m$ (தோர்யமமாக)

$$\therefore m - r = -2c \sin m$$

$$= -2c \sin (I - K) \quad [(16) \text{ன்படி}]$$

எனவே $I - o = -2c \sin (I - K) \quad \dots(17)$

$$\therefore E_1 = -2c \sin (I - K) \quad \dots(17')$$

12.7.2: E_1 ன் மதிப்புத் தரணம்

$$E_1 = (\infty - \alpha) \quad [12.7 (14) \text{ காண்க}]$$

தமக்கு 2.9.8.1 (v) (10) இன்படி $\cos w = \tan \alpha \cot \infty$ எனத் தெரியும்.

$$\therefore \tan \alpha = \tan \infty \cos w$$

$$\begin{aligned} &= \frac{1 - \tan^2 \frac{w}{2}}{1 + \tan^2 \frac{w}{2}} \tan \infty \\ &= \frac{1-t}{1+t} \tan \infty \quad \left[t = \tan^2 \frac{w}{2} \right] \end{aligned}$$

$\therefore$ 10.7 இல் கணி. வரம்பு (2) இன்படி

$$\alpha = \infty - t \sin 2\infty + \frac{t^2}{2} \sin 4\infty \quad (\text{தெரியுமா})$$

$$\text{எனவே } \alpha = \infty - \tan^2 \frac{w}{2} \sin 2\infty \quad (\text{தெரியுமா})$$

$$\infty - \alpha = \tan^2 \frac{w}{2} \sin 2\infty$$

$$= \tan^2 \frac{w}{2} \sin 2 [I + 2c \sin (I-K)]$$

[(17) இன் பயனாக]

$$= \tan^2 \frac{w}{2} \sin 2I \quad (\text{தெரியுமா})$$

$$\text{எனவே } E_1 = \tan^2 \frac{w}{2} \sin 2I \quad \dots (15)$$

$c = \frac{1}{60}$ எனவும், $w = 22^\circ 27'$ என எடுத்துக்கொண்டால்

$$(I - \infty) = E_1 = -2: \sin (I-K) \text{ ஆகையின்கண் (17') இன்படி,}$$

$$= -\frac{12}{30 \pi} \sin (I-K) \text{ மணிசை}$$

$$= -0.884878 \times 18761 \sin (I-K) \text{ விநாடிகள்}$$

$$= -78.87 \sin (I-K) \quad \dots (19)$$

$$(\infty - \alpha) = E_1 = \tan^2 \frac{w}{2} \sin 2I \text{ ஆகையின்கண்}$$

$$= \frac{12}{\pi} \tan^2 \frac{w}{2} \sin 2I \text{ மணிசை}$$

$$= 18751 \times 0.04087 \times \sin 2l \text{ விநாடிகள்} \\ 9\text{நி. } 57 \sin 2l \quad \dots (20)$$

எனவே மொத்தமாக காலக்குறை - நிறைச் சமன்பாடு

$$E = E_1 + E_2 \\ = - 7\text{நி. } 67 \sin (l - K) + 9\text{நி. } 57 \sin 2l \quad \dots (21)$$

$$= - 460.2 \text{ வி} \sin (l - K) + 592.8 \text{ வி} \sin 2l \quad \dots (22)$$

12.7.3.1: காலக் குறை-நிறைச் சமன்பாடு ஓரண்டில் காலக் குறை பூச்சியமாகிறது :

காலக் குறை-நிறைச் சமன்பாடு

$E = - 7.67 \sin (l - k) + 9.57 \sin 2l$ என நாமறிவோம். இங்கு K என்பது கதிரவன் ஆன்மைநிலை நெட்டாங்கிலைக் குறிக் கிறது; K ன் மதிப்பு 258° ; எனவே E இன் மதிப்பு, l இன் சார்புடைய ஒரு மதிப்பாகும். l என்ற வானிலடக் கதிரவனின் நெட்டாக்கு ஓரண்டில் 0° முதல் 360° வரை மாறுகிறது. எனவே E என்பது l என்ற ஒரு மாறியின் சார்பு ஆகவது சார்பவன் (function of l).

$$E(l) = - 7.67 \sin (l - 258^\circ) + 9.57 \sin 2l.$$

$f(x) = 0$ என்ற சமன்பாட்டில் $x = a, b$ என்ற மதிப்புகளை ஏற்றும்போது $f(x)$ குறை, கூட்டு மதிப்புகளை ஏற்குமானால் $x = a, b$ என்ற மதிப்புகளுக்கு இடையில் ஏதாவது ஒரு மதிப்பிற்கு $f(x)$ ன் மதிப்பு குறைந்தது ஒரு முறையேனும் பூச்சியமாகும் என நாமறிவோம். அம்முறைப்படியே $E(0), E(45), E(90), E(180), E(360^\circ)$ ன் மதிப்புகளைக் கண்டு $E(l)$ ன் மதிப்பு, ஆண்டில் தான் ஒரு முறை பூச்சியமாகிறதென நிறுவுவோம்.

$$E(0) = - 7.67 \sin (- 258^\circ) + 9.57 \sin 0 \\ = 7.67 \sin 258^\circ \\ = \text{குறைமதிப்பு}$$

$$E(45) = - 7.67 \sin (45^\circ - 258^\circ) + 9.57 \sin 90^\circ \\ = - 7.67 \sin (- 213^\circ) + 9.57 \\ = 7.67 \sin 213^\circ + 9.57 \\ = \text{கூட்டு மதிப்பு.}$$

$$\begin{aligned}
 E(90) &= -7.67 \sin(90^\circ - 255^\circ) + 9.57 \sin 150^\circ \\
 &= -7.67 \sin(-165^\circ) \\
 &= +7.67 \sin 165^\circ \\
 &= \text{குறை மதிப்பு.}
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 E(180) &= -7.67 \sin(180^\circ - 255^\circ) + 9.57 \sin 300^\circ \\
 &= -7.67 \sin(-105^\circ) \\
 &= 7.67 \sin 105^\circ \\
 &= \text{கூட்டு மதிப்பு.}
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 E(270) &= -7.67 \sin(270^\circ - 255^\circ) + 9.57 \sin 750^\circ \\
 &= -7.67 \sin 15^\circ \\
 &= \text{குறை மதிப்பு.}
 \end{aligned}$$

எனவே / ஒரு முறை, $0^\circ \rightarrow 45^\circ$ க்கு இடைமிக் ஏதாவதொரு மதிப்பேற்றும்போதும், மறுபடி ஒருமுறை $45^\circ \rightarrow 90^\circ$ க்கு இடைமிக் ஏதாவதொரு மதிப்பேற்றும்போதும், மறுபடி ஒரு முறை $90^\circ \rightarrow 180^\circ$ க்கு இடைமிக் ஏதாவதொரு மதிப்பேற்றும் போதும், மற்றுமேல் மூன்றாம் நாள்வாறாக $180^\circ \rightarrow 360^\circ$ க்கு இடைமிக் ஏதாவது ஒரு மதிப்பேற்றும் போதும், E ன் மதிப்பு (E இன் சார்பாக) நான்கு முறை பூச்சிய மதிப்பேற்றும் என நிறுவப்படுகிறது.

12.7.3-2: இரண்டாம் குறை

$$E = E_1 + E_2$$

$$E_1 = -7.67 \sin(l - k)$$

$E_2 = 9.57 \sin 2l$ என நாமறிவோம். எனவே E_1, E_2 இன் தனி அல்லது மட்டு (absolute) மதிப்புக்கள் முறையே 7.67, 9.57 ஆகவது E_1 ன் மட்டுமதிப்பு E_1 -ன் மட்டு மதிப்பைவிடப் பெரிது.

எனவே E_1 தனது மீப்பெரு மதிப்பான +9.57 நி. என்ற மதிப்பு பெறும்போதும், E_2 தனது மீச்சிறுமதிப்பான -9.57 நி. என்ற மதிப்பின்பெறும் போதும் (E_1 இன் மதிப்பு என்னவானாலும்)

$(E_1 + E_2)$ ன் கூட்டுத் தொகை மூன்றையே + மதிப்பையும், -மதிப்பையும் பெறும்.

E_1 ன் மதிப்புகள்

$l = 45^\circ$: $E = + 9.87$ தி; ஏறக்குறைய மே 5ஆம் தேதி.
(D_1)

$l = 135^\circ$: $E = - 9.87$ தி; ஏறக்குறைய ஆகஸ்டு 6ம் தேதி
(D_1)

$l = 225^\circ$: $E = + 9.87$ தி; ஏறக்குறைய நவம்பர் 7ம் தேதி
(D_2)

$l = 315^\circ$: $E = - 9.87$ தி; ஏறக்குறைய சிப்ரவரி 5ம் தேதி
(D_4)

எனவே D_1, D_2, D_3, D_4 எனக் குறிப்பிட்ட நாளைகளில் $E = (E_1 + E_2)$ இன் மதிப்புகள் மூன்றையே +; -; +; -; ஆகவிருக்கும். D_1 என்ற தேதியிலிருந்து ஓராண்டு காலம் எடுத்துக் கொண்டால், மேமாதம் 5 முதல் ஆகஸ்டு வேளை ஏதாவது ஒரு சமயம் E ன் மதிப்பு பூச்சியமாகும். இங்ஙனாக, இரண்டாவது, ஆகஸ்டு 6 முதல் நவம்பர் 7வரை ஒரு முறையும், மூன்றாவது, நவம்பர் 7 முதல் சிப்ரவரி வேளை ஒரு முறையும், நான்காவது சிப்ரவரி 5 முதல் மேமாதம் வேளை ஒரு முறையும் பூச்சியமாகும். எனவே ஓராண்டு காலவட்டத்தில் E ன் மதிப்பு நான்கு முறை பூச்சியமாகும். இம்முடிவு எந்த ஓராண்டு இடைவெளிக்கும் பொருத்துமெனக் கண்டுகொள்க.

12.7.3.3 : மூன்றாம் முறை

காலச் சமன்பாட்டின் வரைப்படம். (Graph of the equation of Time).

நடுக்க ஆளவுச் சட்டத்தில் X-அச்சில் ஓரண்டின் உள்ள நாட்களையும் Y-அச்சில் E_1, E_2, E இன் மதிப்புகளைத் தனித்தனியே இடக்குறித்து வரைப்படம் வரையலாம். E ன் மதிப்பு l இன் மதிப்பைச் சார்ந்துள்ளபடியால், l -க்கு 0° யிலிருந்து 360° வரை மதிப்புகள் கொடுக்கவும். l இன் மதிப்பைச் சார்ந்து E_1, E_2, E இன் தனித்தனி மதிப்புகள் கிடைக்கும்.

$$E_1 = - 7.87 \sin (l - k)$$

$$E_2 = 9.87 \sin 2l$$

$$K = 258^\circ$$

1-க்கு வசதிக்கேற்ப மதிப்புகள் கொடுக்க ஆம்மதிப்புக்களுக்கு ஒத்த E_1, E_2 இன் மதிப்புகள் பெறலாம்.

12-7-8-8 என்ற எண்ணுடைய பட்டியலில் ஜனவரி முதல் தேதி, மூன்றாம் தேதி, கிளைச் தொடர்ந்து ஒவ்வொரு யாதம் தேதி 3, மார்ச் 21, ஜூன் 22, செப்டெம்பர் 23, டிசெம்பர் 22, தேதி களுக்குரிய,

(i) இயக்கவிடைத் திறவன் நெட்டாக்கு;

(ii) உரிய E_1 இன் மதிப்புகள்;

(iii) உரிய E_2 இன் மதிப்புகள்;

(iv) $E = (E_1 + E_2)$ இன் மதிப்புகள்;

கணித்துக் கொடுக்கப்பட்டிருக்கின்றன.

கிளைச் படம் 12-7-8-8 (i) இல் E_1 இன் வரைபடம் (மெல்லிய வரையோடு); E_2 இன் வரைபடம் (நடித்த வரையோடு) இரண்டும் வரைத்து காட்டப்பட்டிருக்கின்றன.

கிளைச் படம் 12-7-8-8 (ii) இல் $(E_1 + E_2)$ என்ற மதிப்புடைய E இன் வரைபடம் (புள்ளி வரையோடு) கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது.

12-7-8-8 (iii) உடன் வரைபடத்தில் E இன் மதிப்புகள் பூச்சியமாகும். இடங்கள் (E இன் வரைபடம் X அச்சை வெட்டு மிடங்கள்) A, B, C, D எனக்காட்டப்பட்டிருக்கின்றன.

ஆய்விடங்களுக்குரிய தேதிகளில் E இன் மதிப்பு பூச்சியமாகிறது. எனவே ஓராண்டு காலத்தில் நான்கு முறை, E எனப்படும் காலக் குறை—நிறைச் சமன்பாடு பூச்சியமாகிறது என அறிவப்படுகிறது. E இன் மதிப்பு பூச்சியமாகும் தேதிகள், ஏறத்தாழ (1) ஏப்ரல் 16 (2) ஜூன் 14 (3) செப்டெம்பர் 2 (4) டிசெம்பர் 25 எனப் படத்தில் ஒருவாறு இடக் குறிக்கப்பட்டிருப்பதைக் காண்க.

E இன் மதிப்பு ஓராண்டு காலத்தில்—14-25 நி. முதல் 16-25 நிமிடம் வரை ஏறத்தாழவுகள் பெறுகிறது.

பட்டியல் 12.7.3-3

$$E = E_1 + E_2$$



$$= -7.67 \sin (I - k) \text{ நி } + 0.57 \sin 2I \text{ நி}$$

E_1 க்குத் தனிவடிபடம்; E_2 க்குத் தனி வடிபடம் ;

$E = E_1 + E_2$ என்பதற்குத் தனி வடிபடம் இவைகம்பட்டிருக்கின்றன.

சூரியன் செறி	1-1	3-1	5-1	7-1	9-1	11-1	13-1	15-1	17-1	19-1	21-1	23-1	25-1	27-1	29-1	31-1	33-1	35-1	37-1	39-1	41-1	43-1	45-1	47-1	49-1	51-1	53-1	55-1	57-1	59-1	61-1	63-1	65-1	67-1	69-1	71-1	73-1	75-1	77-1	79-1	81-1	83-1	85-1	87-1	89-1	91-1	93-1	95-1	97-1	99-1	101-1	103-1	105-1	107-1	109-1	111-1	113-1	115-1	117-1	119-1	121-1	123-1	125-1	127-1	129-1	131-1	133-1	135-1	137-1	139-1	141-1	143-1	145-1	147-1	149-1	151-1	153-1	155-1	157-1	159-1	161-1	163-1	165-1	167-1	169-1	171-1	173-1	175-1	177-1	179-1	181-1	183-1	185-1	187-1	189-1	191-1	193-1	195-1	197-1	199-1	201-1	203-1	205-1	207-1	209-1	211-1	213-1	215-1	217-1	219-1	221-1	223-1	225-1	227-1	229-1	231-1	233-1	235-1	237-1	239-1	241-1	243-1	245-1	247-1	249-1	251-1	253-1	255-1	257-1	259-1	261-1	263-1	265-1	267-1	269-1	271-1	273-1	275-1	277-1	279-1	281-1	283-1	285-1	287-1	289-1	291-1	293-1	295-1	297-1	299-1	301-1	303-1	305-1	307-1	309-1	311-1	313-1	315-1	317-1	319-1	321-1	323-1	325-1	327-1	329-1	331-1	333-1	335-1	337-1	339-1	341-1	343-1	345-1	347-1	349-1	351-1	353-1	355-1	357-1	359-1	361-1	363-1	365-1	367-1	369-1	371-1	373-1	375-1	377-1	379-1	381-1	383-1	385-1	387-1	389-1	391-1	393-1	395-1	397-1	399-1	401-1	403-1	405-1	407-1	409-1	411-1	413-1	415-1	417-1	419-1	421-1	423-1	425-1	427-1	429-1	431-1	433-1	435-1	437-1	439-1	441-1	443-1	445-1	447-1	449-1	451-1	453-1	455-1	457-1	459-1	461-1	463-1	465-1	467-1	469-1	471-1	473-1	475-1	477-1	479-1	481-1	483-1	485-1	487-1	489-1	491-1	493-1	495-1	497-1	499-1	501-1	503-1	505-1	507-1	509-1	511-1	513-1	515-1	517-1	519-1	521-1	523-1	525-1	527-1	529-1	531-1	533-1	535-1	537-1	539-1	541-1	543-1	545-1	547-1	549-1	551-1	553-1	555-1	557-1	559-1	561-1	563-1	565-1	567-1	569-1	571-1	573-1	575-1	577-1	579-1	581-1	583-1	585-1	587-1	589-1	591-1	593-1	595-1	597-1	599-1	601-1	603-1	605-1	607-1	609-1	611-1	613-1	615-1	617-1	619-1	621-1	623-1	625-1	627-1	629-1	631-1	633-1	635-1	637-1	639-1	641-1	643-1	645-1	647-1	649-1	651-1	653-1	655-1	657-1	659-1	661-1	663-1	665-1	667-1	669-1	671-1	673-1	675-1	677-1	679-1	681-1	683-1	685-1	687-1	689-1	691-1	693-1	695-1	697-1	699-1	701-1	703-1	705-1	707-1	709-1	711-1	713-1	715-1	717-1	719-1	721-1	723-1	725-1	727-1	729-1	731-1	733-1	735-1	737-1	739-1	741-1	743-1	745-1	747-1	749-1	751-1	753-1	755-1	757-1	759-1	761-1	763-1	765-1	767-1	769-1	771-1	773-1	775-1	777-1	779-1	781-1	783-1	785-1	787-1	789-1	791-1	793-1	795-1	797-1	799-1	801-1	803-1	805-1	807-1	809-1	811-1	813-1	815-1	817-1	819-1	821-1	823-1	825-1	827-1	829-1	831-1	833-1	835-1	837-1	839-1	841-1	843-1	845-1	847-1	849-1	851-1	853-1	855-1	857-1	859-1	861-1	863-1	865-1	867-1	869-1	871-1	873-1	875-1	877-1	879-1	881-1	883-1	885-1	887-1	889-1	891-1	893-1	895-1	897-1	899-1	901-1	903-1	905-1	907-1	909-1	911-1	913-1	915-1	917-1	919-1	921-1	923-1	925-1	927-1	929-1	931-1	933-1	935-1	937-1	939-1	941-1	943-1	945-1	947-1	949-1	951-1	953-1	955-1	957-1	959-1	961-1	963-1	965-1	967-1	969-1	971-1	973-1	975-1	977-1	979-1	981-1	983-1	985-1	987-1	989-1	991-1	993-1	995-1	997-1	999-1	1001-1	1003-1	1005-1	1007-1	1009-1	1011-1	1013-1	1015-1	1017-1	1019-1	1021-1	1023-1	1025-1	1027-1	1029-1	1031-1	1033-1	1035-1	1037-1	1039-1	1041-1	1043-1	1045-1	1047-1	1049-1	1051-1	1053-1	1055-1	1057-1	1059-1	1061-1	1063-1	1065-1	1067-1	1069-1	1071-1	1073-1	1075-1	1077-1	1079-1	1081-1	1083-1	1085-1	1087-1	1089-1	1091-1	1093-1	1095-1	1097-1	1099-1	1101-1	1103-1	1105-1	1107-1	1109-1	1111-1	1113-1	1115-1	1117-1	1119-1	1121-1	1123-1	1125-1	1127-1	1129-1	1131-1	1133-1	1135-1	1137-1	1139-1	1141-1	1143-1	1145-1	1147-1	1149-1	1151-1	1153-1	1155-1	1157-1	1159-1	1161-1	1163-1	1165-1	1167-1	1169-1	1171-1	1173-1	1175-1	1177-1	1179-1	1181-1	1183-1	1185-1	1187-1	1189-1	1191-1	1193-1	1195-1	1197-1	1199-1	1201-1	1203-1	1205-1	1207-1	1209-1	1211-1	1213-1	1215-1	1217-1	1219-1	1221-1	1223-1	1225-1	1227-1	1229-1	1231-1	1233-1	1235-1	1237-1	1239-1	1241-1	1243-1	1245-1	1247-1	1249-1	1251-1	1253-1	1255-1	1257-1	1259-1	1261-1	1263-1	1265-1	1267-1	1269-1	1271-1	1273-1	1275-1	1277-1	1279-1	1281-1	1283-1	1285-1	1287-1	1289-1	1291-1	1293-1	1295-1	1297-1	1299-1	1301-1	1303-1	1305-1	1307-1	1309-1	1311-1	1313-1	1315-1	1317-1	1319-1	1321-1	1323-1	1325-1	1327-1	1329-1	1331-1	1333-1	1335-1	1337-1	1339-1	1341-1	1343-1	1345-1	1347-1	1349-1	1351-1	1353-1	1355-1	1357-1	1359-1	1361-1	1363-1	1365-1	1367-1	1369-1	1371-1	1373-1	1375-1	1377-1	1379-1	1381-1	1383-1	1385-1	1387-1	1389-1	1391-1	1393-1	1395-1	1397-1	1399-1	1401-1	1403-1	1405-1	1407-1	1409-1	1411-1	1413-1	1415-1	1417-1	1419-1	1421-1	1423-1	1425-1	1427-1	1429-1	1431-1	1433-1	1435-1	1437-1	1439-1	1441-1	1443-1	1445-1	1447-1	1449-1	1451-1	1453-1	1455-1	1457-1	1459-1	1461-1	1463-1	1465-1	1467-1	1469-1	1471-1	1473-1	1475-1	1477-1	1479-1	1481-1	1483-1	1485-1	1487-1	1489-1	1491-1	1493-1	1495-1	1497-1	1499-1	1501-1	1503-1	1505-1	1507-1	1509-1	1511-1	1513-1	1515-1	1517-1	1519-1	1521-1	1523-1	1525-1	1527-1	1529-1	1531-1	1533-1	1535-1	1537-1	1539-1	1541-1	1543-1	1545-1	1547-1	1549-1	1551-1	1553-1	1555-1	1557-1	1559-1	1561-1	1563-1	1565-1	1567-1	1569-1	1571-1	1573-1	1575-1	1577-1	1579-1	1581-1	1583-1	1585-1	1587-1	1589-1	1591-1	1593-1	1595-1	1597-1	1599-1	1601-1	1603-1	1605-1	1607-1	1609-1	1611-1	1613-1	1615-1	1617-1	1619-1	1621-1	1623-1	1625-1	1627-1	1629-1	1631-1	1633-1	1635-1	1637-1	1639-1	1641-1	1643-1	1645-1	1647-1	1649-1	1651-1	1653-1	1655-1	1657-1	1659-1	1661-1	1663-1	1665-1	1667-1	1669-1	1671-1	1673-1	1675-1	1677-1	1679-1	1681-1	1683-1	1685-1	1687-1	1689-1	1691-1	1693-1	1695-1	1697-1	1699-1	1701-1	1703-1	1705-1	1707-1	1709-1	1711-1	1713-1	1715-1	1717-1	1719-1	1721-1	1723-1	1725-1	1727-1	1729-1	1731-1	1733-1	1735-1	1737-1	1739-1	1741-1	1743-1	1745-1	1747-1	1749-1	1751-1	1753-1	1755-1	1757-1	1759-1	1761-1	1763-1	1765-1	1767-1	1769-1	1771-1	1773-1	1775-1	1777-1	1779-1	1781-1	1783-1	1785-1	1787-1	1789-1	1791-1	1793-1	1795-1	1797-1	1799-1	1801-1	1803-1	1805-1	1807-1	1809-1	1811-1	1813-1	1815-1	1817-1	1819-1	1821-1	1823-1	1825-1	1827-1	1829-1	1831-1	1833-1	1835-1	1837-1	1839-1	1841-1	1843-1	1845-1	1847-1	1849-1	1851-1	1853-1	1855-1	1857-1	1859-1	1861-1	1863-1	1865-1	1867-1	1869-1	1871-1	1873-1	1875-1	1877-1	1879-1	1881-1	1883-1	1885-1	1887-1	1889-1	1891-1	1893-1	1895-1	1897-1	1899-1	1901-1	1903-1	1905-1	1907-1	1909-1	1911-1	1913-1	1915-1	1917-1	1919-1	1921-1	1923-1	1925-1	1927-1	1929-1	1931-1	1933-1	1935-1	1937-1	1939-1	1941-1	1943-1	1945-1	1947-1	1949-1	1951-1	1953-1	1955-1	1957-1	1959-1	1961-1	1963-1	1965-1	1967-1	1969-1	1971-1	1973-1	1975-1	1977-1	1979-1	1981-1	1983-1	1985-1	1987-1	1989-1	1991-1	1993-1	1995-1	1997-1	1999-1	2001-1	2003-1	2005-1	2007-1	2009-1	2011-1	2013-1	2015-1	2017-1	2019-1	2021-1	2023-1	2025-1	2027-1	2029-1	2031-1	2033-1	2035-1	2037-1	2039-1	2041-1	2043-1	2045-1	2047-1	2049-1	2051-1	2053-1	2055-1	2057-1	2059-1	2061-1	2063-1	2065-1	2067-1	2069-1	2071-1	2073-1	2075-1	2077-1	2079-1	2081-1	2083-1	2085-1	2087-1	2089-1	2091-1	2093-1	2095-1	2097-1	2099-1	2101-1	2103-1	2105-1	2107-1	2109-1	2111-1	2113-1	2115-1	2117-1	2119-1	2121-1	2123-1	2125-1	2127-1	2129-1	2131-1	2133-1	2135-1	2137-1	2139-1	2141-1	2143-1	2145-1	2147-1	2149-1	2151-1	2153-1	2155-1	2157-1	2159-1	2161-1	2163-1	2165-1	2167-1	2169-1	2171-1	2173-1	2175-1	2177-1	2179-1	2181-1	2183-1	2185-1	2187-1	2189-1	2191-1	2193-1	2195-1	2197-1	2199-1	2201-1	2203-1	2205-1	2207-1	2209-1	2211-1	2213-1	2215-1	2217-1	2219-1	2221-1	2223-1	2225-1	2227-1	2229-1	2231-1	2233-1	2235-1	2237-1	2239-1	2241-1	2243-1	2245-1	2247-1	2249-1	2251-1	2253-1	2255-1	2257-1	2259-1	2261-1	2263-1	2265-1	2267-1	2269-1	2271-1	2273-1	2275-1	2277-1	2279-1	2281-1	2283-1	2285-1	2287-1	2289-1	2291-1	2293-1	2295-1	2297-1
-----------------	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

வரைபடம் - காலகீதறு - நிகழ்ச்சமன்பாடு



அதற்கானது தாட்சனிலும் காலக் குறை-நிறைச் சமன்பாடு பூச்சியமாகும். மேலும் $E-14-25$ தி என்ற மீச் சிறு மதிப்பையும் $16-25$ தி என்ற மீப்பெரு மதிப்பையும் பெறும் காலத்தைத் தேராய்வுரைக்கக் கணக்கிடலாம்.

குறிப்பு : காலக் குறை-நிறைச் சமன்பாடு இரு காரணங்களால் ஏற்படுகிறது.

$$E = E_1 + E_2 \\ = (l-e) + (e-l) \text{ என்று பெறப்பட்டது.}$$

$$E_1 = (l-e)$$

கதிரவன் பாதை ஒரு சரியான வட்டமாயிருந்தால் $e=0$ ஆகும். அப்போது, $l=e$ எனப் பெறப்படும். எனவே $E_1=0$ ஆகும்.

கதிரவன் பாதை வளை நடுவையுமே ஒன்றுமாயின் $e=0$ ஆகும். அப்போது $e=l$ எனப் பெறப்படும். எனவே $E_1=0$ ஆகும். எனவே E இல் காணப்படும் இரு பகுதிகளில் E_1 என்பது, கதிரவன் பாதையில் சீரான கோணவேகம் பெறுமளிரும்பதின் விளைவு; E_2 என்பது, கதிரவன் பாதை நடுவையுக்கு m அளவு சாய்வு பெற்றிருப்பதின் விளைவு.

$$12.7.4 : \text{காரணமே அளவு—மாலை தே.அளவு} = 2E$$

காரணமே அளவு என்பது தேற்றக் கதிரவன் உதயத்திற்கும், ச.க. நண்பகலுக்கும் உள்ள கால இடைவெளி என்றும் மாலை தேர அளவு என்பது ச.க. நண்பகலுக்கும் தேற்றக் கதிரவன் மறைவுக்கும் உள்ள கால இடைவெளி என்றும் வரையறுக்கப் படுகின்றன. தேற்ற நண்பகல் என்பது தேற்றக் கதிரவன் உதயத்திற்கும் தேற்றக் கதிரவன் மறைவுக்கும் உள்ள மைய தேர மாகும். எனவே தேற்றக் கதிரவன் உதயத்திலிருந்து தேற்ற நண்பகலுக்குள்ள தேரம், தேற்ற நண்பகலிலிருந்து தேற்றக் கதிரவன் மறைவுக்குள்ள தேரத்திற்குச் சமம்.



X, A, M, Y என்ற புள்ளிகள் முறையே தேற்றக் கதிரவன்-உதயம், தேற்ற நண்பகல், ச.க. நண்பகல், தேற்றக் கதிரவன்-மறைவுகளைக் குறிக்கும். இப்போது $XA = AY$

XM —காலை நேர அளவு.

MY —மாலை நேர அளவு

$$\begin{aligned}\text{காலை நேர அளவு—மாலை நேர அளவு} &= XM - MY \\ &= (XA + AM) - (AY - AM) \\ &= AM + AM \\ &= 2AM \\ &= 2E\end{aligned}$$

மேலே திறுவப்பட்டுள்ள வாய்பாட்டில் ஒரு தட்பொழுத்தில் ஏற்படும் கதிரவனின் நடுவரை விலைக்கம் சிந்தெனக் கொண்டு அச்சிறு மாறுதல் ஏற்றுக்கொள்ளாமல் விடப்பட்டது. அச்சிறு நடுவரை விலைக்க மாறுதலையும் ஏற்றுக்கொண்டால் நேரத்தக் கதிரவன் உதயத்திற்கும், நேரத் தண்பகலுக்கும் உள்ள வேரம், நேரத் தண்பகலுக்கும் நேரத்தக் கதிரவன் மறைவுக்கும் உள்ள நேரத்திலிருந்து சிறிது மாறுபடும். கதிரவன் உதிக்கும்போது h நேரக்கோணம் எனவும் δ அப்போதைய நடுவரை விலைக்கம் எனவும் கொள்வோம். கதிரவன் மறையும்போது நடுவரை விலைக்கம் $\delta + 4^\circ$ ($\Delta\delta$ மிகச் சிறியது) எனக் கொள்வோம், உதய நேரத்தில் $\cos h = -\tan \phi \tan \delta$ என நாம்றிவோம். வகை துண்டொன்று பிரித்தெழுதினால்,

$$-\sin h \Delta h = -\tan \phi \sec^2 \delta \Delta \delta.$$

$$\begin{aligned}\therefore \Delta h &= \frac{\tan \phi \sec^2 \delta \Delta \delta}{\sin h} \\ &= \frac{\tan \phi \sec^2 \delta \Delta \delta}{\sqrt{1 - \tan^2 \phi \tan^2 \delta}} \\ &= \frac{\sin \phi \sec \delta \Delta \delta}{\sqrt{\cos^2 \phi \cdot \sin^2 \delta}}\end{aligned}$$

மாறித் திறும்ப நிலையிலிருந்து கோடைத்திறும்ப நிலைவரை $\Delta\delta$ சிறிதுசிறிதாக வளர்ந்து செல்வதால் அத்தக வரல இடைவெளியில் நேரத் தண்பகலிலிருந்து நேரத்தக் கதிரவன் மறைவுவரையுள்ள நேரம், நேரத்தக் கதிரவன் உதயத்திலிருந்து நேரத் தண்பகல் வரையுள்ள நேரத்தைவிட அதிகமாகும். இவ்வறிதப்படியான நேரம் $\Delta h/15$ மணிகள். மீதியுள்ள அளவையாண்டு காலத்தில் நேரத் தண்பகலிலிருந்து நேரத்தக் கதிரவன் மறைவு வரையுள்ள நேரம் நேரத்தக் கதிரவன் உதயத்திலிருந்து நேரத் தண்பகல் வரையுள்ள நேரத்தைவிடக் குறைவாகும்.

12-8 : பருவங்கள் (Seasons)

வானியலறிஞர்கள் ஆண்டின் நான்கு பருவங்களாகப் பிரித்து இருக்கின்றனர். அவையாவன : இளவேனில் காலம் (பருவம்); கோடைக் காலம்; இலையுதிர் காலம்; குளிர்காலம். படம் 12-8இல் காட்டியுள்ள நீள்வட்டம், மண்ணுலகைச் சுற்றி வரும் கதிரவனின் தோற்றப்பாதையைக் குறிக்கட்டும். மண்ணுலகு E, நீள்வட்டத்தின் ஒரு குவியத்தில் அமைந்துள்ளது. மார்க்சு 21, செப்டம்பர் 23 ஆகிய தேதிகளில் கதிரவன் மூன்றாய் $E\gamma$, $E\alpha$ என்ற நிலைகளில் அமைந்திருக்கும். $\gamma E\alpha$ என்ற கோட்டிற்கு சம இரவுப் புள்ளிக்கோடு எனப் பெயர். E வழியாக $\gamma E\alpha$ க்குச் செங்குத்தாக S_1ES_2 என்ற கோடு வரைக. அக்கோட்டிற்குக்



படம் 12-8

கதிரவன் திரும்புதலுக்கு கோடு எனப்பெயர். கதிரவன் S_1 க்கு ஜூன் 22த் தேதியும் S_2 க்கு டிசம்பர் 22த் தேதியும் வந்தடைகிறது. மண்ணுலகை வடகோளப் பாதியில் உட்களவர்களுக்கு இளவேனில் காலமானது, கதிரவன் γ இலிருந்து S_1 வரும்வரையும், வேனிற் காலமானது கதிரவன் S_1 இலிருந்து α வரும் வரையும், இலையுதிர் காலமானது கதிரவன் α இலிருந்து S_2 வரும் வரையும்; மார்க் காலமானது கதிரவன் S_2 இலிருந்து γ வரும்வரையும் நீடிக்கும். எனவே ஒவ்வொரு பருவமும் எவ்வளவு காலம் நீடிக்கிறதெனக் கணிக்கலாம். கெப்ளரின் இரண்டாவது விதிப்படி, பரப்பு வேகம் சீரானதாகலின், நான்கு பருவங்களும் அத்தான்சு பரப்புப் பகுதி களுக்கு விசை சமத்திலிருக்கும்.

எனவே,

$$\frac{\text{இளவேனில் பரப்பு } \gamma ES_1}{\text{கோடை பரப்பு } S_1E\alpha} = \frac{\text{இலையுதிர் பரப்பு } \alpha ES_2}{\text{குளிர் பரப்பு } S_2E\gamma} \\ = \frac{\gamma}{\text{நீள்வட்டத்தின் பரப்பு.}}$$

இங்கு y என்பது நான்கு பருவங்களின் கூட்டு அளத்தைக் குறிக்கும் ஓரண்டு அளம். மேற்கண்ட சமன்பாட்டிலிருந்து கோடைக் காலம் நீண்ட காலமென்றும் குளிர் காலம் குறைந்த காலமென்றும் பெறப்படுகிறது. மேலும் இரையுதிர் காலத்தைவிட இளவேனிற் காலம் நீண்டது என்றும் பெறப்படுகிறது.

12-8-1. பருவங்களின் கால அளவுகளைக் கணிக்கும் வாய்பாடு

தோற்றக் கதிரவனின் நெட்டாங்குகள் $0, \frac{\pi}{2}, \pi, \frac{3\pi}{2}, 2\pi$

ஆக இருக்கும்போது இவர்களிடக் கதிரவனின் நெட்டாங்குகள் முறையே l_0, l_1, l_2, l_3, l_4 எனக் கொள்வோம். அப்போது, இளவேனிற் காலம், வேனிர்காலம், இரையுதிர் காலம், குளிர்காலம் இவற்றின் நீடிப்புகள் முறையே மின்வரும் காலங்களாகும் : இவர்களிடக் கதிரவன் சீரான கோண வேகத்தில், சூறாவலு, $\frac{2\pi}{y}$ கோண வேகத்தில்

1. $l_1 - l_0$ மயணம் செய்வுற் தேரம் (இ.வே).

2. $l_2 - l_1$ " " (வே)

3. $l_3 - l_2$ " " (இலை)

4. $l_4 - l_3$ " " (குளிர்)

5. இளவேனிற் காலம் நீடிப்பது,

$$\frac{(l_1 - l_0) y}{2\pi} \text{ நாட்கள் ;}$$

$$\text{வேனிற் காலம்} \quad \frac{(l_2 - l_1) y}{2\pi} \text{ நாட்கள் ;}$$

$$\text{இரையுதிர் காலம்} \quad \frac{(l_3 - l_2) y}{2\pi} \text{ நாட்கள் ;}$$

$$\text{குளிர் காலம்} \quad \frac{(l_4 - l_3) y}{2\pi} \text{ நாட்கள்.}$$

ஆகவே $l - c = -2c \sin(l - k)$ என நாம்றிவோம்.

$\therefore l = c - 2c \sin(c - k)$ எனத் தோராயமாகக் கொள்ளலாம்.

$c = 0$ ஆகும்போது $l = l_0$

எனவே $c = 0$ இல், $l_0 = -2c \sin(0 - k)$

$$= 2c \sin k.$$

$$c = \frac{\pi}{2} \text{ இல், } = l_1 : \therefore l_1 = \frac{\pi}{2} - 2c \sin\left(\frac{\pi}{2} - k\right)$$

$$= \frac{\pi}{2} - 2c \cos k.$$

$$c = \pi \text{ இல், } l = l_2; \therefore I_2 = \pi - 2c \sin(\pi - k) \\ = \pi - 2c \sin k.$$

$$c = \frac{3\pi}{2} \text{ இல், } l = l_3; \therefore I_3 = \frac{3\pi}{2} - 2c \sin\left(\frac{3\pi}{2} - k\right) \\ = -\frac{3\pi}{2} + 2c \cos k.$$

$$c = 2\pi \text{ இல், } l = l_4; \therefore I_4 = 2\pi - 2c \sin(2\pi - k) \\ = 2\pi + 2c \sin k.$$

$$\therefore \text{இனவேலிற் கால அளவு} = \frac{l_1 - l_2}{2\pi} \gamma. \\ = \frac{\gamma}{2\pi} \left[\frac{\pi}{2} - 2c (\cos k + \sin k) \right] \\ \text{நாட்கள்.}$$

$$\text{கோடைகால அளவு} = \frac{l_2 - l_3}{2\pi} \gamma. \\ = \frac{\gamma}{2\pi} \left[-\frac{\pi}{2} - 2c (\sin k - \cos k) \right] \\ \text{நாட்கள்.}$$

$$\text{இலையுதிர்கால அளவு} = \frac{l_3 - l_4}{2\pi} \gamma \\ = \frac{\gamma}{2\pi} \left[\frac{\pi}{2} + 2c (\cos k + \sin k) \right] \\ \text{நாட்கள்.}$$

$$\text{குளிர்கால அளவு} = \frac{l_4 - l_1}{2\pi} \gamma \\ = \frac{\gamma}{2\pi} \left[\frac{\pi}{2} + 2c (\sin k - \cos k) \right] \\ \text{நாட்கள்.}$$

ஆன்மைநிலையின் நெட்டாக்கு $k = 258^\circ$, $c = 0.1674$
 $\gamma = 365.2422$ நாட்கள் எனக்கொண்டு பருவகாலங்களின்
 நாட்களைக் கணக்கிட்டால் இனவேலிர்காலம் 22 நாட்கள் 20-2
 மணிகள்; கோடைகாலம் 38 நாட்கள் 14-4 மணிகள்; இலையுதிர்
 காலம் 39 நாட்கள் 18-7 மணிகள்; குளிர் காலம் 59 நாட்கள் 0-8
 மணிகள் எனப்பெறப்படும்.

குறிப்பு: மன்னாறுவக வடகோணப் பாதிமீத பருவங்கள்
 இனவேலிற் காலம், கோடைகாலம், இலையுதிர் காலம், குளிர்

காலமாகிடுக்கும்போது, மண்ணுலக தென்கோளப் பாதியில் அப்பகுதியைக் குகையே இரையுதிர் காலம், குளிர் காலம், இளவேளிர்காலம் கோடை காலமாகிடுக்கும்.

12-8-1: வெப்ப அளவு

மண்ணுலகில் பருவங்களுத்தோறும் வெப்பநிலை மாறி வருவது தமது அனுபவம்.

ஒரு நாட்பொழுதில் ஒரு குறிப்பிட்ட இடத்திலே உள்ள வெப்ப அளவு மூன்று காரணங்களால் பாதிக்கப்படும்.

1. கதிரவன் அகிலிடத்தில் அன்று தொடுவானத்திற்கு மேல் இருக்கும் மொத்த நேரம் ;

2. கதிரவன் அகிலிடத்தில் அன்று பெறும் மீட்பெரு ஏற்றக் கோணம் ;

3. அன்று கதிரவனுக்கும் மண்ணுலகிற்கும் உள்ள தூரம்.

முதல் காரணப்படி ஒரு நாள் கதிரவன் தொடுவானத்திற்கு மேல் நீண்ட காலம் இருக்குமானால், அன்று வெப்பம் அதிகமாகிடுக்க வாய்ப்புண்டு.

மூன்றாவது காரணப்படி, கதிரவன் மண்ணுலகிற்கு அண்மையில் இருக்குமானால் அன்று வெப்பம் அதிகமாகிடுக்க வாய்ப்புண்டு. இரண்டாவது காரணப்படி, கதிரவனின் உச்சி வட்ட ஏற்றக் கோணம் அதிகமிருக்கும் பருதிகளில் கதிரவனின் கதிர்கள் செங்குத்தாக விழும். அப்போது அதிக வெப்பமிருக்கும். கதிரவனின் உச்சி கடக்கும்போதுள்ள ஏற்றக்கோணம் குறைவாக இருக்கும் பருதிகளில் கதிரவனின் கதிர்கள் செங்குத்தாக விழுவதில்லை. அத்தகைய இடங்களில் ஒளிக் கதிர்கள் பரவலாக விழ ஏதுவாவதுமிகுநாமல் அச்சமயத்தில் வெப்ப ஒளிக் கதிர்கள் மண்ணுலகிற்கு மேலுள்ள வளி மண்டலத்தில் அதிக தூரம் செல்வதாலும் அம்மண்டலத்தின் சுரப்புச் சக்தியாலும் வெப்பம் குறைந்து விடுகிறது. இத்தகைய காரணங்களினால் கதிரவன் உச்சி வட்ட ஏற்றக் கோணம் குறைந்துள்ள பருதிகளில் வெப்பம் குறைந்து விடுகிறது.

மண்ணுலக வடகோளப் பாதியில் எந்த ஒரு இடத்திலும் கோடைகாலத்தில் இரவைவிட பகற்பொழுது அதிகமாகவும், குளிக்காலத்தில் பகற்பொழுதைவிட இரவு நேரம் அதிகமாகவும் இருக்கும். அகலங்குப்பெற்ற ஓரீடத்தில் கதிரவனின் அன்றைய வள ஏற்றம் δ ஆகும், கதிரவன் அன்று உச்சி கடக்கும்போது அதன் ஏற்றக் கோணம், $90 - \delta + \delta$ ஆகும். கோடை காலத்தில்

6-ன் மதிப்பு கூட்டுத் தொகையாகவும், குளிர்காலத்தில் 6-ன் மதிப்பு குறை மதிப்பாகவும் இருப்பதனால் கோடைசிக் கதிரவன் உச்சி கடக்கும்போது ஏற்றக் கோணம் அதிகமாகவும் குளிர்காலத்தில் அக்கோணம் குறைவாகவும் இருக்க வாய்ப்பேற்படுகிறது. ஆனால் கோடையில் கதிரவன் குளிர் வலத்தில் இருப்பதைவிட மண்ணுலகிலிருந்து அதிகமான தூரத்தில் இருப்பதால் அந்தக் காரணத்தால் வெப்பம் கோடை காலத்தில் குறைவாகவும் குளிர்காலத்தில் அதிகமாகவும் இருக்க வாய்ப்பு ஏற்படுகிறது. ஆனால் முதலிரண்டு காரணங்களினால் கோடையில் அதிகவெப்பம் ஏற்படுவதில்லை, மூன்றாவது காரணத்தால் ஏற்படும் வெப்பக் குறைவினால் கோடையில் வெப்பக் குறைவாகத் தோன்றுவதில்லை. இவ்வாறாக, கோடையில் அதிக வெப்பத்தைப் பெறவும் குளிர்காலத்தில் குறைந்த வெப்பத்தைப் பெறவும் மண்ணுலக வட பாதியில் உள்ள பகுதிகளுக்கு வாய்ப்புக்கள் உண்டு.

மண்ணுலக தென் பாதியில் உள்ள பகுதிகளுக்கு மேற்கூறப்பட்ட இரு காரணங்களால் கோடையில் வெப்பம் அதிகமேற்படுகிறது. மற்றும் இப்பகுதிகளில் கோடையில் கதிரவன் பூரிக்கு அருகிலும் குளிர்காலத்தில் பூமியைவிட்டு தூரத்திலும் இருப்பதால் மண்ணுலக வடகோளப் பாதியில் கோடை காலத்தைவிடத் தென் கோளப் பாதியில் கோடை காலம் அதிகம் வெப்பம்பெற வாய்ப்புள்ளது. ஆனால் தென்கோளப் பாதி நீர் நிறைந்த பகுதியாதலின் திடம் நிறைந்த வடகோளப் பாதியைப்போல் வெப்பமாவதில்லை.

12° 8' 2" மண்ணுலகின் வடபாதியில் சிறப்பாக 7.4 மீதவெப்ப மண்டலத்தில் ஒரு குறிப்பிட்ட வட அகலங்கு ($50 < \phi < 90^\circ$) பெற்ற இடத்தில் ஓராண்டு காலத்தில், பருவ நிலைகள் மாறும்போது தட்ப வெப்ப நிலைகளில் ஏற்படும் மாறுதல்களைப்பற்றிச் சற்று விவரமாக ஆராய்வோம்.

கதிரவன் γ புள்ளியைக் கடப்பதிலிருந்து வேளிந்திருப்பப் புள்ளியைக் கடக்கும்வரை (மார்ச்சு 21 முதல் ஜூன் 22 வரை) இளவேனிற்காலம். அம்முன்று மாத இடைவெளியில் கதிரவனது தடுவரை விலக்கம் 0° முதல் $23\frac{1}{2}^\circ (=)$ வரை வளர்கிறது.

ஜூன் 22 முதல் செப்டம்பர் 22 வரை வேளிர்காலம்; அம்முன்று மாத இடைவெளியில் கதிரவனது தடுவரை விலக்கம் $23\frac{1}{2}^\circ$ முதல் 0° வரை குறைந்துவருகிறது.

எடுத்துக் காட்டாக, ஏப்ரல் முதல் தேதி, அதாவது கதிரவன் γ வலத்திலுண்டிருக்க சில நாட்களுக்குப்பிறகு ஒரு நாள் கதிரவனது

நடுவரை விலக்கம் δ ஆக இருக்குமானால், செட்டம்பர் 22க்குச் சில நாட்கள் முன்பு, ஏதாவது ஒரு நாள் அதன் நடுவராவிலக்கம் அதே δ ஆக இருக்கும்.

இங்ஙனாக, கதிரவனது நடுவரை விலக்கங்கள் சமமாக இருக்கும் வகையில் இனவேனிர்காலத்தில் உட்கன நாட்களையும், வேனிற் காலத்தில் உட்கன நாட்களையும், இரட்டை, இரட்டையாக இணைக்கமுடியும்; அப்படி இணைக்கப்பட்ட சுருகு நாட்களில் கதிரவன் நடுவரை விலக்கங்கள் சமமாக, கதிரவன் திசைப் பாதைகள் ஒன்றேயாகும் (ஒருக்கிழிவுக்கும்). அப்படி இரட்டை, இரட்டையாகப் பாகுபடுத்தப்பட்ட நாட்களில், கதிரவன் தொடுவானத்திற்குமேல் உட்கன கால இடைவெளிகள் சமமாகிருக்கும். ($\cos \delta = -\tan \phi \tan \delta$: தொடுவானத்திற்குமேலிருக்கும் நேரம்,

$$\text{அதாவது பகற்பொழுது} = \frac{24}{15} \text{ மணிகள்.})$$

இதிலிருந்து நாம் வெகுலாக,

‘இனவேனிற் காலத்திலும், வேனிற் காலத்திலும் உட்கன சராசரி வெப்பநிலைகள் (Mean Temperatures) சமமாக இருக்கலாம்’

என்ற முடிவுக்குவர இடமிருக்கிறது. அதாவது, இனவேனிற் காலமும், கோடை காலமும் சமவெப்பநிலையவைவென்றே முடிவு கட்டலாம். ஆனால் அது உண்மை நிலைக்குப் புறம்பானது. ஏனெனில் :

இனவேனிர்காலம் ஆரம்பிக்கு முன் குளிர்காலம். குளிர்காலத்தில் குளிர்ந்த பூமி, அடுத்து இனவேனிர்காலத்தில் சிந்தி சிந்தாகச் சூடுபிடிக்க ஆரம்பிக்கிறது; கதிரவன் ஏற்றக் கோணமும் வளர வளர ($90 - \phi$ முதல் $90 - \phi + w$ வரை) வெப்பம் அதிகமாகிக்கொண்டே போகிறது. ஜூன் 22ம் தேதி, மீப்பெரு பகல் காலம் பெத்திருப்பதில்லாமல் கதிரவன் ஏற்றக் கோணம் ($உச்சி$ கடக்கும்போது) மீப்பெரு மதிப்பான $90 - \phi + w$ மதிப்பைப் பெறுகிறது. எனவே, அன்றுதான் நாம் கொண்ட மண்ணுலகப் பகுதியில், பகலில் கதிரவனிடமிருந்து பெறும் வெப்பத்திற்கும், இரவில் தான் இழக்கும் வெப்பத்திற்கும் உட்கன வேறுபாடு மீப்பெரு அளவு உட்கனதாகும். அதன் காரணமாக, அன்றுதான் மீப்பெரு வெப்ப நாள் (hottest day) என்ற கூறிவிட முடியாது. இதற்குப் பின்புலம் ஆய்விடம், பகலில் பெறும் வெப்பம், இரவில் இழக்கும் வெப்பத்தைவிட மிகுதியாகவே இருக்கும், எனவே, ஜூன் 22ம் தேதிக்குப் பின்பும் மண்ணுலகில்

வெப்பம் அதிகரிக்கும். ஏனெனில் பகற்பொழுதில் பெறும் வெப்பமும் இரவுப் பொழுதில் இழக்கும் வெப்பமும் சமமாகும் என்ற, அக் வெப்ப மிழந்தீடும் இழந்துகொண்டே மிகுக்கும். இந்தச் சமநிலை ஏறக்குறைய ஆகஸ்டு மாதம் ஆரம்பமாகும் சமயம், பின்னர்தான் வெப்பம் குறைவ ஆரம்பிக்கும். எனவே இளவேனிற்காலத்தைவிட வேனிர்காலத்தில் வெப்பம் அதிகம்; ஜூன் 22ம் தாளன்று பகற் பொழுது மீப்பெரு நீட்சி பெற்றிருப்பினும், மீப்பெரு வெப்பநாள் அதன் பின்னரே ஏறக்குறைய ஆகஸ்டு முதல் வாரத்தில் தான் வரும் என்பது புலனாகிறது.

மீப்பெரு வெப்பநாளுக்குப் பின்பு, அல்லிடைத்தில் வெப்ப இழப்பு, வெப்பம் பெறுவதைவிட மிகும். இறுப்பினும், பூமி, தான் பெறும் வெப்பத்தைத் தன்னகத்தே சேமித்து வைக்கக்கூடிய இயல்பு பெற்றிருப்பதால், பகற்காலம் தொடர்ந்து வெப்பமாகவேயிருக்கும். இல்லுதிர்சாலம் வரை, இவ் வெப்பநிலை நீடிக்கும். இல்லுதிர்சாலம் ஆரம்பமானபிறகு, பகற்பொழுது குறைத்து, இரப்பொழுது மிகுதியாகும்; கதிரவன் தினசரிப் பாதை, வான நடுவரைக்குக் கீழே தாழ்த்துகொண்டே போகும்.

டிசெம்பர் 22ம் தாள், மீச்சிறு பகற்பொழுதும் மீப்பெரு இரப்பொழுதும் பெற்றதொரு நமக்குத் தெரியும். அன்று, வெப்பக்கதிர் வீச்சல் (Radiation) காரணமாக இரவில் ஏற்படும் வெப்ப இழப்பு அதிகம்; மேலும் பகலில் பெறும் வெப்ப அளவும் குறைவு. இறுப்பினும் டிசெம்பர் 22ம் தாள், மிகக் குளிர்ந்த தாள் என்று கூறுவதற்கில்லை.

ஏனெனில்,

டிசெம்பர் 22ம் தாளுக்குப் பின்பும், மேலும் ஏறக்குறைய 40 நாட்கள் வரை, வெப்பக் கதிர்வீச்சல் காரணமாக, பூமி இழக்கும் வெப்பம், பூமி பெறும் வெப்பத்தைவிட அதிகம். இரண்டும் சமநிலை யடைவது ஏறக்குறைய மிப்ரவரி முதல் வாரத்தில்தான். அப்போது தான் மிகக் குளிர்ந்த தாள் (coldest day) ஏற்படும். மிப்ரவரி மாதம் தான் மிகக் குளிர்ந்த காலம். இந்த நிலை தமிழ் மாதங்கள் கை, மாசியில் ஏற்படுவதால்தான் 'கடையும் மாசியும் வைபகத்துறக்கு' என ஆண்டு முழுவதும் சொல்லப்படுகிறது.

எனவே இல்லுதிர் காலத்தைவிட குளிர்காலத்தில்தான் குளிர் அதிகம்; மேலும் டிசெம்பர் 22ம் தாள் மீச்சிறு பகற்பொழுதுடைய தாயினும், அது மீப்பெரு குளிர்ந்த தாளாகாது; அதன் பின்னரே தான் மீப்பெரு குளிர் தான் வரும்.

இதற்கு நேரெதிர்மாதிரி, மண்ணுலகத் தென் பாதியில் (Southern hemisphere) உள்சுளங்களுக்கு, மீள்வளிமூதல் வரத்தில் தான் மீப்பெரு வெப்பமுடைய காலமும், ஆகஸ்டு முதல் வரத்தில் தான் மீப்பெரு குளிக்காலமும் நிலவுமென்பதைக் காண்க.

12-5-8 வெப்ப மண்டலங்களில், ஆதாவது கடகரேகைக்கும் மகர ரேகைக்கும் இடைப்பட்ட மண்ணுலகப் பகுதிகளில், $(0 < \phi (N.S.) < 30)$ பகல் இரவுப் பொழுதுகளில் பெரிய வேறுபாடுகள் இல்லை; அதிரவன் ஏற்றக்கோணத்தில் பெரிய வேறுபாடுகள் இல்லை. ஆண்டு முழுவதுமே, அதிரவன் மேஜுரீரீ (r)க்கு அருகாமையிலே உச்சி கடக்கும், ஆகவே பருவங்கள் காரணமாக, தட்ப வெப்ப நிலைகளில் பெரிதும் மாற்றங்கள் ஏற்படுவதில்லை. ஆனாலும், தெற்கு, வடக்கு வெப்ப மண்டலங்களில் ஆண்டு முழுவதுமே, வெப்பநிலை சற்றுக் கூடுதலாகவே இருக்கும். குளிர் காலத்தில் இரவில் குளிர் சற்று மிகுதியாக இருப்பினும், பகல் சற்று வெப்பமாகவேயிருக்கும். இளவேனில் காலத்தைவிட வேளிநகரம் மிகுதியான வெப்பமாகவும், இலைவழிநீகாலத்தைவிட குளிர்காலம் மிகுதியான குளிராகவும் இருக்கும்.

மண்ணுலகில் குளிர் மண்டலங்களில் ($N.S. \phi > 66\frac{1}{2}^{\circ}$) ஆண்டு முழுவதுமே அதிரவன் திசையில் பாகை, தொடுவானம் பக்கமாகவே மிகுதியாகச் சாய்ந்திருப்பதால், தன்மையில் கூட, அதிரவன் மிகத் தாழ்த்தேயிருக்கும். நிலைத்த பகற்காலங்களில்கூட அதிரவன் வெப்பம் அதிகவிரைது; ஆனால் நிலைத்த இரவுக் காலங்களில் குளிர் மிகமிக அதிகமாகவேயிருக்கும்.

குறிப்பு

பின்வரும் சொற்சொட்டிக் குறுக்கங்கள் (Abbreviation of terms and expressions) இத்தூதலில் வெகுநகரம் பயன்படுத்தப்படும்:

சொற்சொட்டி	குறுக்கம்
மீள்வழி நேரம் (Sidereal Time)	மீ. வ. நேரம்
தோற்றக் அதிரவன் வழி நேரம் (Apparent Solar Time)	தோ. ச. நேரம்
சராசரிக் அதிரவன் வழி நேரம் (Mean Solar Time)	ச. ச. நேரம்
கிரீனிக் மீள்வழி நேரம் (Greenwich Sidereal Time)	கி. மீ. வ. நேரம்

சொந்தொருடர்	குறியீடுகள்
கிரீனிக் நேரத்தக் கதிரவன் வழி நேரம் (Greenwich Apparent Solar Time)	கி. நேர. க. நேரம்
கிரீனிக் சராசரிக் கதிரவன் வழி நேரம் (Greenwich Mean Solar Time ஆங்கிலம் Greenwich Mean Time (G.M.T.))	கி. ச. க. நேரம்
நேரத்தக் கதிரவன் (Apparent or Real Sun)	நேர. க.
இயக்க விடைக் கதிரவன் (Dynamical Mean Sun)	இ. இ. க.
சராசரிக் கதிரவன் (Astronomical Mean Sun ஆங்கிலம் Mean Sun)	ச. க.
மீன் வழி (Sidereal)	மீ. வ.
இந்திய நியம நேரம் (Indian Standard Time)	இ. நி. நேரம்
காலக் குறை - நிகழச் சமன்பாடு (Equation of Time)	E
கிழக்கு ; மேற்கு ; வடக்கு ; தெற்கு	முதலையே கி. மே. வ. தெ.

பயிற்சி 12 B

(1) மீன்வழி நேரம், நேரத்தக்கதிரவன் நேரம், சராசரி நேரம் இம்முள்ளும் என்னவென வரையறுத்துக் கூறுக.

அவை ஒவ்வொன்றும் ஏன் தேவைப்படுகின்றன என்பதை விளக்குக.

(2) $\Delta\alpha = \Delta\alpha \cos \omega \sec \delta$ என்பதை நிறுவுக. இது கொண்டு Eஇன் ஒரு பகுதியான E_2 இல் ஏற்படும் மாறுதல்களை விளக்குக. எப்போது E_1 தனது மீப்பெரு, மீச்சிறு மதிப்புகளைப் பெறுகிறது?

(3) $E = E_1 + E_2$ என்ற காலக்குறை-நிகழச் சமன்பாட்டில் E_1 இன் மீப்பெரு மதிப்பு $\frac{84e}{\pi}$ மணிபெனவும், E_2 இன் மீப்பெரு

மதிப்பு $\frac{12}{\pi} \tan^2 \frac{\omega}{2}$ மணி எனவும் திறவுக. E_1 தளது மீடுபெறு

மதிப்பேற்றும்போது $\sin \phi = \cos \alpha = \frac{1}{\sqrt{2}} \sec \left(\frac{\omega}{2} \right)$ என
திறவுக.

(4) மரபுப்படி α, ϕ எடுத்துக்கொண்டால்,

$$\frac{\sin (\phi - \alpha)}{\sin (\phi + \alpha)} = \tan^2 \frac{\omega}{2} \text{ என திறவுக.}$$

$$\left[\frac{\tan \phi}{\tan \alpha} = \frac{1}{\cos \omega} \text{ என தமக்குத் தெரிவு.}$$

$$\begin{aligned} \text{எனவே } \frac{\tan \phi - \tan \alpha}{\tan \phi + \tan \alpha} &= \frac{\sin (\phi - \alpha)}{\sin (\phi + \alpha)} \\ &= \frac{1 - \cos \omega}{1 + \cos \omega} = \tan^2 \frac{\omega}{2} \end{aligned}$$

(5) மண்ணுலகப் பாதை ஒரு சரிவான வட்டமாக இருக்கு
மாகும்,

காலக்குறை-நிறைச் சமன்பாடு =

$$\frac{720}{\pi} \tan^{-1} \left[\frac{(1 - \cos \omega) \tan \phi}{(1 + \cos \omega) \tan^3 \phi} \right] \text{ என திறவுக.}$$

$$\left[\phi = 0 \text{ எனவே } E_1 = 0; E_2 = \phi - \alpha \right]$$

$$\therefore E = 0 + (\phi - \alpha) = (\phi - \alpha) \text{ மட்டுமே,}$$

$$\begin{aligned} \therefore \tan E &= \tan (\phi - \alpha) = \frac{\tan \phi - \tan \alpha}{1 + \tan \phi \tan \alpha} \\ &= \frac{\tan \phi \left(1 - \frac{\tan \alpha}{\tan \phi} \right)}{1 + \tan \phi \tan \alpha \cos \omega} \\ &= \frac{\tan \phi (1 - \cos \omega)}{1 + \tan^2 \phi \cos \omega} \end{aligned}$$

(6) E_2 இன் மதிப்பு தன் மீடுபெறு அல்லது மீச்சிறு மதிப்பை
ஏற்கவேண்டுமானால் $\tan \phi = \sqrt{\sec \omega}$; $\tan \alpha = \sqrt{\cos \omega}$ என
திறவுக.

$$\left[E_2 = \frac{\tan \phi (1 - \cos \omega)}{1 + \cos \omega \tan^2 \phi}, (\text{கனக்கு 5-ன் மூலம்}) \right]$$

$$\frac{dE_z}{ds} = \frac{(1 - \cos \omega) \sec^2 \phi (1 + \cos \omega \tan^2 \phi) E - \tan \phi (1 - \cos \omega) \cos \omega \tan \phi \sec^2 \phi}{(1 + \cos \omega \tan^2 \phi)^2}$$

$$\frac{dE_z}{ds} = 0 \text{ ஆகும்போது}$$

$$1 + \cos \omega \tan^2 \phi = 2 \tan^2 \phi \cos \omega$$

$$\therefore \tan^2 \phi \cos \omega = 1$$

$$\tan \phi = \sqrt{\sec \omega}$$

$$\text{அப்போது } \tan \alpha = \tan \phi \cos \omega$$

$$= \sqrt{\cos \omega} \quad]$$

(7) கதிரவன் உதயம் மறைவு மூன்றையே 5 ம 37 நி; 18 ம 24 நி அன்று நண்பகலில் E இன் மதிப்பென்ன. (செ)

(8) கதிரவன் உதயம் 5 மணி 59 நி; அன்று $E = 4$ நி 8 வி. கதிரவன் சாய்வு எப்போது? (செ)

(9) கிரீனிகில், ச. க. நேரங்கள் t , t' ஆக இருந்தபோது, நேர. கதிரவனின் நேரக்கோணங்கள் (பாகையளவில்) மூன்றையே, k , k' அதற்கு முந்திய ச. க. நண்பகலில் $E = \frac{k'}{16 (t-t')}$ ச. க. மணிக்காலமென திறவுக. (செ)

(10) கதிரவன் γ இல் இருந்தபோது E இன் மதிப்பு—7 நி. 29 வி. வேனித்திருப்பப் புள்ளியில் E இன் மதிப்பு—1 நி. 37 வி. மண்ணுலக வட்டக்கு மண்டலத்தில் இளவேனிதகாலம் 92 நாள் 19.2 மணி விடுக்குமென திறவுக. (செ)

(11) கதிரவன் உதயம் 5 ம. 4 நி. 10 வி; சாய்வு 19 ம 50 வி. உதய மூதல் சாய்வுவரை, E இன் மதிப்பு மாறுதிருத்ததென்ற அடிப்படையில் அதன் மதிப்பென்ன? (செ)

(12) ஒரு நாள் கதிரவன் நேரக்கோல், ச. க. காலம் காட்டும் காலத்தைவிட 10 நிமிடம் அதிகமாகக் காட்டிற்று. அன்று E இன் மதிப்பென்ன? காலை நேரமெவ்வளவு? மாலை நேரமெவ்வளவு? (செ)

(13) ஓரண்டில் வேனிதகாலம், இளவேனித காலத்தைவிட 9 நாட்கள் அதிகம்; இலையுதிர் காலத்தைவிட 8 நாட்கள் அதிகம், அப்போது மண்ணுலக நீள்வட்டப் பாதையின் குவிமையப்

நிறைவு காண்க; அதாவது ஆண்டின் நீளம் கண்டறியுங்கள்.

(14) இவ்வெளிப்பாட்டில் ஆரம்பித்து, தாக்கு பருவங்களின் நீளங்களைக் காண்க.

$$(1) A - B \sin\left(\frac{\pi}{4} + k\right); (2) A + B \cos\left(\frac{\pi}{4} + k\right)$$

$$(3) A + B \sin\left(\frac{\pi}{4} + k\right); (4) A - B \cos\left(\frac{\pi}{4} + k\right)$$

எனத் தோராய மதிப்பைப் பெற்றவை என நிறுவுக.

A = காலம்; k = அதாவது ஆண்டின் நீளம் கண்டறியுங்கள்; B : $4A = \pi \sqrt{2}$ எனச் சமன்பாட்டினைப் B ஒரு மாறியாகக் கொள்க.

(15) மண்ணுவகை தென்பாதிக்க, பருவங்களின் கால நீளங்களைக் கணித்துப் பார்க்க.

C

காலக் கணிப்பு முறை—பஞ்சாங்கம்

(The Calendar)

12-9. அதாவது மண்ணுவகை முறைதேவியா எடுத்துக்கொள்ளும் தோற்றக் காலம் ஒரேயே என வரையறுக்கப்படுகிறது. அதாவது அதாவது தன் பாதையில் ஒரு குறிப்பிட்ட இடத்திலிருந்து புறம் பட்டு மறுபடியும் அந்த இடத்தை வந்ததைய எடுத்துக்கொள்ளும் காலம் ஒரேயே எனப் பெறப்படுகிறது. அந்தக் குறிப்பிட்ட இடம், அகண்ட வெளியில் ஒரு நிலை இடமாகும், 'ஆண்டுக் காலம்' ஒரு மாறியாகும், அக்குறிப்பிட்ட இடம் அகண்ட வெளியில் மாறும் தன்மை பெறும், தாம் அகண்ட கூறாகும். ஒன்று வரையறுக்க ஆண்டுகள் மீள்வருமாறு வரையறுக்கப்படுகின்றன.

1. மீள்வழி ஆண்டு (Sidereal Year)

அதாவது மீள்வழிகளின் மீள்வழியில் நிலை இட இடத்திலிருந்து புறப்பட்டு மீண்டும் அகண்ட இடத்தை வந்ததைய எடுத்துக்கொள்ளும் காலம் ஒரு மீள்வழி ஆண்டாகும். இதன் கால அளவு சராசரி 365.2563680 ச. அதாவது நாட்களாகும்.

2. பருவஆண்டு (Tropical Year)

அதாவது மேல் முறையின் γ -மிருத்து புறப்பட்டு மீண்டும் γ வந்ததைய எடுத்துக்கொள்ளும் காலம் ஒரு பருவ ஆண்டு எனப்படுகிறது. இவ்வாண்டிற்கும் மீள்வழி ஆண்டிற்கும் ஒரு சிறு

வேறுபாடு உண்டு இச்சிறு வேறுபாடு ஏற்படக் காரணம் மேட மூலத்திலுள்ள 7 ஆண்டு ஒன்றுக்கு சராசரி $50^{\circ} 45'$ மீன் நோக்கி நகர்வதேயாம். (பகுதி 8 காண்க). இதன் காரணமாக இவ் வரண்டின் கால அளவு சராசரி 365-242128 ச. கதிரவன் நாட்களாகும்.

3. அனல்ம நிலையாண்டு (The Anomalistic Year)

கதிரவன் அனல்ம நிலையிலிருந்து புறப்பட்டு மீண்டும் அங் வன்மை நிலையுள் வந்தடைவ எடுத்துக்கொள்ளும் காலம் ஓர் அனல்ம நிலையாண்டாகும். இவையே கதிரவன் நன் பாதையில் அடுத்தடுத்து அனல்ம நிலைகளைக் கடக்கும் காலம் எனவும் குறிப்பிடலாம். அனல்ம நிலையிலுள்ள ஒரு நிலைத் புள்ளியை அந்நாமல் ஓர் இயங்கு புள்ளியாக ஆண்டிற்குச் சராசரி $11^{\circ} 35'$ முன்னேற்றிக்கவதாக இவ்வாண்டு மீள்வழி ஆண்டடைகின்றது. அதேமாதிரி இருக்கின்றது. இதன் கால அளவு சராசரி 365-256841 ச. கதிரவன் நாட்களாகும். இந்த வரையறைப்படி, மீள்வரும் விசித சமம் சரியாகும்.

$$\frac{\text{மீள்வழியாண்டு}}{360^{\circ}} = \frac{\text{பருவ ஆண்டு}}{360^{\circ} - 50^{\circ} 45'} = \frac{\text{அனல்ம நிலையாண்டு}}{360^{\circ} + 11^{\circ} 35'}.$$

இப்போது வரையரை ஆண்டுகள் ஈட்டுமன்றி, ஒரு முழு எண்ணிக்கை நாட்கள் கொண்ட நிர்வாக ஆண்டு (Civil Year) வழக்கிலிருக்கிறது. ஆனால் இந்த வரையரை நிர்வாக ஆண்டு, பருவ ஆண்டின் அடிப்படையில்தான் திறுவப்பட்டிருக்கிறது.

12:9:1: மனிதனுக்கு இயற்கையாக அமைந்த கால அளவைகள், நேற்றக் கதிரவன் நன், திங்கட்காலம், பருவ ஆண்டு என்பவை. நேற்றக் கதிரவன் நான்கு பதிலாக, சராசரிக் கதிரவன் நன் என ஒரு நன் திறுவப்பட்டு வழக்கிலுள்ளதை நாம் அறிவேம். திங்கட்காலமும், பருவ ஆண்டும் ஒரு முழு எண்ணிக்கை நாட்கள் உடையவைகளில்லை. எனவே, ஒரு முழு எண்ணிக்கை நாட்கள் கொண்ட நிர்வாக ஆண்டு திறுவப்பட்டது.

ஆனால் முழு எண்ணிக்கை நாட்கள் கொண்ட நிர்வாக ஆண்டும், பருவ ஆண்டும் ஏதத்தாழ சமமாகவிருக்க வேண்டிய தேவைவும் ஏற்படுகிறது. பண்டைய காலக் கணிப்பு முறைகள் இதற்கெட்ப அமைப்பில்கில. அக்கணிப்புக்கள் பல, பன்னிரண்டு திங்கள்கள் பெற்ற சத்திரன் வழியாண்டுமாதிரி இருத்தன. இவ்விதப் பஞ்சாங்கங்கள் இன்றும் ஸ்பெயின்ம்கள் வழக்கிலுள்ளன. ஆனால் அவ்வழியிலே, பருவங்கள் யாழியாழி வருகின்றன; மேலும் அவ்வாண்டின் 364-5 நாட்களேயிருத்தன. ரோமன் கணிப்புக்களும் இவ்விதமான முறைகளைப் பெற்றிருத்தன.

ஆறாம், பருவங்களே, 'பருவங்களாகக்' கொண்டுவேண்டி, தன்னிச்சையாகப் பஞ்சாங்கங்களில் நாட்கள், மாதங்கள் தீர்ந்திடப் பட்டு, பஞ்சாங்கங்கள் சீர்துவாக்கப்பட்டன.

இவ்விதமான சீர்துவாக்கை காலக் கணிப்பில் ஏற்பட்டதால், ஜூலியஸ் சீசர் (Julius Caesar) சோஸிஜெனஸ் (Sosigenes) என்ற ஒரு வானியல் அறிஞரின் உதவிகொண்டு காலக் கணிப்பு முறையைச் சீர்திருத்த முயன்றார். ஆம் முயற்சியின் விளைவே இன்று நாம் தெட்டாண்டு எனக்கூறும் லீப் ஆண்டின் தோற்றம்.

ஜூலியன் காலக் கணிப்பு எனக் கூறப்படும் இச் சீர்திருத்தத்தில், 885 நாட்கள் கொண்ட மூன்று ஆண்டுகளுக்குப் பின் 886 நாட்கள் கொண்ட ஒரு தெட்டாண்டு உருவாகிற்று. ஆண்டுவாக்க ரீதியிலும் என், நான்கின் மடங்காணும், அதாவது நான்கால் மீதியின்றி வகுபடுமானும், அவ்வாண்டு தெட்டாண்டாக ஏற்றுக் கொள்ளப்பட்டது.

இக்காலக் கணிப்பு முறை கி.மு 45ஆம் ஆண்டில் தடை முறைக்கு வந்தது. உடனடியாக ஆண்டாரம்ப காலமும் மாற்றம் பெற்றது. அதற்கு முன்னர் மாசிக மாதம் ஆரம்பமான ஆண்டு, ஜனவரி மாதம் முதல் தேதி ஆரம்பமாகியிற்று. (கி. மு 45ம் ஆண்டு மாசித் திருப்ப நிலைக்கு அடுத்த அகாஸாயன்ஸ், இவ்வாண்டு ஆரம்பமாகியிற்று. இதன்பொருட்டு அதற்கு முன் ஆண்டு மிகவும் நீட்டப்பட்டு, குழப்பம் விளைத்ததால், அவ்வாண்டு 'குழப்ப ஆண்டு' (Year of Confusion) எனவே பெயர் பெற்றது).

12-3-2. ஜூலியன் ஆண்டுக்குத் திருத்தங்கள்—கிரகரி காலக் கணிப்பு முறை—கிரகரித் தோற்றம்:

ஜூலியன் காலக் கணிப்புப்படி நான்கு பருவ ஆண்டுகளைவிட 44நிமிடம் 55-56 செகண்டுகள் அதிகம், அவ்வாறாக 400 நிர்வாக ஆண்டுகள், 400 பருவ ஆண்டுகளைவிட 3நாட்கள் 2 மணிகள் 53, நிமிடங்கள் 30 செகண்டுகள் அதிகமாக இருக்கின்றன. இவ்வறிக்கைப் படியான காலம் (3நா 2ம 53நி 30வி) சரியான முறையில் நீக்கப் பட்டு திருத்தப்படாவிட்டால் நீண்டகால இடைவெளியில் பருவ ஆண்டின் ஆரம்பமும் பருவகால ஆரம்பமும் ஒத்து வராது முரண் பட்டுப் போகும். எனவே, அதனை சுடு செய்யப்பொருட்டு கி. பி. 1582இல் போப் கிரகரி XIII என்பவர் ஜூலியன் காலக் கணிப்பிக்கு ஒரு திருத்தம் கொண்டு வந்தார். ஜூலியன் காலக் கணிப்புப்படி 100ஆம் வகுபடும் ஒவ்வோர் ஆண்டும் 4ஆம் வகுபடுமானின் 2000; 1100; 2200.....என்ற ஆண்டுகள் எல்லாம் தெட்டாண்டாகும். ஆனால் கிரகரி கொண்டு வந்த

திருத்தப்படி 100ஆம் வகுப்பும் எல்லா ஆண்டுகளும் நெட்டாண்டுகள் ஆகாது; ஆனால் நூற்றாண்டைக் குறிக்கும் எண்ணும் 4-ஆம் வகுப்பிடாக மட்டுமே அல்லாண்டு நெட்டாண்டாகக் கொள்ளப்படும். எடுத்துக்காட்டாக கி.பி. 1800, 2000, 2100, 2200, 2400,ஆண்டுகளில் கி.பி. 2000ம் கி.பி. 2400 மட்டுமே நெட்டாண்டுகளாகும்; மற்ற ஆண்டுகள் 4-ஆம் மீதி விசை வகுப்பிட போதிலும் நெட்டாண்டுகள் ஆகாது. இவ்வாறு அமைக்கப்பட்ட காலக் கணிப்பு முறை கிரகமீனின் காலக் கணிப்பு முறை என்று கூறப்படுகிறது. இத்திருத்தம் கிரகமீத் திருத்தம் (Gregory's Correction) எனப்படும். இக்கணிப்பு முறையே இப்போது வழக்கத்திலிருந்து வருகிறது. இக்கணிப்பு முறையும் சரியானது என்று நாம் ஏற்றுக் கொண்டுவிடமுடியாது. ஏனெனில் 4000 பருவ ஆண்டுகளை விட 1 நாள் 4 மணிகள் 55 நிமிடங்கள் அதிகமாக இருக்கின்றன. காலப் போக்கில் இதற்கும் திருத்தம் அமைத்து அதையும் வழக்கில் ஏற்றுக்கொள்ளவேண்டி இருக்கும்.

12-9-3 : பெசலியன் ஆண்டு (Besselian Year)

ஜெர்மானிய வானியலறிஞர் பெசலர் என்பவரால் இம்முறை கணிக்கப்பட்டது. இடைக் கதிரவனின் வான நெட்டாங்கு 280° ஆக இருக்கும்போது இவ்வாண்டு ஆரம்பிக்கிறது. இத்தூவக்கம் சந்திரைக் குறைவு நிர்வாக ஆண்டின் ஆரம்பத்தோடு இணைத்து விடுகிறது. இவ்வாண்டின் கால அளவும் பருவ ஆண்டின் கால அளவும் ஒன்றாகும்.

12-9-4. ஜூலியன் நாள் (தேதி) (Julian Date)

வானியல் கணிப்புக்களில், பலவிதமாக நாட்கணக்கெடுக்கும் முறைகளைச் சீர்படுத்தி அமைப்பதற்காக ஜூலியன் நாள் என்ற அமைப்பு உருவாக்கப்பட்டது.

முதல்முதலாக கி.பி. 1582ஆம் ஆண்டில் இந்த முறையை எடுத்தோதியவர் ஸ்காலிகர் (Scaliger) என்ற வானியல் ஆறிஞர். ஜூலியன் கால வட்டத்தில் ஆண்டிற்கு 365½ நாட்கள் கொண்ட 7860 ஜூலியன் ஆண்டுகள் உள்ளன; ஆரம்பத் தேதி கி.மு. 4713ம் ஆண்டு ஜனவரி முதல் தேதி.

மாதாந்திரப் பஞ்சாங்கத்தில், எந்த ஆண்டிலும் ஜனவரி முதல் தேதிக்குச் சரியான ஜூலியன் நாள் கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது. ஜூலியன் நாள் (நிர்வாக நாள் நாளிரவு 12 மணிக்கு ஆரம்பமாகிறது போல் அல்லாமல்) நண்பகலில் ஆரம்பமாகிறது.

கி.பி. 1950—ஜனவரி 1 தட்பாகல் :	ஜூனியன் தாள்	2,488,253
.. 1951—ஜனவரி 1 தட்பாகல் :	..	2,48 48
.. 1952—ஜனவரி 1 தட்பாகல் :	..	2,484,1
.. 1953—ஜனவரி 1 தட்பாகல் :	..	2,484,879
.. 1959—ஜனவரி 1 தட்பாகல் :	..	2,440,228
.. 1970—ஜனவரி 1 தட்பாகல் :	..	2,440,558

ஜூனியன் நாட்களை 7 ஆக வகுக்க வரத்தின் கிழமை கிடைக்கும். 7 ஆக சரியாக வகுப்படுமானால், திங்கட் கிழமை; மீதி 1 வருமானால் செவ்வாய்க் கிழமை; மீதி 6 வருமானால் ஞாயிற்றுக் கிழமை. 1959ம் ஆண்டு ஜனவரி 1ம் தேதி புதன் கிழமை. உரிய ஜூனியன் தாள், 2 440, 228ஐ 7 ஆக வகுக்க மீதி 2-புதன் கிழமை. 1970ம் ஆண்டு ஜனவரி 1ம் தேதி விவாழக் கிழமை. உரிய ஜூனியன் தாள் 2,440,558ஐ 7 ஆக வகுக்க மீதி 3-விவாழக்கிழமை.

கதிரவன், சந்திரன் மறைப்புடன் 'சாராஸ்' எனப்படும் 6555 நாட்கள் கொண்ட காலவட்டங்களில், திரும்பத் திரும்ப நிகழ்த்துகொண்டேயிருக்குமென்ப கேள்வி பகுதி 17 இல் பார்க்க விரும்புகிறோம். ஜூனியன் தேதி x ஆக இருக்கும்போது, ஒரு வகை வான சந்திரன் மறைப்போ, கதிரவன் மறைப்போ ஏற்பட்டதாயின் மறுபடியும் அதேவகையான மறைப்பு ஜூனியன் தாள் x+6555க்கு ஏற்படும்.

எனவே ஜூனியன் நாட்கள், கிழமைகள் அறிவதற்கும், சந்திரன் கதிரவன் மறைப்பு தினங்களை அறிவதற்கும் பயன்படுகிறது. இன்னும் பல வாணியல் நிகழ்ச்சிகளைக் குறிக்கவும் பயன்படுகிறது.

12.9.5. ஒரு பருவ ஆண்டில் உள்சாராசரி+ கதிரவன் நாட்களும் கேள்வதி நாட்களும் :

கதிரவன் மண்ணுவலத்தை ஒரு முழுச் சுற்று சுற்றிவரும் கால வட்டம் ஒரு பருவ ஆண்டு (365-2422 நாட்கள்) எனப்படும். இதுவே ச.க. மண்ணுவலைச் சுற்றிவரும் கால வட்டமாகும். மேட முதற் புள்ளியில் புறப்படும் ச.கதிரவனுடைய வல ஏற்றம் இங் வேரானாகக் 0° முதல் 360° வரை சீராக வளர்கிறது.

360° 24 மணி
அதாவது தினசரி 365-2422 அல்லது 365-2422 அளவில் வளர்

கிறது. (இது சாராசிக் கதிரவன் வரையறுத்தபடி பெறும் முடிவாகும்). இந்த விசித்திரத்தை x எனக்கொள்வோம். ச. கதிரவன் ஒரு தாள் உச்சி கடக்கும்போது, அதன் வல ஏற்றம் x எனக்

கொண்மோம்; அடுத்த நாள் உச்சி கடக்கும்போது அதன் வல-
ஏற்றம் $\mu + x$. எனவே இரண்டு அடுத்தடுத்த சராசரிக் கதிரவன்
நண்பகல்களுக்கு இடைப்பட்ட இடைவெளி = $(24+x)$ மின்வழி-
மணிகள். ஆனால் இதுதான் 24 ச.க. மணி நேரத்திற்குச் ச.க.

எனவே 24 ச.க. மணிகள் = $24 + \frac{24}{865 \cdot 2422}$ மீ. வ. மணிகள்

$$1 \text{ ச.க. மணி} = 1 + \frac{1}{865 \cdot 2422} \text{ மீ. வ. மணி}$$

மேல் அவதூறுக் கணித்தால்,

$$\begin{aligned} \text{ஒரு ச.க. ஆண்டு} &= \text{ஒரு நே. க. ஆண்டு} \\ &= \text{ஒரு பருவ ஆண்டு} \\ &= 865 \cdot 2422 \text{ ச.க. நாட்கள்} \\ &= 865 \cdot 2422 \times 24 \text{ ச.க. மணிகள்} \\ &= 865 \cdot 2422 \times 24 \left(1 + \frac{1}{865 \cdot 2422} \right) \\ &\quad \text{மீ.வ. மணிகள்;} \\ &= 865 \cdot 2422 \left(1 + \frac{1}{865 \cdot 2422} \right) \text{ மீ. வ. நாட்கள்} \\ &= 865 \cdot 2422 \text{ மீ.வ. நாட்கள்.} \end{aligned}$$

அதாவது $865 \cdot 2422$ ச.க. நாட்கள் = $865 \cdot 2422$ மீ.வ. நாட்கள்
என்பு வெறுப்பும்.

12.9-5-1: ஸ்பீரேர் முறை: ஒரு பருவ ஆண்டு என்பது $865 \cdot 2422$
சராசரிக் கதிரவன் வழிநாட்களைக் கொண்டதாகும். இக்கால
இடைவெளியில் ச. கதிரவன் மேட ஓதற்புகுவி γ விளக்குத் துறப்-
பட்டு மீண்டும் அப்புகின்றவ அடைத்துவிடுகிறது. ஆனால்
இக்கால இடைவெளியில் சராசரிக் கதிரவன் ஓர் இடத்தில் உச்சி
வட்டத்தை $865 \cdot 2422$ முறை கடக்கிறது. இக்கால இடைவெளியில்
கதிரவன் ஒரு முறை பூமியைச் சுற்றிவருவதால் மேட ஓதற்புகுவி
 γ உச்சி வட்டத்தை ஒரு முறை அநிகமாக, அதாவது $865 \cdot 2422$
முறை சுற்றி வருகின்றது. எனவே, $865 \cdot 2422$ ச.க. நாட்கள்
= $865 \cdot 2422$ மின்வழி நாட்கள். அதாவது ஒரு பருவ ஆண்டில்
 $865 \cdot 2422$ சராசரிக் கதிரவன் நாட்கள் உள்ளை; $865 \cdot 2422$ மின்-
வழி நாட்கள் உள்ளை என்பது வெறுப்புகிறது.

12.9-6: வேர்பாற்றங்கள் (Conversion of Time)

மின்வழி நேரம், நேரத்தக் கதிரவன் வழி நேரம், சராசரிக்
கதிரவன் வழி நேரம், கிரீனிக் நேரம் என்று பல வகையிலே ஒரு

குறிப்பிட்ட தருணத்தைக் கூறலாம் என இதுவரை நாம் கண்டறி விடுத்து தெரிகிறது.

இப்போது ஒரு குறிப்பிட்ட தருணத்தை, ஒரு வழியாகக் குறிப்பிட்டால், அதற்கு தருணத்திற்குரிய மற்ற வகைப்பட்ட நேரங் களாக மாற்றித் தருவது எப்படி என்ற சில முறைகளால் பார்ப்போம். மாறுமீடு பஞ்சாங்கிக் குறிப்புக்கள் பல இடங்களில் தேவைப் படும், சில இடங்களில் தேவையான குறிப்புக்கள் உடனாக் குடனேயும் இணைக்கப்பட்டிருக்கலாம்.

12-9-6-1 : சராசரிக் கதிரவன் மணி அளவில் கொடுக்கப்பட்ட நேரத்தை மீன்வழி அளவில் மாற்றுவதில் (Mean solar hours into sidereal hours)

சராசரிக் கதிரவன் அளவுகள்	மீன்வழி அளவுகள்
335-24 நாட்கள்	= 335-24 நாட்கள்
ஈ 1 நாள்	= $\left(1 + \frac{1}{335-24}\right)$ நாட்கள்
	= $(1 + .002785)$ நாட்கள்
ஈ 24 மணிகள்	= 24ம. 8நி. 58-5னி
	= 24ம. 4நி - 4னி
	(தேரையமாக)
ஈ 1 மணி	= 1ம + 10னி - $\left(\frac{1}{60}\right)$ நி (A)
எனவே 6 நிமிடங்கள்	= 6நி + 1னி - $\left(\frac{1}{60}\right)$ நி (B)

மேற்கண்ட (A), (B) என்ற இரண்டு சமன்பாடுகளிலிருந்து மீன்வழி 'கவனத்தில் வைக்கக்கூடிய' வாய்பாடு வருவதைப் பாரிக்க :

$$1 \text{ ச.க. மணி} = 1. \text{ மீ.ம.} + 10 \text{ நி.} - \left(\frac{1}{60}\right) 10 \text{ நி.}$$

$$6 \text{ ச.க. நிமிடம்} = 6. \text{ மீ.நி.} + 1 \text{ நி.} - \left(\frac{1}{60}\right) 1 \text{ நி.}$$

எனவே 1 ச.க. மணிக்கு 10 வினாடியும், 6 ச.க. நிமிடங்களுக்கு 1 வினாடியும் கூட்டி, கூட்டும் தொகையில் $\left(\frac{1}{60}\right)$ பங்கு குறைத்து விட்டால், ச.க. மணி அளவுகளை மீ.ம. மணி அளவுகளாக மாற்றலாம்; இதுவே நடைமுறைவில் செயல்படுத்தக்கூடிய விதி (working rule) ஆகும்.

எ.கா : 1 ச.க. 9ம 58 நி கால அளவை மீ.வ. ஆவகில் காண்க.
9 மணிக்கு 90 விநாடிகளும்

56 நிமிடத்திற்கு 8-38 விநாடிகளும் கூட்டி

$\frac{86-58}{90}$ விநாடிகள் கழிக்கவும்.

விடை : 9ம 56 நி + 89 38 நி = 1-48 நி
= 9ம = 57 நி = 57-57 நி. (மீ.வ)

12-9-6-2. மீன்வழி ஆவகில் கொடுக்கப்பட்ட காலஅளவை சராசரி கதிரவன் ஆவகில் மாற்றுவதல் :

மீன்வழி அளவு சராசரிக் கதிரவன் அளவு

333-24 நாட்கள் = 335-24 நாட்கள்

∴ 1 நாள் = $\left(1 - \frac{1}{333-24}\right)$ நாள்.
= (1 - 00278) நாள்.

∴ 24 மணி = 24 ம - 3 நி 55-87 நி.
= 24 ம - 4 நி + 4 நி

(தொடர்புமரக)

∴ 1 மணி = 1 மணி - 10 நி + $\frac{1}{4}$ நி
8 நிமிடங்கள் = 8 நி - 1 நி + $\frac{1}{4}$ நி

எனவே மூன்றுபத்தியில் பயன்படுத்திய கருத்து மூன்றாவது கருவியைப்போல, மீன்வழி மூன்றுபத்தியைப் பார்க்க.

ஒருமீன்வழி மணிக்கு 10 விநாடிகள் கழித்து

6 மீன்வழி நிமிடங்களுக்கு 1 விநாடி கழித்து

கழித்த தொகையில் ($\frac{1}{4}$) பங்கு கூட்டினால், மீன்வழி மணி அளவுகளை, சராசரிக் கதிரவன் மணி அளவுகளாக மாற்றலாம்; இதுவே நடைமுறையில் செயல்படுத்தக் கூடிய விதியாகும்.

எ. கா. : 1 மீ. வ. 9ம 58 நி கால அளவை ச. க. ஆவகில் காண்க.

மூன்றுபத்தியிலுள்ள எடுத்துக் காட்டில் பெற்ற திருத்தங்களைக் குறிமாற்றி எடுத்துப் பயன்படுத்தலாம்.

கழிக்கவேண்டியது 99-38 நி

கூட்டவேண்டியது 1-57 நி

எனவே திரவமாகக் கழிக்கவேண்டியது 1 நி 39 நி.

விடை = 9ம 58 நி - 1 நி 39 நி

= 9ம 54 நி 22 நி

இன்னும் துட்பயாக இம்மாத்ரு வாய்பாடுகள் வேண்டுமாயின்,

$$M \text{ ச. க. மணிகள்} = M (1 + e) \text{ மீன் வழி மணிகள்}$$

$$\text{இங்கு } e = \frac{1}{888.2422} = .002785.$$

$$S \text{ மீன் வழி மணிகள்} = S (1 - e') \text{ ச. க. மணிகள்}$$

$$\text{இங்கு } e' = \frac{1}{888.2422} = .0027802.$$

மீன்வழி மணி கணிப்பது γ -மேல் உச்சி கடப்பதிலிருந்து 0, 1, ..., 24 மணிகள் என்றும், சராசரிக் கதிரவன் மணி கணிப்பது, சராசரிக் கதிரவன் கீழ் உச்சி கடப்பதிலிருந்து 0, 1, 2, ..., 24 மணிகள் என்றும் நாம் அறிவேம். அதாவது மீன்வழி மணி, γ இன் நண்பகலிலும், சராசரிக் கதிரவன் வழி மணி, ச. க. இன் நகிலிரவிலும் இருந்து அளக்கப்படுகிறது.

மாலுமீப் பஞ்சாங்கத்தில், ச. க. நகிலிரவுக்குரிய, மீன்வழி நேரம் (x_m) உம், γ இன் நண்பகலுக்குரிய ச. க. வழி நேரம் (m) உம் ஒவ்வொரு ஆண்டிலும் தினத்தோறும் கிரேஸி (மண்ணுலக நெட்டாங்கு பூச்சியல் உட்கள இடம்) என்ற இடத்திற்குக் கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது. அப்பஞ்சாங்கக் குறிப்புக்கள் கொண்டு, மண்ணுலகில் எத்த நெட்டாங்குள்ள இடத்திற்கும், ச. க. மணி நேரத்தை, மீன் வழி மணி நேரமாகவும், எதிர் மாறாகவும் மாற்ற இயலும். சில எடுத்துக்காட்டுகள் பின்னர் கொடுக்கப்பட்டிருக்கின்றன. (குறிப்பு: $x_m = 0$, எவற்றினக் குறிக்கும் குறிப்புகள் எனக் கவனத்தில் வைக்கவும். பின்னர் அக் குறிப்புகளை அவ்வப்பொருள்களில் பயன்படுத்தலாம்).

12-9-6-3 : ஒரு குறிப்பிட்ட நாளில் கிரேஸி ச. க. நேரம் 11 அதற்குரிய கிரேஸி மீன் வழி நேரம் என்ன?


மாலுமீப் பஞ்சாங்கத்தில் அந்தாளுக்குரிய x_m உம், m உம் யாத்துக்கொள்ளலாம்.

படம் A இல் (பக்கம் 871)

γ குறிப்பது, பி. வ. நண்பகல் சமயம் (0=0^h 0^m பி. வழி நேரம்)

M குறிப்பது, ச. க. நகிலிரவுச் சமயம் (0=0^h 0^m ச. க. நேரம்)

P நமக்குக் கொடுக்கப்பட்டிருக்கும் சமயம், அதாவது, கி. ச. க. நேரம் = m .



மடம் A

$$MP = m \text{ (ச. க. அலகில்)}$$

$$= m (1 + e) \text{ மீன் வழி அலகில்}$$


$$YM = 2m \text{ மீன் வழி அலகில்}$$

$$\therefore YP = 2m + m (1 + e) \text{ மீன் வழி அலகில்}$$

எனவே கிரேஸிச் ச. க. நேரம் m இரத்தும்போது கிரேஸிச் மீன் வழி நேரம் $= 2m + m (1 + e)$. [மீன்வழி அலகுக்களில்].

எ.கா. 1.


கிரேஸிச் ச. க. நேரம் 6 மணிக்குரிய மீன் வழி நேரம் என்ன ?
அன்று, கிரேஸிச்சில் ச. க. கிழ உச்சி கடத்த மீன்வழி நேரம் 10ம 11நி. வி. 87-87.



$$6 \text{ ச. க. மணிநேரம்} = (6^h + 60^m - 1^m) \text{ மீன் வழி காலம்} \\ = 6^h 0^m 59^s$$

$$\therefore \text{அப்போது மீன் வழி நேரம்} = 10^h 11^m 87.87^s \\ + 6^h 0^m 59^s \\ = 16^h 12^m 86.87^s$$

எ.கா. 2 : 1882ஆம் ஆண்டு மார்ச்சு 20ஆம் தேதி கிரேஸிச்சில் ச.க. நேரம் 8ம 42நிக்குச் சரியான கிரேஸிச் மீ.வ. நேரம் காண்க ; 19ஆம் தேதி அங்கு தள்ளிய நேரம் 14ம. 88நி. 48வி (ச.க.).



மடம் B

மடத்தில் குதிக்கப்பட்டதைக் கவனிக்க. (மடம் B)

$$M'M = 24 \text{ மணி (ச.க.)}$$

$$Y'Y = 12 \text{ மணி (மீ.வ.)}$$

$$MP = 8 \text{ ம 42 நி (ச.க.)}$$

MPக்குரிய மீள்வழி தேரம் காணவேண்டும்.

$$M'Y' = 14 \text{ ம 26 நி 46 நி (ச.க.)}$$

$$\therefore M'P = M'M + MP$$

$$= 27 \text{ ம 42 நி (ச.க.)}$$

$$Y'P = Y'M + MP$$

$$= (24 - 14 \text{ ம 26 நி} - 46 \text{ நி}) + 8 \text{ ம 42 நி (ச.க.)}$$

$$= 8 \text{ ம 24 நி 14 நி} + 8 \text{ ம 42 நி (ச.க.)}$$

$$= 16 \text{ ம 6 நி 14 நி (ச.க.)}$$

இதை மீள்வழி தேரமாக மாற்றுக.

$$Y'P = 12 \text{ ம 6 நி 14 நி} + 120 \text{ நி} + 1 \text{ நி} - 2 \text{ நி}$$

$$= 12 \text{ ம 6 நி 14 நி} + 128 \text{ நி}$$

$$= 12 \text{ ம 5 நி 22 நி (மீ.வ.)}$$


$$\therefore YP = Y'P - Y'Y$$

$$= [12 \text{ ம 5 நி 22 நி} - 12 \text{ ம}] \text{ (மீள்வழி)}$$

$$= 1 \text{ ம 8 நி 22 நி}$$

12.9.6.4: கிரேக்கில் ஒரு குதிப்பட்ட மீள்வழி தேரத்தின் குரிய ச.க. தேரம் காணல்.

குதிப்பட்ட மீள்வழி தேரம் s எனக் கொள்க. m_1 - ஆராவது γ உச்சி கூடக்கும்போது உள்ள ச.க. தேரம் கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது (மாறுபாடு பஞ்சாயத்திப்படி).



$P = s$ கொடுக்கப்பட்டிருப்பது.

$$MY = m_1$$


பக்கிய ச.க. தேரம் = MY (ச.க.)

$$= MY \text{ (ச.க.)} + YP \text{ (ச.க.)}$$

$$= m_1 + s (1 - s')$$

$$= E' = .0027302$$

மூன் எடுத்துக்காட்டில் மூக்குப் பதினாக r_m —அதாவது ச.க. நன்னிரவுக்காலம் மீ.க. மணிவில் கொடுக்கப்பட்டால்...



$$YM = r_m \text{ (மீ.க.)}$$

$$= r_m (1 - e') \text{ (ச.க.)}$$

$$YP = r \text{ (மீ.க.)} = r (1 - e') \text{ (ச.க.)}$$

$$\therefore MP = YP - YM$$

$$= r (1 - e') - r_m (1 - e')$$

$$= (r - r_m) (1 - e') \text{ மீ.க.}$$

12-9-7: இந்த முறைகளை விரிவுபடுத்தினால், எந்த இடத் திலும் இப்பாற்றங்களைச் செய்யலாம்.

அதற்குத் தேவைப்படுவன மீன்வழி விதிகள்: கிரேஸ் மீன் வழி தேரம் = r ஆக இருக்கும் தருணம், r கிழக்கு தெட்டாக்குள்ள A என்ற இடத்தில் மீன்வழிதேரம் = $\left(r + \frac{r}{16}\right)$ ஆக இருக்கும். r மேற்கு தெட்டாக்குள்ள B என்ற இடத்தில் அத்தருணம், மீன் வழி தேரம் = $\left(r - \frac{r}{16}\right)$ ஆக இருக்கும். இங்ஙித ச.க. தேரத் திற்கும், தே.க. தேரத்திற்கும் பொருத்தம். (விளக்கம் அடுத்த பகுதி 18இல் காண்க).

இந்த விதிகளைக்கொண்டு, மூன் விளக்கப்பட்ட முறைகளைக் கையாண்டால் தேவைப்படுமாற்றங்களைப் பெறலாம்.


I.S.T. இந்திய நியம தேரம் வேண்டுமெனின் கிரேஸ் தேரத் தோடு சீமணி 80நிகிடம் கூட்டினால் போதும்; I.S.T (இ. ந. தே.) கொடுக்கப்பட்டால் அதிலிருந்து சீமணி 80நிகிடம் கழித்தால் கிரேஸ் தேரம் பெறப்படும். இது மீன்வழி தேரம், சராசரிக் கதிர்வன் தேரம் இரண்டிற்கும் ஒன்றேதான்.

எ.கா. 1. மன்னார்குடி தெட்டாக்கு 80°கி உள்ள ஓட்டத்தில் குதிப்பட்ட நாளில் ச.க. தேரம் 17ம 6நி 18வி. க்குரிய மீன் வழி தேரம் காண்க. கிரேஸ்சில் ச.க. நண்பகலுக்குரிய மீன்வழி தேரம் 1ம 45நி 24வி எனக்கொள்க.

60° கி தொட்டாகவுள்ள இடத்தில் சித்பகல் 17ம 6நி 15வி ச.க.
தேரமானால், அதற்குச் சரியான

கிரேஸிச் ச.க. தேரம் = 17ம 6நி 15வி—80 x 4 நிமிடங்கள்.

$$\begin{aligned} &= 17\text{ம } 6\text{நி } 15\text{வி} \\ &\quad - 3\text{ம } 20\text{நி} \\ &= 13\text{ம } 46\text{நி } 15\text{வி} \\ &= \text{சித்பகல் } 1\text{ம } 46\text{நி } 15\text{வி} \end{aligned}$$



$$Y M' = 1\text{ம } 46\text{நி } 24\text{வி (மீ.வ)}$$

$$M'P \text{ மீ. வ. தேரத்திற்கு மாற்றாக.}$$

$$M'P = 1\text{ம } 46\text{நி } 15\text{வி} + 10\text{வி} + 7.7\text{வி} - \frac{1}{2} (17.7)\text{வி}$$

$$= 1\text{ம } 46\text{நி } 18\text{வி} + 17.4\text{வி}$$

$$= 1\text{ம } 46\text{நி } 35.4\text{வி (மீ.வ)}$$

$$\therefore YP \text{ (மீ.வ)} = YM' + M'P$$

$$= 1\text{ம } 46\text{நி } 24\text{வி (மீ.வ.)}$$

$$+ 1\text{ம } 46\text{நி } 35.4\text{வி (மீ.வ.)}$$

$$= 3\text{ம } 31\text{நி } 59.4\text{வி (மீ.வ.)}$$

இது கிரேஸிச் தேரம்.

$$\therefore \text{குறிப்பிட்ட இடத்தில் மீன்வழி தேரம்}$$

$$= 3\text{ம } 31\text{நி } 59.4\text{வி}$$

$$+ 3\text{ம } 20\text{நி}$$

$$= 6\text{ம } 51\text{நி } 59.4\text{வி.}$$

எ.கா. 2

விண்மீன் அண்டரஸ் (Antares) வல ஏற்றம் 13ம 24நி 45வி. மீன்வழிப் பதிவுகள் செண்டு, மே மாதம் 1ம் தேதி அது சென்னையில் உச்சி கடக்கும் வரப்பொழுது காண்க. (செ)

பதிவு: சென்னை தொட்டாக்கு 5ம 20நி 59-6வி (கி)

பதிவு: ஏப்ரல் 20ம் நாள் கி.மீ. வழி நண்பகல் 8ம 28நி 48வி (ச.க)

சென்னையில் அண்டரஸ் உச்சி கடக்கும் மீன்வழி தேரம் } 13ம 24நி 45வி

சென்னை தொட்டாக்கு } 5ம 20நி 59-6வி

$\therefore$ சென்னையில் அண்டரஸ் உச்சி கடக்கும் போது, கி.மீ.வ. தேரம் } 11ம 3நி 48-4வி



$$\begin{aligned} \gamma A &= 11\pi \cdot 8 \cdot 48 \cdot 4\pi^2 \quad (\text{д.м. секунды}) \\ &= 11\pi \cdot 8 \cdot 48 \cdot 4\pi^2 - 110\pi^2 - 0.6\pi^2 + 1.8\pi^2 \\ &\quad (\text{с.м. секунды}) \\ &= 11\pi \cdot 8 \cdot 48 \quad (\text{Одновременно}) \quad (\text{с.м. секунды}) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \therefore MA &= 11m \ 25 \\ &+ 9m \ 28 \ 48 \text{cm. (s.s.)} \\ &= 20m \ 53 \ 48 \text{cm. (s.s.)} \end{aligned}$$

சென்னை நேரம் = 5 ம 20 நி 59.6 வி

சென்னை நகரம்
அண்டரஸ்
உச்சரி கடக்கும்
ச.க. நேரம்

ஆதலால் மேல்காணும் ஒத்தத்தேதி 1ம் 51ல் 46-6 (ச.க. கோம்).

ஆகும், இந்திய தீவம் மேலும் - 30ம் 30.5 46ம்
+ 5ம் 50ம்
= 35ம் 00 46ம்

மேலாந்தம் முதல் தேதி = 2 ம 09 46 நி (ச.க. மேலாந்தம்)

WMA 120

1. ஒரு விண்டிகின் வலி ஏற்றம் 19ம் 48தி 51வி. சற்று மூத்திய ச.க. நண்பகல் தேரன் 0ம் 8தி 40வி (மீ.வ.) ஆம்மீன் உச்சி கடக்கும் ஊர்ப்பொழுது காண்க. (25)

2. கிரேக்கிஸ் மீ.வ. நேரம் 11ம 35நி 43வி. பின்னரும் பதிவு கொண்டு அதற்குச் சரியான தி.ச.க. நேரம் காண்க. ஜனவரி 18ந் தேதி ச.க. நேரம் 16ம 22நி 47 விநாடிக்கு அங்கு γ உச்சரி கடத்தது.

3. மார்க்க 18ம் தேதி கொல்கத்தா ய் கிளப்பி வட்டத் த.க. தேரம் 14ம் 85தி 40மி. மார்க்க 20ம் தேதி ச.க. தேரம் 8ம் 42தி 86 மி.ஜெ.கிளப் சரியான பீ.வ. தேரம் காண்க. (29)

4. கிரேஸ்டிக்ஸ் ஐரன் 1/2ம் தேத ச. க. நகராபிஷேப்போடு, பி.எ. தேர்ம் 1/2ம் தேத 4டி 88, 54 வினாடி. ஐரன் 2ம் தேத

கிரேனிக்சில் ச.க. நேரம் 2ம 35 45 விநாடிக்குச் சரியான மீ.வ. நேரம் காண்க. (செ)

5. ரீன் கொடுக்கப்படும் பதிவு கொண்டு, ஓரீடத்தில் மீ.வ. நேரம் 10ம 20 நிமிடத்திற்குச் சரியான ச.க. நேரம் காண்க.

முத்திய ச.க. நன்னிரலில், மீ.வ. நேரம் 3ம 5 நி. (செ).

6. ரீன் கொடுக்கப்படும் பதிவு கொண்டு, ஓரீடத்தில் மீ.வ. நேரம் 14ம 30 நிமிடத்திற்குச் சரியான ச.க. நேரம் காண்க.

முத்திய ச.க. நன்னிரலில், மீ.வ. நேரம் 5ம 15 நி. (செ)

குறிப்பு: ரீன்வரும் கணக்குகளை இப்போதே செய்தாலும் செய்வாயம்; அங்கு அடுத்துவரும் 'தெட்டாங்கு' (18) என்ற பகுதியைப் படித்துவிட்டுச் செய்தாலும் செய்வாயம்.

7. சென்னையின் கி. தெட்டாங்கு $80^{\circ} 14' 18''$; செட்டம்பர் முதல் தேதி கிரேனிக்சில் ச.க. நன்னிரலின்போது மீ.வ. நேரம் 22ம 35 நி 40 வி. அன்று சென்னை ச.க. நேரம் (இ.நி. நேரம்) முற்பகல் 8ம 35 நிமிடத்திற்குச் சரியான சென்னை மீ.வ. நேரம் காண்க. (செ)

8. சென்னையின் கிழக்கு தெட்டாங்கு 5ம 21 நி; ஏப்ரல் முதல் தேதி கிரேனிக்சில் ச.க. நன்னிரலின்போது மீன்வழி நேரம் 0ம 35 நி 53 வி. அன்று சென்னை ச.க. நேரம் முற்பகல் 7:30க்குச் சரியான மீன்வழி நேரம் காண்க. (செ)

9. கி. ச.க. நன்பகலுக்குச் சரியான மீ.வ. நேரம் 11ம 14 நி 25 வி. சென்னையின் தெட்டாங்கு, கிழக்கு 5ம 20 நி 57 வி. சென்னையில் மீ.வ. நேரம் 18ம 30 நி 30 விநாடிக்குச் சரியான சென்னை ச.க. நேரமும், இ.நி. நேரமும் காண்க; சென்னையில் மீ.வ. நேரம் 21ம 6 நி 7-5 விநாடிக்குச் சரியான சென்னை ச.க. நேரமும், இ.நி. நேரமும் காண்க. (அ)

10. திபுயார்க்கில் அக்டோபர் 31ம் தேதி ச.க. நன்னிரலுக்குச் சரியான மீ.வ. நேரம் 22ம 30 நி 20 வி; அங்கிடத்தின் மேற்கு தெட்டாங்கு 74° . அங்கிடத்தின் காலை ச.க. நேரம் 9ம 30 நிமிடத்திற்குச் சரியான மீ.வ. நேரம் காண்க. (செ)

11. ஏப்ரல் முதல் தேதி ச.க. நன்னிரலுக்குச் சரியான கி.மீ.வ. நேரம் 0ம 42 நி 7 வி. சென்னையின் தெட்டாங்கு 5ம 30 நி 59 வி (கிழக்கு); ஏப்ரல் 2ம் தேதி, இரவு 9ம—45 நிமிடத்திற்குச் சரியான சென்னை மீ.வ. நேரமும், இ.நி. நேரமும் காண்க. (செ)

கல்லூரி நூல் வெளியீட்டு இயக்குநரகம்

தமிழ்நாட்டுப் பாடநூல் நிறுவனம்

சென்னை

1970 ஜனவரிவரை வெளியிட்டுள்ள நூல்கள்

பொருளாதாரம்

*1. பொருளாதாரம்-I	...	சி. வேலையுதம்	...	18	80
*1.A II	...		...	9	00
*2. சோனியத் பொருளாதார வளர்ச்சி	...	டாக்டர் எம். ஜே. கே. தவராஜ்	...	4	25
*3. அமெரிக்கப் பொருளாதாரம்	...		...	4	80
*4. பொருளாதாரச் சித்தனை வரலாறு	...	சொன்னசலம்	...	7	00
*5. பன்னாட்டு வணிகம்	...	மு. ஆரோக்கியசாமி	...	6	00
*6. ஏற்றுமதிப் பொருளாதாரச் கூறுகள்	...	திருமதி ஆர். தாமராஜாட்சி	...	12	00
*7. பொருளாதாரம் - ஓர் ஆறிமுகம்-I	...	தி.சி. மோகன்	...	13	00
*8. II	...	எம். ஏ. அழகர்வாணி, இ.வி. ஸ்ரீநிவாசன்	...	10	75
*9. பொருளாதாரச் கோட்பாடு வளர்ந்த வரலாறு	...	க. முத்தையன்	...	7	00
*10. பன்னாட்டில் வளர்ச்சியும்-I	...	சி வேலையுதம்	...	6	75
*11. II	...		...	11	80
*12. தனியார் பங்கு இலாகா	...	க. வெந்திலேவர்	...	7	80
*13. இந்தியச் செலாவணியும் பங்கு முகையும்	...	பி. வி. ஜீனிவாசன்	...	5	80
*14. அரசாங்க நிதி இலாகா	...	ஆர். சேஷசலம்	...	4	75
*15. இந்தியப் பொருளியல்-I	...	எம். பாலகந்திரமணிவர்	...	10	00
*16. II	...	எம். ஸ்ரீகுமாரன்	...	14	25

*மூல தர (Original Book)

ம. 11

42. பொருளாதர ஸைக்கிப்பற்றிய கட்டுரைகள்	...	எம். கே. கம்பிரமணியம்	...	7	75
43. இந்தியப் பொருளாதர வரலாறு	...	ம. திருநாவுக்கரசு	...	7	00
44- பொருளாதரம்—ஒரு அறிமுகம்	...	பி. வி. சீனிவாசன்	...	8	95
வரலாறு					
*45. பிவிட்டல் வரலாறு—I	...	சி. ஈ. அனுவந்தன்	...	4	50
*46. "	...	"	...	8	50
*47. "	...	"	...	7	25
*48. ஐரோப்பிய வரலாறு—I	...	பி. வி. செங்கப்பா	...	4	50
49. ஐரோப்பிய—கடத்தல் இந்து நாற்றுகளாகவாத்	...	வை. விருத்தகவிசன்	...	15	00
சரித்திரம்					
50. இந்தியாநாடு வரலாறு—I	...	இரா. அனுவந்தன்	...	18	00
51. "	...	ம. மானிக்கவேலு	...	18	00
52. "	...	என். ஜே. ராஜவேலு	...	5	00
53. "	...	"	...	5	00
54. இந்தியாநாடு வரலாறு—I	...	க. த. திருநாவுக்கரசு	...	15	00
55. "	...	எம். எக்ஸ். பிரண்டர்	...	5	00
56. "	...	"	...	5	00
57. இந்தியாவின் சிறப்பு வரலாறு—I	...	சி. வெ. குப்புசாமி	...	7	50
58. "	...	ஏ. உஸ்மான ஜெபீப்	...	9	00
59. "	...	அ. பாலன்ஜிகன்	...	11	00
60. கிரேக்க நாட்டு வரலாறு—I	...	லாபன் ஜ. எஸ். மாக்ஸ்வாதன்	...	7	50
61. "	...	"	...	7	00
62. "	...	பி. இராஜாஜனம் தேவதாஸ்	...	7	75
63. ஆக்ஸ்கோரியன் இந்திய வரலாறு—I	...	சி. வெ. குப்புசாமி	...	5	25
64. "	...	ஏ. உஸ்மான ஜெபீப்	...	7	50
65. "	...	க. த. திருநாவுக்கரசு	...	10	50

* மூலம் (Original Book)

வரலாறு—(தொடர்ச்சி)			ரூ. பை.	
66. முகவாய் பேரரசு—I	...	ஏ. உ. சிவசுந்தர் ஷெரீப். எம். எக்சிஸ். மிராண்டா	...	7 50
67. "	II	எம். எக்சிஸ். மிராண்டா. பா. மானிக்கவேலு	...	7 75
68. ஆங்கில அரசியலமைப்பின் வரலாறு—I	...	வை. விநாயகசுந்தரன். வை. விநாயகசுந்தரன்.	...	7 80
69. "	II	இரா. அண்ணாமலை	...	6 75
70. "	III	இரா. அண்ணாமலை. பா. மானிக்கவேலு	...	6 60
71. "	IV	பா. மானிக்கவேலு	...	7 00
72. ஆங்கிலமொழியின் சமூகபர வரலாறு—I	...	சி. ச. இராமச்சந்திரன்	...	6 60
73. "	II	சி. ச. இராமச்சந்திரன். இரா. ஆனந்தசுந்தரம்	...	6 75
74. "	III	ஆர். ஆனந்தசுந்தரம்	...	6 50
75. இந்தியாவில் முகவாயின் ஆட்சி—I	...	பா. மானிக்கவேலு	...	5 00
76. "	II	ஏ. உ. சிவசுந்தர் ஷெரீப்	...	6 00
77. அரசியல் அமைப்புகள்	...	ஜே. இராமச்சந்திரன்	...	4 82
78. அரசாங்கத்தின் வரலாறு	...	மோ. கிளார்க், டி. டி. பெர்டெல்	...	7 50
79. இந்திய அரசியலமைப்பு	...	எஃ. கன்லிங்ஹாய்	...	4 75
80. அரசியலுக்கு ஒர் அறிமுகம்	...	டி. செல்லப்பா	...	5 50
81. தற்கால அரசியல் அமைப்புகள்	...	மோ. வசந்த்ராவ் கிளார்க்	...	6 50
82. பன்னாட்டு அரசியல்—I	...	சி. ஜெ. ஜார்ஜ்ஸ் பர்லா	...	18 00
83. "	II	"	...	18 25
84. பொதுத்துறை ஆட்சி இயல்—I	...	எஃ. கன்லிங்ஹாய்	...	9 00
85. "	II	இ. ஜெ. கிளார்க்	...	7 25
86. பொதுத்துறை ஆட்சியியலுக்கு ஒர் அறிமுகம்—I	...	எஃ. கன்லிங்ஹாய்	...	7 50
87. "	II	டி. செல்லப்பா	...	7 50

88	இந்திய அரசியலமைப்பின் திட்டம்	...	தி. வெ. முப்புசாமி, எம். கப்பிரமணிவர்	...	9	25
89.	இந்திய ஆட்சி அமைப்பிழைநிறைவுரை வளர்ச்சி-I	...	வி. கண்ணையா	...	6	25
90.	"	II	வி. கண்ணையா, கி. ர. அனுமந்தன்	...	5	75
91.	"	III	கி. ர. அனுமந்தன்	...	7	25
92.	மக்கள் ஆட்சி	...	க. சத்தானம்	...	4	25
93.	1919 முதல் சர்க்காரை உடையவரும் உரை அரசியலும்	...	என். பி. ராஜகோபால்	...	7	25
94.	சமூக அரசியல் கொள்கையின் அடிப்படைகள்	...	மோ. வங்குலன் கிராசிகல்	...	7	00
95.	அரசியலமைப்பின் சட்ட ஆய்வுக்கு இர அறிமுகம்-I	...	பா. குரியநாதராமணன்	...	5	75
96.	"	II	பா. குரியநாதராமணன், கி. ர. அனுமந்தன்	...	6	00
97.	"	III	கி. ர. அனுமந்தன்	...	5	75
உளவியல்						
98.	குழந்தை உளவியல்-I	...	கி. ர. அப்பள்ளிசாச்சரி	...	5	00
99.	"	II	"	...	7	00
100.	உட்கண் மனம்	...	சி. ந. வைத்தீஸ்வரன்	...	7	00
101.	இலையோர் உளவியல்-I	...	தி. இரா. அரங்கசாமி	...	12	00
102.	"	II	"	...	9	00
103.	சமூக உளவியல்	...	என். வெங்கட்ராமணன்	...	9	25
104.	பிழிபிழை உளவியல்	...	அ. பெசன்ட் கிரீப்ஸ்டர்	...	11	00
105.	பித்திரி உளவியல்	...	"	...	8	00
*106.	குமர உளவியல்	...	டாக்டர் மு. அப்துல்	...	3	25

*மூல மூலம் (Original Book)

தத்துவம்

107. இத்து சமயத் தத்துவம்	...	இசு. ராஜாபகதூர்	...	ரூ. பை.
*108. அறிவு ஆரம்பக் இயல்	...	ஆர். ராமானுஜாச்சாரி	...	5 50
*109. மெய்யறிவாட்டுத் தத்துவம்	...	ஆர். எஸ். தேசிகன்	...	5 50
110. அத்தவிர்த்த தத்துவம்	...	கோ. மோ. காத்தி	...	5 50
111. ஆய்வினையப் பயன்வழிக் கொள்கையினர்	...	மோ. வஸ்ருவன் கிணாழன்	...	5 50
112. இத்தியத் தத்துவம் - I	...	எ. ஆ. தேவசேனாபதி, பா. நா. சண்முகசுந்தரம்	...	5 50
113. II	...	...	...	5 50
114. மெய்ப்பொருளியல் - ஓர் அநிநுக்ம் - I	...	சி. இராமலிங்கம்	...	5 50

அறவியல்

115. அறவியல் - ஓர் அநிநுக்ம்	...	கோ. மோ. காத்தி	...	5 50
------------------------------	-----	----------------	-----	------

அனைவரியல்

116. அனைவரியல் - தொடக்க நூல்	...	கி. ரு. அப்பள்ளாச்சாரி	...	2 50
------------------------------	-----	------------------------	-----	------

மரணிடவியல்

*117. மரணிடவியல்	...	ம. ச. கோபாலகிருஷ்ணன்	...	4 75
118. பண்பாட்டுக் கோவல்கள்	...	கி. பூ. சுப்பிரமணியம்	...	5 50
119. இத்தியானில் மூடியானை வரல்கை	...	எஸ். இலட்சுமி	...	5 50

சமூகவியல்

120. சமூகவியலின் அடிப்படைக் கோட்பாடுகள்	...	ஜே. நாராயணன்	...	10 50
---	-----	--------------	-----	-------

புனைபெயர்

121. ஆசியா—I	...	கோ. கோ. நரசிம்மன்	...	8 80
122. " II	...	"	...	8 76
123. இரோப்பைக் கண்டத்தின் புனைபெயர்	...	ஏ. எஸ். நாராயணன்	...	8 80
*124. தென்மேற்கு ஆசியா	...	ஜி. கிருஷ்ணமூர்த்தி	...	8 50
*125. வட ஆமெரிக்கா	...	மாமனி இரா. அலமேலு	...	8 25
*126. தென் அமெரிக்கா	...	எம். என். பத்மநாபன்	...	8 00
*127. தென் கண்டங்கள்—ஆஸ்திரேலியா	...	திருமதி எச். நிழலன்	...	4 00
*128. " —ஆப்பிரிக்கா	...	எஸ். முத்துக்கிருஷ்ணன் கணபகனார்	...	8 25
*129. புனைப்புவனங்கள்—II	...	நா. அனந்தபத்மநாபன்	...	8 00
*130. செவ்வழைப் புனைபெயர்	...	ச. ஜெயசிவத்திரன்	...	9 00
*131. மக்கட்புரப்பெயர்	...	வி. எஸ். அனந்தபத்மநாபன்	...	8 25
*132. சமுத்திரங்கள்	...	கோ. இராமசாமி	...	8 50
133. காலநிலை இயல்—I	...	கோ. கோ. நரசிம்மன்	...	10 00
134. " II	...	"	...	8 00
*135. காலநிலை இயல்	...	திருமதி இரா. நா	...	10 00
136. வானியல்புருகு முர் அறிமுகம்	...	கோ. இராமசாமி	...	11 00
*137. புவி அமைப்பு இயல்	...	சி. விஸ்வநாதன்	...	4 75
138. பொருள்கள் புனைபெயர்	...	கோ. இராமசாமி	...	8 00
139. சிங்களத்தின் வானியல் புனைபெயர்—I	...	எஸ். மானிக்கம்	...	9 50
140. " II	...	எம். கார்த்திகேயன்	...	12 00
141. " III	...	சி. எஸ். நரசிம்மன்	...	8 75

மருத்துவம்

*158. நிழிவு - கலையோகம்	...	டாக்டர் ஜி. வேங்கடசாமி, டாக்டர் எ. சுதேசன்	...	2 50
*159. மகப்பேறுப் பாதச் சேலும்	...	டாக்டர் (முனி) மணிமேகலை	...	8 50
*160. யாக்மரிபா	...	க. சுந்தரம்	...	2 50
*161. புற்றுநோய்	...	அ. சுதேசன்	...	8 50
*162. உடலியக்கியல்--I	...	டாக்டர்கள் ஜி. வேங்கடசாமி, டி. சரோஜினி, எஸ். கே. துரைராஜ், ஆர். சேது	...	6 75
*163. "	...	...	...	5 50
*164. என்யுக்கி நோய்	...	டாக்டர் அ. சுதேசன்	...	7 50

பொறியியல்

*165. நீங்கலே உய்கள் வீட்டைக் கட்டணம்	...	கே. வி. கிருஷ்ணராஜ், சி. ஆர். சுப்பிரமணியம், ஆர். இராமசாமி, கே. வெறுகேயாள்	...	5 50
---------------------------------------	-----	--	-----	------

கட்டுறவு

*166. உலகக் கட்டுறவு இயக்கம்	...	அ. வேங்கணி	...	5 50
------------------------------	-----	------------	-----	------

சட்டம்

*167. குற்றவியல் சட்டம் (முதல் பாகம் (Original Book))	...	எம். சண்முகசுப்பிரமணியம்	...	10 00
--	-----	--------------------------	-----	-------

பொது துணிகள்

- *168. மகாத்மா காந்தி
- *169. விவசாயப் புரட்சி
- *170. சோமக் கை-தூசி
- *171. முதிர்ச்சிச் சோழர் கலையும் சித்புரம்
- *172. உணவும் ஊட்டமும்

புகழுக (P.U.C.) வகுப்புகளுக்கூரியவை

- *173. உலக வரலாறு
- *174. பொருளாதாரம்
- *175. வணிகவியலுக்கு ஓர் அறிமுகம்—I
- *176. "
- *177. பொருளாதாரம்

- *178. புகழுகப் பொருளாதாரம்
- *179. புகழுக வகுப்புகள் கணிதம்—I
- *180. "
- *181. புகழுக வகுப்புகள் கணித துறை—II
- *182. கணிதம்—ஓர் அறிமுகம்—I
- *183. "
- *184. பொருளாதாரம்
- *185. புகழுகப் பொருளாதாரம்
- *186. புகழுகப் பொருளாதாரம்
- *187. புகழுகப் பொருளாதாரம்
- *188. புகழுகப் பொருளாதாரம்
- *189. புகழுக வகுப்புகள் தாவரவியல்

கு. கம்.

- ... சரஸ்வதி நகரம்
- ... வி. க. சிதம்பரம்
- ... வி. க. சிதம்பரம்
- ... வி. க. சிதம்பரம்
- ... வி. க. சிதம்பரம்
- ... வி. க. சிதம்பரம்

- ... வி. க. சிதம்பரம்
- ... வி. க. சிதம்பரம்
- ... வி. க. சிதம்பரம்
- ... வி. க. சிதம்பரம்
- ... வி. க. சிதம்பரம்
- ... வி. க. சிதம்பரம்

- ... வி. க. சிதம்பரம்
- ... வி. க. சிதம்பரம்
- ... வி. க. சிதம்பரம்
- ... வி. க. சிதம்பரம்
- ... வி. க. சிதம்பரம்
- ... வி. க. சிதம்பரம்

பட்டப்படிப்பிற்குரிய (B.Sc.) நூல்கள்

பொதுவியல் (Physics)

*190. எந்திரவியல்—சிற்றடிப்பாடம் (Book I)		ஆர். நாகராசன்	ரூ. 36
*191. பொப்பவியல்—சிற்றடிப்பாடம்		கே. நாகச்சிழாத்தூ	... 36
*192. செய்முறைப்பொதுவியல்—சிற்றடிப் பாடம்		டி. வாலக்கண்ணன்,	
(Book I)		ஏம். கிழட்டினசாமி	... 4 50
*193. பொதுவியல்—தூண்டிப்பாடம்- I (Book I)		பி. தங்கராஜன்	... 4 00
(Book II)			... 8 00
*194. செய்முறை பொதுவியல்—தூண்டிப்பாடம்		கே. பாகவதர், இரா. வெள்ளம்	... 4 50
*195. மின்னியல்—காத்தவியல் (Book I)		டி. ஏ. கருப்பண்ணன்	... 4 75
*197. ஒளியியல்—சிற்றடிப்பாடம்		டாக்டர் வி. சண்முகசுந்தரம்,	
		டாக்டர் ஆர். சபேசன்	... 7 75

வேதியியல் (Chemistry)

*196. செய்முறைக்கனிமவேதியியல்—சிற்றடிப்பாடம்...		டி. இராமலிங்கம்	... 2 25
*199. பொது வேதியியல் (Book I)		டி. சத்தியேஸ்வரன்	... 4 00
*200. கனிம வேதியியல்—தூண்டிப்பாடம்		சி. ஏ. பக்தவத்சல்	... 6 50
*201. கனிம வேதியியல் (Book I)		பி. ஏ. முனிப்பா	... 4 00
*202. பொது பொது வேதியியல்—தூண்டிப்பாடம்...		ஆர். குமாரசாமி	... 4 75

கணிதம் (Mathematics)

*203. இயற்கணிதம்—சிற்றடிப்பாடம் (Book I)		டி. கோவித்தராமன்,	... 4 25
		கே. முத்துசாமி	
*204. தொகுமுறை கணிதவியல்—சிற்றடிப்பாடம்		ஆர். மகாதேவன்	... 2 00

*ஏனாலும் (Original Book)

கணிதம்—(தொடர்ச்சி)

*205. என்சைக் கணிதம்—சிற்றடிப்பாடம்	... எம். எம். இராமசாமி	... 5 80
*206. திரிசூன கணிதம்—சிற்றடிப்பாடம்	... வி. அரங்கநாதன்	... 8 25
*207. கணிதம்—தூண்பாடம்	... ஆர். அரங்கநாதன்	... 8 00
*208. நிலையல்—சிற்றடிப்பாடம்	... கே. இராஜேசுவரன்	... 8 00
புள்ளியியல் (Statistics)		
*209. புள்ளியியல்—தூண்பாடம்	... எஸ். கருப்பப்பா	... 8 50

விலங்கியல் (Zoology)

*210. மூலகெழுப்பற்றவை—I—சிற்றடிப்பாடம்	... ஆர். முருகேசன்	... 11 50
*211. " II—சிற்றடிப்பாடம்	... திருமதி எஸ். கே. வள்ளி	... 11 25
*212. மூலகெழுப்பற்றவை—I—சிற்றடிப்பாடம் (Book I)	... திருமதி சாணி சுந்தரவாமி	... 8 00
*213. " (Book II)	...	... 8 75
*214. மூலகெழுப்பற்றவை—II—சிற்றடிப்பாடம்	... திருமதி கிருஷ்ணவேணி நாராயணன்	... 11 75
*215. மூலகெழுப்பற்றவை—தூண்பாடம்	... எஸ். இராமலிங்கம்	... 8 00
*216. மூலகெழுப்பற்றவை—தூண்பாடம்	... வி. சேது	... 10 00

தாவரவியல் (Botany)

*217. தாவர வேளி உள்னவைப்பியல்—தூண்பாடம்	... கே. ராஜேசுவர்	... 11 00
*218. தாவரவியல்—சிற்றடிப்பாடம்	... கே. பாலசுந்தரனசேகர்	... 8 25
*219. தாவர உள்னவைப்பியல்	... டாக்டர் ஏ. வேலித்தரவு	... 7 50

*ஒவ்வொரு தாள் (Original Book)

