

பறவைகள் (AVES)

திருமதி கிருஷ்ணவேணி நாராயணன்



தமிழ்நாட்டுப் பாடநூல் நிறுவனம்

பறவைகள்

ஆசிரியை

திருமதி சிஞ்ஞனவேணி நாராயணன், எம்.ஏ.,

பேராசிரியை, விலங்கியல் துறை,

அரவினர் மகளிர் கலைக் கல்லூரி,

வட சென்னை.



தமிழ்நாட்டுப் பாடநூல் நிறுவனம்

First Edition—September, 1972

T.N.T.B.S. (C.P.) No. 356

© Tamil Nadu Text Book Society

AVES

TMT. KRISHNAVENI NARAYANAN

Price Rs. 10.00

Published by the Tamil Nadu Text Book Society under the Centrally Sponsored Scheme of Production of books and literature in regional languages at the University level, of the Government of India in the Ministry of Education and Social Welfare (Department of Culture), New Delhi.*

Printed by
Jeevan Press,
Madras-5.

அணிந்துரை

திரு. இரா. வெடுஞ்செழியன்

(தமிழகக் கல்வி-உள்ளாட்சித்துறை அமைச்சர்)

தமிழகக் கல்லூரிக் கல்வி மொழியாக ஆக்சிப் பன்விரன் டான்டுகள் ஆகியிட்டன. குறிப்பிட்ட சில கல்லூரிகளில் பி.ஏ. வகுப்பு மாணவர்கள் தங்கள் பாடங்கள் அனைத்தையும் தமிழிலேயே கற்று வந்தனர். 1968ஆம் ஆண்டின் தொடக்கத்தில் புதுமுக வகுப் பினும் (P.U.C.), 1969ஆம் ஆண்டிலிருந்து பட்டப் படிப்பு வகுப்பு களிலும் அறிவியல் பாடங்களுக்கும் தமிழிலேயே கற்பிக்க ஏற்பாடு செய்துள்ளோம். தமிழிலேயே கற்பிப்போம் என முன்வந்துள்ள கல்லூரி ஆசிரியர்களின் ஊக்கம், சிறப்பான துறைகளிலும் தொண்டு செய்வோர் இதற்கெனத் தந்த உழைப்பு, தங்கள் சிறப்புத் துறை களில் நூல்கள் எழுதித் தர முன்வந்த நூலாசிரியர்கள் தொண் டுணர்ச்சி இவற்றின் காரணமாக இத் திட்டம் நம்மிடையே மலிச்சி டியும் மன திறனையும் தரத் தக்க வகையில் நடைபெற்று வருகிறது. இவ்வகையில், கல்லூரிப் பேராசிரியர்கள் கல்வி, அறிவியல் பாடங்களை மாணவர்களுக்குத் தமிழிலேயே பயிற்றுவிப்பதற்குத் தேவையான பயிற்சியைப் பெறுவதற்கு மதுரைப் பல்கலைக்கழகம் ஆண்டுதோறும் எடுத்துவரும் பெருமுயற்சியைக் குறிப்பிட்டுச் சொல்ல வேண்டும்.

பல துறைகளில் பணிபுரியும் பேராசிரியர்கள் எத்தனையோ நெருக்கடிக்கிடையே குறுகிய காலத்தில் அரிய முறையில் நூல்கள் எழுதித் தந்துள்ளனர்.

வரலாறு, அரசியல், உளவியல், பொருளாதாரம், தத்துவம், புவிவியல், புவிவழிப்பியல், மனவியல், கணிதம், இயற்பியல், வேதியியல், உயிரியல், வானியல், புள்ளியியல், விவகரியல், தாவர வியல், பொறியியல் ஆகிய எல்லாத் துறைகளிலும் தனி நூல்கள், மொழிபெயர்ப்பு நூல்கள் என்ற இரு வகையிலும் தமிழ்நாட்டுப் பாடநூல் திறவனம் வெளியிட்டு வருகிறது.

இவற்றுள் ஒன்றான 'பறவைகள்' என்ற இந்நூல் தமிழ்நாட்டுப் பாடநூல் திறவனத்தின் 356ஆவது வெளியீடாகும். இதுவரை 391 நூல்கள் வெளிவந்துள்ளன. இந் நூல் மைய அரசு கல்வி, சமூக நல அமைச்சகத்தின் மாநில மொழியில் பக்கங்கழக நூல்கள் வெளி யிடும் திட்டத்தின்பேரில் வெளியிடப்படுகிறது.

உழைப்பின் வாரா உறுதிகள் இவை; ஆதலின், உழைத்து வெற்றி காண்போம். தமிழகப் பயிலும் மாணவர்கள் உலக மாணவர்களிடையே சிறந்த இடம் பெறவேண்டும். அதிலே தமிழ்நாட்டின் குறிக்கோளுமாகும். தமிழ்நாட்டுப் பல்கலைக்கழகக் களின் பல்வகை உதவிகளுக்கும் ஒத்துழைப்புக்கும் நம் மனம்கவந்த தன்றி உரிவதாகுக.

இரா. வெடுஞ்செழியன்

பொருளடக்கம்

	பக்கம்
1. தோற்றுவாய்	... 1
2. புதைபடிவ வரலாறும் தோற்றமும்	... 6
3. பறவைகளின் புறப்போர்வை மண்டலம்	... 23
4. பறவைகளின் எலும்பு மண்டலம்	... 47
5. பறவைகளின் சீரண மண்டலம்	... 85
6. பறவைகளின் கவாச மண்டலம்	... 106
7. பறவைகளின் இரத்த ஓட்ட மண்டலம்	... 135
8. பறவைகளின் தரம்பு மண்டலம்	... 149
9. பறவைகளின் உணர்ச்சி உறுப்புகள்	... 170
10. பறவைகளின் நாளமிக்வாச சுரப்பிகள்	... 187
11. பறவைகளின் கழிவு மண்டலம்	... 207
12. பறவைகளின் இனப்பெருக்க மண்டலம்	... 217
13. பறவை ஒரு பறக்கும் இயந்திரம்	... 235
14. பறவைகள் பறப்பதற்கேற்ப அமைந்துள்ள தகவமைப்புகள்	... 246
15. பறவைகளின்-தகவமைப்பிற்கேற்ப ளாரும் மூறைகள்	... 258
16. பறவைகளின் வகைபாடு	... 297
17. பறவைகள் வகைசை போதல்	... 405
18. பறவைகளின் பழக்கவழக்கங்கள்	... 427
19. பறவைகளின் வருடாந்தர வாழ்க்கைச் சுழற்சி	
" பருதி—I	... 440
" பருதி—II	... 451
" பருதி—III	... 467
20. நில இயல் அமைப்பிற்கொப்ப தற்காலப் பறவைகளின் பரவி வரிக்கும் மூறைகள்	... 482
தூற்பெயர்க் கோவை	... 501
கலைச்சொற்கள்	... 502

1. தோற்றுவாய்

உயிர் வாழ்வனவற்றின் பறவைகள் தொன்றுதொட்டே மக்களை வேருவாகக் கவர்ந்திருக்கின்றன. மனிதன் தன் பேர்முதுபோக்கிற் காக்கலா அல்லது தொழில் நிமித்தமாகவோ பறவைகளைப் பற்றிய கண்ணோட்டத்தின் மிகவும் ஆர்வமுள்ளவனாக விருத்திக்குகின். அவற்றின் புறத்தோற்றத்தின் அழகிய வண்ணங்களும், மதுரமான குரலினையும், பழக்க வழக்கங்களும், 'வவரை' போதல் போன்ற



படம் 1:

பறவைகளின் பல்வேறு வடிவங்களை முறைகளுக்கேற்பத் தலைய முறைகள்

1. ஆர்க்கியாப்பெரிக்ஸ், 2. திக்கோழி, 3. பெங்குவின்,
4. வாத்து, 5. கழுஞ், 6. ஆத்தை, 7. நாய்க்கி பறவை,
8. குருவி, 9. நாரை, 10. தூக்கனும் குருவி.

நூதன வடிவங்களை முறையும் மனிதனின் ஆர்வத்தைத் தூண்டுவன வாயிருத்திருக்கின்றன. ஆகவே மேலும் அவற்றைப் பற்றிய புதுமை களைக் கண்டறிய வேண்டுமென்ற புத்தூணர்வும் ஊக்கமும் மனித னுக்கு ஏற்படுவது இயற்கையே.

பறவைகளில் பல நூற்றுக்கணக்கான இனங்கள் உள்ளன. அவற்றைக் கண்டறிவதே ஒரு பெரிய சாதனை ஆகும். தற்போது பல நூதன மூதையனும், அதற்கான வசதிகளும் தோன்றியிருப்பதால் பறவைகளைப் பற்றிய ஆராய்ச்சி இன்று உன்னத நிலையில் உள்ளது. மேலும் பல இயற்கைச் சூழ்நிலைகளில் மார்த்தரித்த ஆராய்ச்சிக் (Field) குறிப்புகளும், இருகண்ணோக்கி போன்ற கருவியின் கண்டு பிடிப்பும், ஒலியர்களின் வண்ணச் சித்திரங்களும், நூல் நிலையங்களும் இத்துறையில் மனிதனுக்குப் பெரிதும் பயன்படுகின்றன.

சிறந்த பறவை ஆராய்ச்சியாளர்களாகக் கருதப்படுகிறவர்கள் யாவரும், மிகவும் கடினமான சூழ்நிலையிலும் தனிமையாக விடா முயற்சியுடன் அயராது உழைக்கும் தன்மை வாய்ந்தவர்களாக உள்ளார்கள். அவர்களுள் பல குழுக்கள் அமைக்கப்பட்டு, ஒவ்வொரு குழுவும் தனித்தனியே செயல்படுகின்றது. அவ்வாறு செயல்பட்டு சேகரிக்கப்பட்ட விவரங்களை அவர்கள் புனைப்படங்கள் மூலமாகவும், விரிவுரைகள் மூலமாகவும் இதர மக்களுக்கு எடுத்துரைக்கின்றனர். தற்போது உலகில் பறவையினம் மக்கள் பெருக்கத்தினாலும், தொழிற் துறையில் ஏற்பட்டுள்ள முன்னேற்றத்தின் காரணமாகவும் குறைந்து கொண்டே வருகின்றது.

பண்டைய வரலாறு

பேலியோலித்திக் (Paleolithic) காலத்திலிருந்தே மனிதன் அதாவது கற்கால (Stone age) மனிதன், பறவைப் பற்றிய ஆராய்ச்சியில் ஈடுபட்டிருந்தானென்பதற்கு பிரான்ஸ், ஸ்பெயின் முதலிய நாடுகளிலிருந்து கண்டுபிடிக்கப்பட்ட சித்திரங்கள் சான்றுகளாக உள்ளன. கி. மு. 3000 ஆண்டுகளுக்கு முன்பாகவே கிரேக்கர்கள் பறவைகளை தங்கள் சின்னங்களாக உபயோகித்திருக்கின்றனர். பறவைகளை வண்ணச் சித்திரங்களாக வரைத்தும், அவர்களில் சிற்பங்களாகச் செதுக்கவும், புறத்தோற்றத்தைப் பற்றிய குறிப்புக்களைத் தயாரித்தும் வாழ்த்திருக்கின்றனர். அக்காலத்திலேயே கமார் தொண்டிராறு (90) வகைப் பறவையினங்களைக் கண்டு பிடித்துள்ளதாகத் தெரிகின்றது. சீனர்களும் பண்டைக் காலத்தில் பறவைகளை மூத்திரைச் சின்னங்களாகவும், வண்ணப் படங்களாகவும் வரைத்து உள்ளனர். மற்றும் மத்திய அமெரிக்காவின் பூர்வ குடிசனான அஸ்டெக் (Aztec) பிரிவினர் ராஜாணி, வான்கொழி, ஆத்ம போன்ற பறவைகளைக் கவியிலும், மரத்திலும் மிகவும் நிறைபட சிற்பங்களாகச் செதுக்குவதில் வல்லுனர்களாயிருந்திருக்கின்றனர் என்பது தெரிகின்றது. கிறிஸ்தவ வேதத்திலும் (Bible) சுமார் 30 வகைப் பறவைகளைப் பெயர்களோடு குறிப்பிடப்பட்டு

டுள்ளது. இல்பேரிய மக்கள் புறவையும் கறுகையும் மிகவும் ரசித்து வந்துள்ளனர். வலகைப் போதலைப் பற்றி (Migration) ஐரப் என்பவர் (Job) பருந்து போன்ற (Hawk) பறவைகள் தன் ஞானத் தாம் நிகை அறிந்து தனது இறகுகளைத் தெற்கு நோக்கி விரித்தது என்றும், ஜெர்மன் (Jeremiah) என்னும் குறிப்பில் மடையான், கொக்கு போன்ற பறவை இனங்கள் வலகைப் போதும் காவத்தை முன்கூட்டியே அறிந்து கொள்கிறது என்றும் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது.

முதன் முதலாக அரிஸ்டாட்டில் (Aristotle) என்னும் இரேக்க அறிஞர் பறவை வகைப்பாடு என்ற பிரிவை இ.மு. 300-ஆம் ஆண்டில் தோற்றுவித்தார். அவர் நுண்ணோக்கியை (Microscope) கண்டு பிடிப்பதற்கு முன்பே பறவைகளை அறுவை செய்து அவற்றின் உள் தோற்றம் கருவின் அமைப்பு முதலியன பற்றியும் பரிசோதனை செய்து எழுதி உள்ளார். இவரது வகைப்பாடு மிகப் பழமையான தானாலும் சாஸ்திரத்ததாகக் கருதப்படுகின்றது.

12ஆம் நூற்றாண்டில் மறுமலர்ச்சி காலத்தில் (Renaissance age) உயிர் வாழும் பிராணிகளைப் பற்றிய ஆராய்ச்சி தன் தூக்கிவது. அவற்றில் பறவைப் பற்றிய ஆராய்ச்சி இங்கிலாந்து, பிரான்ஸ், ஜெர்மன் மற்றும் பல ஐரோப்பிய நாடுகளிலும் வளர்ந்து மிகவும் உன்னத நிலையை அடைந்தது. அவற்றுள் டர்னரின் (Turner-father of British ornithology) 1544-ஆம் ஆண்டு படைப்பும், வில்லோபி, ரே (Willowby & Ray) முதலானவர்களின் வகைப்பாடும் தலைசிறந்த தலைகளாகும்.

பறவையினம் மனிதனுடைய வாழ்க்கையில் ஒரு சிறந்த பகுதியாக தொன்றுதொட்டே விளங்கி வருகின்றது. மனிதனுக்கு உணவாக மட்டுமின்றி கடற்பயணங்களில் நிகைத் தெரிவாத சமயங்களில் சிறந்த வழிகாட்டியாகவும் உதவியிருக்கின்றது. இங்கிலேயனில் சில நிகைப் பகுதிகள் அவ்வது கண்டங்கள் இன்றுவரை கண்டுபிடிக்க முடியாமலே இருந்திருக்கும். ஆதிமனிதன் பறவைகளிடம் ஒரு தவி ஈடுபாடு கொண்டு அவற்றின் புதுமைகளை ஆராய்ந்து பவவகைக் குறிப்புகள் தயாரித்தும், சித்திரங்கள் வரைத்தும் சிற்பங்களச் செய்துக்கியும் அனுபவித்து வாழ்ந்திருக்கின்றான். மேற்கண்ட குறிப்பு களின் உதவியால் உயிர் வாழ்வவவற்றின் இயற்கைச் சரிதங்கள் அடுபென் (Audubon) காவத்திற்கு முன்பே பிரசுரிக்கப்பட்டுள்ளன. ஆளும் நூற்றாண்டிலேயே மனிதன் பறவைகளை மீன் பிடிக்கவும், செவ்வி கொண்டு செல்வவும், விளையாட்டுப் போட்டிகளில் பங்கு பெறவும் பயிற்சி அளித்தும், அவற்றின் இறகுகளை அழகு சாதனைகளாகவும் உபயோகித்தும், பரீரைவழிக்கும் புழு பூச்சிகளைக் கொல்லும் கருவியாகவும் பயன்படுத்தியிருக்கின்றான்.

பறவை ஆராய்ச்சியில் முதலிடம் வகிப்பவர் அமெரிக்கர். அளர் கனில் மூக்கியமாக வில்சன் (Wilson) அடுபென் (Audubon) என்பவர்கள் குறிப்பிடத்தக்கவர்கள். இவர்களின் ஆராய்ச்சிக் குறிப்புகள் வருங்கால ஆராய்ச்சியாளர்களுக்கு இன்றியமையாத வழிகாட்டியாக அமைகின்றன.

பறவைப் பற்றிய தற்கால நூதன ஆராய்ச்சியில் சில முக்கிய விதிகள் : இனம் பிரித்து வகைப்படுத்தல் :— விஞ்ஞானிகளைத் தவிர இதர மக்களும் ஆர்வத்தோடு பறவைகளைக் கர்ந்து பார்த்தறிந்தவற்றைப் பற்றிய விவரங்களைத் தொகுத்து எண்ணிக்கையுடன் அட்டவணை தயாரிக்கின்றனர். அத்தகைய அட்டவணை நாள வாரியாகவும் (Daily list), காலவாரியாகவும் (Seasonal), வருடாந்தரமாகவும் (Annual), வாழ்க்கை வரலாற்றோடு சம்பந்தப்படுத்தியும் தயாரிப்பதுண்டு. அதாவது வசந்தகாலம், குளிர்காலம், கோடைக்காலம் போன்ற காலங்களில் காணப்படும் பறவைகளை இவ்வாரியாக வகைப்படுத்தி மிகவும் கவனமாக எப்பொழுது, எங்கே, எந்த சூழ்நிலையில், எத்தனை என்று பல தலைப்பின்பிழ் விவரங்கள் தயாரிக்கின்றனர். இங்ஙனம் தயாரிக்கப்பட்ட விவரங்கள் மேற்கொண்டு பறவைகளைப் பற்றிய ஆராய்ச்சிக்குப் பெரிதும் பயன்பட்டன.

கடத்த இரண்டு நூலுறைகளாகப் பறவையினத்தைப் பற்றிய விவரங்களைப் பதிவு செய்கும் முயற்சியில் போட்டி உண்டாபிப் பல குழுக்கள் தனித்தனியாகப் பிரித்து செவ்வேறு திசையில் சென்று குறிப்புனை வகைப்படுத்தி எண்ணிக்கை விவரங்களுடன் தயாரித்து வருகின்றனர். மாணவர்கள் ஆராய்ச்சியாளர் போன்றவர் வருடாந்தரக் குறிப்புகளுடன் அட்டவணை தயாரிப்பது வழக்கம். ஆனால் வாழ்க்கைக் குறிப்புடன் கூடிய அட்டவணை ஒரிடத்திலேயே ஆராய்ந்தறிவது என்பது இயலாது.

பறவைப் பற்றிய புள்ளி விவரங்களில் கடத்த 80 ஆண்டுகளாக வருடாந்தர கிறிஸ்துமஸ் எண்ணிக்கை (Annual Christmas Count) என்னும் உதாரணத்தைத் துவக்கிய அமெரிக்க இயற்கைவாதி (American Naturalist) பிராங்க் எம். சாப்மேன் (Frank M. Chapman) என்பவர் தேசிய அடுபென் கழகத்தின் வாயிலாக (Natural Audubon Society) நடத்திய விவரங்கள் மிகவும் கிறந்ததாகும். விஞ்ஞான ரீதியாக மேற்கண்ட கழகம் மேலும் பல பயனுள்ள விவரங்களை ஐக்கிய நாட்டு மீன் மற்றும் வனவிலக்குத் துறை இலாகாவின் தொடர்புடன் (United States of Fish and wild life Service) பிரசுரித்திருக்கிறது. அதாவது வெப்ப நிலைக்கேற்றவாறு பறவைகளின் இன மாற்றம் எண்ணிக்கை வேறுபாடு, வாழ்க்கை

முறை இனப் பெருக்கம், இடமாற்றம் போன்ற பல விவரங்களைத் தயாரித்துள்ளது. ஒரு மிலர் நிரைப்படம் மூலமாக மக்களைப் பறவை மீனத்தைப் பற்றி அறிய தூண்டுகிறார்கள். பறவைகளுக்கு வலியம் (Band) புட்டும் முறையாக அவற்றின் வலகை போகும் (Migration) திசையையும், வறக்கத்தைப் பற்றிய சிக்கல்களைத் தீர்க்கவும், அட்ட வகைக் குறிப்புகள் தயாரிக்கவும் முடிவின்றது.

சில பறவை ரசிகர்கள் பறவைகளைக் கவரும் நோக்கத்தோடு பழத்தொட்டங்கள், கலர்ச்சியான காடுகள், உணவுக் கட்டங்கள், குளக்குமிடங்கள் போன்றவைகளை நிறுவுகின்றனர். ஆனால் வேட்டை யாடுபவர் பறவைகளை ரசிக்கமாட்டார்கள். மாணவர்களும் ஆராய்ச்சியாளர்களும் பறவையின் புற அமைப்பு, அக அமைப்பு, குழந்தை பழக்கவழக்கங்கள், இனப் பிரிவுகள் என்றவற்று பாகுபடுத்தி கண்டறிகின்றனர். சாதாரண மனிதன் அவற்றின் வாழ்க்கை பற்றிய ஆராய்ச்சியோடு நிறுத்திக் கொள்கிறான். பொதுவாக இத் துறையைப்பற்றி அறிய விரும்புபவர்களில் மிகவும் சாதாரண மனிதன் முதல் அரசன்வரை சமமாகின்றான்.

தொழிற் துறையில் நோக்குங்கால், இத்துறையில் ஆராய்ச்சி அனுபவமூள்வனனாகே சிறந்த வாய்ப்புகள் கிடைக்கின்றன.

பறவைகளின் இயற்கை புகளரன் (Sanctuary) களைக் கூடங்கள் (Museum) போன்ற அமைப்புகள் மக்களுக்கு ஒருவித ஊக்கத்தை உண்டாக்குகின்றன.

இவ்வாறாகப் பண்டைதொட்டே சாதாரண மனிதன் முதற் கொண்டு ஆராய்ச்சியாளர்வரை பறவைகளைப் பற்றி ஆராய்ந்தறிந்து வருகின்றனரென்பது தெள்ளெனப் புளளுகின்றது. வருங்காலத்திலும் இந்த ஆர்வம் மேலும் வளர்ந்து பெருகும் என்பது உறுதி.

2. புதை படிவ வரலாறும் தோற்றமும்

பறவைகளின் புதை படிவ வரலாறு—ஊர்வன, பாலூட்டிகள் முதலியனவற்றின் புதை படிவங்களைப் போன்று, பறவைகளின் புதை படிவங்கள் நமக்கு அய்வனவாக ஆராய்ச்சிக்குக் கிடைக்கவில்லை. பின்னும் மீறிய எல்லா வகைப் பிராணிகளிலும் புதை படிவங்களாக கிடைத்ததை விட பறவைகளைப் பற்றிய புதைப் படிவங்கள் ஒரு சில தான் நமக்குக் கிடைத்தன. பறவைகள் தங்களது பறக்கும் நிறப்புப் பண்புகளாலும் கெட்டிப்படுத்தப்படா வெற்றிடமாக உள்ள எலும்பு முதலியனவற்றைப் பெற்றிருந்ததாலும், பறந்து நிரிதலாக, பூமிக் கஷலில் புதை படிவமாகப் படிந்து, காப்பாற்றப் படுதலிற்குப் போதிய சத்தர்ப்பம் கிடைக்கவில்லை. செக்ஸ்டனிகளில் உள்ளது போன்ற ஒடுகளோ, ஊர்வன, பாலூட்டிகள் முதலியவற்றிலுள்ளது போன்ற கெட்டியான எலும்புகளோ பறவைகளுக்கெல்லாத் காரணத்தால் அவைகள் புதை படிவங்களாகக் கிடைக்கப் பெறவில்லை. இவ்வாறான காரணங்களால் பறவைகளின் புதைப் படிவங்களில் ஒரு சில வற்றைப் பற்றியே நாம் அறிந்து கொள்ளலாம்.

ஜூரேசிக் காலத்தில் வாழ்ந்த பறவைகளைக் குறித்து, நமக்குக் கிடைத்த மூன்று எலும்புக் கருவிகளுமேயே தெரியவருகின்றது. கிரிட்டேஷியஸ் காலப் பறவைகளைப் பற்றியும் அய்வனவாகத் தெரிய வில்லை. சீனோ சோயிக் (Cenozoic) காலத்தில் வாழ்ந்த பறவைகளைப் பற்றியே புதைபடிவங்கள் மூலமாக நமக்கு அதிகமாகத் தெரிக் துள்ளது.

ஜூரேசிக் காலப் பறவைகள்

ஆர்க்கியாப்டெரிக்ஸ்

ஆர்க்கியாப்டெரிக்ஸ் என்னும் பறவைதான் மிகப் பழைமையான புதைப்படிவ பறவையாகும். ஆர்க்கியாப்டெரிக்ஸ் என்பதற்கு

புதை படிவ வரலாறும் தோற்றமும்

‘தொன்மை இறக்கை’ (Ancient wing) என்பது பொருள். இது 140 லட்சம் வருடங்களுக்கு முன்னால் ஜூரேசிக் காலத்தில் வாழ்ந்த மிகப் பழமையான பறவையாகும். அன்டிரியாஸ் வேக்னெர் (Andreas wagner) என்பவர் 1861ஆம் ஆண்டு ஹெர்மெனியிலுள்ள பாவேரியா என்னும் இடத்திலுள்ள சாலன்ஹோஃபன் (Solenhofen) என்ற இடத்தின் கற்பான அச்சப் பலகையின் மூலம் கண்டு பிடித்தார். பல்விசையப் போன்ற இந்த புதைபடிவப் பறவை இரு காலினை யுடைய டைபெனசிர் ஊர்வனவற்றை ஒத்திருந்தது. ஆனால் ஆர்க்கியாப்டெரிக்ஸ் பறவைகளில் காணும் இறகுகள் டைனோசார் பிராணிகளுக்குக் கிடையாது.

இப்பிராணியைப் பற்றிய கண்டுபிடிப்பு விஞ்ஞான உலகின் ஒரு அரும்பெரும் சாதனையாகும். சார்வஸ் டார்வின் என்னும் பெரியார் 1859ஆம் ஆண்டு அதாவது இப்புதை படிவ பறவையைப் பற்றிக் கண்டுபிடிப்பதற்கு இரண்டு வருடங்களுக்கு முன்புதான், தன்னுடைய ‘சிறப்பினங்கள் தோன்றியலகை’ (Origin of Species) என்ற புத்தகத்தை வெளியிட்டார். அவருடைய புதைபடிவங்களைப் பற்றி ஆராய்ச்சியில் பறவைகள் ஊர்வனப் பிராணிகளினின்றும் தான் தோன்றியிருக்க வேண்டுமென்பதை விளக்கியுள்ளார். வேக்னெர் முதன் முதலில் கிடைத்த இந்தப் பறவை புதை படிவத்திற்கு கிரிஃப் போசெளரஸ் (Gryphosaurus) என்று பெயர் கொடுத்தார். பின்பு ஹெர்மென் வான் மேயர் (Hermann Von Meyer) என்பவர் அதற்கு ஆர்க்கியாப்டெரிக்ஸ் வித்தோ கிரேஃபிக் (Archaeopteryx lithographica) என்று பெயர் சூட்டினார். 1877ஆம் ஆண்டு, முதல் புதை படிவ பறவை கிடைத்த இடத்திலிருந்து 10ஆவது மைலில் முழுமையான எலும்புக் கூட்டுடன் மற்றுமொரு புதைபடிவ பறவை கிடைத்தது. இப்பொழுது பெர்லின் கலைக் கூடத்திலுள்ள அப் பறவைக்கு ஆர்க்கியார்னிக்ஸ் சிமென்சி (Archaeornis Siemensi) என்று பெயரிடப்பட்டது. 1956ஆம் ஆண்டு மூன்றாவது புதை படிவ பறவை இனம் அதாவது ஆர்க்கியாப்டெரிக்ஸ்ஸைச் சேர்ந்த இனமே கிடைத்துள்ளது. இந்த மூன்று சிறப்பினங்களும் ஒரு பொது இனத்தையே (Genus) சார்ந்ததாக யிருக்க வேண்டுமென்று கருதப்படுகின்றது.

மேற்கூறிய புதை படிவங்கள் கடற்கரைகளில் கிடைத்திருப்பினும் ஆர்க்கியாப்டெரிக்ஸ் பறவை, காடுகளிலேயே வசித்திருக்கும் என்று கருதப்படுவதற்குப் போதிய ஆதாரங்கள் உள்ளன.

ஆர்க்கியாப்டெரிக்ஸ் பறவையின் கட்ட அமைப்பு:— ஆர்க்கியாப்டெரிக்ஸ், காகம் அல்லது புறவின் அளவுடைய, நிலத்தில் வாலும் பறவை இனமாகும். இதை ஓர் உண்மையான பறவையினமாகக்

சுருத முடிவானியுடனும், ஊர்வனப் பிராணிகளுடனும் வகைப்படுத்த முடியாது.

ஆர்க்கிபாப்டெரிக்ஸ் பறவைக்கு பைகோஸ்டைல் (Pygostyle) என்ற வாக் முள்ளெலும்பின் கடைப்பகுதி இம்மிங் என்பதுடன் வாக், நுனி வரை நீண்டு அதில் 21 முதல் 23 வரை வாக் முள்ளெலும்புகளும் உள்ளன. மற்றும் கடைசி 12 வாக் முள்ளெலும்புகளுக்கு ஒவ்வொன்றிலும் ஒரு சோடி பெரிய நங்கூக வளர்ச்சியுற்ற பக்க வாக் இறகுகள் உள்ளன. டைனோசார் பிராணிகளில் உள்ளது போன்ற தற்போதுள்ள பறவைகளிலில்லாத நீண்ட வாக் பகுதி இவற்றிற்கு உள்ளன.

ஆர்க்கிபாப்டெரிக்ஸ் பறவையின் மண்டையோடு, தற்போதுள்ள பறவைகளின் மண்டையோட்டினை ஒத்தே உள்ளன. இதன் மண்டையோட்டில் பெரிய உருண்டை வடிவமான மூளைப் பெட்டகம் உள்ளது. இதன் அககு குட்டையாகவும் மழுங்கியும் உள்ளது. மற்றும் இதன் தாடைகள் பல்பொருத்தியதாகவும், ஒவ்வொன்றிலும் குட்டையான கூம்பு வடிவமான பற்களின் வரிசையும் உள்ளன. இப்பிராணிகளின் தாடை எலும்புகள் தற்போதுள்ள பறவைகளின் தாடை எலும்புகளைவிட எடைகூடுதலாகவும் உள்ளன. மேல் தாடையில் ஒவ்வொரு பக்கத்திலும் 13 பற்களும் கீழ்தாடையில் ஒவ்வொரு பக்கத்திலும் 3 பற்களும் குழியில் பொருத்துமாறு அமைந்துள்ளன.

இப்பறவைகளுக்கு தற்போதுள்ள பறவைகளில் உள்ளதுபோன்ற பெரிய கண் குழிகள் உள்ளன. அதில் ஒரு ஸ்கிரோட்டிக் எலும்புகள் வளைவம் போன்ற அமைப்பு தற்போதுள்ள மீன்களில் உள்ளது போன்றுள்ளன.

முள்ளெலும்புத் தண்டில் 50 முள்ளெலும்புகள் உள்ளன. அவற்றில் 10 அல்லது 11 சுறுத்து முள்ளெலும்புகள் உள்ளன. சேக்ரல் முள்ளெலும்புகள் இரண்டுதான் உள்ளன. ஆர்னித்தோ போடுடைனோசொர் (Ornithopod dinosaurs) பிராணிகளில் உள்ளது போன்று சேக்ரல் பகுதியில் 6 முள்ளெலும்புகளே உள்ளன. இந்த முள்ளெலும்புகளில் செஷ்ட்ராப் பகுதிகள் இருபுறமும் குறித்து ஆம்ஃபிசீலஸ் (Amphiceelous) வகையைச் சார்ந்ததாக உள்ளன. இதுபோன்ற ஆம்ஃபிசீலஸ் வகை செஷ்ட்ராக்கள் ஸ்பிரோடான் போன்ற பழமையான ஊர்வனவற்றில் காணலாம்.

இவற்றின் விவரவெலும்புகள் பெரிதும் நுண்ணியதாகவும் அச்சினைட் நீட்சிகளற்றும் காணப்படினும் சூத்தத்தெலும்புகளைக் கொண்டதாகவே காணப்படுகின்றன.

புதை படிவ வரலாறும் தொற்றளும்

செர்விக்ஸ் விளாவெலும்புகள் மார்புப்பகுதி விளாவெலும்புகள் மூதலியவைகள் அல்லாமல் வயிற்றுப் பகுதியிலும் மெல்லிய விளாவெலும்புகள் உள்ளன. இந்த வயிற்றுப்பகுதி விளாவெலும்புகள் வயிற்றுப் புதப் பரப்பில் விபிஞ்ஞடான், மூதலைகள் மூதலிய ஊர்வன வற்றில் உள்ளதுபோன்று குறுக்காக அமைந்துள்ளன. இந்த விளாவெலும்புகளுக்கு கேஸ்ட்ரே வியா (Gastralia) என்று பெயர். மார்பெலும்புடன் இந்த விளாவெலும்புகள் அசைவும்படி பொருத்தப் படவில்லை.

ஆர்க்லியாப்டெரிக்ஸ்சில் மார்பெலும்பு தட்டையானதும் அடித் தட்டைக்கமம் இல்லாமலும் அமைந்துள்ளது. இவ்வாறு மார்பெலும்பு அடித் தட்டைக்கமமற்ற கணப்படுவதால் இதற்கு பறக்கவதவும் மார்புத்தசைகளும் கிடையாது.

ஸ்கெப்புலா எனும்பு துண் ணியதாகவே உள்ளது. மற் றும் இது தற்போதுள்ள பறவைகளில் உள்ளதுபோன்று சற்று வளைந்தும் காணப் படுகின்றது. கோரகாய்டு எனும்புகள் சிதிலமாகவே உள்ளன. 'இப்பறவைக்கு புவடிவமுடைய சிபர்குலா (கவை) எனும்பு தற் போதுள்ள பறவைகளில் உள்ளதுபோன்றே அமைத் துள்ளது. இந்த சிபர்குலா எனும்பு கழுத்துப்பட்டை அல்லது மிமெயிக்ஸ் எனும்புகளின் இணைப்பிலுள்ளது.



படம் 2. ஆர்க்லியாப்டெரிக்ஸ்

1. நெய்மரல் அல்லது மேல் கர எனும்பு
2. சிபர்குலா
3. கோரகாய்டு
4. ஸ்கெப்புலா
5. தனித்த மெட்டாக் கார்ப்பல் எனும்புகள்
6. ரெடியல்
7. அக்கு
8. சிபீமர்
9. டியோன
10. டார்சோ மெட்ட டார்சம்சல்
11. வால் மூட்டுஎலும்புகள்
12. வால்
13. மண்டையோடு
14. பற்கள்

இப்பிராணிகளுக்கு நன்றாக வளர்ச்சியுற்ற இறக்கைகள் உள்ளன. நெய்மரல் அல்லது மேல்கர எனும்பு நன்றாக அமைவப்

பெற்ற டெய்டாங்கு நீள் வளை மேட்டுடன் குதிர்ப்பிடத்தக்க முறையில் பெரியதாக அமைந்துள்ளது. இது போன்று அமைப்பு பெற்ற மேக்கர எலும்பின் வடிவத்திலிருந்து, மேல் கரத்தில் இரு புடைப்புத் தசைகள் (Biceps) நன்றாக பணம்பொருத்தியதாக அமைய வில்லை, கையின் முன்கரத்தினுள்ள அக்னோரேடியஸ் எலும்புகள் நீளமாகவும் பணம் பொருத்தியதாகவும் உள்ளன. இப்பிராணியின் கை, ஊர்வனப் பிராணிகளின் கையை ஒத்துள்ளது. மெட்டா கார்ப்பல் எலும்புகள் தனித்தனியே காணப்படுகின்றன. மற்றப் பறவைகளைப் போன்றே இந்தப் பிராணியிலும் கார்ப்போ மெட்டா கார்ப்பல் எலும்புகள் இடையாது. கையில் தனித்தனியாகக் காணப்படும் மூன்று விரல்கள் உள்ளன. அடில் முறையே 2, 3, 4 பகுதிகள் உள்ளன. ஒவ்வொரு விரலின் நுனிப்பகுதியிலும் ஒரு கூரிய நகம் உள்ளது. இப்பிராணியின் ஒவ்வொரு இறக்கையிலும் 17 பெரிய பறக்க உதவும் ரெமிஜெஸ் இறகுகள் உள்ளன. அடில் 7 இறகுகள் முதலாய்வு இறகுகளாகவும் 10 இறகுகள் இரண்டாய்வு இறகுகளாகவும் கருதப்படுகின்றன. தற்போது வசிக்கும் பறவைகளின் இறகுகளைப் போன்றே இவ்வினங்களின் இறகுகள் மிகவும் நுண்ணியதாக உள்ளன. இப்பிராணிகள் பறக்க முடியாத நிலையில் உள்ளதால் முன்னங்கால்கள் கால்களாகவே பயன்படுகின்றனவேயன்றி பறக்க உதவுவதில்லை. இப்பிராணிகளுக்கு நன்றாக வளர்ச்சியுற்ற இறக்கைகள் இவ்வாத காரணத்தால் இவைகள் நழுவிப்பறக்கும் ஆற்றல் மட்டுமே பெற்றுள்ளன. மற்றும் இவற்றின் இறகுகளுடன் கூடிய அகன்ற வால் பகுதி மிதவைகளைப் போன்று மிதந்து நழுவிப் பறக்கவாக்கும் பயன்படுகின்றன. இவ்வினங்குகளின் கால் விரல்களினுள்ள கூரிய நகங்கள் இவைகளைப் பற்றிப் பிடித்து ஏறிச் செல்லுவதற்கேற்ப அமைந்துள்ளன. நாபஸ்கா (Nopsca) என்ற அறிஞரின் கருத்துப்படி இதுகாலியியுடைய இறக்கைகையுடைய பிராணிகள் அடுவைகளாக ஒடும் பொழுது, தங்களது பறக்கும் ஆற்றலைப் பெற்றன என்று கருதினார். இப்பிராணிகள் தங்களது உறுதிவாய்த்த கால்களின் உதவியால் நன்றாக ஒடும் ஆற்றலைப் பெற்றிருந்தன. முன்னங்கால்களின் கூரிய நகங்களின் உதவியால் இவைகள் மரம், புதர் முதலானவற்றில் நன்றாகப் பற்றிப் பிடித்து ஏறும் ஆற்றல் பெற்றிருந்தன.

இவற்றின் இடுப்பு எலும்பும், பின்னங்கால் எலும்புகளும் ஊர்வனப் பிராணிகளின் அமைப்பினையும், பறவைகளின் அமைப்பினையும் பெற்றிருந்தன. நன்றாக பின்புறமாக நீட்டப் பெற்றிருந்த பூழியின் எலும்பும், நுனியுடைய அட்டையுடைய பகுதியும் தற்போதுள்ள பறவைகளில் உள்ளது போன்றே இப்பிராணிகளில் இருந்தன. ஆனால் இந்த எலும்புகளுக்கிடையில் பொருத்துவாய்ப்பு பகுதிகள் (Sutures) உள்ளன. மற்றும் இப்பிராணிகளின் டிபியா

எலும்பும் கீழ்ப்பா எலும்பும் (Tibia and Fibula) ஒரே அளவுடன் தனித்தனியாக அமைந்துள்ளன. பாதத்தில் மெல்லிய 4 டார்சோ மெட்டாசர்சல் எலும்புகள் உள்ளன. அந்த கூரிய நகங்களைமுடைய 4 விரல் எலும்புகளிலும் முறையே 2, 3, 4, 5 விரல் பகுதிகள் உள்ளன. ஹேலெக்ஸ் (Hallux) என்ற முதல் விரல் சிறியதாகவும், பின்புறம் நீட்டப்பெற்றும் எதிராக அமைந்து தற்போதுள்ள பல பறவைகளிலும் உள்ளது போன்றே இருந்தன.

இப்பிராணிகளின் எலும்புகளில் வெற்றிடப்பகுதிகளே கிடை யாது. தற்போது நடத்திய ஆராய்ச்சிகளிலிருந்து ஆர்க்கியாப் டெரிக்ஸ் பறவையின் மூளை தற்போதுள்ள பறவைகளின் மூளையைப் போன்றிருக்காமல், ஊர்வனவற்றின் மூளையை ஒத்தே இருந்ததாகக் கூறப்படுகின்றது. பெருமூளை அரைக்கோளங்கள் வழவழப்பாக இருந்ததாகவும் பறக்கும் ஆற்றல் அல்லனவாகப் பெருந்த காரணத் தால் சிறுமூளைப்பகுதி மிகவும் சிறுத்துக்காணப்பட்டதாகவும் கூறப் படுகின்றது. மற்றும் இந்த தொன்மைப் பறவையின் உடலின் வெப்பம் தற்போதுள்ள பறவைகளில் உள்ளது போன்று ஒரே சீராகவே அமைந்திருந்தது என்றும் கூறப்படுகின்றது.

புதை படிவ, ஆர்க்கியாப் டெரிக்ஸ் பழம் பறவையின் ஊர்வனப் பண்புகளாவன:—

1. ஒரே மாநிலியான பற்கள் பலம் பொருத்திய தாடைகளில் அமைந்திருந்தன.

2. பல்லியின் வாக் பகுதியினைப்போன்று இப்பிராணிகளில் வாக் பிள்ளோக்கிச் செக்ஸ்ச் செக்ஸ துவிப்பகுதி குறுகிக் கொண்டே செல்கின்றது. மற்றும் வாக்பகுதியில் 3 முதல் 20 வரை வாக் முள்ளெலும்புகள் உள்ளன.

3. எலும்புகளினால் வெற்றிடப் பகுதி கிடையாது.

4. மற்றப் பறவைகளையிட இப்பிராணியில் கழுத்து முன் எலும்புகள் மிகவும் குறைவாகவே உள்ளன.

5. ஸ்பீனோடாஸில் உள்ளது போன்றே இதில் கழுத்து முன் எலும்புகள் தனித்து காண்பதுடன், வயிற்றுப் பகுதி விவாவெலும்பு களும் அதில் உள்ளது போன்றே உள்ளது.

6. மார்புப் பகுதி விவாவெலும்புகளுக்கு ஒரே ஒரு தலைப்பகுதி மட்டுமே சிறுப்பதுடன் அங்கினேட் நீட்சிகளே கிடையாது.

7. முள்ளெலும்புகளின் சென்ட்ராப் பகுதிகள் ஆம்ஃபிசீலஸ் வகையைச் சார்ந்தது.

8. மார்பெலும்பு மிகவும் பலமற்றதாகக் காணப்படுகின்றது.

9. இப்பிராணிகளின் வயிற் றுழ்ந்து விரல்கள் உள்ளன. அதில் முறையே 2, 3, 4 விரல் பகுதிகள் உள்ளன. விரல்களின் நுனியில் கூரிய நகல்கள் உள்ளன.

10. கார்ப்பல் எலும்புகளும் மெட்டாகார்ப்பல் எலும்புகளும் தனித்தனியே உள்ளன.

11. இடுப்பு வளை எலும்புகளும் தனித்தனியே காணப்படுகின்றன.

புறநகரில் ஆர்க்கியாப்டெரிக்ஸ் பறவையின் பறவைப் பண்புகளாவன:—

1. செதில்களைத் தவிர உருவ இறகுகளும் உடலில் பாதுகாக்கின்றன.

2. முன்னங்கால்கள் மூன்று விரல்களுடன், பறக்க உதவும் ரெமிஜெஸ் இறகுகளுடன் பறப்பதற்கேற்றவாறு அமைந்துள்ளது.

3. மண்டையோடு மிகவும் பெரியதாக அமைந்திருப்பதுடன் உருண்டை வடிவ மூளைப் பகுதியுடன் அமைந்துள்ளது. கண் குழி விசைச் சுற்றிலும் ஸ்கேலிரோட்டிக் தட்டுகள் உள்ளன, ஒரே ஒரு பிடர்மூண்டுதான் உள்ளது.

4. இரண்டு தாடைகளும் நீட்டப்பெற்று அனுகூலம் போல் அமைந்துள்ளன.

5. ரெஸ்ட்ரிசெஸ் இறகுகள் வால் பகுதியில் இரண்டு வரிசைகளாக அமைந்துள்ளன.

6. மார்பு வளை, இடுப்பு வளை எலும்புகளும் கால்களும் பறவையகளைப் போன்றே அமைந்துள்ளன.

7. ஸ்கேப்புலா எலும்புகள் வளைத்ததாகவும் நுண்ணியதாகவும் உள்ளன.

8. டிபியா எலும்பும் கிபிபுலா எலும்பும் தனித்தனியே காணப்படுகின்றன.

9. கிபர்குலா எலும்பு U வடிவத்துடன் அமைந்துள்ளது.

10. பாதத்தில் கூரிய நகல்களையுடைய நான்கு விரல்கள் உள்ளன. அவற்றில் முறையே 2, 3, 4, 5 விரல் பகுதிகள் உள்ளன. முதல் விரலான நேறல்கில் பின்புறமாக நீண்டுள்ளது.

இவ்வாறான பண்புகளால் இவைகளை பறவைகளே என்றும் முழு மையாகக் கூற முடியாது. அபேத சமயத்தில் ஊர்வனவாகவும் கருத முடியாது. ஆகையால் இவைகள் ஊர்வனவற்றிற்கும் பறவைக்கும் இடைப்பட்ட பிராணிகளாகும். இது ஊர்வனவற்றையும், பறவைகளையும் ஒன்று சேர்க்கின்ற ஒரு சங்கிலித் தொடர்போல அமைந்துள்ளது. இவற்றின் பண்புகளை ஆராய்விட்டது இவைகளை ஊர்வன பிராணிகளாகவும் கருதமுடியாதுமே, பறவைகளாகவும் ஏற்றுக்கொள்ள முடியாதுமே. ஆர்க்கியாப்டெரிக்ஸ் புதைபடிவமானது இருகாலகளைமுடைய டைனோசார்க்களையே ஒத்திருக்கின்றது. இதுபோன்ற பல ஆராய்ச்சிகளின் பலனாக ஆர்க்கியாப்டெரிக்ஸ் என்ற இந்த தோன்மை பறவையே தற்போதுள்ள பறவைகளின் முன்னோர் என்று கருதப்படுகின்றது.

கிரிட்டேஷியஸ் காலப் பறவைகள்

கமார் 135 லட்சம் வருடங்களுக்கு முன்பிருந்த காலத்தையே கிரிட்டேஷியஸ் காலம் என்று அழைக்கலாம். அக்காலத்தில்தான் தற்போதுள்ள பறவை இனம் தோன்றியதாகக் கருதப்படுகின்றது. அக்காலத்தில் ஹெர்பிரார்னிட் (Herperornis) இக்தியார்னிட் (Ichthyornis) என்ற கடற்பறவைகள் அகிமோகக் காணப்பட்டன. இப்பறவைகளும் ஆர்க்கியாப்டெரிக்ஸ் பறவைகளைப் போன்று பழமையான பறவைகளே. இவைகளுக்கு ஆர்க்கியாப்டெரிக்ஸ் பறவைகளைப் போன்று வாயில் பற்கள் இருந்தன. ஆனால், இப் பறவைகள் ஆர்க்கியாப்டெரிக்ஸ் பறவைகளைவிட சற்று மேம்பாடு அடைந்தவைகளாகவே கருதப்பட்டன. இவைகளின் வால் பகுதி ஒடுக்கப்பட்டிருப்பினும், பல இறகுகளுடன், விசிறி வடிவத்துடன் காணப்பட்டது. மார்பெலும்பு நன்றாக வளர்ச்சியுற்றிருந்தது. அதில் அடித்தட்டைக்களும் நிறப்புடன் அமைந்திருந்தது. தற்போதுள்ள பறவைகளில் உள்ளதுபோன்று மெட்டாகார்ப்பல் எனும் புசன் கார்ப்பல் எனும்புகளுடன் இணைத்து காணப்பட்டன. இவ்வாறான பல பண்புகளால் இப்பறவைகள் தற்போது வசிக்கும் பறவைகளையே பெரிதும் ஒத்திருந்தன. இப்பறவைகளின் புதை படிவங்கள் வட அமெரிக்கப்பகுதிகளில் காணப்பட்டன. மற்றும் கிரிட்டேஷியஸ் காலத்தைச் சேர்ந்த கார்மோரெண்ட், கீனோ மிங்கோ முதலிய பறவைகளை ஒத்த புதை படிவங்களும் கிடைத்தன. இப்புதை படிவங்களிலிருந்து கிரிட்டேஷியஸ் காலத்திலேயே நீர்ப் பறவைகளும் தோன்றி, தவணைம்பிவிற்கு ஏற்ப பலவாருகப் பரளியுள்ளன என்பது தெளிவாகத் தெரியவருகின்றது.

‘ஹெல்பிராஸ்’வில்

இப்பறவைகள், வட அமெரிக்காவின் இரிட்டேஷியஸ் காவ புதை படிவங்களிலிருந்து கண்டுபிடிக்கப்பட்டுள்ளன. இது கடலில் தன்ருக மூழ்கியும் நீந்தியும் வாழ்ந்த பறவையாகும். இதன் உடல் தாக்கு அல்லது ஐந்தடி நீளமுடையதாக இருந்தது. இது தற்போது வசிக்கும் பறக்கும் நிறைந்த லூன் (Loon) பறவைகளை ஒத்திருந்தது.



படம் 3. ஹெல்பிராஸ்வில்

இதற்குத் தாடையில் குழி அவ்வது பள்ளத்திலுள் பொருத்தப்பட்ட கூர்மை யான பற்கள் இருந்தன. பிள்ளும் மற்ற பறவைகளில் தற்போது காணப்படும் அகலின் தோற்றமும் இப்பறவையில் காணப்பட்டது. இதற்கு தன்ருக நீட்டப்பெற்றக் கழுத்தும், படகு போன்ற உடல் அமைப்பும் இருந்தது. இப்பறவைகள் நீரில் வாழ்ந்த தன்மை யால் இறகுகள் மறைத்துவிட்டதால், சில காலத்திற்குள்ளாகவே இவைகள் அழியத் தொடங்கினிட்டன. இதன் முன் கையில் பெரிதும் ஒடுங்கிய மெல்லிய ஹியுமரஸ் (Humerus) எலும்பு தான் உண்டு. இதன் மார்பெலும்பும் அடித்தட்டைக் கணற்று ஒடுங்கியே காணப்பட்டது. அடித்தட்டைக் கலமும், இறக்கைகளும் இல்லாத காரணத்தால் இவைகள் பறக்கும் நிறைந்தே காணப்பட்டன. ஆனால் இவற்றின் பின்னங்கால்கள் தன்ருக வளர்ச்சியுற்று பலம்பொருத்திய தோழிழைமங்களூடல் (Web) காணப்பட்டது. தோழிழைமங்களின் உதவியால் இப்பறவைகள் நீரை தன்ருக உந்தித்தள்ளி நீந்த ஏதுவாக அமைந்திருந்தன.

இக்தியாஸ்’வில் (Ichthyornis)

ஹெல்பிராஸ்’வில் பிராணிகள் புதை படிவமாகக் கிடைத்த அதே இடங்களிலேயே இப்பறவைகளின் புதை படிமங்களும் கிடைத்தன. ஹெல்பிராஸ்’வில் பறவைகளைப் போன்று உருவத்தில் பெரிய தாகயில்வாமல், தற்போழுது வசிக்கும் டோர்ன் (Tern) பறவைகளை உருவத்திலும் பழக்கவழக்கங்களிலும் ஒத்திருந்தன. முதலில் இப்பறவைகளுக்குத் தாடையில் பற்கள் இருந்ததாகக் கருதப்பட்டாலும், பின்னால் செல்லப்பட்ட ஆராய்ச்சிகளின் பலனாக இவற்றிற்குப்

பற்களே கிடைப்பாது என்பது தெளிவாகின்றது. பறவைகளின் மூளையை ஒத்த மூளைப்பகுதி இப்பறவைகளுக்கும் இருந்தது. மார்-பெனும்பு பெரியதாகவும், அடித்தட்டைக்கயத்துடன் காணப்பட்டது. இறக்கைகள் தற்போதுள்ள பறவைகளில் உள்ளதுபோன்று தள்ளு வளர்ச்சியுற்றுக் காணப்பட்டன. இறக்கைகளும் அடித்தட்டைக் கவழும் வளர்ச்சியுற்றுக் காணப்படுவதால் இப்பறவைகள் தள்ளு பறக்கக் கூடிய பிராணிகள் என்பது தெளிவாகின்றது.

சீனோசோயிக் காலப் பறவைகள் (Cenozoic Birds)

சீனோசோயிக் காலத்தில் பறவைகள் தங்களது பண்புகளுடன் எண்ணிக்கையில் அதிகமாகப் பெருகி வளிக்கத் தொடங்கினிட்டன. பழம் பறவைகளில் காணப்பட்ட பற்கள் இக்காலத்தில் வளித்தப் பறவைகளுக்குக் கிடைப்பாது. பின்னும் தாடைகளிரண்டும் அவரு களாக மாற்றப்பட்டுவிட்டன. இக்காலப் பறவைகளில் இலக்கியம் இல்லியம் ஆகிய எதுமாயுடன் இணந்து காணப்பட்டன. இது போன்ற பறவைகளின் பண்புகளுடன் கூடிய விலங்குகள் கிப்ட்டோஷியஸ் காலத்தில் கடைசியப்பகுதியில் காணப்பட்டன.

சீனோசோயிக் காலத்தில் அதாவது பேலியோசீன், இயோசீன் (Palaeocene, Eocene) ஆகிய காலப்பிரிவில் பறவைகள் தகவமைப் பிற்றேப பரவி வளிக்கத் தொடங்கின. இக்காலப் பிரிவின்தான்



படம் 4. டைரீமா

தீர்க்கோழிகள், பழமையான பெயிக்கன் பறவைகள், கொக்குகள், நாரைகள், வாத்துகள், கடற்கரை பறவைகள், ஆந்தைகள்,

கொழிகளை ஒத்த பல பறவைகள், பிராணிகளை இரையாக உண்ணும் பல பறவை இனங்கள் முதலியவை தோன்றின.

50 வட்சம் வருடங்களுக்கு முன்பு டயட்ரினா (Diatriina) என்ற பறக்கும் சக்திவற்ற பூதப் பறவை வட அமெரிக்கப் புய்வெளிகளில் வசித்திருந்ததாகக் கூறப்படுகின்றது. அது சுமார் ஏழுடி உயரமுடையதாக இருந்ததுடன் அதன் தலை ஒரு பெரிய குதிரையின் தலையை ஒத்திருந்தது. இதற்கு பலம் பொருந்திய கால்களும் மிகப்பெரிய கர்மையான அங்குகளும் இருந்த காரணத்தினால் இவைகள் பிராணிகளை இரையாக உண்ணும் பறவைகளாகக் கருதப்படுகின்றது. இவைகள் ஊர்வன, பாதுகாட்டிகள் முதலிய வகையைச் சேர்ந்த சிறிய பிராணிகளை உணவாகப் பிடித்து உண்ணும் பழக்கமுள்ளவைகளாகும்.

ஃபோரோரேக்கால் (Phororhacos)

ஆஸ்திரேலியாவில் தற்போது வசிக்கும் பறவைகளின் பல பொது இனங்களும் நிறப்பிணங்களும் தோன்றின. அக்காலத்தில் ஃபோரோரேக்கால் என்னும் டயட்ரினாவை ஒத்தப் பறவைகளும் வசித்திருந்தன. இப்பறவைகளின் சத்தங்கள் தற்போது கிடைப்பாது. இப் பறவைகள் 30 வட்சம் வருடங்களுக்கு முன்பு தென் அமெரிக்காவில் வாழ்ந்திருந்தன. இப்பறவைகள் மனிதனின் உயரத்தை ஒத்து வளர்ந்து காணப்பட்டன. இவைகளும் பிராணிகளைப் பிடித்து இரையாக உண்ணும் பழக்கமுள்ளவைகளேயாகும். அப்பழக்கத்திற் கேற்ப இப்பறவைகளின் அங்கு வளர்ச்சியுற்றுக் காணப்பட்டன. இறக்கைகள் ஒடுங்கியே காணப்பட்டன.

சரீப காலத்தில் மறைந்துவிட்ட பறவைகள்

சுமார் 80 நிறப்பிணப் பறவைகள் இந்த மூன்று நூற்றாண்டு களுக்குள் மறைந்துவிட்டதாகக் கருதப்படுகின்றன. தற்போது வசிக்கும் பறவைகளில் நீக்கொழிப் பறவைகளே உருவில் மிகப் பெரிய பறவைகளாகும்.

மடகாங்கர் பகுதிகளின் பிளின்டோசின் காலத்திலும், வட அமெரிக்கப் பகுதிகளின் பிளியோசின் காலத்திலும், யாணப் பறவைகள் (Elephant birds) என்ற பறவைகளின் புதை படினங்கள் கிடைத்ததாகக் கருதப்படுகின்றன. இப்பறவைகளைப் பற்றி அவ்வளவாகத் தெரியவில்லை. இவைகள் மிகப் பெரியதாக உடல் கட்டினைக் கொண்ட பறவைகளாகும். இவைகளுக்குப் பறக்கும் நிறம் கிடைப்பாது. இவைகள் ஒவ்வொன்றும் ½ டன் எடை உள்ளது. இவை

கன்கு ஒருமைய இறக்கைகளும், பவம் பொருத்திய தாங்கு வீரல் களைபுடைய காக்களும் உண்டு. இவை பறக்கும் திறனற்ற ரேட்டைட்டே பிரிவில், ஏப்பிலாரிவித்தி சிபார்பில் (Aepyornithiformes) என்ற வரிசையைச் சார்ந்த பறவைகளாகும். மடகால்கள் பகுதி கன்கு சுற்றுலா சென்ற மனிதர்கள் இப்பறவைகளின் முட்டைகளை குடுவையாக (Flask) உபயோகித்ததாக தம்புதற்கு ஏற்ற ஆதாரங்கள் உள்ளன. இந்த முட்டைக் குடுவைக்குள் இரண்டு கேவன் (Gallon) தண்ணீர் எடுத்துச் செல்ல முடியும் என்றும் கூறப்படுகின்றது.

மோவால் (Moas)

இப்பறவைகள் பறக்கும் திறனற்ற ரேட்டைட்டேப் பிரிவில் டைனோனித்திபார்மில் (Dinornithiformes) என்ற வரிசையில் வரும் பறவைகளாகும்.

இவைகள் நியூஜிலாந்து நாட்டில் பிலின்போரீன் காலத்தில் வாழ்ந்த பறவைகளாகும். இவைகள் உருவத்தில் வான் கோழியை ஒத்த பறவைகளிருந்து, டைனோனிஸ் மேக்ஸிம்ஸ் (Dinornis maximus) என்ற யூதப் பறவைகள் வரை உள்ளன. இந்தப் யூதப்பறவைகள் சுமார் 12 அடி உயரமும் 520 பவுண்டு எடையுள்ள பறவைகளாகும். இவைகளுக்குச் சிறிய தலையும், குட்டைப்பாள் அங்குகளும் உண்டு. ஆனால் இவற்றின் கால்கள் பவம் பொருத்தியதாகவும் தாங்கு வீரல்களுடன் கூடியதாகவும் காணப்படுகின்றன. அடித்தட்டைக் கலமிற மார்பெலும்பு இவற்றிற்கு உண்டு. இப்பறவைகள் மீறும் சில நிறப்பிணங்களுக்கு மார்பு வளைபழம் இறக்கைகளும் மறைத்துவிட்டதாகக் கருதப்படுகின்றது. இவைகள் ஒட்டைச்சிலிங்கிகளைப் போன்று மரங்களிலுள்ள இலைதழைகளை உணவாகக் கொண்டு வாழ்ந்திருந்தன. இப்பறவைகளின் எலும்புகளை நியூஜிலாந்து மக்கள் ஆயுதமாகப் பயன்படுத்தினார்கள் என்று கூறப்படுகின்றது. இப்பறவைகளை நியூஜிலாந்து மக்கள் உணவாக உட்கொண்டதால் மறைத்துவிட்டதாகக் கருதப்படுகின்றது. ஒரே ஒரு நிறப்பிணப் பறவை மட்டும் 18 ஆவது நூற்றாண்டில் தெற்குத் தீவுகளில் காணப்பட்டதாகக் கூறப்படுகின்றது.

டோடோப் பறவைகள் (Dodo)

இப்பறவைகள் மௌரிட்டியஸ் (Mauritius) பிரிவில் வாழ்ந்திருந்த தற்போது மறைந்துவிட்ட பறவைகளாகும். இவைகள் பகுதி உடம்புடைய, மெதுவாக அசைந்து நிரியும் பறவைகளாகும்.

இவைகளுக்குப் பறக்கும் திறன் இடையாது. இப் பிராணிகளின் முட்டைகள் மனிதர்களுக்கும், எலி பன்றி முதலிய பிராணிகளுக்கும் உணவாகப் பயன்பட்டது. கடைசி டோடோப் பறவை 17ஆவது



படம் 5. டோடோ

நூற்றாண்டில் முழுமையாக மறைந்துவிட்டதாகக் கருதப்படுகின்றது. இப்பறவைகளின் பழக்க வழக்கங்கள் அங்ஙனவாகத் தெரியாது.

பிரயாண புழுக்கள்

புழுக்களும், மாடப்புழுக்களும் அவைகளின் மிகுதுவான மாமிசத்தால் மனிதர்களுக்கு உணவாகப் பெரிதும் பயன்பட்டன. இத்தக் காரணத்தினாலேயே வட அமெரிக்காவில் வாழ்ந்த பிரயாணப் பறவைகள் தற்காலத்தில் மறைந்துவிட்டன. இப்பறவைகள் ஒரு காலத்தில் கோடிக்கணக்கில் வட அமெரிக்காவில் வாழ்ந்திருந்தன. உணவிற்காக அவைகளை வேட்டையாடிவிட்டபடியால் சிறிது சிறிதாக இப்போது மறைந்துவிட்டன. 1900-ஆம் ஆண்டு இப்பறவைகளின் கடைசிப் பறவை வேட்டையாடப்பட்டு விட்டது. இதன் கடைசி நெறப்பினம் மார்த்தா (Martha) என்று அழைக்கப்பட்டது. இது 1914-ஆம் ஆண்டு கொல்லப்பட்டது. இப் பறவையின் உயிர்நிறப்பஞ்சுப் பொருளாக நிரப்பப்பட்ட மாதிரிப் பறவை இப்போது வாஷிங்டன் நகரிலுள்ள நேஷனல் கலெக்டாட்ரியில் (Museum) உள்ளது.

1885-ஆம் ஆண்டு முதல் 1905-ஆம் ஆண்டு வரை சுமார் 20 வகுடங்களுக்குள், 20 நெறப்பினங்கள் மறைந்துவிட்டதாகக் கருதப்

படுகின்றது. பிரயாணப் புறக்கணைத் தவிர வட அமெரிக்காவின் ஆக் கிறப்பப் பறவை (Auk) லேபரேடர் லாத்து (Labrador duck) கெரோவிகு கிளி (Carolina parakeet) ஹீத் கோழி (Heath hen) முதலிய பறவைகளும் தற்போது மறைந்துவிட்டதாகக் கருதப் படுகின்றன. மற்றும் அமெரிக்கக் கொக்குகளும் ஐரோப்பாவின் ஸ்டோர்க் பறவைகளும் சித்திரசிறிதாக மறைந்து வருவதாகக் கருதப்படுகின்றன.

பறவைகளின் மரபு மூலம் அல்லது பறவைகள் தோன்றிய வகை

பறவையின் பல தனிச் சிறப்பியல்புகள் ஊர்வனவற்றின் தனிச் சிறப்பியல்புகளோடு ஒத்திருக்கின்றன. குறிப்பாக இவ்வியல்புகள் டயாபிடோயிசு (Dipterida) ஆர்க்கோசாக்ஸா (Archosauaria) பிரிவைச் சேர்ந்த ஊர்வனவற்றில் மிகுதியாகக் காணப்படுகின்றன. இவ்வாறு இவ்விரு வரிசைகளின் பண்புகளும் ஒத்திருப்பதால் மூன்னர் இவ்விரண்டு வகைகளையும் செனராபிடா (Saurapsida) என்னும் ஒரே பிரிவாக அமைத்திருந்தனர். இன்றும் இக்காரணத் திருமேயை பறவைகள், 'மேன்மை பொருந்திய ஊர்வன' (Glorified reptiles) என்று அழைக்கப்படுகின்றன.

முதலியினதைப் போன்ற இருதயமும், தமனி வளைவுகளும் பறவையினும் காணப்படுகின்றன. ஆனால் பறவையில் இடது பெருந் தமனி வளைவு இல்லை. உள்ஞறுப்புக் குழி முதலியவ் உடலில் இருப் பதைப்போல் நுரையீரல், கல்லீரல் குழிவாகவும் (Pulmohepatic recess) பக்கச் சவ்வு உட்குழிவாகவும் (Pleural cavities) சால்வான தடுப்பாலும் நுரையீரல் கல்லீரல் தசை நார்களாலும் பிரிக்கப்பட்டுள்ளது.

பச்சோந்தியின் உடலிலும், பறவையின் நுரையீரலினின்றும் நீட்டப் பெற்றுள்ள பல காற்றுப் பைகளைப் போன்று, நுரையீரல் காற்றுப் பைகள் காணப்படுகின்றன. நரம்பு மண்டலத்தை எடுத்துக்கொண்டால் பறவையின்மூளை, ஊர்வனவற்றின் மூளைப்பகுதிகளை ஒத்ததாக, சற்று மேலும் விரிவடைந்ததாகக் காணப்படுகின்றது. பறவையின் மூளையில் காற்புள்ளிடரமேட்டப் பகுதி நன்றாக வளர்ச்சி பெற்றுள்ளது. சிறு மூளைப்பகுதி டிரோசார் (Pterosaur) ஊர்வன வற்றின் சிறு மூளையை ஒத்திருக்கின்றது. இவ்வொற்றுமைக்கு இவ் விரண்டின் பறக்கும் இயல்பே காரணமாகும். கரு வளர்ச்சியுறும் போது உண்டாகும் கருச்சூழ் சவ்வு (Amnion) பளிக்கூடம் (Allantois) போன்ற கருச் சவ்வுகளின் (Embryonic membranes) வளர்ச்சியும் இரண்டு வகைகளிலும் துவக்கநிலையில் ஒத்திருக்கின்றன.

உச்சட்டகத்திலும் பல ஒற்றுமைகளைக் காண்கிறோம். ஒரே ஒரு பிடர் மூண்டு, கண்களின் இடைத்தடுப்பு (Inter orbital septum), மார்பு இருப்பு வளைவங்கள், குழியுடை எலும்புகள், பாதத்தின் கணுக்காக இணைப்பு (Mesotarsal joint) ஆகிய பறவைகளிலுள்ள பல இயல்புகள் சில ஆர்க்கோசாரியா (Archosauaria) ஊர்வனவற்றிலும் காணப்படுகின்றன. இவற்றோடு ஜூரானிக் காலப் பிரிவில் காணப்படுகின்ற ஆர்க்கியாப்டெரிக்ஸ் என்னும் புதைபடிவத்தில் ஒரு கேஸ்டேரி வியா, லேக்ரீம்ஸ் இரு டெம்ப்போரல் உட்குழுவின் கிதைவுகள் பல தனித்தனி மூன்றெலும்புகளாலான வாய், துளைவுடன் கூடிய கீழ்த் தாடை முதலிய ஊர்வனவற்றின் பண்புகள் தெளிவாக உள்ளன. அன்றியும் இவற்றின் விவாவெலும்புகளில் அர்ரினேட் நீட்சிகள் இருத்திருக்கக்கூடும். முதலிகள், டைனோசார்க்கள், மிரோசார்க்கள், சிக்ஸ்கோ செப்பெவியா ஆகியவற்றில் பறவையின் பல சிறப்பு இயல்புகளைக் காணலாம். இருதயம் தமனிகள் உட்குழியமைப்பு, பெரிய கார்ப்பல் ஸ்ட்ரேயேட்டம், கீழ்த்தாடை எலும்பின் துவாரம் குகுதி சோதனைகளிலிருந்து கிடைக்கும் தெருக்கிய குகுதி உறவு ஆகிய பண்புகளில் பறவைகள் முதலிகளை ஒத்திருக்கின்றன.

மூன்றேக்கீமல் உட்குழிவு, கணுக்காக இணைப்பு இவ்விரு பறவைப் பண்புகளும் டைனோசார் ஊர்வனவற்றில் காணப்படுகின்றன. சிறு மூளை அமைப்பில் பறவைகள் மிரோசார்களைப் போன்றுள்ளன. சிக்ஸ்கோசெப்பாவியாவின் விவாவெலும்புகளிலுள்ள அர்ரினேட் நீட்சிகள் பறவைகளிலுள்ளன. மேற்கூறிய எல்லா ஊர்வனவற்றிலும் இரு டெம்ப்போரல் உட்குழிவுகளுள்ளன.

எனவே பறவைகள் ஆர்க்கோசெளரியாவைச் சேர்ந்த ஊர்வனவற்றினின்றும் தோன்றியவை எனக் கூறலாம். ஆனும் இதில் எந்தக் குறிப்பிட்ட பிரிவுப் பறவைகளைத் தோற்றுவித்தது என்பதே ஆராய்ச்சிக்குரியதொன்றாகும். இந்த ஊர்வனவற்றின் மூன்றோர்கள் ட்ரையானிக் காலப்பிரிவில் குடோரூக்ஸியாவின் வரிசையில் பூப்பார்க் கேரிய என்னும் புதை படிவத்தை ஒத்திருக்கின்றது. எனவே இவையே பறவைகளின் மூன்றோர்களாகவும் இருத்திருக்கக் கூடுமென்று கருதப்படுகின்றது.

பறவையின் பறக்கும் முறை மற்றப் பறக்கும் பிராணிகளின் முறையினின்றும் வேறுபட்டுள்ளது. இவை சவ்வுப் பறப்பாகப் பறப்பதில்லை. நீக்கோழியின் இறகுகளின் அமைப்பிலிருந்து இறகுகள் செதில்களைப் போன்றே உருவாகியவை என்பதை அறியலாம். ஆனும் இறகுகள் செதில்களிலிருந்து தோன்றியவையல்ல. இறகுகளின் வளர்ச்சி பறவையின் மேற்பரப்பை எடை கூடுதலின்றியே விரிவுபடுத்துகின்றது. இவ்விதிக் மரங்களில் வசித்த பறவை

முன்னோர்க்கு கிளை விட்டுக்கிளை தாவ உதவியாக இருந்திருக்கும். அதே சமயத்தில் இவற்றின் இருப்பு வளையமும் பின்னங்கால்களும், கால்களால் நடக்கக்கூடிய அல்லது ஓடக்கூடிய வாழ்க்கைக்கேற்ப அமைந்துள்ளன. எனவே பறவைகளின் பறக்கும் திறனின் முழு வெற்றிக்குக் காரணமே அவை பின்னங்கால்களைப் பறப்பதற்கு ஈடுபடுத்தாதிருப்பதுதான். எனவே பறவையின் முன்னோர்கள் மரத்தில் குடியிருப்பதற்கு முன் நிலத்தில் நடக்கும் இயல்பை பெற்றதாய் இருந்திருக்க வேண்டும்.

முற்பட்ட காலத்தில் தோன்றிய ஆர்க்கியாப்டெரிக்ஸ் பறவையில் நீண்ட வாலும் பற்களுடைய தாடையும் நன்கு வளர்ச்சி பெற்ற மூன்று விரல்களையுடைய சிறகுகளும், தட்டையான மார்பெலும்பும் காணப்படுகின்றன. இன்றைய பறவைகளிலோ வால் மிகக் குறுகி, வால் முள்ளெலும்புகள் இணைந்து கலப்பை போன்ற பைகோஸ்டைலாகவும் தாடைகள் பற்களினறியும் மார்பெலும்பில் அடித்தட்டைக் கலம் பொருந்தியும் உள்ளன. எனவே ஆர்க்கியாப்டெரிக்ஸ்ஸரில் காணப்படும் ஊர்வனவற்றின் பண்புகளைக் கொண்டு பறவை, ஊர்வனவற்றிலிருந்து தோன்றியவை எனத் தீர்மானிக்கப்படுகின்றது. ஆனால் ஆர்க்கியாப்டெரிக்ஸ்ஸரிற்கும் ஊர்வனவற்றிற்குமிடையில் அமைய வேண்டிய ஒரு பிராணியைப் பற்றி நமக்குத் தெரியவில்லை. எனவே பறவைகளின் புதைபடிவ சரித்திர அறிவு அவற்றின் பரிணாமத்தைக் கணிக்கப் போதுமானதாகயில்லை.

ஆர்க்கியாப்டெரிக்ஸ்ஸரிற்கும் ஊர்வனவற்றிற்கும் இடையே இருந்திருக்கக் கூடிய பிராணியை முன்பறவை இனம் (Pro avis) என்றும் இதன் தோற்றமும் பலவாறு கற்பனை செய்யப்படுகின்றது.

இப்பூனை கருத்து அல்லது தற்காலிகக் கோட்பாடுகளாவன

ஆஸ்பார்ன் (Osborn) என்ற நியுனரின் கருத்துப்படி பறவையின் முன்னோர் மரங்களில் வசித்த வான்குடை மிதவைகள் (Parochute) கொண்ட நான்கு கால்களையுடைய பிராணிகளாகும். இவை பறக்கும் அணில் போன்று ஒரு கிளையிலிருந்து மற்றோர் கிளைக்கு நழுவி (Glide)ச் செல்லும். இவற்றின் மிதவை இறகுகளின் தோற்றத்தாலும் தசைகளாலும் உறுதியாக்கப்பட்டு சிறகுகளாக மாறின.

நாபஸ்காவின் கருத்துப்படி முன்பறவைஇனம் ஒரு நீண்ட வாலுடைய இரு கால்களால் நடக்கக்கூடிய பிராணியாகும். இது தன் உறுதியான பின்னங்கால்களின் உதவியால் தரையில் குதித்தும் ஓடியும் செல்லும். இவ்வாறு செல்லுமுகையில் வேகத்தை அதிகரிப்ப

தற்காக முன்னங்காக்களைக் காற்றில் மூன்றும் பின்னும் அசைக்கும் இம்முன்னங்காக்கள் அகன்று அவற்றிலுள்ள செதில்கள் இறகுகளாக மாறின. இந்த செதில்களிலு் உடலின் மற்ற பாகங்களிலுள்ள செதில்களுக்கும் பரவி அவையும் இறகுகளாக மாறின.

ஸ்கனர் என்ற நிபுணரின் கருத்துப்படி பறவையின் முன் ஜோடிகள் நான்கு கால்களையுடைய மரங்களில் வாழ்ந்த பிராணிக ளாகும். இவற்றின் பின்னங்காக்கள் குதிப்பதற்கும் முன்னங் காக்கள் ஏறுவதற்கும் குதித்தபின் உடலைச் சமநிலைப்படுத்துவதற்கும் ஏற்றவாறு அமைந்துள்ளன. பின்னர் குதிக்கும் பொழுது காற்றில் சமநிலையில் இருப்பதற்கென இறகுகள் முன்னங்காக்களிலும், வாலிலும் தோன்றின. அதன்பின் முன்னங்காக்கள் இறகுகளாகவும், பின்னங்காக்கள் நடப்பதற்கும் பயன்படுத்தப்பட்டன.

முன்பறவை இனம் மரமேறும் நான்கு கால்களையுடைய ஒரு பிராணி எனவும், இவற்றின் எல்லாக் கால்களிலும் இறகுகள் அமைந்து, மிதவைப்போன்று இப்பிராணிகள் நழுவிச் செல்ல உதவிய என்பது பீபி (Beebe) என்பவரின் கருத்தாகும்.

ஆர்க்கியாப்டெரிக்கில்லின் கால்களில் பின்புறக்கி அமைந்துள்ள இறகுகள் இக் கருத்திற்கு ஆதாரமளிக்கின்றன.

கிரிகரி (Gregory) என்பவர் சில பறவைகள் தனரயில் நடக்கும் பிராணிகளிலிருத்தும், மற்றவை மரம் ஏறும் பிராணிகளிலிருத்தும் தனித்தனியே தோன்றியவை என்று கூறியுள்ளார். ஆகவே பறவைகள் ஊர்வனவற்றிலிருந்து தோன்றியவை என்பது தெனீவா கப் புலப்படினும் எந்த ஊர்வனவற்றினின்றும் தோன்றியது என்பதற்குச் சான்றுகள் இதுவரை தெனீவாகத் தெரியவில்லை.

3. பறவைகளின்-புறப்போர்வை மண்டலம் (Integumentary System)

பறவைகளின் பரிணாமத்தில் வானவீதியில் பறந்து செல்லுதற் கேற்ப ஏற்பட்ட தகவமைப்புகளில் அவற்றின் புறப்போர்வையின் அமைப்பே மிகவும் சிறப்பான தொன்றாகும். பறவைகளின் அப்புறப் போர்வை இறகுகளாலானது. பறவைகளில் மட்டுமே காணப்படும் இறகுகளின் அமைப்பு மற்ற முதுகெலும்புள்ள பிராணிகளில் காண முடியாததொன்றாகும். ஆனால் இப்பண்பே பறவைகளை மற்றப் பிராணிகளினின்றும் பிரித்துக்காட்டும் சிறப்புப் பண்புமொன்றும். பறவைகளில் புறத்தோலருக்கினின்றும் தோன்றிய செதில்கள், நகங்கள், அலகுகள் முதலிய பகுதிகளைவிட இறகுகள் அவற்றின் பல விதமான தோற்றம் திரம் தோன்றும் முறை முதலியவற்றால் நம் அனைவரது கவனத்தையும் ஈர்த்து வந்துள்ளது.

தோல்

தோல் உடலின் முழுபாகத்தையும் மூடிக்கொண்டிருக்கும் சிறப்பான, சந்திர ஒளி ஊடுருவக் கூடிய (Semi transparent) மீளும் தன்மையுள்ள (Elastic) ஒரு உறுப்பாகும். மற்றும் உள் பகுதிகளிலுள்ள துவாரங்களின் கோழைப்படலத்தின் மேற்பகுதியும் தோலினால் மூடப்பட்டுள்ளது. மற்ற முதுகெலும்புள்ள பிராணிகளின் தோலுடன் பறவையின் தோலினை ஒப்பிட்டு நோக்குங்கால், பறவையின் தோல் மிகவும் மெல்லிய துண்ணிய ஒரு அமைப்பாகும். ஆந்தைகள், இரவுப்பூந்து (Night Hawks), இராக்கூவற் பறவைகள் (Whippoor will), ட்ரோகான் பறவைகள் (Trogon) முதலியவற்றில் தோல் மிகவும் மெல்லியதாகியிருக்கும். பொதுவாகப் பறவைகளின் தோல் உடலின் தசைகளினின்றும் பிரிந்து தனித்துக் காணும்படி பொருத்தப்பட்டுள்ளது. உடலினுள்ள காற்றுப் பைகளுடன் தொடர்புகொண்ட காற்றுப் பகுதிகள் தோலிற்கும் அதற்கடியி

துள்ள நிகக்களுக்குமிடையில் அமைந்துள்ளன. மற்ற முதுகெலும் புள்ள பிராணிகளைவிட பறவைகளில், தோல், எலும்புகளுடன் பிரிக்க முடியாதபடி ஒட்டிக்கொண்டுள்ளது. மேல்தாடை, கீழ்த்தாடை, பாதம் டியியா எலும்பின் கீழ்ப்பகுதி, இறகுகளின் துணிப் பகுதி (Pinion bone) முதலிய எலும்புப்பகுதிகளுடன் தோல் பிரிக்கமுடியாதபடி ஒட்டிக்கொண்டுள்ளது. மற்றும் தோல் பாதங்களிலும் உடலின் இருபுறமும் இறக்கைகளினால் நீண்டு தோலிழைமங்களாக (Web and patagium) மாற்றியும் அமைக்கப்பட்டுள்ளன. பின்னும் பறவைகளில் கொண்டை, தசைத்தோங்கல் போன்ற நிலயின் தசை திரட்சி ஆபரணங்களாகவும் மாற்றி அமைந்துள்ளது. பறவைகளின் தோலில் பைகோஸ்பைல் சுரப்பிகளைத் தவிர வேறுவிதச் சுரப்பிகள் கிடையாது. மற்ற முதுகெலும் புள்ள பிராணிகளில் உள்ளது போன்று பறவைகளின் தோலிலும் மேல்தோல் (Epidermis) கீழ் அல்லது கீழ்த்தோல் (Dermis) என்று இரண்டு அடுக்குகள் உள்ளன. மேல் தோலில் இரண்டு மூக்கிய அடுக்குகளுள்ளன. மேல்தோலின் மேலடுக்கிற்கு கார்னியல் அடுக்கு (Stratum corneum) என்று பெயர். இது ஒரு உயிர்த்து அற்ற அடுக்காகும். இந்த அடுக்கில் தட்டையான செட்டிப்படுத்தப்பட்ட படுக்கைக்கோட்டு நிலையில் அமைப்பெற்ற செல்களே உள்ளன. இவற்றில் சில உதிர்ந்துவிடும் நிலையிலுமிருக்கும். புறத்தோலின் கீழுக்குகிற்கு ஜெர்மினேட்டிவம் அடுக்கு (Stratum germinativum) என்று பெயர். இது அகத்தோலிற்கு (Dermis) மேலே சற்று ஆழமாக அமைந்துள்ளது. மேல் தோல் ஊட்டப்பொருளை அகத்தோலின்மேல் பெறுகின்றது. கார்னியல் அடுக்கு தேய்ந்து தேய்ந்து உதிர்வதால், அவ்வுக்கு செல்கள் அதற்குக் கீழேயுள்ள செர்மினேட்டிவம் அடுக்கிலிருந்து வெளியே கொண்டுவரப்படுகின்றன.

மேல்த் தோலின் அடர்த்தி, பறவைகளின் ஒவ்வொரு பகுதிகளிலும் வெவ்வேறுகவுள்ளது. உதாரணமாக இறகுகளால் மூடப்பட்ட பகுதிகளில் ஒரு சில செல் அடுக்குகளே உள்ளன. பாதம், அவுரு, கொண்டை முதலான பகுதிகளில் பல செல் அடுக்குகள் உள்ளன.

கீழ் அல்லது அகத்தோல் அல்லது கோரியம் (Dermis or Corium) இழைநார் இணைப்புத் திசுக்களாலானது. இது கொஞ்சம் ஆழமான பகுதிகளில் தோலினடி திசுக்களுடன் (Subcutaneous tissue) தசைநார் ஸ்பைன்ஸலாக இணைக்கப்பட்டு கரணப்படுகின்றது. இறகுகளால் மூடப்பெற்றுள்ள பகுதிகளில் அகத்தோல் புறத்தோலுடன் இணையுமிடத்தில் வழவழப்பாக உள்ளப்பகுதி கூம்பு போன்று நீட்டப்பெற்று முமிழ்களாகக் (Papillae) காணப்படுகின்றன.

உண்மையான முதிர்ச்சுபகுதிகள் அங்கிள்மேனும் பாதத்திற்கு அடியில் மேகத்தோல் கெட்டிப்படுத்தப்பட்டதால் ஏற்பட்டுள்ளன. இந்தப் பகுதிகளில் இரத்த நாளங்களும், உணர்ச்சி நரம்புத் திரட்சிகளும், மிகுந்தவாறு தரைப் பகுதிகளும் அகத்தோலில் காணப்படுகின்றன. இவை போன்றவைகள் அகத்தோலின் இறகுப் பைகளிலும் காணலாம்.

கழுஞ்சள், காண்டோர் (Condor) என்னும் அமெரிக்கக் கழுஞ் வகைகள் வாங்கோழிகள் முதலியவற்றில் இறகுகளற்ற தலை, கழுத்துப் பகுதிகளிலும், கோழியின் கொண்டைப் பகுதிகளிலும் தோல் மிகவும் கெட்டியாகவும் அழுத்தமாகவும் இருப்பதுடன், இரத்த நாளங்கள் மிகுந்தும் காணப்படுகின்றன. மற்றும் சில பறவைகளில் அடை காக்கும் பருவ காலங்களில் மார்புப் பகுதியில் திட்டுத் திட்டாகத் தோல் கெட்டிப்படுத்தப்பட்டுக் காணப்படுகின்றன. அவைகளில் இரத்த நாளங்களும் மிகுந்து காணப்படுகின்றன. அத்திட்டிற்கு 'அடைகாக்கும் திட்டுகள்' (Brood patch) என்று பெயர். அந்தப் பகுதியில் அதிகமான இரத்த ஓட்டம் இருப்பதால் வெப்பமும் அதிகமாக ஏற்படுகின்றது. அங்வேப்பத்தின் உதவியால் அப்பறவை தங்கள் முட்டைகளை நிறப்பான முறையில் அடை காக்கின்றன. இது போன்ற அடை காக்கும் திட்டுகள் உடலின் தளர்மோல்களின் (Hormones) உதவியால் ஏற்படுகின்றது. தோலிற்கடியிலுள்ள திசுவில் கொழுப்புப் பொருள் சேமித்து வைக்கப்பட்டுள்ளது. இவ்வாறு கொழுப்புப் பொருள் சேமிப்பு உடலின் பழ பகுதிகளில் பறவைகளுக்கெதிர்ப் அமைந்திருக்கும். பொதுவாக இறகுகளுக்கடியிலும் கழுத்துப்பைகளுக்கடியிலும் கழுத்துக்கடியிலும், வாலினடியிலும் மேற்கூறிய கொழுப்புப் பொருள் சேமித்து வைக்கப்பட்டிருப்பதைச் சாதாரணமாகக் காணலாம். பெட்ரல், பெங்குயின் போன்ற கடற் பறவைகளின் தோலிற்கடியில் எல்லாப் பகுதிகளிலும் கொழுப்பு சேமிப்பைக் காணலாம். வவசை போரும் பறவைகள் வவசை போதலுக்கு முன்னும் கொழுப்புப் பொருளைச் சேமித்து வைத்துக் கொள்கின்றன.

தோலின் புற அடுக்கும் அக அடுக்கும் முறையே வளர்ச்சியின் போது தோன்றும் மூல அடுக்கு (Germ layers) எனான புறப்படை (Ectoderm) மீசோடெர்ம் அல்லது இடைப்படை (Mesoderm) முதலியவற்றிலின்றும் தோன்றுகின்றன.

வளர்ச்சியுறுதலின்போது பறவைகளின் புறப்படை (Ectoderm) அதன் காற்று வாழ்க்கைக்கு ஏற்றப்போல் பலவிதமான மாற்றங்களைப் பெறுகின்றது. வளர்தலின்போது மேற்பரப்பு அகலமாகப்படுவதால் இறகுகள், செதில்கள், நகங்கள் முதலியன தோன்று

கின்றன. பறவைகளின் புற அடுக்கில் ஸ்ட்ரோபைகம் என்ற பகுதியைத் தவிர மற்றப் பகுதிகளில் கரப்பிகள் இடையாது. பொதுவாகத் தோன்றும் மெங்குதிய நகங்கள், செதில்கள், இறகுகள் முதலியன அல்லாமல் பறவைகளில் தாடைப் பகுதிகளில் நீண்ட அவருகம் தோன்றியுள்ளன. மற்றும் சில பறவைகளில் முழங்காக்களில் தோல் பகுதி கெட்டிப்படுத்தப்பட்டும் நீட்டப்பெற்றும் கரம்புடைப்பாக அல்லது குதிமுட்களாக (Spur) மாற்றப்படுகின்றது. செசெனி பறவைகளில் தலைப் பகுதியில் தோல் கெட்டியான பகுதிகளாக தலைக்கவசமாக (Helmet) மாற்றப்பட்டுள்ளது. பறக்கும் திறனற்ற ரேட்டைட்டே பறவைகளில் மார்புப் பகுதிகளில் தோலானது குறிப்பிடத்தக்க மாற்றங்களைப் பெற்று தடிப்பான உணர்ச்சியற்றப் பகுதிகளாக மாற்றப்பட்டுள்ளன.

மேலே குறிப்பிடப்பட்டுள்ள தோலின் நிறப்பான மாற்றங்களுக்கும் காரணங்களான மூட்டையின் வளர்ச்சியின்பொழுது ஏற்படும் காரணங்களைச் சோதனைகளின் மூலம் ஆராய்ந்துள்ளனர். இவ்வாறு தோலில் குறிப்பிடத்தக்க முறையில் ஏற்படும் மாற்றங்களுக்கு இரண்டாவது மூல அடுக்கான இடை அடுக்கு அல்லது மிசோடெர்ம் தான் காரணம் என்பதைக் கோழிக் குஞ்சின் வளர்ச்சியின் மூலம் விளக்கியுள்ளனர். அதாவது வளர்ச்சியின் முடிவின்பொழுது கால்களாக மாறக்கூடிய பகுதியிலிருந்து ஒரு சிறிது மிசோடெர்ம் பகுதியை பெயர்த்து எடுத்து (Transplant) இறக்கைகளாக வளர்ச்சியுறும் எக்டோடெர்ம் பகுதிகளில் பொதித்தால் மிசோடெர்ம் பகுதியானது இறகுகள் நகங்கள் செதில்களாக மூலிக்வின்றன. இதுபோன்ற பல பெயர்த்து எடுத்து பதிக்கும் (Transplantation) சோதனைகள் கோழிக் குஞ்சின் வளர்ச்சியின்பொழுது நடத்தியுள்ளனர். இதுபற்றி விளக்கக் கூற முடியாவிடினும் மிசோடெர்ம் தன்விடத்திலின்றும் தோன்றும் உறுப்புகளுக்கு முக்கியத்துவம் கொடுக்கின்றது என்பதற்கு வேண்டிய ஆதாரங்கள் உள்ளன. எவ்வப் பகுதிகளில் எக்டோடெர்மின் புற அடுக்கு மாற்றப்படுகின்றதோ அதாவது நகங்களாக, இறகுகளாக, அவருகளாக மாற்றப்பட வேண்டுமோ அங்கெல்லாம் முதலில் கீழ்த்தோலின்தான் (Dermis) குறிப்பிடத்தக்க மாற்றங்கள் தோன்றுகின்றன.

தோலின் அடிப்படை உலுப்புகள் (Derivatives of the Skin)

இறகுகள்

பறவைகளின் பவதரப்பட்ட தோலின் நிறப்புறுப்புகளில் இறகுகளே மிகவும் முக்கியத்துவம் வாய்ந்த பகுதிகளாகும். இறகுகள் தோலின் புற அடுக்கிலிருந்து தோன்றியவைகளாகும். இறகுகள்

பறவைகளுக்குத் திறமை வாய்ந்த, நீர் உள்சேர முக இயலாத ஒரு-போர்வைவாக அமைந்துள்ளது. திறமை வாய்ந்த போர்வைவாக அமைந்திருப்பினும் இறகுகள் மிகவும் இயைக்கூடியதாக விருப்பதால் பறவைகளின் பறக்கும் சக்திக்குத் துணையாகவே அமைந்துள்ளன. குளிர் காணத்திலும், குளிர் பிரதேசத்தில் வசிக்கும் பறவைகளுக்கும் உடல் வெப்பத்தை (40°—44°) ஒரே சீராக வைத்திருக்கவும் பெரிதும் பயன்படுகின்றன.

பறவைகளின் வாழ்க்கையில் மூன்றுவிதமான இறகுகள் தோன்றுகின்றன. மூட்டையிலிருந்து குஞ்சு பொரித்து குஞ்சு வெளிவந்தவுடன் பொடியிறகுகள் (Down feathers) என்ற இறகுகள் தோன்றி உடலில் சுற்றியும் அமைந்து பாதுகாக்கின்றன. பின்பு அவைகள் உதிர்ந்து வேறு விதமான இறகுகள் முதிர்ச்சி அடையாத நிலையிலுள்ள பறவை நிலையில் தோன்றுகின்றன. பறவைகள் முதிர்ச்சி யுற்ற பின்பு எப்பொழுதும் நிரந்தரமாகவுள்ள இறகுகள் தோன்றுகின்றன. நிரந்தரமான இறகுகளில் பறவைகளில் பண்பித நிரத் தோற்றங்களும் மற்றும் ஆண் பெண் பறவைகளில் ஒவ்வொரு இனத்திற்கும் எளிதில் கண்டுகொள்ளக் கூடிய முறையில் பல நிறங்களையுடைய இறகுகள் தோன்றுகின்றன.

பறவைகளின் உடல் இறகுகளால் மூடப்பெற்றிருப்பினும் இறகுகளற்ற பகுதிகளும் உள்வன. மற்றும் உடல் ஒரே சீராக இறகுகளால் மூடப்பெற்றிருப்பதில்லை. உடலின் சில பகுதிகளில் இறகுகளால் மூடப்பெற்றிருக்கும். அப்பகுதிகளுக்கு இறகுப் பாதை அல்லது டெரிலே (Terylac) என்று பெயர். மற்றும் சில பகுதிகளில் இறகுகளற்றுக் காணப்படும். அப்பகுதிகளுக்கு இறகற்ற பாதை அல்லது ஏட்டெரியா (Ateria) என்று பெயர். பென்ருவின் பறவைகளில் மட்டும் மேலே குறிப்பிட்டது போன்ற ஏட்டெரியாப் பகுதிகள் கிடையாது. உடல் ஒரே சீராக இறகுகளால் போர்த்தப் பட்டுக் காணப்படும். அவ்வாறு காணப்படும் நிலை இரண்டாம் படியாகவே (Secondary) தோன்றியிருக்க வேண்டுமென்று கருதப்படுகின்றது. ஏட்டெரியாப் பகுதியும், டெரிலே பகுதியும் பல்வேறுவகைப் பறவைகளில் பனவாறுகக் காணப்படுவதிலிருந்து, அப்பகுதிகளின் அளவு, அமைப்பு முதலியவற்றைக் கொண்டு பறவைகளை வகை படுத்தலாமென்றும் கருதப்படுகிறது.

இறகுப்பாதை தோன்றும் முறை (Formation of the feather Tract)

ஒவ்வொரு இறகுப்பாதையும் ஒரு குறிப்பிட்ட இறகுக் கூழ்-அல்லது முகிழ்களால் குறிப்பிட்ட அமைப்புகளுடனேயே தோன்று

கின்றன. இந்த இறகுக் கூழ் அல்லது முழிக்கலினின்றும் பறவையின் வாழ்தான் முழுவதும் இறகுகள் கூதிர கூதிர அவை மேலும் மேலும் தோன்றிக்கொண்டேயுள்ளன. இந்த இறகு முழிக்கல் பறவை முட்டையினுள் இருந்து கொண்டு குஞ்சாக மாறும் தருணத்திலேயே தோன்றுகின்றன. குஞ்சுகளின் வளர்ச்சியின் போழுது வான்மோடு (Dome) போன்ற வடிவுடைய முட்டைப்புகள் தோயின் மேற்பகுதியில் காணப்படும். பின்பு மிகக் குறைந்த கால அளவிற்குள் நீண்டு, மறு படிவும் அவைகள் தோயின் உள்ளேயே அழுத்தப்பட்டு விடுகின்றன. அதனால் குஞ்சு பொரிக்கும் தருவாயில் இறகுகள் தோயின் அடியில் தோன்றுகின்ற குழாய் போன்ற மயிர்மூட்டுப் பைகளில் (Follicle) காணப்படுகின்றன. மேல் துவாரப் பகுதியைத் தவிர மற்றப் பகுதிகளில் புற அடுக்கு செக்களால் மூடப்பட்டுவிடுகின்றன. கோழிகளில், முட்டை அடைகாக்கப்பட்ட முதல் ஈர முடிவிலேயே இறகு முழிக்கல் தோன்றி சில பகுதிகளில் தெரிய ஆரம்பித்து விடுகின்றன. அடைகாக்கப்படும் 9ஆவது—10ஆவது நாட்களில் முட்டைக்குள் விருக்கும் குஞ்சுகளில் இறகுப்பாதைகளும் தோன்ற ஆரம்பித்து விடும். கோழிகளில் முதலில் உடலின் நீளப்பாதையான மையப்பகுதிகளிலேயே இறகுப்பாதைகள் தோன்ற ஆரம்பிக்கும். பின்பு சிறிது சிறிதாக மற்றக் குறிப்பிடத்தக்க எல்லா இறகுப்பாதைகளும் தோன்றிவிடுகின்றன. இவ்வாறு குஞ்சு முட்டையினுள்ளிருக்கும் பொழுதே அடைகாக்கப்படும் நாளிலேயே இறகுப்பாதைகளெல்லாம் தோன்றிவிடுகின்ற காரணத்தால் குஞ்சு பொரித்து, குஞ்சுகள் வெளிவந்தவுடன் மேலே கூறிய இறகுப்பாதைகளிலிருந்து முறிச்சியுறும் பறவைகளின் இறகுகள் தோன்றுகின்றன.

முட்டையிலிருந்து வெளிவந்த குஞ்சுப் பறவைகளின்
இறகுகளின் தன்மை

(The feathers of the Newly Hatched Bird)

குஞ்சுப் பறவைகளின் முதலில் தோன்றிய இறகுகள், மிகுதுவான மெல்லிழைக்குஞ்சம் போன்ற மெல்லிய இறகுகளாகும். இவை அமைப்பில் மிகவும் சாதாரணமாகவும், எல்லாப் பறவைகளிலும் ஒரே மாநிலமாகவும் காணப்படும். ஒவ்வொரு இறகும் ஒரு கொத்து இழை போன்ற துண்ணிய இழைதார் இறகுத்துய்களால் (Barbs) ஆனது. இந்த இழைதார் இறகுத்துய்களின் இருபுறமும் மெல்லிய நன்றாக வளர்ச்சியுற்ற இறகு துண்துய்கள் (Barbules) உள்ளன. இவைகளுக்கு கொக்கி போன்ற பார்பிக்கிகள் (Barbecles) அநேகமாக இருப்பதில்லை. குழந்தைக்கு அல்லது ரேக்ஸின் (Rachis) அல்லது செக்ப்ட் (Shaft) பகுதி அநேகமாகக் கிடையாது. அவ்வாறு குழல்

தண்டுப் பகுதி இவ்வாத இறகுகளில் இறகுமுன்புதுய், இறகுத்துய் குட்டையான மிகவும் ஒடுக்கப்பட்ட உருளை வடிவமான கெனாமஸ் (Caimanus) என்ற பகுதியுடன் வட்ட வடிவமாக அமைந்திருக்கும். வாத்து, ரெவிய், காஃமோரெண்ட் போன்ற பறவைகளில் சிழ் இறகுகளில் மெல்லிய வளையும்தன்மையுள்ள குழல் தண்டுகள். ஈழம் (Eema) பறவைகளில் மட்டும் ஆகீப்பட்டாஷேப்பட்டகுதி (Aftershaft) உண்டு.

பொடி இறகுகள் மூட்டையிலிருந்து குஞ்சுகள் வெளி வந்தவுடன் எல்லாப் பறவைகளிலும் ஒரே மாதிரி இருப்பதில்லை. கிரெனஸ், வான்சோழி, வாத்து, ஆத்தை முதலிய பறவைகளில் சிழ் இறகுகள் நன்றாக அடர்த்தியாக வளர்த்திருப்பதுடன் பார்வைக்கு மிகவும் அழகாகவும் பல வண்ணங்களுடனும் காணப்படும். சிட்டுக் குஞ்சி, வார்ப்பன், திரெஷன், சிலிகன் (Sparrow, Warbler, Thrushes and Parrots) முதலிய பறவைகளில் பொடி இறகுகள் குறைவாகவும் பொதுவாக எல்லா இடங்களிலும் காணப்படாமல் அங்குமிக் குமாகவும் காணப்படுகின்றன. கிறகிதும் இசை எழுப்பும் பறவைகள், மரங்கொத்திகள், அரசமின்கொத்தி முதலிய பறவைகளின் மூட்டையிலிருந்து வெளிவந்த குஞ்சுகளுக்கு பொடி இறகுகளே காணப்படாமல் தோல்பகுதி வெளியே தெரியும்படி அமைந்திருக்கும். பொடி இறகுகளே மூளைக்காத பறவைக்குஞ்சுகளில் உருவ இறகுகள் (Oonour feathers) மூளைக்க ஆரம்பித்து விடுகின்றன. அவற்றில் உருவ இறகுகள் மிக விரைவாக மூளைக்க ஆரம்பித்து விடுகின்றன. ஆந்திரேவியா நாட்டு ப்ரஷ் வான்கேழிப் (Brush Turkey) பறவைகளில் குஞ்சு, மூட்டைக்குள்ளிருக்கும் பொழுதே அடர்த்தியற்ற பொடி இறகுகள் மூளைக்கின்றன. பின்பு குஞ்சு மூட்டையிலிருந்து வெளிவரும் பொழுது பொடி இறகுகள் உதிர்ந்து, உருவ இறகுகள் நன்றாக வளர்ச்சியுற்ற நிலையில் அக் குஞ்சுகள் உள்ளன. மூட்டையிலிருந்து குஞ்சு பொலிந்தவுடன் அவைகள் பறக்க ஆரம்பித்து விடுகின்றன. திக்கோழிகளில் பொடியிறகுகளின் இறகுத்துய்கள் மிகவும் நீளமாக அமைந்துள்ளன. அவைகள் குஞ்சுப்பறவைகளில் பொடி இறகுகள் உதிர்ந்து உருவ இறகுகள் மூளைக்க ஆரம்பித்த பின்னும் உதிராமல் நுனிப்பகுதியில் நன்றாக தட்டையாக்கப்பட்டு, முன்போன்ற அமைப்புடன் மற்ற எல்லா இறகுகளினின்றும் பிரித்துத் தெரியும்படி உள்ளது குறிப்பிட்டுச் சொல்லக் கூடிய தோன்றும்.

பொடி இறகுகள் பறவைகளின் வாழ்தாளில் ஒரு சிறிது காலமே உள்ளது. இறகுகள் தோன்றும் இறகுப் பைகளிலிருந்து பொடி இறகுகளுக்கு அடுத்துத் தோன்றும் இறகுகளால் வெளியே தள்ளப்

பட்டுவிடுகின்றன. அவ்வாறு தள்ளப்பட்டாலும், அடுத்து முனைக்கும் இறகுகளுடன் ஒட்டிக் கொண்டேயிருக்கும். பின்பு தேய்க்கப்படுவதாலோ, உராயப்படுவதாலோ அவைகள் உதிர்ந்துவிடுகின்றன.


பறவைக் குஞ்சுகளில் பொடி இறகுகளின் தோற்றம்

பொடி இறகுகள், பறவைக்குஞ்சுகளில் முதலில் இடை-அடுக்கின் (Mesoderm) செல்கள் கூட்டமாகச் சேர்ந்து தோன்றி அவைகள் ஒரு புடைப்பாக புற அடுக்கின் டெர்மில் பகுதியில் காணப்படுகின்றன. இப்புடைப்பிற்கு டெர்மல் முழிகள் (Dermal papillae) என்று பெயர். இடை அடுக்குச் செல்களின் தொகுப்பினாலான இந்த புடைப்பு, இறகுகள் முளைப்பதற்கான ஒரு சக்தியைத் தூண்டுகின்றது. அதனால் இப்புடைப்பிற்கு மேலுள்ள புற அடுக்கினைத் துளைத்துக் கொண்டு செல்கள் வளர்ச்சியுறுகின்றன. அதாவது எண்ணிக்கையில் பெருகி அதன்மேல் ஒரு தனி வளர்ச்சியாகத் தோன்றும்படி அமைகின்றன. இதுவே இறகுகளின் புற அடுக்கின்மேல் தெரீயும்படி அமைவும் முதல் வளர்ச்சியாகும். பின்பு இடைஅடுக்குப் பகுதிகளினின்றும் செல்கள் வளர்ச்சியுற்று அவைகளும் புற அடுக்குச் செல்களுடன் சேர்ந்து கொள்கின்றன. இதுபோன்ற வளர்ச்சி, மேலும் வளர்ச்சியுற்று மேல் துளி கூர்மையாகச் செல்லும்படி அமைகின்றது. பார்வைக்கு இது உருளை வடிவமாகவிரும்பினும் மேல் துளி கூர்மையாகவே அமைந்துள்ளது. இவ்வுருளைப் பகுதியின் மையத்தில் மைய அடுக்குச் செல்களின் (Mesodermal core) கூழ்ப்பகுதியுள்ளது. இதில் பல இரத்த நாளங்களும் அமைந்துள்ளன. இவ்வாறு இரத்த நாளங்களுடன் அமைந்திருப்பதால் அப்பகுதிக்கு ஊட்டப் பொருள்கள் இரத்தத்திலிருந்து கிடைக்கப் பெறுகின்றன.

இவ்வாறு இறகு மூலப்பகுதி (Fether-germ) ரிதிது வளர்ச்சியுற்ற பின்பு புற அடுக்கின்மேல் காணப்படும் வழுவுழப்பான், தடிப்பான் உருளை வடிவ புற அடுக்குச் செல்களில் பல மாற்றங்கள் காணப்படுகின்றன. இக்கவரானது பின்னும் மேற்புறமாக நீண்டு பல நீள்ப் பாங்கான நீள்வரை மேடுகள் தோன்றுகின்றன. அதிலிருந்து இறகுத்துய்களும் இறகு துண்டுகளும் (Barbs and barbules) தோன்றுகின்றன. இறவின் நீள்வரைப்பகுதியின் தோற்றத்திற்கு ஏற்றவாறு சீராக நீள்வரை மேட்டுப் பகுதிகள் (Ridges) தோன்றுகின்றன. அவ்வாறு தோன்றும்பொழுது முதிர்ச்சியுற்ற பகுதி புற அடுக்கின் அருகில் காணப்படுகின்றன.

பொடி இறகுகள் தோன்றும்பொழுது அதாவது குஞ்சு மூட்டைக்குள் இருக்கும்பொழுது பொடி இறகுகளைச் சுற்றி ஒரு உறை உள்ளது. குஞ்சு மூட்டையிலிருந்து வெளிவந்தவுடன் உறை

விவரி இறகுத்துங்கனும் இறகு துண்டங்கனும் வெளிப்படுத்தப்படுகின்றன. பொடி இறகுகளின் வளர்ச்சிக்குப்பின்பு டெர்மல் செல்கள்



படம் 6. தூவி இறகின் கட்டமைப்பு

(அ) குறுக முட்டையிலிருந்து வெளிவரும்பொழுது காணப்படும் தூவி இறகு. (அ) தூவி இறகின் குறுக்கு வெட்டுத்தோற்றம். (இ) கோழிக்குஞ்சின் தூவி இறகு.

1. உறை, 2. இறகுத்துப்பின் நீள்வரி மேடு, 3. கூழ்,
4. கெலாமல் அல்லது இறகுத் தண்டு, 5. இறகு துண்டம்,
6. இறகுத்தும்.

புற அடுக்குச் செல்களினால் மூடப்பட்ட ஒரு சிறு பகுதி பொடி இறகுப் பைகளினிடையே காணப்படும். இப்பகுதியினின்றும்தான் பின்னும் முதிர்ச்சியுற்ற பறவைகளில் உருவ இறகுகள் தோன்றுகின்றன.

இளம் பருவத்து பறவைகளின் இறகுகள் (The feathers of the Juvenile Bird)

இளம் பறவைகளின் இறகுகள் பொடி இறகுகள் உதிர்ந்தபின் தோன்றிய இறகுகளாகும். அவைகள் பொடி இறகுகளைக் காட்டிலும் பல கூட்டுத்தொகுதிகளால் ஆனது. முதிர்ச்சியுற்ற பறவைகளின்

இறகுகளுக்கும் [இனம் பறவைகளின் இறகுகளுக்கும் அடிப்படையில்தான்] இனம் வேறுபாடுகள் இல்லை. அவைகள் வடிவம், அளவு, அமைப்பு, நிறத்தோற்றங்கள் முதலியவற்றிலேயே வேறுபடுகின்றன. இனம் பறவைகளின் இறகுகள் மெல்லிய தோற்றமும், கெட்டிப்படுத்தப்படாத அமைப்பும் கொண்டுள்ளன. ரெமிஜஸ், ரெக்ஸிஸஸ் பகுதிகள் இனம்பறவைகளில் முதிர்ச்சியுற்ற பறவைகளை ஒத்திடுகின்றன. ஆனால் அவைகள் இனம் பறவைகளில் அல்லாதவர்களுடனாகப் பட்டாததால் வெளி உத்த - தனித்தனாக இயலாமல் உள்ளன. இறகு பரப்பு அல்லது வேண்டுகளின் பகுதிகளும் இறகுதரங்களும் இறகு துண்டுகளும் ஒடுக்கப்பட்டிருப்பதால் அல்லாதவர்களுடனாகப் பட்டாததால் காணப்படுகின்றன.

முட்டையிலிருந்து குஞ்சுகள் வெளிவந்த நிறு காலத்திற்கெல்லாம் இனம் பறவை இறகுகள் உடனின் பல் பகுதிகளிலின்றும் தோன்ற ஆரம்பிக்கின்றன. இவ்வாறு தோன்றும் பொழுது, இறகுப்பாளை முதன் முதலில் குஞ்சு முட்டையிலுள்ளிருக்கும் பொழுது எந்த அமைப்பில் தோன்றியதோ அதே முறையில் இறகுகளும் தோன்றுகின்றன. அதேபோன்று இறகுகள் உதிர்வதும், தோன்றுவதும் உட முதலில் தோன்றிய அதே அமைப்பையே கொண்டு வருகின்றன. இனம் பறவைகளின் இறகுகள் அதிலேயே தோன்றுகின்றன. முட்டையிலிருந்து குஞ்சு வெளிவந்த பின்னர் வாரங்களுக்குள் பெசுரைன் பறவைகளில் இனம் பறவை இறகுகள் தோன்றுகின்றன.

கெலிதேரியல் குடும்பப் பறவைகள், விலங்குகளை அடித்து உணவாக உண்ணும் பறவைகள், நீர் நிலைகள் கடற்கரையோரங்கள் முதலிய இடங்களில் வசிக்கும் பறவைகள் முதலிய பறவைகளில் இனம் பறவை இறகுகள், பொடி இறகுகள் உதிர்ந்த பல் நாட்களுக்குப் பின்பு தோன்றுகின்றன.

முதிர்ச்சியுற்ற பறவைகளின் இறகுகள் (The feathers of the Adult Bird)

பறவைகளின் இறகு அமைப்பு இறகு வடிவம் முதலியவை பலவாறுகாக காணப்படும் அவைகளில் மூன்று வகை இறகுகள் குறிப்பிட்டுச் சொல்லத்தக்க வகையில் உள்ளன. அவைகள் உருள் இறகுகள் அல்லது காண்ட்டூர் இறகுகள் (Contour) பஞ்சுமூல்கள் (Plumules or downy) அல்லது பொடி இறகுகள் தூளி இறகுகள் (Filoplumes) என்பனவாகும்.


உருவ இறகுகள் (Contour Featheres)

உடலின் பெரும்பகுதி இவ்விறகுகளாலேயே மூடப்பட்டுள்ளது. பறவைகளின் உடலில் நம் கண்ணுக்குத் தெரியும் எல்லாப் பகுதிகளும் உருவ இறகுகளால் மூடப்பெற்றுள்ளது. இந்த இறகுகளின் அமைப்பினைக் கொண்டு பறவைகளின் வடிவங்களை அறிந்து கொள்ளலாம். ரெமிஜஸ் அல்லது பறக்க உதவும் இறகுகளும் ரேக்ஸிசில் அல்லது வால் இறகுகளும், உருவ இறகுகளேயாகும். இந்த இறகுகளுக்கு உறுதியான குழல் தண்டு அல்லது ரேக்ஸிஸ் பகுதி (Rachis) உள்ளது. மற்றும் முழுமை பெற்ற உள் வெளி வேள் பகுதிகளும் (Vane) உள்ளன. இறகுப் பைகளுக்குள் இணைந்த வரிசையான தசைகளின் உதவியால் இந்த இறகுகள் தனித்தனியாக இயங்கின்றன.

உருவ இறகின் அமைப்பு

இந்த இறகுகளுக்கு நீண்ட கோல் போன்ற மூலக் கோதிக்கு குறுகும் இறகு ஈர்க்கு அல்லது ரேக்ஸிஸ் பகுதி (Rachis) உள்ளது. இந்த ஈர்க்கின் இருபுறமும் பெரியதாக அமையப் பெற்ற பக்க சிறகுகள் போன்ற கிளைகள் உள்ளன. அவைகளுக்கு இறகுத்துங்கள் (Barbs) என்று பெயர். இறகுத்துங்கள் பின்னும் பக்கவாட்டில் அநேக சிறிய கண்ணிற்கு புலப்படாத சிறு சிறு கிளைகளாக இறகு துண்டுகளாக பிரித்து காணப்படுகின்றன. இந்த இறகு துண்டுகளை இறகுத் துண்டுகளின் அண்மை சேய்மை ஆகிய இரு பகுதிகளிலும் காணலாம். இறகுத்துங்களில் சேய்மைப் பகுதி இறகு துண்டுகள் அடுத்துள்ள இறகுத்துங்களின் அண்மை இறகு துண்டுகளுக்குக் கொக்கி போன்ற துட்பமான பார்பிசெல்களால் ஒன்றோடொன்று பின்னப்பட்ட நிலையில் அமைந்துள்ளன. செல்களின் துளி கொக்கி போன்ற வரிசைத்துள்ளன. இவ்வாறு கொக்கி போன்ற உறுப்புகளால் பின்னப்பட்டு அமைந்திருப்பதால் இறகுகள் காற்று புகழுடியாத படலம் போன்ற (Airtight membrane) இறகுத் தடுப்பு அல்லது வேள் (Feather vane) உள்ளது. இது போன்ற கொக்கிப் பகுதிகளால் பின்னப்பட்ட இறகு வேள்கள், பறக்க உதவும் இறகுகளானாக்கப் பட்ட இறக்கைப் பகுதிகளிலும், வால் இறகுப் பகுதிகளிலுமே காணப்படும். மற்றப் பகுதிகளிலுள்ள இறகுகள் மெல்லிழைக் குஞ்சம் போன்ற நீண்ட சிறு சிறு இறகிழைகளுடன் கூடிய இறகுகளில் கொக்கிகள் இடையாது. இறகுப் பைகளுக்குள் பொதித்துள்ள குழல் தண்டின் அடிப்பகுதிக்கு கெணமல் (Calamus) என்று பெயர். இப்பகுதியில்

இறகுத்தாங்கள் மிடையாது. குழந்தையின் மற்ற பகுதிக்கு தேர் மானாக இது இருளை வடிவிலுள்ளது. மற்றும் வெற்றிடப் பகுதியாகவும் (Hollow) ஒளி சற்று ஊடுருவுத்தன்மையுடனும் (Semi-transparent) கலரால் பகுதியுள்ளது.



படம் 7. (அ) நீண்ட இறகு.

(அ) நீண்ட இறகு—ஒரு பகுதி பெரிதாக்கப்பட்ட தோற்றம்
1. குழந்தை தண்டு (Quill), 2. ராக்கு (Rachis), 3. வேல் (Vane), 4. இறகுத் தாள் (Barb), 5. மேல் அம்பிளிக்ஸ், 6. கீழ் அம்பிளிக்ஸ், 7. பித் தண்டு அல்லது பித்ஷேப்ப்ட், 8. இறகு நுன்தும், 9. கோக்கி.

கலாமல் பகுதிக்கும் குழந்தையின் அடிப்பகுதிக்கும் இடையில் பிளேஷ்ட் (After shaft) என்னும் இறகுத் தொகுதியுள்ளது. இந்த இறகுத் தொகுதி பல பறவைகளிலும், ஒரே பறவையின் பல இறகுப் பாகை பகுதிகளிலும் வெவ்வேறு அமைத்துள்ளன. இப்பகுதிகளின் வலிற்றுப் புறப்பக்கம் இறகின் வலிற்றுப் புறப்பக்கத்துடன் சேர்த்தே காணப்படுகின்றன. செசெனி சமூக பறவைகளில் பிளேஷ்ட் மற்றபெரிய இறகின் நீளத்தையும் அமைப்பையும் போலவே உள்ளது. ஆனால் சாதாரணமாக அவைகள் நீளமாகியல்லாமலும் பிசுவும்

மென்மைவாகவும் காணப்படும். கோழிகளில் கிளேட்டி நன்றாக வளர்ச்சியுற்றுக் காணப்படுகின்றன.

பூம்பூ அல்லது பொடி இறகுகள் (Plumules)

இந்த இறகுகள் அமைப்பில் குஞ்சுப் பறவைகளின் பொடி இறகுகளை ஒத்திருக்கின்றன. இவைகள் தளர்ச்சியாகவும், மிகுது வாகவும், மெல்லிழைக் குஞ்சம் போன்றும் காணப்படுகின்றன. பல் வரிசை சார்ந்த பறவைகளில் உடலின் பல பகுதிகளிலும் இந்த இறகுகள் ஒரே மாதிரியாகக் காணப்படுவதில்லை. இந்த இறகுகளை உருவ இறகுகளுக்கடியில் காணலாம். சில சமயங்களில் உருவ இறகுகள் இவ்வாத கழுத்துப் பகுதிகளில் காணலாம். மற்றும் பல நீர்ப்பறவைகளில் பொடி இறகுகள் உருவ இறகுகளுக்கடியில் நின்று போன்ற மாற்றப்பட்டு அமைத்திருப்பதைக் காணலாம். பறக்கும் திறனற்ற ஷேடட்டே பறவைகளில் இவ்விதமாகக் காணலாம். பறவைகளில் பொடி இறகுகளிலுள்ள இறகுத்துங்கள் இறகு நுண் துங்கள் முதலான பகுதிகளின் நுனிப்பகுதிகள் தூள்களாக மாற்றப் பட்டு (Powder) உதிரும் தன்மையுள்ளவைகளாயுள்ளன. ஆகையி னாலேயே அவைகளை 'தூள் இறகு' (Powder down) என்றும் அழைக்கலாம்.

தூவி இறகுகள் (Filoplumes)

கண்ணிற்குத் தெரியாத நூலிழை போன்ற நெருகு இறகுகளான இவைகள், ஒரு குறிப்பிட்ட நிலையில் கூர்ந்து ஆராய்ந்து பார்த்ததோ மானால் மற்ற பெரிய இறகுகளைவிட மூக்கியத்துவம் வாய்ந்த தொன்றாக அமைத்திருப்பதைக் காணலாம். குழல் தண்டின் மெல்லிய உரோமம் போன்ற நுனிப்பகுதியில் ஒரு சில இறகுத்துங்கள் உள்ளன. இவ்வகை இறகுகள் பறக்கும் திறனற்ற ரேட்டட்டே பறவைகளைத் தவிர மற்ற எல்லாப் பறவைகளிலும் காணப்படு கின்றன. இவை உருவ இறகுகளுக்கடியில் கூட்டமாகக் காணப்படும். உருவ இறகுகளின் தொற்றத்தினால் இவை முழுமைவாக மறைக்கப் பட்டு அமைந்துள்ளன. ஆனால் கார்மோரென்ட் பறவைகளின் கழுத்து மேலவகு பகுதிகளில் உருவ இறகுகளுக்கு மேல் தூவி இறகுகள் நன்றாக வளர்ச்சியுற்றுக் காணப்படுகின்றன.

அழகு சாதன இறகுகள் (Ornamental feathers)


உருவ இறகுகளில் பல அழகு சாதன இறகுகளாகவும் பயன்படு கின்றன. இதுபோன்ற அழகு சாதன இறகுகளில் கொக்கிகள் யிலவும் ஒடுக்கப்பட்டுள்ளன. மற்றும் இறகு நுண் துங்களும்

கிடையாது. இந்த இறகுகளில் இறகு நுன்துய்கள் இல்லாத காரணத்தினால் இறகுத் துய்கள் இணைக்கப்படாமல் காணப்படுகின்றன. ஆகையால் இவைகள் பார்வைக்கு மிகவும் தளர்ச்சி யாகவும் காணப்படுகின்றன. வண்ணச் சிறகுகளையுடைய நீயுனெய்யி னுள்ள பறவைகளின் (Birds of paradise) மூன் கரங்களில் இவ்விதிகுக் பல வண்ணத் தோற்றத்துடன் காணப்படுகின்றன. மயிங்களின் கொண்டப்பகுதிகளிலும், கொக்குகளின் கொண்டப் பகுதிகளிலும் இம்மாதிரியான இறகுகளைக் காணலாம். வான் கோழிகளில் காணும் புதர்குயியல் போன்ற இறகுகள், நீண்ட கம்பிகள் போன்ற வண்ண சிறகுகளையுடைய நீயுனெய்யினுள்ள பறவைகளின் இறகுகள் கேசெனர்ப் பறவைகளின் இறக்கை களினுள்ள கறுப்பு நிற இறகுகள் முதலியவற்றில் இறகுத்துய்கள் கிடையாது. இவ்வாறு பறவைகளின் இறகுகள் அவற்றின் தகவமைப்புக்காகப் பலவாறுகக் காணப்படுகின்றன, அடிப்படைத் தோற்றத்தில் தோன்றும் முறையில் ஒரே மாதிரியாகவே உள்ளன.

உருவ இறகுகள் தோன்றுதல் (Formation of the Contour Feather)

குஞ்சப் பறவைகளின் வளர்ச்சியின்பொழுது தோன்றிய பொடி-இறகுகள் உதிர்ந்த பின்னும், டெர்மல் முகிழ்கள் புற அடுக்கிலேயே குழாய் போன்ற இறகுப்பையின் அடிப் பகுதியில் நிரந்தரமாகக் காணப்படுகின்றன. இவ்வாறு நிரந்தரமாக அமைப்பெற்ற இறகுப் பையின் டெர்மல் முகிழ்களிலிருத்தே பறவைகளின் வாழ்க்கையில் இறகுகள் உதிர் உதிர் புது இறகுகள் முளைக்கின்றன. புது இறகு-களின் வளர்ச்சிக்கு இறகுப் பைகளிலுள்ள டெர்மல் முகிழ்கள் மிகவும் அவசியமாகும். டெர்மல் முகிழ்களை இறகுப் பைகளிலிருந்து அகற்றிவிட்டால் அவ்விடத்தில் இறகுகள் முளைப்பதில்லை என்பதை சோதனைகள் மூலம் விளக்கியுள்ளனர். முகிழ்ப்பகுதி, மிகவும் சிறப்பு வாய்ந்த தோல் பகுதியின் ஒரு கூட்டுப் பொருளாகும். இதில் சிறப்பாக டெர்மல் தலிப் பிரிவின் பகுதி (Dermal core) மேல் தோலின் மெல்லிய அடுக்கினால் மூடப்பட்டு, இறகுப் பைகளின் அடுக்குகளுடன் தொடர்ச்சியாக அமைந்துள்ளன. குழந்தைகூட, இறகுத்துய் இறகு நுன்துய் ஆகிய இரண்டு எல்லைப் பகுதிகளும், மேலே குறிப்பிட்ட மேல் தோல் செல் அடுக்குகளினின்றும் மைல அடுக்கு செல்களின் துணையுடன் தோற்றுவிக்கப்படுகின்றன.

இறகுப் பைகளில் அமைந்துள்ள டெர்மல் முகிழ்கள் வளர்ச்சி யுறுப்பொழுது இறகுகளின் உருளைப் பகுதியை தோற்றுவிக்கின்றன. பின்னும் இறகாக மாற்றப்படும் இந்த உருளைப் பகுதி கெட்டியான



படம் 8. - இறகு வளர்ச்சியின் பல நிலைகள்

- (அ) இறகு முதிர்ந்த தோற்றத்தை
 (ஆ) இறகு முதிர்ந்த தோலிதழ்மேல் தனித்துக் காணப்படுதல்
 (இ) இறகு முதிர்ந்த செங்குத்து வெட்டுத் தோற்றம்
 (ஈ) இறகு அரும்பு
 (உ) இறகு அரும்பின் செங்குத்து வெட்டுத் தோற்றம்
 (ஊ) உபாவிக்கெழுள் தூவி இறகு
 (ஏ) இறகு அரும்பு குறுக்கு வெட்டுத் தோற்றம்
 (ஐ) குஞ்சுப் பறவையின் முதிர்ச்சியுற்ற தூவி இறகு
 (ஐ) இளம் உருவ இறகு (Young contour feather)

1. செர்மல் (தோல்) முதிர் ஆரம்பப் பகுதி. 2. இறகு முதிர், 3 & 17, கட்டிரட்டம் காணிய அடுக்கு, 4 & 14. கட்டிரட்டம் மேல்புறியல் அடுக்கு, 5. புறத்தோலுக்கு (Ectoderm), 6. செர்மல் முதிர், 7. இறகு உபாவிக்கெழுள், 8. செர்மல், 9. இறகு முதிர்,

புறத் தோல் செல் அடுக்கினால் ஆனது. அதன் மையத்தில் டெர்மல் தனிக்கூறு (Dermal core) பசை போன்று அமைந்துள்ளது. அதில் இரத்த நாளங்களும் உள்ளன. உருளை வடிவ இதரின் கவர்ப் பகுதியில் மூன்று அடுக்குச் செல்களைக் காணலாம். உருளைச் செல்கள் புறத்தில் இதை நன்றாகச் சுற்றிக் காக்கும் பொருட்டு அமைந்துள்ள மேல் தோல் உறை (Epidermal sheath) என்பது ஒன்று. நெருக்கமாகவும் வரிசையாகவும் அமைப்பெற்ற நீள்வரை மேடு களுடன் கூடிய குழத்தண்டு, இறகுத்துப் முதலியவற்றைத் தோற்றுவிக்கும் தடித்த இடைப்பட்ட அடுக்கு இரண்டாவதாகும். மூன்றுவதாக டெர்மல் கூழ் பகுதியைச் சுற்றியமைந்த உள்வரைக்கு இந்த மூன்றுவது அடுக்குகளும் டெர்மல் முமிழ்களைச் சுற்றியுள்ள அடர்த்தியான வளையம் போன்ற ஒரு வளர்ச்சியின்பொழுது தோன்றிய மேல் தோல் அடுக்குகளினின்றும் தான் தோற்றுவிக்கப் படுகின்றன. இந்த புறத்தோல் அடுக்கின் வளையம் போன்ற பகுதிக்கு காலர் அல்லது மட்டை (Collar) என்று பெயர். இந்தப் மட்டைப் பகுதியிலிருந்துதான் செல்கள் தோன்றி வளர்ச்சியுறுகின்றன. இதை செல் உற்பத்தி நிலையம் என்றும் கூறலாம். இப் பகுதியிலிருந்து தோன்றும், வளர்ச்சியுறும் செல்களால் இறகுகள் விரைவில் வளர்ச்சியுறுகின்றன. டெர்மல் முமிழ்களினின்றும், டெர்மல் கூழ்ப்பகுதி தோன்றுகின்றது. இதரின் கழுத்துப் பட்டியின் மூலகுப் புறப்பக்கத்திலிருந்து குழத்தண்டு வளர்ச்சியுறுகின்றது. குழல் தண்டிற்கு எதிர்ப்புறமாக இறகுத்துய்கள், வயிற்றுப் புறப் பக்கத்தில் தோன்றுகின்றன. இறகுத்துய்கள் அதிகமாகத் தோன்றத் தோன்ற மேலே தள்ளப்பட்டு குழத்தண்டின் இளைந்து விடுகின்றன. இறகுத் துய்களின் பகுதிகளிலிருந்து இறகு துண்டுகள் தோன்றுகின்றன.

இறகு உதிர்ந்தல் (Moulting)

மூலர்ச்சியுற்ற பறவைகளில் வருடத்திற்கொரு முறை, இனப் பெருக்கக் கால முடியில் எல்லா இறகுகளும் உதிர்ந்து, புதிய இறகுகள் மூள்கின்றன. மற்றும் சில பறவைகளில் வருடத்திற்கு இரண்டொரு முறை முழுமையற்ற இறகுதிர்ச் செயல்களும் உண்டு.

10 & 13. இறகு .பாவிக்கின். 11. இறகுத் துய்கள் அல்லது மேல் பீஜியம் அடுக்கின் மேல்தோலுக்கு நீள்வரி மேடுகள், 12 & 15. டெர்மல் கூழ், 16. இரத்த நாளங்கள், 18. இறகுத் துய்கள், 19. நீர்த்த இறகு .பாவிக்கின் டெர்மல் முழி, 20. செல்களால் அல்லது குழல் தண்டு, 21. உறை, 22. மேல், 23. கர்க்கு, 24. இறகுத் துய்-இறகு துண்டுகளுடன் கூடிய ஹைப்போ டெர்மிக் பகுதி, 25. மேல் அம்பிவிக்கல், 26. கீழ் அம்பிவிக்கல்;

இவ்வாறு இடைவிடையில் இறகுகள் உதிர்ந்து புதிய இறகுகள் முளைப்பதானும், வருடக் கடைசியில் இறகுகள் உதிர்ந்து புதிய இறகுகள் முளைப்பதானும், வருட முடியில் யாவும் சேர்ந்த ஒரு பல் உட்டு புதிய இறகுகளாக மாறியிருப்பதை பறவைகளில் காணலாம்.

ஆண் பறவைகளில் இனப் பெருக்க காலங்களிலும் அதற்கு முன்பும் காணப்படும் பல வண்ணங்களையுடைய இறகுகள் முழுமை வற்றி இறகுதிரச் செயலினால் தோன்றவதாகக் கருதப்படுகின்றது (Partial moulting). பறவைகளில் இறகுதிரச் செயல்கள் ஒரே சீராக நடைபெறுவின்றது. ஒவ்வொரு வகைப் பறவைகளிலும் அதற்கென்ற தனிச்சிறப்பு உள்ளது. சில சமயங்களில் பறவைகளின் இறகுகள் உதிர்ந்து புதிய இறகுகள் முளைத்துக் கொண்டிருப்பினும், பறக்க உதவும் இறகுகளோ, உடம்புப் பாகங்களாக உதவும் இறகுகளோ இவ்வாறும் பறவைகளில் இருந்ததில்லை. ஆனால் வாக்ந்து, குள்ள லாத்து, கிபிளாயிங்கோ போன்ற சில பறவைகளில் பறக்க உதவும் பெரிய இறகுகள் ஒரே சமயத்தில் கொட்டியிருவதால், கொஞ்ச காலத்திற்கு இப்பறவைகள் பறக்க இயலாமலேயே வலிக்கின்றன. இது போன்ற தன்மை வெகு அபூர்வமாகவே காணப்படுகின்றது. பறவைகளில் இறகுதிரச் செயலின் பொழுதும், இறகுகள் உதிர்ந்து புதிய இறகுகள் முளைக்கும் பொழுதும் அவைகளுக்கு அதிக சக்தி வெள்ளடியிருப்பதானும், அதிக ஊட்டப் பொருள் தேவையாக இருப்பதானும் அதிக இரத்தச் சுழற்சி ஏற்படுகின்றது.

செதிகள், நகங்கள், அலகுகள்

செதிகள், நகங்கள், அலகுகள் முதலான பகுதிகள் மேல்தோல் அடுக்கின் கெட்டிப்படுத்தப்பட்ட உறுப்புகளாகும். இப்பகுதிகள் மேல்தோல் அடுக்குப் பகுதியிலிருந்து தோன்றுகிற முறையிலிருந்தே அவை வளர்வனவற்றிலிருந்து தோன்றியுள்ளதைக் குறிக்கின்றது. இவைகள் மூல அடுக்கிலிருந்து செல் பகுதிகளாகத் தோன்றி பின்பு கெட்டிப்படுத்தப்படுகின்றது. இந்தச் செல்கள் வெளிப்புறமாகப் பரவிச் சென்று ஸ்ட்ரேட்டம் கர்னியம் (Stratum corneum) அடுக்காக மாறுகின்றது. பின்பு அந்த அடுக்கு நெருக்கமான செல்களால் ஆக்கப்பட்டு கெட்டிப்படுத்தப்பட்டுள்ளது. பாதத்தின் புறப் போர்வை அடுக்கு செதில்களால் ஆனது. அவைகள் வெவ்வேறான வடிவத்தையும், அளவுகளையும் உடையன. நீண்ட கால்களையுடைய தன்னீரில் நடக்கும் ஆற்றலுள்ள பறவைகளில் டிபியா எலும்பின் மேற்பகுதியின் சேய்மை பகுதிவரைவிலும் செதில்கள் உள்ளன. ஹிரோனஸ், ஆந்தை, பருத்து, ஸ்வீஃப் (Swift) போன்ற பறவைகளில் மேலே கூறிய டிபியா எலும்புப் பகுதிகளிலும் பாதங்களும்

இறகுகளால் மூடப்பட்டுள்ளன. வெள்ளை ஆந்தை போன்ற பறவைகளில் (Snowy owl) பாதங்களுக்கடியிலும் இறகுகள் உள்ளன. ஆகையால் பறவைகளின் பாதங்களின் புறப்போர்வைப் பகுதி, சிலவற்றில் இறகுகளும் சிலவற்றில் செதில்களும் உள்ள காரணத்தினால் இது ஆற்றல் கொண்டு வேண்டும்பொழுது செயல் படும் திறமள்ளவைகளாக இருக்கின்றன. பறவைகளில் பாதப் பகுதியிலுள்ள புறப்போர்வைக்கு இறகுகளாலோ, செதில்களாலோ மாறும் ஆற்றல் உள்ளன என்பது தெளிவாகத் தெரிகின்றது. குஞ்சுப் பறவைகளில் தோன்றும்பொழுது அவைகளின் அடிப்படத் தோற்றம் ஒரே மாதிரியாகவே யிருக்கும். செதில் செட்கள் இறகுச் செட்களாக மாறுவதை நீக்கோழிகளிலும், கோழிகளிலும் பொதுவாகக் காணலாம்.

விரல்களின் நுனியிலுள்ள நகங்கள் கூர் நகங்கள் முதலியப் பகுதிகள் செதில்களின் மாற்றுப்பகுதிகளேயாகும். இவை செதில்களின் அழுத்தப்பட்ட வளைந்த நுனியில் கூர்மையாகவுள்ள பகுதிகளாகும். விலங்குகளை இரையாக உண்ணும் கொடும்பறவைகளின் கூர்நகங்களித்தால் (Talon) குறிப்பிடத்தக்க வளைந்த தன்மையைக் காணலாம். பல வரிசைகளைச் சேர்ந்த பறவைகளிலும் நகங்கள் பலவாறான தகவமைப்புகளைக் கொண்டிருந்தாலும் அடிப்படையில் தோற்றத்தில் ஒரே மாதிரியாகவே காணப்படுகின்றன. பல்வேறான தகவமைப்புகளைக் கொண்டிருந்தாலும் பறவைகளின் நகங்கள் தேவைக்கேற்றவாறு வளைந்துள்ள தன்மையினேயே மாறுபட்டு காணப்படுகின்றன. கேலிதேசியன் குடும்பத்தை (Gallinaceae) சேர்ந்த பறவைகளுக்கு குட்டையான மிதமாக வளைந்த கூர்நகங்கள் (Claw) உள்ளன. கிரெப்ஸ் பறவைகளுக்கு மூளை மழுங்கிய நகங்கள் உள்ளன. இப்பறவைகளின் நகங்கள் தட்டையாகவும் அகன்றும் காணப்படுகின்றன. அவைகளை மனிதனின் நகங்களோடும் ஒப்பிடலாம்.

பறவைகளில் பாதங்களுக்கடியிலுள்ள செதில்கள் மேல்பரப்பிலுள்ள செதில்களைக் காட்டிலும் வலுவழுப்பாக அல்லது மென்மையாக இருக்கும். இப்பகுதியின் இருகரையிலும் கூர்மையாக இருக்கும். இராப் பருத்துகள் (Night hawk) தாரைகள் (Herons) பெலிக்கன் (Pelican) முதலிய பறவைகளில் மையவிரல் நகத்தின் உள் ஓரப்பகுதி சீப்பின் (Comb) ஓரத்தைப் போன்று அமைந்துள்ளது.

அநேக பறவைகளின் இறக்கைகளில் முதல் விரலில் நகங்கள் உள்ளன. மற்றும் சில குஞ்சுப் பறவைகளில் முதல் இரண்டாவது விரல்களின் நுனியில் கூர்நகங்களைக் காணலாம். இந்நகங்களை இப்பறவைகள் கூட்டின் உள்புற செல்வதற்கும் வெளியே வருவதற்கும்

தற்கும் பயன்படுத்திக்கொள்ளின்றன. திக்கோழிகளில் இரண்டாவது மூன்றுவது விரல்களிலும் கூர்நகங்கள் காணப்படுகின்றன. நகங்கள் பறவைகளின் வாழ்வாசனம் வளர்த்து கொண்டேயிருக்கும். கூண்டு களில் அடைக்கப்பட்டு வைத்திருக்கும் பறவைகளில் அவற்றின் சாதாரண உபயோகங்களுக்கு பயன்படுத்துவதை தடை படுத்தி விடுப்பதால் நகங்கள் மிகவும் நீளமாக வளர்ந்து காணப்படும். இனப் பெருக்க கால முடியில் கிரேனஸ் பறவைகளில் நகங்கள் அவ்வப் பொழுது உதிர்ந்து விடுகின்றன.

மேகத்தாடை சித்தத்தாடை பகுதிகளை முடியுள்ள கர்னியல் அடுக்கு (Cornuous rib) அளவுகளாக மாறியுள்ளது. அங்குள்ள பறவைகளின் இரைவுண்ணும் பழக்கத்திற்கேற்ப பலவாறாக அமைந்துள்ளன. திக்கோழி, டைனாமஸ், கார்போரேன்ட், பெலிகன், நாரைகள் முதலிய பறவைகளில் அங்கு பல துண்டப்பகுதிகளால் ஆனது. ஆனால் பொதுவாக அங்கு பறவைகளில் ஒரே துண்டப் பகுதியாக ஆனது. பறவைகளில் முக்கியமாக அங்குப்பகுதி கெட்டிப் படுத்தப்பட்டே காணப்படும். ஆனால் மற்றும் சில பறவைகளில் துண்டப்பகுதியைத் தவிர மற்ற பகுதிகளெல்லாம் சற்று மிருதுவாகக் காணப்படும். இப்பகுதியில் மற்றப்பகுதிகளில் காணாத கிரேன்டியின் கார்ப்பசல்களும், ஹேர்ப்பீட்ட் கார்ப்பசல்களும் நரம்பு உணர்வு முடிக்கலும் காணப்படுகின்றன. உள்ளாள் பறவைகளில் அங்கு மிகவும் மிருதுத் தன்மையுடன் காணப்படுகின்றது. இப்பகுதி பறவைகளில் தொடு உணர்ச்சி உறுப்பாக மாற்றப்பட்டுள்ளது. பசுவில் இரைதேடியுண்ணும் பறவைகளிலும், இனிகளிலும் அவைகள் அடிப்பாகம் மிகவும் மிருதுவாகிடுப்பதுடன் அது சியர் பகுதியாக மாற்றப்பட்டுள்ளது. புறக்களிலும் இதுபோன்ற சியர் பகுதிகளைக் காணலாம். வாகத்து, கிபினாமிகோ போன்ற சில பறவைகளில் சிறுவரு ரம்பம் போன்ற ஓரத்துடன் காணப்படுகின்றன. இப்பகுதி யினால் மேற்கூறிய பறவைகள் உணவுப்பொருளை அரித்தெடுத்து உண்ணுகின்றன.

நகங்களைப் போன்று அளவுகளும் இற்றுப்போகும் தருணத்தில் மற்றொன்று தோன்றுகிறது. பகிப்பின் (Puffin) பறவைகளின் இனப் பெருக்க காலங்களில் அங்குக்கு மேல் அழகுசாதன உறுப்புகள் தோன்றி இனப்பெருக்க காலம் முடிந்தவுடன் அவை உதிர்ந்து விடுகின்றன.

முட்டையிலிருந்து பறவைக் குஞ்சுகள் வெளிவரும்பொழுது அவற்றின் மேல் அவைகள் முட்டைப்பல் (Egg tooth) என்றும் ஒரு சிறு புடைப்புப்பகுதி தோன்றியுள்ளது. பறவைக் குஞ்சு முட்டைவை

உடைத்துக்கொண்டு வெளியித்தவுடன் முட்டைப்பல் உதிர்ந்து விடுகின்றது.

யூரோப்பைசியல் சுரப்பி (Uropygeal gland)

பறவைகளில் யூரோப்பைசியல் சுரப்பிகள் மட்டுமே உள்ளன. அவைகள் கொழுப்புச் சுரப்பிகளை ஒத்தவைகளாகும். அவைகள் பறவைகளில் வால் பகுதிக்கு அடியில் இரு இதழ்களாக (Bilobed) அமைந்துள்ளன. வால் முள்ளெலும்புபாசு காக்கிலியல் முள்ளெலும்புகளின் இருபுறமிருந்தும் இவை ஒரு சோடி உட்குழிந்த (Invagination) முதுகுப்பற புறஅடுக்குப் பகுதிகளாகத் தோன்றுகின்றன. இவைகளில் பல குழாய் வடிவ சுரப்பிச் செல்கள் உள்ளன. இக்குழாய் வடிவ சுரப்பிச் செல்கள் இணைப்பு நிசைகளால் ஒன்று சேர்க்கப்பட்ட பகுதியே இந்தச் சுரப்பிகளாகும். இவைகள் மைய அடுக்கிலிருந்து (Medulla) தோன்றியதாகக் கருதப்படுகின்றது.

இச்சுரப்பியின் ஒவ்வொரு இதழிலும் ஒரு மையக்குழிப் பகுதி உள்ளது. இந்த மையக்குழிப் பகுதியினின்றும் ஒரு சிறு குழாய் போன்ற உறுப்பு தோலின் மேற்பரப்பில் நிறக்கின்றது.

இச்சுரப்பிகளால் சுரக்கப்படும் நிரவத்தின் தன்மை என்ன என்பது குறித்து பவலித சோதனைகள் நடத்தப்பட்டன. அங்ஙனம் நடத்திய சோதனைகளின் படி பறவை இனப்பறவைகளில் சுரக்கப்பட்ட நிரவம் பவலாக இருப்பதாகக் கண்டுபிடிக்கப்பட்டுள்ளது. இதில் கொழுப்புப் பொருளானது, கொழுப்பு பொருளற்றது (Lipodial-nonlipodial) என இரு சுரப்புப் பொருள்கள் உள்ளன. கொழுப்புப் பொருளில் வெகித்தின் (Lecithin) போன்ற பொருள்கள் கொழுப்பற்ற பொருள்களில் புரதப்பொருளும், தாது உப்புகளும் (Inorganic salts) உள்ளன.

ஹாப்பூ (Hoopoe) புறாவுளாத்து (Muskduck) பெட்ரல் (Pterod) போன்ற பறவைகளில் இந்த சுரப்பிகளிலும் சுரக்கச் செய்யும்பொருள் ஒத்த நூற்றமுடையதாக உள்ளது. மற்றும் சில பறவைகளில் அந்த சுரப்புப் பொருள் இனப்பெருக்க காலங்களில் மட்டுமே நூற்ற முடையதாக விருப்பதாகக் கண்டுபிடிக்கப்பட்டுள்ளது.

யூரோப்பைசியல் சுரப்பி பொதுவாக எவ்வாறு பறவைகளிலும் உள்ளது. ஆனால் இந்தச் சுரப்பி நீரில் வசிக்கும் பறவைகளில் நிறப்பாக அமைந்துள்ளது. இச்சுரப்பியிலிருந்து சுரக்கும் ஒரு எண்ணெய்த் நிரவம் தண்ணீர் இறகுகளுக்குள் துழைய முடியாதபடி தடுக்கின்றன. இந்த எண்ணெய்த் நிரவம் இறகுகளின் மேல்படியும்

பொழுது பறவைகள் தண்ணீருக்குள்ளிருக்கும்பொழுது தண்ணீர் இறகுகளின் ஊடு துருவிச்சென்று இறக்ககளை நீண்டகாலம் தடுக்கப்படுகின்றது. சில நீர் வாழ்ப்பறவைகளிலும் (Water birds) ஸ்டீரோனிட் (Stearons) என்ற எண்ணெய்ப் பறவையிலும் இத்தச் சுரப்பி மிகவும் சிறப்பாகவும் பெரிதாகவும் அமைந்துள்ளது. பஸ்டர்டு பறவைகள் (Bustard), புருக்களில் பல ரகங்கள், இனிகள், திக்கோழி, கெசெளசிகள், லீவா, சமூ முதலிய பறவைகளில் குஞ்சு மூட்டைக்குள்ளிருக்கும் பொழுது இச்சுரப்பிகள் வளர்த்திருந்தாலும் முதிர்ச்சியுற்ற பறவைகளில் இச்சுரப்பிகள் இடையாது. இச்சுரப்பி களுள்ள பறவைகள், இவற்றால் சுரக்கப்படும் எண்ணெய்த் நிரவத் தைக்கொண்டு, தங்கள் இறகுகளைச் சுத்தப்படுத்திக் கொள்கின்றன என்று கூறப்படுகின்றது. மற்றும் இந்த எண்ணெய்த் நிரவம் சுரப்ப தால் அவை உமிழ் நீரைச் சுரக்கத் தூண்டுகின்றதென்றும் உமிழ் நீரின் உதவியால் பறவைகள் இறகுகளைச் சுத்தப்படுத்துகின்றன என்றும் கருதப்படுகின்றது.

பூரோஸ்பெயல் சுரப்பியில் சுரக்கச் செய்யும் எண்ணெய்த் நிரவத்தின் உதவியால் பறவைகளுக்கு போதுமான லைட்டமின் டி (D) கிடைக்கின்றது.

இதுபற்றி பல சோதனைகள் நடத்தப்பட்டுள்ளன. அதாவது ஹோ (How) என்னும் அறிஞர் குஞ்சுப் பறவைகளில் இச்சுரப்பிகளை அகற்றிவிட்டால், போதுமான அளவு உணவுப் பொருளும், சூரிய வெளிச்சமும் கிடைத்தாலும்கூட, அவைகளுக்கு கால்களில் வளைவு ஏற்பட்டு ரிக்கெட் (Ricket) என்ற நோயினும் பாதிக்கப்படுகின்றது என்று கூறியுள்ளார். கோழிகளில் கேல்சியம் உப்புச்சத்து கிடைப்ப தற்கு இச்சுரப்பிகள்தான் பயன்படுகின்றன. இவைபற்றி பல விவாதங்கள் நடந்துவருகின்றன.

பறவைகளின் நிறங்கள்

மற்ற முதுகெலும்புள்ள பிராணிகளைக் காட்டிலும் பறவைகளின் புறப்போர்வை மண்டலமே சிறப்பு வாய்ந்ததாகவும் கண்ணையும் கருத்தையும் கவரும் வண்ணம் அழகுடனும் அமைந்துள்ளது. பல வண்ணங்கள் பறவைகளின் உருவஇறகுப் பகுதியிலேயே பெரும் பாலும் காணலாம். மற்றும் பலபறவைகளில் அலகுபாதம், தலைவீச் பகுதிகள், கழுத்து முதலிய பகுதிகளிலும் பல வண்ண நிறங்கள் இருப்பதைக் காணலாம்.

நிறங்கள் சாதாரணமாகக் காணப்படும் சாம்பல் நிறத்திலிருந்து, நல்ல சிதம்பாண கெப்பு வண்ணம் வரை பறவைகளின் இறகுகளில்

உள்ளது. மெலனின் அல்லது லிப்போக்குரோம் (Melanin or Lipochrome) போன்ற நிறமிகள் அங்ஙனம் வேதியியல் கூட்டுப் பொருள்கள், ஒளியின் அலைநீளத்தை உறிஞ்சும்பொழுது இங்ஙனான பல வண்ணங்கள் உண்டாகின்றன. மற்றும் இறகுத் துய்கள், இறகு துண்டுகள் போன்ற இறகு பரப்பின் துண்மைய பகுதிகளின் அமைப்பு அங்ஙனம் அவற்றின் இயற்பொருள் தன்மை (Physical property) முதலியவைகள் வெவ்வேறான ஒளியை மாற்றுவதாலேயே மிகப்பெரியோ இங்ஙனான பல வண்ணங்கள் தோன்றுகின்றன என்றும் கருதப்படுகின்றது. மேலே கூறிய இது அடிப்படை முறைகளால் வண்ணங்கள் தோன்றுகின்றன என்று கருதப்படும் சில சமயங்கள் இரண்டு அடிப்படை முறைகளும் கலந்தே வண்ணங்களைத் தோற்றுவிக்கின்றன.

மெலனின் நிறமிகள்

பறவைகளின் புறப் போர்வையின் மற்ற எல்லா நிறமிகளைக் காட்டிலும் மெலனின் நிறமிகள் பெரிதும் பரவிக் காணப்படுவதால் இது மிகவும் இன்றியமையாத தொன்ருகும். இவைகள் மிகவும் பசுட்டாகத் தோன்றுத சாம்பல் நெப்பு, பழுப்பு நிறம், கறுப்பு நிறம் முதல், நன்கு பசுட்டாகத் தோன்றும் பல வண்ணங்களுக்கும் உண்டுபண்ணுகின்றன. பசுட்டான வண்ணங்களின் தோற்றத்திற்கு மெலனின் நிறமிகள் லிப்போக்குரோமிகளுடன் சேர்த்து வண்ணங்களைத் தோற்றுவிக்கின்றன. மெலனின் நிறமிகள் பிரிந்து தெரியும் படியான சிறு துகள்களாக குறிப்பிட்ட அளவு, வடிவத்துடன் மெலனின் செல்கள் அங்ஙனம் மெலனோசைபோர்கள் (Melanocytes or melanophores) என்ற பெயர்களுடன் காணப்படுகின்றன. புறத் தோலின் அடிப்படை உறுப்புகளான இறகுகள், நகங்கள், செதில்கள் முதலானவற்றினுள் மெலனின் செல்களின் நிறமிகள் மிகுனாகச் சென்று வண்ணங்களைத் தோற்றுவிக்கின்றன. சற்று கருமையான நிறங்களின் (கறுப்பு, சாம்பல் நிறம், பழுப்பு நிறம்) தோற்றத்திற்கு மெலனின் நிறமிகள் கோல்போவோ நீள்குகளை (Oval) வடிவ மாகவோ காணப்படும். சற்று வெவ்வேறான நிறங்களின் (நெப்பு, மஞ்சள், பழுப்பு) தோற்றத்திற்கு மெலனின் நிறமிகள் சிறிய வட்ட வடிவமாகக் காணப்படும்.

லிப்போக்குரோம்கள்

இவை இறகுகளில் இயற்கையாகவே காணப்படும் நிறமிகளாகும். இவை பொதுவாகவே செம்மஞ்சள் நிறமிகளாகும். இவை மெலனின் நிறமிகளுடன் சேரும்பொழுது பல அழகான

சிறந்த மஞ்சள், ஆரஞ்சு, சிகப்பு போன்ற பல வண்ணங்கள் தொன்று
கின்றன. இதுபோன்ற வண்ணங்கள் அழகுச்சாதன இறக்கை
களாகப் பயன்படும் இறக்கைகளில் காணப்படுகின்றன. வகை
போதும் பறவைகளிலும் இனப்பெருக்கக் காலங்களில் ஆண் பறவை
களிலும் இதுபோன்ற அழகான பசு வண்ணங்கள் தோன்றுகின்றன.
இது போன்ற பிரகாசமான வண்ணங்கள் விப்போக்குரோம் நிறமிகள்
இறகுத்துப்புகிலும், இறகு நுண்ணுய்களிலும் காணப்படுவதாயேயே
தோன்றுகின்றன. விப்போக்குரோம் நிறமிகள் இனம் பறவைகளில்
கிடையாது.

விப்போக்குரோம் நிறமிகள் உடனின் பல பகுதிகளுக்கு
இரத்தத்தினால் எடுத்துச் செல்லப்படுகின்றது. கொழுப்புப்
பொருளினால் இவைகள் ஒரே மாதிரி பரவி ஊடுருவிச் சென்றுள்ளது.

கோழி, வாங்கோழி, வாத்து, குள்ளவாத்து, அன்னம் முதலிய
பறவைகளின் இறகுகள் வெண்மை நிறத்துடன் இருத்தலைக்
காணலாம். அவற்றின் இறகுகள் நிறமற்ற ஒளிபுகக்கூடியதாய்,
ஒளம்பிய பிளவுகளுடன் காற்று நிரம்பிய பரப்புக்களுடன் காணப்
படும். இப்படிப்பட்ட இறகுகளின் மீது ஒளியின் பிரதிபலிப்பாலும்
(Reflection) ஒளிக்கதிர்களின் நிரவுகனாலும் (Refraction)
இறகுகள் வெண்மை நிறத்தைப் பெறுகின்றன. ஒவ்வொரு
பறவையிலும் காணப்படும் நிறம் இறகுகளின் அமைப்பு, அவைகள்
பொருத்தியுள்ள நீர் முதலியவற்றைப் பொருத்திருக்கின்றது. இறகு
நுண்ணுய்கள் இறகுகளில் எண்ணிக்கையில் மிகவும் அதிகமாக
இருப்பதாலும், ஒழுங்கற்ற ஓரப்பகுதியினை யுடையதாகவிரும்பு
தாலும் ஒளியை ஊடுருவச் செல்லவிடாத வெண்மை நிறத்தினை
உற்பத்திவாக்குகின்றது.

பறவைகளில் ஊதா நிறத் துகள்கள் கிடையாது. பகட்டாக
மின்னும்படியில்வாத நீல நிறத்தை ஊதா ஜே (Blue Jay) மொனியா
(Sialia) போன்ற பறவைகளில் காணலாம். அந்த நிறம் இறகுகளில்
இயற்கையாகவே ஏற்பட்ட ஒரு அமைப்பையல்லாமல் அவைகள்
நிறத்துக்களால் உருவாக்கப்பட்டதல்ல. நுண்ணோக்கியின் மூல
மாகவும் மிகவும் நுண்ணிய பொருளை ஆராய்த்தறியத்தக்க புடை
மொனிய நுண்ணோக்கியின் மூலமாகவும் (Ultra microscope) நீல நிறம்
பறவைகளின் இறகுகளில் அமைத்திருத்தலைக் குறித்து ஆராய்ச்சிகள்
நடத்தப்பட்டுள்ளன. நுண்ணிய குழாய்வடிவ இறகுத்துய்களின்
கார்ட்டிகள் பகுதியிலுள்ள நிறமற்ற பெட்டிச் செல்களின் கவர்திக்
காணப்படும். சிறு சிறு துவாரங்களாலுமே நீலநிறம் உருவாக்கப்
படுகின்றது. நீலநிறத் தொற்றத்தை டிண்டால் (Tyndall) என்பவர்
இவ்வாறுதான் குறிப்பிட்டுள்ளார்.

பச்சை நிற இறகுகளும் மேற்கூறிய நீலநிற இறகுகளின் தோற்றத்தைப் போன்றே காணப்படும். பச்சை நிற இறகுகளைக் கிளிகளில் காணலாம். மேலே குறிப்பிட்ட நிறமற்ற பெட்டிச் செடிகளின் உதவியால் நீலநிறம் தோன்றுகின்றது. இந்த நீலநிறம் தோலின் அடியிலுள்ள உறையின் மஞ்சள் நிறத்துக்களுடன் சேரும் பொழுது பச்சைநிறம் உண்டாகுகின்றது. மஞ்சள் நிறத்துக்களை சுரண்டியெடுத்து விட்டால் இறகுகள் நீல நிறமாகயிருப்பதாக மேசன் (Mason) என்னும் அறிஞர் ஆராய்ச்சியின் மூலம் கண்டு விளக்கியுள்ளார். சிகப்பு விப்போக்குரோம் நிறத்துக்கள் அல்லது பழுப்பு கலந்த சிகப்பு நிறத்துக்கள் தோலின் அடியிலுள்ள உறையில் இருக்குமாயின் செங்குநீல நிறம் (Violet) இறகுகளில் தோன்றுகின்றன. இவைகளைப் போன்ற பல்வேறு நிறங்களை இறகு துய்களிலுள்ள நிறமற்றப் பெட்டிச் செடிகளினால் ஏற்படுத்தப்படும் நீலநிறமும் மெலானின், விப்போக்குரோம் முதலானவற்றின் பல்வேறு நிறத்துக்களுடன் இணையும் பொழுது பலதரப்பட்ட நிறங்கள் தோன்றுவதாகக் கண்டுபிடிக்கப்பட்டுள்ளது. பகட்டான அல்லது பளபளப்பான தோற்றத்தை உண்டாக்க இறகு நுண்துய்கள் பயன்படுகின்றன. மெலானின் நிறத்துக்களிலும் பளபளப்பான தோற்றத்தை உண்டுபண்ணும் நிறத்துக்கள் உள்ளன.

4. பறவைகளின் எலும்பு மண்டலம்

ஊர்வன வகுப்பைச் சேர்ந்த விலங்குகளின், முக்கியமாக ப்டிரோசாரிஸ் (Pterosauria) டைனோசார்கள் (Dinosaurs) முதலிகள் முதலியவைகள் அடங்கிய ஆர்க்கோசொரிய (Archosauria) என்ற ஊர்வன பிராணிகளின் எலும்புக்கூட்டிலே ஒத்தே பறவைகளின் எலும்புக்கூடு உள்ளது. பறவைகளும் ப்டிரோசாரிகளும் ஆரம்பத்திலிருந்தே பரிணாமத்தில் ஒரு கிளைவினிக்ந்து வெவ்வேறுபடப் பிரிந்து சென்றாலும் அவைகளின் பறக்க உதவும் இறக்கைகள் அமைப்பில் வெவ்வேறுபாடுகளேயிருந்தன. ஆனால் அவைகளின் எலும்புக்கூட்டிலே ஆராய்ந்து பார்த்தால் இரண்டும் ஒரு பொதுக் கிளைவினிக்ந்தே பிரிந்து சென்று தங்கள் வாழ்வெளி வாழ்க்கைக்குத் தகுந்தவாறு பறக்கும் திறனைப் பெற்றிருக்க வேண்டுமென்று திறப்பதற்கு வேண்டிய ஆதாரங்கள் உள்ளன.

ஆர்க்கோசாரியா ஊர்வனப் பிராணிகள் ஆடுகாவத்திலிருந்தே தங்கள் பின்னங்கால்களின் உதவியால் ஓடும்படியான தகவமைப்பினைப் பெற்றிருந்தன. பின்பு இவ்வாறு பின்னங்கால்களினால் ஓடும் திறன் பல வகுப்பைச் சேர்ந்த பிராணிகளில் காணப்படலும் இத்தகையமைப்பு பறவைகளின் முன்னோர்களிலேயே அடுகமாகக் காணப்பட்டது. இப்பிராணிகளில் ஓடும் திறனுக்கு பின்னங்கால்களே பயன்படுத்தப்பட்டதால், முன்னங்கால்கள் பறக்க உதவும் கருவியாக மாற்றி அமைக்கப்பட்டுவிட்டன என்று கருதப்படுகின்றது.

யங் (Young) என்னும் அறிஞர் குறிப்பிட்டுச் சொல்லியபடி, பறவைகளின் நடப்பதற்கும் பறப்பதற்கும் முறையே பின்னங்கால்களும், முன்னங்கால்களும் தனித்தனியாக, அதாவது தரையில் நடந்து இடப்பெயர்ச்சி செய்வதற்கு பின்னங்கால்கள் மட்டுமே பயன்படும்படியும், விண்வெளியில் பறப்பதற்கு முன்னங்கால்கள் மட்டுமே பயன்படும்படியும் இருவிதமாக ஒன்றுக்கொன்று தனித்து பிரிந்து

இடப்பெயர்ச்சி செய்யும் வண்ணம் அமைந்துள்ளன. இவ்வாறு இருவிதமான இடப்பெயர்ச்சி செய்யும் தன்மையுள்ளதால் பறவைகளின் தோள்பட்டை, இடுப்பு வளையங்கள் இரண்டும் (Pectoral of pelvic girdles) பறக்கும்பொழுதும், நடக்கும்பொழுதும் அழுத்தத்தைத் தாங்கிக் கொள்ளுமாறு சக்தி வாய்ந்ததாகவும், உடலிற்கு ஆதாரம் அளிக்கும்படியாகவும் அமைந்துள்ளன. பறவைகளில் உடம்பு குட்டையாகவும், மண்டையோடு சிறியதாகவும், அழுத்தமாகவும், கழுத்து நீளமாகவும் வளையுத்தன்மையுள்ளதாகவும் அமைந்துள்ளன. கடல் ஆமைகளில் உள்ளது போன்ற கழுத்தின் அமைப்பு பறவைகளிலும் உள்ளது. எலும்புகளினுள் இரத்தச் சத்து (Bone marrow) இல்லாமல் வெற்றிடமாக யிருப்பதால், அவைகளின் எலும்புக்கூடு மிகவும் இலேசானதாகவுள்ளது.

ஜூரேகிக் (Jurassic) காலப்பிரிவில் பறவைகளின் முன்னோர்கள் தோன்றின. டீபீர் (De Beer) என்னும் பெரியார் முதன் முதலில் தோன்றிய இரு பறவைகளின் எலும்புக்கூட்டினை விளக்கியுள்ளார். அவ்விரண்டு பறவைகளும் ஒரே பொது இனம், சிறப்பினைப் பறவைகள்தான். அதற்கு ஆர்க்கியாப்டெரிக்ஸ் வித்தோ கிரேக்பிகா (Archaeopteryx litho graphica) என்று பெயர். இப்பறவைகளில் ஊர்வனப் பிராணிகளின் பல பண்புகளும், பறவைகளின் பல பண்புகளும் காணப்பட்டன. இவ்வாறு இப்பறவைகள் ஊர்வனவற்றின் பண்புகளையும் பறவைகளின் பண்புகளையும் பெற்றிருப்பதி லிருந்து, இவைகள் ஆர்க்கோசெளரியன் முன்னோர்களினின்றுதான் நேரடியாகத் தோன்றியிருக்கக் கூடுமென்று தோன்றுகின்றது. பழமையான இப்பறவைகளின் எலும்புக்கூட்டிற்கும், தற்போதைய பறவைகளின் எலும்புக்கூட்டிற்கும் பொதுவாக, முக்கியமானப் பகுதிகளில் அதிக வேறுபாடுகள் காணப்படுகின்றன. இப்பறவைகளில் தாடைகளில் பற்கள் உண்டு. இறக்கைகளின் ஒவ்வொன்றிலும் மூன்று கூரிய நகங்கள் உள்ளன. மெட்டா டார்சல் எலும்புகள் இணையாமல் தனித்தனியே காணப்படுகின்றன. வால்பகுதி மிகவும் நீளமாகவுள்ளது. இக்காலப் பறவைகளில் காணும் பைகோஸ்டைல் (Pygostyle) பகுதி இவைகளுக்குக் கிடையாது. சேக்ரல் பகுதியில் 6—8 முள்ளெலும்புகளே உள்ளன.


கிரிட்டேஷியஸ் காலப்பிரிவில் மற்றும் 12 வகைப் பறவைகளின் எலும்புக்கூடுகள் மலைகளில் கிடைத்தன. கிரிட்டேஷியஸ் காலப் பிரிவில் கிடைத்துள்ள ஹெஸ்பிரார்னீஸ் (Hesperornis) என்ற உருவத்தில் பெரிய, ஒடுக்கப்பட்ட இறக்கைகளுடன் பறக்கும் திறனற்ற நீரில் மூழ்கி வாழும் பறவையும், இக்தியார்னீஸ் (Ichthyornis) என்று உருவத்தில் சிறிய பறக்கும் திறனுடைய பறவையும் ஆகிய இவை

இரண்டு பறவைகளும் தற்போதுள்ள பறவைகளின் எலும்புக் கூட்டின் ஒத்த எலும்புக்கூட்டியுடைய இரு பறவைகளாகும். ஆனால் ஹெஸ்டிராஸின் பறவைகளில் சித்திராடை டெண்ட்ரி பகுதியில் பற்கள் இருந்தன.

டெர்ஷியர் (Tertiary) காலப்போக்கில் தற்போது வசிக்கும் எல்லாப் பறவைகளிலுமே அதாவது பறக்கும் நிறனுள்ள கேரினேட் (Carnate) பறக்கும் நிறைந்த டேண்ட்ரே பறவைகளும் தோன்றியிருந்தன.

மூன்றெலும்புகளும் விலாவெலும்புகளும்

மற்ற நான்கு கால் பிராணிகளில் உள்ளது போன்றே (Tetrapods) பறவைகளில் ஒவ்வொரு மூன்றெலும்பும் அதன் பக்கத்திலுள்ள மூன்றெலும்புடன் சிபோனியல் இணைப்பால் (Synovial) ஹைப்போசெப்சிஸ்களுக்கிடையில் பொருத்தப்பட்டுள்ளது. கருவளர்ச்சியின் போழுது மூன்றெலும்புகளெல்லாம் பழம் ஊர்வன பிராணிகளைப் போன்று ஆம்ஃபிசெலஸ் (Amphicoelous)



படம் 9. ஆளாப் பறவையின் கழுத்து மூன்றெலும்புகள்

(அ) அட்டாஸ் மூன்றெலும்பு

(ஆ) 4-ஆவது கழுத்து மூன்றெலும்பு-மூன்றாம் தொற்றம்

(இ) 4-ஆவது கழுத்து மூன்றெலும்பு-பின்மூன்றாம் தொற்றம்

(எ) 6-ஆவது கழுத்து மூன்றெலும்பு-மையப் பகுதி வெட்டுத் தொற்றம்

(உ) 15-ஆவது கழுத்து மூன்றெலும்பு - மையப் பகுதி வெட்டுத் தொற்றம்

(ஊ) 5-ஆவது கழுத்து மூன்றெலும்பு-இடப் பக்கத் தொற்றம்

1. அட்டாஸ் மூன்றெலும்பின் குறுக்குப் பற்க்கம், 2. ஆப் செலும்பின் ஓட்டப்பட்டாங்கு நீட்டி மட்டும், 3. ஆர்டியூக்ருவார் பகுதி, 4: மூன்றெலும்புத் தயைக் குழாய், 5. மூன்றெலும்புப் பாகப்பிசு, 6: பின் ஹைப்போ பாகப்பிசு, 7. தண்டுவடக்குழாய்.

வகையைச் சார்ந்ததாகவுள்ளன (அதாவது முள்ளெலும்பின் இரு பக்கமும் குழிந்து காணப்படுகின்றன). கிரிட்டேஷியஸ் காலத்தில் வாழ்ந்த இக்தியாள்ளிஸ் பறவைகளில் கழுத்து, உடல்பகுதியிலுள்ள முள்ளெலும்புகள் ஆம்ஃபிசிலஸ் வகையைச் சார்ந்ததாகவே யிருந்தன. தற்போது வசிக்கும் பறவைகளில் சிலவற்றில் வால் முள்ளெலும்புகள் ஆம்ஃபிசிலஸ் வகையைச் சார்ந்ததாகவுள்ளன, பொதுவாக அட்லாஸ் (Atlas) என்ற முதல் முள்ளெலும்பினைத் தவிர மற்ற முள்ளெலும்புகளெல்லாம் ஹெட்டிரோசிலஸ் (Heterocoelous) வகையைச் சார்ந்ததுதான். பென் குவின் (Penguvin) கிளிகள் (Parrot) போன்ற மற்றும் ஒரு சில வகைகளில் உடல் பகுதியிலுள்ள முள்ளெலும்புகள் ஆப்பிஸ்தோசிலஸ் (Opisthocelous) வகையைச் சார்ந்தவைகளாகும்.

ஒரு பறவையின் முள்ளெலும்புகளின் எண்ணிக்கை குறைந்தது 40 [அதாவது சிறிய பேசரைன் பறவைகளில் Passerine] முதல் 60 வரை (சிக்னினே வகுப்பைச் சேர்ந்த அன்னம்போன்ற பறவைகளில் Cygninae) இருக்குமென்று கணக்கிடப்பட்டுள்ளது.

கழுத்து முள்ளெலும்புகள், எண்ணிக்கையில் 8 முதல் 25 வரை இருக்கும். அதிகப்படியான கழுத்து முள்ளெலும்புகள் அன்னம் மற்றும் நீண்ட கழுத்தினுடைய பறவைகளுக்கு உண்டு.

அட்லாஸ் என்னும் முதல் முள்ளெலும்பு பறவைகளில் சிறிய வளையம்போன்ற எலும்பாகும். இதன் முன் பகுதி மண்டையோட்டில் பிடர்முண்டு பொருந்தும்படி குழிந்து காணப்படுகின்றது. இந்த முள்ளெலும்பில் முள்ளெலும்புத் தமனிகள் ஊடுருவிச் செல்ல மற்ற முள்ளெலும்புகளில் காணப்படும் இணையான தமனித் துவாரங்கள் (Foramena) அநேகமாக இந்த முள்ளெலும்பில் கிடையாது. மற்றும் முதற்பிடர் எலும்பின் துவாரத்திற்கு அருகில் ஒரு சக்திவாய்ந்த குறுக்காயமைந்த பந்தகம் (Ligament) உள்ளது. இப்பந்தகம் அச்செலும்பின் ஓடண்டாய்நீட்சியை அசையாம விடுப்பதற்கும், அந்நீட்சியை தண்டுவடத்தினின்றும் பிரித்து வைப்பதற்கும் பயனுள்ளதாக உள்ளது. பியூசெரோட்டிடே (Bucerotidae) குடும்பத்தைச் சேர்ந்த ஹார்ன்பில் (Hornbill) பறவைகளில் முதற்பிடர் எலும்பும் அச்செலும்பும் (Atlas & axis) இணைந்தே காணப்படுகின்றன. இருப்பினும் இப்பறவையின் தலைப் பகுதி அச்செலும்பிற்கும் மூன்றாவது கழுத்து முள்ளெலும்பிற்கும் (Axis & 3rd Cervical Vertet) இடையிலுள்ள இணைப்பினால் ஒரு சிறிது திரும்பும் திறன் பெற்றுள்ளது. முதற் பிடர் எலும்பினைத் தவிர மற்ற எல்லாக் கழுத்து முள்ளெலும்புகளிலும் விலாவெலும்புகள் உண்டு. அவ்வாறு இருப்பினும் அவைகள் மிகவும்

சிறியதாகவும், முள்ளெலும்புடன் அநேகமாக இணைக்கப்பட்டுமே காணப்படுகின்றன. கடைசி ஒன்று அல்லது இரண்டு கழுத்து முள்ளெலும்புகளில் விலாவெலும்புகள் நீண்டும் அசையும்படியும் உள்ளன. பறவைகள் பலவற்றிலும், கரோட்டிட் தமனிகள் கழுத்து முள்ளெலும்புகளினின்றும் வயிற்றுப்புறமாக (Ventral) நீண்டுள்ள நீட்சிகளால் (Flanges) பாதுகாக்கப்பட்டுள்ளன. முள்ளெலும்பின் நியூரல் முட்கள் கழுத்துப்பகுதிக்கு முன்னால் பெரியதாக உள்ளது. முள்ளெலும்புப் பகுதிகளுக்கு இடையிலுள்ள பிணைப்புகள் திரவத் தால் பிணைக்கப்பட்டுள்ளன. சேணம் போன்ற (Saddle) வடிவிலேயுடைய முள்ளெலும்புப் பகுதிகளின் பிணைக்கும் பாகங்கள் முன்புறம் குழிந்தும் முதுகுப்புற வயிற்றுப்புறத் தோற்றத்தில் குவிந்தும் காணப்படுகின்றன. கழுத்து முள்ளெலும்புகளின் பகுதிகளில் முன்பகுதி (அதாவது முதல் சில முள்ளெலும்புகள்) கழுத்தானது முன்புறமாக தடையின்றி அசையும்படியும் கழுத்தின் மத்திய பகுதி பின்புறமாக தடையின்றி அசையும்படியும் கழுத்தின் பின்பகுதி முன் பகுதியைப் போன்று முன்புறமாக தடையின்றி அசையும் படியும் இவ்வாறு மூன்றுவிதமாக தங்கு தடையின்றி செயல்படுமாறு முள்ளெலும்புகளாலும், அவற்றின் பாகங்களாலும் ஆக்கப்பட்டுள்ளன.


அங்கிண்டா என்ற பாம்புதாரா போன்ற (Anhinga) பறவை (Snake bird)களில், மீனைப் பிடித்து இரையாக உண்ணும் பழக்கங்களுக்கு ஏற்ப சுட்டி போன்ற அவகுடைய பறவைகளில் கழுத்து முள்ளெலும்புகள் பெரிதும் மாறுபட்டு காணப்படுகின்றன. இவைகளில் கழுத்து கொக்கி போன்றிருக்கும்.

மேற்கூறிய கழுத்து முள்ளெலும்புகளின் அமைப்பின் தகவமைப்புகள் அவ்வளவு மிகையாக இல்லாவிடினும் சற்றுத் தெளிவாக நாரைகளிலும் (Hérons) கார்மோரெண்டுகளிலும் (Cormorants) காணலாம்.

பறவைகளில் மார்பு முள்ளெலும்புகள் எண்ணிக்கையில் ஐந்திலிருந்து பத்து வரையிருக்கும். முதல் மார்பு முள்ளெலும்பில் விலாவெலும்பு உண்டு. அவ்விலாவெலும்புகள் மார்பெலும்பு (Sternum) வரை நீண்டிருக்கும். இவைகளில் நியூரல் முட்கள் பெரியதாகவும், வளைவற்ற நுனியுடனும் உள்ளன. மற்றும் சில கழுத்து முள்ளெலும்புகளின் வயிற்றுப்புற நீட்சிகளாக ஹைப்போபைசிஸ்கள் கோலிநீள் முன் தசைகளுடன் (Longus Colianterior muscles) பொருத்தப்பட்டுள்ளன.

முதல் சில மார்பு முள்ளெலும்புகள், கோழிகளிலும் மற்றும் கிபால் கோலிடே குடும்பத்தைச் சேர்ந்த பறவைகளிலும் தனித்

தனியே விவரமாகச் சேர்த்து, ஒரே எலும்பாக காணப்படுகின்றன. மற்றும் செசேக்ரம் பகுதியிலிருந்து இவை பிரிந்து காணப்படுகின்றன.



படம் 10: பாம்பு தாரச் பறவையின் கழுத்து மூன்றெலும்புகளும் அவற்றின் தசைகளும்

1. காக்கல் கோலி பித் தசைகள், 2. காக்கல் கோலி தசைகள்—தசை நாண் பாகம் கெட்டிப்படுத்தப்பட்டுள்ளது, 3. காக்கல் கோலி மூன் தசைகள். (7, 8, 9 கழுத்து மூன்றெலும்புகள்)

மார்பு மூன்றெலும்புகளின் விவரவெலும்புகளுக்கு இரு பகுதிகள் உள்ளன. ஒன்று முதுகுப்புறமாகவும் மற்றொன்று வயிற்றுப்புறமாகவும் நீண்டுள்ளன. இவை இரண்டும் அசைவப்படியான இணைப்பினால் பொருத்தப்பட்டுள்ளன. முதுகுப்புறமாக உள்ள பகுதிக்கு இருதலைகள் உள்ளன. மேலே உள்ள தலை மூன்றெலும்புகளின் குறுக்கு நீட்சிகளுடன் பொருத்தப்படியும், கீழேயுள்ள தலை மூன்றெலும்புகளுடன் பொருத்தப்படியும் அமைந்துள்ளன. இவ்வாறு உள்ள அமைப்புகள் செசேக்ரப்பகுதிக்கு அருகிலுள்ள விவரவெலும்புகளில் அங்ஙனவாகக் காணப்படவில்லை, வயிற்றுப்புறமாக அமைந்துள்ள விவரவெலும்புகளின் பாகங்கள் மார்பெலும்புகளைத் தொடுமளவிற்கு அமைந்துள்ளன. இவைகளுக்கு மார்பு விவரவெலும்புகள் (Sterneal ribs) என்று பெயர். இவைகளை மனிதனின் காஸ்டல் குருத்தெலும்புகளுடன் (Costal Cartilage) ஒப்பிடலாம். இவ்விவரவெலும்புகள் மற்ற நாற்கால் பிராணிகளில் உள்ளது போன்றிவ்ளமம் நன்றாக எலும்பாக்கப்பட்டுள்ளன (Ossified).


இவ்வாறு விளாவெலும்புகள் பறவைகள் பறக்கும்பொழுது உடலின் கனத்தை தாங்குமாறு அமைந்துள்ளன. இருப்பினும் இதுபோன்ற அமைப்புகளை பறக்கும் திறனற்ற கீவி (Kiwi), தீக்கோழி போன்ற பறவைகளிலும் காணலாம்.

ஸ்பீனோடாஸ் (Sphenodora) போன்ற ஊர்வனப்பிராணிகளில் உள்ளது போன்று அநேகமாக எல்லாப் பறவைகளுக்கும் மார்பு மூன்றெலும்புகளின் விளாவெலும்புகளில் அன்சினேட் ஃபீசிக்ஸ் (Uncinate processes) உள்ளன. இந்நீட்சிகள் வளர்ச்சியின்போது (Development) விளாவெலும்புகளிலின்றும் தவிவாகவே தோன்றுின்றன. மற்றும் சில ஏட்டெரீக்சில் (Apteryx) பெங்குவின்சு (Penguins) போன்ற பறவைகளில் விளாவெலும்புகளுடன் அன்சினேட் நீட்சிகள் இணைந்திருப்பதில்லை. இந்நீட்சிகள் அப்பென்டி. கான்டாஸெல் (Appendi costales) மற்றும் அதுபோன்ற தசைகளுடனும், பிணைப்பகங்களுடனும் பொருத்தும்படி அமைந்துள்ளன. இவ்வாறு அமைந்திருப்பதால் மார்புச் சுவர்கள் பலம் பொருத்தியதாக உள்ளன.

பறவைகளின் மார்புக்கூடு ஆமையின் மார்புக்கூட்டினப் போன்று அசைக்க முடியாதபடி அமைவாமலிருப்பினும், பார்வைக்கு மிகவும் நேர்த்தியாக உள்ளது. பறவைகள் சுவாத்தலின்போது விளாவெலும்புகள் அசைகின்றன. விளாவெலும்புகளின் முதுகுப்புற, வயிற்றுப்புற பாகங்களுக்கிடையிலுள்ள பகுதி மார்புக்கூடு விரிவதால் காற்றை உள்ளேயிழுக்கும்பொழுது விரிவாக்கப்படுகின்றது. மார்புக்கூடு கருங்குவதால் காற்றை வெளியேற்றும் பொழுது குறுகலாகின்றது.

பறவையின் எலும்புக் கூட்டில் சின்சேக்ரம் (Synsacrum) என்ற பகுதி மிகவும் முக்கியமானதான தென்புறமும். இப்பகுதி மார்புக் கூடு மூன்றெலும்புகளில் பின்புலுள்ள சில, ஸம்பார் அல்லது இருப்பு மூன்றெலும்புகள், பிட்ட மூன்றெலும்புகள் (Sacral), வால் மூன்றெலும்புகளின் மூன்பகுதியிலுள்ளவற்றில் சில, ஆகிய மூன்றெலும்புகளினால் ஆனது. மேற்கூறிய மூன்றெலும்புகளின் கூடற்பகுதி, திபூரல் முடிகள் குறுக்கு நீட்சிகள் முதலியவைகள் இணைந்தே இருக்கின்றன. இருப்பு வளைவத்துடன் மேற்கூறிய பகுதிகள் நன்றாக கெட்டியாக பிணைக்கப்பட்டுள்ளன. இப்பகுதிகளை அவைகளினின்றும் கிளம்பும் தண்டுவுட நரம்புகளினின்றும்மேதான் பிரித்து பெலர் காணமுடியும். சின்சேக்ரத்தின் பல பகுதிகள் எல்லாப் பறவைகளிலும் ஒரே மாதிரியாக இல்லாவிடினும், ஏறத்தாழ கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ள வகைதான் ஸ்ட்ரெங்மென்

(Stressman) என்பவரால் 1927-34 ஆம் ஆண்டு வரை ஆராயப்பட்டு முடிவாக்கப்பட்டது.



படம் 11. சிலிப் பறவையின் மார்பு வளையம், மார்புக் கரு, இடுப்பு வளையம், சிவ் சேக்ரம் முதலியன.

1. இவ்வளம், 2. அரிட்டாபுலம், 3. மூல்ட்ரோக் கேக்ட்டர், 4. இவ்வளத்தின் தலை, 5. இவ்வளம், 6. பிப்பிள், 7. கீபிள், 8. அக்சிபென்ட் நீட்டி, 9. விவாவெலும்பு, 10. மார்பெலும்பு, 11. அக்து, 12. ரோடலம், 13. கிப்பிளம், 14. கோரகார்டு, 15. கிவ்வெலும்பு.

சிவ்சேக்ரத்தின் மூலப்பகுதியில் ஒன்று, இரண்டு அல்லது மூன்று மார்பு மூள்எலும்புகளுக்கு முடிவுபெற்ற விவாவெலும்புகள் உள்ளன. அவ்விவாவெலும்புகள் மார்பெலும்பு வரை நீண்டு பிணைக்கப்பட்டுள்ளன. அந்த மூள்எலும்புகளுக்குப் பின்னால் அகன்ற ஆழமான குறுக்கு நீட்சிகளையுடைய பல மூள்எலும்புகள் உள்ளன. அத்தீட்சிகள் இடுப்பு வளையத்தின் இவ்வளம் (Ilium) பகுதியை தொடும்படி அமைந்திருப்பதால் அவற்றிற்கு ஒதுகுப்புற வயிற்றுப்புற கம்பிபோன்ற பகுதிகளாக நீண்டுள்ளன. இப்பகுதியின் கடைசி விவாவெலும்புப் பகுதி அகன்றதாக விருப்பதையும், அதனால் அடுத்த மூள்எலும்புப் பகுதி குறிப்பிட்டுச் சொல்லும் பிசுவாக காணப்படாமலும் அமைந்துள்ளன. சிவ்சேக்ரத்தில் மேலே குறிப்பிட்ட பகுதிக்கு பின்னால்வரும் பகுதியில் பல மூள்எலும்புகள் உள்ளன. அம்மூள்எலும்புகள் அனைத்தும் இணைந்தே காணப்படுகின்றன.

மற்றும் ஒவ்வொரு பக்கத்திலுமுள்ள இடுப்பு வளைபத்தில் இலக்கியாட்டிக் குழியில் (Ischiatic fossa) அம்முள்ளெலும்புகளின் தீட்சி பொருத்தும்படியும் அமைந்துள்ளன. அந்த இலக்கியாட்டிக் குழியித்தான் நெுதிரகங்களின் மைய மடல்கள் (Middle lobe) பொருத்தும்படி உள்ளன. இந்த பிற்பகுதியிலுள்ள, முள்ளெலும்பு களுக்கு முதுகுப்புற கம்பிப்பகுதிகள் மட்டுமே உள்ளன. இந்த கம்பிப் பகுதிகள் இம்முள்ளெலும்புகளின் வளைவுகளினின்று தோன்றி ஒன்றுடன் ஒன்று கப் பிணந்து காணப்படுகின்றன. வாக் பகுதியி லுள்ள முள்ளெலும்புகளின் இப்பாகங்கள் தொடர்பான தட்டு போன்ற எலும்பாக அமைந்து இடுப்பெலும்புடன் பொருத்தப் பட்டுள்ளன.

அடுத்ததாக இரண்டு அவ்வது மூன்று முள்ளெலும்புகளை சேக்ரல் முள்ளெலும்புகள் என்று குறிப்பிடலாம். இந்த முள்ளெலும்பு களுக்கு முதுகுப்புற வயிற்றுப்புற கம்பிப்பகுதிகள் உள்ளன. இவை இரண்டும் துலியில் சேர்ந்துள்ளன. கடைசியாக உள்ள முள்ளெலும் புகளுக்கு, வாக் முள்ளெலும்புகள் என்று பெயர். இவைகள் ஒரு குறிப்பிட்ட எண்ணிக்கையில் அமைவதில்லை.

இந்த வாக் முள்ளெலும்புகள் செச்சேக்ரத்திற்கு பின்னும் உள்ளன. அநேகமாக அவை தனித்தனியே எண்ணிக்கையில் 5 முதல் 8 வரை காணப்படுகின்றன. இவற்றிற்குப் பின்னும் சுமார் 10 முள்ளெலும்புகள் ஒன்றாக இணந்து மேற்புறமாக வளைந்த பைகோஸ்டைல் என்ற எலும்பாக அமைந்துள்ளது. வாக் இரகுகளின் பெரும்பகுதி இந்த எலும்புத் தொகுப்புடன் இணக்கப்பட்டுள்ளன. பைகோஸ்டைலானது பறவை பறக்கும்பொழுது பெரிதும் உதவி புரியும் கருவியாக உள்ளது.

சில பறவைகளில் மேலே குறிப்பிட்ட கடைசி முள்ளெலும்பு களின் இணப்பான பைகோஸ்டைல் பகுதி காணப்படுவதில்லை. நெல்பிராசினில் (Hesperornis) மற்றும் டைனோஸ் (Titanomys) போன்ற இதர பறக்கும் சக்தியற்ற பறவைகளில் பைகோஸ்டைல் பகுதி கிடையாது. ஆனால் தீக்கோழிகளில் பைகோஸ்டைல் பகுதி தன்ரக வளர்ச்சியடைந்து காணப்படுகின்றது. இது பற்றி சித்திக்கும் பொழுது, தீக்கோழிப் பிரிவின் பரிணாமத்தை ஆராயும்பொழுது, தீக்கோழியின் முன்னோர்கள் பறக்கும் திறனைப் பெற்றிருக்கவேண்டும் என்பதை பறக்கும் திறனுள்ள பறவைகளையேயே காணப்படும் பைகோஸ்டைல் பகுதியின் தன்ரக அமைப்பெற்ற தோற்றம் விளக்குகின்றது.


மாசுபு வளைபம் (The Shoulder Girdle)

பறக்கும் நிறைந்த பறவைகளில் மாசுபு வளைபமும், முன்னங்காக்களும் மிகவும் ஒடுக்கப்பட்ட நிலையிலேயே உள்ளன. மறைந்து விட்டப் பறவைகளான மோவா (Moa) டைனோசர்ஸின் (Dinornis) போன்ற பறவைகளில் முன்னங்காக்கள் கிடைபாது. முன்னங்காக்களின் மேல்கரம் தனி பொருத்தும் குழியான கிளினாய்டு குழி (Glenoid cavity) லும் கிடைபாது. தற்போது வசிக்கும் பறக்கும் நிறைந்த பறவைகளிலும், கிளினாய்டு, கேரினேட் வகுப்பைச் சேர்ந்த பறவைகளிலும் கிளேவிக்ளின் (Clavicle) எலும்பு ஒடுக்கப்பட்டோ, முழுமையாக மறைவப்பட்டோ காணப்படுகின்றன. மற்ற பறவைகளில் இப்பகுதி மிகவும் நேர்த்தியாக அமைந்திருப்பதுடன் தன்ருக எலும்பாக்கப்பட்டுள்ளது. இவ்வெலும்புகள் விளாவெலும்புகளின் அமைப்பினைப் போன்ற பவத்துடன் பறவைகள் பறக்கும் பொழுது உடலின் கனத்தை இறக்கைகள் தாங்கும்பொழுது அதனும் ஏற்படும் அழுத்தத்தைத் தாங்கும்படி அமைப்பெற்றுள்ளன. கோரகாய்டு எலும்பும், கிளேவிக்ளின் எலும்பும் மாசுபெலும்பிலிருந்து இறக்கைகளை அகற்றி உடலின் கனத்தை தாங்கிக் கொள்ளுமாறு அமைந்துள்ளன.

ஸ்கேப்புலா (Scapula) எலும்பு சாதாரணமாக மிகவும் நீளமானதாகவும் விளாவெலும்புகளின்மீது நீண்டும் அதனுடன் பிணைப்பகங்களினால் பிணைக்கப்பட்டும் காணப்படுகின்றன. இவ்வெலும்புகள் இவியத்தின் முன்பகுதியைக்கூட நீண்டு காணப்படுகின்றன. பெங்குவின் பறவைகளில் ஸ்கேப்புலா எலும்பு குறிப்பிடத்தக்க முறையில் அகன்றும் தட்டையாகவும் காணப்படுகின்றன. ஸ்கேப்புலா கோரகாய்டுடன் இணைக்கப்பட்டுள்ளது. அதே சமயத்தில் கிரேவிக்கிளினாய்டுடன் அதன் அக்குரோமியல் நீட்டிகளால் இணைக்கப்பட்டுள்ளன. பவம் பொருத்தியதாகவும் பெரியதாகவும் அமைப்பெற்ற கோரகாய்டு எலும்புகள், சிப்தோக்ளியும் உட்புறமாகவும் நீண்டு மாசுபெலும்புடன் இணைக்கப்பட்டுள்ளன. அவ்வாறு சிப்தோக்ளியும் உட்புறமாகவும் அவ்வெலும்புகள் நீளம் பொழுது பக்கத்து ஒன்றுக அமைப்பெற்றுள்ள அவை ஒன்றை ஒன்று தொடும்படியும் அவ்வு ஒன்றன்மேல் ஒன்று பொருத்தும்படியும் அமைந்துள்ளன. கோரகாய்டின் முன்பகுதி முன் கோரகாய்டு (Pre coracoid) எலும்பாக நீண்டு அமைப்பகுதியில் கிளேவிக்ளின் எலும்புடன் பிணைக்கப்படுகின்றன.

அடுத்து கிளேவிக்ளின்கள் இரண்டும் குறிப்பிடத்தக்க முறையில் வயிற்றுப்புறப் பகுதியில் இணைந்து வங்குலா (Furcula) அல்லது கலை எலும்பாக (Wish bone) அமைந்துள்ளது. இவ்விரண்டு பக்க

கிளேவிக்ஸின் எலும்புகளும் குருத்தெலும்பினுமேயே பிணைக்கப் பட்டுள்ளது. இருப்பினும் கிளிகன், ஆத்தைகள், பறக்கும் நிறைநிற பறவைகள் முதலியவற்றில் இவ்விரண்டு எலும்புகளும் இன்னயாமல்



படம் 12. குறிப்பிட்ட சில பறவைகளின் மார்பு வளையங்கள்


(அ) ஈழ குஞ்சுப் பறவையின் மார்பெலும்பும் மார்பு வளையமும்

(ஆ) ரேவன் பறவையின் மார்பெலும்பு

(இ. ச & உ) மெயோ சிட்டாக்கஸ் பறவையின் (Melospiza) மார்பெலும்பு-வளர்ச்சியில் சில தோற்றங்கள்

1. கிளேவிக்ஸின், 2. ஸ்கேபுலா, 3. கொராகோசு, 4. ப்ளூரோஸ்டீயம் (Pleurosternum), 5, 6 & 7. பெரிய மார்புத் தசைப் பிடிப்புப் பகுதி, 8. மைய சிப்பாய்வு, 9. பக்க சிப்பாய்வு, 10. மார்பெலும்பில் காம்பட்டக் ஓர் பகுதி, 11. மார்பெலும்புப் பகுதி விடா வெலும்புகள், 12. துளை.

தனித்தனியாகவே காணப்படுகின்றன. பறக்கும் சக்தி அதிகமாக பெற்றுள்ள பறவைகளில் கிளேவிக்ஸின்கள் இரண்டும் இணைத்து மூக்குள் எலும்பாக மாறும் இடத்தில் அதன் கோணமாகவு மிகவும் அகலமாகவுள்ளது.



படம் 12. குதிர்ப்பட்டியை பறவைகளின் மார்பு வளைபங்கள்

- (அ) அகன்ற பறவைகளின் மார்பு வளைபம் (காற்றுக்குழாய்-மார்பெலும்பு பிழை நுழைந்தோற்றம்)
- (ஆ) அகன்ற பறவைகளின் மார்பு பெலும்பு-இடப்புறப் பகுதி-(காற்றுக்குழாய் மார்பெலும்பு பிழை செவ்வது-புள்ளிகளாகக் காட்டப்பட்டுள்ளது)
- (இ) கிளியின் மார்பு வளைபம்-(கிளையின் கிள்கள் இரண்டாம் பாகம் ஒடுங்கியுள்ள நிலை)
- (ஈ) நுட்ப மிக் பறவைகளின் மார்பு வளைபம்-இடப்புறத் தோற்றம்.
1. ஸ்கெப்பா, 2. கோரகாய்டு, 3. பெக்டோரலியின் தசை இழை, 4. நுழைந்தோற்றம் அகன்ற மார்பு பகுதி, 5. 7 & 10. ஸ்கெப்பா, 6. காற்றுக்குழாய், 9. அடித்தட்டைக்கவம், 11. டிரையோசியம் தசை, 12. மேக்கரம், 13. கிளையின், 14. கிளியின் குதிரை.

பின்புறமாக கோரகாய்டு ஸ்கெப்பா எனும்புகளின் முற்பகுதிகளுக்கு இடையிலும் கிளையின் எனும்பு பொருத்துவதன் மையப்பகுதியிலும் பொதுவாக எல்லா கோரகாய்டு பறவைகளிலும் டிரையோசியத்தின் துவாரம் என்ற (Triassic foramen) பகுதி உள்ளது. இத்துவாரத்தின் வழியாகவே பறக்க உதவும் பெரிய மார்புத்தசையின் (Pectoralis secundus) தசைநாண் மேக்கரத்தின் கொண்டைப் பகுதிக்குள் சென்று நுழைந்து பிணைக்கப்பட்டுள்ளது. இத்தத் தசை மார்பெலும்பிலிருந்து தோற்றமளிக்கப்பட்டு, இதன் தசைநார்களின் இணைப்பானது, பறவையின் இறக்கை மேல் நோக்கி அசைவதற்கு ஏதுவாக அமைந்துள்ளது.

பறவைகளில் மார்பெலும்புப் பவனிதமாக அமைந்து, அதன் உதவியாக பறவைகளை வளைப்படுத்தும்படியும் உள்ளன. பறக்கும் நிறைந்த பறவைகளிலும், நெல்பிராரினின் (Hesperornis) போன்ற பறவைகளிலும் மார்பெலும்பு தட்டுபோன்று அமைந்திருப்பதுடன், அதன் நடுவில் ஒரு பெரிய புடைப்புப் பகுதி உள்ளது. இறக்கைகளை நீத்துவதற்கு பயன்படுத்தும் இக்கியாரினில், பென்சுலியன் போன்ற பறவைகள் உட்பட மற்ற பெரும்பான்மையான

பறவைகளின் மார்பெலும்பு மையமாக அமைந்த அடித்தட்டைக் கவத்துடன் கேரீனேட் வகையாக உள்ளது. இந்த அடித்தட்டைக் கலம் மற்ற எலும்புகளுக்கு முன்கோண வடிவடைய ஒரு விட்டம் போன்று அமைந்து அவைகளை பவப்படுத்துகின்றது. மற்றும் பறக்க உதவும் பெரிய மார்புத்தசைகள் அடித்தட்டைக் கவத்துடன்தான் இணைந்துள்ளன.

அடித்தட்டைக் கவத்தின் அளவைப் பொருத்தே பறவைகளின் பறக்கும் திறனை நாம் அளவிடும்படியாகும். அதிவிரைவாகப் பறக்கும் ஸ்வீப் பறவைகள் (Swift) நுய்யில் பறவைகள் (Humming bird) முதலியவற்றில் வியக்கத்தகு முறையில் அடித்தட்டைக்கலம் அளவில் பெரியதாகவுள்ளன. ஆனால் பறக்கும் திறனற்ற நீலுஜிவாந்து மிலியான ஸ்டைரைக்காப்ஸ் (Strigops) போன்ற சில கேரீனேட் பறவைகளில் அடித்தட்டைக்கலம் ஒடுக்கப்பட்டுக்காணப்படுகின்றது.

மார்பெலும்பின் பின்பகுதி பறவைகளில் ஒரேமாதிரியாகவியல்லை. சில பறவைகளில் மார்பெலும்பின் வாக் நுனி நீண்டு, ஒரு மைய சிப்பியாய்வு நீட்சியாக (Xiphoid) உருப்பெற்றுள்ளது. மற்றும் சிலவற்றில் மார்பெலும்பின் வாக் நுனிப்பகுதியில் இரண்டு சிப்பியாய்வு நீட்சிகளாக உருப்பெற்று, அவ்விரண்டிற்குமீடையில் ஒரு ஆழமான வடு தெரிகின்றது. கோழி போன்ற பறவைகளில் மார்பெலும்பின் வாக் நுனிப்பகுதியில் இருபுறமும் இரு சிப்பியாய்வு பக்க நீட்சிகளும், ஆழமான இருவடுக்களும் உள்ளன. இந்த வடுக்கள் சில சமயங்களில் துவாரங்களாகவும் காணப்படும்.

இறக்கைகள்

பறவைகளின் இறக்கைகளுக்கு மேல்கரம், கரம் முதலியவற்றின் எலும்புகளை ஆதாரமாக உள்ளன. ஆனால் மெரோசார், வெளவாக் போன்ற பிராணிகளுக்கு முன்னங்கால்களின் கைகளின் மூலிகள் மட்டுமே இறக்கைகளுக்கு ஆதாரம் அளிக்கின்றன. ஹெம்பிராஸின் பறக்கும் திறனற்ற ரேட்டைட்டே பறவைகள் முதலியவற்றைத்தவிர மற்ற பறவைகளில் முன்னங்கால்களின் மேல்கரத்தில் ஹியுமரஸ் (Humerus) என்ற ஒரு தடித்த எலும்புள்ளது. அதன் அண்மை நுனிப்பகுதி தட்டையாகவும் நன்றாகத் தெரியக்கூடிய இரு புடைப்புக்களுடனும் உள்ளது. அப்புடைப்புகள் முதுகுப்புறமாக அமைந்துள்ள ஒன்றிற்கு ரேடியஸ் அல்லது டெல்டாய்டு (Radius or deltoid crest) புடைப்பு என்றும் வயிற்றுப்புறமாக அமைந்துள்ள மற்றொன்றிற்கு அல்டர்புடைப்பு (Ulnar crest).

என்றும் பெயர். பறக்க உதவும் மார்புத்தசைகள் ரேடியல் புடைப்புடனேயே இணக்கப்பட்டுள்ளது.

பறவைகள் பறக்கும் திறனை பொருத்தே அவைகளின் கரங்களின் பாகங்களின் தீளமும் உள்ளது. அறி சக்தியுடன் பறக்கும் பறவைகளான ஸ்வீப் (Swift) நெடுஞ்சை இசை எழுப்பும் பறவைகள் (Humming birds) முதலியவற்றில் முன்கரமும் கையும், மேல்கரத்தை விட நீளமாக உள்ளன. ஆனால் ஆல்பட்ராஸ் (Albatross) பறவைகளில் மேல்கரம், முன்கரம், கை முதலியவற்றை விட நீளமாக உள்ளது.

முன்கரத்தின் இரு எலும்புகளிலும் அக்னா (Ulna) எலும்பு மிகவும் பருத்து காணப்படுகின்றது. அக்னா எலும்பின் வெளிப்புறத்திலுள்ள வரிசைக் குமிழ்களில் (Knob) இரண்டாம் படி இறகுகளின் குவியல் பகுதிகள் இணைந்துள்ளன.


சீமாய்டு எலும்புகள் முன்கரத்தின் முட்டிக்கூறுகள் உள்ளன. மற்றும் சில பறவைகளில் சீமாய்டு எலும்புகள் அக்னாவுடன் இணைந்து ஆவிக்கிரேனஸ் நீட்சிகளாக மாறியுள்ளன என்று கருதப்படுகின்றது.

முதிர்ச்சியுற்ற பறவைகளில் இரண்டு கார்ப்பல் (Carpal) எலும்புகளேயுள்ளன. அவைகளில் ஒன்று ரேடியல் எலும்பினுக்குடியிலும் மற்றொன்று அக்னா எலும்பினுக்குடியிலும் உள்ளன. மான்ட்டேக்னா (Montagna) என்னும் அறிஞரின் கருத்துப்படி ரேடியல் எலும்பிற்கு ஸ்கேப்போலூசு எலும்பு (Scapholunar) என்ற மறு பெயர் உண்டென்றும் அக்னாவிலும் ரேடியலும், இன்டர்பீடியல், செக்டரேலிய எலும்பினுள் ஒன்று ஆகியவற்றின் இணைப்போரகம் என்றும் கருதுகின்றார். இது போன்ற கார்ப்பல் எலும்புகள் பறக்கும் திறனற்ற பறவைகளில் ஒருங்கியிருக்கும் அல்லது முழுமையாக மறைந்து விடுகின்றன.

கார்ப்பல் எலும்பிற்குப் பக்கத்தில் கார்ப்போமெட்டாகார்ப்பல் என்ற கூட்டு எலும்புள்ளது. இது சேய்மை கார்ப்பல் எலும்பு களானும் மூன்று மெட்டாகார்ப்பல் எலும்புகளானும் ஆனது. மெட்டாகார்ப்பல் எலும்பின் இரண்டாவது பகுதி சிறியதாகவும் மூன்றாவது மெட்டாகார்ப்பல் எலும்பின் அடியில் இணைந்தும் காணப்படுகின்றது. மூன்றாவது தாண்டாவது மெட்டாகார்ப்பல் எலும்புகளும் இரு துளியிலும் இணைந்தே காணப்படுகின்றன. சில பறவைகளில் முழு நீளத்திலும் இரண்டும் இணைந்து காணப்படுகின்றன. மூன்றாவது மெட்டாகார்ப்பல் எலும்பு தடித்தும் நேராகவும் உள்ளது. ஆனால்

நான்காவது மெட்டாக் கார்ப்பல் எனும்பு ஒடுக்கியும் வளைந்தும் காணப்படுகின்றது.

இரண்டாவது நான்காவது மெட்டாக் கார்ப்பல் எனும்பு கழுக்கு ஒன்று அல்லது இரண்டு விரல்கள் உள்ளன. ஆனால் மூன்றாவது மெட்டாக் கார்ப்பல் எனும்பினிற்கு இரண்டு அல்லது



படம் 14. குறிப்பிட்ட சில பறவைகளின் மூல்கள் (Fore arm) எலும்புகள்

(அ) ரேவன் பறவையின் மூல்கள்

(ஆ) கோழியின் வலது பக்க திறகு அல்லது மூல்கள் எனும்புகள்

(இ) பெய்குவின் பறவையின் வலது திறகு அல்லது மூல்கள் எனும்பு

1. மூல்களின் அல்லது மெட்டாக், 2. மூல்களின் தண்டம், தண்ட நான்காவது, 3. அல்லது ஆல்க்கிரேன் நீட்டி, 4. ரேடியல், 5. நீட்டி இறகு புடைப்பு பகுதிகள், 6. கெலிக்ரேன் குழி, 7. அகில, 8. கெலிக்ரேன் புடைப்பு, 9. II மெட்டாக் கார்ப்பல் இரண்டாவது விரல், 9 III மெட்டாக் கார்ப்பல் மூன்றாவது விரல், 10. விரல்கள், 11. டைப்சோ அல்கேன், 12. சோமர்டு எனும்புகள்.

மூன்று விரல்கள் உள்ளன. அந்த இரண்டு மூன்று விரல்களில் முதல் விரல் அகன்றும் தட்டையாகவும் உள்ளது. முதல் விரலிற்கு போலெக்ஸ் (Pollex) என்று பெயர். ஏடெரிக்ஸ், கசெனரிக்ஸ் (Apteryx, Cassowaries) போன்ற பறவைகளில் மற்றப் பறவைகளைக் காட்டிலும் விரல்கள் ஒடுக்கப்பட்டு ஒரே ஒரு விரல் அதாவது மூன்றாவது விரலின் ஒடுக்கிய பகுதி மட்டுமே உள்ளது. சில சமயங்களில் அதுவும் மறைந்து விடுகின்றது.

தற்போதுள்ள பறவைகளின் கை விரல்களில் கூடுதல் நகங்கள் கிடையாது. பறக்கும் திறனற்ற ரேட்டைட்டே பறவைகளிலும், கழுக்கு, வான்கோழி போன்ற கேரினேட் பறவைகளிலும் ஒன்று அல்லது அதற்கு மேலான விரல்களில் நகங்கள் உள்ளன. தோட்டின்

(Hoatzin) என்ற பறவைகளில் கூடுகட்டி, குஞ்சுப் போரிக்கும் காலங்களில் மட்டும் முதல் இரண்டு விரல்களில் நகங்கள் உள்ளன. கூடு கட்டும்பொழுது அதற்கு வேண்டிய பொருள்களைச் சேகரித்து வந்து அவைகளை உபயோகப்படுத்துதற்கு அந்தநகங்கள் பயன்படுகின்றன. இவ்வாறு கூடு கட்டி குஞ்சு போரிக்கும் பருவமெல்லாம் முடிவடைந்த பின்பு இப்பறவைகளுக்கு அந்தநகங்கள் கிழந்து விடுகின்றன.

ஜாக்ரா (Jacana) ஸ்கிரிமெர் (Screamers) பறவைகளில் ஆண் பெண் இரு பறவைகளிலும் சேலங்களின் கால்களில் உள்ளதுபோன்ற குதிமூள் (Spur) இதக்கைகளில் உள்ளன. இக்குதிமூள் பகுதிக்கு எலும்பாலான கெட்டியான பகுதிவுள்ளது. இக்குதிமூள் பகுதிக்கு காசிப்பல் அல்லது மெட்டாக் காசிப்பல் எலும்பிலிருந்து தோன்றுகின்றன. மற்ற நகங்கள் கிரீசுகளிலிருந்து தோன்றுகின்றன. இரண்டாவது விரல் மற்ற இரண்டு விரல்களையும் விட, மூன்றுமடங்க அமைந்துள்ளது அதற்கு மற்ற விரல்களினின்றும் பிரித்து தனித்து அசையும் தன்மையுள்ளது. ஒரு சில இரகுகள் அதனுடன் ஒட்டிக் கொண்டிருப்பதால் அதற்கு பாண்ட்டீடு இதக்கை (Bastard wing) என்று பெயர்.



பறவைகளில் மூன்னங்கால்கள் அமைந்திருக்கும் முறை மற்ற நாற்காலி பிராணிகளினின்றும் மாறுபட்டுள்ளது. இதக்கையை பறவைவாழ்வு மடக்கி வைத்திருக்கும் பொழுது அதன் வலிற்றுப் புறப்பகுதி வெளிப்புறம் தெரியும்படி அமைந்துள்ளது. மூன்னங்கால்களின் மேல்கரம் (Humerus) தோள்பட்டை எலும்புடன் எல்லா நிலைகளிலும் நன்றாக கழனும்படி அமைப்பெற்றுள்ளது மிகவும் பொருத்தமானதானதொன்றாகும். மூன்னங்காலின் மேல்கர எலும்பிற்கும், ரேடியஸ் அல்லா எலும்புக்கும் இடையில் அமைந்துள்ள தாழ்ப்பாள் போன்ற இணைப்பினால் பறவைவாழ்வு ஒரு புறம் மட்டுமே தன் சுரத்தை அசைக்கும்படியுள்ளது. அவ்வாறு ஒரு புறம் மட்டுமே அசையும் படியான மூன்கரம் இதக்கைகளின் அமைப்பிற்கு இணையாக அமைந்துள்ளது. அவ்வாறு அமைந்துள்ளதால் ரேடியஸ் எலும்பிலிருந்து அல்லா எலும்புடன் சேர்ந்து அவ்வளவாக அசையும் தன்மையிழை.

இடுப்பு வளையமும் பின்னங்கால்களும் (The pelvic girdle and the Hind limb)

சாதாரணமாகப் பார்க்கும் பொழுது பறவைகளின் இடுப்பு வளையம் மற்ற முதுகெலும்புள்ள பிராணிகளின் இடுப்பு வளையத்தை ஒத்திவ்வளவாக இருப்பதுடன் ஆர்னிதீசியன் டைனோசார் (Ornithischian Dinosaur) களின் இடுப்பு வளையத்தை ஒத்திருக்க

கின்றது. முதிர்ச்சியுற்ற பறவைகளில் இடுப்பு வளைபகுதியின் மூன்று எலும்புகளும் ஒன்றாக இணைந்து காணப்படுவதுடன், இவ்வியம் செச்சேக்ரத்துடன் இரண்டாகக் கலந்து காணப்படுகின்றது. இவ்வேலும்புகளுக்கிடையிலுள்ள பிணைப்புப் பகுதிகளே தெரியாமல் எவ்வாறு எலும்புகளும் இணைந்து விடுவதோடல்லாமல், இடுப்பு வளைபகுதி செச்சேக்ரம் பகுதியிலுள்ள முள்ளெலும்புகளுடன் நன்றாக இணைக்கப்பட்டு, ஒரு நீண்ட கெட்டியானப் பகுதியாக மாற்றப்படுகின்றது. பறவை நிலத்தில் நடந்து செல்லும்பொழுது உடலின் முழு கனத்தையும் மேலே குறிப்பிட்ட நீண்ட கெட்டியானப் பகுதி தாங்கிக் கொள்கின்றது.

இடுப்பு வளைபகுதியின் இவ்வியம் எலும்பு மிகவும் நீளமாக உள்ளது. அது பின்பக்கமாக உள்ள விவாவெலும்புகள் வரை நீண்டுள்ளது. இருபுறத்து இவ்வியம் எலும்புகளும் முதுகுப்புற பகுதியை நோக்கி நீண்டு செல்வது பறவைக்குப் பறவை வேறுபடுகின்றது. இவ்வியத்தின் பின் பகுதிக்குப் பின்னால் இலக்கியம் எலும்பு (Ischium) உள்ளது. இதற்குப் பின்னாலுள்ள பூப்பிச் எலும்பு (Pubis) பின்பக்கமாக



படம் 15. சில பறவைகளின் செச்சேக்ரம் எலும்பு இடுப்பு வளைபகுதி

(அ) கோழியின் செச்சேக்ரம்-இடுப்பு வளைபகுதி-கத்தோற்றம்

(ஆ) கோழியின் செச்சேக்ரம்-இடுப்பு வளைபகுதி-வெளித் தோற்றம்

1. இடுப்பு வளைபகுதி, 2. பெக்டிலேவிக் நீட்சி, 3 & 8. முள்ளெலும்புகளின் முதுகுப்புறக் கோல் பகுதிகள், 4. இலக்கியத்தின் குழியு, 5. இலக்கியம், 6. பூப்பிச், 7. கடைசி விவாவெலும்பு, 8. முள்ளெலும்பின் வயிற்றுப்புறக் கோல்பகுதி, 10. பைனோண்டல், 11. செச்சேக்ரம், 12. அபிடாபூஷம்.

A - B → மார்பு-வயிற்றுப் பகுதி


B - C → வயிற்றுப் பகுதி

C - D → வால் பகுதி

D - E → நனித்த வால் முள்ளெலும்புப் பகுதி

நின்றன. பூயில்லின் முன் துளிப்பகுதி இங்கியத்தடன் இணைந்து காணப்படுகின்றது. வயிற்றுப்புறப் பகுதியில் இங்கியமோ இங்கியமோ இணைந்து சந்திப்பதில்லை.

இருப்பு வலையத்தில் அரிட்டாபுலம் என்னும் குழி முழுமைவாக காணப்படுவதுடன் ஃபீமர் (Femur) எலும்பின் தலைப்பகுதி அதிம தன்மையுடைய பொருத்தம்படி அமைந்துள்ளது. அரிட்டாபுலத்திற்குப் பின்னும் தன்மையுடைய இங்கியாட்டிக் துளையும் (Ischiatic foramen) இங்கியத்திற்கும் இங்கியத்திற்கும் நடுவில் உள்ளது. சில பறவையில் அத்துவாரம் பின்புக்கமாகவுள்ளது.



படம் 10 (இ) சில அமெரிக்கா குப் பறவையின் இருப்பெலும்புகள்

1 & 10, இங்கியம், 2, இங்கியத்தின் தலை, 3, பூயில், 4, இங்கியம், 5, முன் டிரோக்கிளேட்டர், 6, அங்கு, டிரோட்டர் தலை, 7, அரிட்டாபுலம், 8, பெக்டிகலிங் நீட்சி, 9, கடைசி விகாசெலும்பு.

ஃபீமர் எலும்பு பருத்தும் குட்டையாகவும் காணப்படும். இவ்வெலும்பு முன்புறமாக நீண்டிருப்பதால், கால்கள் உடலின் முன் புறமாக அமைவப்பெற்றுள்ளது. இதன் மேல்புற துலியில் ட்ரோகேன்ட்டர் (Trochanter) எலும்பு அமைந்து அதனுள் க்ரூட்டியல் (Gluteal) தசைகள் பொருத்தப்பட்டுள்ளன. முட்டிக்கால் இணைப்பில் மயிலோடாச்சல் கீபிபுலா (Tibiotarsus & Fibula)-ஆகிய இருஎலும்புகளும் ஃபீமர் எலும்புடன் அசையுமாடி பொருத்தப்பட்டுள்ளன. சாதாரணமாக எவ்வாப் பறவைகளிலும் கீபிபுலா எலும்பு சற்று ஒடுங்கியே காணப்படும்.

டிபிரோடாச்சலின் மேல்துலியில் சீமியல் கீட்டி (Cnemial) என்ற தன்மையுடைய தெரியுமாடியான நீட்சி உள்ளது.

மேட்டெய்வா சீமாவிலு் என்ற பகுதி எவ்வாப் பறவைகளிலும் உண்டு. இது தன்னிடில் வலிக்கும் பறவைகளில் மிகவும் பெரியதாக விருக்கும் இப்பகுதி ஃபீமரோ டிபிரோட் பகுதியுடன் கூடியதாகவும்.

டிபியாவின் நீமியில் நீட்சியுடன் அசையும்படி பொருத்தியும் உள்ளது. பெட்டகமான எலும்பில் பள்ளக்கோடுகள் உண்டு. மற்றும் ஆம்பி வால் தசையின் தசைநார் இப்பாகத்தை ஐனைத்துச் செல்கின்றது. இத்தசையின் தசைநார் தொடைப் பகுதியின் உள்பகுதியிலுள்ள நுழைந்து முட்டிக்கால் இணைப்பிலேத் தாண்டி விரல்களிலுள்ள தசை களைச் சென்று அடைந்து பிணைக்கப்பட்டுள்ளது. அவ்வாறு பிணைக்கப்பட்டிருப்பதனாலேயேதான் பறவைகள் மரங்களில் முட்டிக் காலை மடக்கி குத்தியிருக்க (Perching) ஏதுவாகவுள்ளது. பறவை களின் பாதம் இடுப்பு வலையத்தைப் போன்று மெட்டுசார்சுக்களை ஒத்திருப்பதுடன் மிகவும் முக்கியத்துவம் வாய்ந்ததொன்றாக உள்ளது. அண்மை டார்சல் எலும்புகள், டிபியா எலும்பின் கடைசி நுலியுடன் இணைந்து டிரிபேஸ் டார்சஸ் (Tibiotarsus) எலும்பாக உறுப்பெற்றுள்ளது. சேவ்வைடார்சல் எலும்புகள் மெட்டாடார்சல் (Metatarsal) எலும்புகளுடன் இணைந்து டார்சோ மெட்டாடார்சல் எலும்பாக உருப்பெற்றுள்ளது. முறிச்சிவுற்றப் பறவைகளில் டார்சோ மெட்டாடார்சல் எலும்பு, டார்சல் எலும்புடன் இணைந்த பகுதியெல்லாம், இதனுடன் மூன்று இணைந்த மெட்டாடார்சல் எலும்புகள் காணப்படுகின்றன. அதாவது அவைகள் இரண்டாவது, மூன்றாவது, நான்காவது விரல்களாகும். அதேசமரக பல பறவை களில் இந்த இடத்தில் இரண்டு குழாய்ப்பகுதிகள் மூன்விருத்து பின்புறக்கிச் செல்வதைக் காணலாம். அந்தக் குழாய்ப்பகுதி அம்மது வலிப்பினைத்திலுள்ள தசைநார்கள் செல்லுகின்றன.

பறவைகளின் பாதங்கள் அதாவது விரல்களின் எண்ணிக்கை அமைப்பு முதலியவற்றைக் கொண்டு அவைகளை வகைபடுத்தலாம். அவைகளின் வகிக்கும் இடம் இரவுவுள்ளதும் முறை முதலியனவற் றைக் குறித்து அவைகளின் பாதங்கள் தகவமைப்புகளைக் கொண் டுள்ளன.

அதேசமரக எல்லாப் பறவைகளுக்கும் முதல் இரண்டாவது, மூன்றாவது, நான்காவது ஆகிய நான்கு விரல்களும் உள்ளன. இரண் டாவது மூன்றாவது நான்காவது ஆகிய மூன்றும் டார்சோ மெட்டா டார்சல் எலும்பின் டிரோக்கிலியா (Trochilea)வுடன் அசையும்படி பொருத்தியுள்ளன. மூன்றாவது விரல் டார்சுவைக்கு நீளமாகியிருத் தாலும், அவைகள் முறையே, மூன்று, நான்கு, ஐந்து விரல் பாகம் களையே கொண்டுள்ளன. முதல் விரலான ஹேலெக்ஸ் குட்டை யாகவும் பின்புறமாக நீண்டும் காணப்படுகின்றது. மரங்களில் குத்தி யிருத்ததுக்கேற்ப பறவைகளில் முதல் விரல் நன்றாக அமைந்துள்ளது. அதில் இரு விரல் எலும்புகளே (Phalanges) உள்ளன. மரங்களில் குத்தும் பழக்கமுள்ள பறவைகளில் ஹேலெக்ஸ் டார்சோ மெட்டா டார்சல்களில் முக்கியப் பகுதியுடனேயே மற்ற மூன்று விரல்களைப்

போன்று இணைந்து காணப்படுகின்றது. குத்தும் பழக்கமற்ற அன்னம் போன்ற பறவைகளில் ஹெலெக்ஸ் மிகவும் ஒருக்கப்பட்டும், நகல்களற்றும் காணப்படுகின்றன.

மற்றும் பல்வேறு விதமான தகவணம்புடைய பறவைகளிலும் காணலாம். கிளி, மரங்கொத்தி போன்ற பறவைகளில் முதல் விரலும் நான்காவது விரலும் பின்புறமாக நீண்டுள்ளன. அவ்வாறு அவை இரண்டும் பின்புறமாக நீண்டுள்ளபடியால், இரண்டாவது, மூன்றாவது விரல்களுக்கு நேர் எதிராக அமைவும்படியான வாய்ப்பைப் பெற்றுள்ளன. இவ்வாறான அமைப்பிற்கு ஐரோடெக்டிலி (இணைவிரல் அமைப்பு) (Zygodactyl) என்று பெயர். இவ்வாறான அமைப்பைக் கொண்டுள்ள பறவைகள் நன்றாக கரம் ஏறும் திறன் பெற்றிருக்கும். இன்னும் சில பறவைகளில் கால்களின் நான்கு விரல்களுமே மூன்புறமாக நீண்டிருக்கும். இத்தகைய அமைப்பை பெனிக்கல், ஸ்வீப்பட் (Swifly) போன்ற பறவைகளில் காணலாம். இப்பறவைகளில் பின்னங்காலின் நான்கு விரல்களும் மூன்புறமாக நீண்டு தொவிழைத்துடன் பிணைக்கப்பட்டுள்ளன.

பறக்கும் சக்தியற்ற ரேட்டைட்டே (Ratite) பறவைகளில் முதல் விரலான ஹெலெக்ஸ் கிடையாது. மற்ற மூன்று விரல்கள் மட்டுமே காணப்படுகின்றன. திக்கோழிக்கு இரு விரல்கள் மட்டுமே உள்ளன.

பறவைகளின் மண்டையோடு

பறவைகளின் மண்டையோடு ஊர்வனவற்றின் மண்டை யோட்டினை ஒத்திருக்கின்றது. அதாவது ஊர்வனவற்றின் மண்டை யோட்டினைப் போன்று பறவையிலும் ஒரே ஒரு பீட்டி மூன்று தாளுள்ளது. மற்றும் ஆர்பிட்டல் இடைத்திரையும் ஊர்வன வற்றை ஒத்துள்ளது. பறவைகளிலும் ஊர்வனவற்றைப் போலவே குவாடரேட் எனும்படி, நீழ்த்தாண்டவுடன் அசையும்படி பொருத்தப் பட்டுள்ளது. பறவைகளின் மூளைப்பகுதியும் கண்களும் ஊர்வன வற்றைவிட பெரியதாக அமைத்திருப்பதாக பறவைகளின் மண்டை யோடு ஊர்வனவற்றின் மண்டையோட்டினைவிட அளவில் பெரிய தாக உள்ளது.

மற்ற முதலெலும்புள்ள பிராணிகளில் உள்ளதுபோன்று பறவை களிலும் வளர்ச்சியின் பொழுது பறவையின் மண்டையோட்டிக் குருவிதமான எலும்புகள் தொன்றுகின்றன. மீசன்மைமீவிரந்து (Mesenchym) தொன்றும் எலும்பிற்கு படல எலும்பு (Membranous) என்று பெயர். கான்ட்ரோ கிரேலியம் (Chondrocranium) பகுதி

பறவைகளின் எலும்பு மண்டலம்

மூதனில் குறுத்தெலும்பினால் ஆக்கப்பட்டு பின்பு முதிர்ச்சியடைந்த பறவைகளில் எலும்பாக மாறுகின்றது. முதிர்ச்சியுற்ற பறவைகளில் படல எலும்பும் குருத்தெலும்பு எலும்பும் இணைந்து ஒன்றி வின்று ஒன்று பிரிக்க முடியாதபடி ஆகிவிடுகின்றன. ஊர்வன வற்றின் மண்டையோட்டைவிட பறவைகளின் மண்டையோட்டில் நேசம் பகுதி தவிர மற்ற பகுதிகளில் குருத்தெலும்பு மெடையாது.

மண்டையோட்டின் கூரைப்பகுதியும் கண் குழியும் (The skull roof and Orbit)

மண்டையோட்டின் கூரை, பெரைட்டல் எலும்புகள் பெரிய கிராண்ட்டல் எலும்புகள் ஆகியவற்றால் ஆனது. கிராண்ட்டல் எலும்புகள் கண்குழிப்பகுதியை மூடும்படியும், நேசம், எலும்பின் பிற்பகுதிக்கு நீண்டும் காணப்படுகின்றன. நேசம் எலும்புகளும் கிராண்ட்டல் எலும்புகளும் மற்றும் அதன் அருகிலுள்ள எலும்புகளுமாகச் சேர்ந்து, கெசெனில் பறவைகள் பூசெரோட்டிடே குடும்பத்தைச் சேர்ந்த ஹார்னில் (Hornbill) பறவைகள் முதலியவற்றில் கொண்டை அல்லது கேஸ்க்யூ (Casques) என்ற உறுப்பாக மாறியுள்ளது. கண்குழிக்கு முன்னும் முன்கிராண்ட்டல் அல்லது லேக்ரிமல் (Lacrymal) என்ற எலும்பு உள்ளது. இவ்வெலும்பில் ரேட்டைட்டே பறவைகளில் லேக்ரிமல் குழாய்க்காக ஒரு துளை உள்ளது. கண்குழியின் பின் பகுதியில் ஸ்க்வாமோசல் (Squamosal) எலும்பு உள்ளது. அது ரெரெனியல் பகுதிக்கு பக்கவாட்டில் அமைந்துள்ளது. இரு கண்குழியிற்கும் மத்தியில் துளைகள் நிரம்பிய ஆர்பிட்டல் இடைத்திரை உள்ளது. முதிர்ச்சியுற்ற பறவைகளில் இதற்கு முன் ஸ்பீனும்பு அல்லது மீசெத்மாய்டு என்று பெயர். மூக்கு தரம்புகள் (Olfactory nerve) இந்த எலும்பின்மேல் ஓரத்திலுள்ள ஊலிப்பள்ளங்களானமேயே ஓடுகின்றன.


கண் துளையார் மேற்கூறிய நிரையின் பின்பகுதி ஓரத்தில் உள்ளது. அதனுள் பின்புறமும் மேற்புறம் ஒன்று அல்லது பல துளைகள் உள்ளன. அத்துளைகளில் வழியாக மூளை நரம்பில் ஐத்தாவது நரம்பான டிரெஜெமினல் (Trigeminal) நரம்பின் ஆப்ததாஸ்டிக் கிளியும் ஆப்துலோமோட்டார், டிரோக்லினியார் அப்டுலுசென்ஸ் முதலிய மூளை நரம்புகளும் கண்ணின் முகிய தசையான எக்ஸ்ட்ரின்சிக் (Extrinsic) தசைகளுக்கு செல்கின்றன. இவ் பறவைகளில் கண் துளையாரத்திற்கு மேலே ஆர்பிட்டோஇ ஸ்பீனும்பு என்ற ஒரு நிறுபகுதி உள்ளது. அதற்குப் பின்னால் ஸ்க்வாமோசல் எலும்புடன் அசையும்படி பொருத்தி பக்கஸ்பீனும்பு அல்லது பூசுரோஸ்பீனும்பு (Pterosphene) என்ற எலும்பு உள்ளது. இதையே ஆஸ்பீனும்பு

என்று முதலில் கூறினார்கள். ஆர்பிட்டோஸ்பீனய்ஸ் பக்க ஸ்பீனய்ஸ் முதலியவைகள் நன்றாகக் கெட்டியப்படுத்தப்பட்டு காண்ட்ரோ கிரேவிபத்தின் ஆர்பிட்டல் குறுத்தெனும்படி மண்டலமாக மாறி யுள்ளது.

இது கண்களைவுடைய சினி பறவைகளில் ஆர்பிட்டல் இடைத் திரை மிடையாகு.

டெம்ப்பொரல் குழிவுகள் (Temporal fossal)

தற்போது வசிக்கும் அநேக பறவைகளில் டெம்ப்பொரல் குழிவு கண்குழிவினிலும் கிராண்ட்டல் எலும்பின் பெரிய பின்னூக்கிட்டல் கீட்சியாகல் (Post orbital process) பிரிக்கப்பட்டுள்ளது. அன்னம் போன்ற பறவைகளில் இத்தீட்சியானது மூன்றுபுறமாக வேக்கிமல்




அ

படம் 16. (அ) நன்றாக வளர்ச்சியுற்ற (கமார் 2-3 நாட்கள்) கோழிக் குஞ்சின் மண்டலபோரல்

வரை நீண்டுள்ளது. சினி போன்ற அதன் குறும்பத்தைச் செர்ந்த பறவைகளில் மேற்கூறிய இரண்டு எலும்புகளும் இணைந்து கண் குழிவு பகுதி எனும்புகளால் சுழப்பட்டுக் காணப்படுகின்றன. பின் ஆர்பிட்டல் எலும்பும் பின் கிராண்ட்டல் எலும்பும் மறைந்தும், ஜூகல் எலும்புப் பகுதி ஒடுங்கியும் காணப்படும் நிலை தற்போதுள்ள பறவைகளில் காணலாம். மற்றும் தற்போதுள்ள பறவைகளுக்கு, மேல் கீழ் துளைகள் இணைந்து காணப்படும். நிலையான கணர்வனப் பிராணிகளில் உள்ளது போன்று ஒரே ஒரு பெரிய டெம்ப்பொரல்

குழியுதர உள்ளது. இது கண்குழியுடன் தொடர்பு கொள்ளுமாறு அமைந்துள்ளது.



26

படம் 16. (அ) கோழிக் குஞ்சின் மண்டையோடு—
மைய நீள் வெட்டுத் தொற்றம்

1. மூன் மேக்கிம்மன், 2. நேசம், 3. மூன் கிராண்ட்டம், 4. மீசத்தாம்பு, 5 & 7. கிராண்ட்டம், 6. கீசீரன் எலும்புகள், 8: பெண்ட்டம், 9 & 37. காற்றுப்பை, 10. குரூசு ஆக்ஸிபீட்டம், 11. ப்ரோஓட்டிக், 12. எக்ஸ் ஆக்ஸிபீட்டம், 13. ஆர்பீக்டோ ஓட்டிக், 14. கிரேட்டிக், 15. உருண்டைத் துவாரம், 16. கீழ் கிரேட்டிக், 17. எர்பீ கிராண்ட்டிக், 18. டூண்டெலியன் குறாப், 19. டெரிசாப், 20. ஆர்ட்டிக்லவார், 21. ஆர்ட்டிக்லவார், 22. எர் ஆர்ட்டிக்லவார், 23. செரட்டோ கிராண்ட்டிக், 24. காப்புலா, 25. டெண்ட்டிக், 26. பெராக்லவார், 27 & 44. மேக்கிம்மன், 28. மோமர், 29. பெண்ட்டன், 30. ஜுருவார், 31. பெராக்லவார், 32. க்லாடரேட்டோ ஜு-கம், 33. பெராக்லவார், 34. ஐந்தாவது மூன் நரம்புத் துவாரம், 35. க்லாடரேட்டிக், 36. க்லாடரேட்டிக், 37. எர்பீக்டோ க்லாடரேட்டிக் துவாரம், 38. பெரி ஆக்ஸிபீட்டம், 40. 9, 10, 11 ஆவது மூன் நரம்பு களின் துவாரம், 41: 8 ஆவது மூன் நரம்புத் துவாரம், 42. மூன் ஆர்ட்டிக்லவார், 43. க்லாடரேட்டிக், 45. எர்பீ ஓட்டிக், 46. கிரேட்டிக் (எர்பீக்டிக் குழி), 47. 5 ஆவது மூன் நரம்பின் மீன்களுக்கு கான குழி துவாரம்.

மீன்களிலும், கோழிபோன்ற மற்ற அதனை ஒத்த பறவைகளிலும் க்லாடரேட்டிக் எலும்பிற்கு நன்றாக வளர்ச்சியுற்ற ஐகோமேட்டிக் நீட்டி (Zygomatic) உள்ளது. இத்தீட்சிவானது கிராண்ட்டம்

எனும்பின் பின்புறப்பகுதி நீட்டியதைத் தொடும்படி நீண்டு, உயர்த்தப்படும்பொருள் குழியின் மூலம்படி அமைந்துள்ளது. இதுபோன்ற அமைப்புகள் நிலை ஆரக்கியாப்டெரிசில் பறவை, டயாபிடீட்டர் வளப் பிராணிகளில் உள்ள நிலைக்கு முற்றிலும் மாறுபட்ட ஒரு நிலை என்பது தெளிவாகும். இவ்வாறு மாறுபட்டுள்ள நிலை தற்போதுள்ள பறவைகளுக்கு அவைகளின் தாடைத் தசைகளின் அமைப்பைப் பொருத்து இரண்டாம்படி தகவமைப்புகள் என்று கருதப்படுகின்றன.

மேல் தாடையும் மூக்குப் பகுதியும் (The upper Jaw & Nose)

இளைந்த முள் மேக்ளிக்ஸா எலும்புகள் மேல்தாடை அல்லது மேல் அவரின் எலும்பாகும். உயிரோடு வசிக்கும் பொழுது ரேம்போத்தீசை (Rhamphotheca) என்று கொம்பு போன்ற கெட்டியான பகுதியால் அங்கு கழம்பட்டுள்ளது. பறவைகளில் அவ்வு அமைகள் இரை உண்ணும் நிலைக்கேற்ப பல்வேறு மாறுபட்டு தகவமைப்புக்குடன் பல்வேறு உருப்பெற்றுள்ளது. ஊர்வனவற்றில் உள்ளது போன்றே பறவைகளின் மேல் அங்குப்பகுதியில் நீண்ட ஏறும் நீட்டிகள் தேசம் எலும்புகளுக்கிடையே சென்று, கீப்பிரண்ட்டல் எலும்புகளை அடையும் வண்ணம் அமைந்துள்ளது.

பறவைகளில் வெளிநாதித்துவாரம் முள் மேக்ளிக்ஸா, தேசம் எலும்புகள், சில சமயங்களில் மேக்ளிக்ஸா எலும்புகள் முதலியவற்றால் கழம்பட்டுள்ளன.

நாசித்துவாரங்கள் குறிப்பிட்டுச் சொல்வதற்கு முறையில் பறவைகளில் மிகவும் பின்னால் தள்ளப்பட்டு அவைகளின் அடிமிக் காணப்படுகின்றன. புளாதுண்ணிப் பறவைகள், தன்னளிக் முழ்கி வசிக்கும் பறவைகள், ஹார்ன் பிப் பறவைகள் போன்ற சில பறவைகளில் ஒரு சிறு எலும்பான லாடிபோன்ற பகுதி நாசித்துவாரங்களின் மூடியுள்ளன. மேலே குறிப்பிட்டப்பிராணிகள் வாயினாலேயே கவாசிக்கின்றன.

தேசம் பெட்டசுமும், தேசம் நிரையின் முள் பகுதியும் அவைகள் கெட்டியாக்கப்பட்டுள்ள நிலைக்கேற்ப மாறுபட்டு காணப்படுகின்றன. கோழி போன்ற பறவைகளில் அவைகள் குருத்தெலும்புகளாகவே வாழ்தான் முடியுமாம் காணப்படுகின்றன. புளாதுண்ணிப் பறவைகளில் குருசு பொரித்து சில நாட்களுக்குள்ளாகவே இப்பகுதி எலும்பாக்கப்படுகின்றது.

அண்ண எலும்பு (Palate)

பொதுவாகப் பார்த்தோமானால் அண்ண எலும்பு பாதுகாட்டி கலிம் நேசம் பகுதிக்கும் வாய்க்கும் மத்தியில் ஒரு அறை போன்ற (Shelf) காணப்படும் திசை பறவைகளில் இடையாது. பறவைகளில் இருபக்க அண்ண எலும்புகளுக்கிடையில் மையத்தில் ஒரு பிளவு உள் நுகித் துவாரங்களுக்கு இடையில் காணப்படுகின்றன. அண்ணம் போன்ற டென்மோநேத்தல் வகை அண்ண எலும்புள்ள பறவைகளில் அண்ண எலும்பு முழுமையாகக் காணப்படுகின்றது. வெளி நுகித்துவாரங்கள் குறிப்பிடத்தக்க முறையில் மெல்லிய தீண்ட அலகுகளின் துளிபிற் அமைப்பெற்றுள்ள எட்டெலிக்ஸ் (Apteryx) பறவைகளில் அண்ண எலும்பு மிகவும் நன்றாக அமைந்துள்ளது. அண்ண எலும்பு இவ்வாறு நன்றாக அமைந்துள்ளதால் உள்நுகித் துவாரங்கள் குரல்வளைத் துவாரத்திற்கு (Glottis) அண்மையில் அமைப்புப்படி உள்ளது. அவ்வாறு அமைந்துள்ள திசையினும் இப்பறவைகளில் கவாசிக்கும் முறை நிறம்பாட செயல்படுகின்றது என்று மெக்டோவெல் (Mc Dowell) என்ற அறிஞர் 1948ஆம் ஆண்டு குறிப்பிட்டுள்ளார்.

மூன்றெக்கிவாக்களுக்கு மையத்தில் அலகுகளின் மூன்புறம் இணைந்த அண்ண எலும்பு நீட்டிகள் உள்ளன. மெக்கிவாக்களுக்கு அண்ண எலும்பு நீட்டிகள் அவ்வது மெக்கிவோ பேலட்டைன் எலும்புகள் உள்ளன, நன்றாக வளர்ச்சியுற்ற திசையில் இரண்டும் ஒன்றை ஒன்று சந்திக்கின்றன அவ்வது லோமர் எலும்புகளை சந்திக்கின்றன. பேலட்டைன்கள் பவலிதமான வடிவடையனவாகும். சாதாரணமாக அவைகள் மெல்லியதாகக் காணப்படும். அவ்வது விலிகளில் உள்ளதுபோன்ற அகன்றும் விரிந்தும் காணப்படுகின்றன. லோமர் எலும்புகள் பேலட்டைன் எலும்புகளுக்கிடையில் இணைந்து காணப்படுகின்றன. அவைகள் சில சமயங்களில் மிகவும் நிறையதாகக் காணப்படுகின்றன. சில சமயங்களில் மறைந்தும் விடுகின்றன. உள் நுகித்துவாரங்கள் மெக்கிவாளின் அண்ண (பேலட்டைன்) நீட்டிகளுக்குப் பின்னாலும், லோமர் அண்ண (பேலட்டைன்) எலும்புகளுக்கு மையத்திலும் அமைந்துள்ளன.

அண்ண எலும்பிற்குப் பின்னும் மையத்தில் கொஞ்சம் ஆழமாகக் காணப்படும் சட்டி வடிவடைய எலும்பிற்கு ராஸ்ட்ரம் அவ்வது மூர் (Rostrum) என்று பெயர். இது பெராஸ்கினிடு பகுதியைச் சேர்ந்தது. இது ஆர்பிட்டல் இடைத்திரையின் மேற்புறத்தில் இணைந்து காணப்படுகின்றது.

பேலிடெம்பப்பொரல் என்று அழைக்கப்படும் பகுதி, ராஸ்ட்ரம் பகுதி பின்புறமாக அகலமாக்கப்பட்டு அகன்ற தட்டுபோன்று

காணப்படும் பகுதியேயாகும். இது பேண்டனும்புக்கு வயிற்றுப்புறப் பகுதியில் அமைந்துள்ளது.

டெரிகாய்டு எலும்புகள் (Pterygoid) இரண்டும் பக்கத்திற்கொன்றுக டிக்னெக்டிவியும் வெளிப்புறமாகவும் பேஸட்டைன் எலும்புகளின் பின்பகுதியிலிருந்து குவாடரேட் எலும்புகள் வரை நீண்டுள்ளன. கேரீனேட் பறவைகளில் டெரிகாய்டுகள் பேரான்கீனையுடைய ராஸ்டரத்தின் பக்கங்களில் அசையும்படி பொருத்தப்பட்டுள்ளன. இவைகள் அங்ஙாறு அசையும்படி பொருத்தப்பட்டுள்ள இடங்களில் அன்னம்போன்ற பறவைகளில் இடைவெளிகள் (Facets) உள்ளன. ரேட்டைபட்டே பறவைகளில் டெரிகாய்டு எலும்பிற்கும் மண்டையோட்டு அடிப்பகுதிக்கும் இடையில் ஒரு இணைப்பு மிகவும் தன்னப்பட்டு காணப்படுகின்றன. இங்ஙனெலும்புகள் தங்குக் வளர்ச்சியுற்று பேரிடெரிகாய்டு தீட்சிகள் அசையும்படி பொருத்தப்பட்டுள்ள திண், ஊர்வனப் பிராணிகளின் பக்கங்களில் உள்ளது போன்ற திண்யாகும்.


அண்ண எலும்பின் ஓரத்தில் மேல்வில மேச்சில்லாவின் னைகோ மேட்டிக் தீட்சி உள்ளது. பறவைகளில் எக்ட்டோடெரிகாய்டு அங்ஙனது டிரான்ஸ்பேஸட்டைன் எலும்பு கிடையாது. முதல் னிசரல் வரிசையில் குருத்தெலும்பில் குவாடரேட் எலும்பு தங்குக் வளர்ச்சி யுற்று அமைந்துள்ளது. அதன் முதுகுப்புறத் திண்ப்பகுதி பெரி ஆட்டிக் (Periotic) ன்கோயோகோசக் எலும்பு இவற்றுடன் தங்குக் அசையும்படி பொருத்தப்பட்டுள்ளது. கேரீனேட் பறவை களில் அசையும்படி பொருத்தப்பட்டுள்ளப் பகுதி, இரு தனிப் பகுதிகளாக அமைந்துள்ளது. குவாடரேட்டின் மேற்குவி, மேற்குத் தாண்டின் ஆர்ட்டிக்ஞவார் எலும்புடனும் டெரிகாய்டு, குவாட ரேட்டேச னுகுக் எலும்புகளுடனும் அசையும்படி பொருத்தப் பட்டுள்ளது. குவாடரேட்டுடன் ஆர்பிட்டல் தீட்சிகளும் முன்புற மாக நீளும்படி அமைந்துள்ளன.

அண்ண எலும்பின் வகைகள்

ஹக்ஸ்லி (Huxley) என்னும் அறிஞர் 1867ஆம் ஆண்டு பறவைகளின் அண்ண எலும்பின் வேறுபாடுகளைக் கொண்டு அவைகளை வகைப்படுத்தலாம் என்பதை ஆராய்ந்தார். இதையே மெக்டோவெல் (Mc Dowell) என்பவரும் வெப் (Web) என்பவரும் முறையே 1948ஆம் ஆண்டு, 1957ஆம் ஆண்டுகளில் மறுபடியும் ஆராய்ந்து ஹக்ஸ்லியின் முடிவை ஆதரித்தனர்.

பேலியோநேத்தஸ் அல்லது ட்ரோம்போக்நேத்தஸ் வகை

இவ்வண்ண எலும்பு வகைகளே பெரும்பாலும் பறவைகளில் காணப்படுகின்றன. இவ்வகைகளை முக்கியமாக பறக்கும் திறனற்ற



படம் 17. பறவைகளின் அண்ண வகைகள்

- (அ) ரீவா பறவை (Rhea)—பேலியோ நேத்தஸ் வகை
 (ஆ) (க்)கல் பறவை (Gull)—ஹைட்ரோநேத்தஸ் வகை
 (இ) அக்ஸப் பறவை (Swan)—டெல்மோநேத்தஸ் வகை
 (ஈ) காகம் (Crow)—அலூக்நோநேத்தஸ் வகை

1. பேரால்டீனாடு, 2. ஸ்ட்ரெப்தோனா, 3. மேக்ஸிலா,
 4. பேலி டெரிகலாடு நீட்சி, 5. க்ளாடரேட், 6. டெரிகலாடு,
 7. மேக்ஸிலாவின் பேலட்டல் நீட்சி, 8. பேரால்டீனாடு ராஸ்ட்,
 ரத்தடல் அசையுப்படி பொருத்தும் பகுதி, 9. வோமர்,
 10. பேலட்டல்.

ரேட்டைட்டே பறவைகளில் காணலாம். இது ஊர்வனப் பிராணி களிலுள்ளது போன்ற பழமையான பண்பாகக் கருதப்படுகின்றது.

இவ்வகையில் வேமர் எலும்புகள் இணைந்து மிகப் பெரியதாக அமைந்துள்ளன. டெரிகாம்பு எலும்புகள் வேமர் எலும்புகளுடன் அசையும்படி பொருத்தியுள்ளது. மற்றும் ஸ்கோயோமோசல் இணைப்புகளால் பேஸ்டைன் எலும்புகளுடன் இணைந்துள்ளது. பேஸ்டைன் எலும்புகளோ, டெரிகாம்பு எலும்புகளோ, பேராஸ்பீனும்பு ராஸ்ட்ரத்துடன் தொடர்பு கொண்டு அமையவில்லை. பேஸ்டைன் எலும்புகளின் அகன்ற தனித்த மூள் நுனிப்பகுதிகள் மேக்கிஸ்ஸாவுடன் நன்றாக அசையும்படி பொருத்தியுள்ளன. ராஸ்ட்ரத்திற்கு பின்னால் பேலிடெரிகாம்பு நீட்சிகள் நன்றாக பொருத்தப்பட்டுள்ளது.

நியோக்டேத்தஸ் வகை

கேரீனேட் பறவைகளில் நியோக்டேத்தஸ் அண்ண எலும்புவகை மூக்கியமாகக் காணப்படுகின்றது. இதில் டெரிகாம்பு எலும்புகள் பேராஸ்பீனும்பு ராஸ்ட்ரத்துடன் நன்றாக அசையும்படி பொருத்தப் பட்டிருந்தாலும், இவ்வகை பேஸ்டைன் எலும்புகளால் வேமர் எலும்புகளுடன் தொடர்பில்லாமல் தனித்துப்பிரித்து வைக்கப்பட்டுள்ளன. பேலியோநேத்தஸ் வகையில் காணப்பட்டது போன்ற ஸ்கோயோமோசல் இணைப்புகளால் பேஸ்டைன் எலும்புகளும், டெரிகாம்பு எலும்புகளும் இணையாமல், ஒரு தனித்த அசையும்படி யான இணைப்பினால் இவ்விருவெலும்புகளும் இணைக்கப்பட்டுள்ளன. பேஸ்டைன் எலும்புகளின் மூள் நுனிப்பகுதி மூள்புறமாக நீண்டு மூள் மேக்கிஸ்ஸா எலும்புடன் அசையும்படி பொருத்தப்பட்டிருக்கும் அல்லது முழுமையாக இணைக்கப்பட்டிருக்கும்.

இந்த நியோக்டேத்தஸ் அண்ண எலும்பு வகையை மேலும் பல இன வகைகளாகப் பிரிக்கலாம். அதாவது ஷைனோநேத்தஸ் டெஸ்மோநேத்தஸ், அஜிக்தோநேத்தஸ் (Schizognathos), (Desmognathos) (Aegithognathos) என்பனவாகும். ஷைனோநேத்தஸ் அண்ண எலும்பு வகையைக் கல் பறவைகளை உதாரணமாகக் கொண்ட லேரிஃபார்மில் (Lariiformes) வரிசையிலும், கோழிகளை உதாரணமாகக் கொண்ட கேலிஃபார்மெல் (Galli formes) வரிசையிலும் மற்றும் பழமைபொருத்திய புதைபடிவ பறவைவகை ஆர்ச்சிபாப்டெரிக்ஸ் (Archaeopteryx) பறவையிலும் காணலாம். டெஸ்மோநேத்தஸ் அண்ண எலும்பு வகையை அன்னப்பறவைகளை உதாரணமாகக் கொண்ட அன்செரிஃபார்மெல் (Anseriiformes) வரிசையிலும், மாமிசங்களை உணவாகவுள்ளனும் கழுது பருத்து போன்ற பறவைகளை உதாரணமாகக் கொண்ட அசிபிடீரை ஃபார்மெல் (Accipitri formes) வரிசையிலும் காணலாம். அஜிக்தோநேத்தஸ் அண்ண எலும்பு வகையை டிரங்கனில் குத்தி

விரும்பும் பழக்கத்திற்கேற்ப அமையப்பெற்ற தகவலையெழுத்துக் கொண்ட பேச்சுப்பாடுமெல் (Passeri formos) வரிசையிலும் காணலாம்.

ஷெலோநேத்தல் வகையில் அண்ண எலும்பில் அநேகமாக அதன் மூல நளத்திலும் பிளவு காணப்படுகின்றது. அவ்வாறு பிளவு காணப்படுவதாகப் பேயட்டை எலும்புகளோ அவ்வது மேக்ரில்லா எலும்புகளின் அண்ண எலும்பு நீட்சிகளோ மையக்கோட்டில் சந்திப்பதில்லை. இப்பிளவு மிகுதுவான திசுக்களினால் மூடப்படாமல் இருப்பதால் வாய்ப்பகுதியும் மூக்குப்பகுதியும் தன்ளுக அமையப் பெற்ற தொடர்புகளுடனேயே காணப்படுகின்றன.

அஜிக்ஷோநேத்தல் வகை மேலே குறிப்பிட்ட ஷெலோநேத்தல் வகையைப் போன்றே விரும்பினும் இவ்வகையில் வோமர் எலும்புகள் ஒரே சீரான துவிவுடன் இவ்வாமல் பிளவுபட்டு மூல் கரண்டி போன்று (Forked) அமைந்துள்ளது.

டெஸ்மோநேத்தல் வகையில் சாதாரணமாக வோமர் எலும்புகள் மிகவும் நிறியதாகக் காணப்படுகின்றன. மேக்ரில்லாவின் அண்ண எலும்பு நீட்சிகள் ஒன்றோடொன்று பிணைக்கப்பட்டுள்ளது. பேயட்டை எலும்புகள் உள்நாசித் துவாரங்களுக்குப் பின்னால் மையக்கோட்டில் நிறு சந்திக்கும்படியோ அவ்வது முழுமையாக சந்திக்கும்படியோ அமைந்துள்ளன.

இவ்வாறு அண்ண எலும்புகளின் வேறுபாடுகளைக் கொண்டு பறவைகளை சாதாரணமாக பேலியோநேத்தல் என்றும் நியோநேத்தல் என்றும் பின்னும் அவைகளினின்றும் பல இன வகைகளாகப் பிரித்தானும் இத்தகைய பழைய வகைபாடு, யாவரும் ஏற்றுக் கொள்ளும் வகையில் இல்லை. மேக்டோவெல் (McDowell) என்ற அறிஞரும் அவர் போன்ற மற்றும் பல அறிஞர்களும் ஆராய்ந்ததன் படினாக, பறக்கும் திறனற்ற ரேட்டைட்டே பறவைகளின் அண்ண எலும்பு வகையில் பல வேறுபாடுகள் இருப்பதாகக் கண்டறிந்துள்ளனர். மற்றும் பேலியோநேத்தல் வகைக்கும் நியோநேத்தல் வகைக்கும் உள்ள வேறுபாடுகளை அவ்வளவு கூரிய நிறத்த முறையில் காண்பது எளிதில்ை என்றும் கண்டு குறிப்பிட்டுள்ளனர். பேலியோநேத்தல் வகையில் பெரிய வோமர் எலும்புகள் உள்ளன. ஆனால் திக்கோழிகளில் வோமர் எலும்புகள் குறிப்பிடத்தக்க முறையில் நிற தாகவே காணப்படுகின்றன. மற்றும் ஹக்ஸ்லியின் வினக்கத்தின்படி வோமர் எலும்புகள் டெரிக்காய்டுகளுடன் தொடர்புகொண்டு அமைந்திருத்தல் வேண்டும். ஆனால் திக்கோழிகளில் அவ்வாறு அமையவில்லை. மேலும் சில நியோநேத்தல் அண்ண எலும்பு வகையைச் சேர்ந்த

பறவைகளில், பேலியோநேத்தல் வகைகளில் உள்ளது போன்று பேலிடெலிகாய்டு நீட்சிகள் பின்புறமாக அமைந்துள்ளது.

மேக்டோவெல், டயீர், வெப் (Mc'Dowell 1948, De Beer 1937, 1956, Web 1957) முதலிய அறிஞர்கள் வோமர் எனும்புகளின் இணையாத தன்மை வெளி நசித்துவாரங்கள் ஆர்பிட்டல் குழிவுடன் தனித்து இணையாமல் இருக்கும் நிலை முதலிய பழையபாண பின்பு களால் பேலியோநேத்தல் வகையை நியோநேத்தல் வகை ஒத்திருப்பதாக ஆராய்ச்சியின் மூலம் கண்டறிந்துள்ளனர். மேலும் பைபிராக்ட் (Pycroft) என்பவரின் ஆராய்ச்சியிலும், தன் ஆராய்ச்சியிலும், டயீர் நியோநேத்தல் வகையை முதிர்ச்சியுற்ற பறவைகள் அடைதலுக்கு முன் பேலியோநேத்தல் வகைபோலத் தோன்றி படிப்படியாக மாறுதல் அமைந்து பின்பு நியோநேத்தல் வகையை அடைகின்றன என்று கூறிவுள்ளார்.

உதாரணமாக (ங்)கல், காகம், பருத்து போன்ற பறவைகளில் அவைகள் குஞ்சுப் பறவையானாக விரும்பும்போழுது டெலிகாய்டு எனும்புகளின் முன்பாகம் வோமர் எனும்புகளைத் தொடும்படி அமைந்துள்ளன. பின்பு டெலிகாய்டு எனும்புகள் மற்ற எனும்புகளினின்றும் பிரிக்கப்பட்டு, பேஸ்டைன் எனும்புகளுடன் இணைந்து விடுகின்றன. பின்பு ஒரு அசையும் இணைப்பு இவைகளுக்கு இடையில் தோன்றி டெலிகாய்டுகளின் பெரும் பகுதியைப் பிரித்துவிடுகின்றன. இவ்வாறு பேலியோநேத்தல் வகையிலிருந்து, டெலிகாய்டு எனும்புகள் வோமர் எனும்புகளினின்றும் பிரித்துக் காணப்படும் நியோநேத்தல் வகை உண்டாகின்றது.

அநேகமாக பல பறவைகளில் ஊர்வனப் பிராணிகளில் உள்ளது போன்று மேத்தாடை ஒரு குறிப்பிடத்தக்க முறையில் அசையும்படி அமைந்துள்ளது. இதுபற்றி ஹாஃபர் (Hoffer) என்பவர் 1954ஆம் ஆண்டும், டீ காக் (De Kock) என்பவர் 1955ஆம் ஆண்டும், ஃபெரி (Fourie) என்பவர் 1955ஆம் ஆண்டும் வெப், சைமனெட்டா, ஜென்கின்ஸ் (Web, Simonetta, Jenkin) என்பவர்கள் 1957ஆம் ஆண்டிலும் ஆராய்ச்சி நடத்திவுள்ளார்கள். சித்தாடை மேண்டிபுல் (Mandible) பகுதி ஒடுக்கப்பட்டிருப்பதாலும், குளாடரேட்டிங் சிறுதுணி முன்புறமாக அசையும்படி பொருத்தப்பட்டிருக்கின்றனாலும் அவ்வாறு குளாடரேட்டிங் அசைவிற்கு, சைமோமெட்டிக் வளைவு ஒரு பக்கமும் டெலிகோ பேஸ்டைன் எனும்பு மற்றுறமும் நெருக்கமாக அமைந்திருப்பதாலும், மேல் தாடை அசைகின்றது.

மேண்டியோட்டிங் அடிப் பகுதியில், டெலிகாய்டு எனும்புகளுக்கும் பேராம்பிளய்டு ராண்ட்ரம் அல்லது பேலிடெலிகாய்டு நீட்சி

கனுக்கும் மத்தியில் சறுக்கு அசைவு ஏற்படுகின்றது. மண்டையோட்டின் டெரிகாய்டு எலும்பிற்கும் பேஸ்டைடர் எலும்பிற்கும் இடையில் சிறிது அசைவு உண்டு. ஆர்பிட்டல் பிளவு மண்டையோட்டின் இருப்பதால் அங்கின் முதுகுப் புறப் பகுதி கிரேனியத்தின் பின்புறம் முன் மேக்ஸில்லாவின் ஒருங்கிய ஏறு நீட்சிகளால் இணக்கப்பட்டுள்ளது. இவ்வாறு இணக்கப்பட்டுள்ளதால் அலகானது மேல் நோக்கி வளைவையும் பொருத்தமாக அமைந்துள்ளது. விலிகள் போன்ற சில பறவைகளில் ஒரு முழுமையான குறுக்காயமைந்த கிரேனியோகிரேனியம் (Craniofascia) தாழ்ப்பாள் போன்ற பகுதி வளர்ச்சியுற்று காணப்படுகின்றது. இவ்வாறு மிகச் சிறந்த முறையில் அமைப்பெற்ற தாழ்ப்பாள் பகுதியினும் மேல் அளவு வெகு நேர்த்தியாக அசைகின்றது. பறவைகளில் மேல்தாடை அசையும் படியான நிலை, அதாவது மண்டையோட்டிலுள்ள விலையும் கோட்டினும் அமைப்பெற்ற நிலைக்கு மிகோகைனெட்டிக் (Meso Kinetic) என்று பெயர். இதுபற்றி ஹாகிபர் என்பவர் மேலும் ஆராய்ந்துள்ளார். ஃபிஷர், குட்மேன் (Fisher, Goodman) என்பவர்கள் 1955ஆம் ஆண்டு மேற்கூறிய மேல்தாடை அசையும் நிலையை அளக்கக் கருவியிலெக்கடக் கண்டறிந்துள்ளனர்.

ஒருசில கேரினேட் பறவைகளில் மேல்தாடை அசையதில்லை. உதாரணமாக சிம்ஸ் (Sims) என்பவர் கண்டறிந்த ஹாகிபீன்ச் (Howfinch) பறவையைக் கூறலாம். இது 55 கிராம் எடையுள்ள ஒரு சிறு பறவை. இச்சிறு பறவை செரீரி, ஆவிய் போன்ற பழங்களின் கல் போன்ற மிகவும் கெட்டியான விதைகளை உடைத்து, அவற்றை உண்ணுகின்றன. அவ்வாறு அக்கொட்டைகளை உடைப்பதற்கு அவற்றிற்கு 106—159 பவுண்டு அழுத்தம் தேவை என்றும் கண்டுபிடிக்கப்பட்டுள்ளது.

ஹாகிபீன்ச் பறவையின் மண்டையோடு, தாடைத் தசைகள் அளவு முதலானவைகள் அவை உண்ணும் உணவிற்கேற்ப தனிச் சிறப்பு வாய்ந்த தகவமைப்புகளைக் கொண்டுள்ளன. இப்பறவைகளில் ஆர்பிட்டோ நேசல் இடைத்திரை அடங்கலாக எவ்வாறு மண்டையோட்டுப் பகுதிகளும் நன்றாக கெட்டிப்படுத்தப்பட்டுள்ளன. அதன் சிறப்பரப்பு அடர்த்தியான ஹைகோமெட்டிக் விலையும் டெரிகாய்டு எலும்புகளும் நன்றாக பஸம் பொருத்தியதாக அமைந்துள்ளது. பேஸ்டைடர் எலும்புகள் பேராஸ்பீனியுடு ரால்ட்ரம், லோமர் எலும்புகளுடன் நன்றாக இணைந்துள்ளன. கிரேனியோகிரேனியம் தாழ்ப்பாள் பகுதி மறைக்கப்பட்டுவிட்டது. குவாடரேட் எலும்பினுக்கு கிரேனியம் பகுதியுடன் நன்றாக இணையும்படி அமைந்திருப்பதுடன், சிற்த் தாடைக்கு ஆதாரமாக அமைவதுடன், அசையும் படியான நிலை சற்று ஒடுக்கப்பட்டுள்ளது.

பறக்கும் திறனற்ற ரேட்டைட்டே பறவைகளில் மேல்தாடைப் பகுதி அசையும்படியாக அமைப்பதில்லை. ஆர்பிட்டோ நேசம் இடைத்திரை, கிரேவிபோஸ்பெரியல் பகுதியில் நன்றாக அமைந்து அப்பகுதி வளைந்து கொடுக்கும் நிலையில் உள்ளது. கெட்டோலெல் என்பவர் மேலே கூறிய நிலையானது அப்பறவைகளின் உணவுண்ணும் பழக்கத்திற்கேற்ப அமைத்திருப்பதாகக் கூறியுள்ளார். ஏதெனிக்ஸ் பறவைகள் தங்கள் உணவை நோண்டி அல்லது கண்டுவிட்டு நோண்டி எடுத்து உண்ணுதலுக்கேற்ப அதன் அவசரம் கெட்டியாகவும் விரைப்பாகவும் உள்ளன. பெரிய உருவுள்ள ரேட்டைட்டே பறவைகள் புல் பூண்டுளை உண்ணுகின்றன. அதற்கெதிர்த்தோல் அமைவதில் அவசரம் நுனி அமைந்துள்ளன, இவ்வாறு முக்கியமாக மேல் தாடை அசைய முடியாதபடி அமைத்திருப்பதும் சில ரேட்டைட்டே பறவைகளில் மேல் தாடை அசையும்படியான அமைப்பும் உள்ளது. அவசரம் மேல்தாடை எழும்புகள், கிழேயுள்ள இடைத் திரையில் மேலே தூக்கும்படியான நிலையினும் சிறிது சரிந்து அல்லது வளைவும் அசையும் ஏற்படுகின்றன.

கீழ்த்தாடை (The Lower Jaw)


பறவைகளில் கீழ்த்தாடை ஐந்து படல எழும்புகளால் ஆனது. வளர்ச்சியின்பொழுது அவை ஐந்தும் தனித்தனியே மார்கைக்குத் தெரிந்தாலும், பின்னும் அவை ஐந்தும் ஒன்றாகி ஒன்றினின்றும் ஒன்று பிரித்துக் கண்டுகொள்ள முடியாதபடி ஆகிவிடுகின்றன. டென்ட்டரி ஸ்பீனியல், ஆங்குலர், என் ஆங்குலர், முன்ஆட்டிகுலார் (Dentary, Splenial, Angular, Surangular & Prearticular) என்பவைகளை கீழ்த்தாடையின் ஐந்து முக்கிய எழும்புகளாகும், கோரனம் என்ற எழும்பு ஏடுவிலியா முற்றிலும் மறைந்துவிட்ட நிலையிலே உள்ளது. ஆனால் சர்ஆங்குலர் எழும்பினிற்கு ஒரு கோரனம் நீட்டி உள்ளது. ஆர்க்கோசெனரியல் வளர்வன பிராணிகளில் உள்ளது போன்று கீழ்த்தாடை எழும்பில் அதாவது மேல்புறமார் எழும்பில் டென்ட்டரி எழும்பிற்குப்பின்னால் ஒரு துளை உள்ளது.

மெக்கலின் குருத்தெழும்பிற்குப் பின்னால் குவாடரேட் எழும்பு ஆர்ட்டிகுலார் எழும்புடன் நன்றாகப் பொருத்தும்படியும் அசையும்படியும் அமைந்துள்ளது. சில பறவைகளில் ஆர்ட்டிகுலார் எழும்பினிற்கு ஆங்குலர் நீட்டியும் உண்டு.

கீழ்த்தாடையின் இருபக்கங்களும் சேர்த்து ஒர் எழும்பொருள் கிரேவி (Syrrhysis) உண்டாக்கப்படுகின்றது.

ஹயாம்பு உறுப்பு அல்லது வளைந்த நாவடி உறுப்பு (Hyoid apparatus)

இது நாக்கினுள் அமைப்பெற்ற முன்பக்கமாக அமைந்த பேராகுளோசம் (Paraglossum) என்ற ஒரு மையப்பகுதியும், பின் பக்கமாக அமைந்த காப்புலர் (Copular) அல்லது பேசிபிராக்கிவல்



படம் 18. பதனவகலின் நாக்கு எலும்புமையு

அ. பச்சை நிற மரக்கொத்தியின் நாக்கு எலும்புமையு

ஆ. அன்னப் பதனவகலின் நாக்கின் எலும்புமையு

1. கொம்பு, 2. காப்புலர், 3. பேராகுளோசம், 4. தசை நீளும் கொட்டுப் பகுதி, 5. ஜீவியோ ஹயாம்புத் தசை, 6. செட்டப் பட்டக்கொம்புப் பகுதி, 7. நாக்கு நீளும் துளாரம், 8. நாக்கின் ஹலி, 9. ஜீவியோ ஹயாம்புத் தசை பொருத்தியுள்ள இடம், 10. ஜீவியோ ஹயாம்புத் தசையினுள் கொம்பு துறைதல், 11. செட்டப்பட்ட கொம்புப் பகுதி, 12. பேராகுளோசம், 13. செராட்டோ பிராக்கிவல், 14. எப்பி பிராக்கிவல்.

குறிப்பு: ஆ—மரக்கொத்தியின் நாக்கு என்னாறு லேவியே நீட்டப்படுகிறது என்பதை விளக்குகின்றது.]

(Basibranchial) என்ற பகுதியையும் கொண்டது. பின்பும் கூறப் பட்ட காப்புலார் பகுதி ஒவ்வொரு பக்கத்துடனும் ஒரு நீண்ட கொம்பு அல்லது காப்புலார் நீட்சியுடன் பொருத்தப்பட்டுள்ளது. காப்புலார் நீட்சி அல்லது நீண்டக் கொம்புப்பகுதி செரட்டோபிராங்கியல், எப்பிராங்கியல் (Cerato branchial, Epi branchial) என்ற இரு பகுதிகளும் இணைந்த ஒரு பகுதியாகும்.

பொதுவாக எல்லா முதிர்ச்சியுற்ற பறவைகளிலும் தாவடி உறுப்பு நன்றாக எலும்பாக்கப்பட்டிருக்கும். ஆனால் தீக்கோழிகளில் மட்டும் முதிர்ச்சியுற்றப் பறவைகளில் கூட செரட்டோபிராங்கியல் பகுதி தவிர மற்ற பகுதிகளெல்லாம் குருத்தெலும்புப்பகுதியே ஆக்கப்பட்டுள்ளன.

மரக்கொத்திப் பறவைகளிலும் மற்றும் அதனை ஒத்த பிசிடே (Picidae) குடும்பத்தைச் சேர்ந்த அதன் இனப்பறவைகளிலும் (Wrynecks) தாவடி உறுப்பின் கொம்புகள் மிகவும் நீளமாகவும், மெல்லியதாகவும் அமைந்துள்ளன. அவைகள் மண்டையோட்டின் பின்புறமாக வளைந்து நீண்டு கங்குழியிலிருந்து மேல் சார்வாகச் சென்று கங்குழியின் பக்கத்தில் ஒரு வரிப்பள்ளத்தில் முடிவடைகின்றது. அல்லது ஜெலிநஸ் (Gellinas) பறவைகளிலுள்ளது போன்று வலது நாகித் துவாரங்களில் துறைந்து முன்புறமாக நீண்டு அவ்வின் துலியில் காப்புலார் பகுதியாக முடிவடைகின்றன. இவ்வாறாக தகவல்மப்புகளை மேலே கூறிய மரக்கொத்தி, ஜெலிநஸ் முதலிய பறவைகள் உடைத்தாயிருப்பதால், அவற்றின் உதவியால் நாக்கு நன்றாக நீண்டு பூச்சிகளை இரைவாகப் பிடிக்க உதவுகின்றது. மற்றும் தாக்கின் தசைகள் தாவடி உறுப்புடன் இணைந்து காணப்படுவதால் அவைகள் இரைபுண்ணும் வாழ்க்கைக்கேற்ப அவ்வாறு அமைந்துள்ளது. வாலர் என்ற அறிஞரும் (Wallar) மற்றும் பலரும் 1716ஆம் ஆண்டு மேலே குறிப்பிட்டது போல எவ்வாறு நாகும், தாவடி எலும்பும் அவை இரைபுண்ணும் வாழ்க்கைக்கேற்ப அமைந்துள்ளன என்பதை விளக்கியுள்ளனர்.

மண்டையோட்டின் அடிப்பகுதியும் ஓட்டிக் ஆக்ஸிப்பிட்டில் பகுதிகளும்

(The Skull base, Otic and Occipital regions)

மண்டையோட்டின் அடிப்பகுதி பேசில்பீரூய்டு எலும்புகளும் பாராஸ்பீரூய்டு எலும்பு உட்புறமாக பேசிஸ்பீரூய்டுடன் இணைந்த பகுதியும் பேசி ஆக்ஸிப்பிட்டில் பகுதி முதலியனவாகும். பேசி ஆக்ஸிப்பிட்டில்சுரூடன் பிடரிமுள்ளு நன்றாக பிணைக்கப்பட்டுள்ளது.

பறவைகளின் எலும்பு மண்டலம்

பேசி ஆக்ஸிபிட்டல் எலும்புகளோடு மட்டுமல்லாமல் எக்ஸ்சுக்ஸிபிட்டல் எலும்புகளுடனும் பிடர்முண்டு சிறிது இணைந்துள்ளது. பொதுவாகப் பறவைகளில் ஒரு ஒரு பிடர் முண்டுதான் உள்ளது. ஆனால் கோழி போன்ற பறவைகளில் பிடர்முண்டு மிகவு பட்டாந் போல் தோன்றுகின்றது. மேக்ஸம் துளியில் மூதுகுப்புறப்பக்கத்தில் குப்ரா ஆக்ஸிபிட்டல் வளர்ச்சியுற்ற காணப்படுகின்றன. ஒட்டிக் பெட்டகம் புரோஓட்டிக் ஒப்பிஸ்தோ ஒட்டிக், மையப்பகுதி கலிவின்று தோன்றியுள்ளது. இவைகள் ஒன்றாக இணைந்து பெரி ஒட்டிக் பகுதியாக உருவெடுத்து, அப்பெரிஓட்டிக் பகுதி உட்செவி வயச் சுற்றிலும் அமைந்துள்ளது. சில சமயங்களில் எப்பி ஒட்டிக் பகுதி குப்ரா ஆக்ஸிபிட்டல் எலும்புகளுடன் இணைந்திருப்பதைக் காணலாம்.

ஆந்தைகளில் மெயற்றீம் ஒட்டிக் பகுதிகளைக் கொண்ட இரு பக்கத்து தலைப்பகுதியும் சமச்சீர் அற்று காணப்படுகின்றன. ஆந்தை களில் கரதிலும் கேட்கும் புலன் மிகவும் சிறப்பாக அமைந்திருத் தவாயெய இவ்வாறு சமச்சீர் அற்று காணப்படுவதாகக் கருதிப் படுகின்றது.

சைறப்போக்கிளசல் நரம்புகள் மண்டலமோட்டினின்றும் ஒன்று அல்லது சில துவாரங்கள் மூலம் பிடர்முண்டின் இருபுற மிருத்தும் பேசிஆக்ஸிபிட்டல் எலும்புகளுக்கும் எக்ஸ்சுக்ஸிபிட்டல் எலும்புகளுக்கு மிடையிலிருத்தும் இனம்பி மண்டலமோட்டினிருத்த வெளியாகின்றன, க்ளாசோக்பெலிஸ்ரீயல் வேகன் ஆகிய நரம்புகள் பக்கங்களிலுள்ள துவாரங்களின் வழியாகச் சென்று ஒரு சிறிய குழியை அடைகின்றன.

ஃபெலியல் நரம்புக் குழாயின் துவாரத்தின் வழியாக அதன் கிளைவான நடுவோமெண்டியுவார் கிளை செல்லுகின்றது. அத்துவா ரத்தின் வழியாக உள்கிரோட்டிப் தமனி சென்று மண்டல மோட்டிக் அடைகின்றது.

பேராஸ்பீனாடு, பே சி ன் பீ னா டு எலும்புகளுக்கிடையில் கிரோட்டிப் உள் தமனி மூள்பக்கமாக பேராபேசல் குழாய் வழியாக மண்டலமோட்டிஸ் அடிப்பகுதியை அடைகின்றது. உள் கிரோட்டிப் தமனியை ஒட்டியே ஃபெலியல் நரம்பு செல்லுகின்றது. இந்தத் தமனி பின்னும் மேல் தோக்கிச் சென்று செரீபிரல் தமனியாக மாறி பீட்டியூட்டரி குழியை அடைகின்றது. அதனின்றும் ஒரு கிளைத் தமனி இனம்பி (அதாவது பேஸ்ட்டைன் தமனி) ஒரு துளை வழியாக வெளியேறி பூஸ்டெலியன் குழாய்களின் பக்கங்களில் சென்று பேஸ்ட்டைன் நரம்புகளுக்கு இணையாகச் செல்லுகின்றது.

குளாடிரேட் எனும்புகளுக்கும் பிள்ளும் ஒவ்வொரு பக்கத்திலு் ஒரு பெரிய குழியு—அதாவது செவிப்பறைக் குழி (Tympanic fossa) உள்ளது. ஸ்டேப்பில் என்ற எனும்பு இதனுள் இருப்பதால் இக் குழியை செவிப்பறைப்படலம் மூடிவுள்ளது. இதன் உச்சவரி பெர் ஓட்டிக் எக்ஸ்ட்ரீமீட்டில் எனும்புகளால் ஆனது. அதனுள் மூன்று பெரிய துளாரங்கள் உள்ளன. அந்நில் முதுகுப்புறப் பக்கத்தில் அமைந்துள்ள துளாரம் செவிபிள் மையப்பகுதி மண்டையோட்டின் கார்திறப்பகுதிக்கு தொடர்பு கொள்ள உதவுகின்றது. அதற்கு சற்றுக் கீழேயும் பின்புறமாகவும் மற்றொரு துளை உள்ளது. அத்துளை மறுபடியும் ஒரு எனும்பு நீட்சியால் இரண்டு துளாரங்களாகப் பிரிக்கப்பட்டுள்ளன. இந்த இரண்டு துளாரங்களில் மேலேயுள்ள தற்கு நீட்சுவித் துளாரம் (Fenestra ovalis) என்று பெயர். கீழேயுள்ள துளாரத்திற்கு உருவித் துளாரம் (Fenestra rotunda) என்று பெயர். மற்றும் மூன்றாவது நீழ்ப்பகுதியிலுள்ள துளை யூஸ்டேசியன் குழாய் நடுச் செவிப்பகுதியிலுள் துழையச் செல்கின்றது.

ட்ரைஜெனீஸ் தரம்பிள் விளைகளான மேக்ஸில்லரி மேன்டிபுலார் விளைகளுக்கு ஒரு பொதுத்துளை பக்க ஸ்பீரம்பு எனும்புகளுக்கும் ப்ரோஓட்டிக் எனும்புகளுக்கும் இடையில் உள்ளது.


ஸ்டேப்பீடியல் சிக்கலுறுப்பு (The Stapedial complex)

செவிப்புவினை உணர்ந்தும் உறுப்புக்கு உள் ஸ்டேப்பில் அல்லது காஸ்டமெல்லா என்று பெயர். காஸ்டமெல்லாவிற்கு அகன்ற ஒரு பாதத் தட்டுபோன்ற பகுதி உள்ளது. அப்பகுதி நீள்வருவித் துளாரத்தில் பொருத்தும்படி அமைந்துள்ளது. பின்னும் செவிவக் வெளின் ஸ்டேப்பில் அல்லது காஸ்டமெல்லாவின் மிகுப்பகுதி (Extra columella) என்ற பகுதியும் உள்ளது. இந்தக் காஸ்டமெல்லா மிகுப்பகுதி செவிப் பறைவுடன் தொடர்பு கொண்டுள்ளது.

ஆத்தைகள் லிவர்தரில் ஸ்டேப்பில் பகுதி மிகவும் நிறப்புடன் அமைந்துள்ளது. ஸ்டேப்பில்லின் பாதநீட்டிற்கு ஒரு உருண்டையான துவிப்பகுதியுள்ளது. அவ்வுருண்டை துவிப்பகுதி உட்செவிபிள் பெரிஸிம்பு (Peri lymph) பகுதியினுள் நீட்டிக்கொண்டிருக்கும்படி அமைந்துள்ளது.

ஸ்டேப்பில்லின் மிகுப்பகுதியிலிருந்து நிறிய நிறிய நீட்சிகள் லெம்புவிலின்றன. இந்நீட்சியிலிருந்து மற்றொரு நீட்சி வெளிப்புறமாகச் சென்று செவிப்பறையை அடைகின்றது. மற்றும் மேலாக முதுகுப்புற

மாகவும் பக்கங்களிலேயும் அநேக நீட்சிகள் உள்ளன. இவற்றில் முதுகுப்புறமாகவும் பக்கங்களிலும் உள்ள நீட்சிகள் ஒன்று சேர்ந்து ஹக்ஸுலியின் துவாரம், Huxley's foramen) என்னும் துவாரத்தை அடைகின்றன. இந்த நீட்சிகளின் உறுப்பொத்த தன்மைபற்றி இராய்ப்ப்டன்



படம் 19; பறவையின் ஸ்டெர்பீடியல் சிக்கலுறுப்பு

- (அ) குஞ்சுப் பறவையின் ஸ்டெர்பீடியல் சிக்கலுறுப்பு
(ஆ) ஸ்டெர்பீல் எலும்பு-கீழ்க்கிடைப் பறவை (Guillemot)
(இ) ஸ்டெர்பீல் எலும்பு-ஆத்தை

1. பாதத் தட்டு, 2. முதுகுப்புற நீட்சி, 3. ஹக்ஸுலியின் துவாரம், 4. பக்க நீட்சி, 5. வெளி நீட்சி, 6. உள் நீட்சி, 7. உருண்டைத் துவாரம், 8. நீள் உருளைத் துவாரம், 9. தாடை, 10. கீவாடரேட்.

(Crompton) என்பவர் 1953 ஆம் ஆண்டு ஆராய்ந்துள்ளார். மற்றும் டிபேரியல் நரம்பின் கார்டா டிம்ப்ளனி கிளை, ஸ்டெர்பீல்ஸ்டன் இணைந்துள்ளதைப் பற்றியும் 1937 ஆம் ஆண்டு டிபீர் (De Beer) என்பவர் விளக்கியுள்ளார்.

மேலே குறிப்பிட்ட பாதத்தட்டுப் பகுதியைத் தவிர ஸ்டெர்பீடியல் சிக்கலுறுப்பு (Complex) பகுதி தாவடி உறுப்பு அல்லது இரண்டாவது லாவடி எலும்பு மண்டலத்திலின்றும் தான் வளர்ச்சியுறுகின்றது. இது பறவைகளின் வளர்ச்சியின்பொழுது ஒட்டோஸ்டேபீல் என்ற உள்பகுதியும் ஹெயோஸ்டேபீல் என்ற வெளிப்பகுதியும் கொண்டது. இந்த ஒட்டோஸ்டேபீல் பகுதி முதிர்ச்சியுற்ற பறவைகளின் ஒட்டிக் பெட்டகமாகும்.

மேலே குறிப்பிட்ட பகுதிகளை ஸ்டெர்பீல், ஸ்டெர்பீல் மிகுப் பகுதி முதலியனவாக பின்னும் மாறுகின்றன.

கோழிக் குஞ்சுகளின் வளர்ச்சியின்பொழுது ஒட்டோஸ்டேபீல் பகுதியை அகற்றியிட்டால் ஸ்டெர்பீடியல் பெட்டகமும், ஸ்டெர்பீடியல் பாதத்தட்டு பகுதியும் பின்னும் காணப்படுவதில்லை, வளர்ச்சி


படைவழியை என்று ரேகான் (Reagon) என்பவர் 1917-ஆம் ஆண்டு கண்டறிந்து கூறிவுள்ளார். இவ்வாறு ஒட்டோசிஸ்ட் பகுதி அகற்றப் படுவதால் மேலே கூறிய இரண்டு பாகங்களே மாதிரிகப்படுகின்றனவே யல்லாமல் மற்ற எட்டெப்பீழிகள் சிக்கல் பகுதி பாதிக்கப் படுவதில்லை. ஆகையால் ஒட்டோசிஸ்ட் ஒட்டிக் பெட்டகமும், பாதத் தட்டும் வளர்ச்சிபுறுதலுக்குக் காரணமாகவுள்ளது என்று கூறப்படுகின்றது.

5. பறவைகளின் சீரண மண்டலம்

பறவைகளின் சீரண மண்டலம், அவற்றின் பறக்கும் திறனையும் அதனாய் ஏற்படுகின்ற வளர்ச்சிதை மாற்றங்களையும் பொருத்து அமைந்த ஒரு திறன்மயமான மண்டலமாகும். தலைப்பகுதியிலுள்ள சீரண உறுப்புகள், பறவைகளின் இரைவுண்ணும் தகவமைப்புக் கேற்ப மிகவும் ஒடுக்கப்பட்டு தேவைக்கு வேண்டிய இரு சிறு பகுதி மட்டுமே காணப்படுகின்றன. பறவைகளுக்கு தாடைப்பகுதி ஒடுக்கப் பட்டு அவருகளாக மாறி, அதனாய் அங்கு எதுமயபுகளின் கனம் குறைக்கப்பட்டிருப்பதுடன் இந்த இடத்தில் அதிக எடைமயுள்ள தாடைத் தகைகளும் கிடைமயுறு. பறவைகளின் அமருகள், பற்களின் வேலைகளைச் செய்து வருகின்றன.

பறவைகளுக்கு உணவுக்குழாய் (Oesophagus) நீளமாகமயும், அகன்றும் காணப்படுகின்றது. இப்பகுதி பறவைக்கு உணவை உள்பே செலுத்த ஒரு வழியாகமயும் அதே சமயத்தில் உணவை சேர்த்து வைக்கும் இருப்பிடமாகமயும் பயன்படுகின்றது. பறவை களின் சீரண உறுப்புகளில் இரைப்பைப் பகுதி இரண்டு அறை களாகப் பிரித்து காணப்படுமயுதே குறிப்பிட்டுச் சொல்வக்கடிய மூக்கியமான தொன்றும். இரைப்பை ப்ரோவென்ட்ரிக்குலஸ் (Proventriculus) என்ற கரப்பிசுளடக்கிய மூன் இரைப்பை பகுதி யாகமயும், வென்ட்ரிக்குலஸ் அல்லது அரவைப்பை (Gizzard) என்ற தன்றாகப் பொருத்தப்பட்ட தகைகளானமயின் இரைப்பை பகுதி யாகமயும் ஆக இரு பகுதிகளாகப் பிரிக்கப்பட்டுள்ளது. மற்ற மூன்று கெணுமயுள்ள பிராணிகளில் பற்கள் செய்யும் செயலை பறவைகளில் அரவைப்பை செயலாற்றுகின்றது. ஆகையால் இது செயலெடுத்துத் தன்மையை (Aesalogeny) விளக்குகின்றது. வயிற்றுப் பகுதிக்கு அப்பால் பறவைகளின் சீரண மண்டலத்தில் மற்ற மூன்றுகெணுமயுள்ள பிராணிகளில் உள்ளது போன்ற மூக்கிய பகுதிகள் பறவைகளில்

கொடையாது. ஆனால் மற்றப் பிராணிகளில் உள்ளது போன்ற பலவிதமான உணவுப்பொருள்களைவுள்ளனும் மூறையும் அதற்கெற்ற தகவ



படம் 20. ஆண் புறவியின் சீரண மண்டலம்

1. உணவுக் குழாய், 2. திணிப் பை, 3. புரோகெண்ட் டிக்ரூவன், 4. அரணைப் பை, 5. கல்லீரல், 6. பித்த நாளம், 7. கிணையம், 8. கிணைய ஊளக்கல், 9. குடம், 10. பொதுக் கழிவறை, 11. வித்தகம், 12. சிறுநீரகம்.

மைப்புகள் பறவைகளிலும் குறிப்பிட்டிருச் சொத்தும அளவிற்கு அமைந்துள்ளது.

உள்வாய், உள்வாய்ச்சுருப்பிகள், தொண்டைப்பகுதிகள்
(The Buccal cavity, Buccal gland & Dharvnx)

பொதுவாக உள்வாய் உணவுப்பொருளை வாயிலிலுள்ள தொண்டைக்குள் செலுத்தப் பயன்படும் ஒரு பாதையாகவும், உணவும்

பொருளை ஈரப்பனப்போல் மாற்றவும் உதவுகின்றது. விதை, கொட்டை முதலியவற்றை உள்ளனும் பறவைகளில் கொட்டைகளை உடைக்கவும், புளாதுண்ணிப் பறவைகளின் மாரிசத்தைக் கிழிக்கவும் ஒரு சிறிது யந்திர சக்தியை பயன்படுத்தவும் அவை உதவுகின்றது. அவருகள் மற்றப் பிராணிகளின் பற்களைப் போன்று பறவைகளில் உணவுப்பொருள்களைப் பற்றிப் பிடித்து, விழாமல் உள்சே செலுத்த உதவுகின்றன.

உள்வாய் மேம்பாடை, கீழ்த்தாடை என்ற அவருகளிலும் மூடப் பட்ட ஒரு பகுதியாகும். உள்வாயின் கடைசிப் பகுதியும் தொண்டையின் முன் பகுதியும் சேருமிடத்தில் குரல்வளை (Glottis) உள்ளது. தொண்டையும் உள்வாயின் கடைசிப் பகுதியும் ஜீரண மண்டலத்திற்கும் கவச மண்டலத்திற்கும் ஒரு பொது அறையாக அமைந்துள்ளன.

வாயின் கரைப்பகுதி அண்ண எலும்புகளால் ஆனது. அப் பகுதியில் முன்பகுதி மிகவும் கெட்டியான பகுதியாகவும் பிற்பகுதி மென்மையான பகுதியாகவும் அமைந்துள்ளன. அண்ண எலும்புப் பகுதியிலும், தொண்டையின் கரை பகுதியிலும் பொதுவாக பின் புறமாக நீட்டப்பெற்றுள்ள முடிற் பகுதிகள் (Papillar) உள்ளன. அண்ண எலும்பின் முற்பகுதியில் காணப்படும் குழியில் நாக்கு அழுத்தி பொருத்தப்பட்டிருக்கும். அண்ண எலும்பை இரண்டு அண்ண பிளவு (Choanal) என்ற பிளவு அண்ண எலும்பை இரண்டு அண்ண எலும்பு தொங்கற் பகுதிகளாகப் பிரிக்கின்றன. கொயனல் பிளவு மூக்குக் குழியினை உள்வாயின் பின்பகுதி, தொண்டை முதலிய பகுதி களுடன் தொடர்புகொள்ள உதவுகின்றது. கொயனல் பிளவின் தாடைப் பகுதியில் இங்கிப்பண்டியுயர் பிளவு என்ற பிளவு தொண்டையின் கரைப் பகுதியில் உள்ளது. அப்பிளவில்தான் இரு பக்கங்களிலிருத்தும் வரும் செசிப்பறைகளின் இணைந்த பொதுத் துவாரம் காணப்படுகின்றது.

நாக்கு தொண்டையினின்றும் தோன்றிய ஒரு கருவியாகும். இது உள்வாயின் பின்புறமாக இணைந்துள்ளது. நாக்கின் இணையாத முன்பகுதி, மேண்டியுயர் வளைவிலின்றும் தோன்றுகின்றது. ஆனால் அதன் அடிப்பகுதி ஹலாய்டு, முதல் பிராஸ்கியஸ் வளைவுகளினின்றும் தோன்றுகின்றது. அவருகளைப் போன்றே நாக்கும் பறவைகளில் அவற்றின் இரைபண்ணும் பழக்கத்திற்கேற்ப பவவாருணதகவணம்பு களைவுடையதாய் இருப்பதாகக் கண்டறிந்துள்ளனர். அதில் குறிப் பிட்டுச் சொல்வதற்கு உதாரணங்கள் கீழ்வருமாறு, செலிகளின் நாக்கு அடர்த்தியாகவும் பருத்தும் காணப்படுகின்றது. வாத்துகள், குள்ள வாத்துகள் முதலியவற்றில் பருத்துக் காணப்படும் நாக்கின் இரு

புறமும் பக்கவாட்டிலும் அமையப்பெற்ற நிறமூட்டுகள் உள்ளன. பெண்குளின் பறவைகளிலும், பெட்டில் பறவைகளிலும் நாக்கில் பின்புறமாக நீண்டு கெட்டிப்படுத்தப்பட்ட முகிழ்கள் காணப்படுகின்றன. தேன் உண்ணும் பறவைகளின் நாக்கு குழாய் ஷட்வமாகவோ அல்லது நிரீது குழாய் ஷட்வமாகவோ காணப்படுகின்றது. ஸ்டிரிக்டோபோடஸ் (Strigopodites) குடும்பத்தைச் சேர்ந்த பறவைகளில் நாக்கு மிகவும் ஒடுக்கப்பட்டுக் காணப்படுகின்றது. பறவைகளின் நாக்கில் கவை மொட்டுகள் பலவாறாக அமைந்துள்ளன.

அண்ண எலும்பின் மென்மையானப் பகுதிகளிலும் குரல்வளைப் பகுதியிலும் கவை மொட்டுகள் எண்ணிக்கையில் மிகவும் அதிகமாக உள்ளன. நாக்கின் பின்பகுதியில் நாக்கிந்தடியில் உருகி மொட்டுகள் பல இருக்கின்றன. உமிழ்நீர்ச் சுரப்பிகள் உள்ள இடங்களிலும் இவைகள் காணப்படுகின்றன. இருப்பினும் நாம் விடுகளில் சாதாரணமாகக் காணும் கொழிகளில் உருகி மொட்டுகள் கிடையாது. பறவைகளின் ஊய்க் குழியிலும் தொண்டையிலும் ப்ரெஸ்போரிசிடப்டர்க்ஸ் (Presso-receptor) என்ற உணர்ச்சி உறுப்புகள் உள்ளன. ஆத்தை, வாதது முதலிய பறவைகளின் நாக்கிலும் அண்ண எலும்புகளிலும் கிராண்டி கார்ப்பசுக்கள் (Grandy Corpuscles) உள்ளன. மீறும் பறவைகளின் தொண்டைக் குழியினால் செர்க்கல் உறுப்புகள் (Merkel bodies) என்ற உறுப்புகளும் உள்ளன. மரக்கொத்தி போன்ற பறவைகளில் ஹெர்ப்பீட் (Herbat) கார்ப்பசுக்கள் அண்ண எலும்பு, அசை முதலிய பகுதிகளில் உள்ளதாக விவரிக்கப்பட்டுள்ளன.

பறவைகளின் உமிழ்நீர் சுரப்பிகளின் துண்ணிய பகுதிகளின் அமைப்பை ஒப்பிட்டு ஆராய்தல் என்பது ஒரு நூற்றுண்டிற்குமேல் பல ஆறிஞர்களின் மிகச் சிறந்த சாதனைகளாகும். பறவைகளில் கீழ்க்கண்ட உமிழ்நீர்ச் சுரப்பிகள் அவை அமைத்திருக்கும் இடத்தைப் பொறுத்து பெயரிடப்பட்டுள்ளன.

1. நாக்குச் சுரப்பிகள் (Lingual)
2. தாவுடிச் சுரப்பிகள் (Sub lingual)
3. மேண்டிபுலார் சுரப்பிகள் (Mandibular)
4. தாண்டச் சுரப்பிகள் (Glands of the angle of the jaw)
5. பேலட்டைன் சுரப்பிகள் (Palatine)
6. கிரிக்ரோ ஆரிட்டென்டாய்ஞ் சுரப்பிகள் (Crico Arytendoid)
7. ஸ்பீனோடெரீகாய்ஞ் சுரப்பிகள் (Sphenopterygoid)

ஆக ஏழு சோடி உமிழ்நீர்ச் சுரப்பிகள் பறவைகளிலுள்ளதாகக் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளன.

பறவைகளின் உமிழ்தீர்ச் சுரப்பிகள், அமைப்பில் குழாய் வடிவமாகவே காணப்படுகின்றன. அவைகள் சில பறவைகளில் மிகவும் சாதாரண அமைப்பாக உள்ளன. சிலவற்றில் பல கிளைகளுடன் உள்ளன. மற்றும் சிலவற்றில் கொஞ்சம் சிக்கலான அமைப்பைப் பெற்றுள்ளன.

பறவை அவை உண்ணும் உணவிற்கெற்ப உமிழ்தீர்ச் சுரப்பிகள் பலவிதமான அமைப்பைப் பெற்றிருப்பதுவும் உண்டு. பொதுவாக வழுக்கிலேயும் திரவப் பொருட்களை உணவாக உண்ணும் பறவைகளில் உமிழ்தீர்ச் சுரப்பிகள் அய்வனவாக வளர்ச்சியுற்றுக் காணப்படுவதில்லை. ஆர்டுயா சினிசியா (Ardea Cinerea) என்ற பறவையில் தாவடி உமிழ்தீர்ச் சுரப்பிகள் (Inferior Lingual) என்ற ஒரு சோடி உமிழ்தீர்ச் சுரப்பிகள் மட்டுமே காணப்படுகின்றன. ப்ளோட்டஸ் ஆன்லிங்கு (Plots anhingea) என்ற பறவைகளுக்கு உமிழ்தீர்ச் சுரப்பிகளே கிடையாது. உணவுப் பொருட்களை நன்கு சுரப்பசைவுடன் பிணைத்து உட்செலுத்தும் பறவைகளான வாத்து, குள்ள வாத்து முதலிய பறவைகளில் உமிழ்தீர்ச் சுரப்பிகள் மிகவும் நெற்பாண முறையில் அமைந்துள்ளன. கொட்டை விதைகளை உண்ணும் பறவைகளிலும், புழு பூச்சிகளை உண்ணும் பறவைகளிலும் மற்றும் எவ்வாறான உணவுப் பொருட்களைவும் உணவாக உண்ணும் பறவைகளிலும் உமிழ்தீர்ச் சுரப்பிகள் மிகச் செறிப்புடன் நன்கு முழுமையாக வளர்ச்சியுற்றுக் காணப்படுகின்றன. பருத்துகளிலும் ஆத்தைகளிலும் க்ரைக்கோ ஆர்டனாய்டு (Crco artenoid) சுரப்பிகள் கிடையாது. மரங்கொத்திகளில் பெரிய நன்கு தெரியும் படியான பிக்கோரச் சுரப்பிகள் (Glandular Picorum) என்ற சுரப்பிகள் உள்ளன. அவற்றின் தானங்கள் நரகிற்கு அடியில் திறக்கின்றன. இச்சுரப்பிகளில் இரண்டுவிதமான பகுதிகள் உள்ளன. பிற்பகுதி ஒட்டிக்கொள்ளும் பசை போன்ற ஒரு திரவப் பொருளைச் சுரக்கச் செய்கின்றன. அப்பசைப் பொருள் குறிப்பிட்டுச் சொல்லக் கூடிய முறையில் மரங்கொத்திகளின் நாக்கில் இருப்பதைக் காணலாம்.

உமிழ்தீர்ச் சுரப்பிகளின் முதற்கண் செயல் கோழையை (Mucous) சுரக்கச் செய்வதேயாகும். கோழையின் முக்கிய செயல் உணவுப் பொருட்களை சுரப்படுத்துவதேயாகும். உமிழ்தீரில் அமிலேஸ் (Amylase) என்ற நொதிப் பொருள் உண்டு. இப்பொருள் இருப்பதை புழு, கோழி, வாத்து, வான்கோழி போன்ற பறவைகளின் உமிழ்தீர்ச் சுரப்பிகளிலிருந்து ஆராய்ந்துள்ளனர். ஒரு சிலர் உமிழ்தீர்ச் சுரப்பியில் அமிலேஸ் என்ற நொதிப்பொருள் கிடையாது என்றும், அவ்வாறு அவை உள்வாயில் உமிழ்தீர்ச் சுரப்பியில் தோன்றிற்றும்கூட.

தீனிப் பையிம் (Crop) தான் உபயோகப்படுத்தப்படும் என்றும் கூறிவுள்ளனர்.

பறவைகள் உணவு உட்கொள்ளும் பொழுது உயிற்றீர்ச் சுரப்பிகள் விரைவாகச் செயல்படுகின்றன. பட்டினியாகவுள்ள நேரங்களில் அவை அவ்வளவாகச் செயல்படுவதில்லை.

ஸ்கீப்ட் (Swift) பறவைகளின் உயிற்றீர்ச் சுரப்பிகள் பசைப் பொருளை உண்டாக்குகின்றன. அவற்றின் உதவியால் அப்பறவைகள் கூடு கட்டுகின்றன. கியூட்டூரா பெல்வாஜிக்கா (Chaetura Pelagica), ஏப்பஸ் (Aps) போன்ற பறவைகளில் இனப்பெருக்கக் காலங்களில் இமெண்ட் என்ற கெட்டியான பொருளை உண்டாக்கும் சுரப்பிகள் மிகுதியாகக் காணப்படுகின்றன.

பறவைகள் எவ்வாறு தங்கள் உணவை விழுங்குகின்றன என்பது அவ்வளவு தெளிவாகத் தெரியவில்லை. உணவுப் பொருள் தலையைத் தூக்கப்படுவதாலோ அல்லது தலையை மூடிமுமாக அழுத்தப் படுவதாலோ தொண்டைக்குள் செல்கின்றது. அவ்வாறு தலை மூன் முறமாக அழுத்தப்படுவதால் கொயண்ட் பிளவு மூடப்படுகின்றது. மற்றும், லேரிங்ஸ் (Laryngs) கலாசக் குழாய் (Trachea) முதலிய பகுதிகள் மூன்முறமாகத் தள்ளப்படுகின்றன. அவ்வாறு தள்ளப்படும் பொழுது அவை நாகின் அடிப்பகுதியைத் தொடுவதால் குரல்வளைத் துளையை (Glottis) மூடிவிடுகின்றது. அப்பொழுது உணவுப் பொருட்கள் உள்ளே தள்ளப்பட்டு உணவுக்குழாயை அடைகின்றது. பறவைகள் தண்ணீர் அருத்துவது வேறுவிதமாக உள்ளது.

பறவைகள் பொதுவாக நிரலப்பொருளை வாயினுள் செலுத்தியவுடன் வாயை மூடிக்கொண்டு தலையைத் தூக்குகின்றன. அப் பொழுது புவிமீர்ப்பின் சக்தியால் வாயினுள்ள நிரலம் உணவுக்குழாயினுள் செல்கின்றது.


உணவுக் குழாயும் தீனிப் பையும் (The Oesophagus & Crop)

தொண்டைக்கும் இரைப்பைக்கும் இடையேயுள்ள பகுதியே உணவுக்குழாயும் தீனிப்பையும்மாகும். இதன் வழியாகவே உணவுப் பொருட்கள் தொண்டையிலிருந்து இரைப்பையை அடைகின்றன. உணவுக்குழாயினுள்ள சுரப்பிகள் உணவுப்பொருட்களுடன் கலக்கும் படியான நிரலப்பொருட்களைச் சுரக்கச் செய்கின்றன. இத்திரவப் பொருட்களைச் சுரக்கச் செய்வதொடல்வாமல் உணவுக்குழாய், உணவுப்பொருட்களைச் சேமித்து வைக்கும் பெட்டகமாகவும் பயன்

பறவைகளின் ஜீரண மண்டலம்

படுகின்றது. உணவுப்பொருட்களை சேமித்து வைக்கும்பொழுது உணவுக்குழாயிலிருந்து தற்காலிகமாகவோ அல்லது எப்பொழுது காணும் படிவாகவோ உள்ள தங்குப்பை தோன்றுகின்றது. புழுப் போன்ற பறவைகளில் தங்குப்பைகள் புழுப்பாலைச் (Pigeon milk) சுரக்கச் செய்கின்றன. மற்றும் சில பறவைகளில் அவைகள் மிகவும் பெரிவதாகக் காணப்படுவதால் ஒலி உண்டாக்கப் பயன்படுகின்றன. கேயிப்பார்மில், கொயம்பிப்பார்மில் மற்றும் அவைகளை ஒத்த இனப் பறவைகளில் தங்குப்பைகள் (Crop) ஒரு நெத்த முறையில் சீரணத்திற்குரிய பெட்டகங்களாகப் பயன்படுத்தப்படுகின்றன.

மற்ற முதுகெலும்புள்ளப் பிராணிகளுடன் ஒப்பிட்டு நோக்குமிடத்து பறவைகளின் உணவுக்குழாய் நீளமானதாகவும் தன்ளுக பெரிவதாகவும், அவைகளின் உணவுண்ணும் முறைக்கேற்பவும் அமைந்துள்ளன. உணவுக்குழாய் கழுத்தின் மையப்பகுதிக்கு வலது புறமாக அமைந்துள்ளது. பறவைகளில் தங்குப்பைகள் இருக்கு-



படம் 21. பறவைகளின் திணிப்பைகளின் வகைகள்

- (அ) பேலாக்ரோகோரக்ஸ் பறவையின் (Phalacrocorax) ஒடுக்கப்பட்ட திணிப்பை
(ஆ) ஜிப்ஸ் ஃபல்வஸ் (Gyps fulvus) பறவையின் உண்மையற்ற திணிப்பை
(இ) பேவோ க்ரீஸ்டேட்டஸ் (Pavo cristatus) பறவையின் உண்மையான திணிப்பை.

1. உணவுக் குழாய் மேல்பகுதி, 2. ஒடுக்கப்பட்ட தங்குப்பை பகுதி, 3. உண்மையற்ற திணிப்பை, 4. உணவுக் குழாய்க் கீழ் பகுதி, 5. திணிப்பை.

மேலும், உணவுக்குழாயின் மேல்பகுதி (Upper) உணவுக்குழாயின் கீழ்ப்பகுதி (Lower) என்று இரண்டு பிரிவுகளாக பிரிக்கலாம். அதிக-

கனமான உணவுப் பொருட்களை (Bulky) உண்ணும் பறவைகளிலும், தங்குப்பைகளுள்ள பறவைகளிலும் உணவுக்குழாய் அகன்றும் மடிப்பு களுடனும் காணப்படுகின்றது. கிரெப்ஸ், தூய், ஆக், பகீப்ரீச், பெட்ரல், (க்)க், கார்போரென்ட், ஸ்டோர்க், நாகரகன், கட், கேலிபீயஸ், பருத்து, ஆந்தை, அரச மீன்கொத்தி (Grebe, Loons, Anks, Puffin, Petrel, Gull, Cormorants, Stork, Herons, Goot, Gallinules, Hawks, Owls, Kingfisher) போன்ற பறவைகளில் உணவுக்குழாய்ப் பகுதி குறுக்கில் மிகவும் அகன்று காணப்படுகின்றது. கொட்டை, புழு பூச்சி முதலியவற்றை உண்ணும் பறவைகளிலும், சிறு சிறு துண்டுகளை உணவாக உண்ணும் கிலிகளிலும், உணவுக்குழாய் மிகவும் குறுகிய குறுக்களவுடன் காணப்படுகின்றது. பெங்குவின், ஆக், பெட்ரல், கக் கானெட், பெலிக்கன், வாத்து, குள்ளவாத்து, கிரெய்ஸ், பருத்து, ஆந்தை, காக்கை முதலிய பறவைகளில் உணவுக்குழாய் நன்றாக வளர்ச்சியுற்ற பல மடிப்புக்களுடன் காணப்படுகின்றது.

உணவுக்குழாயிலுள்ள சுரப்பிகளும் கோழையையே சுரக்கச் செய்கின்றன. மாமிச பட்சணிப் பறவைகளில் இச்சுரப்பிகள் சாதாரணமாக குழாய் வடிவங்களுடன் காணப்படுகின்றன.

போதுவாக ஒரு மெவற்றைத் தவிர எவ்வாப் பறவைகளிலும் உணவுப்பொருளைச் சேமித்து வைக்கும் செயல் உணவுக்குழாய்க்கு உண்டது. உணவுப்பொருளைச் சேமித்து வைக்கும் செயல் உணவுக்குழாய்க்கு இருப்பினும், கிரெப்ஸ், பெங்குவின், பெட்ரல், கக், வாத்து, குள்ளவாத்து, ஆந்தை, மரங்கொத்தி, ஸ்டோர்க் போன்றவை (Steganopoda) பெசரைன் (Passerina) இனம் போன்ற பறவைகளில் உணவுப் பொருட்களைச் சேமித்து வைப்பதற்கு தனிவாள் நிறப்பாளை உணவுக்குழாயில் இல்லை.

உணவுக்குழாயிலின்று தோன்றி அதனிலும் தனித்து அகல மாக்கப்பட்டப் பகுதியே தங்கு பை (Crop) என்று அழைக்கப்படுகின்றது. தங்குப்பை என்று அழைக்கப்படும் பகுதிக்கு எவ்வாப் பிராணிகளிலும் உறுப்பொற்றுமை (Homologous) உண்டு. பெசரைன் பறவைகளில் தங்குப்பைக் கதிரி (Pisiform) வடிவ குடையதாகவுள்ளன. கேலிபார்மில் பறவைகளில் (Galliforms) தங்குப்பைக் உணவுக்குழாயில் கடைசிப் பகுதியில் இருமடல் களுடன் (Biloked) நன்றாக வளர்ச்சியுற்ற காணப்படுகின்றன. இத்தங்கு பைகள் உணவுப் பொருட்களால் நிறைந்திருக்கும் பொழுது கிபர்க்குலா (Purcula) எனும்பின் இருபுறங்களாலும் தாங்கப்படுகின்றது.

உணவுப் பொருட்கள் தங்குபைகளில் சேகரித்து வைக்கப்பட்டு, தொடர்ச்சியாக இடைவிடாமல் இரைப்பைக்குள் செலுத்தப்பட்டுக் கொண்டேயிருக்கின்றன. பட்டிலியாக இருந்த கோழிக் குஞ்சுகள் உணவுண்ணும் பொழுது உணவுப் பொருள் தன்விச்சை தசை அலைகளால் உணவுக் குழாயிலிருந்து அரணைப்பை (Gizzard)யை அடைகின்றது. அவ்வாறு முதன் முதலாக உண்ணப்படும்பொழுது உணவு அரணைப்பையை அடைவுப்பொழுது தங்குப்பை மூடிக்கொள்கின்றது. இவ்வாறு உணவுப் பொருள் உணவுக்குழாயினுள் பெரிண்டாவிலில் அசைவிலுக் செல்லும்பொழுது வினாடிக்கு பல சென்டிமீட்டர் தூரம் செல்வதாகக் கணக்கிடப்பட்டுள்ளது. ஆகையால் முதலில் சென்ற உணவு அரணைப்பையை அடைந்தவுடன் தங்குபைகளினுள்ள சுருங்குத் தசைகள் விரிவடைகின்றன. அவ்வாறு தசைகள் விரிவடைவதால் தங்குபைகள் நன்றாகத் திறக்கப்பட்டு, மறுபடியும் மறுபடியும் உண்ணும் உணவுப்பொருட்கள் தங்குபைகளை அடைகின்றன. பின்பு உணவுப் பொருட்கள் சிறிது சிறிதாக இரைப்பைக்குள் செலுத்தப்படுகின்றன. உணவுப் பொருள்களில் ஒரு சிறு பகுதி சில சமயங்களில் 24 மணி நேரம்கூட தங்குபைகளில் இருக்குமென்று கணக்கிடப்பட்டுள்ளது.

தங்குபைகளில் பெரிண்டாவிலில் அசைவிலுக் மூளை நரம்பின் பத்தாவது நரம்பான வேகஸ் நரம்பின் (Vagus) இயக்கமீட காரணமாகும்.

புறவின் தங்கு பைகளின் சுரப்பிகளில் அமிலேஸ், இன்வெர்ட்டேஸ் என்ற (Amylase invertase) நொதிப்பொருள்கள் உள்ளன. இச்சுரப்பிகள் இம்மாதிரியான நொதிப்பொருள்களைச் சுரக்கச் செய்வதால் இவைகளை பேரா உமிழ்ச்சுரப்பிகள் (Pancreatic glands) என்று அழைக்கலாம்.

புறக்களிலும், மாடப்புறக்களிலும் (Pigeons, doves) தங்குபைகளுக்கு புறப்பாலைச் சுரக்கச் செய்யும் தகவமைப்பு உள்ளது. இருபால் பறவைகளிலும் தங்குபைகளின் கொழுப்புப் பொருள் சேர்த்த செல்லிலிருந்து பால் சுரக்கின்றது. இரு பால் பறவைகளிலும் முட்டைகளை அடைவைக்கப்பட்டுக் காக்கப்பட்ட எட்டாவது தாளிலிருந்து, முட்டையிலிருந்து குஞ்சு பொரித்து 18 நாட்களுக்கு புறப்பால் தங்கு பையில் சுரக்கின்றது. புறப்பாலில் கொழுப்புச் சத்து (25—30%) லெசிதின் (Lecithin) (5%) புரதச் சத்து (10—15%) முதலியன உள்ளது. சர்க்கரைப் பொருள் இடையாது. ஆனால் வளர்ச்சிக்குச் சாதகமான வைட்டமின்கள் புறப்பாலில் உள்ளன. பீரோலேக்டின் என்ற ஹார்மோனின் தூண்டுதலினுடையே தங்கு பையின் செல் அடுக்குகள் புறப்பாலில் சுரக்கச் செய்கின்றன.

ஆண் பறவைகள் மொவற்றில் உணவுக்குழாய் குறிப்பிடத்தக்க பெரிய உறுப்புகளாக மாறி, அங்வுறுப்புகளின் உதவியுடன் விநோதமான சத்தம் உண்டாக்கி பெண் பறவைகளை இனப் பெருக்கக் காலம் களிக் கவர்பின்றன. இதுபோன்ற அமைப்புகளை புரு, கிரெனஸ், திக் கோழி முதலிய பறவைகளில் காணலாம்.

பறவைகளின் இரைப்பைப்பகுதி

பறவைகளின் இரைப்பைப்பகுதி பொதுவாக இரு தனித்தனி பிரிவுகளாக உடையது. முன்னறை, கரப்பிகள் நிறைந்தது. அதற்கு கரப்பி இரைப்பை அல்லது ப்ரோவென்ட்ரிக்குலஸ் (Proventriculus) என்று பெயர். பின்னறைக்கு, அரவைப்பை அல்லது வென்ட்ரிக்குலஸ் (Ventriculus) என்றும் பெயர். அது தசைகளடாத்த கவரிகளைப் பெற்றது. முன்னறையான ப்ரோவென்ட்ரிக்குலஸ் சீரணிப்பதற்குதவும், இரைப்பை நிரவத்தை (Gastric Juice) கரக்கச் செய்கின்றது. பின்னறும் அது உணவுப் பொருள்கள் உணவுக் குழாயினின்றும் தசைக் கவர்களாலான வென்ட்ரிக்குலஸ் அல்லது அரவைப் பைக்குச் செல்வதற்கு வழியாக அமைந்துள்ளது. மற்றும் இப்பகுதி உணவுப் பொருட்களைச் சேமித்து வைக்கும் இடமாகவும், அமிலங்களை உற்பத்தி செய்கும் உறுப்பாகவும் பண்பபடுகின்றது. அரவைப்பையில் உணவுப் பொருட்கள் சீரணிக்கப்படத்தக்க முறையில் அரைக்கப்படுகின்றது. ஆகையால் இப்பகுதி மற்ற பிராணிகளிலுள்ள பற்களுடன் செயலொற்றுமை பெற்றுள்ளது. இப்பகுதியும் உணவுப் பொருட்களைச் சேமித்து வைப்பதுடன், அமிலங்களை உற்பத்தி செய்கின்றது. இது தவிர தாரை, ஸ்டீரோக், கார்கோரென்ட், பாம்புதாரா (Heron, Stork, Cormorant, Darter) முதலிய பறவைகளில் இரைப்பை பகுதியும் மிவருடல் பகுதியும் செருமிடத்தில் பைலோரிக் இரைப்பைப்பகுதி (Pyloric Stomach) என்ற மற்றொரு பகுதியும் உண்டு.

ப்ரோவென்ட்ரிக்குலஸ் (Proventriculus)

இப்பகுதி ஒரு குழாய் வடிவமுடையது. பின்னறும் பெருந்தீவி இன்னும் ஆல்பெட்ராஸ் கிப்பம்ஸ், கக், கார்கோரென்ட், ஸ்டீரோக் (Albatross fulmar, Gull, Cormorant, Stork) முதலிய பறவைகளில் குழாய் வடிவமுடைய இப்பகுதி தன்ளுக நீளும்படி அமைந்துள்ளது. இப்பகுதியிலுள்ள கரப்பிகள், பறவைகளில் பல்வேறு விதமாக அமைந்திருக்கும்.

இக்கரப்பிகளின் அமைப்பு பலவாறாக வேறுபட்டு காணப்படும். அவைகள் உருவம், நீள் உருவம் போன்ற வடிவவிக்ருடல் இருக்கும்.

இச்சுரப்பிகளின் நாளங்கள் புரோவென்ட்ரிக் குவஸ்சில் குறுக்காக சென்று அவ்விடத்தை அடைகின்றன. இச்சுரப்பிகளால் சுரக்கும் திரவம் புரோவென்ட்ரிக் குவஸை அடையும் விதமும் பலவாறு கக் காணப்படுகின்றன. இச்சுரப்பிகளினால் சுரக்கப்படும் பொருள் குழாய்வடிவமுடைய ஒரு அறையை அடைந்து அங்கிருந்து ஒரு நாளம் மூலமாக புரோவென்ட்ரிக் குவஸை அடைகின்றது. இது போன்ற சிறிது மாறுபட்ட அமைப்பையே ஆசிட், (ங்) கல், கிளி, குயில், மரங்கொத்தி, பெட்ரல், வாத்து, குள்ளவாத்து (Alcid, Gull, Parrot, Cuckoo, Wood Pecker, Petrel Duck, Geese) முதலிய பறவைகளில் காணலாம். கேலிக்பார்ம் பறவைகளில் இச்சுரப்பிகளில் பல இதழ்களுள்ளன. இச்சுரப்பிச் செல்கள் புரோவென்ட்ரிக் குவஸ் பகுதி முழுவதும் ஒரே மாதிரியாகக் காணப்படுகின்றன.

இச்சுரப்பிகளின் முக்கிய செயல் சேரணநீரைச் சுரக்கச் செய்வதே யாகும். இச்சுரப்பிகள் சுரக்கச் செய்யும் செரி நீருக்கு அமிலத் தன்மையும் புரோட்டிபோலிட்டிக் அல்லது புரதப்பொருளை சேரணிக்க உதவும் தன்மையும் உண்டு, என்பதை 18ஆம் நூற்றாண்டிலேயே ரேமர் (Reaumur) என்பவர் கண்டுபிடித்துள்ளார். இவர் கழுஞ், பருந்து, ஆந்தை முதலிய பறவைகளின் சேரண நீரைக் கொண்டு ஆராய்ச்சி நடத்தியே மேற்கண்ட உண்மையைக் கண்டறிந்தார். சேரணநீரில் ஹைட்ரோ க்ளோரிக் அமிலம் உள்ளதாகக் கண்டுபிடிக்கப்பட்டிருப்பினும் அதன் அடர்த்தி (Concentration) எவ்வளவு என்று சரிவரத் தெரியவில்லை. பெப்சின் (Pepsin) என்ற நொதிப் பொருள் பறவையில் உண்டு. சில பறவைகளின் சேரண நீர்களை இதுபற்றி ஆராய்ந்தபொழுது பெப்சின் பாலூட்டிகளில் எவ்வாறு செயல்படுகின்றதோ அதேபோன்று பறவைகளிலும் செயல்படுகின்றது என்று தெரியவருகின்றது. ரெனின் போன்ற மற்ற புரதப் பொருளைச் சேரணிக்கச் செய்யும் நொதிப்பொருள் பறவைகளில் உள்ளதா? என்பது சந்தேகத்துக்குரிய ஒரு விஷயமாகும். பறவையின் இரைப்பை சேரண நீரில் லிப்பேஸ்கள் (Lipases) உள்ளன என்பதற்கு வேண்டிய ஆதாரங்கள் உள்ளன.

ஹார்மோன்களின் முயற்சியாலும் நரம்பு மண்டலத்தின் சிறந்த செயல்படும் தன்மையாலும் புரோவென்ட்ரிக் குவஸ் சீராகத் திரவங் களைச் சுரக்கச் செய்கின்றது.


பறவைகள் அவை உண்ணும் உணவின் தரத்தைப் பொருத்தே சேரணநீர் அதிகமாகவோ குறைவாகவோ சுரக்கின்றது. க்ரோபெல்ஸ் (Groebells) என்பவர் வாத்துகளிலும் குள்ள வாத்துகளிலும் உருளைக் கிழங்கு, இறைச்சி முதலியவற்றை அவைகள் உண்ணும்பொழுது சேரண நீர் அதிகமாகச் சுரக்கின்றது என்றும், ரொட்டி, தானியங்கள்

மூதவியலற்றை அவை உண்ணும்போழுது சீரண நீர் குறைவாகச் சுரக்கின்றது என்றும் கண்டறிந்துள்ளனர்.

பெட்ரல், ஆம்பெட் ரால் பறவைகளில் இப்பகுதி குறிப்பிடத் தக்க மூன்றாவது நிறப்பாக அமைந்துள்ளது. இப்பறவைகள், சீரணத்தின்போழுது இப்பகுதியில் சுரக்கும் ஒரு எண்ணெய்த் திரவத்தைக் கக்கியிருக்கின்றன என்று கண்டுபிடித்துள்ளனர்.

வெள்ட்ரிக்குலை அல்லது அரவைப்பை

இப்பகுதி வெகுநாட்களுக்கு முன்பிருத்தே பல விவங்கியல் அறிஞர்



களின் விவாதத்திற்குரிய பகுதியாக இருந்திருக்கின்றது. இப்பகுதி தடித்த தசைச் சுவர்களாலானது. இத்தப் பகுதியும் பல்வேறு பறவைகளில் பல்வேறு மாற்றங்களுடன் அவை உண்ணும் உணவிற்கேற்ப அமைந்துள்ளது. கொட்டை மீனதகளை உண்ணும் பறவைகளிலும், சாக மட்சினிப் பறவைகளிலும் இப்பகுதியின் தசைச்சுவர் தனது வளர்ச்சியுற்றிருப்பதைக் காணலாம். புறானுண்ணிப் பறவைகளில் இப்பகுதி செவ்விய தசைச் சுவர்களைக் கொண்டதாயும் ஒரு பை போன்றும் அமைந்துள்ளது. அரிவத்துண்ணி (Omnivorous) பறவைகளிலும் புழுபூச்சிகளை உணவாக உண்ணும் பறவைகளிலும் மேலே கூறப்பட்ட, இரண்டுவிதத்திற்கும் இடைப்பட்டதாக அமைந்துள்ளது. பறம் தின்னும் அநிலும் மிகவும் மிகுதுவான பழத்தின் பாகங்களையுண்ணும் பறவைகளில் தசைச்சுவர் மிகவும் ஒடுக்கப்பட்டுக் காணப்படுகின்றது.

படம் 22. பறவைகளின் அரவைப் பையில் நிறத்த அமைப்பிற்கு மூலிய உதாரணங்கள்

(அ) ஆர்சுலா சினீரா (Ardea cinerea)
(ஆ) இயல் பறவை (Gyps fulvus)
(இ) பேரோவ் கிரீஸ்டேட்டஸ் (Pavo cristatus)

1. உணவுக்குழாய், 2. பீரோவென்ட் கிக்குலை, 3. பைரோவல், 4. மூட்டுக் குழாய் பை, 5. அரவைப்பை, 6. பைரோவிக் இரைப்பை, 7. பைரோவிக் பர்சா, 8. இய்த்துமல்

அரணவப்பைக்கு தான்கு வேலைகள் உள்ளன. (1) இது உணவுப் பொருட்களுக்கு ஒரு சேமிப்பு இருப்பிடமாகச் செயல்படுகின்றது. உணவுப் பொருட்கள் சீரண நீர் தள்ளுக துழைத்து, அமிலத்தன்மை யுடனும், புரதப் பொருட்களைச் சீரணிக்கச் செய்யும்வரை தங்கு கின்றன. பின்பு உணவுப் பொருட்கள் நெருடலை அடைகின்றது. மாமிச பட்சணிப் பறவைகளில் உணவுப் பொருட்கள் பெரும்பாலும் இப்பகுதியில் தங்கிச் செல்கின்றன.

(2) மூள்பே கூறியதுபோல இப்பகுதி அமிலங்களை உற்பத்தி செய்து அமிலத்தன்மையை ஏற்படுத்தி, புரதப் பொருட்களை சீரணிக்க உதவுகின்றது.

(3) மற்ரும் இப்பகுதியில் தான் உணவுப்பொருட்கள் தள்ளுக அரைக்கப்படுகின்றன. கொட்டை, கிதை முதலியவற்றை உண்ணும் பறவைகள், தாவரமுண்ணிகள், புழு பூச்சிகளை உண்ணும் பறவைகள் முதலியவற்றில் இந்தப் பகுதி குறிப்பிடத்தக்க முறையில் அமைப்பப் பெற்றுள்ளது.

(4) கடைசிவாக, உணவுப்பொருட்கள் அரணவப்பையிலிருந்து, நெருடலை அடைவதற்கு உதவுகின்றது. இப்பகுதிகளிலுள்ள தசைச் சுளிகளின் குறிப்பிட்ட அசைவுகளால் உணவுப் பொருள் நெருடலிலிருந்து தள்ளப்படுகின்றது.

ஹைட்ரஜன் அயான், புரதச் சத்துக்கள் சீரணிக்கப்படுவதற்கு P H-2 ஆக இருத்தல் வேண்டும்.

தானியங்களை உணவாக உண்ணும் பறவைகளிலும், தாவர வுண்ணிப் பறவைகளிலும், அகிதத்துண்ணிப் பறவைகளிலும் அரணவப்பையில் நெரு கற்கள் அல்லது கிரிட் (Grit) உள்ளன. பறவைகள் பவவற்றில் அப்பகுதியில் கற்கள் இருப்பதாகக் கூறப் படினும், கோழிகளில்தான் அவைகளைப்பற்றி முழுமைவாக விளக்கப் பட்டுள்ளது.

உணவுப் பொருள் அரணவப் பையில் தங்கும் நேரம் பறவைகளின் இனத்திற்கு இளம் வேறுபடுகின்றது. வாத்து, குள்ளவாத்து, கோழி முதலிய பறவைகளில் உணவுப் பொருள் சுமார் 3 மணி நேரம் அரணவப் பையில் தங்குகின்றன.

பைலோரிக் இரைப்பை பகுதி

அரணவப் பைக்கும் நெருடலிலிருக்கும் இடையில் பைலோரிக் இரைப்பை பகுதி உள்ளது. இவை நோன்றிய கிதமும், செயலும் பவவிதப் பறவைகளில் பவவிதமாக உள்ளது. கார்மோரென்ட்,

யாம்புதாரா, தர்ரை, ஸ்டிரோக், லிரெப், தண்ணீரில் தடக்கும் பறவைகளான வாத்து, குள்ளவாத்து முதலிய பறவைகளில் பைலோரிக் அல்லது குடற்பக்க இரைப்பை பகுதி உண்டு. உணவுடன் அதிகமாக தண்ணீரையும் சேர்த்து உட்கொண்டு அவைகள் பைலோரிக் இரைப்பை பகுதியை அடைகின்றன. லிரெப் பறவைகளில் இப்பகுதியில் சிறு சிறு இறகுகள் போன்ற அமைப்புகள் உள்ளன. அவை உணவுப் பொருட்களை வடிவக் கட்டி அடுத்தப்பகுதிக்கு அனுப்ப உதவுகின்றது. யாம்புதாராப் பறவைகளில் அப்பகுதியில் மயிர்க்கற்றை போன்ற சிறு சிறு நீட்சிகள் உள்ளன. அவையும் உணவுப் பொருட்களை வடிவக் கட்டி அனுப்ப உதவுகின்றன.

சிறுகுடல்

மூக்கியமாக உணவுப்பொருட்கள் சிறுகுடலிலேயே சீரணிக்கப் படுகின்றன. இப்பகுதியில்தான் சீரணிக்கப்பட்ட உணவுப் பொருட்கள் இரத்தத்துடனும் நினைநீருடனும் கலக்கின்றன. சிறுகுடலிற்குள் செல்லும் உணவுப் பொருளின் சிறுகுடல் கவர்கள், தங்கள் அசையிலும் சிறிது சிறிதாக அடுத்த பகுதிக்கு தள்ளுகின்றன. சிறுகுடலின் செல்களில் சில, நாளமிக்வாச் சுரப்பிகளின் ஹைலையச் செய்கின்றன. சிறுகுடல் இது பீசிவுகளாகப் பிரிக்கலாம். முன் பீசிவிற்கு டியோடினம் (Duodenum) என்று பெயர். பின் பீசிவிற்கு இலியம் (Ileum) என்று பெயர். டியோடினத்தை ஒட்டிபே அதன் U வடிவப் பகுதியில் க்னைவம் (Pancreas) அமைந்துள்ளது. சிறுகுடலின் குழல் மிசன்ட்டெரிகளின் அமைப்புகள் பவவானாக இருக்கும்.

உணவு உண்ணும் பழக்கங்களுக்கும், முன்போர்களின் சிறுகுடல் அமைப்பைப் பொருத்தும் பறவைகளிலும் சிறுகுடல் அமைப்பில் பவவானான வேறுபாடுகள் உள்ளது. சிறுகுடல் டியோடினன் குழல் U வடிவமுடையதாகவிரும்பதால் முதலில் ஒரு பக்கத்துக் குழல் பெருங்குடல்வரை நீண்டு, பின் பு மற்றொரு குழல் அரவைப் பைவரை மெய்தோக்கி நீள்கின்றது. தாவரவுண்ணி பறவைகள் தாவிலங்களின் உண்ணும் பறவைகள் முதலியவற்றில் இலியம் மிகவும் நீளமாக இருக்கும். புளானுண்ணிப் பறவைகளில் இலியம் மிகவும் குட்டையாகவிரும்பும். சில சமயங்களில் அதனுடன் மெக்கலின் உறுப்பு என்ற பகுதி (வனர் கருவின் போக் பகுதியின் சிறு பகுதி) ஒட்டிக் கொண்டிருக்கும்.

சிறுகுடலின் உள் கவர் அருக்கு வெய்ப்பர்க்கள்களின் நீட்சிச் செய்களாயானது (Crypts of Lieberkühn). இவைகளிலும் சிறுகுடல் பகுதி பவவானான தகவமைப்புகளைக் கொண்டுள்ளது. இச்செய்களின் உதவியிலும் அதிக அளவு உணவுப் பொருட்களை உள்சேர கிரடுக்கக் கூடும்.

ஹெகுடல் தன்பகுதியில் பல தொழிப்பொருள்களைச் சேர்த்துச் செய்வதால் ஒரு கடிக்கும் உறுப்பாகவும் தன்னுள் பல பொருள் சேரணிக்கப்படுவதால் ஒரு சேனை உறுப்பாகவும் செயல்படுகின்றது. பறவைகளில் ஹெகுடலின் சேனை நீரான சேக்கல் என்ட்ரிக்ஸ் (*Sacculus entericus*) குறித்து அவ்வளவு விவரமாகத் தெரியவில்லை. கொழிகளின் ஹெகுடல் சேனை நீரை ஆராய்ச்சி செய்ததன் பலனாக அது ஒரு காரத் திரவம் என்றும் (Alkaline fluid) அதன் PH 8 என்றும் கணைய நீர் அல்லது மித்த நீருடன் சேர்த்தால் நடுநிலை (Neutralise) ஆகின்றது என்றும் உறப்படுகின்றது. ஹெகுடல் சேனை நீரின் தொழிப் பொருள்களைப் பற்றியும் அவ்வளவு விவரமாகத் தெரியவில்லை. ஹெகுடல் சேனை நீரில், புரதச்செரி தொழில்களும் சர்க்கரைச் செரி தொழில்களும், கொழுப்புச் செரி தொழில்களும் உள்ளன. ஹெகுடலின் சேனை நீரிலேப்பற்றி ஆராயும்பொழுது, கணைய நீரிலுள்ள புரதச் சத்து, சர்க்கரை, கொழுப்பு முதலியவற்றைச் சேரணிக்கச் செய்யும் தொழிப்பொருட்களைப்பற்றியும் அறிந்து கொள்ளுதல் அவசியமாகும். இவைகளையாமல் ஹெகுடலிலுள்ள துள்ளிய உறுப்புகளும் ஊட்டச் சத்துக்களை மீறியெடுத்திரு பவனுள்ளதாகக் கொடுக்கின்றன. பாலுரட்டிகளில் உள்ளது போன்றே பறவைகளிலும் ஹெகுடலில் புரதச் சத்து, சர்க்கரை, கொழுப்பு பொருள், கொழுப்புப் பொருள் முதலியவைகள் சேரணிக்கப்படுகின்றன. ஹெகுடலின் வழியாக உணவுப் பொருட்கள் செல்லும்பொழுது அவை சேரணிக்கப்படு தனுக்கு தங்கும் நேரம் பல்வேறு பறவைகளில் பல்வாறுகவுள்ளது. மாயிசபட்சனிப் பறவைகளில் ஒரு சிறிது நேரமே உணவுப் பொருள் ஹெகுடலில் தங்குகின்றன. பழம் தின்னும் பறவைகளில் அதிக நேரம் தங்குகின்றன.

ஹெகுடலின் உணவுப் பொருட்களை அடுத்தப் பகுதிக்குத் தள்ளும், பெலிட்டாவிட்டிக் அசைவு வேகம் தரம்பின் ஊக்கு வித்தலால் இருப்பினும் இவ்விவரத்தின் கடைசிப் பகுதி தன்னிச்சை வினாவேயே உணவுப் பொருட்களை பெருங்குடலினுள் செலுத்து கின்றது.


பெருங்குடல்

ஹெகுடலின் கடைசி நீட்சியே பெருங்குடல் பகுதியாகும். இது ஹெகுடல் மூட்டுக் குழாய்களிலின்றும் தோன்றி பொதுப்புகழைவரை அமைந்துள்ளது. பொதுவாக பெருங்குடல் மிகவும் குறுகிய பகுதி யாகும். ரீவா அமெரிக்கா, பாஸாபீடியா கார்னூட்டா (*Rhea americana*, *Palamedea cornuta*) போன்ற ஒரு சில பறவைகளில் மட்டும் பெருங்குடல் சற்று நீளமாக அமைத்திருக்கும். பெருங்குடல் ஹெகுடலினின்றும் தள்ளப்பட்ட கழிவுப் பொருட்களை தள்ளித்தே

நிறிது நேரம் தங்கச் செய்வதற்கு ஒரு சேமிப்பு நிலையமாகவிருக்கின்றதேவலியாமல், அதற்கென்று வேறு தனிச் செயல்கள் இல்லை. பெருங்குடலில் நிறிது அளவு சீரணம் ஏற்படுகின்றது. பெருங்குடல் கவ? செய்கள் அங்கு தங்கும் பொருட்களினின்றும் தண்ணீரை உறுதிப்படுத்துகின்றன. பெருங்குடல் செய் அடுக்குகள் பெருங்குடலும் நிறு குடல் செய் அடுக்குகளை ஒத்தேயிருக்கின்றன.

பொதுப்புழை

பெருங்குடலின் கடைசி நீட்சிப் பகுதியே பொதுக்கழிவறையாகும். சீரணமண்டலம், இனப் பெருக்க மண்டலம், கழிவு மண்டலம் ஆகியவற்றின் பொது அறையாக பொதுப்புழை அமைந்



படம் 23. புழு-பொதுக்கழிவறையின் நீள் வெட்டுத் தோற்றம்

1. காரோடேவியம், 2. பூரோடேவியம், 3. ப்ரோக்டோடேவியம், 4. *முதுகுப்புழை, 5. நிறுநீரக நாளம், வித்து நாளம்-இவற்றின் அரும்புகள் (Papillae), 6. பச்சை-பெயரணை, 7. கருக்குத் தசை, 8. கோழைச் சுரப்பிகள், 9. பொதுப்புழை, 10. புறத் தோலுக்கு, 11. பெருங்குடல்.

துள்ளது. இதில் மூன்று தனித்தனியான பகுதிகள் ஒன்றிலின்றும் ஒன்று பிரித்துக் காணும்படி அமைந்துள்ளன. அவைகள் குறுக்குச் கவர் மடிப்புள்ளால் பிரிக்கப்பட்டுள்ளன.

பறவைகளின் சீரண மண்டலம்

மலவழி அல்லது காப்ரோடேயியம் (Coprodæum) என்னும் பகுதி முதல் பகுதியாகும். இது பெருங்குடையுடன் தொடர்பு கொண்டும் ஒரு பகுதியாகும். அடுத்த பகுதிக்கு நெதர் வழி அல்லது யூரோடேயியம் (Urodæum) என்று பெயர். இப்பகுதியினுள் அண்டநாளம் அல்லது கித்தகநாளமும் நெதர் நாளங்களும் (Vetere) இறக்கின்றன. இப்பகுதி மலவாய் வழி அல்லது ப்ரோக்டோடேயியம் (Proctodæum) என்ற அடுத்த பகுதியுடன் இணைந்துள்ளது. ப்ரோக்டோடேயியம் பொதுப்புழை வழியாக (Anus) வெளியே நிறக்கின்றது.

செல் அடுக்குகளின் அமைப்பைக் காணும்பொழுது பொது அறையின் செல் அடுக்கை, பெருங்குடவின் செல் அடுக்கை ஒத்த காணப்படுகின்றன. ஆனால் பொதுப்புழையின் செல் அடுக்குகளில் வட்டவடிவமான பல செல்களுள்ளன.


குஞ்சு பறவைகளில் பெருங்குடவிற்கும் பொதுப்புழைக்கு மிடையில் முதுகுப்புறப் பக்கத்தில் ஒரு வெளிப் பிதுக்கம் உள்ளது. அதற்கு மர்சாபேரிசியஸ் (Marsa fibris) என்று பெயர். பறவை வளர வளர இப்பகுதி கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தேய்வடைந்து நெதர் மண்டலத்துடன் கலந்து விடுகின்றது.

குடல் பகுதிகளின் சீக்கங்கள் அல்லது முட்டுக் குழாய்கள்

பறவைகளில் பொதுவாக நெகுடவிற்கும் பெருங்குடவிற்கும் நடுவில் ஒரு சோடி குடல் முட்டுக் குழாய்கள் உள்ளன. இவ்வினில் குஞ்சு பறவைகளிலோ, முதிர்ச்சியுற்ற பறவைகளிலோ இப்பகுதி கிடையாது. நெகுடவால் இசை எழுப்பும் பறவைகள், ஸ்வீட் (Swift) பறவைகள், புழு, மரங்கொத்தி முதலிய பறவைகளில் முதிர்ச்சியுற்ற பறவைகளில் குடல் பகுதியின் முட்டுக் குழாய்கள் கிடையாது. தானைகளில் ஒரு சோடி சீக்கங்களில் ஒரே ஒரு சீக்கம் வளர்ச்சியுற்றும் மற்றொன்று பெரிதும் ஒடுக்கப்பட்டும் காணப்படுகின்றன. தாவர வுண்ணிப் பறவைகளிலும், அணைத்துண்ணிப் பறவைகளிலும், இப்பகுதி நன்றாக வளர்ச்சியுற்றுக் காணப்படுகின்றன. தானியங்களை உணவாகவுண்ணும் பறவைகளில் இது மிகவும் ஒடுக்கப்பட்டுள்ளது. டெட்ராணிடு குடும்பத்தைச் சேர்ந்த பறவைகளிலும் தீக்கொழி களிலும் (Tetraonidae, Struthiscameles) இப்பகுதி வெகுவாக வளர்ச்சியுற்றுக் காணப்படுகின்றது. தோற்றத்தில் இம்முட்டுக் குழாய்கள் குடல்களின் அமைப்பையே ஒத்திருக்கின்றன. ஆனால் இவற்றில் நெதர் நிக்கல் குறிப்பாக கேலிப்பார்ட் பறவைகள் டைனமஸ் பறவைகள் வந்து, குள்ள வந்து, நீரில் நடக்கும் ஆற்றலுள்ள பறவைகள் முதலியவற்றில் அதிகமாகக் காணப்படுகின்றன.

பறவைகளில் 4 விதமான மூட்டுக்குழாய்கள் (Caecae) இருப்பதாகக் காணப்படுகின்றன.

(1) முதல் வகை : இது மிகவும் பழமையான தொன்மையும், இதுதான் பொதுவாகப் பல பறவைகளில் காணக்கூடியதும் ஆகும். இவ்வகையில் மூட்டுக்குழாய்கள் மிகவும் மெல்லிய கவர் களாலானது.



படம் 24. பறவை-குடக் பகுதியின் மூட்டுக் குழாய் வகைகள்

(அ) ஸ்ட்ரூத்தியோ கேமெல்லஸ் (Struthio camelus)

(ஆ) கேலிட்ரெமாஸ் எலிகம்ஸ் ((*Calidrems elegans*)

(இ) கோழி (Domestic fowl)

இவற்றில் உணவுப் பொருள்கள் காணப்படுவதால், ஒரு சிறு பகுதி சீரணமும் நடைபெறுகின்றது. இதுபோன்ற முதல் வகை மூட்டுக் குழாய்களை வாத்து, குள்ளவாத்து, பறக்கும் சக்தியற்ற பறவைகளில் சில, கிரெப்ஸ், ஹான், பெலிக்கானிடே குடும்பப் பறவைகள், டிரோகன், ரோவர் பறவைகள், தேனி உண்ணும் பறவைகள் (Ducks, Garga, Some Ratites, Grebes, Loons, Pelicanidae, Trogons, Roller, Bee eaters) போன்ற பறவைகளில் காணலாம்.

(2) இரண்டாவது வகை : இவ்வகையில் மூட்டுக்குழாய்கள் மிகவும் பெரியதாகக் காணப்படுகின்றன. இவ்வகையில் செவ்ஹு ஹான் பொருட்களை சீரணிக்கும் வகையில் மூட்டுக்குழாய்கள் தகவமைப்புகளைப் பெற்றுள்ளன. இப்பகுதியில் தினதீர் நிக்கனும் அடுகமாகக் காணப்படுகின்றன. இவ்வகை கேலிப்பார்ம் குடும்பப் பறவைகள், ஸ்கீடர்சு, ரெயிங், கிரெளஸ், நீலம் நடக்கும் ஆற்ற ஹான் பல பறவைகள், ஆந்தைகள் முதலியவற்றில் காணலாம்.

(3) மூன்றாம் வகை : இதற்கு தினதீர்ப் படைத்திக வகை (Lympho epithelial type) என்று பெயர். இவ்வகை மூட்டுக் குழாய்

களுக்கு உணவுப் பொருட்களை சீரணிக்கச் செய்யும் செயல் நடைபாது. இவை அமைப்பில் மிகவும் ஏடுக்கப்பட்டு காணப்படுகின்றன. இவை பெசுலிப்பார்ம் பறவைகளிலும், மாடப்பூரூ, புரூ போன்ற பறவைகளிலும், நீசில் நடக்கும் சக்திபெற்ற சில பறவைகளிலும் காணலாம்.

(4) ஊன்காம்பு வகை! இவ்வகையில் முட்டுக்குழாய்கள் மிகவும் மெலிந்தும், இருத்தும் இவ்வகைப்போன்ற எஞ்சிய நிலையில் காணப்படும் (Vestigial). இவ்வகைக் குழாய்கள் பெண்குவின் பறவைகள், பெட்ரக்கள், கருகுகள், கிளிகள், பழந்தின்னிப் பறவைகள், மரக் கொத்திகள், ஸ்பிப்ட், பாடும் பறவைகள், அரச மீன் கொத்திகள் முதலிய பறவைகளில் காணலாம்.


முட்டுக்குழாய்களின் முக்கியச் செயல்களாவன

அவைகள் உணவுப் பொருட்களிலுள்ள தண்ணீரை உறுஞ்சுகின்றன. புரதமில்லாத எதட்டோரோசுப் பொருட்களையும் உணவிலிருந்து உறுஞ்சுகின்றன. இப்பகுதியில் புரதமும், சர்க்கரைப் பொருளும் சீரணிக்கப்படுகின்றன. செல்லுலோஸ் என்னும் பொருள் இப்பகுதியில்தான் சிதைக்கப்படுகின்றது. வைட்டமின்களின் உற்பத்தியும் அவை இரத்தத்துடன் கலப்பதும் இப்பகுதியில்தான் நடைபெறுகின்றது.

கல்வீரல்

கல்வீரல், பறவைகளில் சரிதழ்களைக் கொண்ட நன்றாகக் காணக்கூடிய ஒர் உறுப்பாகும். அதில் வலதுப் பக்க கல்வீரல் பகுதி மிகவும் பெரியதாகவும், இடப் பகுதி சற்று சிறியதாகவும் காணப்படுகின்றன. பொதுவாக இவ்வுறுப்பு சீரணத்திற்குப் பயன்படும் பித்தநீரைச் சுரக்கச் செய்கின்றது. மற்றும் இது கொழுப்புப் பொருள்களையும், கிளைக்கோஜனையும் சேகரித்து வைக்கும் இடமாக உவ்னது. இவ்வுறுப்பு, கிளைக்கோஜன் முதலியவற்றின் உற்பத்தியும், சிறிதளவு வளர்சிதை மாற்றமும் ஏற்படுகின்றது. யூரிக் அமிலமும் இவ்விடத்தில் உற்பத்தியாகுகின்றது. புளாஸ்மான்சிப் பறவைகளிலும், தானியங்களை உணவாகவுண்ணும் பறவைகளிலும் கல்வீரல் அளவில் மிகவும் சிறியதாகவுள்ளது. மீன்களைப் பண்ணும் பறவைகளிலும், புழுபூச்சிகளை உண்ணும் பறவைகளிலும் மிகவும் பெரியதாகவுண்ணா. உதாரணமாக மீன்களை உணவாக வுண்ணும் வாத்துகளில் கல்வீரல் மிகவும் பெரியதாகியிருப்பதையும், தானியங்களைப்போன்ற மற்ற உணவுப் பொருட்களையோ உண்ணும் வாத்துகளில் கல்வீரல் மிகவும் சிறியதாகியிருப்பதையும் கண்கூடாகக் காணலாம். ஒவ்வொரு கல்வீரல் இதழினின்றும் ஒரு பித்தநீரான புறப்பட்டு குடவின் டியோடிகஸ்

பகுதியை அடைகின்றது. இடது பித்தநாளம் கல்லீரலிலிருந்து லிஸம்பி நேராக டியோடினத்தை அடைகின்றது. ஆனால் வலது பித்தநாளம் கல்லீரலிலிருந்து லிஸம்பி டியோடினத்தை அடைவுமுன்பாக பித்தப்பை (Gall bladder)யை அடைத்து பின்பு டியோடினத்தை அடைகின்றது. அதே பறவைகளில் பித்தப்பை இடையாது. உதாரணமாக



படம் 25. காட்டா ரேக்டெல் கிரைசோகோம் (*Cathartes chrysocome*) பறவை-கல்லீரல், பித்தப்பை, கிணயம் முதலியனையும் அவற்றின் தாளங்களும்

1. சிறு பெருங்குரை. 2. கல்லீரல்-இடது இதழ். 3. இடது பித்தநாளம். 4. முதலுப்புற கிணய நாளம். 5. கிணயம். 6. அரவப்பை. 7. டியோடினம். 8. பித்தப்பை.

தீக்னோழி (*Struthio*) ரியா கிபால்கோ பறவைகளில் புழு, மாடப்புழு, கிளிகளின் பவவகை, பாடும் பறவை இனங்களில் இரண்டு, பெசரைன் பறவைகளில் சில இனங்கள், மரங்கொத்தி வகைகளில் சில ஆகிய வற்றில் பித்தப்பை இடையாது. உணவுப் பொருட்கள் சீரணிக்கப் படுவதற்கு பித்தப்பையிலிருந்து பித்தநீர் குடல் பகுதியை அடைகின்றது. பித்தநீர் குடலை வந்தடைவும் குடல் குழம்பின் (*Chyme*)

அமிலத்தன்மையை மாற்றுவதற்கு பயன்படுகின்றது. கொழுப்புப் பொருட்களை சித்தநீர், அதிலுள்ள உப்புகளால் குழம்பாக மாற்றுகின்றது. கோழிகளின் சித்தநீரில் அமிலேஸ் என்னும் தொதிப் பொருள் இருப்பதாகக் கண்டுபிடிக்கப்பட்டுள்ளது.

கணையம்

கணையத்தை ஒரு நாளயிவ்வா கரப்பி என்றும், நாளமுள்ள கரப்பி என்றும் (Endocrine & Exocrine gland) இருவாறாக அழைக்கலாம். நாளயிவ்வா கரப்பி என்ற மூலையில் அது க்ளூகோகன் (Glucagon) இன்களின் (Insulin) என்ற இரு இயக்குநீர்களை (Hormones) உற்பத்தி செய்கின்றது. நாளமுள்ள கரப்பி என்ற வகையில் இது கணையநீரை உற்பத்தி செய்கின்றது. வளர்ச்சியின் பொழுது கணையம் குடல் பகுதியினின்றும் தோன்றிய மூன்று இதழ்களினின்றும் தோன்றுகின்றன. கணையத்தினின்றும் மூன்று நாளங்கள் தோன்றி அவை டியோடினத்தில் திறக்கின்றன.

கணைய நீருக்கு இரண்டு மூக்கிய வேலைகளுள்ளன. குடல் குழம்பின் அமிலத்தன்மையை மாற்றுவதற்குப் பயன்படுகின்றது. பின்னும் கணைய அமிலேஸ் (Amylase) போன்ற தொதிப் பொருள்கள் இருப்பதால் உணவுப் பொருள் சீரணமாகத்தகுப் பயனுள்ளதாக விடுக்கின்றன. கோழிகளில் கணையநீரில் லிபேஸ் (Lipase) தொதிப் பொருள் இருப்பதாகவும் கண்டுபிடிக்கப்பட்டுள்ளது.

6. பறவைகளின் சுவாச மண்டலம்

பறவைகளின் சுவாச மண்டலம், நுரையீரல்கள், இணையான பல் சோடி பைகள், அவைகளை இணைக்கும் காற்றுப் பாதைகள், காற்றுக் குழாய், காற்றுக் கிளைக் குழாய்கள், அவற்றுடன் இணைந்த இரத்தக் குழாய்கள், நரம்புகள் முதலியவற்றால் ஆனது. சுவாச மண்டலத்தில் மீள்தன்மைவற்ற அமைந்துள்ள நுரையீரல்களும், பெரிய இரத்த தாளங்கள் அதிகமற்ற காற்றுப் பைகளும் பறவைகளின் மட்டுமே காணப்படுவது குறிப்பிட்டுச் சொல்லக் கூடிய தொன்றாகும். பறவைகளின் நுரையீரல்கள் காற்றுப் பைகள் முதலியவற்றை 1651 ஆம் ஆண்டு வில்லியம் ஹார்வி (William Harvey) என்ற பேரறிஞர் கண்டு பிடித்தார். இக்கண்டுபிடிப்பின்போது நடத்திய ஆராய்ச்சியின் பொழுது அவர் பறவைகளின் நுரையீரல்கள் விரிவாக்கப்பட முடிவாதபடி, விளாவெலும்புகளாலும் பக்கச் சுவர்களாலும் தடுத்திருந்தாலும், அவைகள் காற்றுப் பைகளின் உதவியால் எவ்வளவு எளிதாகவும் நிறமையாகவும் சுவாசிக்கின்றன என்றும், எவ்வளவு இனிமையான பாடும் குரலினைப் பெற்றிருக்கின்றன என்பது குறித்தும் விவந்து மாராட்டி அதன் அமைப்புகளை விவரித்துள்ளார்.


விவ ஊர்வனப் பிராணிகளில், நுரையீரலின் சிறு பகுதி மெக்ஸிசு கவருடனும், மீள் தன்மையுடனும் காணப்படுகின்றது. பச்சோந்தியின் நுரையீரல்களின் ஒரு சிறு பகுதி பறவைகளில் சுவாச உறுப்பினை ஒத்துள்ளது.

மேலே குறிப்பிட்டுள்ள ஒப்புமைகளிலிருந்து, பறவைகளின் சுவாச உறுப்புகள் ஊர்வனவற்றின் சுவாச உறுப்புகளிலிருந்தே தோன்றியிருக்கக் கூடுமென்பது தெளிவாகின்றது. அவ்வாறு தோன்றியிருப்பினும் பறவைகளின் உடல் வெப்பநிலை ஒரே சீராக அமைந்துள்ள நிலையைக் கட்டுப்படுத்த அவற்றின் சுவாச உறுப்புகள் மிகவும் சிறப்புடன் செயல்படுகின்றன.

கவாச மண்டலத்தின் மேற்பகுதி (Upper respiratory tract)

மூக்குத் தொண்டைப் பகுதி (Naso pharyngeal area)

பறவைகளில் புற நாதத் துளார்களின் வழிவாக நுழையும் காரற்று நாகிக்குழியினுள் செல்வின்றது. மூக்கு அல்லது நேசம் பகுதி ஒரு இடைத்திரையினால் பிரிக்கப்பட்டுள்ளது. ஒவ்வொரு பக்க நாகிக்குழியும் மையத்தில் மூன்று காளிக்காக்களை (Conchae) கொண்



படம் 26. புறவில் நுரையீரல்களும்-காற்றுப்பைகளும்
(வயிற்றுப்புறத் தோற்றம்)

1. காற்றுக்குழாய், 2. செரீலிக்ஸ் காற்றுப்பை, 3. கிபெலிக் குவார் காற்றுப்பை, 4. மிகு கிபெலிக் குவார் காற்றுப்பை (Extra-clavicular), 5. மேக்சரக் காற்றுப்பை, 6. மூன் மார்பு காற்றுப்பை, 7. பக்கக் காற்றுக்கிளைக்குழாய், 8. பின் மார்பு காற்றுப்பை, 9. வயிற்றுப் பகுதி காற்றுப்பை, 10. வலது நுரையீரல், 11. காற்றுக்கிளைக்குழாய், 12. கிபெலிக் குவார் இடைக் காற்றுப்பை, 13. கிரீசுஸ் அல்லது ஒலிப்பெட்டி, 14. இரண்டாம் படி காற்றுக்கிளைக்குழாய், 15. மூன்றாம் படி காற்றுக்கிளைக்குழாய், 16. பக்கக் காற்றுக்கிளைக்குழாய், 17. நடு காற்றுக்கிளைக்குழாய்.

டுள்ளது. இவைகள் மூன்றும் ஒன்றன்பின் ஒன்றாக அமைந்துள்ளன. மூன்றப்களும் மையத்திலும் அமைந்துள்ள காங்க்காக்கள் மிகவும் பெரியதாகவுள்ளன. பின்புறம் உள்ள காங்க்கா சற்று சிறியதாகவுள்ளது. மூக்கு தரம்பின் நியூரான்கள் (Olfactory nerve) பின் காங்க்காவிலிள்ளும் தோன்றுகின்றது. மூக்குக் குழி வாயுடன் V வடிவ பிளவின் உதவியால் தொடர்பு கொண்டுள்ளது. இந்தப் பிளவின் பின்புறப் பகுதியிலும் நாக்நெற்கு பின்புறமும் காற்றுக் குழாயின் துவாரம் குரல்வளை துளை (Glottis) அமைந்துள்ளது. அத்துவாரத்தைச் சுற்றிலும் சிறு மெட்டுப் பகுதியுள்ளது. அதேசக பறவைகளில் தொண்டையினுள்ளும், வாயினுள்ளும் கோழையைச் சுரக்கச் செய்யும் சிறு சிறு சுரப்பிகள் நிறக்கின்றன. சில கோழிச்சாடிகள் (Pou & Chaffinch) போன்ற தாளியங்களை உள்ளனும் பறவைகளில் இச்சுரப்பிகள் சுரக்கச் செய்யும் திரவத்தில் அமிலமே என்ற நொழிப் பொருள் உள்ளது.

காற்றுக்குழாய் (Trachea)

காற்றுக் குழாய்ச் சுவர் குரல்வளைத் துவாரத்தில் குரல்வளை குருத்தெலும்புகளால் பனப்படுத்தப்பட்டுள்ளது. குரல்வளை குருத்தெலும்புகளின் எண்ணிக்கை ஒவ்வொரு பறவை இனத்திற்கு இனம் வேறுபடுகின்றது. புறவியில் மூன்றப்க்கத்து ஒரு சோடி ஆயிரம்பது குருத்தெலும்புகள் குரல்வளைத் துவாரத்தை தாக்கும்படி அமைந்துள்ளது. அதற்குக் கீழே ஒரு கரைக்காய்டு குருத்தெலும்பு (Cricoid) வளைவ வடிவில் அமைந்துள்ளது. பறவைகளில் குரல்வளைக்கு ஒவ் உண்டாக்கும் உறுப்பாக அமைந்த தனிச்சிறப்பு இடையாது.


குரல் வளைக்குப் பின்னால் காற்றுக் குழாய் உடல் குழியினால் நுழைகின்றது. அதேசக பறவைகளில் (கிரஸ், சிக்னஸ்) (Grus, cygnus) காற்றுக் குழாய் வளைவவடிவமாக நீண்டு காணப்படுகின்றது. மற்றும் சில பறவைகளில் குழாய் வடிவ காற்றுக் குழாய் நீண்டு, மார் பெலும்புப் பகுதியில் பொருத்தி வைக்கப்பட்டுள்ளது. காற்றுக் குழாய்ச் சுவர் ஹயலின் குருத்தெலும்பு வளைவ்களால் வலுவூட்டப்பட்டு நிரத்தபடி வைக்கப்பட்டிருப்பினும் வலிற்றுப் புறப்பக்கத்தில் சிறிதளவுப் பகுதி எலும்பாக்கப்பட்டுள்ளது. மூதுகுப்புறப் பக்கத்தில் வளைவ்கள் குறுகி இருப்பதால், காற்றுக் குழாயின் சுவர்கள் வளைவுத் தன்மையுடன் அமைந்துள்ளன. உடல் குழியினால் காற்றுக் குழாய் நுழையுமிடத்து இரு மீள்களாக—வளை காற்றுக் குழாய் (Bronchi) எனாகப் பிரிகின்றது. இவ்வாறு காற்றுக்குழாய் இரு காற்றுக் குழாய்களாகப் பிரியுமிடத்திலுள்ள காற்றுக் குழாய் காற்றுக் மீள்க்

குழாய்கள் முதலியவற்றிலுள்ள குருத்தெலும்புகள் அப்பகுதியிலுள்ள திசுக்களுடன் இணைந்து ஒலி உண்டாக்கும் சிரிங்க்ஸ் (Syrinx) உறுப்பாக தோன்றி அமைந்துள்ளது.

சிரிங்க்ஸ் (Syrinx) அல்லது ஒலிப்பெட்டி

பறவைகளின் ஒலியை உண்டாக்கும் உறுப்பு சிரிங்க்ஸ் ஆகும். பொதுவாக காற்றுக் குழாய் காற்றுக் கிளைக் குழாய் முதலிய பகுதிகளின் கவர்களில் ஒன்று அல்லது பல படலங்கள் காணப்படுகின்றன. அப்படலங்கள் வெளிக்காற்று உள்ளே செல்லும் பொழுது ஏற்படும் அதிர்வில்களால் ஒலியை உண்டாக்குகின்றன. இப்பகுதியிலுள்ள தசைகள் இரு வகைப்படும். முதல் வகை எக்ஸ்ட்ரின்சிக் தசைகள் (Extrinsic muscles) என்பதாகும். இவைகள் மார்பெலும்பிலிருந்து தோன்றி காற்றுக் குழாய்களுடன் பொருந்தியுள்ளது. இரண்டாம் வகை இன்ட்ரின்சிக் தசைகள் (Intrinsic muscle) என்பதாகும். இவைகள் காற்றுக் குழாய் அல்லது காற்றுக் கிளைக் குழாய் முதலிய பகுதிகளில் தோன்றி அப்பகுதிகளிலேயே பொருந்தியுள்ளன.

சிரிங்க்ஸ் என்ற ஒலியுண்டாக்கும் உறுப்பு பறவைகளின் இனத்திற்கு இனம் வேறுபாடுடன் அமைந்துள்ள சிறப்புப் பொருத்திய ஒரு உறுப்பாகும். அதில் அமைந்துள்ள தசைகளின் எண்ணிக்கையும் அவை பொருத்தியுள்ள இடமும் இனத்திற்கு இனம் பறவைக்கு பறவை வேறுபடுகின்றது. சிரிங்க்ஸ் உறுப்பிலுள்ள தசைகளின் எண்ணிக்கை அமைப்பு முதலியவற்றைப் பொருத்தே பறவைகளின் வகைபாடு அமைந்துள்ளது.



படம் 27. புறவின் சிரிங்க்ஸ் அல்லது ஒலிப்பெட்டி.

1. இன்ட்ரின்சிக் தசைகள், 2. காற்றுக் குழாய், 3. செலிப்பறை போலும் படலம் (Tympaniform membrane), 4. காற்றுக் கிளைக் குழாய்.

நுரையீரல் மிகு காற்றுக் கிளைக் குழாய் (The extra-pulmonary Bronchi)

சிரிங்க்ஸிலிருந்து பின்னும் இரு காற்றுக் கிளைக் குழாய்களும் பக்கவாட்டிலும் பின்னாலும் நீண்டு நுரையீரல்களின் திசுக்களில் ழுள்

பக்கமாக மையப்பகுதியில் முடிவடைகின்றன. காற்றுக் கிளைக் குழாய்களின் குருத்தெலும்பு வளைபங்கள் முழுமைபெறாமல் கிரீவக்கல் பகுதியின் மையத்தில் காணப்படுகின்றது. வயிற்றுப் புறப்பகுதியில் நுரையீரல் பகுதியிலும் குருத்தெலும்பு முழுமை பெற்று அமைவாமலே உள்ளது. இந்த மிகு-நுரையீரல் காற்றுக் கிளைக் குழாய்ப் பகுதி (Extra pulmonary bronchi) குறு இழை (Ciliated) தூண்டுசெல்களால் மூடப்பட்டுள்ளது.

நுரையீரல் (The Lung)

மார்புப் பகுதியில் முதுகுப்புறப் பக்கமாக (Dorsal) நன்றாகப் பொருத்தும்படி நுரையீரல் அமைந்துள்ளது. நுரையீரல்களின் திசுக்கள் மார்புப்புற மையப்பகுதியிலிருந்து கிளம்பி வினாவெலும்பு கணுக்கிடைவியுள்ள திசுக்களினுள் ஊடுருவிச் செல்கின்றன. நுரையீரல் ஒரு மெல்லிய நுரையீரல் உறையினால் (Pleura) போர்த்தப் பட்டுள்ளது. நுரையீரல் மார்புச் சவற்றுடனும், நுரையீரல் உத்துச் சவ்வுடனும் (Lung diaphragm) மெல்லிய தூணிழைகள் போன்ற இணைப்புத் திசுக்களால் நன்றாகப் பொருத்தும்படி அமைந்துள்ளது. இவைகள் உருவத்தில் தட்டையாகவும் எகிறிய வடிவ கோபுரங்களாகவும் (Pyramid) ஒத்தும் இருக்கின்றன.


உத்துச் சவ்வுகள் (The diaphragms)

புறவைகளில் இரு உத்துச் சவ்வுகள் உள்ளன. மார்புவகை இரண்டும் இரு கரைகளைப் போன்று ஒரே ஆதாரக் கொம்பின்பிறகு ஒன்றன்மேல் ஒன்றாக அமைந்துள்ளன. பறவையின் வயிற்றுப் புறப் பகுதிதான் மேலே குறிப்பிட்ட ஆதாரக் கொம்பாகும். முதுகுப்புற நுரையீரல் உத்துச் சவ்வு சற்றுத் தட்டையாக இருக்கும். இது முதுகுப்புற மையப் பகுதியிலிருந்து மார்புக் கூட்டின் பக்கச் சுவர்கள் வரையிலும் நீண்டு படர்ந்துள்ளது. இது பின்பக்கத்தில் வயிற்று உத்துச் சவ்வுடன் (Abdominal diaphragm) இணைக்கப்பட்டுள்ளது. வயிற்றுப்புறத்தில் அமைந்துள்ள வயிற்றுப் பகுதி உத்துச் சவ்வு, இருதயவுறைவுடன் இணைந்து மார்பெலும்பின் பக்க ஓரங்களுக்கும் பின்பக்கமாக சின்சேக்ரம் (Synsacrum) பகுதி வரையிலும் நீண்டு அமைந்துள்ளது.

வயிற்றுப் பகுதி உத்துச் சவ்வு குறுக்காயமைந்த இடைத்திறை (Oblique septum) போன்றது. இது இரண்டு அடுக்குகளாகப் பிரித்து காணப்படுகின்றது. இரு மார்பு காற்றுப் பைகளும் இவ்விரண்டு அடுக்குகளுக்குமிடையில் காணப்படுகின்றன. சில

புறவைகளில் இந்த இரு மார்புக் காற்றுப் பைகளுக்கும்மிடையில் ஒரு இடைத்திரை உள்ளது.

நுரையிரல் உத்துச் சவ்வின் ஓரங்களில் நிறிய வரித் (Striated) தசைகள் உள்ளன. இவைகளுக்கு கால்ட்டோ நுரையிரல் தசைகள் அல்லது விவா நுரையிரல் தசைகள் (Costo pulmonary muscles)



படம் 28. புறவின் நுரையிரல்களும் காற்றுப்பைகளும் இடம்பக்கப் படம் 1-வலிற்றுப்புறப் பக்கத்தைக் காட்டுகின்றது வலப்பக்கப் படம் 2-முதுகுப்புற பக்கத்தைக் காட்டுகின்றது.

1 செர்விக்ஸ் காற்றுப் பை, 2. டிரெய்சிக்ரலார், காற்றுப்பை அதன் நீட்சியுடன், 3. காற்றுக் கிளைக் குழாயின் முக்கிய பகுதி, 4. வெக்ட்டியுலம், 5. பீக் மார்பு காற்றுப்பை, 6. வலிற்றுப்புறப் பகுதி காற்றுப்பை, 7. செர்விக்ஸ் வலிற்றுப்புற காற்றுக்கிளைக் குழாய், 8. நடுக் காற்றுக் கிளைக் குழாய், 9. மூன் மார்பு காற்றுப்பை.

என்று பெயர். இவை மார்பெலும்பு கால்ட்டா மூட்டிற்கு (Sterno costal joint) அருகிலுள்ள விவாவெலும்புகளில் நோன்றி நுரையிரல் உத்துச்சவ்விலுள் நுழைக்கப்பட்டு அமைந்துள்ளது. இந்தத் தசைகள் சுருங்கும்பொழுது நுரையிரல் உத்துச்சவ்வின்மேல் இழுப்பு விசை (Tension) ஏற்படுகின்றது.


சுவாசக் காற்றுப் பாதை (The air passages in the lung)

நுரையீரலின் ஒவ்வொரு காற்றுக் கிளைக் குழாயையும் (காற்றுக் குழாயிலிருந்து பிரிந்த காற்றுக் கிளைக் குழாயை) முதலாம் காற்றுக் கிளைக் குழாய் (Primery bronchi) என்று அழைக்கலாம். பக்க வாட்டிலும் பின்பக்கமாகவும் செல்கின்றது. அவ்வாறு செல்லும் பொழுது குழாய்களின் குறுக்கு விட்டப்பகுதி மாறிக்கொண்டே வந்து கடைசியில் முதலாம் காற்றுக் கிளைக்குழாய்கள், பின்னும் சிறு சிறு கிளையாகப் பிரிந்து இரண்டாம் படி காற்றுக் கிளைக் குழாயாக மாறுகின்றன. வயிற்றுப் பகுதி காற்றுப் பைகளின் மையப்பகுதி நுரையீரலின் பின்பகுதி பக்கவாட்டின் மூலையில் தொடும் இடத்தில் ஒரு துவாரத்தினுள் மேற்கூறிய இரண்டாம் படி காற்றுக் கிளைக் குழாய்கள் முடிவடைகின்றன. நுரையீரலினுள் காற்றுக் கிளைக் குழாய்கள் சற்று விரிவடைந்து வெஸ்ட்டிபுலம் அறைகளாக மாறுகின்றன. கோழிகளிலும் வாத்துகளிலும், புராவைவிட வெஸ்ட்டிபுலம் அறைகள் தெளிவாகத் தெரிகின்றன. இப்பகுதியின் சுவர் குருத்தெலும்பின் ஆதரவுடன் அமைக்கப்பட்டு சீரற்ற தட்டுகளாக மாற்றப்பட்டுள்ளன. வெஸ்ட்டிபுலத்தினுள் அவை சிறிது சிறிதாக மறைந்துவிட்டன. வெஸ்ட்டிபுலத்தின் பின்பகுதியில் முதலாம் காற்றுக் கிளைக் குழாய் (முதலாம் காற்றுக் கிளைக் குழாய்கள் இங்கு மைய காற்றுக் கிளைக் குழாயென்று (Meso bronchi) அழைக்கப்படுகின்றது) பின்னும் குறுகி மிகு நுரையீரல்கள் கிளைக் குழாயாக (Extra pulmonary bronchus) மாறி பின்பகுதியில் நுண்ணிய கிளைகளாக மாறிவிடுகின்றன. நுரையீரலின் முன் பகுதியிலுள்ள காற்றறைக் கோழைச் சுரப்பிகள் (Alveolar mucous glands) நுரையீரலின் பின்பகுதியை அடையும்பொழுது எண்ணிக்கையிலும் அளவிலும் குறைந்து விடுகின்றன. நுரையீரலின் பிற்பகுதியில் இவைகளுக்கு கிண்ணச் செல்கள் (Goblet cells) என்று பெயர். லெமினாப்ரோப்பிரியா (Leminapropria)ப் பகுதியில் நிணநீர் முடிச்சுகள் (Lymph nodules) உள்ளன.

[முதலாம் காற்றுக் கிளைக் குழாய்களிலிருந்து அநேக கிளைக் குழாய்கள் பிரிகின்றன. ஒவ்வொரு இரண்டாம் படி காற்றுக் கிளைக் குழாயும் குறு இழையுடைய எளிய தூண் எப்பித்தீவியத் திகிலினால் ஆனது. அதில் நுண் காற்றுப் பைச் சுரப்பிகளும் கிண்ணச் சுரப்பிகளும் உள்ளன.]

முதலாம் காற்றுக் கிளைக் குழாயின் வெஸ்ட்டிபுலத்தின் கிரேனியல் பகுதியின் 5 துவாரங்கள், 8 பெரிய இரண்டாம் படி காற்றுக் கிளைக் குழாய்களுக்குச் செல்கின்றன. அவைகள் நுரை

வீரனின் ஸ்பிரிதும் புறப்பக்கப் பரப்பில் சிறு சிறு இளைகளாகப் பிரித்துப் பரவியுள்ளன. இவ்வாறான அமைப்பை எல்லாப் பறவைகளிலும் காணலாம். ஸ்பிரிதும்புற பக்கமாக அமைப்பெற்ற அந்த எட்டு இரண்டாம்படி காற்றுக் கிளைக் குழாய்களையும் பின்வருமாறு அழைக்கலாம். 1. கிளேவிக்குளாரிஸ் (Clavicularis) 2. செர்விக்கேலிஸ் (Cervicalis) 3. கிளேவிக்குளாரிஸ் டார்சாலிஸ் (Clavicularis dorsalis) 4. முன் டயாக்ரீரம்மேட்டிக்கல் (Diaphragmaticus



படம் 29. பறவையின் கவாச மண்டலத்தின் காற்றுப் பாதை—
பக்க வாட்டுத் தோற்றம்

1. முன் காற்றுப் பை, 2. காற்றுத் தத்துகை, 3. பக்கக் காற்றுக் கிளைக் குழாய், 4. முதுகுப்புற காற்றுக் கிளைக் குழாய், 5. நுரையிரம் பேரங்கைமா, 6. பெரிய காற்றுக் கிளைக் குழாய், 7. பின் காற்றுப் பை, 8. நடு காற்றுக் கிளைக் குழாய், 9. வெட்டிடி புலம், 10. முதுவாம்படி காற்றுக் கிளைக் குழாய், 11. முன் ஸ்பிரிதும்புற காற்றுக் கிளைக்குழாய்.

anterior) 5. பின் டயாக்ரீரம்மேட்டிக்கல் (Diaphragmaticus posterior) 6. மீடியாலிஸ் (Medialis) 7. கரடாலிஸ் (Caudalis) 8. லேட்டராலிஸ் (Lateralis) என்பனவாகும். முதல் இரண்டு மூன்று ஆகிய இம்மூன்று ஸ்பிரிதும் புறப்பக்க இரண்டாம்படி காற்றுக் கிளைக் குழாயும் ஒரு பெரிய துளை மூலம் கழுத்துப் பட்டை எலும்பைச் சார்ந்த காற்றுப் பைகள் அல்லது கிளேவிக்குளார் இடை காற்றுப் பைகள் (Inter clavicular air sacs) என்ற காற்றுப் பைகளுடன் கழுத்துக் காற்றுப் பைகள் அல்லது செர்விக்கல் காற்றுப் பைகள் (Cervical air sacs) என்ற காற்றுப் பைகளுடனும் இணைந்துள்ளன. நான்காவது ஸ்பிரிதும் புறப்பக்க இரண்டாம்படி காற்றுக் கிளைக் குழாய்களை மாஃபு முன் காற்றுப் பைகள் (Anterior thoracic air sacs) என்ற காற்றுப் பைகளுடன் அத்துனை இணைந்துள்ளது. மையக் காற்றுக் கிளைக் குழாயின் ஒரு கிளை மாஃபு பின் காற்றுப் பைகளுடன் (Posterior thoracic air sacs) இணைந்துள்ளது. ஒவ்வொரு மைய காற்றுக் கிளைக் குழாயும் நுரையிரலின் ஊடே துளைத்துச் சென்று பின்பு ஸ்பிரிதும் காற்றுப் பைகளுடன் (Abdominal air sacs) இணைகின்றன.

வெட்டியுபுரத்தின் முதுகுப் புற பக்க பின்பு பகுதிகளிலிருந்தும், மையக் காற்றுக் கிளைக் குழாயின் பின்பு பகுதியிலிருந்தும் ஆறு முதல் பத்து வரை இரண்டாம்படி காற்றுக் கிளைக் குழாய்கள் பிரிந்து சென்று நுரையிரலின் முதுகுப்புறப் பகுதியில் சிறு சிறு கிளைகளாகப் பிரித்து அதன் பரப்பில் பரவி விடுகின்றன. இவ்விடத்திலிருந்து கிளையும் இரண்டாம்படி காற்றுக் கிளைக் குழாய்களின் எண்ணிக்கை பறவைகளில் இனத்திற்கு இனம் வேறுபடுகின்றன. நுரையிரலின் முதுகுப்புறப் பக்கத்திலிருந்து தோன்றும் இரண்டாம்படி காற்றுக் கிளைக் குழாய்களையும் வலிற்றுப் புறப் பக்கத்திலிருந்து தோன்றும் இரண்டாம்படி காற்றுக் கிளைக் குழாய்களையும் அநேக மூள் பின்பு பக்க காற்றுக் கிளைக் குழாய்கள் இணைத்தாலும், மூன்றாம் படி காற்றுக் கிளைக் குழாய்கள் (Tertiary bronchi) அவ்வறு பக்கக் காற்றுக் குழாய்களினுமேயே முழுமையாக இணைக்கப்பட்டுள்ளது. இந்த மூன்றாம் படி காற்றுக் கிளைக் குழாய்கள் நுரையிரல்களின் பரோக்கமர (Parenchyma) திசையைத் துளைத்துக்கொண்டே பரவி அமைந்துள்ளன. மூன்றாம் படி காற்றுக் கிளைக் குழாய்கள் வளைவுத் தன்மையற்ற நீண்ட குழாய்களாகும். மூன்றாம் படி காற்றுக் கிளைக் குழாய்கள் மையக் காற்றுக் குழாய்களுடன் தொடர்பு கொண்டுள்ளன. பிள்ளும், குஞ்சுப் பறவைகளின் வளர்ச்சியின் பொழுது அநேக குறுகிய எலிந்த் திசைத் திரும்பும் காற்றுக் கிளைக் குழாய்கள் (Recurrent) காற்றுப் பைகளுக்கும் இரண்டாம்படி காற்றுக் கிளைக் குழாய்களுக்கும் இடையில் நன்றாக வளர்ச்சியுற்று அமைந்துள்ளன. இவ்வாறு பறவைகளின் கவாச மண்டலம் பவ சிக்கலான பகுதிகளால் ஆனது.

ஒவ்வொரு பக்கக் காற்றுக் கிளைக் குழாயும் (Para bronchus) நுரையிரலின் மையக் கவாச உறுப்பாகக் கருதப்படுகின்றது. ஒரு பக்கக் காற்றுக் கிளைக் குழாய் அது நீண்டு செல்லும்பொழுது தேர் கோண வடிவ சிறுசிறு காற்றுத் தந்துகிகள் (Air capillaries) எல்லாத் திசைகளிலும் கொடுத்துக்கொண்டு செல்கின்றது. ஒவ்வொரு காற்றுத் தந்துகியும் ஒரு சிறு குழாய் வடிவமுடன் உள்ளது. அக் குழாய் பக்கக் காற்றுக் கிளைக் குழாயிலிருந்தும் வெளிப்புறமாகச் செல்லும்பொழுது பிள்ளும் சிறுசிறு குழாய்களாகப் பிரிந்து சென்று, அவற்றின் துளி மிகவும் மெல்லியதாகவும் கருவ்களுடனும் அமைகின்றன. இவ்வாறு அமைந்த மெல்லிய கருவ் வடிவ, துண்ணிய காற்றுத் தந்துகிகள் இரத்தத் தந்துகிகளுடன் கோத்து பிள்ளிக் கொள்கின்றன. இந்த இடத்தில் அருகருகே அமைப்புப் பெற்ற மற்ற சிறு சிறு பக்கக் காற்றுக் கிளைக் குழாய்களுடனும் இரண்டாங்கு கலக்கின்றன.

கொலம்பா, பியூடிபோ, கோலுத்தரஸ் (Colomba, Buteo, Moluthrus) போன்ற பறக்கும் நிறனுள்ள பறவைகளில் பக்கக் காற்றுக் கிளைக் குழாய்கள் அதனாகிவிடுவன மற்ற பக்கக் காற்றுக் கிளைக் குழாய்களுடன் நிறப்பாச முறையில் இரண்டாகக் கலந்து பரவி விடுகின்றன. கோழி, ஊத்து (Gallus, Anasbosanus) போன்ற அய்வனவு நிறப்பாச பறக்காத பறவைகளில் பக்கக்காற்றுக் கிளைக் குழாய்கள் ஒன்றோடுொன்று அய்வனவு நிறப்பாச முறையில் கலந்து பரவவில்லை. மற்றும் இந்தக் காற்றுக் கிளைக் குழாயின் நிற நிற நுண்ணிய கிளைகளுக்கிடையில் இணைப்புத் திக இடைத்திரை உள்ளது.


ஒவ்வொரு கவாச கூட்டுப் பகுதிக்கும் நிற நிற தமனிகளும் நிரைகளும் முறையே இரத்தத்தைக் கொடுத்து எடுத்துச் செல் கின்றன. அய்வானுள் தமனிகளும் நிரைகளும் பக்கக் காற்றுக் கிளைக் குழாய்களுக்கு இணையாக அடுத்தடுத்து (Parallel) செல் கின்றன. பக்கக் காற்றுக் கிளைக் குழாய்கள் தட்டை எப்பித்தீவியம் செல்களானது.

காற்றுப்பைகள் (Air sacs)

காற்றுப் பாதைகளுடன் தொடர்பு கொண்டுள்ள காற்றறை களுக்கு காற்றுப்பைகள் (Air sacs) என்று பெயர். அவை நுரை யீரவிற்கு வெளிப்பகுதியில் உடல் குழியில் அமைந்துள்ளன. இந்த காற்றுப் பைகளினின்றும் தோன்றிய குழாய்கள் கழுத்துப் பகுதி யிலும், கால்களின் எலும்புகளுக்கிடையிலும் நீட்டப்பட்டுள்ளன. பறவைகளில் ஒன்பது காற்றுப்பைகள் உள்ளன. கிலேவிக் குவார் இடை காற்றுப் பை என்ற ஒன்றும் கிலேவிக் குவார் காற்றுப்பைகள், மார்பு மூன் காற்றுப்பைகள், மார்புப் பின் காற்றுப்பைகள், வயிற்றுக் காற்றுப்பைகள் என்ற நான்கு சோடியும், ஆக மொத்தம் 9 காற்றுப் பைகள் பறவைகளில் உள்ளன.

ஒவ்வொரு காற்றுப்பையும் மீள் தன்மைவுள்ள இழைநார்களை யுடைய செவ்விய இணைப்புத் திக அடுக்குகளாலானது. உடற் குழியி லுள்ள காற்றுப்பைகளில் மிகவும் குறைந்தளவுள்ள இரத்த நாளங் கிணையுள்ளன. ஆனால் எலும்புகளுக்கிடையில் குழிப்பிடத்தக்க முறையில் நீட்டிக் கொண்டுள்ள காற்றுப்பைகளில் குறிப்பிடத்தக்க முறையில் இரத்த ஓட்டம் அமைந்துள்ளது. ஒவ்வொரு காற்றுப்பையும் நுரை யீரவின் காற்றுப் பாதையுடன் பல புழைகள் மூலம் தொடர்பு கொண்டுள்ளன. இப்புழைகளில் மிகவும் பெரியதாக உள்ள ஒன்று இரண்டாம் படி காற்றுக் கிளைக்குழாயை காற்றுப்பையுடன் மேலே குறிப்பிட்டபடி இணைத்துள்ளது. மற்றப்புழைகள் எதிர்த்திரை

திரும்பும் காற்றுக் கிளைக்குழாய் (Recurrent) கலுடன் இணைந்துள்ளது. அவைகள் நுரையீரலின் முதுகுப்புற பக்கப்பரப்பினில் அமைந்துள்ளன. செர்னிக்கல் காற்றுப் பைகளுக்கு எதிர்த்திசை திரும்பும் காற்றுக் கிளைக்குழாய்கள் இடையாது. கோழி, வாத்து



படம் 30. யாத்தின் உடற்குழி (மற்ற உடன்கூறுப்புகளும் காற்றுப் பைகளும் உடற்குழியின் அமைந்திருக்கும் நிலை)

1. செர்னிக்கல் காற்றுப் பை, 2. பற்கடிதலும் மார்புத் தசைகள், 3. விரிக்கும்வின் எக்ஸ்டீன்சிக் தசைகள், 4. இரத்தவம், 5. கல்லீரல், 6. அரையப் பை, 7. குடம், 8. வயிற்றுப் பகுதி காற்றுப் பை, 9. பித் மார்பு காற்றுப் பை, 10. முன் மார்புக் காற்றுப் பை, 11. ரெனெய்க்ரஸர் இடைக் காற்றுப் பை.

முதலியவற்றின் ரெனெய்க்ரஸர் இடைக் காற்றுப் பைகளிலும், மார்பு முன்காற்றுப் பைகளிலும் எதிர்த்திசை திரும்பும் காற்றுக் கிளைக் குழாய்கள் உள்ளன. புழுக்களில் இவ்விரு சோடி காற்றுப் பைகளிலும் எதிர் திசை திரும்பும் காற்றுக் கிளைக் குழாய்கள் இடையாது.

புழுயின் காற்றுப்பைகள்

செர்னிக்கல் காற்றுப் பைகள் (Cervical air sacs)

பறவைகளில் ஒரு சோடி செர்னிக்கல் காற்றுப்பைகள் உள்ளன. இவை செறிவதாடவும் முன்னெலும்பு தண்டிற்கு கீழாகவும் 10-ஆவது

பறவைகளின் கவாச மண்டலம்

செர்விக்ஸ் அங்கு கழுத்து முள்ளெலும்புகளுக்கு இருபுறமும், நுரையிரல்களின் மூலப், ஓரத்திலும் அமைந்துள்ளன. இவை முதலாய்வு காற்றுக் கிளைக் குழாயுடன் வயிற்றுப் புறக்காற்றுக் கிளைக் குழாய்களின் முதல்கிளையின் உதவியால் இணைந்துள்ளன. இவை கிளேவிக்குலார் இடைக் காற்றுப் பைகளுடனும் தொடர்பு கொண்டுள்ளன. இந்தக் காற்றுப் பைகளிலிருந்து முன்புறமாக முள்ளெலும்புத் தண்டு அதன் தசைகளினாலும் பின்புறமாக மார்பு முள்ளெலும்புகளினாலும் சிறு கிளைகள் சென்று காற்றுக் குழிவுகளை உண்டாக்கியுள்ளன.

கிளேவிக்குலார் இடைக் காற்றுப்பை

ஒரே ஒரு கிளேவிக்குலார் இடைக்காற்றுப்பை, உணவுக் குழாய் காற்றுக் குழாய்களின் வயிற்றுப்புற பகுதியில் உள்ளது. மற்றும் இது இருகயத்திற்கு முன்னாலும், செர்விக்ஸ் காற்றுப் பைகளுக்கு வயிற்றுப்புறப் பகுதியிலும் உள்ளது. கிளேவிக்குலார் இடைக் காற்றுப் பையிலிருந்து மூன்று சோடி நீட்டப் பெற்றக் குழாய் போன்ற பகுதிகள் தோன்றுகின்றன. முதல் குழாய்க்கு ஸ்கேப்பலார் கீழ்க்குழாய் (Sub Scapular) என்று பெயர். இது ஸ்கேப்பலார் எலும்பினிலிருந்து விவாவெலும்புகளுக்குமிடையில் நீண்டுள்ளது. அடுத்த சோடிக்கு ஆக்ஸிலரிக் குழாய் (Axillary) என்று பெயர். இது ஆக்ஸிலர், க்புமெரல் தசைகளிடையே நீண்டு மேல்க்கரத்தின் க்புமெரல் (Humerus) எலும்பின் காற்றுப் பகுதியாக மாறிவிட உள்ளது. உண்டுகளில் அடைக்கப்பட்டு வளரும் புருக்களைவிட தன்விச்சையாக அமைந்து பறந்து திவியும் புருக்களில் இந்தக் காற்றுப்பை பெரியதாக வளர்ச்சியுற்றுக் காணப்படும். இந்தக் காற்றுப்பை, காற்றுப் பாதைகளுடன் முதல் வயிற்றுப் புறக்காற்றுக் கிளைக் குழாயினால் வயிற்றுப்புறப் பக்கமாக தொடர்புகொண்டு உள்ளது. இக்காற்றுப் பையில் எதிர்த் திசைத் திரும்பும் காற்றுக் கிளைக் குழாய்கள் நுரையிரலின் முதுகுப்புறக் காற்றுக் கிளைக் குழாயுடன் இணைந்துள்ளன.

மார்பு முன் காற்றுப் பைகள் (Anterior Thoracic air sacs)

இந்த ஒரு சோடி காற்றுப் பைகளில் நீட்டப்பெறும் குழாய் பகுதிகள் (Diverticula) கிடையாது. இவை மார்பின் முன்னகையில் குறுக்காயமைந்த இடைத்திரையின் அமைந்துள்ளன. இவை நுரையிரலின் அடிப்பகுதியிலிருந்து மார்பெலும்பின் ஓரக்கள்வரை நீண்டு ஆவது விவாவெலும்புகளுக்கருகில் அடுத்த சோடி காற்றுப்பைகளின் மீது பதியும்படி அமைந்துள்ளன. மற்றும் இவைகள் மூன்றுவது,

நாங்காவது, வயிற்றுப்புற காற்றுக் கிளைக் குழாய்களுடன் தொடர்பு கொண்டும்ன. இவை நுரையீரலின் மூலப்பக்கப் பகுதிகளுடனும் இணங்கும்ன.

மார்புப் பின் காற்றுப்பைகள் (Posterior Thoracic air sacs)

இவை சோடியான காற்றுப் பைகளாக இருப்பினும், சமீபீர்த்து காணப்படுகின்றன. இவைகளுள் வலது பக்கக் காற்றுப் பைகளைவிட இடது பக்கக் காற்றுப்பைகள் மிகவும் பெரியதாகக் காணப்படுகின்றன. இவை குறுக்காயமைந்த இடைத்திணைக்குயின்பகுதியில் மார்பின் பின்னறையில் அமைந்துள்ளன. இவை காற்றுப் பாதையுடன் ஒரு பெரிய மையக் காற்றுக் கிளைக் குழாயின் (Medio bronchus) கிளையினால் தொடர்புக் கொண்டுள்ளது. மற்றும் எதிர் திசை நிகழ்பும் காற்றுக் கிளைக்குழாய்களினால் நுரையீரலின் பக்கப் பகுதிகளுடன் தொடர்பு கொண்டுள்ளது.

வயிற்றுப் பகுதி காற்றுப் பைகள் (Abdominal air sacs)

மற்ற எவ்வாக்காற்றுப் பைகளைக் காட்டிலும் இத்தக் காற்றுப் பைகள் சமீபீர்த்தும் உருவில் பெரியதாகவும் காணப்படுகின்றன. இவை உடற்குழியின் பரப்பில் மற்ற உட்கிடப்புறுப்புகளிடையே (Viscera) இடம் பெற்றுள்ளன. உட்கிடப்புறுப்புகளின் அமைப்பிற் கேற்ப பறவைகளில் இவற்றின் உருவமும் மாறுபட்டு காணப்படுகின்றன. இத்தக் காற்றுப்பைகளினின்றும் இரண்டு சோடி நீட்டப் பெறும் குழாய்கள் உள்ளன. இடுப்புக் காற்றுப் பைக்குழாய் என்ற முதல் சோடி, சிறு நீரகத்தைக் கற்றிக்கொண்டு சிள்சேக்ரம் எனும் பிறும் அமைந்து காற்றறைப் பகுதிகளாக மாறியுள்ளன. இங்ருளக் (Inguinal) என்ற மற்றொரு சோடி கீழே எலும்பின் தலைப் பகுதியைக் கற்றிக்கொண்டு தொடைத் தசைகளுக்கிடையில் காற்றறைப் பகுதிகளாக மாறி அமைந்துள்ளன. மையக் காற்றுக் கிளைக் குழாய், வயிற்றுப் பகுதி காற்றுப் பைகளின் பின்பக்க கடைசிப் பகுதியில் திறக்கின்றது. நுரையீரலின் பின் முதுகுப்புறப் பகுதியினுள்ள எதிர்த்திசை நிகழ்பும் காற்றுக் கிளைக் குழாய்கள் வயிற்றுப் பகுதிக் காற்றுப் பைகளினால் திறக்கின்றது.

மார்பு வயிற்றுப் பகுதிகளின் கவர்

(The Thoraco Abdominal Wall)

எலும்புக் கூட்டமைப்பு

இப்பகுதியின் முதுகுப் புறப் பகுதி முதுகுத் தண்டினால் (Vertebral column) ஆனது. இப்பகுதியின் முதுகுத் தண்டின்

இரண்டு மிதக்கும் குட்டையான வினாவெலும்புகளை உடைய கழுத்து முள்ளெலும்புகளும், 4 அகுவது 5 வினாபெலும்புகளை உடைய மார்பு முள்ளெலும்புகளும், கமார் 12 முள்ளெலும்புகளால் இணைந்த சிங்சேக்ரம் பகுதியும் உள்ளன. நான்கு மார்பு முள்ளெலும்புகள் இந்த எலும்புப்பகுதியில் இருப்பின் நான்காவது முள்ளெலும்பு யிருந்து தனித்து காணப்படும். ஐந்து மார்பு முள்ளெலும்புகள் இருப்பின், முதல் முள்ளெலும்பும் ஐந்தாவது முள்ளெலும்பும் தனித்துக் காணப்படுகின்றன. இதுபோன்று அமைத்திருப்பதால் குறிப்பிட்ட பறவைகளில் குறிப்பிட்ட அளவு அசைவு ஏற்பட சாதகமாக உள்ளது. வினாவெலும்புகளில் இருதலைப் பகுதிகள் உள்ளன. வினா எலும்புகளுக்கு வெட்டியிரல்பகுதி அங்னது முதலுப் பகுதி (Vertebral) ஸ்டெர்னல் பகுதி அங்னது வயிற்றுப் பகுதி (Sternal) என்ற இரு பகுதிகள் உள்ளன. இவைகள் மார்பெலும்பின் பக்க ஓரப்பகுதி களுடன் இணைந்துள்ளன. வினாவெலும்புகள் முழுமையாக எலும்பாக்கப்பட்டுள்ளன. வினாவெலும்புகளின் இரு பகுதிகளும் ஒரு இணைப்பினால் அசையும்படி பொருத்தி உள்ளன.

மார்பெலும்பு, அடித்தட்டைக்கவம் (Keel) என்ற பகுதியுடன் இணைந்து கவசம் போன்ற உறுப்பாகக் (Shield) காணப்படுகின்றது. கடைசி வினாவெலும்பின் தனித் தனி, மற்ற வினாவெலும்புகளில் வெட்டியிரல்ப் பகுதியின் மையத்தில் பின்புறம் நீட்டப்பட்ட அஸ்டினைட் நீட்டி உள்ளது. ஒரு வினாவெலும்பின் அஸ்டினைட் நீட்டி, அதனை அடுத்ததுள்ள வினாவெலும்பின்மீது தொடும்படி அமைந்துள்ளது. மார்பு வளைவத்தின் கோரகாங்கு எலும்பு ஒரு தடித்த எலும்பாகும். இது மார்பெலும்பின் பக்க, முன்முனைப் பகுதி களுடன் அசையும்படி பொருத்தி உள்ளது. இங்னாறு அசையும்படி பொருத்த உள்ளதால் கோரகாங்கு எலும்பின் உதவியால் பக்கங் களில் அசையும்படி பொருத்தி உள்ளது. கோரகாங்கு எலும்பு முது குப்புறமும் பக்கவாட்டிலும் நீண்டு ஸ்கேப்புலா கிளினிங்கு குழியை (Scapula glenoidfossa) உண்டாக்கி அதில் மேல்க்கையில் முன்கரம் (Humerus) பொருத்தி உள்ளது. கோரகாங்கு முன்புறமும் இணை காகவும் ஒரு V வடிவ டாக்குள் எலும்பு உள்ளது. இது பந்தக் களால் ஸ்கேப்புலா, கோரகாங்கு எலும்புகளுடன் அசையும்படி பொருத்தியுள்ளது. இந்த முன்று எலும்புகளும் கடும் இடத்தில் ஒரு துவாரம் உள்ளது. இதற்கு முவெலும்புத்துளை (Triossius foramen) என்று பெயர். இத்துவாரத்தின் வழியாகவே பறக்க உதவும் தசை யான கோரகாங்கியல் தசையின் (Coracoidius Muscle) பந்தகம் (தசைநாண்) செல்லுகின்றது. சிங்சேக்ரம், தட்டையான அடிப் பகுதியை உடைய கவிழ்த்து வைக்கப்பட்ட படகினைப் போன் றுள்ளது. இதன் முன்புறப் பக்கங்கள் குறுகலாகவும், பின்புறப்

பக்கங்கள் அகன்றும் காணப்படுகின்றன. இப்பகுதியுடன் கீபிமர் எலும்பு இணைந்து, அசையும்படி பொருத்தி இருப்பதுடன் பிங்கால் வால் பகுதிகளின் தசைகளும், பறக்க உதவும் தசைகளும் பொருத்தி அமைந்துள்ளன.

பறவைகள் நிற்கும்பொழுது ஏற்படும் காற்றைப் பைகளின் காற்றோட்டம்

(Ventilation of the Respiratory tract while standing)

பறவைகளின் உடலின் நிற்கும் பொழுதும் பறக்கும் பொழுதும் ஏற்படும் அழுத்தம் ஒரே மாதிரியாக இல்லை. பறக்கும்பொழுது இறக்கையிலேயே மேல் நோக்கி உயர்த்தும் விசை ஏற்படுத்தப்படுகின்றது. பறவைகளின் உடல் பறக்கும்பொழுது இரண்டு தொங்கும் படகை மார்பு வளைவு ஹெமிரோஸ்டேரீனல் தசைத்தொகுதிகளால் தாங்கப்பட்டு உள்ளது. உடல் குழியின் உட்கிடப்புறுப்புக்களின் எடை, மார்பெலும்பினாலும் வயிற்றுத் தசைகளினாலும் தாங்கிக் கொள்ளப்படுகின்றது. உடலின் மற்றப் பகுதிகள் விலாவெலும்புகள், மார்பெலும்பிற்கும் முன்னெலும்புத்தண்டிற்கும் இடையே அமைவப் பெற்றுள்ள கூட்டினால் பொருந்தியுள்ளது. பறவைகள் நிற்கும் பொழுது சிங்ஸ்க்ரத்திற்கு கால்களை முழு ஆதாரமாக அமைத்துள்ளன. ஆனால் உட்கிடப்புறுப்புக்களின் எடையும், பறக்க உதவும் தசைகளின் எடையும் மார்பெலும்பாலும் வயிற்றுப் பகுதி தசைகளாலும் தாங்கிக் கொள்ளப்படுகின்றன. இப்பகுதி அதாவது மார்பெலும்பும் வயிற்றுப் பகுதி தசைகளும் விலாவெலும்பாலும் முன்னெலும்புத் தண்டினாலும் தொங்கும்படியான நிலையில் அமைந்துள்ளன. மற்றும் கவாச உறுப்புகளின் காற்றோட்டம் பறவைகளின் நிற்கும் நிலைக்கும் பறக்கும் நிலைக்கும் பெரிதும் வேறுபாடு உள்ளது.

கவாசித்தலின்போது எலும்புக் கூட்டின் அசைவுகள்

(Movements of the bony structure)

பறவைகளில் உள் கவாசித்தலின்போது, கவாசித்தலுக்கும் பயனுள்ள தசைகள் கருக்குவதால் முன்னெலும்பிற்கும் மார்பெலும்பிற்கும் இடையேயுள்ள விலாவெலும்புப் பகுதிகள் கோணம் (Angle) விரிவடைகின்றது. அதனால் முன்னோக்கியும் நிற்கோக்கியும் மார்பெலும்பு அழுத்தப்படுவதால், மார்பெலும்பும் கோரகாய்டு எலும்பும் தோள்பட்டையையும் ஒரு கற்று கற்றுவிடுகின்றன. இவ்வாறான அசைவினால் மார்பு வயிற்றுப் பரப்பு முதுகுப்புற வயிற்றுப் புறப்பக்கங்களில்

பெரிதும் விரிவடைகின்றது. பின்னும் மார்பெலும்பின் பின்பகுதி பெரிதும் விரிவாக்கப்படுகின்றது. விவரவெலும்புகள் சற்று வெளிப்புறம் நோக்கி அடைவதால், மார்புக் கூட்டின் குறுக்கு விட்டப் பகுதியும் (Transverse diameter) விரிவடைகின்றது. மார்புப் பகுதியின் பக்கப் பகுதிகளும், கோரகம்பு எலும்புகள் மார்பெலும்புகள் மீது உராய்வதால் விரிவடைகின்றது. மேலே குறிப்பிட்ட எல்லா அசைவுகளும் ஒரே சமயத்தில் நிகழ்கின்றன. காற்றை வெளியிடும் பொழுது அதற்கென்று அமைந்துள்ள தசைகள் கருக்குவதால் மேலே குறிப்பிட்ட அசைவுகளுக்கு எதிர்மாறான அசைவுகள் ஏற்படுகின்றன. அதனால் உடல் குழிச் சருங்குகின்றது.

கவாசச் சுழற்சி (The Respiratory cycle)

பறவைகளில் சாதாரணமாகக் காற்றை உள்ளீழுத்ததும் வெளியீடுததும் ஒன்றன்பின் ஒன்றாக ஒரே சீராக தக்குதடையின்றி நடைபெறுகின்றது. பறவை வளையாமல் நேராக நிற்கும் பொழுது அக் கவாசமும் புற கவாசமும் நிதானமாகவும், எளிதாகவும் நடைபெறுகின்றன. இவை இரண்டிற்கும் இடைப்பட்ட கால இடைவெளியும் ஒரே அளவாக இருக்கும். தசைகளின் கருங்கு தன்மையால் உள் கவாசமும் புற கவாசமும் நடைபெறுகின்றன. இவ்வாறு காற் றோட்டமானது எப்பொழுதும் செயல் நிரமூலையதாகவே இருக்கும். பின்னும் இழு விசைத் தன்மையினால் மார்புக்கு மறுபடியும் பழைய தன்மையை அடைந்துவிடுதலை, பறவைகள் இளைப்பாறும் நிலையை ஆராய்ந்து பார்த்தால் கண்டு கொள்ளலாம்.

மேலே பறவைகளிலும் சுத்தமான காற்று உள்ளே புகும்அளவு வேறு வேறுபடவே இருக்கும். உதாரணமாக புறவின் உடலில் உள்ளே சுத்தக் காற்று சுமார் 5-8 C.C அளவு இருக்கும். விடுகளில் வளர்க்கப்படும் ஊத்துகளின் உடலில் உள்ள சுத்தக் காற்றின் அளவு சுமார் 38 C.C இருக்கும். கோழிக்குஞ்சின் உடலில் சுமார் 45 C.C சுத்தக் காற்று உள்ளது. இவற்றின் அளவு, பறவைகளின் அசைவுகள், செப்ப அழுத்தம், ஹார்பொன்களின் நோற்றம் முதலியவற்றைக் கொண்டே கருதலாகலாம், குறைவாகவோ இருக்கும். புழு இளைப்பாறும்பொழுது நிமிடத்திற்கு 30-35 முறை கவாசித்தல் ஏற்படுகின்றது. அந்த சமயத்தில் உள்ளேயும் வெளியேயும் புகும் காற்றின் அளவு சுமார் 150 முதல் 280 C.C வரை ஆகும்.

காற்றுப் பைகளின் காற்றோட்டம் (The Ventilation of the air sacs)

பறவைகளின் மார்பு வயிற்றுப் பரப்புகள், உள் கவாசித்தலின் போது விரிவடையும்பொழுது, காற்றுப்பைகளில் கீழ்தோக்கிய

அழுத்தம் ஏற்பட்டு அதனால் காற்று நிறந்துள்ளதும் விரிவாக்கப்படுவதுமான காற்றுப் பைகளினால் தள்ளப்படுகின்றது. மார்பு வயிற்றுப் பரப்புகள் விரிவடைதல்பொழுது மார்பெலும்பு பின்பகுதியின் கடைப்பகுதி விரிவடைகின்றது. அதனால் இப் பிற்பகுதியினுள்ள காற்றுப்பைகளில் முற்பகுதியிலுள்ள காற்றுப்பைகளையிட காற்றோட்டம் அதிகமாகக் கிடைக்கின்றது. மற்றும் பிற்பகுதி காற்றுப் பைகள் அளவில் பெரியதாகிவரும்பதால் அவற்றினால் உள்காற்றுச் சவாசம் அதிகமாகவே ஏற்படுகின்றது.

புதுவிட மார்பு வயிற்றுக் காற்றுப் பைகளில் காற்றோட்டம் அதிகமாகவே காணப்படுகின்றன. மற்றும் வயிற்றுப் பகுதித் காற்றுப் பைகளில் உள்சவாசக்காற்றின் நிலை, மற்ற இரண்டு சோடி மார்புக் காற்றுப் பைகளின் உள் சவாசக் காற்றின் நிலைக்குச் சமமாகும். இவ்வாறும்பொழுது பறவைகளில் இவ்வளவுகூடா இடைக்காற்றுப் பைகளும், சோவிக் உள் காற்றுப் பைகளும் செயல்பற்றே காணப்படுகின்றன.

நுரையீரலின் காற்றோட்டம் (Ventilation of the lungs)

பொதுவாக கவாசித்தலின் பொழுது பெரும் பகுதி உள்சவாசக் காற்று, காற்றுப் பைகளுக்கே செல்கின்றது. ஆனால் காற்று, காற்றுப் பைகளினின்றும் வெளிப்பெறும்பொழுது நுரையீரல்களை ஊடுருவிச் செல்கின்றன. விவாதமெலும்புகள் நுரையீரலின் முதலுப்புற மையப் பகுதிகளில் பொருத்தி உள்ள காரணத்தால், அவைகளின் அசைவினால் சற்று மெதுவான சவாச முறை ஏற்படுகின்றது. உள்சவாசத்தின் பொழுது விவாதமெலும்புகளுக் கிடையேயுள்ள நுரையீரல் திசுமூன்புற பின்புற திசையில் நீள்கின்றது. நுரையீரலின் பேரண்களை (Parenchyma)வும் விரிவடைகின்றது.

நுரையீரல் திசு சற்று விரிவடைந்த நிலையில் விவாதமெலும்புகளுடன் இணைந்துள்ளது. அங்ஙனம் விரிவடையாமல் இருந்தால், அத்திசு சுருங்குகின்றது. அங்ஙனம் சுருங்கும்பொழுது நுரையீரலினுள்ள காற்றுகளிக் குழாய்களும், இரத்தத்திற்குள்ளும் ஹட்ப்பட்டு விடுகின்றன. அதனால் நுரையீரலினுள்ள காற்றுப்புக முடிவாமல் பறவை காற்றில்லாமல் தினை இறந்துவிடும்.

காற்றுப் பாதையில் காற்றுச் சமூகம் வரும்பொழுது வயிற்றுப் பகுதி உற்றுச் சவ்வு சுருங்கி விரிவடைகின்றது. மற்றும் அது காற்றோட்டத்தை ஏற்படுத்தி விரைந்து செயல்படுவதில்லை. ஆனால் நுரையீரல் உற்றுச் சவ்வு தசை தொங்கல்களை உடையது. புற கவாசித்தலின் பொழுது அவைகள் சுருங்குவதால் உற்றுச் சவ்வின் மீது அழுத்

தத்தை ஏற்படுத்துகின்றது. அங்ஙனம் அழுத்தம் ஏற்படுவதால் அந்த அழுத்தம் நுரையிரினியின் கவாசித்தனிலும் ஏற்படும் அளவின் மாற்றங்களைக் குறைத்து அதனும் அங்குள்ள துளியோ அல்லது பெரிய காற்றுக் கிளைக் குழாயோ புற கவாசித்தனில்பொழுது விசித்து விடாமல் தடுக்கின்றது.


காற்றுப் பாதைகளின் காற்றோட்டம் (Ventilation in the Respiratory tract)

கவாசித்தனில்பொழுது மூலபின் காற்றுப்பைகளினுள் காற்றை இழுக்க முதல்படி இரண்டாம்படி காற்றுக் கிளைக்குழாய்கள் உதவுகின்றன. அதனும் காற்றுப்பைகளினுள் காற்றில்வாத பகுதிகளே கிடையாது. இங்ஙனம் காற்றுப் பைகளினுள் நுழையும் காற்று நுரையிரினியுள்ளும் நுழைகின்றது. இது சோயம் (Soyam) என்பவரின் கருத்தாகும். அவருக்குப் பின்னும் வந்தவர்களின் கருத்து, இதனினும் மாறுபட்டு காணப்படுகின்றது. அதற்குப் பின்பு ஏற்பட்ட கோட்பாடுகளெல்லாம் காற்று காற்றுப்பாதை நுரையிரல் காற்றுப்பைகள் முதலியவற்றிலும் பக்கக் காற்றுக் கிளைக் குழாயினுள் உட்கவாசம் புற கவாசத்தின்பொழுதும் ஒரே திசையில் தான் செல்கின்றது என்பதைப் விளக்குகின்றன. மற்றும் இங்ஙனம் காற்று ஒரே திசையில் செல்வதால் காற்றுக் கிளைக் குழாய்களிலெல்லாம் வாய்வுகள் இருக்கின்றன என்றும் கூறப்படுகின்றன. அந்தக் கோட்பாடும் மறுக்கப்பட்டு பறவைகளின் காற்றுப் பாதைகளில் வாய்வுகளே கிடையாது என்றும் கூறப்படுகின்றது. இந்த கோட்பாடுகளெல்லாம் கவாசித்தனில் பொழுது முதலாம்படி இரண்டாம்படி காற்றுக் கிளைக் குழாய்கள் அகலமாகியிருப்பதால் அவற்றினுள் காற்றின் பெரும்பகுதி செல்கின்றது என்றும், மற்றும் வேறு சிறப்பான மூலையிருந்தால்தான் பக்கக் காற்றுக் கிளைக் குழாயினுள் காற்று செல்கின்றது என்றும் கூறுகின்றன. இதுவும் சரிவாகியிருக்க முடியாது என்று கருதப்படுகின்றது.

ஃபிஷ்சர் (Fischer) என்பவர் கீழ்க்கண்டவாறு விவரித்துள்ளார். முதலுப்புற காற்றுக் கிளைக்குழாய் (Dorso bronchus) வயிற்றுப்புற காற்றுக் கிளைக்குழாய் (Ventro bronchus) தோன்றுகின்ற இடத்தினுள்ள மையக் காற்றுக் கிளைக்குழாயின் முடிவுப் பகுதியில் நிறுக்கின்றது. மையக் காற்றுக் கிளைக் குழாயும், பக்கக் காற்றுக் கிளைக் குழாயும் பின்பக்கத்தினுள்ள காற்றுப் பைகளுக்கு இணை இணையாகச் செல்கின்றன என்று கருதப்படுகின்றது.

காற்றுப் பாதைகளைப் பற்றி சரியாகத் தெரிந்து கொண்டவற்றை கீழ்க்கண்ட சோதனைகளின் மூலம் விளக்கம் தெரிவித்துள்ளனர்.

அதாவது ஒருவகை புனைக்கரியை பறவைகளை முகரவைத்தோ, ஊசி மருத்தின் மூலம் உடலினுள் செலுத்தினோ, அதன் காரணம் பாதைகளை அறிவலாம். அவ்வாறு உள்ளை செலுத்தப்பட்ட



படம் 31. புழுவின நுரையீரல் கார்புர்ப்பைகளின் தொடர்பு

1. கார்புர்ப்பு, 2. கிரீக்கல், 3. கார்புர்ப்பு கிரீக்கல் குழாய், 4. கிரீக்கல்குழாய் இடை கார்புர்ப்பு பை, 5. மூன் மார்பு கார்புர்ப்பு பை, 6. தடு கார்புர்ப்பு கிரீக்கல் குழாய், 7. பிச்சு மார்பு கார்புர்ப்பு பை, 8. இரண்டாம் படி கார்புர்ப்பு கிரீக்கல் குழாய், 9. வயிற்றுப்பகுதி கார்புர்ப்பு கிரீக்கல் குழாய், 10. எதிர்த்திசை நிகழ்ப்பு கார்புர்ப்பு கிரீக்கல் குழாய் (Recurvans), 11. கார்புர்ப்பு தத்துகென், 12. பக்கக் கார்புர்ப்பு கிரீக்கல் குழாய், 13. செர்விகல் கார்புர்ப்பு பை,

நிறமிகள் பறவைகளில் முதலாய்மபடி கார்புர்ப்பு கிரீக்கல் குழாய், பின்புற வயிற்றுப்பகுதி கிரீக்கல் குழாய்கள், பின்புற மார்பு, வயிற்றுப்பகுதி கார்புர்ப்பு பைகள், கார்புர்ப்பைகளினுள்ள எதிர்த்திசை நிகழ்ப்பு கார்புர்ப்பு கிரீக்கல் குழாய்கள், பக்கக் கார்புர்ப்பு கிரீக்கல் குழாய்கள், அதிலும் பின்புற கார்புர்ப்பைகளுடன் தொடர்பு கொண்டுள்ள பக்கக் கார்புர்ப்பு கிரீக்கல் குழாய்கள் முதலிய பாதைகளில் நிறமித் துகள்கள் அவ்வது நிறமிப்புனைப் படவத்தைக் காணலாம். முன்பக்கத்து வயிற்றுப்புறக் கார்புர்ப்பு கிரீக்கல் குழாய்களிலோ, மூன்புற கார்புர்ப்பு பைகளிலோ நிறமிகளைச் சிதிலும் காணமுடியாது, மற்றும் நிறமிகளை பின்புறக் கார்புர்ப்பைகளில் ஊசிவின் மூலம் செலுத்தினால் மேலே குறிப்பிட்டபடி அவைகள் பறவிக் செலுத்தின்றன என்றும், வெவ்வேடி புலத்தினுள் நிறமிகள் நுழைவதில்லை என்றும் தெரிய வருகின்றது. இது போன்ற சோதனைகளை இந்தக் காக்கைகளின் கவர உறுப்பு களுக்கு கார்புர்ப்பு குழாய் மூலம் நிறமிகளை செலுத்தி, செயற்கை முறையில் வளர்த்தனை செயல்படுத்தியும் ஆராய்ந்துள்ளனர். இந்த

சோதனையிலும் மேற்கூறிய பாக்தகனிலேயே நிறமிகள் சென்று வின்றன என்பதைத் தெள்ளத் தெளிய கண்டறிந்துள்ளனர். சோவம் என்பவர் தன்னுடைய சோதனையில் உள் கவாசித்தலின் பொழுது பக்கக் காற்றுக் கிளைக் குழாய்கள் குறுக்கு வீட்டத்தில் விரிவடைவின்றன என்று கண்டறிந்துள்ளார்.

கவாசித்தலின் கட்டுப்பாட்டு விதிமுறை (Regulation of the Respiratory Movements)

பறவைகளில் கவாசித்தலுக்கு கட்டுப் படுத்தும் நரம்புகளின் ஆற்றல்பற்றி சோதனைகளிலிருந்து அவ்வளவாகத் தெரியவில்லை. ஆனால் பாதுகாட்டிகளில் உள்ளதுபோன்ற அதே அவிச்சை செயல் (Reflex Function) பறவைகளிலும் ஏற்படுகின்றது என்று கூறுதற்கு வேண்டிய ஆதாரங்கள் உள்ளன. கவாசித்தலை கட்டுப்படுத்தும் நரம்பு சார்ந்த மையப்பகுதி முகுவதில் உள்ளது. மற்ற நரம்பு மண்டலத்தின் தூண்டுதல் இல்லாதபொழுது இந்தப் பகுதி, சற்று குறைந்த முறையில் செயல்படும், தன்னிச்சையாகவே இயங்குகின்றது. இவ்வாறு குறைந்த செயல்படும் முறையினை கோழிக் குஞ்சுகளில் காணலாம். இவ்வாறு தன்னிச்சையாக செயல்படும் தனிப்பட்ட மையப் பகுதியில் தூண்டுதல், தன்னுடைய நரம்புகளின் மூலமாக உள் கவாசித்தலுக்கு பயன்படும் தசைகளுக்கு செய்வதால் உள்கவாசம் நடைபெறுகின்றது. இவ்வாறான சோதனைகள் செய்வதற்குப் பறவைகளில் (Sparrow) தான் ஆராயப்படுவதாக புறகவாசம் கறுகறுப்பாக இயங்குகின்றதா அல்லது மிகவும் நிதானமாக நடக்கின்றதா என்பது குறித்து அறிவது மிகவும் கடினமாக உள்ளது. ஆனால் பறவைகளில் புறகவாசமும் நரம்பு மண்டலத்தின் தூண்டுதலாலேயே நடைபெறுகின்றது என்பதற்கு ஆதாரங்கள் உள்ளன.

இவ்வாறு பறவைகளில் கவாசித்தல் நரம்பு மண்டலத்தின் தூண்டுதலால் நடைபெறுமாயின், ஒரே சீராக அமைப்பெற்ற உள் கவாசத்தினையும் அவ்வப்பொழுது நிமலென்று தோன்றுகின்ற புறகவாசத்தினையும் காணலாம்.

கவாசித்தலின் பொழுது நரம்பு மையங்களுக்கு உணர்ச்சிகளைக் கொண்டு சேர்க்கின்ற நரம்புகளின் கட்டுப்பாடு (Afferent neural control of the respiratory cycle)

சாதாரணமாக பறவைகள் கவாசிக்கும் பொழுது தன்னிச்சையாக கவாச மண்டலம் செயல்படுவதில்லை. நரம்பு மையங்களுக்கு உணர்ச்சிகளைக் கொண்டு சேர்க்கின்ற நரம்புகளை அச்செயல்

செய்கின்றன. இத்தகைய நரம்புகள் இரண்டு மூக்கிய புள்ளிப் பகுதிகளில் அமைந்துள்ளன. கவாச உறுப்புகளின் நீளம் உணர்வுச் செல்களிலும் (Stretch receptors) காற்றுக் குழாயின் படலத்தின் காற்றின் திசை, வேகம் முதலியவற்றை அறிவக்கூடிய செல்களிலும் மேலே குறிப்பிட்ட நரம்புகளின் மூக்கிய பகுதிகள் உள்ளன. கவாச உறுப்புகளில் எதுவும் தன்மையோ, அழிந்துவிடுத் தன்மையோ ஏற்படும்பொழுது தன்விச்சை தூண்டுதல் ஏற்பட்டு வேகம் நரம்பின் உதவியால் உள் கவாசம் ஏற்படுகின்றது. இதற்கு நேர் மாறாக கவாச உறுப்புகள் விரிவடைவதால் புற கவாசம் ஏற்பட தூண்டுதல் இடைக்கின்றது. பறவைகளில் ஏற்படும் இத்தகைய தன்விச்சை தூண்டுச் செயல், பாதுகாட்டிகளில் காணப்படும் தெறிகிட்டுமேர் தன்விச்சை செயலிற்கு (Herring-Breuer reflex) ஒப்பாகும் என்று உதர்ப்படுகின்றது. காற்றின் காற்றுக் குழாய் வழியாக ஊடுததள்ளும் பொழுது காற்று காற்றுப் பாதைகளின் வழியாக சென்று கடைசியில் காற்றுப் பைகளிலுள்ள துவாரங்களின் மூலம் வெளியேறுகின்றது. அவ்வாறு காற்று சுற்றியரும் பொழுது முதலில் துரையீரல்களில் உறுப்புகள் தன்விச்சை செயலால் தடுக்கப் பட்டு மறுபடியும் செயல்படும் நிறம் பெறுகின்றது.

காற்றுக் குழாய் வழியாக காற்று வெளியேறும்பொழுது, காற்றுக் குழாய் படலங்களிலிருந்து புறத்தூண்டுதல் வேகம் நரம்பின் வழியாக மூகுளத்திற்கு எடுத்துச் செல்லப்படுகின்றது. புறச் கவாசமும், உட்கவாசமும் ஏற்படுத்தும் தூண்டுதல் பகுதி மூகுளத்தின் உள்ளது. இருப்பினும் உட்கவாசத்தின் செயல் ஒக்கியே உள்ளது.

கவாசித்தலின் வேதியல் கட்டுப்பாடு (Chemical control of Respiration)

கவாச உறுப்புகளின் மூக்கிய பகுதியின் செயல்கள் காற்றிலுள்ள பிராணவாயு, கரியமகவாயு முதலியவற்றின் தன்மை துரையீரலினுள்ளும், இரத்தத்தினுள்ளும் ஏற்படும் மாற்றங்களுக்கேற்றவாறே அமைந்துள்ளது. இரத்தத்தின் குறைந்த பிராணவாயுப் பொருள் இருந்தால் மாற்றங்கள் அவ்வளவாக இல்லை. ஒரு பறவை காற்றில் னாயல் இறந்துவிடும் நிலையில் இருந்தால் கவாச உறுப்புகளிலுள்ள செல்கள், கவாசச் செயலித் தூண்டுப்படியான நிலையில் உள்ளன. அப்போதற்ற நிலையிலும் சிறிது கவனிக்கிடமான நிலையிலுள்ள பறவைகளிலும் பிராணவாயுப்பகுதி உட்கவாசக் காற்றிலுள்ள சிறிது குறைக் கப்பட்டால் கவாசித்தலின் வேகம் அதிகரிக்கின்றது.

உணர்ச்சி தூண்டுதல்கள் கவாச உறுப்புகளிலிருந்து மூகுளத் திற்கு வேகம் தரம்பின் மூலமாக எடுத்துச் செல்லப்படுகின்றது. இரு பக்க வேகம் தரம்புகளையும் துண்டித்துவிட்டால் கவாசித்தலின் உணர்வு தூண்டுதல்கள் மூகுளத்திற்குச் செல்லாது. இரத்தத்தி லுள்ள கரிமமலவாயுப் பொருளும் கவாச உறுப்புகளின் முக்கியப் பகுதிகளின் உணர்வுத் தூண்டுதலிற்கு காரணமாக உள்ளன. இது நிலத்தில் வாழும் பறவைகளிடத்தான் அதிகமாகக் காணலாம். நீரில் ளாழும் பறவைகளிலும், நீரில் அனைத்து தங்களை உணவைத் தேடும் பறவைகளிலும் இரத்தத்தில் கரிமமலவாயுப் பொருள் (CO₂ content) அதிகமானும் கவாசித்தல் பெரிதும் பாதிக்கின்றது. இந்தத் தூண்டுதல் மூக்குத் தொண்டைப் பகுதியிலுள்ள (Naso pharynx) வேதியல் உணர்வு (Chemo Receptor) செவ்விலிருந்தே தோன்று கின்றன. மற்றும் நீரில் மூழ்கும் பழக்கமுள்ள பறவைகளில் தலை, உடம்பகுதிக்குக் கீழே சென்றும், கவாசித்தல் நின்று விடுகின்றது. இவ்வாறான மாற்றங்கள் குறிப்பிடத்தக்கதாகவும் சற்று வித்தை வாகவும் பறவைகளில் அமைந்துள்ளன.

கவாச மண்டலத்தின்—வெப்ப சீரமைப்பு (Heat regulation by respiratory system)

பறவைகளின் கவாச மண்டலத்தில் நீர் நீராவியாக மாறிச் செல்லுதல் வெப்பத்தை வெளியேற்றத்தற்குரிய ஒரு அரிய சாதனை ளாகும். உடலின் வெப்பநிலை (Temperature) ஏற ஏற இதன் முக்கியத்துவமும் அதிகமாகின்றது. கவாசித்தலின் பொழுது வெப் பத்தை வெளியேற்றக் கூடிய வேறு வழிகள்—அவ்வாறு வெப்ப மாற்றம் ஏற்படுவதால், கவாசத்திற்குரிய காற்றில் வெப்பம் ஏற்றும் நிலை முறையினைகளைக் குறித்து சிறிது தெரிந்துகொள்ளும் நிலையில் இருந்தாலும், காற்றின் வித வெப்பமானம் (Specific heat) மிகவும் குறைவாயிருப்பதால், இது பற்றிய ஆராய்ச்சி அவ்வளவு முக்கியமானதாகவில்லை.

காற்றோட்டத்தின் பொழுது நீராவியாக மாறும் இயக்கவியல் (The Mechanics of Evaporation by Ventilation)

நீர் நீராவியாக மாறும் விதைத்தில் பறவைகளில் இரண்டு துணைக் கூறுகள் உள்ளன. கவாசப் பாதையிலுள்ள ஒரு நுண்ணிய காற்றின் நிறையும், உள் கவாசக் காற்றினும் புற கவாசக் காற்றிலுமுள்ள நீராவியின் அழுத்தத்தின் வேறுபாடுகள் அவ்விரு துணைக் கூறு களாகும்.

நுண்ணிய கன அளவு (Minute volume) கவாசிக்கும் கார்தின் நுண்ணிய கனஅளவு கவாசிக்கும் வீதம், கவாசிக்கும் அளவு ஆவிய இரண்டில் ஒன்றையோ அல்லது இரண்டையுமோ பொறுத்து மாறும். பறவைகள் நுரையிரவினுள்ள கார்துப் பாதைகளின் விட்டத்தை மாற்றிக் கொள்ளும் இயல்புள்ளதால் கவாசிக்கும் கார்தின் நுண்ணிய கனஅளவு அதிகரிக்கும். இதனால் கார்துப் பைகள் எளிதில் காற்றோட்டமாகப்படுமே தவிர நுரையிரவின் காற்றோட்டம் அதிகரிக்கச் செய்யாது.

தடுநிலை வெப்ப நிலைக்குக் குறைந்த (Thermo-neutral) வெப்ப நிலையில் வளர்சிதை மாற்ற ஆக்ஸிஜன் தேவை நுண்ணிய கன அளவை பொறுத்து உள்ளது. ஆனால் இக்கொந்தா குகுணியப் பற்றி பார்த்தால் இவ்வெப்ப நிலையின் 8ம் அதிகப்படியாக ஆவியாதக் கடைபிடிக்கிறது. வெப்ப தடுநிலைக்கு மேற்பட்ட வெப்பநிலைகளில் உடல் வெப்பநிலை உயர்வால் நுண்ணிய கனஅளவு அதிகரிக்கின்றது. புரூக்கனில் கவாச வீதம் (Frequency) அதிகரிக்கின்றது. ஆனால் கவாசித்தலின் அளவோ குறைகின்றது (Depth of respiration). உடல் வெப்பநிலை 41.7° ஆக இருக்கும்போது கவாசித்தலின் வீதம் 46 ஆகும். நுண்ணிய கனஅளவு 185 க. செ. இருக்கும். உடல் வெப்பநிலை 43.6° க்கு உயர்ந்தவுடன் கவாசித்தலின் வீதம் நிமிடத்திற்கு 510 ஆக உயர்கின்றது. ஆனால் நுண்ணிய கன அளவோ 610 க. செ. ஆக அதிகரிக்கின்றது.

உள்ளிழுக்கும் காற்றிற்கும் வெளிவிடும் காற்றிற்கும்

உள்ள ஆவி அழுத்த வேற்றுமை

(Vapour pressure difference between
Inspired & expired Air)

கவாசித்தலின் விளைவாக ஏற்படும் ஆவியாதல் உள்ளிழுக்கும் காற்றிற்கும் வெளிவிடும் காற்றிற்கும் உள்ள ஆவி அழுத்த வேற்றுமையைப் பொறுத்து உள்ளது. குறிப்பிட்ட உடல் வெப்பநிலையில் உள்ளிழுக்கும் காற்றின் ஆவி அழுத்தம் அதிகரித்தால் ஆவியாதலின் வீதம் குறைகின்றது. எனவே கவாசித்த ஆவியாதல் சரக்காற்றில் குறைவாகவே இருக்கும். உதாரணமாக கேயர் என்பவர் புரூக்கனில் 30° வெப்ப நிலையில் ஆவியாகும் நீருக்கும் உட்கொள்ளப்பட்ட ஆக்ஸிஜனுக்கும் உள்ள வீதம் உயர்ந்த காற்றில் உள்ளதைவிட சரக்காற்றில் ($3/4$ பங்கு பூரீதமாக்கப்பட்டது) $1/3$ பங்கு குறைவாக உள்ளது என்று கண்டறிந்தார். புரூக்கனில் ஆவியாகும் வீதம் சரக்காற்றில் 20°C வெப்பநிலையிலும் உயர்ந்த காற்றில் 30°C வெப்பநிலையிலும் சமமாக உள்ளது என்பதையும் கேயர் கண்டறிந்தார். பன

பறவையினங்கட்கு அதிக வெப்பநிலையைத் தாங்கும் சக்தியும், வெளி ஆவி அழுத்தமும் தவிர்த்துவிடப் பொருத்தத்தில் உள்ளன.

வெளியிலும் காற்றின் நீரின் அளவு அக்காற்றின் வெப்ப நிலையைப் பொருத்து உள்ளது. துறைவீரனிலும் காற்றுப் பைகளிலும் காற்று பூரிதமாவதால் அதன் ஆவி அழுத்தம் அவ்வெப்ப நிலையிலுள்ள பூரித ஆவி அழுத்தமாகும். எனவே வெப்பநிலை அதிகரித்தால் ஆவியாதலின் வீதமும் அதிகரிக்கின்றது. வெளிச் செல்லும் காற்று குளிர்ந்த காற்றுப் பாதை, மூக்குப் பாதை இவை வழிபாகச் செல்லும்போது அக்காற்றிலுள்ள நீராவி குளிர்ச்சி படைகின்றது. இதனால் திகக்களுக்கு உடனடியாக வெப்பம் மாற்றப்படுகிறது. ஆனால் மேற்கூறியபடி நீராவி குளிர்ச்சி படைகின்றதா என்பது திட்டவாட்டமாகத் தெரியாததொன்றாகும். கவாசிக்கும் காற்றின் நிகைவேகம் (Velocity) ஒரு நிலைமையு காணலாகும் (Critical factor). இதனால் தான் மூச்சு இரைக்கும் ஒரு பறவைக்கு கவாசித்தலின் வீதம் அதிகரித்தால் நுண்ணிய கனஅளவும் அதிகரிக்கின்றது.

நீர் ஆவியாக மாறுவதில் காற்றுப்பைகளின் தொழிற்கூறு

(The Role of air sacs in Evaporation)

காற்றுப் பைகளில் நீர் ஆவியாதலின் பெரும் பகுதி நடைபெறுகின்றது. மாட்டி, வயிற்றுப் பகுதிக் காற்றுப்பைகள், செயல்படாமல் இருப்பின் எப்பொழுதும் நீராவியாகும் நிலையைக் காட்டிலும் மூன்றிரண்டு பங்கிலிருந்து பாதிவரை குறைந்து விடுகின்றது. காற்றின் வெப்பநிலை மிகவும் அதிகமாக இருப்பின், மேலே குறிப்பிட்ட காற்றுப் பைகள் செயல்படாமல் இருப்பின் புதுவானது தன்னுடைய உடல் வெப்பத்தைக் கட்டுப்படுத்த இயலாமல் மிகவும் அவதியுறுகின்றது. மூச்சிரைக்கும் புறாவில் (Panting pigeon) கவாசம் நிமிடத்திற்கு 300 முதல் 400 வரை இருக்கும். இப்பொழுது காற்றுப்பைகளின் காற்றிலுள்ள கரியமலவாயுவின் சதவிகிதம் மூன்றில் இரண்டு பங்கிலிருந்து மூன்றில் ஒரு பங்காகக் குறைந்துவிடுகின்றது. இதில் வயிற்று மூள் காற்றுப்பைகள், மிசைவிக்குவார் இடைக் காற்றுப் பைகள் சொவிக்கல் காற்றுப்பைகள் முதலிய மூன்பகுதி காற்றுப் பைகளே பெரிதும் பங்கேற்கின்றன. வளர்சிதை மாற்றம் அதிகரிக்கும்பொழுது காற்றோட்டமும் அதிகரிக்கின்றது. உடல்நிலை குளிர் படுத்தப் படுவதாலும் இறகுகளின் அசையும் தன்மையாலும் காற்றுப் பைகளிலுள்ள காற்றின் கரியமலவாயுவின் சதவிகிதம் மாறும் இருக்கின்றது. இந்த மூள் காற்றுப்பைகளில் காற்றோட்டம் அதிகரிக்கும் பொழுது, கரியமலவாயுவின் சதவிகிதம் குறைகின்றது.

பறவைகளின் உடலில் அதிகப்படியான வெப்பம் ஏற்படும் பொழுது மூன் காற்றுப் பைகள் முக்கியமாக அதைத் தணிக்கும்படியான குளிர் சாதனப் பெட்டி போன்று செயல்படுகின்றது.

பறக்கும்பொழுது ஏற்படும் கவாசத்தில் நீராவியாதல் (Respiratory evaporation during flight)

பறக்கும் பொழுது, பறக்க உதவும் பெரிய மார்புத் தசைகளில் வெப்பம் அதிகப்படியாக உண்டாகின்றது. அப்பொழுது பறக்க உதவும் மார்புத் தசைகளுக்கடியிலுள்ள மூன் காற்றுப் பைகளில் அதிகப்படியான நீராவியாதல் ஏற்படுகின்றது. வாக்றுகளில் சாதாரணமாக நிற்கும் நிலையில் மூன் காற்றுப் பைகளில் நீராவியாதலை தடுப்பதற்காக கழுத்து S வடிவமாக அமைந்திருக்கும். பறக்கும் பொழுது அப்பறவைகளில் கழுத்து நேராக் கப்படுவதால் காற்றுப் பைகளில் பறக்கும் பொழுது நீராவியாதல் ஏற்பட்டு பறவை அதிகப் படியான வெப்பத்தை வெளியேற்றுகின்றது.

கவாசிக்கும் பொழுது நீராவியாக்குதலின் மைய நரம்பு மண்டலத்தின் கட்டுப்பாடு (Central control of respiratory evaporation)

மைய மூளையின் மூன்புற முதுகுப் பக்கச் கவர்களில் பறவைகளில் மூச்சுத் திணறும் நினைவினைக் கட்டுப்படுத்தும் முக்கிய பகுதி உள்ளது. இந்தப் பகுதி துண்டப்படுமானால் மூச்சுத் திணறலைக் கட்டுப்படுத்தும் முக்கிய பகுதி, கவாசித்தலின் நிலையை உண்டாக்கும் பகுதிவுடன் இணையும் பொழுது கவாசித்தலின் வேகம் அதிகரிக்கின்றது.

மூச்சுத் திணறலைக் கட்டுப்படுத்தும் பகுதிக்கு வரும் இரத்தத்தின் வெப்பத்தைப் பொறுத்தே அப்பகுதி செயல்படுகின்றது. உடலிலின்றும் புறத் தூண்டுதலின்றவையோ அல்லது உடலின் வெப்பநிலைக் கெற்றவாறே செயல்படும் என்ற நிலை அதற்கெனவே. நோயின் வெப்பத்தைக் கோழிக் குஞ்சுகளில் செயற்கை முறையில் அதிகரிக்கச் செய்து, அதே சமயத்தில் மூளக்குச் செய்தும் இரத்தத்தை பனிக்கட்டியை தலைப்பகுதியில் வைத்துக் குளிர்ச் செய்து கொண்டு குந்தோமானால் கோழிக் குஞ்சுக்கு மூச்சுத் திணறும்நிலை ஏற்படாது என்று சோதனை மூலம் விளக்கப்பட்டுள்ளது. மூச்சுத் திணறுதல் ஏற்படுவதற்கு $0.1-0.4^{\circ}\text{C}$ க்கு இடையில் வெப்பம் ஏறினாலே போதுமானதாகும். உடலிலுள்ள இரத்தத்தின் வெப்பநிலை அதிகரித்துக் கொண்டே போகுமானால் மூச்சுத் திணறுவதும் நின்று பறவை இறந்து விடுகின்றது.

சிலவகைச் செயல்களின்பொழுது ஏற்படும் கவாசித்தலின் தன்மை

(Respiration during specialised activities)

நீரில் மூழ்கி நீந்திச் செல்லுதல் என்னும் செயல் அதேக பறவை இனங்களில் காணக்கூடியதொன்றாகும். [சில பறவைகள் நீருக்கடியில் சில நிமிடங்கள் மூழ்கி இரைதேடி வெளிவருகின்றன. ஊர் பறவை 15 நிமிடங்களும், குன்னவாத்துக்கள் 16 நிமிடங்களும், கியனிமாட் (Gallinule) 8 நிமிடங்களும் நீருக்கடியிலேயே மூழ்கி வெளிவராமல் இரையைத் தேடும் ஆற்றல் பெற்றிருக்கின்றன. மற்றும் சில பறவைகள் மூதல் மூன்ற மூழ்கி வெளிக் கிளம்புதற்கும் அடுத்த மூன்ற மூழ்குவதற்கும் இடையில் ஒருசில கிதாடினோ என்குத்துக் கொள்கின்றன. தருவப் பிரதேசங்களில் வசிக்கும் ஊர் பறவைகள் ஒரு மூன்ற நீருக்குள் மூழ்குவதற்கு முன், காற்றுப் பாதையினுள்ள காற்றை வெளியே விட்டுவிட்டு நீருக்குள் மூழ்குகின்றன. அவ்வாறு கவாசப் பாதையினுள்ள காற்றை வெளிப்படுத்துவதால், அதன் மிகக்கும் ஆற்றல் (Buoyancy) ஏடுக்கப்பட்டு, நீரினுள் மூழ்குவதற்கு ஏற்றவாறு அமைகின்றது. நீரில் மூழ்கும் பறவைகளில், அவை நீரில் மூழ்கும்பொழுது அவற்றின் மார்புப் பகுதி நிறிதும் அசைவற்றுக் காணப்படுகின்றது. மற்றும் நீரில் மூழ்குவதற்கு முன்னால் இப் பறவைகள் இறகுகளை ஒன்றோடொன்று பொருத்துமாறு அழுத்துவதால், அதனிடையே உள்ள காற்றும் வெளியேறி, பறவை மூழ்குவதற்கான ஆற்றலைப் பெறுகின்றது. நீரில் மூழ்கும் ஆற்றலுள்ள பறவைகள், அவற்றின் கவாச மண்டலத்தின் துணையுடைய இரத்த மண்டலத்தின் உதவியுடையே இந்தவகைமப்பினை பெறுகின்றன. மற்றும் இப்பறவைகளில் இரத்தத்தின் அளவு அதிகமாகிவிருக்கும். இரத்தத்தினுள்ள ஹீமோக்ஸிஜனின் அடர்த்தியும் அதிகரிக்கின்றது. தசைகளினுள்ள மயோக்ஸிஜனின் பகுதி அதிகரிக்கப்படுகின்றது. நீரில்மூழ்கும் தகவமைப்பினையுடைய பறவைகளில் இரத்தத்தினுள்ள கரிமமலாடியின் அளவிற்கு அப்பறவைகள் மிகக் குறைந்த உணர்தலின் தன்மையையே காட்டுகின்றன.

பறவைகளின் செயலற்ற பருவத்துயில் கொள்ளும் நிலை (Hibernation & Torpidity)

பறவைகளின் பல சிறப்பினைகளில் சாதாரணமாக இருக்கக் கூடிய நிலைக்கு முற்றினும் மாறாக உடலின் வெப்பநிலை ஒரே சீராக அமையாமல் நிம்மாற்றமடையக் கூடியதொன்றாக உள்ளது. சாதாரணமாக இரவு நேரங்களில், இப்பறவைகளின் உடல் வெப்பம்

குறைந்துவிடும்பொழுது, இந்தப் பறவைகள் செயலற்ற செறிதலில் கொள்ளும் நிலையை அடைகின்றன. இத்தகைய செறிதலில் கொள்ளும் நிலையின்பொழுது உடலின் வளர்சிதை மாற்றத்தின் அளவும் வெகுவாகக் குறைந்து விடுகின்றது. அந்த சமயத்தில் கவாசித்தலின் செயலும் மிகவும் குறைந்து காணப்படுகின்றது. ஒரு சில பறவைகளில் இது குறித்து கண்டுபிடிக்கப்பட்டுள்ளது. ஆனால் சிறிதளவும் இவை எழுப்பும் பறவையில் (Anna, Humming bird) உடலின் வெப்பத்திற்கு ஏற்றவாறே கவாசித்தலும் செயல் படுகின்றது. உடலின் வெப்பம் 12°C ஆகவிரும்ந்தால் கவாசித்தலின் வேகம் நிமிடத்திற்கு 60 இருக்கும். பறவை இளைப்பாறும்பொழுது அதன் உடலின் வெப்பம் 42°C ஆக இருக்கும். இப்பொழுது கவாசித்தலின் வேகம் ஒரு நிமிடத்திற்கு 370 ஆக இருக்கும். உடலின் வெப்பம் 20°C டுக்குக் கீழாக இருந்தால் பறவையின் கவாசித்தலின் வேகம் ஒரே சீராக அளவளாமல் வேறுபட்டுக் காணப்படும்.

பியர்சன் (Pearson) என்பவர் 1950 ஆம் ஆண்டு செயலற்ற செறிதலிலினின்றும் எழுந்த பறவைகளின் அசைவுகளைப்பற்றி சிறிது ஆராய்ச்சி நடத்தியதன் பலனாக அதுபற்றி விளக்கியுள்ளார். ஆனால் இவை எழுப்பும் பறவைகள் (Allen Humming bird) செறிதலில் விடக் கூரம்பிக்கும் நிலையில் கவாசித்தல் நிமிடத்திற்கு 132 ஆக இருக்கும். 7 நிமிடங்களுக்குப் பின்னும் அவற்றால் பறக்க இயலாவிட்டால், பறவை இறகுகள் பறக்கும் திறனற்றுக் காணப்படுகின்றன. பின்பு கவாசிக்கும் வேகம் நிமிடத்திற்கு 210 ஆக உயர்கின்றது. மூன்று நிமிடங்களுக்குப் பின்பு கவாசித்தலின் வேகம் நிமிடத்திற்கு 150 ஆகக் குறைந்து, ஒரு நிமிட இடைவெளிக்குப்பின் பறவை தட்டுத்தடுமாறி நடந்து செல்கின்றது.

மேலே குறிப்பிட்டப் பறவைகள் ஒரு சில மணி நேரங்களே செறிதலில் கொள்கின்றன. புவர்பிள் (Pou bill) என்ற பறவைகள் குளிரகால முழுவதும் செயலற்ற செறிதலில் கொள்கின்றன. இப் பறவைகளில் ஒரு சிறிதுகூட கவாசிக்கும் நிலை இடையாது. இப் பறவைகள் செறிதலிலினின்றும் விழித்தவுடன், கடினமாகவே சிறிது கவாசிக்கும். அப்பொழுது ஒரு நிமிடத்திற்கு 40 முறை கவாசிக்கின்றது. அப்பொழுது உடலின் வெப்பம் $14-20^{\circ}\text{C}$ டிற்கும் இடையில் உள்ளது. உடல் வெப்பம் 20°C முதல் 24°C வரை ஏறும் பொழுது கவாசித்தலும் நிமிடத்திற்கு 78 முதல் 82 வரை ஏறி, வேகமாகச் கவாசிக்கின்றது. நன்றாக விழிப்படைந்தவுடன் இப் பறவைகளில் உடல் வெப்பம் 37.2°C முதல் 40°C வரை ஏறி விடுகின்றது.

பறத்தலின்பொழுது சுவாசித்தலின் நிலை (Respiration during flight)

மற்ற உறுப்பு மண்டலங்களைப் போன்றே பறவைகளின் சுவாச மண்டலமும் பறவையின் காற்று வாழ்க்கைக்கேற்றவாறு தகவமைப்பு களைப் பெற்றுள்ளன. பறவைகளில் பறக்கும்பொழுதுள்ள சுவாசித் தலின் நிலையை அறிவது மிகவும் கடினம். பறக்கும்பொழுது ஏற்படும் சுவாசித்தலிலும், உடலின் வெப்பத்தைச் சீராக்கும் நிலையிலும் அவைகள் எவ்வாறு செயல்படுகின்றன என்பது பற்றியும் பல ஆராய்ச்சிகள் நடைபெற்று வருகின்றன. இருப்பினும் இது குறித்து இப்பொழுதும் சரியானத் தகவல்கள் நமக்குக் கிடைக்க வில்லை. இப்பொழுது பறவைகளில் பறத்தலின் பொழுதுள்ள சுவாசித்தலின் நிலையை தரிக்க ரீதியான விளக்கங்களாலேயே அறிய முடிபெற்றது.

நழுவிப் பறத்தல், வட்டமிட்டு பறத்தல், மிதவை போன்ற மிதந்து பறத்தல் போன்ற பறக்கல்களுடைய பறவைகளில் இறக்கைகளை நன்றாக மேலும் கீழமாக அடித்துக்கொண்டு பறத்தல் காற்றிப் பறந்து திரிதல் போன்ற பறக்கல்களைவிடைய பறவைகளைவிட சக்தி குறைவானவையே இருந்தாலும் அதுவே அவைகளின் தேவைக்குப் போதுமானதென்று கருதப்படுகின்றது. புற இறக்கைகளை மேலும் கீழும் அடித்துக்கொண்டு, செங்குத்தாக மேலே எழும்பிப் பறக்கும் ஆற்றலுள்ள பறவைகளாகும். இதற்கு அப்பறவைகளுக்கு மார்புத் தசைகளும் மேல் கோரகாய்டியல் தசைகளும் (Pectoral & Super coracoidalis & Muscle) பயன்படுகின்றன. இவ்விருண்டு தசை களும் உடலின் எடையில் 50% உள்ளது. இதே தசைகள் இறகுகளை மேலும் கீழும் அசைத்து எழும்பி, நழுவிப் பறக்கும் தெருவிக்கல் பறவைகளில் (Herring gull) உடலின் எடையில் 16% உள்ளது. நன்றாக வேகமாகப் பறக்கும் பறவைகளில், சாதாரண வேகத்துடன் பறக்கும் பறவைகளைவிட இருதயம் அதிக எடை உள்ளது. புறவில் இருதயம் உடலின் எடையில் சுமார் 12-14% உள்ளது.

பறவைகளின் உடலில் விவரணை சுரப்பிகள் கிடையாது. பறக்காத நிலையில் பறவைகள் விவரணை சுரப்பிகள் இல்லாததால் வெப்ப மிகுதியால் (Hyperthermia) மூச்சுத் திணறுதலை எதிர்த்து போராடுகின்றன. காற்றோட்டம் காற்றுப் பாதைகளின் மேல் பகுதியிலும் காற்றுப் பைகளிலுமே காணப்படுகின்றது. கரியமல வாயுவில் இழுசக்தி (Tension) இருப்பதாகத் தெரியவில்லை. ஆகையால் நுரைவிரலின் பேரங்கையையும் எப்பொழுதும்போலவே சாதாரணமாகவே இயக்குகின்றது. பறக்கும்பொழுது பறவைகளால் உபயோகப்படுத்தப்படும் பிராணவாயு முதலியவற்றைக் குறித்து

ஒரு சிற்றே அறியலாம். அதிக கோடை காலங்களில் பறவைகள் எவ்வாறு உள்ளன என்பது பற்றி அநேக அறிஞர்கள் ஆராய்ச்சி செய்துள்ளனர். சிறிய அளவுள்ள பறவைகளும், மிகப் பெரிய அளவுள்ள பறவைகளும் காலை நேரத்திலேயே உணவுப் பொருளைத் தேடி உண்ணுகின்றன. பின்பு அதிக வெப்பமாக உள்ள காலை 11 மணி முதல் மாலை சுமார் 4 மணிவரை காற்றின் வெப்பம் 35°C -ஊற்றும் 45°C -ஊற்றும் இடையேயிருக்கும். சிறிய பறவைகளான பிட்டுக் குருவி, புழு போன்ற பறவைகள் தம்வறிமூலுள்ள பகுதிகளில் தங்களை மறைத்துக் கொண்டு மாலைவரை அங்கேயே தங்கி இருக்கின்றன. அளவில் பெரிய கழுஞ், பருந்து, ஸ்டோர்க் (Stork), ரேவன் போன்ற பறவைகள் தங்கள் இறகுகளை நன்றாக விரித்துக் கொண்டு சுமார் 700—1000 மீட்டர் அடி உயரமான இடங்களுக்கு பறந்து சென்று, அங்கேயே சுற்றிப் பறந்து திரிகின்றன. 700—1000 மீட்டர் உயரமான இடங்களில் $10-15^{\circ}\text{C}$ வெப்பமே இருப்பதால் தரைவீல் வெப்பமாக இருக்கும் நேரத்திலும் அங்கு மிகவும் குளிர்ச்சியாக இருக்கும். மற்றும் 37 முதல் 38°C வரையுள்ள கீழ்ப்பகுதியில் பறக்கும்பொழுது ரேவன் பறவைகள் அனுகூலத் திறந்துகொண்டே பறக்கின்றன. அவ்வாறு அகலினைத் திறந்துகொண்டு பறப்பதால் வாயிலூடே காற்றுச் சேய்வதால், சுவாசப் பாதை குளிர்ச்சி யடைவும் என்று கருதப்படுகின்றது. மணலில் லாழும் கிரௌஸ் (Sand grouse) பறவைகள் காலைவிலும் மாலைவிலும் தண்ணீர் பகுதி களிலிருந்தே பறந்து செல்கின்றன. ஒவ்வொரு முறையும் அவை ஒரு கிண்ணம் (2×150 ml) தண்ணீர் குடிக்கின்றதாகக் கூறப் படுகின்றது. இவ்வாறு அவை ஒரு கிண்ணம் தண்ணீர் குடிப்பதால், பறக்கும்பொழுது தண்ணீர் நீராவிவாக மாறி போதிய வளினை கிடை மாற்றம் ஏற்பட அதிக வெப்பமான நாட்களிலும் பறக்க முடிகின்றது. பறக்கும்பொழுது காற்றுப் பைகளைக் குளிர்ச்சிப் படுத்தப்படும் முறையின்பற்றி அறிய இயலாவிடும்.

7. பறவைகளின் இரத்த ஓட்ட மண்டலம்

பாதுாட்டிகளைப் போன்றே பறவைகளிலும் உடல் வெப்பநிலை ஒரே சீராக அமைந்துள்ளது. மற்றும் இருதயத்தில் சுத்த இரத்தமும் அசுத்த ரத்தமும் நனித்தனியே பிரித்து வைக்கப்பட்டுள்ளன. கருக்க மாடக்கூற வேண்டுமானால் பறவைகள் வெப்ப இரத்தப் பிராணி களாகும், பின்னும் அவைகளில் இருகழற்சி இரத்த ஓட்டம் உள்ளது.

பறவைகளும் பாதுாட்டிகளும் ஊர்வனவற்றிலிருந்து தோன்றியதாகக் கருதப்பட்டாலும் அவற்றின் இரத்த ஓட்ட மண்டலங்களை ஒப்பிட்டுப் பார்க்கும் பொழுது பாதுாட்டிகளின் இரத்த மண்டலங் களின் இரத்த மண்டலத்தைவிட மாறுபட்டு காணப்படுகின்றது. அவ்வாறு இருப்பினும் பறவைகளின் இரத்த ஓட்டம் பாதுாட்டிக் களின் இரத்த ஓட்டத்தைவிட மிகவும் நிறமை வாய்ந்ததாக அமைத் திருக்கின்றது. பறவைகளில் உடல் வெப்பம் 105°F டிகிருத்து 111°F வரை உள்ளது. பாதுாட்டிகளின் உடல் வெப்பத்துடன் ஒப்பிட்டு நோக்குங்கால் பறவைகளின் உடல் வெப்பம் $2^{\circ}\text{--}14^{\circ}\text{F}$ அதிகமாக இருப்பதாகக் கணக்கிடப்பட்டுள்ளது. பாதுாட்டிகளின் இருதயத்தைவிட, பறவைகளின் இருதயம் உருவத்திலும் பெரியதாக உள்ளது. அது இயங்கும் முறையும் அந் துறையினாலும், அதிகமான இரத்தத்தை வெளியேற்றும்படியாகவும் அமைந்துள்ளது.

இவ்வாறான நிறமை மிக்க சாதனைகளைப் பெற்றிருப்பதாவேயே, அவைகளுக்கு கவாசிக்கும் நிறனும், பறக்கும் நிறனும் மிகச் சிறப்பாக அமைந்துள்ளன.


பறவைகளுக்குள்ளேயே, அவற்றிற்குத் தேவைப்படும் சக்திக் கேற்ப இருதயத்தின் எடையும், அது இயங்கும் விதமும் மாறுபடு கின்றன. ஒரு பறவை, பார்ப்பதற்கு உருவத்தில் மிகச் சிறியதாக யிருப்பினும் அதன் அதிகமான பறக்கும்நிறனும் வளர்முகை மாற்றத் தின் வேகம் அதிகரிக்குமானால் அதன் இருதயம், பெரிய உருவுடைய

ஒரு பறவையின் இருதயத்தைவிட அளவில் பெரியதாகவும் செயல்படும் தன்மையில் நிறுவுள்ளதாகவும் அமைந்திருக்கும். சில சமயங்களில் ஒரு பறவைவாழ்வு தான் வளிக்கும் சூழ்நிலை, தன் சிறப்பான செயல்கள், மற்றும் வகைபாட்டின் அது பெற்றுள்ள இடம் முதலியவற்றிற்கேற்ப மாறுபட்டு காணப்படுவதும் உண்டு. உதாரணமாக அறிவெப்ப மண்டலங்களிலோ அல்லது அத்திலாண்டிக் மண்டலங்களிலோ வளிக்கும் பறவைகளின் இருதயத்தின் வெண்ட்ரிகிளின் அளவில் மற்ற பறவைகளைவிட பெரியதாகவிரும்புகின்றது. கேலிசிபார்சியில் (Galapagos) பறவைகளின் இருதயம், பெசரிசிபார்சியில் (Passeriformes) பறவைகளின் இருதயத்தைவிட அளவில் மிகச் சிறியதாகவிரும்புகும், அதிலேயாவாக பறக்கும் நிறுவுடைய பறவைகளுக்கும், அதிலேயாவாக ஒட்டும் நிறுவுள்ள பறவைகளுக்கும் அதிக ஓசையுடையவாகவும் நிறுவுள்ள பறவைகளுக்கும் இருதயத்தின் எடை கூடுதலாக இருக்கும் என்று கண்டறிந்துள்ளனர். பாடும் நிறுவுள்ள பறவைகளில் இருதயம் அளவில் மிகப் பெரியதாக உள்ளது. அது உடலின் எடையில் 1-74 முதல் 2-4% இருப்பதாகவும் கண்டுபிடிக்கப்பட்டுள்ளது.

பறவைகளில் இருதயம் மார்புக் கூட்டின் மத்தியில், நுரையீரல் களுக்கு வயிற்றுப்புறத்தின் அமைந்துள்ளது. மார்புக் கூட்டுப்பகுதி வயிற்றுப் பகுதியிலிருந்து குறுக்காக அமைப்பெற்ற நுரையீரல்கள் பிரிக்கப்பட்டுள்ளது. இருதயத்தைச் சுற்றி இருதய உறை உள்ளது (Pericardial sac). அதில் ஒருவகை திரவம் உள்ளது. அத்திரவம் இருதயத்தின் வெளிச்சுவரைச் சுற்றிக் காணப்படுகிறது.

இருதயத்தின் இருதய சுற்றறையை நீக்கினால், எருகுமியப்பாண்ட்ரிகிள் (Ventricular) ஸ்தலமுடைய இருதயத்தைக் காணலாம். இருதயத்தின் அகன்ற இடத்தில் மெல்லிய கவர்களையுடைய ஆரிகிள்கள் உள்ளன, தடித்த கவர்களையுடைய சிறப்பகுதியில் இரு வெண்ட்ரிக்ள்கள் உள்ளன. உடலின் பல பாகங்களிலிருந்து வரும் அகத்த இரத்தம் வலது ஆரிகிளின் அடைகின்றது. நுரையீரலிலிருந்து வரும் சுத்த இரத்தம் இடது ஆரிகிளின் அடைகின்றது. வெண்ட்ரிகிள்களும், வலது வெண்ட்ரிகிள் இடது வெண்ட்ரிகிள் என்று இரண்டாகப் பிரிக்கப்பட்டுள்ளது. இரண்டிலும் இடது வெண்ட்ரிகிளின் அடர்த்தியான தசைச் சுவர்களால் வலிமை பொருந்தியதாக உள்ளது. உடலின் பல பாகங்களுக்கு எடுத்துச் செல்லப்படும் சுத்த இரத்தம் இடது ஆரிகிளிலிருந்து இடது வெண்ட்ரிகிளின் அடைகின்றது. வலது வெண்ட்ரிகிளின் கவர் இடது வெண்ட்ரிகிளின் சுவரையிட மெல்லியதாக உள்ளது. இரண்டு ஆரிகிள்களுக்கும் இடையில் ஆரிக்ளுவார் இடைத்திரை அல்லது ஆரிக்ளுவார் நடு குறுக்குச் சுவர் (Inter atrial

Septum) என்ற ஒரு கவர் உள்ளது. இரண்டு வெண்ட்ரிகிளிலிருந்தும் இடையில் வெண்ட்ரிகுலர் குறுக்குச் சுவர் (Inter Ventricular Septum) என்ற உறுதியான கவர் உள்ளது.




படம் 32. கோழி இருதயத்தின் முதுகுப்புறத் தோற்றம்
(உள் வெட்டுத் தோற்றம்)

1. பெருந்தமனி, 2. பெக்குவேட் தசைகல், 3. வயது ஆரீக்கிள்,
4. ஆரீக்குவே வெண்ட்ரிக்ளுவர்த்துவி, 5. மையக்கரோனரி சைர,
6. வயது வெண்ட்ரிக்ளின், 7. இடது வெண்ட்ரிக்ளின், 8. கரோனரி குழிவு,
9. இடது ஆரீக்கிள், 10. இடது நுரையீரல் தமனி, 11. கரோட்டிட் தமனிகள்.

இருதயத்தின் உட்பக்கத்தில் என்டோகார்டியம் (Endocardium) என்ற மெல்லிய படலம் உள்ளது. இருதயத்தின் கவர் மயோகார்டியம் என்ற தனிச் சிறப்புப் பொருத்திய இருதயத் தசைத் திசுவினால் பெரும்பாலும் ஆக்கப்பட்டுள்ளது. இருதயத்தின் வெளிச்சுவர் எபிகார்டியம் (Epicardium) என்ற புறத்தோல் அடுக்கினால் ஆனது. உடலின் பல பகுதியிலிருந்து எடுத்து வரப்பட்ட இரத்தம் மூன்று பெரும் சைரகளினால் இருதயத்தை அடைவின்றது. மேற் மட்டப் பிராணிகளில் அகத்த இரத்தம் வயது வெண்ட்ரிகிளை அடையும் முன்பு, சைனஸ் ஸ்டிரோசஸ் என்ற அறையை அடைந்து, அங்கிருந்து

வலது வெண்டீக்கிக்கு வரும்படி நது. ஆனால் பறவைகளில் சைனஸ் வினோசஸ் அறையானது வலது ஆரீக்கிவின் அறைச் சுவருடன் இரண்டாகக் கலந்து விடுவதால் தனிவான சைனஸ் வினோசஸ் பகுதி இடையாது. ஆனால் திக்கோழிகளில் மட்டும் சைனஸ் வினோசஸ் உள்ளது. அப்பகுதியிலிருந்து வலது ஆரீக்கிவினுள் நுழையும் இடத்தில் சைனோ-ஏட்ரியல் வாய்வு உள்ளது. குவரீங் (Quiring) என்பவர் கோழிகளில் (Gallus) சைனஸ் வினோசஸ் அறையும் அதன் சைனோ ஏட்ரியல் வாய்வுகளும் இப்பொழுதும் இருப்பதாகக் கண்டறிந்துள்ளார்.

உடலின் பல பாகங்களிலிருந்து வந்த அகத்த இரத்தம், வலது ஆரீக்கிவ் கருங்கும்பொழுது அங்கிருந்து ஆரீக்கிவோ வெண்டீக்கி



படம் 13. பறவை இருதயம் (இயற்குதந்திரிய தசைகள்)

1. பெருந்தமனி, 2. இடது ஆரீக்கிவ் குழி, 3. ஆரீக்குவோ வெண்டீக்கிக்குளர் கணு, 4. தசைத் தொகுதியின் ரெக்டென்டீக்கி, 5. ஆரீக்கிவ்-பக்க பரீக்கிவ் குழி இழை நாரீகள், 6. இடது வெண்டீக்கிவ் குழி, 7. வலது வெண்டீக்கிவ் குழி, 8. தசை வாய்வு, 9. ஆரீக்குவோ வெண்டீக்கிக்குளர் தசை-வாய்வு, 10. பரீக்கிவ் குழி இழை நாரீகள் வரிசை, 11. சைனோ ஆரீக்குவோ கணு, 12. வலது ஆரீக்கிவ் குழி, 13. வலது-இடது சிறை வாய்வுகள்.

குளர் துணியின் வழியாக வலது வெண்டீக்கிவிடையிலிருந்து. இந்த ஆரீக்கிவோ வெண்டீக்கிக்குளர் துவாரம் (Atrio Ventricular Orifice)

வலது ஆரீக்கிளையோ வெண்ட்ரிக்குலார் வால்வுகளால் சூழப்பட்டு பாதுகாப்பாக அமைந்துள்ளது. இந்த துவாரத்தைச் சுற்றி ஒரு தசை நீள் வரைமேடு உள்ளது. ஆரீக்கிளையோ வெண்ட்ரிக்குலார் வால்வுடன் இவ்வாறான நீள்வரைமேடு இத்துவாரத்தை சுற்றி அமைந்திருத்தல் பறவைகளில் மட்டும் காணப்படும் ஒரு சிறப்புப் பண்பாகும். மேற்கூறிய பண்பானது பறவைகளுக்கான ஒரு சிறப்புப் பண்பாகியிருப்பினும், மூதல்களிலும், மாஜேட்டிரீம் பாதுகாட்டிகளிலும் இத்தகைய பண்பினைக் காணலாம். தசை நீள்வரை மேட்டில் கீவி (Kivi) பறவைகளிலும், வாத்துகளிலும் (Duck) சிறு படலப் பகுதிகளையும் காணலாம்.

வலது வெண்ட்ரிக்கிலிலிருந்து இரத்தமானது துரையீரல் இரத்தக் குழாய் வழியாக (Pulmonary trunk) துரையீரல்களுக்கு எடுத்துச் செல்லப்படுகின்றது. துரையீரல் இரத்தக்குழாயின் துளை மூன்று பிறைவடிவ வால்வுகளால் பாதுகாக்கப்பட்டுள்ளது. அந்த வால்வுகள் இரத்தம் மறுபடியும் வெண்ட்ரிக்கிலின் அடைவதைத் தடுக்கின்றது. பின்பு துரையீரல் இரத்தக்குழாய் இரண்டாகப் பிரிந்து ஒவ்வொன்றுக்கும் ஒவ்வொரு துரையீரலுக்கு இரத்தத்தை எடுத்துச் செல்கின்றன. துரையீரலில் அகத்த இரத்தம் சுத்தமாக்கப்பட்ட பின்பு, துரையீரல் சிறைகளினால் (Pulmonary Veins) மறுபடியும் இருதயத்தின் இடது ஆரீக்கிளுக்கு எடுத்து வரப்படுகின்றது.

பின்பு இடது ஆரீக்கிள் சுருங்கும் பொழுது இரத்தம் இடது வெண்ட்ரிக்கிலின் அடைகின்றது. இடது ஆரீக்கிளுக்கு இடது வெண்ட்ரிக்குக்கும் இடையிலுள்ள துவாரம் சவ்வு போன்ற படலம் போன்ற வால்வினால் (Membranous Valve) பாதுகாக்கப்பட்டுள்ளது. இந்த வால்விருத்தாய் சரிதழ் வால்வு அல்லது மிட்ரல் வால்வு என்று பெயர். ஆனால் இந்த வால்வுகளில் மூன்று இதழ்கள் உள்ளன. வெண்ட்ரிக்கில்கள் சுருங்கும்பொழுது இரத்தமானது ஆரீக்கில்களினால் துண்டாயாமல் இருப்பதற்கு இந்த வால்வுகளின் இதழ்கள் பெரிதும் பவப்படுகின்றன. வெண்ட்ரிக்கில்கள் சுருங்கும் பொழுது இந்த வால்வுகள் மேலே நிறம்பி ஆரீக்கில்களினால் துண்டாத்து விடாமல் இருத்தலுக்கு இவைகளுடன் காட்டே டென்டியூளே என்னும் இருதய தாண்டகம் அமைந்துள்ளன. இவை தசை பாப்பிசிலர்களினால் வெண்ட்ரிக்கில்களின் கவருடன் பொருத்தப்பட்டுள்ளன. ஆகையால் வெண்ட்ரிக்கில்கள் சுருங்கும்பொழுது, வெண்ட்ரிக்கிலினுள்ள இரத்தம் ஆரீக்கிலின் அடைவாமல் மேலே குறிப்பிட்ட வால்வுகளால் வால்வுகளின் இதழ்களும் தடுக்கின்றன.

இடது வெண்ட்ரிக்கிலிலிருந்து சுத்த இரத்தம் சிட்டமிக் தமலி வளைவிலும் செலுத்தப்படுகின்றது. சிட்டமிக் தமலி வளைவு இடது

வெண்டிக்கிளின் மூற்பகுதியிலிருந்து ஆரம்பமாகின்றது. கிட்டமிக் தமனி வளைவு ஆரம்பமாகும் இடத்தில், மூன்று பிறை வடிவ வாய்வுகள் உள்ளன. கரோனரி தமனிகள் கிட்டமிக் தமனியிலிருந்தும் சுத்த இரத்தத்தை இருதயத்தின் தசைகளுக்கு எடுத்துச் செல்லுகின்றன. அதே போன்று கரோனரி சிறைகள் இருதய தசைகளிலிருந்து சுத்த இரத்தத்தை எடுத்துச் சென்று இருதயத்தின் வலது ஆரிக்ளின்களில் அமைந்துள்ள கரோனரி சைனஸ் அல்லது கரோனரி பைக்குழியைச் சென்றடைகின்றது. கரோனரி சைனஸ் பின் பெருஞ் சிறைக்கு அருகில் அமைந்துள்ளது. இவ்வாறாக இருதயத்தின் தசைகளுக்கு சுத்த இரத்தமும், அசுத்த இரத்தமும் முறையே கரோனரி தமனி, கரோனரி சிறைகளிலும் எடுத்துச் செல்வப்பட்டு அவற்றிற்கு வேண்டிய ஊட்ட சத்துக்களையும் தேவையான வாயுக்களையும் கொடுக்கின்றன. மற்றும் கழிவுப் பொருள்கள் வெளியேற்றப்படுகின்றன. இதற்கு கரோனரி இரத்த சுழற்சி என்று பெயர்.

இருதயத்தின் பாக்களை ஆராயும் போழுது அது எவ்வாறு செயல்படுகின்றன என்பதையும் சிறிது கவனிப்போம். இருதயத்துட்பு இருதயத்தின் இரண்டு பக்கங்களிலும் ஏறத்தாழ ஒரே சமயத்தில்தான் ஆரம்பமாகின்றது. இருதயத்துட்பு மூதலிக் ஆரிக்ளின்க் தொடங்கி பின்பு வேகமாக இடது ஆரிக்ளினிற்குப் பரவி வெண்டிக்கிள்களையும் அடைகின்றது. இவ்வாறு அநிலிகரவாக ஆரிக்ளின்களிலிருந்து வெண்டிக்கிள்களுக்குப் பரவுவது என்பது ஒரு குறிப்பிட்ட சிறப்பு வாய்ந்த தொடர்பு கொள்ளும் தசைகளாக வேயே தூண்டப்படுகின்றது என்பதாகக் கண்டறியப்பட்டுள்ளது. வலது மேற் பெருஞ்சிறைக்கும், சிற்ப் பெருஞ்சிறைக்கும் இடையே உள்ள இருதயச் சுவரின்ன ஸாக்னோட்டரியல் ஸ்னூ (Node) என்ற திகக் கணு உள்ளது. ஏட்ரியோவெண்டிரிக் குவார் கணு என்ற மற்றொரு திகக் கணுவும் ஆரிக்ளின் இடைத்திரையின் பின்பகுதிச் சுவரின்னப் பொருத்தியுள்ளது. இந்த இரண்டாவதாகக் கூறிய திகக் கணுவில் சிற்ப்பகுதியிலிருந்து ஏட்ரியோவெண்டிரிக் குவார்க்குறை என்ற இழைக் சுற்றை ஒன்று சிற்தோக்கி வெண்டிரியின் இடைத்திரையினுள் சென்று அங்கிருந்து மிளகனாகப் பிரிந்து இருதயத்தின் எவ்வாப் பகுதிகளுக்கும் செல்லுகின்றன. இக்கிளைகளுள் இரண்டு, ஏட்ரியோவெண்டிரிக் குவார் துவாரத்தையும் வாய்வையும் சுற்றிச் செல்கின்றன. மற்றும் இரண்டு கிளைகள் இருதயத்தின் மேற்பரப்பில் அமைந்துள்ள பிர்க்ளிஜி இழைகள் (Purkinji Fibre) என்ற இழை கணுடன் சென்று இணைகின்றன. இருதயத் துடிப்பின் ஆரம்பம், வேகம் முதலானவை ஸாக்னோட்டரியல் கணுவிலுமேயே சரிவர இயல்புபடுவதாகக் கருதப்படுவதாக இதை பேஸ்மேக்கர் (Pace maker) என்று அழைப்பதும் உண்டு. மற்றும் இருதயம் பரிவு நரம்பு மண்டலம்


துணைப்பரிவு நரம்பு மண்டலம் முதலிய நரம்பு மண்டலங்களுடனும் இணைந்து காணப்படுவதால், மேலே குறிப்பிட்ட சைடு எட்ரியல் கணுவின் இயக்குதன்மை அவ்வளவாக வெளியீக் தெரிவதில்லை. பாலூட்டிகளில் உள்ளதுபோன்றே, பறவைகளில் இருதயத்துடிப்பைப் பரிவுநரம்பு மண்டலம் இயங்கச் செய்கின்றது. துணைப்பரிவு நரம்பு மண்டலம் நிறுத்த உதவுகின்றது. சாதாரணமாக இணைப்பாறுகின்ற பறவைகளில்கூட இருதயத்துடிப்பு, அவ்விக் மிகச் சிறியதாகவுள்ள பாலூட்டிகளைவிட மிக அதிகமாகிவிடுகின்றது என்று கண்டுபிடிக்கப் பட்டுள்ளது.

பார்வைக்கு பாலூட்டிகளின் இருதயமும், பறவைகளின் இருதயமும் ஒரே மாதிரியாகவிரும்பினும், அவைகளில் பல வேறுபாடுகள் உள்ளன. பறவைகளின் இருதயத்தின் எட்ரியோவெண்ட்ரிக்ளுகைக் களவு இருப்பதும், அவை சிண்டமிக் வளைவு இருப்பதையும் பாலூட்டிகளின் இருதயத்தை ஒப்பிட்டு பார்க்கும்பொழுது காணப்படும் முக்கிய வேறுபாடுகள் ஆகும். பாலூட்டிகளில் இருதயத்தில் சாதாரண படவாசையும் இடது சிண்டமிக் தமனி வளைவும் உள்ளன. வெண்ட்ரிகில் இடைத்திரை தோன்றும் முறை, பாலூட்டிகளிலும் பறவைகளிலும் வேறு வேறுக உள்ளது. இரண்டு ஆரீக்கிள்களுக்கும் இடையில் இடைத்திரை கருவணர்ச்சியின் முடியில் தோன்றும். சிறமும் மாறுபடுவதாகக் காண்கிறோம்.

பறவைகள்-தமனி மண்டலம்

சிண்டமிக் வளைவு இடது வெண்ட்ரிகிலிலிருந்து தோன்றி, முதுகுப்புறம் வலது பக்கமாக வளைந்து பின்பு இருதயத்திற்குப் பின்னும் பின்புறமாகச் செல்லுகின்றது. உடலின் பிற்பகுதியில் இது முதுகுப்புற தமனியாக (Dorsal aorta) செல்லுகின்றது. இருதயத்தின் இடது வெண்ட்ரிகிலிலிருந்து தோன்றி வளைபுமிடத்து இரண்டு கிளைகளை கொடுத்து வளைந்து செல்லுகின்றது. அந்த இரண்டு கிளைகளும் வலது இன்னுமினேத் தமனி, இடது இன்னுமினேத் தமனி என்ற இரண்டு தமனிகளாகும். அந்த இன்னுமினேத் தமனிகள் ஒவ்வொன்றும் மறுபடியும் சர்க்கினேயியன் தமனி, கரோட்டிட் தமனி என்னும் இரு கிளைகளாகப் பிரிகின்றன.

கரோட்டிட் தமனி இருதயத்திலிருந்து மேல்நோக்கி தலைப்பகுதிக்குச் சென்று தலையின் முக்கிய உறுப்புகளுக்கு கத்த இரத்தத்தை அளிக்கின்றது. பறவைகளின் கழுத்து நீண்டு வளையும் தன்மை பெற்றுள்ளதானாலேயே அவற்றின் கரோட்டிட் தமனிகளில் மற்ற வகுப்பு பிராணிகளில் காணமுடியாத பல மாற்றங்கள் காணப்படுகின்றன. பறவைகளின் கழுத்து நீளமாகவிரும்பதால் கரோட்டிட்



படம் 34. புற-தமனி மண்டலம்

1. வெளி கரோட்டிட் தமனி,
2. உள் கரோட்டிட் தமனி,
3. பொது கரோட்டிட் தமனி,
4. நுரையிரல் தமனி, 5. பெக்டோரல் தமனி, 6. இடது ஆரீக்கிள்,
7. இடது வெண்ட்ரிகிள், 8. சிலிவாக் தமனி, 9. மூன் குட்டம் தமனி,
10. டிரோமோரல் தமனி, 11. சயாட்டிக் தமனி, 12. இடது நெரீரகம்,
13. பீல் குட்டம் தமனி, 14. வாக் தமனி, 15. பொதுப் புறநெரீரகம்,
16. உள் இவியாக் தமனி, 17. பீல் நெரீரகத் தமனி, 18. வயது நெரீரகத் தமனி,
19. மூன் நெரீரகத் தமனி, 20. மூலகுப்பற பெருத்தமனி, 21. வயது வெண்ட்ரிகிள்,
22. சிற்ப் பெருஞ்சிறை, 23. வயது ஆரீக்கிள், 24. மேல் பெருஞ்சிறை, 25. வயது இங்குமிசெட் தமனி, 26. பிரேக்லியம் தமனி, 27. வயது சப்ஜிவெயிவம் தமனி, 28. நெரு.

விளையின் வயது இடது பக்க தமனிகள் இரண்டும் ஒன்று சேர்ந்து ஒரே ரோக கழுத்து மூன்றெனும் புக்களினுள் பொதிந்து இணையாகச் செல் இன்றன.

கரோட்டிட் தமனிகள் கழுத்து அசையில் கழற்சி ஏற்படும் அச்சிற்கு வெகு அருகாமையில் அமைந்திருப்பதால், அவைகள் கழுத்தின் அசையினும் பாதிக்கப்படாமல் அமைந்துள்ளன. புட்ட்டோரைட்டுவை ரெஸ்ஸென் (Butorides Virascens) என்ற பச்சை நாரைகளில் (Green herons) இரு கரோட்டிட் தமனிகளும் ஒன்று சேர்ந்து ஒரே தமனியாக கழுத்துப் பகுதியில் செல்வின்றது. மற்றும் சிலவற்றில் இரண்டும் ஒரே அளவாகியவளாமல் ஒன்று நீளமாகவும் மற்றொன்று குட்டையாகவும் இருக்கும். உதாரணமாக கிபிளாயிக்ஸோ பறவைகளில் இடது கரோட்டிட் தமனி, வயது கரோட்டிட் தமனியைவிட பெரிவதாக உள்ளது. காக்கட்டோ (Kakatoe) பறவைகளில் கிபிளாயிக்ஸோ பறவைகளுக்கு நேர் எதிராக வயது கரோட்டிட் தமனி இடது கரோட்டிட் தமனியைவிட பெரிவதாகவுள்ளது. மற்றும் சில பேசரின்களில் (Passerine) இரு கரோட்டிட் தமனிகளில் ஒன்று மட்டுமே காணப்படும். மற்றும் சிலவற்றில் செர்விக்ஸல் அல்லது கழுத்துத் தமனிகள், கரோட்டிட் தமனிகளின் இடங்களில்

தோன்றி விடுத்தலைக் காணலாம். சில பறவைகளில் இரண்டு கரோட்டிக் தமனிகளும் கழுத்துத் தமனிகளாக மாற்றப்பட்டிருக்கும் அல்லது. சில வகைகளில் இருப்பது போன்று ஒரு கரோட்டிக் தமனி கழுத்துத் தமனியாக மாறியிருக்கும். இவ்வாறு ஏற்பட்டுள்ள மாறுதலைக் கொண்டே பறவைகளை வகை மடுத்தலாம். சப்ஸெவியல் தமனி பீன்சர் மார்புத்தமனி (Pecoral) மேற்கைத் தமனி (Brachial) என்று இரண்டாகப் பிரிந்துள்ளது. மார்புத் தமனி மார்புத் தசைகளுக்கும் மேற்கைத் தமனி மேற் கரத்திற்கும் சுத்த இரத்தத்தை எடுத்துச் செல்கின்றது.

முதுகுப் பெருத்தமனி (Dorsal aorta) முதுகுப்புறத்தில் நீண்டு செல்கின்றது. அவ்வாறு செல்லும்போழுது பல இணையான தமனிகள் இதிலிருந்து பிரிந்து செல்கின்றன. அவ்வாறு பிரிந்து செல்லும் தமனிகளில் ஒரு சோடி இண்ட்டர் கால்டல் தமனிகள் உள்ளன. பின்பு இரண்டு இணையற்ற பெரிய தமனிகள் உள்ளன. முதல் தமனியின் பெயர் உடற்குழித் தமனி (Coeliac) என்பதாகும். இரண்டாவதன் பெயர் முங்குடல் தனி (Anterior mesenteric) என்பதாகும். உடற் குழித்தமனி பல மிளகனாகப் பிரிந்து உணவு மண்டலத்தின் வயிறு, மண்ணீரல், கிணயம், கரல், கியோடிகனம் போன்ற உறுப்புகளுக்குச் சுத்த இரத்தத்தைக் கொடுக்கின்றது. முங்குடல் தமனி, நெகுடலின் பெரும் பகுதிக்கு சுத்த இரத்தத்தைக் கொடுக்கின்றது. இதிலிருந்தும் ஒரு மிள, கிணயத்திற்குச் செல்கின்றது. பின்புறமாக நீண்டு செல்லும்போழுது முதுகுப் பெருத் தமனி மற்றும் சில சோடி, நெற்றிகத் தனி (Renal) சீப்மோரல், சயாடிக், இவ்வியாக் தமனிகள் போன்றவற்றைக் கொடுக்கின்றது. நெற்றிகத் தமனிகள் நெற்றிகங்களுக்கும், சீப்மோரல் சயாடிக் இவ்வியாக் போன்ற தமனிகள் கால்களுக்கும் சுத்த இரத்தத்தை எடுத்துச் செல்கின்றது. சயாட்டிக் தமனி கால்களுக்கு சுத்த இரத்தத்தை எடுத்துச் செல்லும் தமனிகளுள் மிகவும் முக்கியமானதாகும். முதலில் கால்களின் முதுகுப்புறமாகச் செல்லும் சுத்தத் தமனி வயிற்றுப்புறப் பகுதியில் அமையப்பெற்றுள்ள சீப்மோரல் தமனியைச் சந்தித்த பின்பு, முழங்காணுக்கருகில் இரண்டுமாக வாப்லிட்டியல் (Popliteal) தமனியாக மாறி பின்பு கீழ்க்காலிற்கு முன் கியியல் தமனி, கிய் கியியல் தமனி என இரண்டு மிளகனாகச் செல்லு கின்றன.

முதுகுப்புற பெருத்தமனியிலிருந்து இவ்வியாக் தமனி தோன்று கிடத்தில் பிங்குடல் தமனி (Posterior mesentire) தோன்றுகின்றது. இது பெருங்குடலிற்கும் மனக்குடலிற்கும் சுத்த இரத்தத்தை எடுத்துச் செல்கின்றது. பின்பு முதுகுப்புறத் தமனி வால்பகுதி

யினும் நீண்டு வால் தாவிவாக (Caudal) மாறி வால் பகுதிக்கு கத்த இரத்தத்தைக் கொடுக்கின்றது.

பறவைகளின் சிறை மண்டலம்

தலைப்பகுதியிலிருந்து வருவின்ற அகத்த இரத்தம் ஒரு சோடி ஜுகுவார் சிறைகளிலும் எடுத்து வரப்படுகின்றது. இதில் வலதுபக்க ஜுகுவார் சிறை சற்று அகன்று காணப்படுகின்றது. இவ்விரு சிறைகளும் கண்ணப்பகுதிக்கடியில் ஒரு இரத்தக் குழாயிலும் இணைக்கப்படுகின்றது. இவ்வாறு இணைந்திருப்பது போலியை கரோட்டிட் தமனிகளும் இணைந்து, கழுத்துப்பகுதி நன்றாக வளைவதற்கு ஏதுவாக அமைந்துள்ளது. கழுத்து வலையும் பொழுது ஒரு ஜுகுவார் சிறை அழுத்தப்பட்டால் இரத்தமானது இணைக்கப்பட்ட இரத்தக்குழாய் வழியாக நிரம்பி அனுப்பப்பட்டு, மற்றொரு சிறையின் மூலம் இருதயத்திற்கு அனுப்பப்படுகின்றது.

இரக்கைகளினின்றும் அகத்த இரத்தம் பிரக்கியல் சிறை மூலமாக எடுத்து வரப்பட்டு ஆக்ஸிலரி சிறை (Axillary) புடன் இணைந்து சப்ஸிலேவியன் சிறையாக மாறுகின்றது. சப்ஸிலேவியன் சிறைபுடன் பறக்க உதவும் தசைகளினின்றும்எனும் மார்புச்சிறை (Pectoral) இணைக்கின்றது. யினும் ஒவ்வொரு பக்கமும் ஜுகுவார் சிறையும் சப்ஸிலேவியன் சிறையும் இணைந்து மேற்பெரும் சிறையாக மாறி, இரண்டு மேற்பெரும் சிறைகளும் இருதயத்தின் வலது ஆர்க்கிலினுள் நிறைகின்றன.

வால் பகுதியினின்றும் அகத்த இரத்தம் பல வழிகளில் இருதயத்தை வந்து அடைகின்றது. வால்கிரை (Caudal) வால் பகுதியினின்றும் அகத்த இரத்தத்தை எடுத்து வந்து குறிப்பிட்டப் பகுதியில் வலது அல்லது இடது ஹைப்போகேஸ்ட்டிக் (Hypogastric) சிறை புடன் பிணைக்கப்பட்டு செல்கின்றது அல்லது ஓக்ஸிலோ மிசென்டெரிக் இரத்தக் குழாபுடன் இணைந்து செல்கின்றது.


ஹைப்போ கேஸ்ட்டிக் சிறை, வால்கிரை இணைப்பிடத்திலிருந்து, சிறு நீரகங்களை நோக்கிச் செல்லுகின்றது. அவ்வாறு செல்லும் பொழுது ஓக்ஸிலோ மிசென்டெரிக் புடன் இணைந்து செல்கின்றது. ஹைப்போகேஸ்ட்டிக் சிறையும் உள் இவ்விவாக் சிறையும் இணைந்து சிறுநீரகப் போர்ட்டல் சிறைகளாக மாறுகின்றது.

சிறுநீரக போர்ட்டல் சிறையின் பெயர் அதற்குக் கொடுக்கப்பட்ட சரியான பெயர் அல்ல, ஏனென்றால் சிறுநீரக போர்ட்டல் சிறை சிறுநீரகத்தின் நிகக்கிலினுள் இரத்தத் தத்துகளாக முடி.

வடைபயிக்கும், ஒரு சில நிறு இரத்தக் குழாய்கள் இரத்தத் தந்துகிகளால் ஏற்பட்டு குறுக்காக அமைந்து நிறுநீரக நெரகனாக மாறுகின்றன. நிறுநீரகத்தினால் உண்டாக்கப்பட்ட இந்த நிறுநீரகச் நெரகம், நிறுநீரகப் போர்ட்டல் நெரகமூடல் காக்களிலின்று வரும் கீப்மோரம் நெரக சேர்த்து இவ்விடக் நெரகமாக மாறுகின்றது.

அகத்த இரத்தம் நிறுநீரகச் நெரகவின் வழியாகவும் நிறுநீரகப் போர்ட்டல் நெரக வழியாகவும் செல்லும் முறைக்கு ஹீமோடைனமிக் (Haemodynamic) முறை என்ற ஒரு முறைபாச சரிசமமான அழுத்தத்தினாலேயே அவ்வாறு இரத்தம் செல்கின்றது என்று கருதப்படுகின்றது. இவ்வாறு ஏற்படும் அழுத்தத்தை, நிறுநீரக போர்ட்டல் நெரக, நிறுநீரக நெரக புடல் நெரக என்றும் இடத்தினுள்ள வாய்விழல் அறியலாம். இந்த வாய்விழல் தன்மை பறவைக்கு பறவை வேறுபடுகின்றது. அது சில பறவைகளில் ஒரே ஒரு மையத்துடன் உள்ள தகடுப்பான்றிருக்கும். மற்ற சிலவற்றில் அத்தகடு அநேக துளைபுடன் சவ்வடைப்பான்றிருக்கும். பின்னும் சில பறவைகளில் புளல் போன்று அமைந்திருக்கும். இருபுறத்து இவ்விடக் நெரகமும் மையத்தில் கடைமையில் இணைந்து கீழ்ப்பெருஞ் நெரகமாக மாறி இரு தவத்தின் வலது ஆரீக்கின்னினுள் துழைகின்றது.

காக்ஸிஜனோ மிசன்டெரீக் நெரக அவ்வது வாய்மிசன்டெரீக் நெரக பறவைகளில் மட்டுமே காணப்படுகின்ற குறிப்பிட்டுச் சொல்லக் கூடிய ஒரு நெரகமாகும். நைரப்போ கேண்டரீக் நெரக இரண்டாகப்



படம் 35. புற-நெரக மண்டலம்

1. ஜுகுலார் நெரகவின் பின்னப் பகுதி, 2. இடது ஜுகுலார் நெரக, 3. இடது மேத பெருஞ் நெரக, 4. நுரையீரல் நெரக, 5. இருதயம், 6 & 18. நெறப் பாட்டிக்நெரக, 7. நெறப்பாட்டிக் போர்ட்டல் நெரக, 8. பொது இவ்விடக் நெரக, 9. நிறுநீரகம், 10. காக்ஸிஜனோ மிசன்டெரீக் நெரக, 11. வாய் நெரக, 12. உள் இவ்விடக் நெரக, 13. நிறுநீரக போர்ட்டல் நெரக, 14 & 17. நிறுநீரக நெரக, 15. சவாட்டிக் நெரக, 16. கீப்மோரம் நெரக, 19 கீழ்ப்பெருஞ்நெரக, 20. பெக்டோரல் நெரக, 21. டிரெக்ஸில் நெரக, 22. வலது ஜுகுலார் நெரக, 23. நெரு, 24. பொதுப் புழை.

பிளவு படுகின்ற இடத்தில் இந்த காக்கிஜியோ மிசென்ட்டரிக் சிறை தோன்றி மூன்றுமாக மலக்குடலின் மிசென்ட்டரி வழியாகச் செல்லும் பொழுது, சிறுநுடல், மலக்குடல், பொதுப் புழை முதலியவற்றிலிருந்து பல சிறு கிளைகள் அதனுடன் சேர்ந்து கொள்கின்றன. பின்பு காக்கிஜியோ மிசென்ட்டரிக் சிறை மூன்றுமாகச் சென்று கல்வீரலின் போர்ட்டல் மண்டலத்துடன் சேர்கின்றது.

இரண்டு நெற்பெட்டிக் சிறைகள் கல்வீரலுள் நுழைகின்றன. அவற்றுள் ஒன்று பெரியதாகவும் மற்றொன்று சற்று சிறியதாகவும் உள்ளது. பெரியதாகவுள்ள சிறை, வலப்பக்கத்தில் அமைந்து, ருடல் பகுதிகளிலின்றும் வருகின்ற சிறை காக்கிஜியோ மிசென்ட்டரிக் சிறை, கணையத்திலின்றும் வரும் சிறை ஆகிய சிறைகளை ஒன்று சேர்த்தின் பாலாக ஏற்படுகின்றது. இடது நெற்பெட்டிக் சிறை வயிற்றிலின்றும் வருகின்ற சிறை முதலியவைகள் சேர்க்கப்பட்டு, கல்வீரலை அடைகின்றது. இவ்விரண்டு நெற்பெட்டிக் சிறைகளும் கீழ்ப்பெருஞ் சிறையுடன் இணைகின்றன.

தண்ணீரில் நடத்து செல்லும் நிறனுள்ள நீண்ட கால்களை யுடைய நாரை, கொக்கு, கிபிளாயிங்கோ போன்ற பறவைகளில் டார்ச்சல் பகுதியில் தமனி சினைகளான வலைப்பின்னல் பகுதி (Arteris Venet net work) உண்டு. இப்பகுதிக்கு ரேட்டி (Rete) என்று பெயர்.

செயலொத்தத் தன்மையில் (Analogy) இந்த ரேட்டி என்ற பகுதியினை தண்ணீரில் வசிக்கும் தவணைம்பினையுடைய பாலாட்டிகளின் துடுப்புகளுக்கு (Flipper) ஒப்பிட்டு நோக்குவதால், பறவைகளின் ரேட்டிப்பகுதி பாலாட்டிகளின் துடுப்புகளில் உள்ளது போன்றே வெப்பமாற்றத்திற்கு பயன்படுத்தப்பட்டு அவ்வாறு வெப்பமாற்றம் ஏற்படுவதால் உடலின் வெப்பநிலை ஒரே சீராக இருத்தலுக்கு பயன்படுகின்றன. மேலே குறிப்பிட்ட பறவைகள், தண்ணீரில் நடத்து செல்லும்பொழுது தண்ணீரிலுள் உடல் வெப்பநிலை மாறும்பொழுது மேலே குறிப்பிட்ட ரேட்டிப்பகுதிகளின் உதவியால் வெப்ப மாற்றங்கள் ஏற்பட்டு, உடலின் வெப்பம் ஒரே சீராக அமைவ உதவுகின்றது. இவ்வாறான வெப்பமாற்றங்கள் மெல்லிய படலத்தால் மூடப்பெற்ற கால் பகுதியிலிருந்து தண்ணீர்க்குள் செல்லுகின்றன. வெப்பமானது இப்பறவைகளின், உடலில் கால் பகுதியிலிருந்து தண்ணீருக்குள் செல்வதால் ஒரு சிறிதே வெளியேறுகின்றது. அதனால் ஒரு சிறிதே வெப்பம் வெளியேற்றப்படுவதால் உடலின் வெப்பம் சீராக்கப்படுகின்றது.

பெங்குவின் பறவைகளில் ஆக்ஸிலா (Axilla)ப்பகுதியில் ஒரு தமனிரேட்டி உள்ளது. இதுவும் மேலே குறிப்பிட்டது போன்றே

வெப்பநிலை மாற்றத்திற்குப் பயன்படுத்தப்படுகின்றது என்று கருதப் படுகின்றது.

பறவைகளின் நிணநீர் மண்டலம்

பறவைகளின் உடலிலுள்ள வெப்பநிலையைப் போன்ற தத்துவி குழாய்களாலான இரத்தக் குழாய்களிலிருந்து மற்ரும் நுண்ணிய குழாய்களாகக் கொண்ட நிணநீர்க் குழாய்களும் உள்ளன. இத்திணநீர், சுற்றிலுமுள்ள செல்களிலிருந்துவரும் சிறு பகுதியும், இரத்தக் குழாய்களிலின்றும் வடிக்கப்பட்டு வரும் பிளாஸ்மாவின் சிறு பகுதியும் சேர்ந்து நிணநீர் மண்டலத்தின் நிணநீராகின்றது. இத்திணநீரில் விழுக்கோலசட்டுகள் (Leucocytes) உள்ளன. ஆறாம் இரத்தத்திலுள்ள டிரதங்கள் கிடையாது. இத்திணநீர் தத்துவி செல்களால் ஒன்று சேர்ந்து பெரிய நிணநீர்க்குழாய்களாக மாறி இருதயத்திற்கருகில் மேற்பெருஞ் சிறையிலுள்ள திசுடன் குழாய்களிலுள்ள நிணநீரை வெளியேற்றுகின்றன. பெரிய நிணநீர்க் குழாய்களுக்கு நிணநீரை ஒரே மாதையில் செலுத்தச் செய்வதற்கு வால்வுகள் பொருத்தப்பட்டுள்ளன. இருப்பினும் பறவைகளின் நிணநீர் மண்டலத்தில் பாதுகாப்புக்களில் உள்ளதுபோன்று வால்வுகள் எல்லாவிடங்களில் அவ்வளவு அதிகமாகக் கிடையாது.

பறவைகளில் இடப்பெயர்ச்சி செய்தல் போன்ற அசையும் தன்மைகளாலேயே நிணநீரானது உடலின் எல்லாப் பகுதிகளிலும் சுற்றிச்சுழை போலுமானதாக உள்ளது. இருப்பினும் அதற்குரிய தனி முயற்சியும் இருக்கவேண்டும் என்றும் கருதப்படுகின்றது. குஞ்சு, முட்டைக் குள்ளிருக்கும்போழுது அவற்றிற்கு ஒரு சோடி நிணநீர் இருதயங்கள் உள்ளன. இந்த நிணநீர் இருதயங்கள் கடைசி சேக்ரல் முள்ளெலும்பில் இருபக்கங்களிலும் காணப்படுகின்றன. முட்டையிலிருந்து குஞ்சு வெளிவந்தவுடன் இந்த நிணநீர் இருதயங்கள் மறைத்து விடுகின்றன. மற்றும் சிலவற்றில் குஞ்சுப் பறவைகளில் அவைகள் அப்படியே தங்கியும் விடுகின்றன. அங்ஙனம் சில பறவைகளில் முழுமையாக மறைத்தும் மறைபாமலும் இருப் பதிலும் உண்டு. திக்கோழியின் இந்த நிணநீர் இருதயங்கள் அப்பொழுதும் நஞ்சு வளர்ச்சியற்றுக் காணப்படுகின்றன. பறவை களில் ஒரு சிலவற்றைத்தவிர மற்றவற்றில் நிணநீர் திக்களின் பெரிய கூட்டுப்பகுதி பாதுகாப்புக்களின் நிணநீர் திக்கணுக்களைப் போன்று அவ்வளவு குறிப்பிட்டுச் சொல்வதற்கு முறையில் காண வில்லை.

உதாரணமாக அனாட்டிடே குடும்பப் பறவைகளில் (Anatidae) ஒரு சோடி நிணநீர் திக்கணு, இனப்பெருக்க கரப்பிசுக்கு

அருகிலும் மற்஁றுகு சோடி கழுத்தின் அடிப்பகுதியிலும் அமைந்துள்ளன. பொதுவாக பறவைகள் பவவற்றிலும் ரெறு ரெறு முடிச்சு போன்ற நிணநீர்த்த திசுக்கள் முக்கியமாக சீரண உறுப்புகளின் கவர்கள் போன்ற பகுதியிலிருந்து உடலின் பல்வேறு உறுப்புகளில் கரணவரம்பு

8. பறவைகளின் நரம்பு மண்டலம் (Nervous System)

ஓர் உயிருள்ள பிராணியின் மைய நரம்பு மண்டலம், மற்ற எல்லா உறுப்புகளையும் இயக்குவதிலும் ஒரு சிறந்த மண்டலமாக செயல்படுகின்றது. மைய நரம்பு மண்டலத்தின் பகுதிகள் கட்டமைப்பிலும் செயல்படு திறனிலும் விலங்கு வகைகளில் வெவ்வேறுகக் காணப்படும். அதன் முக்கிய வேலை எல்லாவற்றிலும் ஒன்றாகவே காணப்படுகின்றது.

தண்டு வடம்: (Spinal cord) பறவைகளின் தண்டு வடம் பல பகுதிகளாகப் பிரிக்கப்பட்டுள்ளது. கூறுகளின் ஒவ்வொரு பக்கத்திலும் ஒரு சோடி வேர்ப்பகுதிகள் காணப்படுகின்றன. அவைகள் முறையே முன் அல்லது வயிற்றுப்புற வேர்ப்பகுதியும், பின் அல்லது முதுகுப்புற வேர்ப்பகுதியும் (Anterior or Ventral, Posterior or dorsal roots) ஆகும். முன் அல்லது வயிற்றுப்புற வேர்ப்பகுதிகள் தண்டு வடத்தின் சாம்பல் பொருளின் முன் கொம்புப் பகுதியிலுள்ள இயக்க நரம்பு செல்லளிலிருந்து (Motor cell) தோன்றுகின்றன. இவை உணர்வு அலைகளைத் தண்டு வடத்திலிருந்து தசைகளுக்கும் கரப்பிசைகளுக்கும் எடுத்துச் செல்லும் (Efferent) வேலையைச் செய்கின்றன. பின் அல்லது முதுகுப்புற வேர்ப்பகுதிகளில் நரம்புச் செல் நிரல் (Ganglion) உள்ளவைகளாக இருப்பதே அவைகளின் சிறப்பான குணமாகும். மற்றும் உணர்ச்சி நரம்புகள் (Afferent or Sensory) உணர்வு அலைகளை உடலின் மற்றப் பகுதிகளிலிருந்து மைய நரம்பு மண்டலத்திற்கு கொண்டு வரும் வேலையைச் செய்கின்றன.

பறவைகளின் தண்டு வடத்தில் முக்கியமான இருபகுதிகள் உள்ளன. செர்விகல் அல்லது கழுத்துப் பகுதி தண்டு வடத்தில் அதிகக் கூறுகள் காணப்படுகின்றன. மற்றும் ஸம்போசேக்ரல் பகுதியில் ஒரு ஸம்போசேக்ரல் குழிவுப் (Lumbo Sacral sinus) பகுதி

உள்ளது. தண்டுவடத்தில் இந்த இரண்டு பகுதிகளும் இவ்வாறு குறிப்பிடத்தக்க முறையில் அமைந்துள்ளன.

பறவைகளில் தோலுணர்வுத் தொகுதிகள் தண்டுவடத்தின் கறுகளில், மூன் அல்லது முதுகுப்புற வேர்ப்பகுதியின் ஒரு கிளையில் அமைந்துள்ளன. எதும்புத் தசைகளின் தொகுதிகளை இயக்கும் மையங்கள் தண்டுவடத்தில் அமைந்துள்ள நினைபற்றி அவ்வளவு தெளிவாகத் தெரியவில்லை.

தண்டு வடம் மற்றும் மைய நரம்பு மண்டலத்தின் மற்ற பகுதிகளின் வேலைமையப்பற்றி சரிவரத் தெரிந்து கொள்வதற்கு தண்டு வடத்தையும், மூளைப் பகுதியையும் வெகுவேறு இடங்களில் தொடர்பில்லாமல் துண்டித்தோ அல்லது ஒரு சில பகுதிகளை அகற்றியோ ஆராயப்பட்டன. மைய நரம்பு மண்டலத்தின் மேல் பகுதியினின்றும் சீழ்ப்பகுதி தொடர்பில்லாமல் பிரிக்கப்படுமானாலும் ஒரு சில வேலைகளே தடைபடுகின்றன. தண்டுவடத்தின் ஸம்பார் பகுதி குறுக்காக வெட்டப்பட்டுவிடுமானால் பறவைகள் அதனால் பாதிக்கப்படாமல் வெகு நாட்கள் உயிர்வாழும். இதே போன்ற மற்றப் பிராணிகளும் தண்டுவடத்தின் ஸம்பார் பகுதி குறுக்காக வெட்டப் படினும் பாதிக்கப்படாமல் ஒரு சில வேலைகள் தடைபடுவதோடு உயிர் வாழமுடிகின்றது.

ஒரு பறவையில் தண்டுவடத்தை ஒரு குறிப்பிட்ட இடத்தில் குறுக்காக வெட்டிப் பிரித்துவிட்டால் ஒரு சிறிது நேரம் அப்பறவை தண்டுவட அதிர்ச்சியை (Spinal shock) தாங்கிக்கொள்ளல் வேண்டும். பின்பு துண்டிக்கப்பட்ட பகுதியின் சீழ்ப்பகுதி மற்ற மைய நரம்பு மண்டலத்துடன் தொடர்பில்லாததால் ஒரு சிறிது நேரம் பறவை செயல்படாமல் அசைவிலாமல் உணர்விலாமல் காணப்படுகின்றது. ஆனால் சிறிது நேரத்திற்குப் பின்பு பாதுகாப்பு தண்டுவட அதிர்ச்சை ஆற்றல் (Protective spinal reflex) தோன்றி, கால்கள் உடம்பு முதலிய பகுதிகளில் அதிர்ச்சை செயல் ஏற்படுகின்றது என்று கூறப்படுகின்றது.

தண்டு வடத்தை மாறிப் பகுதியில் குறுக்காக துண்டித்துவிட்டு ஒரு பக்க பாதத்தினை வளைத்தும் நீட்டியும் அசைவு உண்டாக்கினால் மறு பக்கப் பாதம் அதே போன்ற எதிர்புறமாக வளைத்தல் நீட்டுதல் போன்ற அசைவு மறுவிடிக் கருதாத்தன்விச்சை செயலாக ஏற்படுகின்றது. அவ்வாறு அசைவு மேன்மேலும் பெருகிக் கொண்டே போகும்போழுது, சீரான இரண்டு பாதங்களின் அசைவும் ஏற்படுகின்றது.

பறவையின் தண்டுவடத்தை ஒரு குறிப்பிட்ட பகுதியில் குறுக்காக வெட்டினால், வால் பகுதியில் பண்பித மறுவீணக் கருதாத தன்னிச்சை செயல்களின் அசைவுகள் தூண்டப்படுகின்றன. தலைமும் உடலும் மூன்புறமாக செங்குத்தாக நீட்டப்பட்ட தண்டுவடம் துண்டிக்கப்பட்ட புழுவினை திடீரென்று மேல்புறமாக தூக்கி, படுக்கைக் கோட்டு நிலைக்கு கொண்டுவந்ததால், அதன் வால் இறகுகள் விசிறி போன்ற பரவி விரிந்து காணப்படும். மறுபடியும் மூன்புறத்த நிலைக்கு தள்ளப்பட்டால், அப்புறவின் வால் ஒரு சிறிது மேலே எழும்பும். இவ்வாறு தண்டுவடம் துண்டிக்கப்பட்ட புழுவின் வால் அசைவினால் அப்பறவை தன்னுடைய நிலையை சமீபராக்கிக் கொண்டு திறக் முயற்சிக்கின்றது.

பறவைகளில் தண்டு வடம் ஒரு இடத்தில் குறுக்காக வெட்டப் படிச் அப்பறவையின் மைய நரம்பு மண்டலத்தின் உயர் பகுதிகள், தாழ்வான பகுதிகளினின்றும் பிரிக்கப்பட்டு விடுகின்றன. அதனால்தான் சாதாரணமாக பறவைகளின் காணப்படும் நடக்கும் தன்மை மேலே குறிப்பிட்டப் பறவைகளில் இயலாமல் போய்விடுகின்றது. மற்றும் இப்பறவைகளில் நிமிர்ந்த நோக்கும் தடைபெற்று விடுகின்றது.

தண்டுவடம் பிரிக்கப்பட்ட பறவையின் கால்களில் காணப்படும் அசைவிற்கும், இறக்கைகளில் காணப்படும் அசைவிற்கும் பெரிதும் வேறுபாடுகள் உள்ளன. கால்களின் அசைவு பக்கங்களில் மாறி மாறி காணப்படுகின்றது. ஆனால் இறக்கைகளின் அசைவு ஒரே மாதிரி மாகவும், உடனிகழுவாகவும் (Simultaneously) நடைபெறுகின்றது. தண்டுவடம் துண்டித்த ஒரு புழுவினை வால் பகுதி பக்கமாக கையில் பிடித்துக் கொண்டால் இறக்கைகள் எப்பொழுதும்போல் மேலும் கீழும் அடித்துக் கொள்கின்றன. மற்றும் தண்டு வடத்தின் இறக்கைகளின் தசைகள் பொருத்தும் முதுகுப்புற வேரின் துண்டித்து விட்டால் பறவை பறக்கும் திறனை அறவே இழந்து விடுகின்றது.

பறவையின் தண்டு வடத்தின் லம்பார் (Lumbar) பகுதியின் அடியோடழித்துவிட்டால், வால் பகுதியில் உணர்வுகள் அசைவுகளும் தடைபெறுகின்றன. பொதுப்புறமழவின் கருக்கு தசைகள் செயல்படு திறனை இழந்துவிடுகின்றது. இருப்பினும் சிறிது நேரத்திற்குப் பின்பு அப்பகுதி மறுபடியும் தன் செயல் திறனைப் பெறுகின்றது. பொதுப் புறம வழிவாக மலம் குறிப்பிட்ட இடைவெளியில் வெளியேறு கின்றது.

மேலே கூறப்பட்ட தண்டு வடம் துண்டிக்கப்பட்ட பறவைகளில் நரம்பு இழை நார்கள் மறு வளர்ச்சியடைதலை அறிந்து கொள்ளுதல் மிகவும் இயற்கையானதொன்றாகும். இவ்வாறு துண்டிக்கப்பட்டு

நடத்தும் பரிசோதனையில் தண்டு வடம் முழுமைமாக வெட்டி எடுக்கப்பட்டுவிடின் பறவையில் தண்டு வடம் முழு பாகமும் மறு வளர்ச்சி அடைதல் எதிர்பார்க்க முடியாது. ஒரு சிறிது நரம்பு இழை தார்க்கள் தண்டு வடத்தின் அண்மைப்பகுதியிலும் சேய்மைப் பகுதியிலும் மறு வளர்ச்சிபடைவதைக் காணலாம். குஞ்சுப் பறவைகளில் தண்டு வடத்தின் மறு வளர்ச்சி வேகமாக இருத்தலுக் காணலாம்.

பறவையின் தண்டு வடம் ஒரு பக்கத்தில் சேதப்படுத்தப்பட்டால், கால் நடக்க முடியாமல் அவதியுறும், வானும் பழுதுபட்ட பாகத்தை தோக்கி சுருண்டுவிடும். பறவையின் உணர்ச்சி அப்பகுதியில் ஒரு சிறிதே பாதிக்கப்படும். சிறிது நாட்களுக்குப் பின் அப்பறவையில் சேதப்பட்ட பகுதி வளர்ச்சியுற்று, பறவை பழைய நிலையை அடையும்.

மூளை (Brain)

மூகுளம் (Medulla oblongata)

மைசு நரம்பு மண்டலத்திலேயே மூகுளம்தான் ஒரு முக்கியமான பகுதியாகும். பெரு மூளைப் பகுதியோ சிறு மூளைப் பகுதியோ இன்னாது பறவைகளும், தண்டு வடம் சிதைக்கப்பட்ட பறவையும் உயிர் வாழ முடியுமென்று கண்டுபிடிக்கப்பட்டுள்ளது. ஆனால் மூகுளம் இல்லாவிடில் பிராணிகள் உயிர் வாழ முடியாது. பறவைகளில் பன்விரண்டு மூளை நரம்புகளில் எட்டு மூளை நரம்புகள் இப்பகுதியிலிருந்தே தோன்றி வெளியேறுகின்றன என்றால் அதன் முக்கியத்துவம் நன்கு விளங்கும்.

தண்டு வடத்தின் நேரான நீட்சியே மூகுளமாகும். மூகுளத்தில் தண்டு வடத்தின் மையக் குழாய்ப் பகுதி நீண்டு தாண்டாவது வெண்டிரிக்குள் என்று அழைக்கப்படுகின்றது. மூகுளம் முன்புறம் மைய மூளைபாக மாற்றப்பட்டுள்ளது. மூகுளம் எவ்வளவு வகைப் பிராணிகளிலும் ஏறத்தாழ ஒரே மாதிரியாகக் காட்டி தருகின்ற காரணத்தினால் இதை ஒரு பழமைமான உறுப்பு என்று கூறலாம். பறவைகளில் மூகுளத்தின் குயிற் (Nerve) நன்கு வளர்ச்சியுற்றுக் காணப்படுவதுடன் இதனில் வாழ்க்கைக்கு இன்றியமையாத பன்மறுமூள்கருதாத தன்விச்சைச் செயல் மையப் பகுதிகளும் அமைந்துள்ளன.

மூகுளம் கவாசித்தலுக்கு உட்படுபடுத்தும் ஒரு முக்கியப் பகுதியாகும். பறவைகளிலும் பாதுகாடிகளிலும் மூகுளத்தின் தாண்டாவது

வெஸ்ட்ஃகிலியின் தரைப் பகுதியின் பின் மூலக் கூடிக் முடிச்சு (Knock of life) என்று அழைக்கப்படுகின்றது. பறவைகளிலும் மானூட்டிகளிலும் இந்த கூடிக் முடிச்சிற்கு சேதம் ஏற்பட்டால் கவாசம் தடைபெறுகின்றது. அதனும் அப்பிராணிகள் உடனடியாக இறந்து விடவும் நேரிடும்.

மற்றும் இது போன்ற பல மையப் பகுதிகள் கவாசத்தை மானூட்டிகளிலும் பறவைகளிலும் கட்டுப்படுத்துகின்றன என்பது பற்றி பச்சோதனைகளால் கண்டுபிடிக்கப்பட்டுள்ளன. கமாசித்தனைக் கட்டுப்படுத்துவதோடும்மாமல், முகுளம் சீரண உறுப்புகள், இரத்த நாளங்கள் போன்ற கூடலின் உள்சூறுப்புகளின் செயல்படு தன்மையையும் கட்டுப்படுத்துகின்றது. இகுதயத்தின் செயல்படு தன்மையை, முகுளத்தின் குமிழ்ப் பகுதியில் அமைந்துள்ள வேகல் அல்லது சஞ்சாரி நரம்புகள் கட்டுப்படுத்துகின்றன. இரத்தத்தினுள்ள கரீயமிச வாயுவின் அடர்த்தியினையும் முகுளத்தில் அமைந்துள்ள மையப் பகுதிகளே கட்டுப்படுத்துகின்றன.

கூடலின் பல செயல்களைக் கட்டுப்படுத்தும் மையப் பகுதிகளில் முகுளத்தின் வெஸ்ட்ஃடியுவார் பகுதியே முக்கியமானதாகும். எட்டாவது மூளை நரம்பின் வெஸ்ட்ஃடியுவார் தசை நார்கள், நான்கு வெஸ்ட்ஃடியு செல் தொகுதிகளில் காணப்படுகின்றன. இந்தச் செல் தொகுதிகளே முகுளக் குமிழின் வெஸ்ட்ஃடியுவார் நரம்புச் செல் திரளாகும். இந்த நரம்புச் செல்களின் பாதைப் பகுதிகளில் கண்கள், கழுத்து, கூடம்பு முதலிய பகுதிகளை அசைவிக்கும் தூண்டுதல் நரம்புகள் காணப்படுகின்றன. மற்றும் வெஸ்ட்ஃடியுவார் பகுதி சிறு மூளைப் பகுதி இவை இரண்டையும் சேர்க்கும் வெஸ்ட்ஃடியுவார் சிறு மூளைப் பாதைகளும் முகுளத்தில் காணப்படுகின்றன. இப்பகுதியினுள்ள திழக்கியங்கள் கண்களின் வெளித் தசைகளின் அசைவிற்கும், மற்ற தசைகளின் அசைவிற்கும் காரணமாக அமைந்துள்ளது. பறவைகளின் முகுளத்தின் வெஸ்ட்ஃடியுவார் குமிழின் செயல்படு தன்மையே பறவையின் தலை கூடம்பு முதலிய பகுதிகளின் நேரான நிலைக்குக் காரணமாகும். கண்களின் நிலையான தன்மைக்கும் இப் பகுதியே காரணமாகும்.

புருக்களிலும் வானத்துகளிலும் முகுளத்தின் வெஸ்ட்ஃடியுவார் பகுதி ஒரு பக்கம் சேதப்படுத்தப்படின் கண்களின் சுழற்சி பிரிந்து காணப்படுவதுடன், தலை பக்கவாட்டில் வளைவதுடன் சுழலும் தன்மையையும் பெறுகின்றது. எந்தப் பக்கம் சேதமடையப் பட்டதோ அந்தப் பக்கமாக சுழல்தும் கூடம்பும் திருகுச் சுருள் திசையில் வளைகின்றன.

சிறு மூளை (Cerebellum)

பறவைகளில் சிறு மூளை நன்றாக வளர்ச்சியுற்றுக் காணப் படுகின்றது. இதில் வெர்மிஸ் (Vermis) அல்லது கார்ப்பஸ் செரிபெல்லி (Corpus Cerebelli) என்ற ஒரு பெரிய மையப்பகுதியும் இரண்டு பக்க இதழ்ப் பகுதிகளும் ஆக மூன்று பகுதிகள் உள்ளன. வெர்மிஸ் பகுதி பின்னும் முன், மைய, பின் இதழ்களாக மூன்று இதழ்களாகப் பிரிக்கப் பட்டுள்ளது. இந்த மூன்று இதழ்களிலும் ஒன்றிலின்று ஒன்றைப் பிரிக்கும் ஆழமானப் பிளவுகள் உள்ளன.

சிறு மூளையின் பாகங்களைச் சிதைத்தோ அல்லது முழுமையாக அகற்றிவிட்டோ பறத்தலும் நடப்பதும் தடைபெறுகின்றது. சிறிது நாட்களுக்குப்பின் பறவை நடக்கும் திறனையும் பறக்கும் திறனையும் சிறிது சிறிதாகப் பெறுகின்றது. சிறு மூளை அகற்றப்பட்ட ஒரு சிறிது நாட்களுக்குப்பின்பு புதுமைக் கையில் எடுத்து தூக்கிவிட்டு பறக்க விட்டால், பறந்து செல்லும் ஆற்றலைப் பெறுகின்றது. ஆனால் அதுவாக மேலே எழும்பி பறக்கும் ஆற்றலை முழுளச் சிதைவிலும் பெறவில்லை.

வால் பகுதியின் பல்வேறு மறுவிலை கருதாத தன்னிச்சைத் தூண்டுதல், சிறு மூளைப் பகுதியின் கட்டுப்பாட்டுத் தன்மையினாலேயே நடக்கின்றது.

பாதுாட்டிகளைப் போன்றே பறவைகளிலும் சிறுமூளை, உடலின் பல பகுதிகளிலுமுள்ள தசைகளின் அசைவினைக் கட்டுப்படுத்தும்படி அமைந்துள்ளது. சிறு மூளையின் கார்ட்டெக்ஸ் பகுதியில்தான் இத்தக் கட்டுப்படுத்தும் தன்மை அமைந்துள்ளது. சிறு மூளையின் கார்ட்டெக்ஸ் பகுதியைத் தவிர சிறு மூளையின் வெள்ளைப் பொருளில் அமைந்துள்ள நியூக்லியஸ் பகுதியும் மிகவும் இன்றையமையாத தொன்றாகும். பறவை கழுத்தினைத் தூக்குவதற்கும் திருப்புவதற்கும் சிறு மூளையின் நியூக்லியஸ் பகுதியாக தூண்டப்படும் மூகுளத்தின் வெல்ட்டிபுளார் மையப்பகுதியின் கட்டுப்பாட்டுத் தன்மையே காரணமாகும்.

பரிசோதனைகளின் மூலம் பறவையின் தொடு உணர்வு (Tactile Sense), பார்வை உணர்வு, ஒலி உண்டாக்கும் உணர்வு முதலிய வற்றின் தூண்டுதல்கள் சிறு மூளையின் கார்ட்டெக்ஸ் பகுதியிலேயே அமைந்துள்ளன என்பது விளக்கப்பட்டுள்ளது.

சிறு மூளையின் பின் இதழ் கார்ட்டெக்ஸ் பகுதியில் மற்றும் உணர்வுகளைத் தூண்டு முறைகளும் உள்ளன. இவை வெல்ட்டிபுளார் மையப்பகுதியின் தூண்டுதலால் கழுத்து வாகப் பகுதி தசைகளை

இயங்கச் செங்கின்றன. இந்தப் பகுதி சேதமடையப்பட்டால், கழுத்து வாய் பகுதிகளின் அசைவு எப்பொழுதும் உள்ள அசைவிற்கு நேர் எதிராக இருப்பதால் பறவை முதுகுப்புறம் கீழ் படும்படி விழுந்து விடுகின்றது.


மைய மூளை அல்லது மீசன்செஃப்பலான் (Mid brain or Mesencephalon)

மைய மூளைப் பகுதியை இடை மூளைப் பகுதியினின்றும் (Diencephalon) பிரித்துக் காண்பது அவ்வளவு எளிதல்ல. உணர்வுகளை மூளையினின்றும் மற்ற பாகங்களுக்கு எடுத்துச் செல்லும் இயக்க தரம்புகளுக்கும் (Motor nerves) உடலின் மற்ற பாகங்களிலிருந்து உணர்வுகளை மூளைக்கு கொண்டுவரும் உணர்ச்சி தரம்புகளுக்கும் (Sensory nerves) மையப் பகுதியாக இருக்கும் இடை மூளைப் பகுதியையும் மைய மூளைப் பகுதியையும் பிரித்துக் காணல் இயலாது.

மைய மூளையின் முதுகுப்புற பகுதியை டெக்டம் ஆப்டிகம் (Tectum opticum) என்ற பகுதியாக ஆனது. இதில் நன்றாகத் தெரியும்படியாக அமைந்த ஆப்டிக் இதழ்கள் (Optic lobes) என்ற பக்க இரு இதழ்களுள்ளன. பறவைகளில் பார்வை உணர்ச்சி மிகவும் இன்றியமையாத தொன்ருகையாக ஆப்டிக் இதழ்கள் மற்றப் பிராணிகளில் இருப்பதைக் காட்டிலும் மிகவும் பெரியதாக அமைந்துள்ளன. பார்வை தரம்புகள் இப்பகுதியில் ஒன்றன்மேல் ஒன்றாகக் குறுக்காகப் பாய்ந்து குறுக்காய் அமைந்திருப்பதுடன் உடலின் மற்ற பாகங்களுக்கு உணர்வுகளை எடுத்துவரும் தரம்பு தசைதார்களுக்கும் இது மையப் பகுதியாக உள்ளது.

மைய மூளையின் வலிந்துப்புறப் பகுதி டெக்மெண்டம் (Tegmentum) என்ற தரம்பு மையங்களைக் கொண்ட பகுதியாக ஆனது.

ஆப்டிக் இதழ்களை அழித்தோ, சேதம் உண்டாக்கியோ அதனால் ஏற்படும் விளைவுகளை ஃளவரென்ஸ் (Flowerens) என்ற பிராங்க தேசத்து அறிஞர் முதன் முதலில் 1824 ஆம் ஆண்டில் விளக்கியுள்ளார். அவர் புரூ, கோழி போன்ற பறவைகளில் ஒரு பக்கத்து ஆப்டிக் இதழை அழித்துவிடின் மறுபக்க கண்ணிற்கு பார்வை குறைந்துகண் தெரியாமல் போய்விடுவதைக் கண்டறிந்தார். இரண்டு பக்கத்து ஆப்டிக் இதழ்களையும் அழித்து சேதப்படுத்தினால் பறவை கண் பார்வையை முழுமையாக இழந்து விடுகின்றது என்பதாகக் கூறியுள்ளார். இவ்வாறு ஃப்ளவரென்ஸ் அவர்களால் கண்டுபிடிக்கப்



- படம் 36. 49-ஹீ (அ) முதுகுப்புறத் தோற்றம்
 (ஆ) வலிப்புறத் தோற்றம் (இ) பக்கத் தோற்றம்
 (ஈ) உள் குழியிலின் தோற்றம் (உ) பக்க வெட்டுத் தோற்றம்
1. நுகர்ச்சி குமிழ்கள், 2. பெருமூளை அறை வட்டப் பகுதிகள், 3. கண் கோணங்கள், 4. நெறு மூளை, 5. கிப்பனாக் குழல், 6. முதுகை, 7. தண்டு வட்டம், 8. பீனியக் கூறுப்பு, 9. கண் நரம்புகள், 10. கண் நரம்பு குறுக்கையெப்பு, 11. கண் நரம்புப் பகுதி, 12. இன் பின்புழை, 13. மூதல் தண்டு வட்ட நரம்பு, 14. கைறப்போ அபசில், 15. இரண்டாவது வெண்டிக்குள், 16. காம்பல் வட்டவெட்டம், 17. மச்செலின் ஹீ, 18. கண் குழியு அல்லது ஆர்போலிம், 19. நெறு மூளையின் காம்புப் பகுதி, 20. ஆர்புக் குமிழர், 21. பிள் கமிஷர், 22. டயல் செட்டப்பலான், 23. மூன்றுவது வெண்டிக்குள், 24. மூள் கமிஷர், 25. இட்டர் (Nose.)

பட்டச் செயல்களைக் குறித்து மற்றவர்களும் ஆராய்ச்சி நடத்தினார்கள். தற்சமயம் நடத்தியதும் சோதனைகள் ஆப்டிக் இதழ்களின் மேல் பரப்பு அடுக்குச் செய்களை அகற்றினால் பறவைகள் பார்வையை முழுமையாக இழப்பதில்லை என்று காட்டப்பட்டுள்ளது. இவ்வாறு ஆப்டிக் இதழ்களின் மேல் பரப்பு அடுக்குச் செய்களை அகற்றியேனும் பருவானது தன் மூன்று மூன்று தடவைகள் அகற்றி நன்றாக நடக்கின்றது. ஆனால் அப்பருவியைத் தானியங்கிகளைக் கொத்தித் தின்ன இயலாது. மூன் மூளை (Fore brain)ப் பகுதியினை பறவைகளில் அகற்றியேனும் இது போன்ற செயல்களை ஏற்படும் என்று கருதப்படுகின்றன.

மூளையின் மையப் பகுதியாகிய இப்பகுதி சேதப்படுத்தப்பட்டால் எல்லா முறுகெழும்புள்ள பிராணிகளிலும் அவைகள் தங்கள் சமீபமான உடல் அசையினை இழந்துவிடுகின்றன. மைய மூளையின் டெக்ட்டம் டெமெண்ட்டம் ஆகிய இருபகுதிகளும், மூளையின் தளமலம், சிறு மூளை, முகுளம், தண்டுவடம் ஆகிய எல்லாப் பகுதிகளுக்கும் இணைப்புகளுடன் காணப்படுவதாவேயே, இப்பகுதி சேதப்படுத்தப்பட்டால் உடலின் எல்லாச் செயல்களும் சீர்கெடுகின்றன.

பறவைகளில் வலது பக்க ஆப்டிக் இதழை அகற்றி விட்டால் கழுத்து திரும்பிக் கொள்வதுடன் பறவை எந்தப் பக்கத்து இதழ் சேதப்படுத்தப் பட்டதோ அந்தப் பக்கமாகச் சுற்றி சுற்றி வட்டமிட்டு அசைகின்றது. அதே போன்று இடப்பக்க ஆப்டிக் இதழை அகற்றிவிட்டால், இதழ் சேதப்பட்ட திசைப் பக்கமாக திரும்பிக் கொண்டு வட்டமிட்டவாறு சுற்றி சுற்றி வருகின்றது. ஆப்டிக் இதழ்கள் வால் பகுதியில் நிரப்பத்தினைவும் பரப்புதலையும் கட்டுப்படுத்துகின்றது. ஆகையால் ஆப்டிக் இதழ்கள் சேதப்படுத்தப்பட்டால் பறவை தன் வானைத் திரும்புதலோ, விரிப்பதோ தடைபடுகின்றது. மற்றும் பறவைகள் பறந்து கொண்டிருக்கும் நிலையிலிருந்து தரையில் வந்து இறங்கும்போழுது காக்கைக்கு ஆதாரத்தையும் இந்த ஆப்டிக் இதழ்களின் தூண்டுதலே அளிக்கின்றது.

ஆப்டிக் இதழ்களின் தூண்டுதலால் ஏற்படும் விளைவுகள்

மார்ட்டினோ (Martino) என்பவர் 1926 ஆம் ஆண்டு பறவைகளின் ஆப்டிக் இதழ்களை நரம்பு மருந்தாகப் பயன்படும் ஸ்ட்ரிக்னின் (Strychnine) என்ற நச்சு மருத்தினால் தூண்டி அதன் விளைவுகளை ஆராய்ந்தார். உறுஞ்சு காகிதத்தை 1 மி. மீ. அளவு எடுத்துக் கொண்டு அதில் மேலே குறிப்பிட்ட 1:1 அடர்த்தியுள்ள நச்சு மருத்

நிலை தடவி ஆப்டிக் இதழ் மேல் பரப்பில் வைத்தார். அப்பொழுது பறவையின் கால்கள் இறக்கைகள் முதலானவற்றின் அசைவுகளை ஆராய்ந்தார். ஆப்டிக் இதழ்களை இவ்வாறு தூண்டியதால் பறவை நடுக்கமுற்ற நிலையில் கால்களையும் இறக்கைகளையும் அசைத்து இடப் பெயர்ச்சி செய்தன. வால்பகுதியும் இதனால் உயிர்ப்பியக்கம் எழுப்பப்பெறுகின்றது (Irritated).

மற்றும் மின்சாரத் தூண்டுதலாலும் மற்ற புறச் சாதனங்களின் தூண்டுதலாலும் ஆப்டிக் இதழ்கள் எவ்வாறு செயல்படுகின்றன என்பது குறித்தும் விரிவாக ஆராயப்பட்டன. ஆப்டிக் இதழின் கீழ்க்கம்பப் பகுதியின் தூண்டுதல் கழுத்தசைவுகளை ஏற்படுத்துகின்றன. அதன் முதுகுப்புறப் பகுதியினைத் தூண்டினால் இறக்கைகளும் கழுத்தும் அசைகின்றன. மற்றுமொரு குறிப்பிட்ட ஆப்டிக் இதழ் பகுதியைத் தூண்டினால் கால்களும் இறக்கைகளும் அசைகின்றன. ஆப்டிக் இதழின் மேல் கம்பப் பகுதியைத் தூண்டினால் வாலில் அசைவு ஏற்படுகின்றது. அலகு, ஒலி உண்டாக்கும் உறுப்பு முதலியவைகள் ஆப்டிக் இதழின் வயிற்றுப்புறப்பகுதி தூண்டுதலால் செயல்படுகின்றன.

டயன்செஃப்பலான் அல்லது இடைமூளை (Diencephalon or Midbrain)

இடை மூளைப் பகுதியில் தான் மூன்றாவது வெண்டிரிக்கின் உள்ளது. இது தலாமஸ், ஹைப்போதலாமஸ் (Thalamus, Hypothalamus) என்ற இரண்டு பகுதிகளைக் கொண்டது. பறவைகளின் தலாமஸ் பகுதி முன் மூளையின் கார்ட்டெக்ஸ் பகுதியுடன் இணைந்திருப்பதால் அது தெளிவாகத் தெரிகின்றது. தலாமஸ்ஸின் நியூக்கிலியஸ்கள்தான் முன் மூளைக்கும், உடலின் உணர்வு மண்டலங்களுக்கும் உணர்வுகளை ஒலி பரப்பும் அஞ்சல் நிலையங்களாக அமைந்துள்ளன. தலாமஸ் பகுதியின் நியூக்கிலியஸ்ஸில் உடலின் மற்ற பாகங்களிலிருந்து உணர்வுகளைக் கொண்டு வரும் நரம்புப் பாதைகள் முடிவடைகின்றன. ஆப்டிக் அல்லது கண் நரம்பு, காது நரம்பு (Auditory), தண்டு வட தலாமிக் நரம்பு (Spino thalamic), ட்ரை ஜெமின்னல் அல்லது முக்கினை நரம்புப் பாதைகள் உடலின் மற்றப் பகுதியிலிருந்து தலாமஸ்ஸின் நியூக்கிலியஸ் பகுதியில் முடிவடைகின்றன.

தலாமஸ் நியூக்கிலியஸ்ஸின் நரம்பு செல்கள் முன் மூளையின் பகுதிகளுக்கு நீண்டுள்ளன. அதே போன்று முன் மூளையிலிருந்து தலாமஸ் நியூக்கிலியஸ் பகுதிக்கு பல பாதைகளால் இணைக்கப்பட்டுள்ளன.

தலாமஸ்ஸின் வேலை

தலாமஸ்ஸின் வேலைகளைப் பற்றித் தெரிந்து கொள்வதற்கு பறவைகளின் மூன் மூளைப் பகுதியினை தலாமஸ் பகுதியுடன் சேர்த்து சேதமடையச் செய்து பின்பு பறவை எவ்வாறு செயல்படுகின்றது என்பதிலிருந்தே அறியலாம். பறவைகளின் மூன் மூளையை அகற்றி விடின் ஏற்படும் விளைவுகளைக் காணப் பல பரிசோதனைகள் நடத்தப் பட்டன. இவ்வாறு நடத்தப்பட்ட பரிசோதனைகளில், ஒரே ஒரு பறவையின்தான் தலாமஸ் பகுதி சேதப்படாமல் மூன் மூளைப் பகுதியை அகற்ற முடிந்ததாகக் கண்டு பிடிக்கப்பட்டுள்ளது. மூன் மூளையும் அதனுடன் சேர்த்தார்போல் அகற்றப்பட்ட தலாமஸ் பகுதியை அகற்றியும், புறக்கனில் பல, இரண்டு வகுடங்கள் வரை வாழ்த்திருந்ததாக சோதனைகள் கூறுகின்றன. பின்பு அப்பகுதி விலகா மறற்ப் பகுதிகளின் செல் அமைப்புகளைப் பற்றியும் ஆராயப் பட்டன. இவ்வாறு மூன் மூளைப் பகுதியும் தலாமஸ்ஸின் நிறு பகுதி சேதப்படுத்தப்பட்ட புறக்கன், தன் விருப்ப நிலை அல்லது தானாக இயல்பாக இயங்குதலை ஆற்றும், உணவுப் பொருளைத் தானாக எடுத்து உண்ணமுடியாத நிலையிலும் இருந்தன. இவ்வாறு பல புறக்கனில் நடத்திய சோதனைகளில் ஒரே ஒரு புற மட்டும் எப்பொழுது அதற்கு சாதாரணமாக உள்ள செயல்படு திறனை திரும்பவும் பெற்று, தானாகவே இயங்குதற்கும் தானாகவே உணவுப் பொருட்களை எடுத்து உண்பதற்கும் சய திறனைப் பெற்றுவிட்டன. மேலே குறிப்பிட்ட சோதனை நடத்திய பறவைகளில் இரண்டு வகுடங்களுக்குப் பின்பு அவைகள் தானாகவே உணவு உண்ணுதல் போன்ற பழக்கங்களை சாதாரணமாக உள்ள காலங்களைப் போன்று பெருகியும் பார்வைக்கு அவ்வளவு வித்தியாசம் தெரியவில்லை.

மற்றும் மூன் மூளையும் தலாமஸ் பகுதியும் பாதிக்கப்பட்ட பறவைகள் நிர்ப்பதற்குக்கூட சிரமம் படுகின்றன என்று கூறப்படுகின்றது. மூன் தலாமஸ் பகுதியை மின்சாரத்தினால் தூண்டதல் செய்தால், அசைப்போடும் திறனும் கழித்துப் பகுதித் தசைகளின் சுருக்கு தன்மை குறையும்படியான நிலையும் அதனால் வட்டமிட்டு சுற்றித் திரியும் நிலையும் ஏற்படுகின்றன. தலாமஸ்ஸின் நாழிந்த பகுதியை மின்சாரத்தினால் தூண்டப்படின சுருத்து தன்மை இறகுகள் கால்கள் முதலியவைகள் தன்மை வளைந்து கொடுக்கும்படியான நிலை ஏற்படுவதுடன் பறவை வட்டமிட்டு சுற்றித் திரியும் நிலையும் ஏற்படுகின்றன.

ஹைப்போ தலாமஸ்

ஹைப்போ தலாமஸ், டயன் செக்ப்பலான் அல்லது இடை மூளைவின் அடிப் பகுதியில் தலாமஸ்ஸிற்குக் கீழே அமைந்துள்ளது.

தலாமல் பகுதியில் உள்ளது போன்றே இப்பகுதியிலும் நியூக்லியியங்கள் கூட்டமாக அமைந்துள்ளன. பறவைகளின் ஹைப்போதலாமல் பகுதியில் நியூக்லியியங்களும் அவைகளின் இணைப்பையும் மூன் மைய பீன் ஆகிய மூன்று தனித்துத் தெரியும் பகுதிகளில் காணலாம். மூக்குப் பகுதி, தலாமல் பகுதி மூன் மூளைப் பகுதி ஆகிய இடங்களிலிருந்து தசை தார்கள் ஹைப்போதலாமல் பகுதியுடன் இணைந்திருத்தலைக் காணலாம். மற்றும் ஏறு பாதையில் மூலமாக முகுளம் தண்டுவடம் முதலிய பகுதிகள் வழியாக தூண்டு தல்கள் ஹைப்போதலாமல் பகுதியை அடைவன. மூளைப் பகுதியிலிருந்து உணர்வுகளை வெளியே எடுத்துச் செல்லும் நரம்புகள் ஹைப்போதலாமல் பகுதியிலிருந்து மூன் தலாமல் பகுதிக்கும், தலாமல் வழியாக மூன் மூளைப் பகுதிக்கும், தானியங்கு நரம்பு மண்டலத்திற்கும் தண்டுவடத்திற்கும் செல்வன. மூன் மூளையின் ஹைப்போதலாமல் பகுதியுடன் ஹைப்போதலாமல் இணைந்திருப்பது மிகவும் இன்றியமையாததொன்றாகும். ஹைப்போதலாமல் உடலின் வெப்பத்தை ஒரே சீராக வைத்திருப்பதற்குப் பெரிதும் பயனுள்ளதாக உள்ளது. மைய மூளைவையும் மூன் மூளைவையும் அகற்றியிட்டால், பறவையின் உடல் வெப்பம் ஒரே சீராகவியலாமல் மிகவும் குறைந்து விடுவின்றது. ஹைப்போதலாமல் பகுதி பழுதடைப்பிட்டால் உடனடிபாக உடலின் வெப்பம் சீராக விராமல் குறைந்து விடுவின்றது. மற்றும் பறவையின் சிரத்த அழுத்தமும் குறைந்து விடுவின்றது. மேலும் உடலிலுள்ள தண்ணீரும் உலர்ந்துவிட்டு விடுவின்றது.

ஹைப்போதலாமல், ஹைப்போதலாமல் பகுதியுடன் இணைந்து காணப்படுகின்றது. ஹைப்போதலாமல் பகுதியில் இரண்டு மூக்கிய பகுதிகள் உள்ளன. பீன் பகுதி அவ்வது நியூரோ ஹைப்போதலாமல் ஹைப்போதலாமல் பகுதியுடன் சுப்ரா ஆப்டிக்ஸே ஹைப்போதலாமல் பாதை (Supra optico hypophyseal tract) என்ற ஒரு தசை தார் கொத்தினால், சுட்டுப்படுத்தப்பட்டு செயல்படுகின்றது. இந்த உட்பகுதியில் இப்பகுதியிலிருந்து வெளியேற்றப்பட்ட ஹார்மோனின் உதவியால் உடலில் மிகுதியாக வெளியேற்றப்படும் சிறு நீர், சிறுநீர் போக்கு (Diuresis) என்னும் தோல் தடுத்து நிறுத்தப்படுகிறது. மூன் பகுதி அடிஹைப்போதலாமல் என்னும் பகுதியாகும். பீன்பகுதியுடனும் ஹைப்போதலாமல் பகுதியுடன் இந்த தாண்டுகள் சார்ந்த இணைப்புகளால் இணைக்கப்பட்டு உள்ளது. பறவைகளில் ஆக்டிடோசின், லாசோட்டோசின் என்ற இரு ஹார்மோன்கள் ஹைப்போதலாமல் சுப்ரா ஆப்டிக், பேராவெண்ட்ரிக்ஞலார் நியூக்லியியங்களில் நரம்புச் செல்களிலிருந்து உற்பத்தியாவின்றன. இவைகளை நியூரோ ஹார்மோன்கள் என்றும் அழைக்கலாம்.

இவைகள் மற்ற இனப் பெருக்க வளர்ச்சி துறார்மோன்களின் (Gonads tropic hormones) செயல்படு தன்மைகளைக் கட்டுப் படுத்துகின்றன.

முன் மூளை (Fore brain)

பறவைகளின் முன் மூளை சக்தி வாய்ந்த ஸ்ட்ரீயேட்டம் என்னும் பகுதியையும் மெல்லிய கார்ட்டெக்ஸ் பகுதியையும் கொண்டது. பறவைகளின் ஸ்ட்ரீயேட்டம் பேலியோ ஸ்ட்ரீயேட்டம் (Palaeo striatum) ஆர்க்கி ஸ்ட்ரீயேட்டம் (Archi striatum) நியோ ஸ்ட்ரீயேட்டம் (Neo striatum) ஹைப்பர் ஸ்ட்ரீயேட்டம் (Hyper striatum) என்னும் நான்கு பகுதிகளாகப் பிரிக்கப்பட்டு காணப் படுகின்றது.

முன் மூளையுடன் இடை மூளை, மைய மூளை, முதுகும், தண்டு வடம் முதலிய பகுதிகள் உணர்வினை அப்பகுதிகளிலிருந்து முன் மூளைக்கு எடுத்துவரும் உணர்ச்சி (Afferent) தரம்புகளானும், முன் மூளையிலிருந்து உணர்வுகளை மேல் கூறிய பகுதிகளுக்கு எடுத்துச் செல்லும் (Efferent) இயக்கு தரம்புகளானும் தொடர்பு கொண்டுள்ளன.

கார்ட்டெக்ஸ் பகுதி அகற்றப்படின் ஏற்படும் விளைவுகள்

பறவைகளின் முன் மூளைப் பகுதியினை அகற்றி அதனால் ஏற்படும் விளைவுகளைப் பற்றி பல அறிஞர்கள் ஆராய்ச்சிகள் நடத்தினார்கள். முன் மூளையை அகற்றிவிடின் ஏற்படும் விளைவுகள் குறித்து பலரும் ஆராய்ச்சிகள் நடத்தினாலும் ஸ்ச்ரூடர் (Schwarzer) என்பவர் முன் மூளை அகற்றப்பட்ட புறக்களைப் பற்றிய ஆராய்ச்சியே மிகவும் சிறந்ததாகும்.

முன் மூளை அகற்றப்பட்ட புறக்கள் எவ்வாறு தன்னிச்சையாகவே செயல்படுகின்றன என்பதைக் கண்டறிந்தார். முன் மூளை அகற்றப் பட்ட ஒரு சிறிது நாட்களுக்கு அப்புறக்கள் உறக்க நிலையில் உன்னவையகம்போல் காணப்படும். பின்பு சிறிது சிறிதாக அவைகள் எப்பொழுதும் போன்று கறுகறுப்பாக இயங்க ஆரம்பித்து விடுகின்றன. அப்புறக்கள் வழியில் ஏற்படும் தடைகளையெல்லாம் அகற்றிக்கொண்டு தன்னுடைய பறக்க ஆரம்பித்து விடுகின்றன. முன் மூளை அகற்றப்பட்ட புறக்கள் சம சீர் நிலையினும் பிறழாமல் செயல் படுகின்றன. அப்பறவைகளில் தொடு உணர்ச்சியும் சிறிதும் மாற்ற மில்லாமல் சிறப்பாகவே அமைந்திருக்கும். மிகவும் அநிரர்ச்சி தரும் சந்தைதக் கேட்க தேர்ந்தால் இப்பறவைகள் சற்றுத் தவக்கத் துடனே காணப்படும்.

மற்ற தரம்பு மண்டலப் பகுதிகளின் கருணாச்சிகளின் தூண்டுதல்களினால் சாதாரணமாக அப்பறவைகள் செயல்படுகின்றன. மூன் மூளை அகற்றப்பட்ட பறவைகளில் பரி தாகம் முதலான உணர்ச்சிகளைத் தூண்டும் உறுப்புகளினின்றும் கூட புறத் தூண்டுதல் ஏற்படுகின்றது. அப்பறவைகளை அதிக வெளிச்சமூள் பகுதிகளிலோ, அதிக இருட்டான பகுதிகளிலோ செலுத்தப்படி அவைகள் அந்த இரண்டு விதமான நிலையையும் விருப்பப்படாமல் மிதமான வெளிச்சமூள் பகுதிகளை நோக்கிச் செல்கின்றன. மிதமான வெளிச்சத்தினுள்ள அப்புறக்களை நிகரென்று இருட்டான பகுதிகளுக்குள் செலுத்தினால் எவ்விதமான அசைவுமில்லாமல் நின்றுவிடுகின்றன. மூன் மூளை அகற்றப்பட்ட புறக்கள் வெளிச்சத்தில் அது பறக்கும் தூரம், திசை முதலியவற்றைக் கண்டு கொண்டு அதற்கேற்றாற்போல் பறந்து செல்வது மிகவும் விவக்கத்தக்க செயலாகும். மற்றும் இத்தகைய புறக்கள் கற்களும் தாவியமும் கவத்து வைத்திருந்தாலும் கற்களினின்றும் தாவியத்தைப் பிரித்தெடுத்தாலும், கொத்தி உண்ணும் திறன் அந்தே காணப்படுகின்றன. இதே போன்ற செய்கைகளை இராசானி (Falcon) களில் காணலாம். மூன் மூளை அகற்றப்பட்ட இப்பறவைகள் விரைவாக ஓடும் கண்டெலியை தங்கள் உரிய நகங்கள் களால் பிடித்துக் கொள்கின்றன. கண்டெலியில் அசைவிற்கும் வரை தங்கள் கால்களுக்கு இடையிலேயே வைத்துக் கொண்டிருக்கின்றன. இத்தகைய சோதனைகளிலிருந்து மூன் மூளை அகற்றப்பட்ட பறவைகளுக்கு பார்வை உணர்ச்சி தூண்டும் சக்தியிருக்கின்றது என்பதை அறிவலாம். இவைகள் கண்ணால் பாரிக்கும் திறனையும் அப்படிப் பார்த்தக் காரணத்தினால் அதற்கேற்றாற்போல் செயல்படும் திறனையும் பெற்றுள்ளதாகக் கருதப்படுகின்றது.

மற்றும் மூன் மூளை முழுமையாக அகற்றப்படாமல், கார்ப்பல் ஸ்ட்ரேயெட்டம் சிறு பகுதி மற்ற மூளைப் பகுதியுடன் இணைந்து காணப்படும். புறக்கள், உணவுப் பொருளைப் பார்ப்பதொடங்கலாம், படுபெருக்கும் சமயங்களில் அதைக் கொத்தித் தின்னும் திறனையும் பெற்றுள்ளன. சாதாரணமாக உள்ள அதாவது மூன் மூளைப் பகுதியுடன் உள்ள புறக்களில் உணவுப் பொருட்களைப் பார்த்தவுடன் சில குறிப்பிட்ட உறுப்புகளின் தூண்டுதலால் (உதாரணமாக கண் அசைவு மற்ற அவயவங்களில் அசைவு) தாவியத்தை உண்ணத் தூண்டுகின்றது. இதேபோன்ற அசைவுகளின் தூண்டுதல் மூன் மூளைவற்றப் பறவைகளில் ஏற்படுவதில்லை. அவ்வாறான அசைவுகள் ஏற்படாததற்கு, அப்பறவைகளின் மனநிலைச் செயல்பாடாததே காரணமாகும்.

நாளமில்லாத் கரப்புகளின் நறாங்கோன்களினால் இனப் பெருக்கக் காலங்களில் ஏற்படும் முட்டையிடத் தூண்டல், ஆண்

பெண் பறவைகளின் கலியாட்டம் போன்ற செயல்கள், மூன் மூளை அகற்றப்பட்ட பறவைகளிலும் தடைபெறுவின்றதேயல்லாமல் அவைகள் செயல்படாமல் இருப்பதிலும், இதுபோன்ற செயல்கள் இப்பறவைகளில் ஏற்பட்டாலும் சாதாரண நிலையிலுள்ள பறவைகளில் ஏற்படும் இச்செயல்களுக்கும் மூன் மூளை அகற்றப்பட்ட பறவைகளில் ஏற்படும் இச்செயல்களுக்கும் முக்கிய சில வேறுபாடுகள் உள்ளன. வெளி உலக நிலையின்றியே தன்வியல்பாகவே இப்பறவைகள் செயல்படுவின்றனவேயன்றி மனநிலை சாதாரணமாக யிருக்கும் நிலையில் இப்பறவைகள் இல்லை, மனநிலை சார்ந்த செயல்கள் மூன் மூளையின் தூண்டுதலாலேயே தடைபெறுவின்றது என்பதை மேற்கூறிய விளக்கங்களால் அறியலாம்.

காஃப்ஸ் ஸ்ட்ரேயேட்டம், உணவு உண்ணுதல், தன்னிச்சு அருத்துதல், கூடுகட்டுதல், குஞ்சுகளைப் பேணி வளர்த்தல் போன்ற செயல்களை தூண்டுவின்றன என்பது குறிப்பிடத்தக்கதொன்றாகும். காஃப்டெக்ஸ் பகுதி அகற்றப்பட்டால் மேலே குறிப்பிட்ட செயல்கள் தடைபெறுவதில்லை, காஃப்டெக்ஸ் பகுதி ஹைப்பர் ஸ்ட்ரேயேட்டத்தின் சிறு தொகுதியுடன் அகற்றப்படுகின், சிறிது காலத்திற்குப் பின் உணவு தானியத்தை கொரத்தி எடுத்தி உண்ணும் திறனை இப்பறவைகள் பெறிலும், கூடுகட்டுதல், இனத்துடன் சேர்தல் போன்ற செயல்கள் திரத்தரமாக செயல்படுவதில்லை. எக்ட்டோ, எப்பி, மீசோ ஸ்ட்ரேயேட்டங்கள் மூன் மூளைப் பகுதியில் அகற்றப்படாமல் இருப்பின் அப்பறவைகள் உணவு உட்கொள்ளுதல், நீர் அருத்துதல், இனப்பறவைகளுடன் கலியாட்டம் கொள்ளல் போன்ற செயல்களை செய்வின்றன. எப்பி ஸ்ட்ரேயேட்டத்திலுள்ள பார்வைத் தூண்டுதல் பகுதியின் கட்டுப்பாட்டுத் தன்மையால் மேலே குறிப்பிட்ட செயல்கள் தடைபெறுவின்றன.

ஹைப்பர் ஸ்ட்ரேயேட்டம் இனத்துடன் சேர்தல், கூடுகட்டுதல், குஞ்சுகளைப் பேணி வளர்த்தல் போன்ற சற்று சிக்கலான செயல்களின் திகழ்விற்கு இன்றியமையாததாக அமைந்துள்ளது. எப்பி ஸ்ட்ரேயேட்டம் பார்வை தூண்டுதல் ஏற்படுவதற்குக் காரணமாக உள்வெதலில் எக்ட்டோ, மீசோ ஸ்ட்ரேயேட்டங்கள் தசைகளின் அசைவுகளை கட்டுப்படுத்தும் மையப்பகுதிகளாக அமைந்துள்ளன.

மின்சாரத் தூண்டுதல்

மின்சாரத் தூண்டுதலினால் மூன் மூளையின் விளைவுகளைப் பற்றி ஆராய்ச்சி நடத்தப்படினும் மின்சாரத் தூண்டுதலை அப்பகுதி மட்டிலுமே ஏற்காமல் அதன் அருகிலுள்ள பகுதிகளுக்கும் பரவிவிடுவதால் இது பற்றிய ஆராய்ச்சி அவ்வளவு எளிதாக இருக்கவில்லை.

ரோஜர்ஸ் (Rogers) என்பவர் 1932ஆம் ஆண்டு புறக்கனில் ஒரு சிறிது மின்சாரத் தூண்டுதல் கார்ட்டுக் பகுதிக்கு ஏற்றி விளைவு களைப் பற்றி விளக்கியுள்ளார். ஒரு சிறிது மின்சாரத் தூண்டுதல் புறவின் கார்ட்டுக் பகுதிக்குக் கொடுத்தால், கண் பார்வை இடுக்கம் (Myosis) ஏற்படுவதுடன் தொண்டைப் பகுதியிலுள்ள இறகுகள் தாழ்த்தப்படுகின்றன.

கேலிஷ்ஷெர் (Kalischer) என்னும் அறிஞர் 1905ஆம் ஆண்டு பறவைகளில் செரிபிரல் கார்ட்டெக்ஸ் பகுதியில் மின்சாரத் தூண்டுதலினால் ஏற்படும் விளைவுகள் குறித்து ஆராய்ந்தார். அவர் அத்தகைய பரிசோதனையை மின்களில் சிறப்பாகச் சோதித்தார். அவர் அத்தகைய பரிசோதனையை மின்களில் நடத்தியதற்கு மின்களில் செரிபிரல் கார்ட்டெக்ஸ் பகுதி சிறப்பாக அமைந்துள்ளதே காரணமாகும். இப்பறவைகளில் தாக்கிற்கும் தாடைகளின் அசைவிற்கும், கால்களுக்கும், இறக்கைகளுக்கும் தூண்டுதல்கள் இப்பகுதியிலிருந்தே பெரும்பாலும் எடுத்துச் செல்லப்பட்டது என்பதைக் கண்டு பிடித்துள்ளனர்.

சூழ்நிலைக்குட்பட்ட எதிர்த் தூண்டுதல் (Conditioned reflexes)

பறவைகளைச் சுற்றுச் சூழ்நிலைக்கேற்ப, பவதிமான பயிற்சி கொடுத்தால் அவைகள் மாறுபட்டுக் காணப்படும். அவ்வாறு பயிற்சி கொடுக்கும்பொழுது பறவைகளின் செயல்கள் மூன் மூன்றின் உதவி யாலேயே பெரிதும் நடக்கின்றன. ஒரு பறவையின் நடுநினைவான ஒரு தூண்டுதலால் எவ்வித மாற்றமும் இல்லாமல் இருக்கும் பொழுது, மற்றுமொரு தொடர்ச்சியான தூண்டுதலைக் கொடுத்தால் ஏற்படும் மாற்றத்திற்கே சூழ்நிலைக்குட்பட்ட எதிர்த் தூண்டுதல் (Conditioned reflexes) என்று பெயர்.

ஒரு புறவின் முகத்தின் மீது காற்றை ஊதிக் கொண்டேயிருத் தால் ஒருவித மாற்றமும் இருக்காது. அதற்கு நடுநிலை தூண்டுதல் என்று பெயர். அதன்மேல் சத்தத்தை உண்டாக்கும் ஒரு தூண்டுதலைச் செலுத்தினால் இரண்டு தூண்டுதலும் சேர்ந்து புறவிய் தலையின் அசைவைக் கொடுக்கின்றன. இவ்வாறு இரண்டு தூண்டுதல்களையும் கொடுத்துக் கொண்டே யிருந்தால் புறவின் தலை அசைவு இருந்து கொண்டே யிருக்கும். சிறிது நேரத்திற்குப்பின் ஒகித் தூண்டுதல் மட்டும் செலுத்தினாலும் புறவின் தலை அசையும். பிராணி களின் வாழ்க்கையில் இவ்வாறு சூழ்நிலைக்குட்பட்ட எதிர்த் தூண்டுதல்கள் அவைகள் வசிக்கும் சுற்றுச் சூழ்நிலைக்கேற்ப கொண்டுள்ள

தகவமைப்புகளால் ஏற்படுகின்றன. இவ்வாறு உண்டாகும் மாறுதல்கள் அவைகள் வசிக்கும் இடத்தின் நிலைமைப் பொருத்தே அமைவும். சூழ்நிலைக்குட்பட்ட எதிர் தூண்டல்கள் பறவைகளின் ஊழ்க்கையில் உடல் பிறந்த அல்லது இயற்கையாக உன்னார்ந்த (Inborn) செயல்களாக. இவைகள் சூழ்நிலைக்கு ஏற்பட்ட மாறுதல்களே யாகும்.

முகர்ச்சி குமிழ்கள் (Olfactory lobes)

பறவைகளுக்கு ஓடு, சோடி, மிகச் சிறிய முகர்ச்சிக் குமிழ்கள் உள்ளன. முகர்ச்சிக் குமிழ்கள் மிகவும் சிறியதாக அமைந்துள்ள காரணத்தினாலேயே அவைகளுக்கு முகர்ச்சி உணர்வு மிகவும் ஒடுக்கப் பட்டுள்ளது.

மூளை நரம்புகள் (Cranial nerves)

புறமிக் 12 சோடி மூளை நரம்புகள் உள்ளன.

முகர்ச்சி நரம்புகள் (Olfactory) : இந்த நரம்புகள் முகர்ச்சிக் குமிழ்களிலிருந்து தோன்றி நேசம் பகுதியை அடைகின்றன.

பார்வை நரம்புகள் (Optic) : இவைகள் மைய மூளையின் வயிற்றுப் புறப் பகுதியில் குறுக்கமைப்புடன் தோன்றி கண் குழிவுகளுக்குச் செல்கின்றன.

கண் இயக்கி நரம்புகள் (Oculomotor) : இவைகள் பார்வை நரம்புகளுக்கருகில் தோன்றி, பார்வை குழிவு வரை செல்கின்றன.

ட்ரோக்கிளியர் அல்லது கப்பி நரம்புகள் (Trochlear or pathetic nerve) : இவைகள் பார்வை இதழ்களுக்கிடையிலும் சிறு மூளைப் பகுதியிலும் தோன்றி கண் குழிவுகள் வரை செல்கின்றன.

ட்ரைஜெமினல் அல்லது மூப்பிரிவு நரம்புகள் (Trigeminal nerves) : பார்வை இதழ்களுக்குக் கீழே மூகுளத்திலிருந்து இந்த நரம்புகள் தோன்றி முன்புறமாகச் செல்லும்பொழுது கேசெரியன் நரம்புச் செல் திரைக் மாறி பின்பு மூன்று விலைகளைக் கொடுக்கின்றன.

அபடூசன் அல்லது அப்டூசன்ஸ் நரம்புகள் (Abducens) : மூகுளத் தின் வயிற்றுப்புற பகுதியில் தோன்றும் இவைகள் மிகவும் சிறிய நரம்புகளாகும். இவைகள் மண்டைப்போட்டினுள் புகுந்து கண் குழிவுகள் வரைச் செல்கின்றன.

முக நரம்புகள் (Facial) : ஐத்தாவது மூளை நரம்புகளுக்கருகில் முதுகத்தின் பக்கவாட்டிலிருந்து இளம்பி பின்புறமாகச் சென்று இரண்டு கிளைகளைக் கொடுக்கின்றன.

செவி நரம்புகள் (Auditory) : இவைகள் ஏழாவது மூளை நரம்பு களைவிடப் பெரியது. ஏழாவது மூளை நரம்புகளுக்கருகிலிருந்து இவைகள் தோன்றி செவி வரை செல்கின்றன.

நாக்குத் தொண்டை நரம்புகள் (Glossa pharygeal) : இவைகள் செவி நரம்புகளுக்கருகில் தோன்றி நாக்கு மண்டையோட்டின் அடிப் பகுதியை வரை செல்கின்றன.

சஞ்சலி நரம்பு (Vagus) : இவை ஒன்பதாவது மூளை நரம்புகளுக் கருகில் தோன்றி உடல் குழி வரை நீண்டு பல கிளைகளாகப் பிரி கின்றன. அக்கிளைகள் கவாசக் குழாய், நுரையீரல், இருதயம், இரைப்பை, அரணைப்பை முதலான பகுதிகளை அடைகின்றன.

தண்டுவிட இணைப்பு நரம்புகள் (Spinal accessory) : இது தண்டு விடத்திற்கருகில் தோன்றி பெருந்துளை வழியாக மண்டையோட்டுக் குழிகளினுள் சென்று பல கிளைகளாகப் பிரிந்து கழுத்தின் தசைகள் வரை செல்கின்றன.

ஹைப்போக்ளாசல் (Hypoglossal) : இது முதுகத்தின் முதலாம் புறப் பகுதியிலிருந்து தோன்றி, கழுத்துத் தசைகள் வரைச் செல் கின்றன.

தண்டுவிட நரம்புகள் (Spinal nerves)

இவைகள் தண்டுவிடத்திலிருந்து சோடிகளாகச் இளம்பி தோல், உடம்பு, கழுத்து, கால்கள் முதலிய பகுதிகளின் தசைகளுக்குச் செல் கின்றன.

ஒவ்வொரு சோடி நரம்புகளும் இரு மூன்றெழும்புகளுக்கிடையி லுள்ள மூன்றெழும்பு இடைத்துவாரங்கள் வழியாக வெளியேறி ஒவ்வொன்றும் இரண்டு கிளைகளாகப் பிரிகின்றன. ஒரு கிளை முதுகுப்புறமாகவும் மற்றொன்று வயிற்றுப் புறமாகவும் அமைந் துள்ளன. முதுகுப்புறமாக அமைந்துள்ள கிளைவுடன் ஒரு நரம்புச் செம்பிரன் உள்ளது. இய்விரண்டு கிளைகளும் மூன்றெழும்பு இடைத் துளைக்கப்பாற் இணைந்து செல்கின்றன. தண்டுவிட நரம்புகள் நான்கு பகுதிகளை உடையது. அவைகள் முறையே மேல்கர வளைப் பிண்ணல் (Brachial Plexus) லம்பாள் பகுதி வளைப் பிண்ணல் (Lumbar Plexus) சேகரல் வளைப் பிண்ணல் (Sacral Plexus) ப்லூடென்டஸ் வளை

பின்னல் (Pudendus Plexus) என்பனவாகும். மேற்கூற வியைப் பின்னலின் தண்டு வட நரம்புகள் இறக்கைகளுக்கும் மார்புப் பகுதிக்கும் செல்கின்றன. மம்பார் பகுதி வியைப் பின்னல் தொடை தசைகளுக்குச் செல்கின்றன. சேக்ரம் பகுதி வியைப் பின்னல் கால்களுக்குச் செல்கின்றன. கடைசிப் பகுதியான பூட்டென்டல் வியைப் பின்னல் ஏழு தண்டு வட நரம்புகளின் இணைப்பினால் ஆனது. இது வால் பகுதிக்கு குறுக்காகச் செல்கின்றது.

தானியங்கும் நரம்பு மண்டலம் (Autonomic nervous System)

மூளை தண்டு வடம் அடங்கிய மைய நரம்பு மண்டலம் இயக்கு வரித் தசைகளைக் கட்டுப்படுத்தும் தன்மைவுடையது. அங்ஙனம் இயக்கு தசைகளைக் கட்டுப்படுத்தும் தன்மையால் உடலின் அசைவு வெளிப்புற அழுத்தம், புவிவீர்ப்பு சக்தி முதலியவற்றிற்கு ஈடு கொடுக்கும் வகையில் அமையப் பெற்ற உடலின் நிமிர்ந்த நோக்கு முதலியவற்றை சீராக்கும் வேலையினைச் செல்கின்றன. இயங்கு தசை இயக்கங்களை கட்டுப்படுத்தும் தானியங்கு நரம்பு மண்டலம் உடல் உள்ஊறுப்புகளின் இயக்கத் தன்மைகளுக்குக் காரணமாகவுள்ளது. குடல் பகுதி, இரத்த நாளங்கள், கரப்பிகள் மற்றும் இது போன்ற பொது உறுப்புகள் இயங்கு தசைகளால் ஆனபடியால் தானியங்கு நரம்பு மண்டலத்தின் உதவியின்றியே இயங்குகின்றன. இந்த இருவிதமான மண்டலங்களும் ஒன்றை ஒன்று தழுவினே செயல்படுகின்றன. தானியங்கு நரம்பு மண்டலத்தை கட்டுப்படுத்தும் மையப்பகுதி ஹைப்போதலாமஸ்ஸில் உள்ளது.

இயங்குதசை நிபூரான்களும் இவற்றால் கட்டுப்படுத்தப்படும் உடனானஊறுப்புகளும் தன்னிச்சையாக வியங்கும் ஆற்றலைப் பெற்றுள்ளன. இங்ஙனாக தன்னிச்சையாக வியங்கும் ஆற்றல் பெற்றிருப்பதாலேயே அவற்றிற்கு தானியங்கு நரம்பு மண்டலம் என்று பெயர். இயங்குதசைகளான உறுப்புகளுக்கும், இருதயம் போன்ற தன்னிச்சை நரம்புகள் கொண்ட உறுப்புகளுக்கும் தன்னிச்சையாகவே ஒழுங்குற செயல்படும் திறனுள்ளது. எலும்புப் பகுதி சூடூன் இணைத்துள்ள இயக்கு தசைகளுடன் இணைக்கப்பட்ட கட்டளை நரம்புகள் (Motor nervous)-வெட்டப்படின, அழிந்துவிடுகின்றன. ஆனால் குடல், இருதயம், அண்டநாளம் போன்ற பகுதிகளிலுள்ள இயங்கு தசைகளுடன் இணைந்த கட்டளை நரம்புகள் துண்டிக்கப்படலும் அவை நம் செயல்படுகிற அநிக நேரம் இழப்பதில்லை. இங்ஙனம் அநிக நேரம் செயல்படுகின்ற காரணத்தினாலேயே இருதயம் கருங்கி விரியதையும், குடலின் அசைவைவும்

கட்டளை நரம்பு துண்டிக்கப்பட்ட இந்த உறுப்புகளில் காணலாம். பறவைகளில் மற்ற மூதுகெழும்புள்ள பிராணிகளைப் போன்றே இந்த தானியங்கு நரம்பு மண்டலம் பரிவு நரம்பு மண்டலம் (Sympathetic nervous system) பக்கப் பிரிவு நரம்பு மண்டலம் (Para Sympathetic nervous system) என்ற இரண்டு பிரிவுகளை கொண்டது. இந்த இரண்டு பிரிவுகளும் அமைப்பு (Anatomy) செயல்படுதிறன் (Physiology) மருத்துப் பொருளியல் (Pharmacology) முதலிய வற்றில் வேறுபட்டே காணப்படுகின்றன.

பரிவு நரம்பு மண்டலம், தண்டுவடத்தின் சாம்பல் பொருளின் பக்கக் கொம்பு பகுதியிலிருந்து தோன்றுகின்றது. இந்தச் செல்களின் நரம்பு தார்களின் (Axons) மையப் பகுதி, மார்புப் பகுதி, கம்பாற்பு பகுதி ஆகிய தண்டுவடத்தின் பகுதிகளை விட்டு மூள் அல்லது வயிற்றுப்புற நோக்கிலும் வெளியேறி நரம்புச் செல் நிரல்களான ஒரு சங்கிலித் தொடராக மாறி பறவையின் முன்னெழும்புத் தண்டிற்கு இருபுறமும் இரண்டு சங்கிலித் தொடர்களாக அமைந்துள்ளது. நரம்புச் செல்நிரல்கள் ஒவ்வொன்றும் மற்றவற்றுடன் இணைப்புத் தைச தார்களால் இணைக்கப்பட்டுள்ளன. இந்த இரண்டுச் சங்கிலித் தொடர் பரிவு நரம்பு மண்டலப் பகுதிகளும் பொதுப்புறமெங்கேயும் இணைந்து, சோடியற்ற நரம்புச் செல் நிரலாக மாறியிருப்பதாகக் கருதப்படுகின்றது. ஆனால் தற்போது நடத்திவரும் ஆராய்ச்சிகளின்படி, பொதுப் புற அருகில் இரண்டு பரிவு நரம்புச் செல்களின் தொடர்களும் இணைத்தாலும் நரம்புச் செல் நிரல் சோடியாகவே உள்ளதாகக் கருதப்படுகின்றது.

பரிவு நரம்பு மண்டல சங்கிலித் தொடரின் தலைப் பகுதியில் ஒரு பெரிய மேல் செர்விக்ஸ் நரம்புச் செல் நிரல் உள்ளது. இந்த செர்விக்ஸ் நரம்புச் செல் நிரலிலிருந்து நரம்பு இழை தார்கள் தலைப்பகுதிக்குச் செல்கின்றன. தலைப் பகுதிகளுக்குச் செல்லும் நரம்பு இழை தார்கள் இரண்டு பாதைகளாகப் பிரிந்து செல்கின்றன. செர்விக்ஸ் முன்னெழும்புகளின் குறுக்காயமைந்த நீட்டிகளின் ஆழப்பகுதியில் ஒரு பாதை செல்கின்றது. மற்றொன்று மிகவும் மேலெழுந்தவாறியாக சஞ்சாரி நரம்பு (பத்தாவது மூளை நரம்பு) க்குடன் இணைந்து காணப்படுகின்றது. பறவைகளில் மார்புப் பகுதி பரிவு நரம்பு மண்டல சங்கிலித் தொடரைக் காட்டிலும் வயிற்றுப் பகுதி (Abdominal) பரிவு நரம்பு மண்டலச் சங்கிலித் தொடரே மிகவும் விரிப்பு வாய்ந்ததாக அமைந்துள்ளது. பறவைகளில் இவ்வாறு வயிற்றுப் பகுதி பரிவு நரம்பு மண்டல சங்கிலித் தொடர் விரிப்பாக அமைந்துள்ளதே ஒரு குறிப்பிட்டுச் சொல்லக்கூடிய இன்றியமைவாத அமைப்பாகும்.

பறவைகளின் பரிவு நரம்பு மண்டலம் பாதுகாட்டிகளின் பரிவு நரம்பு மண்டலத்தின் ஒத்தே அமைந்துள்ளது. பறவைகளின் இறக்கைகளில் இத்தகைய நரம்பு மண்டலம் இறகுகளை நிமிர்த்துவதற்கோ தாழ்த்துவதற்கோ ஏற்றவாறு அமைந்திருப்பதே பாதுகாட்டிகளின் நரம்பு மண்டலங்களில் காணாத பறவைகளின் பரிவு நரம்பு மண்டலத்தில் நிறப்பாக அமைந்துள்ள தொன்றாகும். பறவைகளில் இறகுகளை நிமிர்த்துவதற்கும் தாழ்த்துவதற்கும் ஏற்றவாறு, தசைகளின் அமைப்பு பரிவு நரம்பு மண்டலத்தின் தசை நாள்களில் அமைந்துள்ளது. இறகுகளை தாழ்த்துவதற்கு பயன்படும் தசைகள், இறகுகளை நிமிர்த்துவதற்குப் பயன்படும் தசைகளிடமிட அதிகமாக காணப்படுகின்றது.

கழுத்துப் பகுதி அங்கத்து செர்னிக்கல் பகுதி பரிவு நரம்பு மண்டல நரம்புகளின் செயல்படுதன்மையால் தூண்டுதலால், கண்ணிமைகள் நிறிது இழுப்படுகின்றது. வாயின் கோணைப் படலம் வெளிநிற்போகின்றது (Palore). கழுத்துப்பகுதி தொடர் இரத்த நாளங்கள் கருக்குகின்றன. கழுத்துப் பகுதியிலுள்ள இறகுகள் தாழ்த்தப்படுகின்றன. இவ்வாறு பல மாறுதல்கள் கழுத்துப் பகுதி பரிவு நரம்பு மண்டலச் சக்திவித் தொடரின் தூண்டுதலால் ஏற்படுகின்றது.

தாலியங்கு நரம்பு மண்டலத்தின் அடுத்த பிரிவான பக்கப் பரிவு நரம்பு மண்டலம், மைய மூளை, மூளையும், தண்டுவடத்தின் சேக்ரல் பகுதி முதலிய பகுதிகளிலுள்ள நியூரான்களின் மையப்பகுதிகளின் இணைப்பினால் காணப்படுகின்றது.

பக்கப்பரிவு நரம்பு மண்டலத்தின் தலைப் பகுதிகள் இயக்கி நரம்புகள் (Oculomotor) மூக நரம்புகள் (Focial) நாக்குத் தொண்டை நரம்புகள் (Glossopharyngeal) சஞ்சாரி நரம்புகள் (Vagus) ஆகிய மூளை நரம்புகளுடன் இணைந்து காணப்படுகின்றது. சஞ்சாரி நரம்புகளுடன் இணைந்திருத்தலே பக்கப் பரிவு நரம்பு மண்டலத்தின் இன்றியமையாத பகுதியாகும். இவற்றிலிருந்து மாசிப்புப் பகுதி வரிலுந்துப் பகுதி உறுப்புகளுக்கு நரம்புகள் செல்கின்றன. மற்றும் பரிவு நரம்பு மண்டலத்துடன், பக்கப் பரிவு நரம்பு மண்டலம் இணைந்து சென்றே உடலின் உள்ளுறுப்புகளுக்கு நரம்புகளைக் கொடுக்கின்றன.

உடல் உள்ளுறுப்புகள் பரிவு நரம்பு மண்டல நரம்புகளாலும், பக்கப் பரிவு நரம்பு மண்டல நரம்புகளாலும் செயல்படுகின்றது. இந்த உள்ளுறுப்புகளில் இந்த இரண்டு பகுதிகளும் செயல்படும் எதிர் எதிராக செயல்படுகின்றன.

9. பறவைகளின் உணர்ச்சி உறுப்புகள்

தோல் (Skin): மத்திய நரம்பு மண்டலம் பலவிதமான உணர்வுச் செய்களை உற்பத்தி செய்கின்றது. அவற்றில் சில தோலிலும், உள் வாயிலும் உணர்வுச் செய்களாக மாறி உணர்ச்சிகளை அறிய பயன் படுகின்றன. இவ்வாறு தோலில் அமைந்துள்ள உணர்வுச் செய்களை வெளி உணர்வுச் செய்கள் (Extero receptors) என்று அழைப்பர். உறுப்புகளின் உள்னே அமைப்பெற்ற உணர்வுச் செய்களுக்கு உள் உணர்வுச் செய்கள் (Intero receptor) என்று பெயர். உள் உணர்வுச் செய்களிலும் இரண்டு வகையுண்டு. தசைகள், தசை நாண்கள், மிசைட்டோசிகள் முதலியவற்றில் அமைந்துள்ள உள் உணர்வுச் செய்களுக்குப் ப்ரோப்ரியோ ரிசெப்டார்கள் (Proprio receptors) என்றும், உள்னறுப்புகளான குடம் பகுதிகளிலும் அதன் சுரப்பிக னிடத்து அமைந்துள்ள உள் உணர்வுச் செய்களுக்கு விசெரோ ரிசெப் டார்கள் (Viscero receptors) என்றும் பெயர்.

பரிணாமத்தில் பறவைகள் மிகவும் உயர்ந்த இடத்தைப் பெற் றுள்ள காரணத்தால் இவைகளில் மேற்கூறிய உணர்வுச் செய்கள் மிகவும் சிறப்பாக அமைந்துள்ளது. மற்ற முதுகெலும்புள்ள பிராணி களிலுள்ளது போன்று பறவைகளின் உள்உறுப்புகளில் கட்டற்ற நூழ் நூழ்வுகள் (Free nerve endings) உள்ளன. அவைகள் முடிவில் துண்விய சூழிழ்களாகவோ (Knob) அல்லது டென்ட்ரைட்டிக் அமைப்புகளுடனோ அல்லது கொக்கி வளைவுகளாகவோ அல்லது சிக்க ளான உறுப்புகளாகவோ காணப்படும். இதுபோன்ற அநேக நரம்புச் செய்கள் ஒன்று சேர்ந்து ஒரு பொது வலைப்பின்னல் பகுதி (Network) யாக மாறுகின்றது. இதுபோன்ற நரம்புச் செய் வலைப்பின்னல் பகுதி கள் தோலில் அதிகமாக உள்ளன. இந்த நரம்புச் செய் வலைப்பின்னல் பகுதிகளின் செயல்கள் அவ்வளவாகத் தெரிவாவிடினும், அவைகளை யும் நாடி நரம்புகளில் வெளி நேரக்கிச் செல்லும் நரம்புகளையும் (Efferent), அவற்றில் உள் நோக்கிச் செல்லும் நரம்புகளையும் (Afferent) பிரித்து காணுதல் கடினமாகும்.


உள்வாயில் குறிப்பாக நாக்கிலும் தோலிலும் தொடு உணர்ச்சி கார்ப்பசுக்கள் அதிகமாக உள்ளன.

அவைகள் ஒரு பெரு நரம்பு நுண்ணிழையின் கிண்ணம் போன்ற வலைப்பின்னல் பகுதி உணர்ச்சி செல்லுடன் நெருக்கமாக இணைவதால் ஏற்படுகின்றன. மற்றும் இந்த கார்ப்பசுக்களைச் சுற்றித் தானியங்கு நரம்பு மண்டலத்துடன் (Auto nomic nervous System) இணைந்த ஒரு நுண்ணிய வலைப்பின்னல் பகுதி சூழ்ந்துள்ளது. தொடு உணர்ச்சி செங்களைச் சுற்றி இவ்வாறு பல நுண்ணிய வலைப் பின்னல் பகுதிகள் உள்ளன.

பறவைகளில் காணப்படும் மற்றும் இரண்டு உணர்வு உறுப்புகள், கிராண்ட்ரீயின் கார்ப்பசுக்களும், ஹெர்ப்ஸ்ட் கார்ப்பசுக்களும் (Grandry and Herbst Corpuscles) ஆகும்.

கிராண்ட்ரீயின் கார்ப்பசுக்கள்

இந்த உணர்வுறுப்புகளை பல பறவை இனங்களில் நாக்கு அண்ணா எழும்பு முதலிய பகுதிகளிலும், வாத்துகளின் அகடுகளை மூடியுள்ள



படம் 37. அ. ஆ. காத்தில் அமைந்துள்ள தோலின் கிராண்ட்ரீயின் கார்ப்பசுக்கள்


1. உறை செல்கள், 2. நரம்பு இழை நார்களின் மைய வலைப் பின்னல், 3. உருவி செல்கள், 4. நரம்பு இழை நார்களின் பக்க வலைப் பின்னல், 5. நரம்பு இழை நார்கள்.

தோல் பகுதிகளிலும் காணலாம். இந்த கார்ப்பசுக்கள் உணர்வுறுப்புகளின் நரம்பு இழை நரண்களின் கடைசிப் பகுதிகளில் தட்டையான வட்ட வடிவுடைய இரண்டு பெரிய இரண்டாம்படி உணர்வுச் செல்.

களாவானது. இச்செய்களைச் சுற்றிலும் பெரிய நியூக்லியஸ்களைக் கொண்ட பல துணைச் செய்கைகள் (Satellite cells) உள்ளன. இவைகள் இணைப்பு இழைத்தசைகளால் மூடப்பெற்றுள்ளன. இவற்றின் மூலப் பகுதியின் தசை நாரிகள், தோலின் பரப்புடன் இணையாகச் செய்கின்றன.

ஹெர்பிஸ்டிஸ் கார்ப்பசுக்கள்

உள்ளான் பறவைகளின் அவயின் முதுகுப்புறத்தோல் பகுதியிலும், மரங்கொத்திகளின் தாக்கிலும் மேலே குறிப்பிட்ட ஹெர்ப்



படம் 38. வாதத்தில் அவயிலுள்ள ஹெர்ப்ஸ்டிஸ் கார்ப்பசுக்கள் (Herbst Corpuscles)


1. மைய நரம்பு இழை நாரிகளின் பகுதி, 2. ஆக்ஸியல் (Axial cells) செய்கை, 3. உள் உறைச் செய்கை, 4. நரம்பு இழை நாரிகளின் உறை செய்கை, 5. வெளி மெய்க்வார் மண்டலம், 6. இரத்தத் தந்துகிகள், 7. உள் மெய்க்வார் மண்டலம்.

பிஸ்டிஸ் கார்ப்பசுக்கள் உள்ளன. இந்த கார்ப்பசுக்களில் வெமெல் வார் பெட்டசம் இணைப்பு இழைத்தசைகளாவானது. இதில் இரண்டு வரிசை நியூக்லியஸ்கள் உள்ளன. நியூக்லியஸிற்கு வெளிப்பேயுள்ள புரோட்டோபிளாசுத்தில் வரிசை வரிசையான செமெல்வார் அமைப்புடன் உள்ளான் (Snipe) பறவைகளிலுள்ளது போன்று அமைந்திருக்கும், அல்லது வாதங்களிலுள்ளது போன்று ஓரே சீராக அமைந்திருக்கும். முற்காலத்தில் இவைகள் களை அறியும் மொட்டுகளாகக்

கருதப்பட்டது. ஆனால் இக்கால ஆராய்ச்சியின்படி அவைகள் இரத்த அழுத்தத்திற்கும் அதன் மாற்றங்களுக்கும் தகுந்தாற்போல் உணர்ச்சிகளை அறிவும் செல்களாகப் பயன்படுகின்றன. தற்காலத்தில் இவை அதிர்வு உணர்ச்சி உறுப்புகளாகக் (Vibration receptor) கருதப்படுகின்றன. இவைகள் பறவைகளிலேதான் நிறப்பாக அமைந்துள்ளன. செவிப்புலனிற்கும், இந்த அதிர்வு புலனிற்கும் வேறுபாடுகள் உண்டு. இவை பறவைகளில் டிபீலா, கீபீபுலா எழும்புகளுக்கிடையில் அதிர்வு புறத்துண்டுதலிற்கு ஒரு உணர்வு மண்டலமாகவே அமைந்துள்ளன.

கவை-உணர்வுறுப்புகள்

கடத்த நூற்றுண்டின் மத்தியில் தான் உருவி அறிதற்கு நிறப்பான உணர்வுச் செல்கள் பறவைகளில் இருப்பதைக் கண்டு பிடித்துள்ளார்கள். பல பறவை இனங்களின் வாங்குமுறியிலும், நாக்கின்



படம் 39. பறவைகளின்-உருவி அல்லது கவை மொட்டுகள்

அ. உணர்ச்சி செல்கள்

ஆ. கீ. இ. உள்-வெளி ஜெம்மல் நரம்புகள்

1. வெளி ஜெம்மல் நரம்பு இறை நாக்கள், 2. உள் ஜெம்மல் நரம்பு இறை நாக்கள், 3. வெளி செல் அடுக்கு, 4. கீழ்ப்படி அல்லது தோல், 5. உள் ஜெம்மல் நரம்பு வளைப் பின்னல், 6. கீழ் ஜெம்மல் நரம்பு வளைப் பின்னல், 7. உறை செல்கள், 8. சப்-டெய்லிச் செல்கள், 9. உணர்ச்சி செல்கள்.

துணிப்பகுதியிலும், பேலட்டைன் பகுதிகளிலும் உணர்வுறுப்புகள் அமைந்துகொண்டிருக்கின்றன.

இவை அமைப்பில் மற்ற முதுகெலும்பிகளில் உள்ளதுபோன்றே இருக்கும். சில சமயங்களில் இச் செக்களைச் சுற்றிலும் சிறு பை (Follicle) போன்ற பகுதிகள் உள்ளன. சிறு பறவைகளில் உருசி உணர்வுறுப்புகளைச் சுற்றிலும் முழுமையான நீள் உருளை வடிவுடைய மேல்கறைவுள்ளது. அவ்வது அந்த சிறு பைப் பகுதி உணர்வுறுப்புகளின் வெளிப்பகுதியை உறையிடாமல் உள் பகுதியை மட்டும் உறையால் மூடிவிடுக்கும். மிகளின் உணர்வுறுப்புகளில் இந்த உறையே இடையாது. ஒவ்வொரு சிறப்பினப் பறவைகளிலும் மேற்கூறிய ஏதாவது ஒருவகை உணர்வுறுப்புள்ளே இருக்கும். ஒரு மொட்டியுக் சுமார் 25 முதல் 50 செக்கள் இருக்கும்.

முகர்தல்

பறவைகளின் முகர்தல் உணர்வுறுப்புகள் ஊர்வனப் பிராணிகளில் உள்ளது போன்றே அமைந்துள்ளது. பறவைகளில் இரண்டு தேசப் பகுதிகள் உள்ளன. இவை இரண்டையும் ஒரு தேசப் பகுதித் திரை பிரிக்கின்றது. இரண்டு வெளி நாகித் துவாரங்கள் இரண்டு தேசப் பகுதிகளுடன் இணந்து இரு உள்நாகித் துவாரங்களாக உள்வாயில் நிறங்கின்றன. இந்த ஒவ்வொரு தேசப் பகுதிகளையும் பின்னும் இடைவிடாய்விடையான மூன்று பகுதிகளாகப் பிரிக்கலாம். அவ்வாறு தோன்றிய ஒவ்வொரு பகுதியிலும் அவற்றின் பக்க கவரி விடுத்து தோன்றிய ட்ரீனிக் அல்லது காஸ்க்கா (Turbinel or Concha) என்ற ஒரு உறுப்பினைக் காணலாம். ஒரு சில பறவை இனங்களில் தேசப் பகுதியின் ரால்ட்ரல் பகுதி பின்புறமாக சிறிது வளைந்து காணப்படும். அவ்வாறு காணப்படுவதால் வெளி நாகித்துளைகள் கண் குழியிற்றெருவி அவகின் பின் பகுதியில் காணப்படும் தேசப் பகுதி களின் பக்கக் கவரிகளில் ப்ரேகாஸ்க்கா (Praeconcha) என்ற குறுத் தெழுப்பால் இணந்த பகுதி காணப்படுகின்றது. இதன் கடைசிப் பகுதி குறுக்காவமைந்த (Thrush hold) பகுதியுடன் இணந்துள்ளது. ப்ரேகாஸ்க்கா, கேவிப்பார்ம் குறும்பப் பறவைகளிலும், சிபாக்கள் களிலும் மிகவும் பெரியதாகக் காணப்படுகின்றது. பெய்குவின், ஸ்ட்ரோக், கிரெப்ஸ் முதலிய பறவைகளில் மிகவும் சிறியதாகக் காணப்படுகின்றன. இது கேசெனரீப் பறவைகளில் (Cassowary) முழுமையாக மறைந்து விட்டது.

தேசக் கரப்புகளில் சில இப்பகுதியின் கடை கோடியில் அமைந்துள்ளன. மேலே குறிப்பிட்ட மூன்று வரிசைப் பகுதிகளில், மத்திய பகுதியே தலைமையான அறையாகும். இப்பகுதி முகப்புப் பகுதிக்கும் (Thresh hold) கொவகுப் பகுதிக்கும் இடையிலுள்ளது. இது உள்வாயுடன் தொடர்பு கொண்டு அமைந்துள்ளது. இதில்தான் காஸ்க்கா

(Concha)யின் சுற்றப்புப் பகுதி அமைந்துள்ளன. இதையே பாணூட்டிகளில் மேக்ரில்லோ டர்சினல் பகுதி என்று அழைப்பர். காண்க்கா கருங்கணியுடையது. காண்க்காவின் அடிப்பகுதியில்தான் நேசோலேக் சிமல் வாளம் திறக்கின்றது. மேக்ரிமல் கரப்பிகள் காண்க்காப் பகுதி களின் ஊடே பின்பகுதியில் அமைந்துள்ளன.

இதற்குப் பின்னால் மேற்புறமாக மூன்றாவது மூகர்வு அறை (Olfactory chamber) உள்ளது. இப்பகுதியில்தான் காண்க்காவின் சுற்றப்பா ட்ரூபர்டிக் உள்ளது. இப்பகுதியைத் தான் உண்மையான மூகர்வுப் படைத்திக் மூடியுள்ளது. இவ்வாறு வெளி நுகித்துவாரங்கள் பறவைகளில் பெரும்பாலும் மேல் அளவின் அடிப்பகுதியிலேயே காணப்படும். சில பறவைகளில் மட்டும் இத்துவாரங்கள் துணைக் உதவும் அளவில் மேல் பகுதியில் அமைந்துள்ளது. பொதுவாக நுகித் துவாரங்கள் கெட்டியான மூடியினால் மூடப்பட்டுள்ளன.

நேசல் பகுதி பலவாறான செயல்களைச் செய்கின்றன. முதலில் இப்பகுதிகளின் வழியாகவே காற்றானது தொண்டை காற்றுக்குழாய் முதலியவற்றின் வழியாக ஊரையிற் காற்றுப்பைகள் முதலியவற்றை அடைகின்றன. மூகர்தல் உணர்ச்சி தூண்டுதலும் இப்பகுதிகளாலேயே கிரகிக்கப்படுகின்றது. டர்சினல் உறுப்புகளின் உதவியால் நேசல் பகுதிகளில் ஊழையும் காற்று சுத்தப்படுத்தப்படுகின்றது.

சில பறவைகளில் மூகர்வு உணர்ச்சிகள் நன்றாக செயல்படுகின்றன. வாத்துகளிலும் பாடும் பறவைகளிலும் மூகர்வு உணர்ச்சிகள் இருப்பதாகவே சோதனைகளின் மூலம் கண்டு பிடிக்கப்பட்டுள்ளன.


பார்வை (Vision)

பறவைகளின் கண் விழி (Eye ball) பாணூட்டிகளின் கண் விழியைப் போல் அவ்வளவு வட்ட வடிவமானதல்ல. பாணூட்டிகளின் கண்விழிகள் வட்ட வடிவமாக இருத்தலால், அவைகளின் சுற்றநிலை பெரிதும் பயனுள்ளதாக அமைந்துள்ளன. பறவைகளின் கண் விழிகள் வட்ட வடிவமாக இல்லாவிடினும், ரெட்டினல் பகுதி வட்ட வடிவ வரம்புடனேயே பின்னால் அமைந்துள்ளது. கார்னியா (Cornea)யிற்கு சுற்றிலும் உள்ள குழித்த பகுதியினால் அப்பரப்பு தசைகள் பொருத்த தற்கு பயனுள்ளதாகவிகுப்பதாகக் கண் பார்வை ஏற்படுத்தும் சக்தி அதிகமாகின்றது. பறவைகளில் தலையின் அளவுடன் கண்விழிகளின் அளவை ஒப்பிட்டுநோக்குங்கால் கண்விழிகளின் அளவு மிகவும் பெரியதாகவுள்ளது. அதனால் கண்களின் சுற்றநிலை சற்று குறைக்கப்படுவதாக பார்வை சக்தி வாய்ந்ததாக விருக்குமென்று கருதப்படுகின்றது.

-ஆத்தைகளின் கண் விழிகள் கண் குழியிற்குள் அசைக்க முடியாதபடி அமைந்திருப்பதிலும் மற்ற பறவைகள் மூன்றுமாக குவித்து நோக்கும்பார்வைக்கு கண்விழிகளை அசைக்க முடியும்.

ரெட்டினா

பகல் நேரங்களில் உணவுப் பொருளை தேடிமுன்னும் (Dvurnal) பறவைகளில் ரெட்டினாவின் கூம்புப்பகுதிகள் (Cone) மிகவும் நன்றாக வளர்ச்சியுற்று காணப்படுகின்றன. ரூச்சிப் பகுதிகள் (Rods) சில பறவைகளில் மூலமையாக மறைத்து விடுகின்றன, மற்றும் சில வற்றில் ஆங்காங்கே காணப்படுகின்றன.



படம் 10. பறவைகளில் கண்களின் வடிவங்கள்

- (அ) அம்சப் பறவை போன்ற பறவைகளில் காணப்படும் பொது-கண் அமைப்பு வகை.
 (ஆ) சுழற் போன்ற பறவைகளில் காணப்படும் உருண்டை வடிவக் கண் அமைப்பு வகை.
 (இ) ஆத்தை போன்ற பறவைகளில் காணப்படும் குறார் வடிவக் கண் அமைப்பு வகை.
 (ஈ) ஆத்தை-வகுை கண்ணின் மீட்டைக்கோட்டு வெட்டுத் தோற்றம் (Horizontal section).

1. காசுலீபா, 2. விசுலி, 3. ஸ்கிஸ், 4. பெக்டினேட் பத்தகம்
 5. ஸ்க்ரீஸ் ஆக்சிதிகை, 6. ஸ்க்ரீஸ், 7. ரெட்டினா, 8. பெக்டெட், 9. கோரோடு, 11. குறு இழை நீட்சிகள்.

மனிதனின் பார்வை சக்தியை விட பறவைகளின் பார்வை சக்தி மிகவும் கூர்மை உடையது என்று நம்புதலுக்கேற்ற ஆதாரங்கள் உள்ளன. கழுஞ், பருந்து, வேட்டைப் பருந்து முதலியவற்றின் பார்வை மனிதனை விட அதிக கூர்மையாக உள்ளது. அதே போன்று பூச்சிகளை உண்ணும் பறவைகள், பூச்சிகளை மனிதனைவிட மிகவும் கூர்மையாக கண்டு பிடித்து எடுத்து விடுகின்றன. ஸ்டட்டமிட்டு வானில் வெகு உயரத்தில் பறக்கும் பறவைகளுக்கும் மிகவும் கூர்மையான பார்வை சக்தியுண்டு.

பறவைகளின் கண்பார்வை மிகவும் கூர்மையானது என்பதற்கு தற்போது நடத்தி வரும் பறவை—நீர் வழிச் செல்லும் நிறம் (Bird navigation) பற்றிய ஆராய்ச்சியே ஆதாரமாகும். பறவைகள் குளியலின் ஏற்றச் சரிவுகளை நள்ளாக அறிந்துள்ளன. சரியான உபகரணங்கள் இல்லாமல் மனிதனும் குளியலின் ஏற்றச்சரிவுகளை அறிதல் இயலாது. மனிதனும் குளியல், சந்திரன் மற்ற கோளங்கள் முதலியவற்றின் ஏற்றங்களை நீண்ட இடைவெளிக்குப் பின்னும் தான் மிதிது. அறிய முடியுமெல்லாமல் அவைகளின் ஏற்றச் சரிவுகளைப் பறவைகளைப்போன்று அவ்வளவு கூர்மையாக அறிய முடியாது.

ஏரியாவும் ஃபோவியாவும் (Arae and Foveae)

ரெட்டினாவில் கம்புப் பகுதிகளல்லாமல் பசுவில் இரத்தேடும் பறவைகளில் ஒன்று அவ்வது பல கம்புப் பகுதிகள் மிகவும் அடர்த்தியானப் பகுதிகளும் காணப்படுகின்றன. இப்பகுதிகளில் நரம்புச் செல் நிறங்களும் (Retinon Cells) கம்புகளும் 1:1 என்ற விகிதத்தில் ரெட்டினாவின் திசுக்களையார் அடுக்கில் உள்ளன. இந்த ஏரியாப்பகுதிகளுக்குள் கீபோவியா என்ற குழிவுப் பரப்பும் உள்ளது. ஏரியாப் பகுதிதான் கண்ணின் கூர்மைப் பார்வை லெடக்கச் செயல் படுகின்றது. கீபோவியாப் பகுதியிலும் கண்ணிலிகள் ஒரு குறிப் பிட்டப் பொருளைக் காணும்படி செயல்படவுகின்றது. அக்குறிப் பிட்டப் பொருள் அசைத்தாலும் கூட கீபோவியாவின் உதவி மிகுமேயே பறவைகள் அதைக் கூர்ந்து நோக்க முடியும்.

மேலே குறிப்பிட்ட ஏரியா—ஃபோவியா (Arae & Foveae)ப் பகுதிகள் அமைக்கப்பட்டுள்ள முறையிவற்று அவைகளை மூன்று விதமாகப் பிரிக்கலாம். தாவியங்களை உணவாக உண்ணும் பறவைகளில் ஒரே ஒரு பரப்பு அவ்வது ஏரியாதான் காணப்படுகின்றது. இதில் கீபோவியாப் பகுதி இருத்தாலும். இருக்கும், இல்லாமல் போனாலும் போகும். இந்த ஏரியாப் பகுதி கண்ணிலி அச்சிற்கு அருகில் அமைந்திருப்பதால் அதை ஏரியா சென்ட்ராவில் அவ்வது

சிபார்ச் பறவைகளிலும் பூச்சிகளை இறவின் மேல் சுமத்து செல்லும் க்ஸிபிட், ஸ்வாலோ (Swift, Swallow) போன்ற பறவைகளிலும், அரசமீன் கொத்தி பறவைகளிலும், பாடும் பறவைகளிலும் இரண்டு ஏரியாப்பகுதிகளும் இரு சிபோனியாப் பகுதிகளும் உள்ளன. மைய சிபோனியாப் பகுதி க்ஸிபிழி அச்சிற்கருவில் உள்ளது. மற்றொன்று சிபோனியா டெம்ப்போராலில் என்ற பகுதியாகும். இந்த சிபோனியா டெம்ப்போராலில் பகுதியின் உதவியால் பறவைகள் விண்வெளியில் வெகுதூரத்தில் வேகமாகப் பறந்தால் கூட இரு கண் பார்வையினால் தீட்டக் காட்சிகளைக் காண முடிவின்றது. பறவையானது வெகு தூரத்தில் வேகமாகப் பறப்பினும் சிபோனியா டெம்ப்போராலில் பகுதியின் உதவியால் அசையும் இரையின் மீது பாய்ந்து எடுத்துச் செல்வின்றது.

பெக்டென்

ரெட்டினல் செவ்வகத்து கண்டப் பொருள்களும் பிராண வாயுவும் விட்ரஸ் அதையினுள்ள பெக்டன் மூலமாக கலந்த ஒரு பரவுகின்றன (Diffuse). பெக்டன் ஒரு சிறு கூம்பு வடிவுடைய உறுப்பாகும். இது கண் தரம்பு (Optic nerve) விட்ரஸ் அதையினுள் நுழையுமிடத்து அமைந்துள்ளது. இதன் தலைப்பகுதி கண் கிழியின் (Lens) மையப் பகுதியை நோக்கி அமைந்துள்ளது. பறவைகளின் பெக்டென் பகுதி இரத்தக் குழாய் அடர்த்த பகுதியாகும். இப்பகுதியில் பார்வைச் செவ்வகமும் மிகவும் அதிகமாகக் காணப் படுகின்றன. ஆகையால் தான் பறவைகளின் கண் பார்வை கூர்மையாக அமைந்துள்ளது.

இரனில் இரை தேடும் பறவைகள்

ஆந்தைகள் இரவு நேரங்களில் இருட்டில் பறந்து நிரீவது வற்றியும் இரையைத் தேடி உண்ணும் முறையைப் பற்றியும் வெகு நாட்களாகவே விவந்து கொண்டதால் இருத்திருக்கின்றோம். இப்பறவைகள் இருட்டில் எப்பொருள் மீதோ அல்ல எந்தப்பூதர் மரங்கள் மீதோ மோதாமல் பறந்து சென்று இரையைப் பிடிப்பதற்கு அவைகளின் கண் பார்வையை விட செலிப்புண்களே பெரிதும் பயன்பட்டு வருகின்றன. ஆந்தைகளின் மணி (Pupil) விரிவுபடுத்தப் படிச் மிகவும் பெரிய தான் அமைந்துள்ளது. அதன் குவியத்தூரம் (Focal length) மிகவும் குறைந்ததாகும். பார்வைப் பரப்பும் குறுகியே உள்ளது. பார்வை உணர்ச்சி செவ்வகப் பெரும்பாலும் குச்சிகளாகவே (Rods) அமைந்திருக்கும். அவைகளின் கடைசி பகுதி மிகவும் நீளமாக அமைந்திருப்பதுடன் அவற்றில் ரோடோபின் (Rhodopsin)

மிகுதியாகக் காணப்படுகின்றது. இதன் வழியாக குறைந்த ஒளி உள்நே புறத்து நிறத்துகள் அடுக்குகளிலும் வினாக்கப்படாமல் செல்கின்றது. ஆந்தைகளின் கண்களினுள்ள ரெட்டிசு அடுக்கில் தரம்புத்திரட்சி செல் அடுக்கு (Ganglionic cell layer) மிகவும் அடர்த்தியாக அமைந்துள்ளது. அந்த அடுக்கின் உதவியின்றியே அவை இருட்டிங்குட பறந்து செல்ல முடியின்றது. மற்ற பறவைகள் எவ்வாறு வெளிச்சத்தில் பறந்து செல்கின்றதோ அதே போன்று ஆந்தைகள் இருட்டில் தாராளமாக அதன் மாறுபட்ட வியக்கத்தக்க அமைப்பினால் பறந்து செல்கின்றன.

சமச்சீர் நிலை (Equilibrium)

பறவைகளின் உட்செவி இரு பிரிவுகளைக் கொண்டது. ஒன்று பார்ஸ் சுப்பீரியல் (Pars superior) மற்றொன்று பார்ஸ் இன்ஃபீரியல் (Pars inferior) என்பதாகும். முதல் பகுதியான பார்ஸ் சுப்பீரியலில் ஸ்டிரிக்கில் பகுதியுள் (Utricle) அதன் மூன்று அரைவிட்ட வட்டக் குழாய்களில் துவாரங்களும் உள்ளன. பார்ஸ் இன்ஃபீரியல் பகுதியில் சேக்க்யூல் (Saccule) என்ட்ரோலிம்ப்ஃபெட்டிக்கள்களின் செக்கல்லனம் தாளங்கள் காசிலியா (Cochlea) லெஜினா (Lagena) முதலியப் பகுதிகள் உள்ளன. சவ்வு அல்லது மெம்பிரேனஸ் லேபிரிந்த் (Membranous Labyrinth) பகுதி வளர்ச்சியின் பொழுது வெகு விரைவில் அடை வைத்த ஏழாம் நாளே நன்றாக வளர்ச்சியுற்று காணப்படுகின்றது. இதனைச் சுற்றிலும் மூன்று பகுதிகள் பெட்ரோசம், மாஸ்டாய்டு, எபிஃபுட்டிக் என்ற எலும்புப் பகுதிகள் வளர்ச்சியுறுகின்றன. பின்பு இம்மூன்று எலும்புப் பகுதியும் ஒன்றாக இணைந்து ஒரே எலும்பாக மாறி மண்டையோட்டின் பின் பகுதியில் அமைகின்றது. சவ்வு அல்லது மெம்பிரேனஸ் பகுதியின் கவர்கள் ட்யூபிக்கா ப்ரோப்ரியா (Tunica Propria) என்ற தட்டைச் செக்களாலும், உள் அடுக்கு செக்களாலும் ஆனது. அதுவே உணர்ச்சி உறுப்புப் பகுதியாக மாறுதலடைகின்றது. மெம்பிரேனஸ் லேபிரிந்த் பகுதியை ஒரு படகம் மூடிவுள்ளது. ஆம்புல்லாக்கள் (Ampulla), ஸ்டிரிக்கில், செக்க்யூல் (Utricle & saccule) என்ற பகுதிகளினுள்ள சுரப்பி செக்களால் சுரக்கப்பட்ட என்ட்ரோலிம்ப் என்ற திரவம் மெம்பிரேனஸ் லேபிரிந்த் பகுதியில் உள்ளது.

இந்த மெம்பிரேனஸ் பகுதி உட்செவியுடன் ஒரு புறமும் தலைப் பகுதியுடன் மற்றொரு புறமும் மூன்று இடங்களில் இணைந்துள்ளன.

1. மையச் செவி ஓவால் துணையுடன் தொடர்பு கொண்டுள்ளது.

3. என்ட்ரோ விற்ப்பேட்டிக் நாளம் மூளைப் பகுதியுடன் தொடர்பு கொள்ளுமிடத்தில் அக்வா டக்டஸ் வெஸ்டிபுலி (Aqua-ductus Vestibuli) என்ற துவாரம் உள்ளது.

3. இன்ட்ரோ அக்கஸ்டிக் நரம்பைச் (Acusticus internus) சுற்றி ஒரு துவாரம் உள்ளது. அதற்கு மீயாட்டஸ் அக்கஸ்டிக்ஸ் இன்ட்ரோசைஸ் (Meatus acusticus internus) என்று பெயர். இதன் அருகில் ஐந்து சிறு துளைகள் உள்ளன. அதன் வழியாக வெஸ்டிபுலார் நரம்பின்தாளுக்கு இளைகளும், காக்கியார் நரம்பும் செல்கின்றன. பட்டினிக்கா ப்ரோபர்சியாவின் மெம்ப்ரேனஸ் பகுதிக்கும் என்ட்ரோஸ் ஷயத்தின் கெட்டிப் படுத்தப்பட்டப் பகுதிக்கும் இடையில் இணைப்பு இணைத்திக் உள்ளது. இப்பகுதி பெரியிம்ப் (Peri lymph) என்ற திரவத் தாப் நிரப்பப்பட்டுள்ளது. காக்கியார்ப் பகுதியில் இந்த இணைப்பு இழைத்திக் கிடையாது. அப்பகுதிதான் வெனித்தூண்டுதலைக் கிரகிக்கும் இடமாகும்.

உணர்ச்சி உறுப்புகளும் அவற்றின் கார்ப்புகளும்


லேபிரீசுத் உறுப்பில் இரண்டு வெவ்வேறான உணர்ச்சி உறுப்புகள் உள்ளன. ஒன்று கப்புளா (Copula) வகை உறுப்பு, மற்றொன்று மெக்குளா (Macula) வகை உறுப்பாகும். கப்புளா வகையில் மூன்று ஆம்புபுளாக்களும், மெக்குளா வகையில் ஸ்ட்ரிக்கில் செக்ஸ்டு, வெஜிசு முதலியவற்றின் உணர்ச்சிப் பகுதிகளும் உள்ளன. ஆனும் இந்த இரண்டு பகுதிகளிலும் அடிப்படை அமைப்பு அதாவது லேபிரீசுத் பகுதியின் கவர்கள் ஒரே மாநிலியான செல்களாலேயே ஆனது. அச்செல்களில் உணர்வுப் பொட்டுகளும் உள்ளன. அவற்றுடன் உரோமம் போன்ற நீட்சிகளுமுள்ளன. இந்த நரம்பு இழை தார்கள், நரம்பு செவ்விரலி (Ganglion) வின்றும் தோன்றி உணர்வுப் பொட்டுகளிலுள் நுழைத்து, உணர்வுச் செல்களுடன் இணைத்து உணர்வு வலை பின்னமாக மாறுகின்றது.

செவிப்புலன் — செவிவின் அமைப்பு

புறச் செவிக்குழாய்

எல் பறவை சிறப்பினங்களில் புறச் செவிக்குழாய் (External auditory meatus) வெவிப்புறம் திறந்தே காணப்படுகின்றன. ஆனும் பொதுவாகப் பறவைகளில் புறச் செவிக்குழாய் இறகுகளால் மூடிவடபுதான் அமைத்திருக்கும். அவ்வாறு இறகுகளால் மூடியிருப் யதால் வெவிப் பார்வைக்கு நம் கண்களுக்குத் தெரியாது. நஞ்ச் செவிப் பகுதி புறச் செவிக்குழாயினின்றும் செவிப்பறையினால் (Tympanic membrane) தடுக்கப்பட்டிருக்கும். நஞ்ச் செவிப்பகுதியும்

காற்றிலும் நிரப்பப்பட்ட ஒரு பகுதியே ஆகும். அப்பகுதியும் பூண்டேவியன் குழாய், வாய் முதலியவற்றால் வெளிக்காற்ற மண்ட வத்துடன் தொடர்புகொண்டு அமைந்திருக்கும். இவ்வாறு அமைந்திருப்பதால் இருபக்க செவிப்பறைகளிலும் காற்றின் அழுத்தம் ஒரே மாதிரியாகவே இருக்கும். ஆனால் சிசுமயங்களில் காற்றின் அழுத்தம் ஒரே சீராகவியலாமல் அதிலேசுமமாக இருக்கும்பொழுது, ஒவ்வொன்று புறச் செவிக்குழாய் வழியாக செவிப்பறையைச் சென்று தாக்கி, பின்பு அது உட்செவிக்குள்ளே நிரம்ப பகுதியை கால்பூமெல்லா (Columella) வின் உதவியிலும் சென்றடைகின்றது. அங்குள்ள பாதத்தட்டுப் பகுதி நீள் உருவ துணியை (Fenestra ovalis) அமைக்கும்படி அமைந்துள்ளது. பாதத்தட்டுப் பகுதி நீள் உருவ துணியில் காக்கியாப் பொருத்தும்படி அமைவதற்கு துணைக் முடியாத ஆனால் தொய்வான வகையம் போன்ற தகை நார் அதன் விளிம்பு நீள் உருவ துணியில் பிணைக்கும்படி அமைந்துள்ளது. இத்தட்டின் உள்பகுதி ஸ்கேலா வெஸ்டிபுலி (Scala vestibuli) யிலுள்ள பெரிஸிம்ப் (Perilymph) என்ற நிரவத்துடன் தொடர்பு கொண்டு அமைந்துள்ளது. எனும்பாலான காக்கியாப் பகுதி விரல் வடிவக் குழாய் போன்றுள்ளது. காக்கியாவின் மையப் பகுதியில் காக்கியா நாளம் அல்லது ஸ்கேலா மீடியா (Cochlear duct or scala media) என்ற பகுதியுள்ளது. இந்த நாளம் படல மேவிரின்த் (Membranous labyrinth) இன் வெளி வளர்ச்சியுறுப்பாகும். இதனால் எண்டோலிம்ப் (Endolymph) என்ற நிரவம் உள்ளது. காக்கியார் நாளம் அல்லது ஸ்கேலா மீடியாப் பகுதி இருபுறமும் இரண்டு குறுத்தெனும்பாலான நிழைக்குத் தட்டுகளால் (Shelf) காக்கியாவின்விளும் நீட்டிக் கொண்டிருக்கும்படி சீராக அமைபும்படி பொருத்தப்பட்டுள்ளது. இரண்டு குறுத்தெனும்பாலான நிழைக்குத் தட்டுகளில் கூரைப் பகுதி டெக்மெண்டம் டெக்டுமென்சம் (Tegmentum Vascularum) என்ற பகுதியாலும், தரைப் பகுதி பேசிலென் மடலத்தினாலும் (Basilar membrane) ஆகும். இந்த காக்கியார் நாளம் முடிவுறும் முடிப்பகுதியில் லெஜெனார் மெக்ஸுலா (Legendar macula) என்ற ஒரு கூட்டமான மயிர்க்தறை போன்ற உணர்ச்சி செய்கன் ஆட்டோ கோனியா (Otogonia) என்ற உறுப்புக்குடன் அமைந்துள்ளது. காக்கியார் நாளத்தின் மேலேயுள்ள பகுதிக்கு ஸ்கேலா வெஸ்டிபுலி (Scala Vestibuli) என்று பெயர். காக்கியார் நாளத்திற்குக் கீழேயுள்ள பகுதிக்கு ஸ்கேலா டிம்பானி (Scala tympani) என்று பெயர். இவ்விரு பகுதிகளிலும் பெரிஸிம்ப் (Perilymph) என்ற நிரவப்பொருள் உள்ளது. ஸ்கேலா டிம்பானியின் துணிப் பகுதியின் எனும்பாலான சுவரில் மற்றொரு துணியுள்ளது. இது உட்செவிமையுள் நடுச் செவிமையுள் பிரிக்கின்றது. இத்தத் துண் வட்ட வடிவமாக இருப்பதால் இதற்கு வட்டத்துண் (Fenestra rotunda) என்று பெயர்.



படம் 42. பறவை-செவிப்பகுதிகள்

- (அ) எலும்பு வேரிலிருந்து பகுதி
 (ஆ) மூல புறச் செவிப்பகுதிகள்
 (இ) காக்கியாவின் நீள் வெட்டுத் தொற்றம்

1 & 5. காதுமேகலா (அடெப்பிஸ் மிகு பகுதி). 2. ஆங்குலவர் பத்தகம், 3. வெஜினா, 4. காக்கியா 5. வட்டத் துளி, 7. மைவச் செவிக்குழி, 8. செவிப்பறை படலம், 9. புறச் செவிக்குழாய், 10. காதுமேகலாவின் பாதத் தட்டு, 11. பேரில்லவர் படலம், 12. வெஜினா மேக்யூலா, 13. ரெக்மெண்ட்டம் வானத்துமோசம், 14. காக்கியாவின் எலும்புப் பகுதி, 15. ம்சோலா வெஸ்ட்டிப்யூலா, 16. ம்சோலா மீடியா, 17. ம்சோலா டிரம்பாஸி.

இத்துணையை ஒரு மெல்லிய தொல்வுடைய படலம் மூடிவுள்ளது. அப்படலம் ஸ்கேலா டிம்ப்பேனியினுள்ள பெலிஸிப்பை நழுச் செவிவினுள்ள வெணிக்காற்றினின்றும் பிரிக்கின்றது; காற்றைவிட பெலிஸிப் அழுத்தத்தைத் தாங்க முடியாத பொருளாகையால் கால்லு மெல்லானின் இடப்பெயர்ச்சியினால் ஸ்கேலா வென்டிஸ்தும் இடம் பெயர்வதால் அதற்கிடாக வட்டத் துவாரத்தை அடைத்துக் கொண்டிருக்கும் படலமும் மையச் செவியை நோக்கி அசைகின்றது. இவ்வாறான அசைவுகளால் டெக்டென்ட்டல் படலமும், பேசிஸ்வார் படலமும் சற்று அநே போன்ற இடப்பெயர்ச்சியை மேற்கொள்ளுகின்றன. பேசிஸ்வார் படலத்தின் அசைவினால் உரோமம் போன்ற உணர்ச்சி செங்கலும் கலந்து அவைகள் உடனே காக்கியார் நரம்பு இவ்வுணர்வுகளை அதிர்ச் செய்கின்றன. முடிவில் பறவை ஓசையைக் கேட்கும் திறனைப் பெறுகின்றது.

பேசிஸ்வார் படலம் உரோமம் போன்ற உணர்வுச் செங்கல் அதனுடன் துணையான உள்ள மற் ற செங்கல், நரம்பு இழைநார்கள். டெக்டோரியல் படலம் முதலியன (Basilar membrane, Hair cells, accessory supporting cells, nerve fibres, tectorial membrane) கூட்டாகச் சேர்த்ததே கஸ்ட்டியின் உறுப்பாகும் (Organ of Corti). பேசிஸ்வார் படலம் குறுக்கு இழை நார்களினால் தள்ளுக் கெட்டிப் படுத்தப்பட்டு, இவ்விழை நார்கள் மேலே குறிப்பிட்ட குருத்தெனும் பாளான நிலை அடுக்குத் தட்டுகளினால் (Shelf) நங்குரம் பாம்ப்சினுத் போல் நள்ளுக் பொருத்தப்பட்டுள்ளன. இவ்விழை நார்கள் எண்ணிக்கையில் சுமார் ஒன்று முதல் இரண்டாயிரம் வரையிலுக்கும். துவலில் மிகவும் கூர்மையாக அமைந்திருக்கும், நரம்பு இழை நார்களுக்கு மேலே மயிரிழை செங்கல் எண்ணிக்கையில் மூப்பது முதல் ஐம்பது வரை நள்ளுக் பொருத்தி அமைந்துள்ளன. காக்கியார் நரம்பின் இழைநார்கள் மூன்புற குருத்தெனும்பு நிலை அடுக்கு தட்டினால் துளைத்து துழைத்து அதனுள் சிறு சிறு துண் கிளைகளாகப் பிரித்து கலந்து விடுகின்றன. அப்பகுதியின் மயிரிழை போன்ற தொகுதிகள் டெக்டோரியல் படலத்தினால் கலந்து விடுகின்றன.

பொதுவாகப் பார்க்கும்பொழுது பாதுாட்டிகளின் காதுப் பகுதியும் பறவைகளின் காதுப் பகுதியும் ஒரே மாநிலியாகக் காணப் பட்டாலும், அவற்றுள் பல வேறுபாடுகள் உள்ளன. மாபேட்ரீம் (Monotremes) என்ற தாழ்த்த வகுப்பு பாதுாட்டிகளின் காதுகள் ஏறத்தாழ பறவைகளின் காதுகளை ஒத்துள்ளன. பறவைகளைப் போன்ற காக்கியாப் பகுதி மாபேட்ரீம் பாதுாட்டிகளில் உள்ளது. ஆனால் மாபேட்ரீம் பாதுாட்டிகளின் காக்கியா குட்டையாகவும் கருதற்றும் முடிவில் மேக்யூலா லெஜினு என்ற பகுதிபுடனுள்ளது.

மற்ற பாலூட்டிகளில் காக்கியா கெட்டியாக கற்றப்பட்ட 2 முதல் 4 வயதுக்குட்பட்ட கருணாக அமைந்துள்ளது. ஆனால் வெஜிஜா கிடை யாது. பின்பும் ஹெலிக்சோக்மரிசா (Helicotrema) என்ற துவார ரத்தால் ஸ்கேலாவெஸ்டிபுலி என்ற பகுதியும் ஸ்கேலாடிம்பிபெனி என்ற பகுதியும் இணைந்துள்ளது. ஹெலிக்சோக்மரிசா துவாரம் பறவைகளில் கிடையாது.

காக்கியா

காக்கியாப் பறவைகளில் அமைந்துள்ள நிபன்ய சரிவர ஆராய்ந்து பார்க்கும்பொழுது பாலூட்டிகளில் உள்ளது போன்ற அங்ஙனவு விரிவாக அமைவதில்லை. பேசில்லார் படவழம் பாலூட்டிகளிடையே பறவைகளில் குட்டையாக அமைந்துள்ளது. அதனால் அவைகளின் செவிப்புலன் பாலூட்டிகளைப் போன்று அங்ஙனவு கர்மம்வாக இல்லை. பறவைகளின் பேசில்லார் படவம் பாலூட்டிகளின் பேசில்லார் படவத்தைவிட 10 மடங்கு சிறியது.

கடுச்செவி

இதன் முக்கிய வேலை ஒலி அலைகளை செவிப்பறையினின்று நீள் வட்டத்துணையினுள் (Fenestra ovalis) செலுத்துவதேயாகும். பின்பு ஒசையானது வட்டத் துவாரத்தை (Fenestra rotundus) சென்று அடைகின்றது. கடுச்செவியினுள் இது போன்ற குழல் வடிவ காற்றறைகள் தொடர்பு கொண்டுள்ளதால் அங்குள்ள காற்றினால் அந்த அறைகள் அங்கிடம் வந்தடைந்த ஒலி அலைகளை எதிரொலிக்கச் செய்யும் இயத்திரமாக (Resonant) பயன்படுகின்றன. ஆனால் இது பற்றி விரிவாகத் தெரியவில்லை. அப்பகுதி ஒரு நெத்த நுண்ணிய உறுப்பாக அமைந்து செவிப்புலனை அறிவும்படி செய்கின்றது.

பறவைகளில் ஒசை சக்தியை செவிப்பறையினின்றும் காக்கியாப் பகுதிக்கு தொடர்பு கொள்ளச் செய்தல் பாலூட்டிகளில் உள்ளதைக் காட்டிலும் எளிதாக நடைபெறிலும் அவைகளைப் பற்றி விரிவாகத் தெரியவில்லை. செவிப்பறையும் பாதத்தட்டும் குறிப் குடத்தாக உந்து தண்டுகள் போன்று (Pistons) காங்க்யுமெல்லா என்ற விறைப்பான தோலுடன் தொடர்பு கொண்டு அமைந்துள்ளன. செவிப்பறை பாதத்தட்டு முதலிய இடங்களிலுள்ள ஒசையின் அழுத்தம் ஸ்கேலா வெஸ்டிபுலி, புறச் செவிக்குழாய் முதலியவற்றி லுள்ள ஒசையின் அழுத்தத்திற்குச் சமமாக இருக்கும்.

செவிப்பறையுடன் தொடர்பு கொண்டு காங்க்யுமெல்லா ஸ்டேப்பியஸ் (Stapes) என்ற எலும்புப் பகுதியாலும் மிகுதி ஸ்டேப்பியஸ்

(Extra stapes) என்ற குருத்தெலும்புப் பகுதியாலும் ஆனது. இது செவிப்பறைபுடன் குறிப்பிட்ட வலிமைவான கோணத்தில் பொருத்தியுள்ளது. இவ்வாறு வலிமைபுடன் குறுக்காக செவிப் பறையினால் நுழைக்கப்பட்டு அமைந்துள்ள காக்குமெல்லா, செவிப் பறையின் அதிர்விலும் கழன்று அசைகின்றது. அவ்வாறு அசையும் பொழுது காக்குமெல்லா ஒரு நெம்புகோல் (Lever) போன்று அமைகின்றது. அதன் தாக்கு நிலை ஆதாரம் (Fulcrum) நீள் உருவிகத் துவாரத்தின் ஒரு ஓரத்தில் அமைகின்றது. மற்றும் அதன் குட்டையான நெடிய கரங்கள் (Short & long arm) முறையே பாதத்தட்டின் அரைண்டிப் பகுதியும் (Radius) காக்குமெல்லாவின் முழுநீள் பகுதியுமாகும். இவ்வாறு அமைத்திருப்பதால் நெம்பு கோலானது மற்றும் மிகுதியாகவும் முகவியமானதுமான ஒசை சக்தியை உள்ளே செலுத்தி அதிகப்படியான ஒசை அமைகளை உண்டாக்குகின்றது. இது போன்ற அமைப்பு ஆத்தைகளில் மிகவும் துல்லியமாக அமைந்துள்ளது.

புறச்செவி

பாதுட்டிகளில் புறச்செவிக் குழாய்கள் நீண்டு செவிமடல் (Pinna) களாக மாற்றப்பட்டுள்ளன. பறவைகளில் அத்தகைய காது மடல்கள் இடையாது. பறவைகள் காற்றின் அதிவேகத்தைப் போன்று பறக்கக் கூடிய சக்தியுள்ளவைகள். பறவைகளின் புறச் செவிக் குழாய்கள் வெவ்வேறு தெரியாதபடி இறகுகளால் மூடப்பட்டுள்ளன. வெவ்வேறுள்ள காற்றின் கொத்தளிப்பு வேகமாகப் பறக்கும் பொழுது உள்ளே புகாமல் இருத்தலுக்குத்தான் புறச் செவிக் குழாய் இறகுகளால் மூடப்பட்டுள்ளன.

10. பறவைகளின் நாளமில்லாச் சுரப்பிகள் (Endocrine glands)

இரத்த நாளங்கள் அடங்கிய எப்பித்தீலியல் செல்களின் கூட்டுப் பகுதியே நாளமில்லாச் சுரப்பியாகும். இவற்றிற்கு நாளங்கள் இடையாது. இந்தச் சுரப்பிகளால் சுரக்கச் செய்யும் பொருள் இரத்தத்தினால் உடலின் எல்லாப் பாகங்களுக்கும் எடுத்துச் செல்லப் படினும் அவை குறிப்பிட்ட நிகக்களியேயே செயல்படுகின்றன. இவ்வாறு நிறத்த மூன்றில் செயல்பட இச்சுரப்பிகள் சுரக்கச் செய்யும் பொருளை ஹார்மோன்கள் (Hormones) எனப்படும். இவைகளினால் இயங்குகின்ற நிகக்களுக்கு குறிப்பிட்ட உறுப்பு (Target organ) என்று பெயர். ஒரு குறிப்பிட்ட நிக இந்த ஹார்மோன்களின் உதவியால் அதிலிரைவில் வளர்ச்சியுறுகின்றன. அவ்வது உடலின் பல பாகங்களில் வேதியல் மாற்றங்கள் ஏற்படும்படி ஹார்மோன்கள் தூண்டுகின்றன. இந்த ஹார்மோன்களின் செயல்களைக் குறித்து அறிந்து கொள்வது மிகவும் கடினமாகும். ஆனால் இவற்றில் னைராய்டு நாளமில்லாச் சுரப்பியின் நிறத்த செயல்களை பரிசோதனைகளின் மூலம் நிறுது அறியலாம்.

எல்லா முதுகெலும்புள்ள பிராணிகளிலும் ஹார்மோன்களைச் சுரக்கச் செய்யும் சுரப்பிகள் தோற்றத்திலும் அமைப்பிலும் ஏறத்தாழ ஒரே மாநிலியாகவே விருக்கும், அவைகளிலிருந்து சுரக்கப்படும் பொருளும் ஒரே மாநிலியாகவே விருக்கும். மற்ரும் இவ்வகைச் சுரப்பிகளினின்றும் சுரக்கச் செய்யும் ஹார்மோன்களின் செயல்களும் எல்லாப் பிராணிகளிலும் ஒரேமாநிலியாகவே விருக்கும். முதுகெலும்பற்ற பிராணிகளிலும் ஹார்மோன்கள் உள்ளன. ஆனால் அவைகள் முதுகெலும்புள்ள பிராணிகளின் ஹார்மோன்களினின்றும் மாறுபட்டே காணப்படுகின்றன. நைராய்டு, அட்ரீனலின் அகனி

அவ்வது மெடுஞ்சரி முதலியவற்றில் கரக்கும் ஹார்மோன்கள் அமினோ அமிலம், தைரோக்சின் போன்ற பொருட்களினாலேயே ஆக்கப்படுகின்றன. அட்ரீனல், இனப்பெருக்க உறுப்புகள் (Gonads) முதலியவை க் கமராய்டு ஹார்மோன்களைச் சுரக்கின்றன. பிட்டி டியூட்டரி (Pituitary) பேரா தைராய்டு (Parathyroid) கணையம் (Pancreas) முதலிய சுரப்பிகளினின்றும் கரக்கும் ஹார்மோன்களில் புரதச் சத்துள்ளது. கடைசியாகக் குறிப்பிட்ட மூன்று சுரப்பிகளின் ஹார்மோன்கள் முதுகெலும்புள்ளப் பிராணிகளின் பல வகுப்பு களிலும் ஒரே மாதிரியாக இல்லை. இவைகளுள் அமைப்பு செயல் முதலியவற்றில் வேறுபாடுகளுள்ளன.

பறவைகளில் பிட்டி டியூட்டரி தைராய்டு பேராதைராய்டு, அட்ரீனல், கணையம், இனப்பெருக்க உறுப்புகள் முதலானவைகளே நாளமில்லாத் சுரப்பிகளாகவுள்ளன. கடைசியாகக் கூறப்பட்ட இனப்பெருக்க உறுப்புகள் ஹார்மோன்களைச் சுரக்கச் செய்வதோடும் லாமல் இனச் செய்களையும் (Gonads) உற்பத்தி செய்கின்றன. கணையத்தில் வெளிப் பொரு ள்களை சுரக்கச் செய்யும் தன்மையும் உள்ளது. அது சீரண நீரைச் சுரக்கின்றது. அதில் ஹார்மோன்களைச் சுரக்கச் செய்யும் நிறப்புச் செய்கள் (Islets) உள்ளன. தைமஸ் (Thymus) சுரப்பியும், பீனியல் சுரப்பியும் (Pineal) ஹார்மோன்களை உற்பத்தி செய்தாலும், அவைகளைப் பற்றி இன்னும் சரிவரத் தெரியவில்லை. பாலூட்டிகளில் சில ஹார் மோன்கள் சீரண நீர் உற்பத்தியையும் குடவின் அசைவையும் ஒழுங்கு படுத்தும் வகையில் உள்ளன. இத்தகைய ஹார்மோன்கள் பறவை களிலும் உள்ளன. ஹார்மோன்களில் தைராய்டுகளில் கரக்கும் ஹார்மோன்களைத்தவிர மற்றவைகளைச் சுரப்புகளுறையில் வாயின் வழியாக உள்பே செலுத்தினாலும்கூட ஒழுங்கித விளையுமில்லாமல் சென்றுவிடும். ஆனால் அதே ஹார்மோன் ஊடு மருத் தாக பறவையின் உடலில் நிகுக்களில் செலுத்தினாலும்கூட அவை இரத் தத்தினால் கலக்கின்றது.


பேரா தைராய்டு ஹார்மோன், அட்ரீனல் கார்ட்ட்டிகல் ஹார் மோன்களில் ஒன்று, கணையத்தின் ஹார்மோன், முதலியவற்றின் போன்ற ஹார்மோன்கள், உயிர் வாழ்வதற்கு இன்றியமையாத உடலில் சில முக்கிய, குறிப்பிடத்தக்க வேடுவியல் செய்களை ஒழுங்குற தடைபெறச் செய்வதற்கு காரணமாக உள்ளன. பறவை களில் பிட்டி டியூட்டரி சுரப்பியின் சுரப்புப்பொருள்— ஹார்மோன் — பறவை உயிர் வாழ்வதற்கே மிகவும் இன்றியமையாததொன்றாகும். இந்த ஹார்மோன், மற்ற ஹார்மோன்களின் செயல்களைக் கட்டுப் படுத்துவதால் இது மிக மிக முக்கியமான தொன்றாகும்.

உடல் வளர்ச்சி, இறகு வளர்ச்சி, இறகுநீர் செயல் முதலியவைகள் ஹார்மோன்களினாலேயே ஒழுங்குநடைபெறுகின்றன. மற்றும் சில பறவைகளின் இறகுகளிலுள்ள திறமிகளின் தோற்றமும் இந்த ஹார்மோன்களின் உதவியாலேயே மாறுபட்டு தெரிகின்றன. குள்ள வாக்று, கோழி போன்ற வீடுகளில் வளர்க்கப்படும் பறவைகளில் பால்வழி இரு தோற்றமடங்கிணைக் காணலாம் (Sexual dimorphism). இப்பறவைகளில் ஆண் பெண் பறவைகள் வேறுபட்டு காணப்படுவதைக் காணலாம். அத்தகைய வேறுபாடுகளுக்குக் காரணம் அவற்றின் ஹார்மோன்களையாகும். பெண் பறவைகளில் பெண்ணின் சிறப்புக்களைத் தோற்றவிலக்கும் ஹார்மோன்களும், ஆண் பறவைகளில் ஆணின் சிறப்புக்களைத் தோற்றவிலக்கும் ஹார்மோன்களும் உள்ளன. ஆபிரிக்க கிபிச் பறவைகளில் பிட்மஸ்ட்டரி ஹார்மோன்களே ஆண் பறவைகளில் இனப்பெருக்கக் காலங்களில் தோன்றும் இறகுகளைத் தோற்றவிலக்கின்றன. மற்றும் முதிர்ச்சியுற்ற கல் (Gull) பறவைகளில் காணப்படும் இறகுகள், கருத்தடைகையுடைய கல் பறவைகளில் இனப்பெருக்கக் காலங்களில் தோன்றும். இறகுகள், நாளங்களின் கறுப்பு கொண்டைப்பகுதிகள் முதலியனவும் ஆன்ட்ரோஜன் (Androgen) என்ற ஆண்-பால் ஹார்மோன்களின் (Male sexhormone) தூண்டுதலாலேயே தோன்றுகின்றன. ஒரு சில பறவைகளில் அவகுகளின் திறமும் இனப்பெருக்கக் காலங்களில் மாற்றப்படுவதற்கு மேலே குறிப்பிட்ட ஆன்ட்ரோஜன் ஹார்மோன்களே காரணம் என்று கருதப்படுகின்றது.

பறவைகளின் ஒழுக்கவாறு (Behaviour) முறை ஹார்மோன்களாலேயே பெரிதும் தடைபெறுகின்றது. அவைகள் மைய தரம்பு மண்டலத்துடன் தொடர்பு பெற்றே மேற்கூறியபடி பறவைகளின் ஒழுக்கவாறு முறைகளை கட்டுப்படுத்தி நடத்துகின்றன. ஆன்ட்ரோஜன் என்னும் ஆண்-பால் ஹார்மோன் மைய தரம்பு மண்டலத்துடன் இணைத்து, ஆண் பறவைகளின் ஒழுக்கவாற்றிலிருந்துக் காரணமாகவுள்ளது. ஆண் பறவைகளில் இனப்பெருக்கக் காலங்களில் தோன்றும் எகலி பிடித்தல், பாடும் நிறன் போன்ற செயல்களுக்கு மட்டுமே அல்லாமல், பெண் இனங்களுடன் கூடுதல் போன்ற செயல்களுக்கும் இந்த ஹார்மோன்களே காரணமாகும். பெண்-பால் ஹார்மோன்களின் திறனைப்பற்றி அறிதல் மிகவும் கடினமானதொன்றாகும். பெண்-பால் ஹார்மோன்களைத் தவிர மற்றும் சில ஹார்மோன்கள், பெண் பறவைகளில் இனப்பெருக்கக் காலங்களில் தோன்றுவதாலேயே, ஆண் பறவைகளின் இனப்பெருக்கக் காலங்களில் ஏற்படும் தூண்டுதலினை பெண் பறவைகளும் ஏற்கின்றன. 'வலகை போதல்' பழக்கங்களையும் பறவைகளில் ஹார்மோன்களே தூண்டுகின்றன.

பிட்டியூட்டரி சுரப்பி அல்லது ஹைப்போஃபைசிஸ் (Pituitary or Hypophysis)

இது கீழ்க்கண்ட எலும்பிக், மண்டையோட்டின் தரைப்பகுதியில், பார்வை நரம்பு குறுக்கமைப்பிற்குப் பின்னால் மத்திய மூளைபுடன் இணையும்படி செல்லா டர்னிகா என்ற (Sella turcica) ஒரு வட்ட



படம் 43.

- (அ) ஆண்பறவை-உடன்குறுப்புக்களில் வெட்டுத் தொற்றம்-
நாளிடுவாகக் கர்ப்பிகளின் அமைப்பு
(ஆ) வாததில் பிட்டியூட்டரி சுரப்பி-மையப்பகுதி நீள் வெட்டுத்
தொற்றம்
(இ) மீட்டுக் குறுவியில் உடன்குறுப்புக்கள்

வடிவ குழியில் அமைந்துள்ளது. இந்தச் சுரப்பி இரு வெவ்வேறுக வளர்ச்சியுறும் பகுதிகளைக் கொண்டது. இரு பகுதிகளில் முன் பக்க இதழ் சற்று பெரியதாகவுள்ளது. இது தொண்டைப் பகுதி புற அடுக்கினின்றும் வளர்ச்சியின் பொழுது தோன்றுகின்றது. தொண்டைப்பகுதி புற அடுக்கினின்றும் இது தோன்றிய பின் அப்பகுதியினின்றும் பிரித்து விடுகின்றது. இதன் பின்பக்க இதழ் சற்று சிறியதாகவுள்ளது. இது நடு மூளையினின்றும் தோன்றியதாகக் கருதப்படுகின்றது. இந்த இரண்டு பகுதிகளும் இணைப்புத் திகத் தடுப்பினால் தடுக்கப்பட்டுள்ளது. மற்றுமொரு பகுதி பார்ஸ் இன்டர்மீடியா (Pars intermedia) என்ற மையத்தில் காணப்படும் பகுதி பாலுட்டிகளில் உள்ளது. ஆனால் அப்பகுதி பறவைகளில் கிடையாது.

பிட்டியூட்டரியின் முன் இதழ்பகுதியில் எப்பித்தீவியல் செல்கள் இரத்தக் குழிவுகளினின்றும் (Blood Sinuses) திண்ணிய நாளம் அல்லது கயிறு போன்று அமைந்துள்ளன. இந்த திண்ணிய நாளத்தில் குரோமோபோப் (Chromophobe) செல்களும், பேசோபைல் அல்லது அசிடோபைல் வகையைச் சார்ந்த (Basophile, Acidophile) சிறு மணிகள் போன்ற குரோமோபைல் செல்களும் அமைந்துள்ளன. மற்றும் ஏறக்குறைய 50 பறவை சிறப்பினங்களில் இந்தப் பகுதியினைக் குறித்து ஆராய்ந்ததன் மூலம் இப்பகுதியில் தலைப்பகுதி (Cephalicregion) வால் பகுதி (Caudalregion) என்ற இரு தனித் தனிப்பகுதிகள் இருப்பதைக் கண்டுபிடிக்கப்பட்டுள்ளன. வால் பகுதியில் 'A1' அசிடோபைல் பாலுட்டிகளின் பிட்டியூட்டரி அசிடோபைலினை ஒத்து அமைந்துள்ளது. இது ஃபூச்சின் (Fuchsin) என்ற நிறமியுடன் இணைந்தால் கிடிப்பு அல்லது ஆரஞ்சு கலத்த கிடிப்பு நிறத்தை உண்டாக்குகின்றது. தலைப்பகுதியில் 'A2' அசிடோபைல் உள்ளது. இது அளவில் மிகச் சிறு திண்ணிய மணிகள்

1. பிட்டியூட்டரி சுரப்பி பொருந்தியுள்ள இடம், 2. இடது ஜுகுலார்சிரை, 3. தைமஸ் சுரப்பிகள், 4. இருகயம், 5. உணவுக் குழாய், 6. அட்ரீனல் சுரப்பி, 7. சிறுநீரகம், 8. டியோடினம், 9. கண்களும், 10. வித்தகம், 11. முதுகுப் பெருத்தமனி, 12. வலது நுரையீரல், 13. சப்ளினேவியன் தமனி, 14. தைராய்டு சுரப்பி, 15. தோல் மடிப்பு, 16. காற்றுக் குழாய், 17. எலும்புப் பகுதி, 18. பிட்டியூட்டரி முன் இதழின் தலைப்பகுதியிலுள்ள போர்ட்டல் நாளங்கள் 19. பிட்டியூட்டரி முன்இதழின் வால் பகுதி போர்ட்டல் நாளங்கள், 20. இணைப்புத் திகத் தடுப்பு, 21. பிட்டியூட்டரி பின் இதழின் இரத்த நாளங்கள், 22 & 24. பார்ஸ் ப்யூபெராலிஸ், 23. மூன்றாவது வெண்ட்ரிகிளின் குழி, 25. மையப்புடைப்பு, 26. கண் நரம்பு குறுக்கமைப்பு, 27. இடது வேகல் நரம்பு அல்லது சஞ்சாரி நரம்பு, 28. மேல் கர நரம்புவலைப் பின்னல் (Brachial Plexus).

பொய்லுள்ளது. இது பிங்குச்சின் உடனிலைந்தாய் இரத்த செப்பு (Scarlet) நிறத்தை உண்டாக்குகின்றது. தலைப்பகுதியில் பேசோபைக்கள் சிறியதாகவும் வாக் பகுதியில் உள்வளைவிட எண்ணிக்கையில் அதிகமாகவும் உள்ளது.

அடை காக்கப்படும் நிலையில் கோழிக்குஞ்சுகளில் பிட்டிபூட்டரி கர்ப்பியில் பேசோபைக்கள் மறைத்து அடையுள்ள சிறிய அரிடோபைக்கள் நிரப்புகின்றன. பேசோபைக்கள் கொளுடோட்ரோபிக் (Gonads, Tropics) ஹார்மோன்களை உற்பத்தி செய்கின்றன.

அரிடோபைக்கள் ப்ரோலாக்டின் (Prolactin) ஹார்மோன்களை உற்பத்தி செய்கின்றன. மற்றும் வளர்ச்சியுறுதலிற்குக் காரணமான ஒரு ஹார்மோனையும், கைராய்டு தூண்டு ஹார்மோனையும், அடீரீனோகர்டீகோட்ரோபிக் (Adreno cortico trophic) என்ற ஹார்மோனையும் உற்பத்தி செய்கின்றது. பார்ல் பியூபெராலில் (Pars tuberalis) பகுதி குரோமோபோய்ஸ் செல்களும், மற்றும் சில நெர்ப்பின்களில் குரோமோபிக் செல்களும் உள்ளன. மூளையின் ஹைப்போதாலமஸ் பகுதியிலிருந்து பிட்டிபூட்டரியின் பின் பகுதி வரை இன்றியமையாத ஒரு நரம்புத்தடம் (Nerve tract) அமைந்துள்ளது. மற்றுமொரு மூக்கியமான போர்ட்டல் இரத்த நாளப் பகுதி மூளையின் மையப்பகுதிக்கும் பிட்டிபூட்டரியின் முன்பகுதிக்கும் இடையில் அமைந்துள்ளது. மற்றும் இந்தப் பகுதியிலுள்ள இரத்த நாளத்திலுள் ஒரு சில வேதியியல் பொருட்களும் உள்ளே செலுத்தப் படுகின்றன. இப்பொருட்கள் முன் இதழ்களிலிருந்தும் இனப்பெருக்க உறுப்புகளைத் தூண்டும் ஒரு சில ஹார்மோன்களை உற்பத்தி செய்கின்றன.

பிட்டிபூட்டரியின் முன் இதழ்

இதன் செயல்திறமும் துகை அகற்றியிடக் ஏற்படும் விளைவுகளும்

கிழக்கண்ட ஹார்மோன்கள் பறவையின் பிட்டிபூட்டரி கர்ப்பியிலிருந்து கிடைக்கப் பெறுகின்றன:—

கோனோட்ரோப்பின்கள் (Gonotropins)

(a) பாரலிக்சின் தூண்டுஹார்மோன் (F.S.H.)

இது அடையுள்ள கிபாலிக்சின் கலையும் வித்தகத்திலுள்ள செல்களையும் அண்டமும் விந்துவும் உற்பத்திவாக்கத் தூண்டுகின்றன.

(b) கீழ்க்கண்ட ஹார்மோன் (L.H.) (Luteinizing)

இந்த ஹார்மோன்கள் மூலக்கூறுகளிலேயே நிறப்பாகச் செயல்படுகின்றன.

அட்ரினோ கார்டிகோ டிரோபிக் ஹார்மோன் (Adreno cortico tropic hormone) (ACTH):

இது நெருங்கிய தொடர்புடைய அட்ரினல் கிரிண்டிலும் செயல்படத் துண்டுகின்றன. இது அட்ரினல் கார்ட்டெக்ஸ் என்ற மூலக்கூறுகளில் பகுதிக்கு ஒப்பாகவுள்ளது. இந்த ஹார்மோன்கள் கோழிகளில் உள்ளது.

தையர்டு ஸ்டிமூலிங் ஹார்மோன் (Thyroid stimulating hormone) (TSH)

இந்த ஹார்மோன் கோழிகளுக்குள்ளே பிடிபட்டிருப்பதிலிருந்து கரத்ததாகக் கண்டுபிடிக்கப்பட்டுள்ளது.

ப்ரோலாக்டின் அல்லது கீழ்க்கண்ட ஹார்மோன் (Prolactene or luteo tropic hormone)

இந்த ஹார்மோனும் கோழிகளிலேயே இருப்பதாகக் கண்டுபிடிக்கப்பட்டுள்ளது. கண்பை சுரப்பியைத் தூண்டும் ஹார்மோன்களும், பெரிசு தையர்டு சுரப்பியைத் தூண்டும் ஹார்மோன்களும் பறவைகளில் இருப்பது குறித்து இன்னும் அறிய இயலவில்லை. வளர்ச்சியைத் தூண்டும் ஹார்மோன்களும் பறவைகளில் கண்டுபிடிக்கப்படவில்லை. ஆனால் மூலக்கூறுகளின் வளர்ச்சி ஹார்மோன்கள் பறவையின் உடலில் ஏற்றிதரும், முட்டையிலும் தன்மை நிறுத்தப்பட்டுவருகின்றன. பறவை சிறிது வளர்ச்சியுள்ளது. முதிர்ச்சி வந்த வயதான பறவைகளில், மூலக்கூறுகளின் வளர்ச்சியைத் தூண்டும் ஹார்மோன்களைச் செலுத்தினால், இரத்தத்தில் உதிர்ந்து புதிய இரத்தம் முளைக்கின்றன. வளர்ச்சி மாதிரிகள் ஏற்படும் செயலினாலும் பிடிபட்டிருக்க சுரப்பியின் மூலம் இதழ்கள் சுரக்கச் செய்யும் ஹார்மோன்களை காரணமாகும். பரஸ் இன்டர்மீடியா (Para intermedia) என்ற பகுதி பறவைகளில் இல்லாவிடினும், இன்டர்மீடியா (Intermedia) என்ற ஹார்மோன் பிடிபட்டிருப்பதில் மூலம் இதழ்களின் உதவியால் சுரக்கின்றன. இந்த ஹார்மோன் நியட்ரோ மெலாநோபார்சு (Melanophore) என்ற நிறமிக்க பெரிதாகப் பயன்பட்டும், பறவைகளில் அச்செயலில் செயல்படுகிறது. தையர்டு ஹார்மோன் ஹார்மோன் செயல்படுகின்றது.

பிட்டியூட்டரி சுரப்பிகளால் சுரக்கச் செய்யும் ஹார்மோன்கள் மற்ற சுரப்பிகளில் ஹார்மோன்கள் சுரத்ததைத் தூண்டுகின்றபடியால் இந்த உறுப்பினை நாளமில்லா சுரப்பிகள் எல்லாவற்றினாலும் தலைமையான உறுப்பாகக் கருதப்படுகின்றது. இனப்பெருக்க உறுப்பு களைத் தவிர மற்றச் சுரப்பிகள் செயல்படுகின்றதா என்பது பிட்டியூட்டரியின் ட்ரோபிக் (Tropic) ஹார்மோன் சுரப்பை பொறுத்துள்ளது. பிட்டியூட்டரி சுரப்பியை அறுவை நிச்சிதை மூலம் வெட்டி எடுத்துவிட்டால் தைராய்டு சுரப்பியும், அட்ரீனோ கார்ட்டிகல் சுரப்பியும் ஒரு சிறிதே செயல்படுகின்றன. தைராய்டு சுரப்பியினை பிட்டியூட்டரியின் தைராய்டு தூண்டு ஹார்மோன்கள் தூண்டுகிறது, தைராய்டு ஹார்மோன்களை உற்பத்தி செய்கின்றன. இந்த தைராய்டு ஹார்மோன்கள் பிட்டியூட்டரியின் தைராய்டு தூண்டு ஹார்மோன்களை சிறப்பிற் செயல்படும்படி செய்கின்றது. இவ்வாறு இவைகள் ஒன்றை ஒன்று தழுவிச் செயல்படுகின்றன.

தைராய்டு தூண்டு ஹார்மோனின் → தைராய்டு சுரப்பிகளை செயல்
சுரத்தல் TSH → படத் தூண்டுகின்றது.

தைராய்டு ஹார்மோன்

தைராய்டு தூண்டு ஹார்மோன்களைச் → அதனால் தைராய்டு ஹார்
மோன் சுரக்கின்றது.

கோழிக்குஞ்சுகள், குள்ள வாத்துகள், புருக்கள் முதலியவற்றில் பிட்டியூட்டரி சுரப்பியினை அறுவை நிச்சிதை மூலம் வெட்டி எடுத்த பின்பு, விளைந்த விளைவுகள் கீழ்க்கண்டவாறு இருந்தன என்று கொடுக்கப்பட்டுள்ளது. உடலின் வளர்ச்சி பெரிதும் குறைந்து விட்டன. வளர்சிதை மாற்றமும் நினை மாறாமல் அமைத்துவிட்டது. தைராய்டு அட்ரீனல்கள், இனப்பெருக்க உறுப்புகள் முதலியவைகள் தேய்வடைந்து விடுகின்றன. சிறுகுடல், கல்லீரல், கிணையம், திணிப் பை முதலிய பகுதிகள் புழுவில் ஒடுக்கப்பட்டு விடுகின்றன. உடலின் வெப்ப நிலை குறைந்து விடுகின்றது. உடலின் மற்றச் செயல்களும் மிகவும் குறைந்தே காணப்படுகின்றன. பறவை தன்னீர் உணவு முதலானவையும் ஒரு சிறிதளவே உண்ணுகின்றன. இவ்வாறான பல மாற்றங்களை பிட்டியூட்டரி சுரப்பி அகற்றப்படுவதால் ஏற்படு கின்றன.

ப்ரோலாக்டின் (Prolactin)

பெட்டைக் கோழிகளின் பிட்டியூட்டரி சுரப்பிகளிலிருந்து இந்த ஹார்மோனினி பிரித்து எடுத்துள்ளனர். பாதாட்டிகளில் இந்த ஹார்மோன் பால் சுரப்பிகளில் பாவினை சுரக்கச் செய்கின்றது. புழுவில் இந்த ஹார்மோன் வளர்ச்சியைத் தூண்டுகின்றதும், தங்கு

பைகளில் புரூப் பாலைச் சுரக்கச் செய்யவும் பவனுள்ளதாகவிற்குக் கின்றது. இங்விடத்தில் ப்ரோலேக்டின் ஹார்மோனின் செய் ஹோற்றுமையை அறிவனாம். புரூவில் ஆண் பெண் ஆகிய இரு இனங்களிலுமே இந்த ஹார்மோன் உள்ளது. புரூவிலும் கோழியிலும் இரு இனங்களிலும் கோனூடோட்ரோப்பின் (Gonadotropin) ஹார் மோனின் செயலை ப்ரோலேக்டின் அழுத்திவிடுவதையுடைய இத்தீர் கோனூடோட்ரோப்பின் ஹார்மோனிற்கு எதிர் செயலை செய்வதாகக் கருதப்படுகின்றது.

இந்த ப்ரோலேக்டின் ஹார்மோன் புரூக்களிலும் கோழிகளிலும் அடை காக்கும் உணர்வைத் தூண்டுகின்றன. பறவைகளில் அடை காக்கும் உணர்வுத் தூண்டுதலிற்குப் பிறகு ஆண் பெண் இனங்களில் வேறு எவ்விதமான தூண்டுதல்களையும் பார்க்க முடியாது. அதற்கு இந்த ப்ரோலேக்டின் நடத்தும் எதிர்ச் செயல்களே காரணமாக விற்கும் என்று கருதப்படுகின்றது. கோழிகளில் அடை காக்கும் நாளிலிருந்து குஞ்சுகள் முட்டையிலிருந்து வெளிவரும்வரை, பிட்டியூட்டரீயின் ப்ரோலேக்டின் ஹார்மோனின் செயல் ஒரே மாநிலி லாகவிற்கும், முட்டையிலிருந்து குஞ்சுகள் வெளிவந்த பின்பு பெட்டைக் கோழிகள் குஞ்சுகளைப் பேணி வளர்க்கும் முறைக்கு இந்த ப்ரோலேக்டின் ஹார்மோன்கள் காரணமாகாது. புரூக்களில் ப்ரோலேக்டின் ஹார்மோன் இரகுதீர், செயலை (Molt) தடுக் கின்றது. இரத்தத்தில் சர்க்கரைப் பொருள் கூடுதலிற்கும் காரண மாகவுள்ளது. மற்றும் இந்த ஹார்மோனின் செயல்படு தன்மையால் கல்சீரல், கிணயம், குடல் முதலிய பகுதிகள் எடையில் கூடுதலடை கின்றன. தைராய்டு சுரப்பியை அகற்றியிலுளும் வளர்சிதை மாற்றமும் அதிகரிக்கின்றன. அடை காக்கும் தன்மை இவ்வாத கிகப்புத் தலை வாத்து போன்ற பறவைகளில் ப்ரோலேக்டின் ஹார்மோன் கிடைபாது.

பிட்டியூட்டரீயின் பின் இதழ்

மற்ற ழுதசெலும்குள்ள பிராணிகளில் பிட்டியூட்டரீயின் பின் இதழ் சுரக்கச் செய்யும் ஹார்மோன்களையே பறவைகளின் பிட்டியூட்டரீ சுரப்பி சுரக்கச் செய்கின்றது. வர்சோப்ரேசின் (Vasopressin) ஆக்சிடோசின் (Oxytocin) ஆன்ட்டியூரிட்டிக் பொருள் (Antidiuratic) ழுதணானவை கோழியின் பிட்டியூட்டரீ பின் இதழ்களிலிருந்து கண்டுபிடிக்கப்பட்டுள்ளன. கோழிகளில் இத்தப் பகுதிகளால் சுரக்கச் செய்யும் ஹார்மோன் இரத்த அழுத்தத்தை வெகுளாகக் குறைக்கின்றது. ஆனால் பாலூட்டிகளில் இத்த ஹார்மோன் இரத்த அழுத்தத்தை அதிகரிக்கச் செய்கின்றது. இத்தப்

பகுதியின் ஆக்ஸிடோசின் இரத்த அழுத்தத்தை எப்பொழுதும் குறைக்கின்றது. ஆனால் மற்றொரு ஹார்மோனான வானோபீரின் இரத்த அழுத்தம் குறைந்தால் அதிகரிக்கச் செய்யவும், அதிகரித்தால் குறைக்கவும் பப்னுள்ளதாகவுள்ளது. ஆக்ஸிடோசின் பாதுண்டிகளில் கருப்பைச் சுவர்த் தசை கருங்குவதற்கு பயன்படுகின்றது. அதே போன்ற செயலொற்றுமைச் செயலி பறவைகளின் அண்ட நாளத்தில் ஏற்பட இந்த ஹார்மோன் பயன்படுகின்றது. இந்த ஹார்மோன் புருவில் மூட்டையைச் சுற்றி ஒரு மூடுவதற்கு மூம்பே மூட்டையை வெளியேற்றிவிடுகின்றது.

ஆன்ட்டிடையூரிட்டிக் ஹார்மோன் (Antidiuretic)

சிறுநீரின் கன அளவிற்குக் குறைத்து தண்ணீரை சிறுநீரிலிருந்து உறிஞ்சி அதற்கு உடலிற்கு தேவையானத் தண்ணீரை பாதுகாக்க உதவுகின்றது. இந்தப் பகுதியை பறவைகளில் வெட்டி எடுத்து விட்டால் அதிக கன அளவுள்ள சிறுநீர் வெளியேற்றப்பட்டு, பறவை தாக்கத்தினால் மிகவும் துன்புறும்.

தைராய்டு சுரப்பி


பறவையின் வளர்ச்சியின் பொழுது கருவில் முதல் இரண்டாவது செவுள் (Branchial pouch) பைகளுக்கருகில் வயிற்றும் ஸூத் தொண்டைப் பகுதியின் சுவரின் மையப் பகுதியிலிருந்து தைராய்டு சுரப்பிகள் வளர்ச்சியுறுகின்றன. பின்பு தொண்டைப் பகுதியுடனுள்ள தொடர்வை துண்டித்துக் கொண்டு இருபுறமும் இரு இடத்தில் கனாகக் காணப்படுகின்றன. பறவைகளின் தைராய்டு, மற்ற மூன்று கெலும்புள்ள பிராணிகளில் உள்ளது போன்றே கட்டமைப்பில் காணப்படுகின்றன. தைராய்டு சுரப்பிகள் பார்வைக்கு வட்ட வடிவ பைகள் போன்றிருக்கும். இந்த வட்டப் பைகளைச் சுற்றிலும் இணைப்புத் திசுவின் பெட்டைப் பகுதியுள்ளது. ஒவ்வொரு பையும் ஒரு எப்பித்தீலியல் செல் அடுக்கினால் ஆனது. இதனுள் ஒரே மாதிரியாக அமைப்பெற்றத் (Homogeneous) திரவம் உள்ளது. ஆதலுக்கு தைராய்டு கொண்டு என்று பெயர். வட்டப் பை அருகே அமைந்துள்ள மற்றொரு வட்டப் பையினின்றும் இணைப்புத் திசுக்களால் பிரிக்கப்பட்டுள்ளது. இப்பகுதியில் சிறப்பாக அமைப்பெற்ற இரத்த நாளங்கள் உள்ளன. இந்தப் பகுதியிலுள்ள எப்பித்தீலியல் செல்கள் மற்றத் திசுக்களைக் காட்டிலும் கருகறுப்பாக இயக்கி இரத்தத்திலுள்ள ஆயோடின் பிரித்தெடுத்து, பாதுண்டிகளில் திகழ்வது போன்றே அயோடின் அமினோ அமில டைரோசின் ஐடன் (Amino acid tyrosine) இணைத்து அயோடின் டைரோசின்

கூட்டுப் பொருள்களைத் தோற்றுவிக்கின்றது. இதில் இரண்டு மூலக் கூறுகள் அறுத்தப்பட்டு ஒரு தைராக்சின் (Thyroxine) மூலக்கூறுக மாறுகின்றது. இந்த தைராக்சின் தறார்மோன் புரதப் பொருளுடன் கலந்து தைரோக்ஸோபுளூயின் (Thyroglobulin) என மாறுகின்றது. தைரோக்ஸோபுளூயின் தைராய்டு கொவாய்டிக் சேமித்து வைக்கப் பட்டு உள்ளது. தன்மூக செயல்படும் தைராய்டு கரப்பிகளில் கொவாய்டு தொடர்ந்து பயன்படுத்தப்படின் அவைகளுக்கு மிகச் சிறிய பைகள் உள்ளன. கங்குக் செயல்படாத தைராய்டு கரப்பிகளில் இவைகள் மிகவும் பெரியதாகக் காணப்படுகின்றன. மறிமப் பிராணி களைப் போன்றே பறவைகளிலும் தைராய்டு கரப்பிகளில் அலோய்டுக் குறைந்தால் கர்பிட்டர் (Goiter) என்ற பெரிய புடைப்பு கோழிகளில் ஏற்படும். தைராய்டு தறார்மோன், பிஹட்டிஹட்டிக்ளின் மூன் இதழ் களில் கரக்கின்ற தைராய்டு தூவ் தறார்மோன்களின் செயலி னுமேயே செயல்படுகின்றது.

பருவகால மாற்றங்கள்

மித வெப்பமான (Temperate) காலங்களிலும், குளிர் காலங் களிலும், தைராய்டு கரப்பி மிக வும் கறுகறுப்பாகவே இயங்கு கின்றது. அப்பொழுது உடலில் அதிக வெப்பம் வெளியேற்றப் படுவதால் அதிக வளர்சிதை மாற்றமும் ஏற்படுகின்றது.

சிட்டுக்குருவி, காகம், புழு, கோழி, குள்ளவாத்து போன்ற பறவைகளில் தைராய்டு கரப்பி யின் செயல்படு தன்மையை, இலியுதிர் காலம், குளிர் காலம், இளவேனிற் காலம், கோடை காலம் போன்ற எல்லாப் பருவ காலங்களிலும் ஆராய்ந்தறித் துள்ளனர். இலியுதிர் காலத்தி லும் குளிர் காலத்திலும் தைராய்டு கரப்பி அதிக கறுகறுப் பாகச் செயல்பட்டது என்றும் இளவேனிற் காலத்திலும் கோடை காலத்திலும் அவ்வளவு கறுகறுப்பாக இயங்கவில்லை என்றும் கண்டு பிடிக்கப்பட்டுள்ளது. சிட்டுக் குருவியை அதிக வெப்பமில்லாத



படம் 44. செவ்வின் மீது நாளயிவ் வாச் கரப்பிகளின் அமைப்பு

1. தைமஸ், 2. தைராய்டு,
3. பெராதைராய்டு.

குளிர்ந்த நிலையில் வைத்தால் அதில் எதராய்டு கரப்பி வேகமாக இயங்குகின்றது. மற்றும் உடலின் வளர்சிதை மாற்றத்தின் வேகமும் அதிகரிக்கின்றது. கோழிகளில் எதராய்டு தூண்டு ஹார்மோன்களின் அளவு கோடைக் காலத்தையிட குளிர் காலங்களில் அதிகமாக விகுக்கும். பறவைகள் வகுடத்தில் ஒரு முறை இறகுநீர் செய்னை (Moult) மேற் கொள்ளுகின்றன. அந்தக் காலங்களில் மீத வெப்பமாகவிகுக்கும் சமயங்களில் எதராய்டு கரப்பிகள் விரைவாக செயல்படுகின்றது. இதுபோன்ற செயலை கிட்டுக்குருவி, மரங்களில் வாழும் குருவி வகைகள், ராபின் முதலானப் பறவைகளில் காணலாம்.

எதராய்டு ஹார்மோனின் பொதுவான விளைவுகள்

பொதுவாகப் பறவைகள் வளர்ச்சியுறுதலிற்கும் இனப்பெருக்க உறுப்புகளின் வளர்ச்சிக்கும் எதராய்டு ஹார்மோன் மிகவும் இன்றியமையாத தொன்றாகும். எதராய்டு கரப்பியினை அறுவை செய்து அதற்றிவிட்டால் பறவைகளில் வளர்ச்சி பெரிதும் பாதிக்கப்படுகின்றது. கோழிகளிலும் எதராய்டு நீக்கப்படிச் சூழ்நிலைப்பறவைகளாகவே வளர்ச்சியுறாமல் காணப்படுகின்றன. சேவட்களில் கோண்டைப் பகுதியின் வளர்ச்சி ஒடுக்கப்பட்டு விடுகின்றது. மற்றும் பறவையின் வளர்சிதை மாற்றமும் ஒடுக்கப்படுகின்றது. இதனால் வரத்துகளில் கல்வீரல் பெரிதாக்கப்படுகின்றது. வளர்சிதை மாற்றம் சரிவாக நடைபெறாத காரணத்தினால் வரத்துகளில் எதராய்டு நீக்கப் பட்டால் கொலஸ்டிரால் (Cholesterol) கொழுப்பு அமிலம் (Fatty acids) பிளாஸ்போலிப்பிடு (Phospho lipids) முதலானப் பொருட்கள் இரத்தத்தில் அதிகமாகக் காணப்படுகின்றன. எதராய்டு ஹார்மோன் இரத்தத்தில் சர்க்கரைப் பொருளின் அளவை கூட்டுவதுடன் கிப்பு கார்ப்பசங்களின் எண்ணிக்கையையும் அதிகப்படுத்தி தூண்டு கின்றது. அதனால் கோழிகளில் இருதயம் சரிவர இயங்குகின்றது என்று ஆராய்ச்சியின் மூலம் கண்டறிந்துள்ளனர்.

பறவைகளின் எதராய்டு கரப்பியும் வலசை போகும் நிமிஷமும்

பறவைகள் வலசை போகும் காலங்களில் அதன் உடலின் வளர்சிதை மாற்றத்தின் அளவு அதிகரிக்கின்றது. வளர்சிதை மாற்றத்தின் அளவு அதிகரிக்கும் பொழுது எதராய்டின் ஹார்மோனின் தூண்டுதலும் அதிகமாகவே இயங்குகின்றது. வலசை போகும் காலங்களில் குறிப்பிட்டப் பறவைகளில் எதராய்டு கரப்பியினை அறுவை செய்து அதற்றி நடத்திய சோதனைகளிலிருந்து அறியத்தக்க செய்திகள் அதிகமாகக் கிடைக்கவில்லை. அதாவது சுற்றுச் சூழ்நிலையின் தன்மையைப்

பொருத்துதான் பறவைகள் வலசை போகின்றதெய்வம்வளம் உள்ளது
றுப்புகளின் மாற்றங்கள் அவ்வளவு இன்றியமையாததல்ல.

கூண்டுளில் அடைத்து வைக்கப்பட்டுள்ள ராபின், வெள்ளைக்
கழுத்து சில்வியா (Sylvia) பறவைகள் முதலானவற்றில் வலசை
போகும் பருவ காலங்களில் தைராக்கின் ஹார்மோன் உடலினுள்
ஊடு மூலம் செலுத்திடுமாறும் இராக்காலங்களிலேயே வலசை
போகும் பழக்கமுள்ள இவைகள், இரவு நேரங்களில் கூண்டுகளில்
அடைத்து நிறியது தெரிகின்றது. இவ்வாறான தூண்டுதல் தைராக்கின்
ஹார்மோனினாலேயே ஏற்பட்டு இதுக்க வேண்டுமென்று கருதப்படு
கின்றது.

தைராய்டு சுரப்பி இனப்பெருக்க உறுப்பு இவற்றின் தொடர்புறவு

பறவைகளில் இனப் பெருக்க உறுப்புகள் தைராக்கின் ஹார்
மோனின் தூண்டுதலாலேயே செயல்படுகின்றது. இனப்பெருக்க
உறுப்புகள் தன்னை வளர்ச்சியுற்ற இனம் கோழிகளில், தைராய்டு
சுரப்பியின் அறுவை செய்து எடுத்துவிட்டால், இனப்பெருக்க உறுப்
புகள் தேய்வடைந்து விடுகின்றன. சேவல்களின் கொண்டைப்
பகுதியும் தேய்வடைந்துவிடுகின்றன பறவை எடைவீதும் குறைந்து
விடுகின்றது. தைராக்கின் ஹார்மோன் ஆண் வாத்ருகன்,
கோழிகள், காட்டு வாத்ருகன் (Mallard) முதலியவற்றில் மீத்தகங்
களை தன்னை வளர்ச்சியுற்று செயல்படத் தூண்டுகின்றது. இவ்வாறு
தைராக்கின் ஹார்மோனின் செயல்படு தன்மை, பீட்டிஹூட்டர் சுரப்
பியின் ஹார்மோனாக கோனூட்ரோபின் (Gonadotrophin)வின்
தூண்டுதலாலேயே ஆகும்.

மற்றும் கோழிகளில் தைராய்டு சுரப்பி ஹார்மோன் மூட்டை
உற்பத்தியையும் அதிகரிக்கச் செய்கின்றது. மூட்டையிலும் கோழி
களில் தைராய்டு சுரப்பியின் அறுவை செய்து எடுத்துவிட்டால்
மூட்டை உற்பத்தி குறைந்துவிடுவதுடன், மூட்டை ஓட்டில் கண்
னும்பு உப்பின் அளவும் குறைந்துவிடும், விடைச் சேவல் (Cockreals)
களிலும் வாத்ருகளிலும் மீத்தகங்களின் அதிகப்படியான செயல்படு
தன்மை பீட்டிஹூட்டர் சுரப்பியின் தைரோட்ரோபிக் (Thyrotrophic)
ஹார்மோனின் செயலால், செயல்படாமல் அழுத்தி விடுகின்றது.
எஸ்ட்ரோஜென்(Estrogen) ஹார்மோன் உள்ளே செலுத்தப்படுமானால்
அது பிளாஸ்மா லிப்பிட் (Plasmalipid) கேஸ்ஸியம் பிளாஸ்மா புரதம்
போன்றப் பொருள்கள் அதிகரிக்கச் செய்யும். தைராக்கின் ஹார்
மோன் மேலே குறிப்பிட்டப் பொருட்களை உற்பத்தியாகாமல் தடுக்க

கின்றது. கோழிக்குஞ்சுகளில் அடுக்கப்படியான கைராய்டு ஹார் மோன்களின் தூண்டுதல்களால் இனப்பெருக்க உறுப்புகள் செயல்படும் தன்மையில் அழுத்தப்பட்டு விடுகின்றது.

இறகு வளர்ச்சி, இறகு கிறம், இறகுநீர்ச் செயல் முதலியவைகளுடன் கைராய்டு கரப்பியின் தொடர்புறவு

கைராய்டு கரப்பியின் சாதாரணமாகப் பறவைகளில் அகற்றி விட்டால், இறகு வளர்ச்சி பெரிதும் ஒடுக்கப்பட்டு விடுகின்றது. பின்னும் இறகுகள் வளர்ச்சியுற்றாலும், சாதாரணமாகியல்லாமல் தோற்றத்தில் பெரிதும் மாறுபட்டே காணப்படுகின்றது. அந்த மாநிலியான இறகுகள் நீண்டும் பக்கவாட்டிலும் மிகவும் குறுகியும் காணப்படுகின்றது. பின்னும் அவை அழுத்தமாகியல்லாமல் பிசித்தே காணப்படுகின்றன. இறகு நுண்ணுங்களில் வளர்ச்சி பெரிதும் ஒடுக்கப்பட்டுவிட்டபடியால், அந்த இறகுகள் அழுத்தமாகியல்லாமல் பிசித்து காணப்படுகின்றன. கைராய்டு கரப்பிகள் அகற்றப்படுகின்றபொழுது இந்த மாறுதல்களை கோழிகள், புழுக்கள், காட்டு வாத்துகள், மெக்பி பறவைகள் (Magpie) முதலானவற்றில் நடத்திய சோதனைகள் மூலம் கண்டுபிடிக்கப்பட்டுள்ளன. இதற்கு நேர்மாறாகச் சாதாரண பறவைகளில் கைராக்கின் ஹார்மோன் உடனினுள் செலுத்தினாலும்கூட குட்டையான அகன்ற வட்ட வடிவமான இழையோரங்களுடன் கூடிய இறகுகள் தோன்றுகின்றன.

மற்றும் இறகுகளின் நிறங்களின் தன்மை கைராக்கின் ஹார்மோனின் செயலால் பெரிதும் வேறுபடுகின்றது. புழுநில் கைராய்டு கரப்பியின் அகற்றிவிடலும் இறகு நிறங்களில் ஒரு மாற்றமும் உண்டாவதில்லை. கோழிகளில் கைராய்டு கரப்பியின் அகற்றிவிட்டால் கறுப்பு நிற இறகுகளெல்லாம் நவ வ கிப்பு கனத்த பழுப்பு (Reddish brown) நிற இறகுகளாக மாறிவிடுகின்றன. கைராக்கின் ஹார்மோன் உடலில் செலுத்தினால் இறகுகள் கருநிறத் தன்மையை பெறுகின்றன. இது போன்ற செயல்களை காட்டு வாத்துகளிலும் சோதனைமூலம் கண்டறிந்துள்ளனர். மற்றும் கோழிகளில் கைராய்டு கரப்பியின் அகற்றி விட்டால் ஸ்பர்(Spur) என்ற புறத்தோல் உறுப்பு தேய்வடைத்து டார்சோ மெட்ட டார்சல் எனப்பட்ட உள்ள தொடர்புடன் சிறிது கழன்று காணப்படும்.

இறகுநீர் செயலிலிருக்கும் கைராய்டு கரப்பியின் தூண்டுதலிற்கும் உள்ள வேற்றுமைகளைக் குறித்து இப்பொழுது நடைபெற்ற சோதனைகளிலிருந்து நமக்கு கீழ்க்கண்ட தகவல்கள் கிடைத்துள்ளன.

1. தைராய்டு ஹார்மோன் உடலினுள்ளே செலுத்தப்படின், அல்லது தைராய்டு சுரப்பு துகள்களாக உணவுடன் கலந்து கொடுக்கப்படின் அல்லது பிட்டியூட்டரி சுரப்பியின் ஹார்மோனான தைராய்டு தூண்டு ஹார்மோனின் உடலினுள் செலுத்தப்படின், இறகுதிரிச் செயல் மிகவும் சிறப்பாக நடைபெறுகிறது. இச்செயல் அதிகமாகக் காணப்படின் இனப்பெருக்க உறுப்புகள் ஒடுக்கப்படுகின்றன. கொண்டைப் பகுதி ஒடுக்கப்படுகின்றது. தசைத் தொங்கல் (Wattle) பகுதியும் ஒடுக்கப்படுகின்றது.

2. ப்ரோஜெஸ்டீரான் (Progesterone) ஹார்மோன் உடலினுள் செலுத்தப்படினும் இறகுதிரிச் செயல் அதிகரிக்கின்றது. அதனால் முட்டை உற்பத்தியும் குறைக்கப்படுகின்றது. இனப்பெருக்க உறுப்புகள் ஒடுக்கப்படுகின்றன.

3. பிட்டியூட்டரி சுரப்பிகள் கோனோடோட்ரோப்பின் (Gono-trophin) ஹார்மோன்களைச் சுரக்கச் செய்ய என்ஹெப்டின் (Enheptin) என்ற பொருள் தேவைப்படுகின்றது. ஆனால் இப்பொருள் தைராய்டு தூண்டு ஹார்மோனின் சுரத்தலைத் தடுக்காது. இவ்வாறு கோனோடோட்ரோப்பின் ஹார்மோன் சிறப்பாக செயல்படுவதால், இறகுதிரிச் செயலும் சிறப்பாக நடைபெறுகின்றது. ஆனால் இனப்பெருக்க உறுப்புகள் வளர்ச்சியடைவதில்லை.

4. பிட்டியூட்டரி சுரப்பியின் அறுவை (Hypophyrectomy) செய்து எடுத்துவிட்டால் கோழிகளின் இறகுதிரிச் செயல் நடைபெறுகின்றது.

5. கோழிகளில் பாலூட்டிகளின் பிட்டியூட்டரி சுரக்கும் வளர்ச்சி ஹார்மோனை பறவைகளின் உடலினுள்ளே செலுத்தப்பட்டால் இறகுதிரிச் செயல் நடைபெறுகின்றது.

6. தைராய்டு சுரப்பியின் முழுமையாக நிரந்தரமாக வெட்டியெடுத்துவிட்டால் கோழிகளில் இறகுதிரிச் செயல் நடைபெற்று விடுகின்றது.

7. இனப்பெருக்க ஆற்றலழிப்பினால் பழுப்பு நிற ஆண் வெக்காரின் (Leg horn) பறவைகளில் இறகுகளும் உதிர்ந்து விடுகின்றன.

அட்ரீனல் சுரப்பிகள் (Adrenal)

நீள் உருளை வடிவமுடைய அட்ரீனல் சுரப்பிகள் பிரகாசமான மஞ்சள் நிறமாகவோ, ஆரஞ்சு நிறமாகவோ இருக்கின்றன. சிறு நீரகங்களின் முன்பக்கத்தில் தலைப்பகுதி இதழில் இவைகள் பக்கத்திற்

கொள்ளுக அமைந்துள்ளன. இச்சுரப்பிசிகள் ஒய்வொன்றும் இரண்டு தனித்துத் தெரியும் பகுதிகளைக் கொண்டது. பாதுாட்டிகளில் அட்ரீனலின் வெளிப்பகுதிக்கு புறணி அல்லது கார்ட்டெக்ஸ் (Cortex) என்றும், உள் பகுதிக்கு க்ரோமாஃப்பின் என்ற திகிலிலுமான (Chromaffin) அகணி அல்லது மெடுல்லா அல்லது கோர் (Medulla or core) என்றும் பெயர். பறவைகளின் அட்ரீனல் சுரப்பிகளின் இவ்விரு பகுதிகளும் கலந்தே காணப்படுகின்றன.

காச்ட்டிகல் ஹார்மோன்கள் (Cortical) மூன்று வகைப்படும்:—

1. தாதுஉப்பு கார்ட்டிக் காய்டுகள்:—(Mineral corticoids)

உதாரணம்:—அல்டோஸ்டெராண் (Aldosterone)

சோடியம் உப்பை நிறுத்திகிருந்து உறிஞ்சுவதும், பொட்டாசியம் உப்பினை உறிஞ்சுவதைக் குறைப்பதுவுமே இந்த அட்ரீனல் ஹார்மோனின் செயலாகும். வாதது, கோழி, புழு முதலிய பறவைகளில் அட்ரீனல் சுரப்பிகளை அகற்றிவிட்டால் அவைகள் இறந்துவிடும் என்று பரிசோதனைகள் மூலம் கண்டுபிடிக்கப்பட்டன.

2. கோனாடாய்டுகள்:—(Gonadoids)

எஸ்ட்ரோஜென் (Estrogen) அண்ட்ரோஜென் (Androgen) முதலிய ஹார்மோன்களுக்கு சாதாரண காலங்களில் அவ்வளவு முக்கியத்துவம் கிடைப்பாது. அட்ரீனல் கோனாடாய்டு சுரக்கப்படுவதால் இவ் ஹார்மோன்கள் (Sex hormones) பாதிக்கப்படுவதில்லை.

3. குளுக்கோ கார்ட்டிகாய்டுகள்:—(Glucocorticoids).

உதாரணம்:—கார்ட்டிசோன் (Cortisone)

ஹைட்ரோ கார்ட்டிசோன் (Hydro cortisone)

கார்ட்டிகோ ஸ்டெராண் (Cortico sterone)

முதலியன.

பறவைகளில் இந்த ஹார்மோன்கள் இரகத்தினிலுள்ள சர்க்கரைப் பொருளை அடுக்கிக்கச் செய்கின்றது. மற்றும் கிளைக்கோஜன் (Glycogen) கல்லீரலில் தேக்கி வைக்கப்பட உதவிபுரிகின்றது.

பாதுாட்டிகளைப் போன்றே பறவைகளிலும் அட்ரீனலின் சுரப்பியின் நீளம் இடைத் திசுக்கள், பிட்டிபூட்டரி சுரப்பி சுரக்கும் அட்ரீனோ கார்ட்டிகோ க்ரோயிக் ஹார்மோனின் தூண்டுதலால் வேவே செயல்படுகின்றது. வாததுகளிலும் புருக்களிலும், பிட்டிபூட்டரி சுரப்பியை அறுவை செய்து அகற்றிவிட்டால் நீளம் இடைத்

நிகக்கள் பெரிதும் கருவிலிருக்கின்றன. முதிர்ச்சியடைந்த கோழிகளில் கார்ட்டிசோன் ஹார்மோன்களின் செய்கையால் தைமஸ் சுரப்பி தேய்வடைகின்றது.

ரீனல் இடை லம்பராய்டு ஹார்மோன்களும் (Inter renal steroids) இனப் பெருக்க உறுப்புகளில் சில மாறுதல்களை உண்டாக்குகின்றன. அட்ரீனல் சுரப்பிகளை அறுவை செய்து அகற்றிவிட்டால், சேவகங்களில் வித்தகங்கள் கருவிலிருக்கின்றன. கொண்டைப் பகுதியும் தேய்ந்துவிடுகின்றது. கார்ட்டிசோன் ஹார்மோன் வித்தகங்களை விரிவடைபச் செய்கின்றன.

க்ரோமாஃபின் திசு (Chromaffin tissue)

அட்ரீனல் பகுதியின் ரீனல் இடைத் திசுவின் (Inter renal tissue) போல் க்ரோமாஃபின் திசு, பிட்டியூட்டரி சுரப்பிகளால் கட்டுப்படுத்தப் படவில்லை. பாதுஷ்டிகளில் க்ரோமாஃபின் செல்கள் பரிவு நரம்பு மண்டல தசை நாரீகளால் கட்டுப்படுத்தப் பட்டுள்ளது. அதே போன்று பறவைகளிலும் பரிவு நரம்பு மண்டலமே இச் செல்களின் செயல்படு தன்மையைக் கட்டுப்படுத்துகின்றது. இத்தச் செல்கள் ஆட்ரீனலின் (Adrenalin) னர் ஆட்ரீனலின் (Noradrenalin) என்ற இரு ஹார்மோன்களைச் சுரக்கச் செய்கின்றன என்பதை கோழிகளிலும் புளூக்களிலும் காணலாம். இத்த ஹார்மோன்கள் இரத்த நாளங்களிற் கருங்கச் செய்கின்றன. எனலுபுத்திக், இருதயம் போன்ற சில பகுதிகளில் இரத்த நாளங்களை விரிவடைபச் செய்கின்றன. இவைகள் இரத்தத்தில் ஒரு சிறிது நேரமே இயங்கும். பின்வு இரத்தத்திலுள்ள நொதிப்பொருள் இவற்றை அழித்துவிடும்.

பறவைகளில் அட்ரீனலின் ஹார்மோனின் இயக்குதன்மை, பாதுஷ்டிகளில் உள்ளதைப் போன்றே செயல்படுகின்றது. மிகச் சிறு அளவில் இருதயம் வேகமாக அடித்துக் கொள்ள உதவுகின்றது. இது பெரும் அளவில் இருத்தால் இருதயம் மிகவும் வேகம் குறைவாக அடிக்கின்றது. இது இரத்த அழுத்தத்தையும் சமமாக்குகின்றது. வாத்து, குள்ள வாத்து, கோழி, கோழிக்குஞ்சு முதலிய பறவைகளில் இத்த ஹார்மோனின் தூண்டுதலால் இரத்தத்தில் சர்க்கரைப் பொருள் அதிகமாகின்றது.

குடல் தசைகளையும் அட்ரீனல் ஹார்மோன் இயக்குகின்றது. பெர்ரி என்பவர் (Perry) ிட்டுக் குருவிகளில் தசைகளினுள் அட்ரீனலின் ஹார்மோன் ஊசி மூலம் செலுத்தி அதனால் ஏற்பட்ட விளைவுகளை ஆராய்ந்தார். தசைகளினுள் அட்ரீனலின் ஹார்மோன் செலுத்தப்படும்பொழுது குருவிகளில் இருபால் பறவைகளினும்.

இனப்பெருக்க உறுப்புகள் வளரவிடாமல் தடை செய்கின்றது என்பதைக் கண்டறித்தார்.

பேரா தைராய்டு சுரப்பிகள் (Para thyroid)

இரு சோடி பேரா தைராய்டு சுரப்பிகள் கரு வளர்ச்சியின் பொழுது மூன்றுவது நாள்களாவது செவுள் பைனாக்ஸுலில் ஒவ்வொரு பக்கமும் வளர்ச்சியுறுகின்றன. மற்றும் இவைகள் தைராய்டு சுரப்பிகளின் பின்பக்க ஓரத்தில் அமைந்துள்ளன. புரு, வரத்து, கோழி போன்ற பறவைகளில் மேலே குறிப்பிட்டுள்ளவாறு அமைந்துள்ளன. கோழிகளில் ஒரு பக்கத்து இரு இதழ்களும் இணைத்து காணப்படுகின்றன. சில பறவை இனங்களில் ஒரு பக்க இரு இதழ்களும் இணைத்து ஒரே இதழாகக் காணப்படுகின்றது. ஒவ்வொரு பறவையினும் உடலின் எடை 1 கிராமமாக விரும்பின் பேரா தைராய்டின் எடை 10 மில்லிகிராம் எடையாக இருக்கும். பாதுகாட்டிகளில் பேரா தைராய்டு சுரப்பிச் செய்களில் ஆக்சிபைல் செய்களை (Oxyphile cells) முக்கியமானவைகளாகும். இந்த ஆக்சிபைல் செய்கள் பறவைகளில் கிடையாது. இந்தச் சுரப்பிகளால் சுரக்கச் செய்யும் ஹார்மோனிக்கு பேரா தார்மோன் (Para thormone) என்று பெயர். இந்த ஹார்மோன் எலும்பியூள்ள கேல்சியம் உப்பைப் பிரிக்கத்தூண்டுகச் செய்து இரத்தத்தில் கேல்சியம் உப்பை அதிகரிக்கச் செய்வதே இதன் முக்கிய செயலாகும். நெருக்கங்களிலிருந்து பாஸ்பரஸ் (Phosphorus) லைப் பிரிக்கச் செய்யத் தூண்டுகளும் இதன் முக்கிய செயலாகும். இரத்தத்தில் கேல்சியம் உப்பு வரம்பினை சரிவான நிலையில் வைத்திருப்பதால் நரம்பும் திசுக்களும் சரியாக இயங்குகின்றன. இவ்வாறியுல் நரம்பியல் (Tetany) என்ற நரம்பு சார்ந்த நோய் உண்டாகும்.

நரம்புகளும் சரியாக இயங்காத நிலை—நரம்பியல் ஏற்படும் நிலையை சரிப்படுத்தாவிடின் பறவைகள் இறந்துவிடும். அந்த போன்று இரத்தத்தில் கேல்சியம் உப்பு அதிகமாகவிரும்பாது நரம்பு மண்டளமும், தசைகளும் சரியாக இயங்காது.

இதுபற்றி பல சோதனைகளை புரு, வரத்து, கோழி போன்ற பல பறவைகளில் நடத்தப்பட்டுள்ளன. பேரா தைராய்டு சுரப்பிகளை அகற்றி பேரா தார்மோன் (Para thormone) என்ற ஹார்மோனை உடலினுள் செலுத்தினால் கேல்சியம் உப்பு இரத்தத்தில் போதுமான அளவு அதிகரிக்கின்றது என்பதை வரத்து, புரு போன்ற பறவைகளில் சோதனை மூலம் கண்டுபிடிக்கப்பட்டுள்ளது. பிட்டிசுட்டரி சுரப்பிகளை அறுவை சிகிச்சையால் அகற்றியிட்டால் பேரா தைராய்டு சுரப்பிகளும் அவளில் சிறிது குறைந்து விடுகின்றன. பெட்டைக் கோழிகளில் கேல்சியம் உப்பு இரத்தத்துடன் கலந்து பரவியிருக்கும்

வளர்சிதை மாற்ற நிலையில் முட்டையிலும் நிலையுடன் இணைந்தே காணப்படுகின்றது. இது போன்ற கேம்பியம் உப்பு இரத்தத்தில் பரவி உள்ள நிலைக்கேற்ப முட்டையிலும் தன்மையில் மாற்றம் ஏற்படுவதை எஸ்ட்ரோஜெனிக் ஹார்மோன்களே (Estrogenic hormones) தூண்டுகின்றன. மிகுதியாக உள்ள எலும்புப் பொருள் மெடுல்லரி எலும்பில் (Medullary bone) சேர்த்து வைக்கப்பட்டு, முட்டையின் ஒரு உற்பத்தியாகும் பொழுது அதற்களிக்கப்படுகின்றது. எஸ்ட்ரோஜென் ஹார்மோன்களை, பேரா னைராய்டு கரப்பி கரக்கச் செயல்படும் ஹார்மோன்களான தூண்டுகின்றதா என்பது குறித்து சரிவரத் தெரியவில்லை. வாதங்களில் எஸ்ட்ரோஜென் ஹார்மோன்களின் தூண்டுதலாகப் பேரா னைராய்டு கரப்பிகள் பெரிதாக்கப்படுகின்றது. பேரா னைராய்டு கரப்பிகளை வாதங்களில் அகற்றினீட்டால், இரத்தத்திலுள்ள கேம்பியம் சீராக்கப்படுவதில்லை. புழுவில் இவ்வாறு ஏற்படுவதில்லை. வாதங்களில் மட்டுமே பேரா னைராய்டு கரப்பிகளின் ஹார்மோன்கள் எஸ்ட்ரோஜென் ஹார்மோன்களைத் தூண்டி அதனாக இரத்தத்திலுள்ள கேம்பியம் உப்பு சீரான நிலையில் அமைத்து, முட்டையிலும் நிலையில் முட்டைக்கு சீரான ஒட்டிகளை உற்பத்தி செய்வதே தூண்டுகின்றது. புழுக்களிலும் வாதங்களிலும் பேரா னைராய்டு கரப்பி தூண்டுதலின் பருவகால மாறுதல்கள் இவ்வுப் பெருக்க உறுப்புகளின் செயல்படுதன்மையுடன் இணைந்தே காணப்படுகின்றது.

தைமஸ் கரப்பி (Thymus)

பறவைகளின் தைமஸ் கரப்பி நிணநீர்க்கணுக்கள், பொதுப்புழை-பர்சா சிபேபிரசை (Bursa Fabricii) போன்ற திசுக்களில் காணப்படும் நிணநீர்த் திசுக்களைப் போன்ற திசுக்களாலேயே ஆனது. தைமஸ் கரப்பியும், பர்சா சிபேபிரசையும் பறவைகள் பால்முதிர்ச்சியடையும் பொழுது (Sexual maturity) உள்நோக்கி பெருகி பெரிதும் மாற்றமடைகின்றன. இது போன்ற மாற்றங்களாலேயே பறவை பால்முதிர்ச்சியடைந்து விட்டனவா என்று அறியலாம். வாதங்கள் முட்டையிலிருந்து வெளிவந்த 9 அல்லது 10 மாதங்களுக்குப் பின்பே பால் முதிர்ச்சியடைகின்றது. பெரிய வாதங்கள் போன்ற நீர்ப் பறவைகள் சுமார் இரண்டு வருடங்களுக்குப் பின்பே முதிர்ச்சியடைகின்றன. தைமஸ் கரப்பியை பறவைகளிலே பாதுாட்டிகளிலோ அறுவை செய்து எடுத்துவிடுவதால் குறிப்பிடத்தக்க மாற்றங்கள் எதுவும் நிகழாது என்று உறப்படுகின்றது. இந்தச் கரப்பி, மற்ற நிணநீர் கரப்பிகளின் செயல்படு தன்மைகளுடன் இணைந்து நிணநீர் செய்களை உற்பத்தி செய்கின்றது. பறவைகளின் தைமஸ் கரப்பி முதல் செவுள் பை, மூன்றாவது செவுள் பை முதலியவற்றினின்றும்.

வளர்ச்சியுற்றிருக்கின்றன. முதலில் பக்கத்திற்கு ஒரு இதழாகத் தொன்றிய இந்தச் சுரப்பி பின்பு பல இதழ்களாக பிரிந்துவிட்டன. நன்றாக முதிர்ச்சியுற்ற பறவைகளில் பெரிய கைமன் இதழ்களாக கழுத்தப் பகுதிக்கடியில் கோழிகளில் காணப்படுகின்றன. பேசுபவன் பறவைகளிலும் கிபாங்கோ பறவையிலும் கைமன் சுரப்பிகள் மிகவும் பெரியதாகவிருப்பதுடன், தாடைகளுக்கடியில் வளர்ச்சியுற்று ஆமைந்துள்ளன.

பீனியல் சுரப்பி

பீனியல் சுரப்பி குறித்து தற்போது எந்தவிதப் பரிசோதனையும் நடத்தப்படவில்லை. இது மற்ற நாளமில்லா சுரப்பிகளுடன் பொதுவாக இணைந்தே செயல்படுகின்றது என்பது தெளிவாகும். இது ஆகைப் பகுதியின் முதுகுப்புறப் பக்கத்தில் (Dorsal) ஆமைந்துள்ளது.

11. பறவைகளின் கழிவு மண்டலம்

சிறுநீரகங்களின் கட்டமைப்பும் (Structure) செயல்படு திறனும் (Functional) பாலூட்டிகளில் விசிவாக ஆராயப்பட்டுள்ளது. பாலூட்டிகளின் சிறுநீரகங்களைப் பற்றி அறிந்ததிலிருந்து, மற்ற மூது செலும்புள்ள பிராணிகளையும் குறிப்பாக பறவைகளின் சிறுநீரகங்களைப் பற்றி தெரிந்து கொள்ளுதல் எளிதாகும். அமைப்பில் பாலூட்டிகளின் சிறுநீரகத்திற்கும் பறவைகளின் சிறுநீரகத்திற்கும் பல வேறுபாடுகள் உள்ளன. பறவைகளில் செயல்படும் சிறுநீரகமான கடைதிறை கழிவு நீரகத்தில் (Meta nephros) ஒரு சிறந்த சிறுநீரக போர்ட்டல் மண்டலம் உள்ளது. சிறுநீரக போர்ட்டல் மண்டலம் அமைந்துள்ள காரணத்தினாலேயே ஊர்வனப் பிராணிகளில் உள்ளது போன்ற பறவைகளிலும் சிறுநீரகம் பல தனித்தனி இதழ்களாகப் பிரிந்துள்ளது. சிறுநீரக போர்ட்டல் மண்டலத்தின் கிளைகள் இந்த இதழ்பகுதிகளின் பரப்பிலேயே அமைந்துள்ளன. பறவையின் சிறுநீரகத்தில் சிறுநீரக துண்குழாய் (Nephrons) களில் ஹென்லியின் குழாய் (Loop of Henle) இருப்பினும், இவைகள் ஊர்வனப் பிராணிகளில் உள்ளது போன்றே அமைந்துள்ளன.

சிறுநீரிலுள்ள உப்பு வாயுக்கட்டுப்பாடுகள் (Nitrogenous compound) யூரிக் அமிலத்தன்மையாக இருத்தல் பறவைகளையும் ஊர்வனப் பிராணிகளையும் ஒன்றாகச் சேர்த்துள்ளன. சிறுநீரகங்களுக்குள் துழையும் இரத்தத்திலிருந்து சிறுநீரக துண்குழாய்கள் யூரிக் அமிலத்தை உறிஞ்சி எடுத்து விடுவதிலும் பறவைகளும் ஊர்வனப் பிராணிகளும் ஒன்றுபோலச் செயல்படுகின்றன. சிறுநீரகப் போர்ட்டல் மண்டலங்களின் வழியாகச் செல்லும் இரத்தத்திலிருந்தும் யூரிக் அமிலம் சிறுநீரக துண்குழாய்கள் வழியாக உறிஞ்சப்பட்டு விடுகின்றன. சிறுநீரிலிருந்து தண்ணீர் உறிஞ்சப்பட்டு யூரிக் அமிலமாக, யூரேட் சிறு துள்களாக மாற்றப்பட்ட நிலையில் கூழ் போன்ற பொருளாக வெளியேறுகின்றது. பறவைகளின் சிறுநீரகங்களை பாலூட்டிகளின் சிறுநீரகங்களுடன் ஒப்பிட்டு நோக்குவதால்

ஒரு சிறிது ஒற்றைமை மிகுப்பினும் அது பற்றிய ஆராய்ச்சி அவ்வளவு முக்கியமானதல்ல.

பறவை—சிறுநீரகத்தின் கட்டமைப்பு

சிறுநீரகங்கள் பொதுவாக முதுகுப்புறப் பக்கத்தில் வயிற்றுக் குழியில் பொருத்தப்பட்டுள்ளன. இரண்டு வளைவங்களுக்கிடையில் முதுகுப்புற பரப்பின் நீள் வரிப்பள்ளத்தின் மையத்தில் சிறுநீரகங்கள் பொருத்தி இருத்தலாக் காணலாம். பறவையின் ஒவ்வொரு சிறுநீரகமும் மேல் பரப்பில் பார்ப்பதற்கு மூன்று இதழ்களாகப் பிரிந்து காணப்படுகின்றது. இவ்வாறு இதழ்களாகப் பிரிந்து தெரியும் தன்மையைப்பற்றி தெரிந்தகொள்ள வேண்டியது அவ்வளவு முக்கியமானதல்ல. சிறுநீரகத்தின் உட்கோடு பன நுண்ணிய சிறு இதழ்கள் இருத்தலாக் காணலாம். ஒவ்வொரு நுண் இதழிலும் சிறுநீரக நாளத்தின் ஒரு சிறு கிளைபும், தெகிப்ராண்டுகளுடன் கூடிய சேகரிக்கும் நுண் குழாய்கள் நிறக்கும்படியும் அமைப்புப் பெற்றுள்ளது. ஒவ்வொரு நுண் இதழிலும் இரண்டு பகுதிகள் உள்ளன. முதல் பகுதிக்கு மெடுல்லரிப் பகுதி (Medullary part) என்று பெயர். அதில் தெகிப்ராண்டுகளின் குழாய்கள் அமைந்திருக்கும். இரண்டாவது பகுதிக்கு கார்ட்டிகல் பகுதி என்று பெயர். இதில் தெகிப்ராண்டுகளின் பெரும் பகுதி அமைந்திருக்கும். ஒவ்வொரு நுண் இதழிலும் இரத்த நாளங்கள் உள்ளன. அந்த இரத்த நாளங்கள் ஒரு நுண் இதழினுள் நுழைவது போன்று காணப்படினும் நுண் இதழ்கள் அருகருகே அமைந்துள்ள காரணத்தினால் இரண்டு நுண் இதழிலுமே இரத்த நாளங்கள் காணப்படுகின்றன. மையப்பகுதியான கார்ட்டிகல் பகுதி நுண் இதழில் ஒரு சிறையும் (Vein) ஒரு சிறு தமனிகளும் உள்ளன. அகத்த இரத்தத்தை சிறுநீரகங்களுக்கு எடுத்துச் செல்லும் சிறையின் ஒரு கிளைதான் நுண் இதழினுள் செல்கின்றது. கார்ட்டிகல் பகுதியின் பரப்பில் நீண்ட போர்ட்டல் சிறையின் கிளைகள் உள்ளன.

தெகிப்ராண்டுகள் (கழிவு நீரகக்குழாய்)

பறவைகளில் தெகிப்ராண்டுகளின் அமைப்பு இடம் முதலியவற்றைப்பற்றி தெருங்காலமாக ஆராய்ச்சிகள் தடைபெற்றன. அவற்றின் லின்ட்கிரேன் (Lindgren) க்லூபர் (Huber) என்பவர்களால் அவை பற்றி நடத்திய ஆராய்ச்சியே மிகவும் பயனுள்ளதாக உள்ளது. தெகிப்ராண்டின் நுண் அமைப்பிலேயும், அவைகள் சிறுநீரகங்களில் பொருத்தி உள்ள தன்மையையும் அவர்கள் மிகவும் சிறப்பாகக் கூறியுள்ளார்கள். தெகிப்ராண்டுகளில் இருவகையுள்ளன. ஒரு வகை தெகிப்ராண்டுகள் கார்ட்டிகல் பகுதியில் மட்டுமுள்ளன. மற்றொரு வகை கார்ட்டிகல் பகுதியில் அமைந்திருப்பினும் அவற்றின் நெறையிலின்

குழாய்கள் மெடுஞ்சலிப் பகுதிவரை நீண்டு அமைந்துள்ளன. இங் கிரண்டு வகை தெகிப்ரான்களையும் மைய தெகிப்ரான்கள் இணைத் துள்ளன.

நகரக வளர்ச்சியுற்று அமைந்துள்ள சிறுநீரகத்தில் பெளமெலின் பெட்டகம் (Bowman's capsule) ஒவ்வொரு தெகிப்ரானின் தொடக் கத்திலும் அமைந்திருப்பதைக் காணலாம். அவை மிகவும் நுண்ணிய அமைப்புடன் உள்ளன. கார்ட்டுகள் தெகிப்ரானில் மிகவும் நுண் குழாய்களுள் அண்மைப் பகுதி, நுண் குழாய்களைவிட சற்று அகன்று பெளமெலின் பெட்டகமாக காணப்படுகின்றது.

பெளமெலின் பெட்டகம், தெகிப்ரான் அண்மை நுண் குழாயுடன் ஒரு சிறு கழுத்துப் பகுதியால் இணைந்துள்ளது. அண்மை நுண் குழாய் சிறுநீரக நுண் இதழ்களின் மேல் பரப்பில் மற்றும் பசு கருளுடன் கூடியதாக அமைந்துள்ளது. பின்பு இக்கருள் மைய நிரையை நோக்கிச் சென்று அதை அடைகின்றது. மையச் நிரையை அடைந்தவுடன் அதன் விட்டப் பகுதி பெரிதும் குறைத்து இது போன்றே அமைந்துள்ள அடுத்த நுண் குழாயுடன் இணைந்து விடு கின்றது. மெடுஞ்சலிப் பகுதியிலிருந்து லிஸ்பிய தெகிப்ரான்களின் இந்த ஒடுக்கிய சிறு நுண் குழாய் பகுதியே ஊர்வனவற்றின் மைய குறு இழைப்புடன் கூடிய நுண் குழாய்ப்பகுதிக்கு ஒப்பிடப்பட்டுள்ளது. பறவைகளின் சிறு நீரகங்களிலுள்ள மெடுஞ்சலி தெகிப்ரான்களின் ஹென்லியின் குழாய்க்கும், சேய்மை நுண் குழாய்ச் கருள் பகுதிக்கும் இடையேயுள்ள பகுதியே ஒரு முக்கிய எக்ஸ்யாகக் கருதப்படு கின்றது. இவ்வாறு அமைந்துள்ள பகுதியிலிருந்து சேய்மை நுண் குழாய் மையச் நிரையை நோக்கிச் செல்கின்றது. பின்பு அப்பகுதியில் சேய்மை நுண்குழாய் பவ கருள்களுடன் கூடியதாக அமைந்து தொடக்க சேகரிக்கும் நுண்குழாய்களாக (Initial collecting tubules) மாறுகின்றது. இது பெளமெலின் பெட்டகத்திற்கும் நுண் இதழ் மேல் பரப்பிற்கும் இடையே அமைந்துள்ள சேகரிக்கும் நுண் குழாய்களுடன் இணைக்கின்றது. அந்த சேகரிக்கும் நுண் குழாய்கள் கார்ட்டுகள் தெகிப்ரான்களுடன் இணைந்திருப்பதுடன், அவ்வாறு இணைவ தற்கு முன் இணை இணையாகச் சேரிந்தே கார்ட்டுகள் தெகிப்ரான் களுடன் இணைந்துள்ளன. சேகரிக்கும் நுண் குழாய்களின் அடிப் பகுதி மெடுஞ்சலி தெகிப்ரான்களுடன் இணைந்திருப்பதுடன், மெடுஞ்சலி தெகிப்ரானின் ஹென்லியின் குழாய்க்கு இணைத் தொழைவுக் கோட்டு நிலையேயே (Parallel) செல்கின்றன.

தெகிப்ரானின் பங்வேறு கூறுகளைப் பற்றி (Segment) யும் ஆராய்ச்சிகள் தடைபெற்றுள்ளன. தெகிப்ரானின் அண்மை நுண்

குழாய் தூசிகை ஓரப் பகுதியுடன் (Brush border) காணப்படுகின்றது. பாலூட்டிகளின் இதேப் பகுதியில் இணையாக அமைந்த மெட்ரோகாண்ட்ரியாக்கள் தெலீனாகத் தெரியும்படி அமைந்துள்ளது. இது போன்ற பகுதி பறவைகளில் கிடையாது. நெரன்லியின் குழாயின் மேக்ஸியப் பகுதியில் பறவைகளில் உயரமான செக்ஸுடன் கூடிய பகுதி பாலூட்டிகளின் நெசிப்ராவில் கிடையாது. நெரன்லியின் குழாயின் அடர்த்திப் பகுதியில் இணையான மைட்டோகாண்ட்ரியாக்கள் வரிசைகளாக அமைப்பு பெற்றுள்ளது ஒரு குறிப்பிடத்தக்க அமைப்பாகும்.

தொடக்க சேகரிக்கும் துண் குழாய்களில் கோழைத் துகள்கள் உள்ளன. சேகரிக்கும் குழாய்களிலும் இதுபோன்ற கோழைத் துகள்கள் உள்ளன.

சிறு நீரகங்களின் இரத்த ஓட்ட மண்டலம்


ஒரு சோடி மூன் சிறுநீரகத்தமனிகள், சிறுநீரகத்தின் மூன் இதழிற்கு சுத்த இரத்தத்தை எடுத்துச் செல்கின்றன. சிறுநீரகத்தின் பின் இதழிற்கு முதுகுப் பெருத்தமனியிலிருந்து பிரிந்துவந்த சிப்மோரம் தமனிகள் சுத்த இரத்தத்தைக் கொடுக்கின்றன. இந்தத் தமனிகள் முதுகுப்புறப் பக்கத்தில் மூன், மைய சிறு நீரக இதழ்களின் கரையிலேயே சென்று அவைகளுக்கும் ஒன்று அல்லது பல சிறு துண் நெக்சிகள் கொடுக்கின்றது. இதே போன்று சலாட்டிக் தமனிகள் மைய, கடைசி சிறுநீரக இதழ்களின் கரையிலேயே சென்று, அவைகளுக்கு சிறு துண் நெக்சிக் கொடுக்கின்றன.

சிறு நீரகங்களுக்குள் துறைந்த பின்பு, இந்தச் சிறு நெக்சித் தமனிகள் நெக்சிச் சிறைகளுடனேயே இணையாகச் சென்றுகின்றன. ஒவ்வொரு சிறை நெக்சியும் பல சிறு நெக்சித்தமனிகளுடன் இணைகோட்டில் செல்லக்கூடியதாக துண் இதழின் பரப்பில் காணப்படும். இந்தச் சிறு நெக்சிகள் ஒவ்வொன்றும் பல துண் குழாய்த் தொகுதி கிளாமுலஸ் (Glomeruli) களினும் ஆனது.

கிளாமுலஸ்கின் மையப் பகுதியில் இணைப்புத் திசுக்களைப் போன்ற ஒரு கூட்டுப் பகுதியுள்ளது. பறவைகளின் நெசிப்ரான் அணியில் மிகவும் சிறியதாகக் காணப்படுவதாகக் கிளாமுலஸ்க் மிகவும் துண்மையிதாகக் காணப்படுகின்றன. கிளாமுலஸ்க் இரத்தத் தத்துவி கவர்கள் பறவையிடு, பாலூட்டிகளில் உள்ளது போன்றே அமைந்துள்ளது. இவற்றின் வெளிப்பரப்பு போட்டோ ஷைட்டுகள் என்ற நீர் வரை நீட்சிகளாக ஆன ஒரு அடுக்காகும். ஒவ்வொரு கிளாமுலஸ்கிலும் ஒரு சிறிய இரத்தத் தத்துவிக் குழாய்க் கொத்துகள்

உள்ளன. விளாமருவன்கள், சிறு நீரக நுண் இதழ்களின் மையப் பகுதிக்கும் பரப்பிற்கும் இடையில் அமைந்துள்ளது. வித்தக நாளம் சிறு நீரக இதழ்களின் மேல் பரப்பில் சென்று, இடை அல்லது மைய சிறு நீரக இதழ் தத்துவி வலைப் பின்னிலுள் செல்கின்றது.

இடை நுண் குழாய்த் தத்துவிகள் சிறு நீரக நுண் குழாய்களுக்கு கருவிலுள்ள பரப்பில் உள்ளன. அதன் கவரிகள் நெகிழ்நாண்களின்



படம் 45. (அ) பிழுவியோ பிழுவியோப் பறவையின் சிறு நீரகங்கள்

1. பிழுவியோ சிறுநீரகம், 2. நுண் ஆர்ப்பட்டியல் ரீதியில், 3. காக்கிளியோ பிசுட்டிக் சிறுநீரகம், 4. மலக்குடல், 5. பொதுக் கழிவுரை, 6. சிறுநீரக நாளம், 7. காக்கிளியோ சிறுநீரகம், 8. உள் இவ்வியாக் சிறுநீரகம், 9. இவ்வியாக் தமனி, 10. பிழுவியோ தமனி, 11. இவ்வியாக் சிறுநீரகம் ரீதியில் சிறுநீரகம் இடைநிலைப் பிணைப்புப் பகுதி, 12. நுண் ரீதியில் தமனி.


(ஆ) புறவியின் சிறுநீரக நாளத்தின் மெருக்கி உள்புப் பகுதிகள்

(இ) புறவியின் சிறுநீரகத்தின் சிறு மண்டலம்

1. அட்ரீனல் போர்ப்பட்டல் மண்டலத்தின் இணைப்பு நாளங்கள், 2. ரீனல் போர்ப்பட்டல் சிறுநீரகம் ரீதியில் ரீதியில், 3. வெளி இவ்வியாக் சிறுநீரகம், 4. உள் இவ்வியாக் சிறுநீரகம், 5. இவ்வியாக் சிறுநீரகம், 6. செக்ரல் சிறுநீரகம், 7. காக்கிளியோ சிறுநீரகம், 8. சிறுநீரக வலியு, 9. இவ்வியாக் சிறுநீரகம் ரீதியில் சிறுநீரகம் இடைநிலைப் பிணைப்புப் பகுதி, 10. நுண்ணெலும்புச் சிறுநீரகம்.

அடிப்படையுடைய (Basement membrane) ஒட்டிக்கொண்டுள்ளன. மெருக்கிப் பகுதியில் இந்த தத்துவிகள் நுண் குழாய்களினின்றும் தத்துவிக் கவரிகளாலும் இணைப்புத் திசுக்களாலும் பிரிக்கப்பட்டுக் காணப்படுகின்றன. இடை நுண் குழாய்த் தத்துவிகள் நுண் இதழின் கார்ப்புகள் பகுதியில், பரப்புப் பகுதியிலிருந்து மையப்பகுதியை

தொக்கிச் செல்லுகின்றன. சிறு நீரக நுண் இதழின் மேல் பரப்பில் தத்துமி வளைப்பின்னல், இடை நுண் இதழ்-சிறைகளுடன் பல கிளைத் தொகுதிகளால் தொடர்பு கொண்டுள்ளது. சிறு நீரக நுண் இதழ்



படம் 45. (அ) புறவின் சிறு நீரகம்

3. வெளி இவ்வியாக் சிறை, 5. இவ்வியாட்டிக் சிறை, 6. சிறு நீரக நுண், 7. காக்கிழியோ சிறை, 9. இவ்வியாட்டிக் தமனி, 11. அபிமோரல் தமனி, 13. ரேலி நெண்சல் ரைல் சிறை.

(ஆ) சிறு நீரக இவ்வியாக் காக்கிழியோ பகுதியின் இரத்த ஓட்டம்
13. காபுலியோ இடைச் சிறை, 14. வித்தக நுணம் (Vaso-
effereus), 15. வித்த நுணம், (Vaso deferens), 16. கிராமருவல்,
17. தத்துமிகள், 18. மையத் தமனி, 19. மையத் சிறை.

களின் மையத்தில் தத்துமி வளைப்பின்னல், மையச் சிறைகளுடன் இணைந்துள்ளது. பின்பு அவை சிறுநீரகத்தின் வெளிச் செல்லும் சிறைகளுடன் (Effluent renalveins) இணைந்து விடுகின்றன. இடை நுண் இதழ் சிறைகள் சிறு நீரகப் போர்ட்டல் மண்டலத்தின் கிளைகளாகும்.

கால் பகுதியிலிலும் வரும்பெரும் சிறைவாண வெளி இவ்வியாக் சிறை, தொடைப் பகுதியிலிலும் சிறு நீரகத்தின் வயிற்றுப்புற பக்கப்பகுதிகள் வரை நீண்டு மூன் மைய சிறுநீரக இதழ்களிடையே செல்லுகின்றது. சிறு நீரகத்தினுள் நுழைந்த பின்பு, இது ஒரு தடித்த கிளையாக மாறி மூன் இதழில் காணப்படுகின்றது. பின்பு இந்த பெரிய கிளை இரண்டு கிளைகளாகப் பிரிகின்றது. அதில் ஒரு கிளை பின்பு பகுதியில் சிறு நீரகத்தின் கலியுள் புருத்து கலந்து விடுகின்றது. இந்த கிளைதான் உள் இவ்வியாக் சிறை ஆகும். இது சிறு நீரகத்திற்கு பல கிளைகளைக் கொடுப்பதுடன் கால் பகுதியிலிலும்

வரும் சவாட்டிக் கிரையிலிருத்தும் ஒரு மீன் இந்த உள் இவ்வியாக கிரையுடன் இணைகின்றது. வெட்டிவிடல் சிறை அகத்து மூதுருத்தண்டு சிறையும் இதனுடன் இணைகின்றது. இந்த இரண்டு உள் இவ்வியாக் கிரைகளும் ஒரு கிரை வளைவிலும் சிறு நீரகத்தின் கடைசி பகுதியில் பிணைக்கப்பட்டுள்ளன. இந்த கிரைகள் அப்பகுதியில் பின்னும் காக்கீலியல் கிரைகளுடன் இணைகின்றன. இப்பகுதி காக்கீலியோ மிசன்ட்டரிக் கிரைகளிலும் தெறப்பாட்டிக் போர்ட்டல் மண்டலத் துடன் தொடர்பு கொண்டுள்ளது.

வெளி இவ்வியாக் கிரைகளின் கிளைகள் சிறு நீரகத்தினுள் செல்லும் கிரைகளுடன் (Renal efferent vein) இணைந்துள்ளது. இவைகள் சிறு நீரகப் போர்ட்டல் மண்டல கிரைகளுக்கும், சிறு நீரகத்தினுள் செல்லும் கிரைகளுக்குமிடையில் ஒரு வலைப்பின்னல்போன்று அமைந்துள்ளது.

பறவைகளில் சிறுநீரக போர்ட்டல் மண்டலம் இருப்பது குறித்து ஜேக்சன் (Jacobsen) என்பவர் 1822ஆம் ஆண்டு கண்டுபிடித்தார். இதற்கு முன்பே நியூதீர் வாழ்வனவற்றிலும் ஊர்வனவற்றிலும் சிறு நீரக போர்ட்டல் மண்டலம் இருப்பது குறித்து அறிவிக்கப்பட்டிருந்தது. பறவைகளில் சிறு நீரக போர்ட்டல் மண்டலம் உள்ள நிலை குறித்து; பெரிதும் விவாதித்த பின்பே அது இருப்பதை குறித்து ஒரு மனதாக ஒப்புக்கொள்ளப்பட்டது.

சிறுநீரகங்களின் செயல் படுதன்மை

சிறுநீர் சேகரிக்கப்படும் முறை

நீர்க்கொழியைத் தவிர பறவைகளில் சிறுநீர்ப்பை (Urinary bladder) கிடையாது. சிறுநீர் தாளங்கள் (Ureters) பொதுப்புழையில் நிறைகின்றன. சிறுநீர், மலத்துடன் கலக்கப்பட்ட நிலையில் தான் பறவைகளின் பொதுப்புழை வழியாக வெளியேறுகின்றது. இவ்வாறு சிறுநீர் மலத்துடன் கலந்து வெளியேறுவதாவேயே, பறவைகளில் சிறுநீர் தவிராக சேகரிக்கப்பட முடிவதில்லை.

மலக்குடல் காப்ரோடேயியத்தில் சேருமிடத்தைதவும் சிறு நீரக தாளங்கள் யூரோடேயியத்தில் சேருமிடத்தைதவும் தேவைபாச பக்குவ முறையில் ஒரு பறவையில் பிரித்து, சிறு நீரைச் சேகரிக்கும் முறையை கையாண்டிருக்கலாம். இவ்வாறு பிரித்து பரிசோதனை நடத்தும் பறவைக்கு தக்கக் கவனம் செலுத்தி அதை உயிர் வாழச் செய்து சிறு நீர் சேகரிக்கப்பட்டு சோதனை நடத்தப்பட்டு, வெற்றி கரமாகவே முடிவுற்றது. இத்தகைய பரிசோதனையில் சிறு நீரக

நாளங்களிற் பெற்றுப்புகைக்கு வெளியே வைத்து சோதனை நடத்தப் பட்டது.

பறவைக்கு மயக்க நிலையை ஏற்படுத்தி சிறு நீரக நாளங்களிற் விருத்தும் சிறு நீரை எடுத்து பரிசோதனை செய்துள்ளனர். மற்றும் மயக்கம் கொடுக்காத நிலையிலுள்ள பறவையில் முதலில் குறிப்பிட்ட மூலையில் சிறு நீரை சேகரிக்க முடியும். பறவையின் மலக்குடலில் தண்ணீரை உறிஞ்சும் சக்திவற்ற பஞ்சை வைத்து பொதுப்புறமில் வந்து சேரும் சிறு நீரை சேகரிப்பதும் மற்றுமொரு பரிசோதனை யாரும். இவ்வாறு பல வழிகளைக் கொண்டு சிறு நீரை பறவையின் உடலிலிருந்து சேகரித்துப் பரிசோதனை நடத்தப்பட்டது. சிறு நீரகங்கள், வடிசுட்டுதல், கழிவுப்பொருட்களை அகற்றுதல், தேவையான பொருட்களை திரும்பவும் உறிஞ்சுதல் ஆகிய மூன்று முக்கிய வேலைகளைச் செய்கின்றன. சிறுநீரில் காணப்படும், வளர் சிதை மாற்றத்தின்பொழுது உற்பத்தியான சில பொருட்களையும் தண்ணீரையும் சிறு நீரகம் இரத்தத்திலிருந்து உறிஞ்சுகின்றது. உடலிற்குத் தேவையான க்ளூகோஸ் (Glucose) தண்ணீர் மற்றும் இதர பொருட்களை திரும்பவும் சிறு நீரகங்கள் உறிஞ்சிக் கொடுத்து உதவுகின்றன. இவ்வாறு அதிகப்படியான கழிவுப் பொருட்களை அகற்றியும், மற்றும் இரத்தத்திலுள்ள சிறு நீரிலிருந்தும் வெளியேறக் கூடிய அவசியமான பொருட்களை உறிஞ்சியும், சிறு நீரகங்கள் உடலிற்கு தேவையான தண்ணீர், கரைசலில் கரைவுற்ற பொருட்களை ஒரே சம நீரான நிலையில் வைக்கப் பெரிதும் பயனுள்ளவைகளாக உள்ளன.

பறவைகளில் வடிசுட்டும் திறன் சிறு நீரகத்தின் கிளாமிகுலஸ் (Glomerulus) பகுதியில் நடைபெறுகின்றது. கிளாமிகுலஸ் வழியாக வடிசு அமைப்புடைய பொருள்களும் மூலக்கூறுகள் மிகச் சிறிவதாகவுள்ள பொருள்களும் கிளாமிகுலஸ் தத்துவச் சுவர் வழியாக சிறு நீரகப் பெட்டிகளுக்கும் செல்கின்றன. பிளாஸ்மாவில் உள்ளப் புரதப் பொருட்கள், மூலக்கூறு எற்றுப் பெரிவதாகவுள்ளதாக் அவைகள் வடிசுட்டப்படமாட்டாது. சோடியம், பொட்டாஷியம், க்ளோரைடு, கனிம பாஸ்பேட்டு (Inorganic Phosphates), க்ளூகோஸ், யூரியா, க்ரிபாட்டினின், யூரிக் அமிலம் போன்ற பொருட்கள் வடிசுட்டப்படுகின்றன.

மேலே குறிப்பிட்ட பொருட்களில் சிலவற்றிற் அடர்த்தி சிறு நீரில் இரத்தத்தில் பிளாஸ்மாவைவிட அதிகமாகவோ குறைவாகவோ காணப்படும். அவ்வாறு அடர்த்தி குறைவாக இரத்த பிளாஸ்மாவில் இருந்தால் சிறு நீரக மூன் குழாய்கள் அவற்றை உறிஞ்சிவிடுகின்றன. சிறு நீரில் க்ளூகோஸ் சாதாரணமாகக் காணப்படுவதில்லை. ஆனால்

ஒரு சிறு அளவு எண்ணப்படிச் சிறு நீரக நுண் குழாய்கள் அமைகின்ற திரும்பவும் உறிஞ்சி விடுகின்றன.

சிறு நீரக நுண் குழாய்கள் இரத்தத்திலுள்ள அதிகப்படியான தண்ணீரை திரும்பவும் உறிஞ்சி விடுவதால் இரத்தத்தின் தண்ணீரின் அளவு எப்பொழுதும் ஒரே சீராக உள்ளது. இரத்த ஓட்டத்தையும் இரத்த அழுத்தத்தையும் பொருத்தே சிறுநீர் உற்பத்தி அளவு அமைந்துள்ளது. பசுவு நரம்பு மண்டலத்தின் தூண்டுதலால் கிளாமிகுலஸ்களில் அதிகப்படியான இரத்தம் செலுத்தப்படிச், சிறு நீரும் அதிகப்படியாகவே உற்பத்தியாகின்றன. கோழிக் குஞ்சுகளில் அட்சீனனின் றமார்மோன் இரத்த அழுத்தத்தை அதிகப்படுத்துவதால், சிறு நீரின் உற்பத்தியை அதிகப்படுத்துகின்றது என்பது விளக்கப்பட்டுள்ளது.

பாதுாட்டிகளின் சிறு நீரில் யூரியாப் பொருள்தான் முக்கிய பொருளாகும். ஆனால் பறவைகளின் சிறு நீரில் யூரிக் அமிலம்தான் முக்கிய பொருளாகும். பொதுவாக 80 முதல் 80 சதவீதம் உப்பு வாயு பறவையின் யூரிக் அமிலத்தில் உள்ளது. கிரியாட்டிகளின் பொருளும் ஒரு சிறிது பறவையின் சிறு நீரில் உள்ளதாகக் கணக்கிடப் பட்டுள்ளது. பொதுப்புறமும் மலக்குடலும் சிறு நீரின்குத்து திரும்பவும் நீரை உறிஞ்சிக் கொள்கின்றன.

பறவைகளின் சிறுநீர் வெளிர் மஞ்சள் நிறமுடன் உள்ளது. கோழைப் பொருளுடன் இருப்பதால் மிகவும் அடர்த்தியாக உள்ளது. யூரிக் அமிலம் சிறு நீரில் மிகவும் அதிகமாக உள்ளது. கோழிக் குஞ்சுகளின் சிறு நீரின் PH 6.33 முதல் 6.7 வரை உள்ளது.

கடற்கரையில் வாழும் பறவைகள் கடல்நீரையே குடித்து, கழிவு நீரை வெளியேற்றுகின்றன. இவ்வாறு உப்புத் தண்ணீரை குடித்து வாழும் பறவைகளுக்கு மூக்கில் ஒரு மூக்குச் சுரப்பி அதிகப்படியான உப்பை உற்பத்தி செய்வும் வண்ணம் அமைந்துள்ளது. இந்த சுரப்பி அமைத்து செயல்பாற்றும் நிறவை கார்மோரெண்ட்டுகள், பழுப்பு நிற பெய்க்கன் வர்த்துகள், ஹெரிக்ஸ்க் (Herring gull) பறவைகளிலும் பெங்குவின் போன்ற மற்ற சிறப்பின கடல் வாழ் பறவைகளிலும் ஆராயப்பட்டுள்ளது. அநேகமாக மூக்குப் பகுதியிலேயே இச்சுரப்பி அமைந்துள்ளதாகக் கருதப்படினும் சில பறவைகளில் தலையின் மேல் பகுதியிலோ கண் குழிவிற்கருகிலோ இந்தச் சுரப்பி காணப்படுகின்றது. இந்தச் சுரப்பி உப்பை உற்பத்தி செய்வதால் இதனை உப்பு உற்பத்திச் சுரப்பி (Salt secreting gland) என்றும் அழைக்கலாம். சில பறவைகளில் மண்டையோட்டின் மேல் பகுதியில் இரண்டு பிறை வடிவ சுரப்பிகளைக் காணலாம். இந்த இரு சுரப்பிகளிலிருந்தும் இரு

நாளங்கள் மூக்கின் வெஸ்ட்டிபுலார் கால்க்கா பகுதிகளவரை நீண்டிருக்கும். பின்பு நாகித்துவாரங்கள் வழியாக மேலே குறிப் பிட்டிருத்த கரப்பிகளினும் கரக்கப்படும் இரவும் அவரின் நுனியில் சொட்டு சொட்டாக வெளியேற்றப்படுதலாக காணலாம். இவ்வாறு இப்பறவைகள் அதிகப்படியான உப்பை வெளியேற்றுகின்றன. இவ்வாறு உடலின் உள்ளே எடுக்கப்படும் உப்பின் அளவு வெளியேற்றப்படும் உப்பின் அளவிற்கு சமமாகப்படுவதற்கு இந்தச் கரப்பிகள் மிகவும் பயனுள்ளவைகளாக உள்ளன.

12. பறவைகளின் இனப் பெருக்க மண்டலம்

மற்ற முதுகெலும்புள்ள பிராணிகளில் உள்ளது போன்றே பறவையின் இனப்பெருக்க மண்டலம், மத்திய நரம்பு மண்டலம், அடினோ ஹைப்போசிபைசிசி, இனப்பெருக்க உறுப்புகள் மற்ற குறி வட்ட உறுப்புகள் (Central nervous system, adenohipophysis gonads & other target organs) முதலியவைகள் சூழ்நிலைக்கேற்றவாறு இயங்குகின்ற ஒரு நரம்பு சார்ந்த நாளமில்லாச் சுரப்பிகளாலானது. இனப்பெருக்க உறுப்புகள் ஆண் பிராணிகளுக்கு விந்தகங்களும், பெண் பிராணிகளுக்கு ஒரே ஒரு பக்கத்தில் மட்டும் அமைப்பெற்ற அண்டமும், விந்தையும் அண்டத்தையும் உற்பத்தி செய்கின்றன. விந்தமும் அண்டப் பைபுமே ஆதிகளாத்தொட்டு பிராணிகளில் காணப்படும் இனப்பெருக்க உறுப்புகளாகும். பிராணிகளில் 330 வட்சம் வகுடங்களுக்கு முன்பு ஆர்டோவீசியன் (Ordovician) காலத்தில் வாழ்ந்த நாடையற்ற (Agnatha) மீன்களைப் போன்ற பிராணிகளிலும், பால் ஹார்மோன்கள் (Sex hormones) இருந்ததாகக் கூறப்படுகின்றது.

ஆண் பறவைகளின் விந்தகங்கள், மற்ற இனப்பெருக்க உறுப்புகளின் உள்விலப்பின்னம் அமைப்பு முதலியவற்றை ஆராய்விட்டது அவை மற்ற முதுகெலும்புள்ள பிராணிகளிலெல்லாம் ஒரே மாதிரி விலங்காக வேறுபட்டே காணப்படுகின்றது என்பது தெளிவாகின்றது. பறவைகளில் உட்ப்பியல் நாளங்கள் (Wolffian duct) அல்லது மைய கழிவு நீரக நாளங்கள், மத்திய கழிவு நீரகத்துடன் இணைந்து எப்பிடிடியில் (Episidymus) என்ற உறுப்பாக மாறுகின்றது. அதன் சீழ்ப்பகுதி விந்து நாளமாக (Vas deferens) மாற்றப் படுகின்றது.

எவ்வாறென பறவைகளிலும் வயது பக்க அண்ட சுரப்பி மிகவும் தேய்வடைந்து காணப்படுகின்றது. பறவைகளில் மற்ற நாகரிக பிராணிகளில் உள்ளது போன்று, மூலவரியன் நாளங்கள் (Mullarian duct) அதவிடத்தில் அமைந்துள்ளன. மூலவரியன் நாளங்களே அண்ட நாளங்களாக மாற்றி அமைக்கப்பட்டுள்ளன. முதிர்ந்த அண்டம், உடல் குழிக்குள் செலுத்தப்பட்டு, பின்பு மூலவரியன் புனல் வழியாக அண்ட நாளத்திற்குள் செல்கின்றது. பறவைகளின் இடது பக்க அண்ட நாளம், முட்டையை சரிவர உற்பத்தி செய்வ, பன பகுதிகளுடன் கூடியதாக பன செயல்களைச் செய்யுமாறு அமைந்துள்ளது. இனப்பெருக்க நாளங்களும் சீரணப் பகுதியின் கடைசி பகுதியான மலக்குடனும் பொதுக்கழிவறைகே திறக்கின்றது.


விந்தகம் (Testis)

ஆண் பறவைகளில் விந்தகம் ஒரு இன்றியமையாத இனப் பெருக்க உறுப்பாகும். இதற்கு இரு முக்கிய செயல்கள் உள்ளன. முதலாவதாக இவை விந்தணுக்களை உற்பத்தி செய்யும் ஒரு முக்கிய உறுப்பாகக் கருதப்படுகின்றது. இரண்டாவதாக இவை இனப் பெருக்க ஹார்மோன்களை உற்பத்தி செய்யும் நாளமில்லா சுரப்பியே மாறும். விந்தகங்களுக்கும் அவைகளை அடுத்துள்ள நாளங்கள்களுக்கும் விந்தகத் தமனிகள் சுத்த இரத்தத்தைக் கொடுக்கின்றன. இடது பக்க விந்தகம், வயது பக்க விந்தகத்தைவிட அளவில் சற்று பெரியதாக இருக்கும். ஒரு பக்கத்து விந்தகத்தை அகற்றிவிட்டால், மற்றொரு பக்கத்து விந்தகம், அகற்றப்பட்ட விந்தகத்தையும் சேர்த்து இரு மடங்காகச் செயல்படுகின்றது. ஒவ்வொரு விந்தகமும் பொதுவாக நீள் உருளை வடிவமுடனும், சுற்றிலும் ஓர் உறைவுடன் கூடிய உறுப்பாகும். இதன் வடிவமும் கன அளவும், பருவ காலம் களுக்கும், பால் வேறுபாடு நிலைக்கும் ஏற்றவாறு அமைந்திருக்கும். ஒவ்வொரு விந்தகத்தின் உள் அமைப்பின் ஆராய்ந்து பார்த்ததோ மானும் அவை நீண்ட வித்து உண்டுபண்ணுகின்ற செமினி:பெரல் அல்லது விந்தாக்க நுண் குழாய் (Seminaliferous tubule) களான தொகுதியாகும். இந்த நுண் குழாய்களின் எப்பித்தீரியல் செல்களில் விருத்தி ஆண் இனப் பெருக்கச் செல்கள் அல்லது விந்தணுக்கள் உற்பத்தியாகின்றன. முதலில் இந்த இனப் பெருக்கச் செல்கள் மறைமுகப் பிரிவினையே (Mitosis) பல செல்களாகப் பிரிக்கின்றன. பின்பு இனப் பெருக்கக் காலங்களின் குற்றம் பிரிவின் பங்களாக, இரண்டாம்படி, விந்தணுக்களும், முதற்படி இரண்டாம்படி வித்து செல்களும், வித்துக்களும் உற்பத்தியாகின்றன.

மூதிர்ச்செய்த வித்தணுக்களின் வலுவும் பறவைகளில் இனத்திற்கு இனம் மாறுபட்டே காணப்படுகின்றன. இவை வித்தகத்தின் மையப்பகுதியில் கட்டமாகக் காணப்படுவதை இனப்பெருக்கக் காலங்களில் காணலாம். இம்மாதிரியான இனப்பெருக்கக் காலங்களில் வித்தகத்தின் மையப்பகுதி கொழுப்பு கொள்ளட்தரம் பொருளானும் நீரைத்து காணப்படுகின்றது.

பறவைகளின் வித்து மூன்று பாகங்களாகக் கொண்டது. முதல் பகுதி வித்தின் தலைப்பகுதியாகும். அக்ரோசோமிற்கு மேல் குரோமெட்டிபுறவான உச்சி பகுதியுடையது. இரண்டாவது பகுதி மையத்துண்டு பகுதியாகும். மையத்துண்டு பகுதிக்குப் பின்னால் மூன்றாவது பகுதியாகிய வால் உள்ளது. வால் பகுதி நீண்டதாக விரும்பதுடன் வான தன்மையுடையது இடப்பெயர்ச்சி செய்ய ஏதுவாக அமைந்துள்ளது. வித்தகத்திலிருந்து பல ஸ்சம் வித்துக்கள் உற்பத்தியாகி செமினல்பெரஸ் துண்குழாய் வழியாகச் சென்று எப்பிடிடிமில் பகுதியை அடைகின்றன. அங்கிருந்து வளையும் தன்மையற்ற தேரான வித்தக நாளத்தின் (Vas deferens) வழியாகச் சென்று வித்தும் பை (Seminal sac) க்கு அடைகின்றன. பின்பு வித்துப் பைகளிலிருந்து பெண் இனப்பெருக்கக் குழாயினுள் கவையின்போது செலுத்தப்படுகின்றது.

ஒவ்வொரு வித்தகமும் இனப்பெருக்கக் காலங்களில் சாதாரண காலங்களிலிட கமார் 350 பங்கு பெரிதாக வளர்ச்சியுறுகின்றது. வித்தகத்தினுள்ள துண் குழாய்கள் ஏரியோவார் இணைப்புத்திட, இரத்தத் தத்துகில் தினதீர் குழாய்கள், நரம்புத் திசுக்கள் இவற்றுடையனது. மற்றும் சில பறவைகளில் மெலனோபிளாஸ்ட்டுகள் (Melanoplasts) வித்தகச் செல்களில் உள்ளன. ஒடுக்கப்பட்ட நிலையில் வித்தகங்கள் மெலனோபிளாஸ்ட்டுகளினால் கலப்பாகவுள்ளன. இனப்பெருக்கக் காலங்களில் வித்தகங்கள் விலகலையும்பொழுது மெலனோபிளாஸ்ட்டுகளும் விலகல் பரவல் செய்யப்படுவதால் வித்தகங்கள் முதலில் சாயல் நிறமாகவும், பின்பு நல்ல வெண்மை நிறமாகவும் மாற்றப்படுகின்றன. மற்றும் சில பறவைகளில் உருவத்தில் சற்று விரிவதாக அமைந்துள்ள வித்தகங்கள் இனப்பெருக்க காலங்களில் மஞ்சள் நிறமாகவோ பின்பு ஆரஞ்சு நிறமாகவோ மாற்றமடைகின்றன. இனப்பெருக்கக் காலங்களில் அதிகப்படியான கொழுப்புச் செல்கள் உற்பத்தியாகி அவை நாளமில்லாத் சுரப்பி செல்களுடன் இணையும்பொழுது இவ்வாறான மஞ்சள் அல்லது ஆரஞ்சு நிறம் வித்தகத்தின் தோன்றுகின்றது. இனப்பெருக்கக் காலம் ஒருமுறை முடிவடைந்து, அடுத்த இனப்பெருக்கக் காலம் வரும்வரை வித்தகங்கள் வெள்ளையாகவுள்ளன. இனப்பெருக்கக் காலங்களில் உருவிய மிகப்



படம் 46. பெட்டிக் குருவி—ஆண்-இனப் பெருக்க மண்டலம்

(அ) இனப் பெருக்கத்திற்கு காலத்தில் இன உறுப்புகளின் நிலை

(ஆ) இனப் பெருக்கக் காலத்தில் இன உறுப்புகளின் நிலை

1. அட்ரினல், 2. வித்தகம், 3. எம்பிரிடியம், 4. கடைநிலை நெருக்கம், 5. வித்தக நாளம், 6. நெருக்க நாளம், 7. செயின்ட் களாமல், 8: வித்து வீச்சு நாளம் (Ejaculatory duct), 9. பொதுப் புறம், 10. சிறு பெருஞ்சிறை, 11. பொதுக் கழிவறை, 12. மேல் பிண்விழுதசை, (Upper retractor muscle), 13 சிறு பிண்விழுதசை, (Lower retractor muscle).

பெரியதாகக் காணப்படும் வித்தகத்தில் ட்டிபூனிக்கா இரத்தத் தத்துவச் சிறகன் மிகுதியாகக் காணப்படுகின்றன.

விந்து சுரப்பி உற்பத்தி செய்யும் பொருட்கள்

விடுகளில் வளர்க்கப்படும் செவ்வகனில் வித்தகங்களைப் பற்றி நடத்திய ஆராய்ச்சியின் பயனாக 1763 ஆம் ஆண்டு, ஜான் ஹண்ட்டர் (John Hunter) என்பவர் வித்தகங்கள், தானியம்வாச் சுரப்பிகளாகவும் செயல்படுகின்றன என்பதைக் கண்டறிந்தார். பறவைகளின் வித்தகத்திலுள்ள இடைவீட்டுச் செவ்வகப்பற்றியும் ஆராய்ச்சி நடத்தப்பட்டிருக்கின்றது. இச் செவ்வகச் செவ்வகச் செவ்வகச் (Leydig cells) என்றும் பெயர் பெறும். இவை இனப்பெருக்கக் காலங்களில் எல்லாறு செயல்படுகின்றன என்பது குறித்தும் ஆராயப்பட்டது. இவ்வாறு ஆராய்ச்சியின் பயனாக இந்த இடைவீட்டுச் செவ்வகனின் அமைப்பினதான் கருத்தினைச் செலுத்த முடிந்ததெய்வகம், செயல்படு தன்மையில் அவ்வளவு முக்கியத்துவம் இல்லை என்று கண்டறிந்தனர். இந்த இடைச் செவ்வகச் எவ்வாறு முறுகெழும்புள்ள பிராணிகளின் வித்தகங்களிலும் காணப்படுகின்றன. இந்த சுரப்பி களாவான செவ்வகச், வித்துக்களை உற்பத்தி செய்வதற்கு துணை புரிகின்றன. பரிசோதனைகள் மூலம், அன்ட்ரோஜென் ஹார்மோன்கள் வித்துக்களை உண்டுபண்ணும் குன்றல் பிரிவினரு பெரிதும் பயன்படுகின்றன என்று கண்டறியப்பட்டுள்ளது.

மற்றும் சிலர், இடைச் செவ்வகச், தானியம்வாச் சுரப்பிகளச் செய்வும் துண்டுதலைச் செய்யவில்லை என்று விவாதித்துள்ளனர். இனப்பெருக்கக் காலங்களில் வித்தகங்களில் இடைச் செவ்வகச் (Interstitial cells) எண்ணிக்கையில் மிகவும் குறைந்து காணப்பட்டதே அவர்களது விவாதத்திற்குக் காரணமாகும். குன்றல் பிரிவின்போது வித்தகங்களில் வித்துக்கள் உற்பத்தியாகும் பொழுது, அவைகளின் துண் குழாய்கள் விடுவடைதலால் செவ்வகம் தெறிப் பரவிக்கிடக்கின்றன. ஆகையால் அத்தகைய நிலையை குறுக்கு வெட்டுத் தொற்றத்தில் ஆராய்ந்தால் அந்தப் பகுதியில் இடைச் செவ்வகச் குறைவான எண்ணிக்கையில் காணப்படுகின்றன. மற்றும் இச் செவ்வகனிலிருந்து சுரக்கப்படும் கொலஸ்ட்ரால் விப்பிடு கொழுமும் சிறிது சிறிதரசு பயன்படுத்தப்பட்டு, அது அன்ட்ரோஜென் ஹார்மோனாக மாறுகின்றது. கடைமீயை இனப்பெருக்கக் கால முடிவில் விப்பிடுகள் முழுமையாக மறைத்து விடுகின்றன.

அன்ட்ரோஜென்

வாஸ்கோழிகளிலும், கோழிகளிலும் ஆண்டால் ஹார்மோன்கள் (Male sexhormones) வளர்ச்சியை உண்டுபண்ணுவதாக அறியப்படு

கின்றது. ஆண் பறவைகளின் இனப்பெருக்க ஆற்றலை அழித்தால் பாணுட்டிகளில் ஏற்படுவது போன்றே அவற்றின் தீவிரமான எழும்புகள் பாதிக்கப்படுகின்றன. மற்றும் பறவைகளின் போர்த்திறவு (Pugnacity) கடுகதரப்பாக வியங்குதன்மை முதலிய உடற்பாங்குகள் (Temperament) ஆண் பறவைகளில் இனப்பெருக்க ஆற்றலை அழிப்பதால் ஏற்படுகின்றன. இதனை சாதாரணமாக வீடுகளில் வளர்க்கப்படும் சேவகனில் காணலாம். பலர் பறவைகள் (Bower bird) சாதாரணமாக வலிவச் சண்டைக்கு இழுக்கும் (Aggressive) இயல்புடையவை. இப்பறவைகளின் இனப்பெருக்க உறப்பு ஆற்றலை அழித்துவிட்டால், அதன் இயல்பான தன்மையையும் இழந்து இவை சாதுக்களாகக் காணப்படுகின்றன. ஆண்டு ரேவியா நாட்டு மேகப்பி (Magpie) பறவைகள் இனப்பெருக்கக் காலமுடிவில் கடு முரட்டுத் தன்மைமூலையதாக விருப்பதால் மற்றப் பறவைகளை பாதுகாக்கும் பொருட்டு வயதான ஆண் பறவைகளைச் சுட்டுக் கொன்று விடுவதும் உண்டு.

ஆண் இனப்பெருக்க உறப்பு ஆற்றல் அழிக்கப்பட்டப் பறவைகளில் அன்ட்ரோஜென் ஹார்மோனை உடலுள்ளே செலுத்தி அதன் விளைவுகளைக் கண்டறிந்துள்ளனர். ஆண் இனப்பெருக்க உறப்பு ஆற்றல் அழிக்கப்படின் கொண்டைப் பகுதி மிகவும் சிறியதாக விருக்கும். பின்பு அவை நன்றாக வளர்த்துவிடும். ஒவ்வொரு நாளும் கமார் 3-5 மில்லிசிராம் அன்ட்ரோஸ்டீரான் (Androsterone) ஹார்மோனைப் பறக்கும் மார்புத்தலை வழியாக உடலுள் செலுத்தினால் மூன்று வாரங்களுக்குப் பிறகு கொண்டை எப்பொழுதும் உள்ள வடிவத்தை அடைந்துவிடுகின்றது என்று கண்டுபிடிக்கப்பட்டுள்ளது. கமார் 5 வாரங்களுக்குப் பிறகு அப்பறவைகளில் கொண்டைப் பகுதி பெரிதும் வளர்ச்சியுற்று மற்றப் பறவைகளின் வடிவத்தைவிட நன்றாகத் தெரிவும்படி அமைந்து விடுகின்றது. இதே போன்று டெஸ்டோஸ்டீரான் (Testosterone) என்ற ஹார்மோனையும் மேலே குறிப்பிட்ட ஆண் இனப்பெருக்க உறுப்பாற்றல் அழிக்கப்பட்ட பறவைகளில், உடலினுள் செலுத்தினால் கொண்டைப் பகுதி நன்றாக வளர்ச்சியுற்றுக் காணப்படுகின்றது. தசைத்தொக்கம் பகுதி (Wattles) களும், காது இதழ்களும் கூட இப்பறவைகளில் அன்ட்ரோஜென் ஹார்மோனினால் பெரிதும் வளர்ச்சியுற்றுக் காணப்படுகின்றன. அன்ட்ரோஜென் ஹார்மோனை உடலுள் செலுத்துவதால் ஏற்படும் விளைவுகள் குறித்து பலர் ஆராய்ச்சி நடத்தியுள்ளனர். ஆண் இனப்பெருக்க உறுப்பாற்றல் அழிக்கப்பட்ட பறவைகளில் அன்ட்ரோஜென் செலுத்தினால் அவைகள் திரும்பவும் பழைய தன்மையைப் பெற்று தங்கள் பால்வழி பழகுமுறைகளைக் (Sexual behaviour) அடைக்கொள்ளுகின்றன. மெட்டைக் கோழிகளின் உடலினுள் இந்த

ஹார்மோன்களைச் செலுத்தினால் ஆண் பறவைகளின் பழக்கங்கள் இவற்றிற்கு வந்துவிடுகின்றன. முரட்டுத்தன்மை, பாடும் நிறம், கத்தும் நிறம் முதலியவற்றின் இவை பெற்றுவிடுவதை இப்பரிசோதனை மூலம் கண்டறிந்துள்ளனர்.

கோழிக்கரு முட்டையினுள் வளரும்போது ஆண்-பாஸ் ஹார்மோன் உட்செலுத்தினால் மீசோடெப்ரிக், உய்க்பியஸ் நாளங்கள் (Mesonephric & Wolffian ducts) இரு பால் பறவைகளிலும் அதிவேகமாக நன்றாக உருப்பெற்று வளர்ச்சியடைந்து விடுகின்றன. மற்றும் வேறுபல ஆண்-பாஸ் ஹார்மோன்களையும், மேலே கூறியபடி முட்டையினுள் செலுத்தினால், முட்டையிலிருந்து உருப்பெறும் பாலுழை அந்நிகு கொண்டைப் பகுதி வளர்ச்சியுற்ற இனப்பெருக்கக் காலங்களில், இவ்வாறு சோதனைக்குள்ளாக்கப்பட்ட பறவைகள் முட்டையிலிருந்து வெளிவந்த சிறிய நாட்களுக்குள் இனப்பெருக்கக் காலங்களில் ஏற்படுத்தும் ஒலியையும் உண்டாக்குகின்றன. இவை இனப்பெருகத்திலேயே முதிர்ச்சியுற்று விடுகின்றன. ஹெரிங்கல் (Herring gull) பறவைகளிலும் இத்தகைய சோதனைகள் நடத்தப்பட்டன. ஆண்-பாஸ் ஹார்மோன்களை முட்டைக்குள்ளுள்ள வளர்க்குறியில் செலுத்தினால் முட்டையிலிருந்து குஞ்சு வெளிவந்து 37-முந்தம் 90 நாட்களுக்குள் முதிர்ச்சியுற்றப் பறவைகளின் இறகு வளர்ச்சி முழுவதையும் பெற்று விடுவதாகக் கண்டறிந்துள்ளனர். முதிர்ச்சியுற்றப் பறவைகளைப் போன்ற ஒலி எழுப்பும் ஆற்றலை இக்குஞ்சுப் பறவைகள் சுமார் 45 நாட்களுக்குள் பெற்றுவிடுகின்றன.

இனப் பெருக்கக் காலங்களில் மட்டும் தோன்றும் சில உறுப்புக்களின் வளர்ச்சி குறித்தும் இந்த ஆண்-பாஸ் ஹார்மோன்களின் விளைவு குறித்தும் பல ஆராய்ச்சிகள் நடத்தப்பட்டுள்ளன. காட்டு வான்கோழி-மெலிகாக்ரில் (Meleagris) போன்ற பறவைகளில் இனப் பெருக்கக் காலங்களில் தோன்றும் தசைத்தொங்கல் பகுதி பற்றி ஆராய்ந்துள்ளனர். இப்பகுதியின் வளர்ச்சி வீத்தகங்களின் அண்டரோஜென் ஹார்மோன்களின்கட்டுப்பாட்டு தன்மையினாலேயே வளர்ச்சியுறுகிறது. லேகோப்பஸ் மியூட்டஸ் (Lagopus lagopus) என்ற காட்டுக் கோழிகளின் (Ptarmigan) தெற்றிப் பகுதியில் ஏற்படும் 'ரோஜாப்பூ' (Roses) உறுப்பும், ஹைக்கேயினுள்ள கெனதாரி (Partridge) பறவைகளில் உள்ள 'கண்புருவப் பகுதியும்' (Eyebrows) இந்த ஆண்-பாஸ் ஹார்மோன்களால் கட்டுப்படுத்தப் பட்டு இயங்குகின்றன.

பறவைகளின் 'கடி வாழும்படிவிலி சமுதாய அமைப்பு' (Social hierarchy) அல்லது 'கொத்து விதி' (Peck order) பற்றியும் ஆராயப்பட்டுள்ளது. இந்த கொத்து விதி அமைப்பில் இனவேறு

மாடுகள் பற்றித் தெரிந்து கொள்ளுதல், முக்கியமானதொன்றாகும். வெள்ளிபெண்ட் (Silver Pheasant) பறவைகளிலும், வான்கோழிகளிலும் ஆண் பறவைகளுக்கு பெண் பறவைகளை அடக்கி ஆளும் ஒங்கு தன்மைகள் இருக்கின்றன. மற்றும் சில சிறப்பினங்களில் பெண் பறவைகளுக்கு ஆண் பறவைகளை அடக்கி ஆளும் ஒங்கு தன்மைகள் இருக்கின்றன. சில பறவைகளில் இனப் பெருக்கக் காலங்களில் பெண் பறவைகளின் தன்மை ஒங்கியிருக்கும். மற்றும் அண்ட சுரப்பியை அறுவை செய்து எடுத்துவிட்டால் எஸ்ட்ரோஜென் (Estrogen) ஹார்மோன்களை உடலின் உள்சே செலுத்தினால், இனப் பெருக்கக் காலத்தில் அண்ட்ரோஜென் (Androgen) ஹார்மோன் உற்பத்தியாகின்றது.

மற்றுமொரு விந்தையான மாற்றத்தை பெட்டைக் கோழிகளில் காணலாம். எப்பொழுதும் செயல்படும் அண்ட சுரப்பி பழுதடைந்து விடின், ஆண் இனச் செய் ஹார்மோன் உடலினால் செலுத்தினால் ஒரு பக்கம் அண்ட சுரப்பியும், ஒரு பக்கம் விந்துசுரப்பியும் வளர்ச்சி யுற்றுக் காணப்படுகின்றன. உடலினால் எஸ்ட்ரோஜென் ஹார்மோனின் துண்டிதலால், ஆண் பறவைகளில் காணப்படும் இறந்தகல் வளர்ச்சியுறுகின்றன. ஆண் பறவைகளைப் பெண்ணினமாகவும் ஹார்மோன்களும் உள்ளன.

எஸ்ட்ரோஜென் (Estrogen)

ஆண் பறவைகளில் ஆண்—பால் ஹார்மோன்களும், சில சமயங்களில் பெண்—பால் ஹார்மோன்களும் காக்கப்படுகின்றன என்பதற்குப் போதிய ஆதாரங்கள் உள்ளன.

ஆண் பறவைகள் சிறிதளவு பெண் பறவைத் தன்மைகளைப் பெறுவதும், பெண் பறவைகள் சிறிதளவு ஆண் பறவைத் தன்மைகளைப் பெறுவதும் இயற்கையாக நிகழும் ஒரு நிகழ்ச்சியாகக் கூற முடியாது. ஆஸ்ட்ரேலிய மேக்பீ (Magpie) பறவையின் இனமாற்றத்தைப்பற்றி விளக்கமாகக் கூறப்பட்டுள்ளது. இப் பறவையில் வலது விந்தைச் சாதாரணமாக உள்ளது. ஆனால் இடது விந்தைக் குறிப்பிட்ட வடிவமற்ற அண்ட விந்துப்பை (Ovotestis) யாகக் காணப்படுகின்றது. இதில் நான்சில், மூன்று பங்கில் அண்டப் பையின் கிபாசிக்கில்கள் உள்ளன. மற்ற நான்சில் ஒரு பங்கு விந்தைப்பகுதியாக செயிஸிப்பெஸ் துண் குழாய்களாகக் காணப்படுகின்றது. மற்றும் வெளித் தோற்றத்திலும் மாறுதல்கள் காணப்படுகின்றன. இதுபோன்ற மாற்றங்களெல்லாம் இனப்பெருக்க பால்—ஹார்மோன்களின் ஆற்றலாலேயே நடைபெறுகின்றன.

புரோஜெஸ்டினைகள் (Progestins)

இந்த ஹார்மோன்கள் சேவகனின் இரத்த பிளாஸ்மாவில் தான் உள்ளதெயல்யாமல், ஆண் இனப்பெருக்க உறுப்பாற்றல் அழிக்கப்பட்ட பறவைகளில் காணப்படுவதில்லை. இனப்பெருக்கக் காலங்களில் வித்தகங்களில் தோன்றும் கொணன்ட்ரால்+, லிப்பிடு கனின் உதவியாலேயே இந்த ஹார்மோன்கள் உற்பத்தியாகின்றன.

அண்ட சுரப்பி (Ovary)

கட்டமைப்பு (Structure)

ஆணின் இனப்பெருக்க உறுப்பைப் போன்றே பெண்ணின் இனப்பெருக்க உறுப்பும், சூன்மல் பிளின்யோது அண்டத்தை உற்பத்தி செய்யும் வேலையைவும், நாளமில்லாத் சுரப்பிகளின் செயலையும் ஆக இருவித செயல்களையும் செய்கின்றன. இதன் முக்கிய மான வேலை அண்டத்தை உற்பத்தி செய்வதுதான். பின்னும் பெண்-பால்-ஹார்மோன்-எஸ்ட்ரோஜென்னிகளையும் உற்பத்தி செய்கின்றது. இது அஸ்ட்ரோஜென் என்ற ஆண்-பால் ஹார்மோனையும் உற்பத்தி செய்வதாகக் கருதப்படுகின்றது. புரோஜெஸ்டிரான் (Progesteroes) என்ற ஹார்மோனும் பறவையின் அண்ட சுரப்பியிலிருந்தே உற்பத்தியாகிறதென்று கண்டுபிடிக்கப்பட்டுள்ளது.

அண்ட சுரப்பி, நிற நீரகங்களுக்கு எதிராக அமையப்பெற்று இந்த ஒற்றை உறுப்பு, சீரான தோற்றமில்லாத வெள்ளைநிறமுடைய உறுப்பாகும். அண்டத் தடவிகள் இதற்கு சுத்த இரத்தத்தைக் கொடுக்கின்றன. இது முதுகுப்புற உடற்குழி சவ்வுடன் பொருத்த மான மீசோவாரியம் (Mesovarium) என்னும் பத்தகத்தினால் (Ligament) பொருத்தி வைக்கப்பட்டுள்ளது. பொதுவாக எல்லாப் பறவைகளிலும் இடது பக்க அண்ட சுரப்பியும் இடது பக்க அண்ட நாளமும் மட்டுமே செயல்படுகின்றன. ரேப்டோர் (Raptor) பறவைகளில் இடது, வலது ஆக இரு பக்கத்து அண்ட சுரப்பிகளும் செயல்படுமாறு அமைந்துள்ளன. மற்றும் சில நிறப்பிளங்களில் ஒரு பக்க அண்ட சுரப்பியும் அண்ட நாளமும் முதிராப்பண்பாகக் கருதப்பட்டு, இரு பக்கமும் இனப்பெருக்க உறுப்புகள் வளர்ச்சியுற்றிருப்பதைக் காணலாம். அவ்வாறு வளர்ச்சியுற்றதன் பயனாக, வர்த்து ஒவ்வொரு நாளும் இரு முட்டைகளை ஒரே சமயத்தில் இட்டதாகவும் அது ஒரு சாதாரண திகழ்ச்சி அல்ல வென்றும் கூறப்படுகின்றது.

அண்ட சுரப்பியின் வெளிப்பகுதிக்கு கார்ட்டிடெக்ஸ் என்று பெயர். அதில்தான் அண்டங்கள் உள்ளன. இப்பகுதி இரத்த நாளங்களால்

வான மெடுமவா என்ற பகுதியைச் சுற்றிலும் அமைந்துள்ளது. இந்த மெடுமவாப் பகுதி இளைப்புத் திடக்களானது. கார்ட்டெக்ஸ் பகுதியின் சுற்றுப்புறத்தில் மூல இன எப்பித்திரியம் அருக்கு உள்ளது. அதில்தான் மூல இனச் செல்கள் முதல்படி இரண்டாம்படி நிலையில் ஊகிவடுகளாக சிபாலிக்கின்களில் அமையப் பெற்றுள்ளன. ஒரு அண்டப் பையில் சுமார் 1600 முதல் லட்சம் வரை சிபாலிக்கின்கள் உள்ளன. இதில் சிறிய சிறிய பகுதிகளே வேண்டுமளவிற்கு முதிர்ச்சியிற்று, முட்டைகளை உற்பத்தி செய்கின்றன.

அண்டச் சுரப்பியில் சுரக்கப்படும் பொருள்கள்

ஒவ்வொரு சிபாலிக்கின் வளர்ச்சியும் பொழுதும், அதில் உள் செல்களின் இளைப்புத் திடக்களும், அதைச் சுற்றிலும் வெளிக்களச் சுருக்குகளிலிருந்தும் விப்பாய்டல், கொலஸ்ட்ராஃம்த் வி ய பொருள்கள் உற்பத்தியாகின்றன. ஒவ்வொரு சிபாலிக்கின்களிலும் சிபாலிக்கின் திரவம் (Liquor Folliculi) உள்ளது. மற்ற நான்கு மிகுமாச் சுரப்பிகளைப் போன்றே இந்த சிபாலிக்கின்களும் அடர்த்தியான இரத்த நாளங்களால் சூழப்பட்டுள்ளது. இரத்தத்தில் உலித்த ஹார்மோன்களை (Blood born hormones) சிபாலிக்கின்கள் முதிர்ச்சியடைதலிற்குக் காரணமாக உள்ளன. இந்த செல்களிலுள்ள விப்பிடுகளில் கொலஸ்ட்ராஃம்த், பொருள் திறந்துள்ளது. ஸ்டிராப்டு ஹார்மோன்களை உற்பத்தி செய்வதற்கு கொலஸ்ட்ராஃம்த், பொருளே முன்னோடியாக அமைந்துள்ளது. அண்டம் முதிர்ந்து சிபாலிக்கின்களிட்டு வெளியேறியவுடன், வேறு சில செல்கள் அக்குழியை அடைந்து விடுகின்றன. பறவைகளில் கார்ப்பஸ் லூட்டியம் (Corpus luteum) என்ற பொருள் நிரந்தரமாகக் காணப்படுவதில்லை. அண்ட சுரப்பியில் இரண்டுவித இடைவிட்டுச் செல்கள் இருப்பதாகக் கண்டுபிடிக்கப்பட்டுள்ளது. இந்த செல்களில் சுரப்பி செல்களும் உள்ளன. வித்தகங்களில் காணப்படும் அண்டரோஜன் சுரக்கவக்கும் லெய்டிக் (Leydic) செல்களை ஒத்தே மேற்கூறிய செல்கள் உள்ளன.


அண்ட சுரப்பி, வித்தகத்தைப் போன்று அண்டரோஜென், அண்டரோஜென் ஆகிய இரண்டு ஹார்மோன்களையும் சுரக்கின்றதா என்பது கேள்விக்குறிய பொருளாகும். மேலே குறிப்பிட்ட இரண்டு விதச் செல்களுக்கும் உள்ள முக்கிய வேறுபாடுகள், அவைகள் தோன்றும் பொழுது சிறிது தெரிவின்றித் தவிர மற்ற சமயங்களில் அவ்வளவாகத் தெரியவில்லை. ஆனால் இந்த செல்களை அண்டரோஜெனை உற்பத்தி செய்கின்றன என்பது தெளிவாகத் தெரிவின்றது. கோழிகளில் இருபால் பறவைகளிலும் கொண்டையின் வளர்ச்சி, அண்ட

ரோஜெனிக் ஹார்மோனாலேயே கட்டுப்படுத்தப்படுகின்றது. கோழிகளில் பரிசோதனைபின் மூலம் கொனாடோட்ரோப்பின் (Gonadotrophin) ஹார்மோனை உடலினுள் செலுத்துவதை நிறுத்தியபின் பெட்டைக் கோழிகளில் கொண்டை வளர்ச்சி தடைபட்டுவிடுகின்றது என்பதாகக் கூறப்படுகின்றது. மற்றும் அண்டத்தினுள்ள மேடுமலர்ப் பகுதியின் இடைச் செல்கள் நுரை போன்ற விப்பாய்ரூப் பொருளாக நிரப்பப்படுகின்றது.

எஸ்ட்ரோஜென் (Estrogen)

எஸ்ட்ரோஜென் ஹார்மோன் எத்தகைய செல்களிலிருந்து உற்பத்தியாகுதலும் அதன் செயல்படு தன்மை பவவானாகவுள்ளது. கிப்படி அவகினை யுடைய டாயோக் பறவைகளிலும் (Dioch) பட்டெஜிகாக் (Budyerygab) அல்லது பேரக்ரீட் (Parakeet) பெண் பறவைகளிலும் பெண்பால் ஹார்மோன்களின் தூண்டுதலால் அலகுகளின் திறம் மாறுகின்றன. விடுகளில் வளர்க்கப்படும் சில கோழி வகைகளில், ஆண் இனப்பெருக்க உறுப்பாற்றல் அழிவினால் அவற்றின் இறகுகளின் திறம் தன்மை முதலானவை மாறுபட்டு காணப்படுவதில்லை. இஃது பால் பறவைகளின் வேற்றுமைகள் இப்பறவைகளின் பெண்பால்-ஹார்மோன்களாலேயே தூண்டப்படுகின்றன. எஸ்ட்ரோஜென் ஹார்மோன் பறவைகளில் கூடு கட்டும் தன்மையைத் தூண்டுகின்றது. ஆனால் பெண் பறவைகளில் எஸ்ட்ரோஜென் ஹார்மோனை உடலினுள் செலுத்தினால், அடைகாக்கும் தன்மை நின்று விடுகின்றது. சண்டைச் சேலங்களில் ஒலி எழுப்புதலும் போன்ற மற்ற இனப்பெருக்கக் கால செயல்படுதன்மைகளும் நின்றுவிடுகின்றன. இனப்பெருக்க உறுப்பாற்றல் அழிக்கப்பட்ட ஆண் பறவைகளில், ஆண் தன்மை மூற்றிலும் அழிந்து விடாமல் நிறிது காணப்படினும், எஸ்ட்ரோஜென் ஹார்மோனை உடலினுள் செலுத்தினால், பின்னும் பெண் பால் தன்மைகளே நலி தூக்குகின்றன. இனப்பெருக்க உறுப்பாற்றல் அழிக்கப்பட்ட ஆண் பறவைகளிலும் அண்ட சுரப்பியின் நிகக்களைப் பொருத்தினால், அவை குஞ்சுகளைப் பாதுகாக்கும் தன்மை முதல் பல பெண்பால் பறவைகளின் தன்மையைப் பெறுகின்றன. பெண் புருக்களில் அண்ட சுரப்பியினை அகற்றிவிட்டு எஸ்ட்ரோஜென் ஹார்மோன்களை உடலினுள் ஊசிமூலம் செலுத்தினால் ஆண் தன்மைகளைப் பெறுகின்றன.

எஸ்ட்ரோஜென், இனப்பெருக்கக் காலங்களில் அண்ட நாளங்களையும் செயல்படத் தூண்டுகின்றன. கேக்ஸியம் உப்பினை எலும்பிலிருந்து உள்ள குழிகளில் (Marrow) சேர்த்து வைக்கவும், அவற்றை மூட்டை உற்பத்தியாகும் பொழுது அதன் ஒரு உண்டாக்கும் நிலைக்கு பயனுள்ளதாகவும் எஸ்ட்ரோஜென் இன்றியமையாததொன்றாக



படம் 47. கிட்டுக்குருவி-பெண் இனப்பெருக்க மண்டலம்

(அ) இனப் பெருக்கமற்ற காலத்தில் இன உறுப்புகளின் நிலை

(ஆ) இனப்பெருக்கக் காலத்தில் இன உறுப்புகளின் நிலை

1. இடது அண்டகம், 2. அண்டப் புறம், 3. கடைநிலை சிறு நீரகம், 4. சிறு நீரக தாளம், 5. காப்போரோட்டேரியம், 6. பொதுப் புறம், 7. ஆரோட்டேரியம், 8. ஒடுக்கப்பட்ட வித்துறளம்.

அமைந்துள்ளது. இனப்பெருக்க உறுப்பு நாளங்களில் கேக்ஸியம் சேர்த்து வைக்கப்படவில்லை. ஆனால் அவை கோழிகளில் எலும்புக் குழியினுள் (Marrow) சேர்த்து வைக்கப்பட்டு ஒரு முறையில் ஆறு மூட்டைக்கு வேண்டிய கேக்ஸியம் உப்பு எலும்புக் குழியினுள்ளிருந்து வெளியேற்றப்பட்டு, பண்படுத்தப்படுகின்றது. கோழிகள், புறங்கள், குள்ள வாத்ஸுகள் முதலான பறவைகளில் இரத்தத்தில் கேக்ஸியம் பாஸ்பரஸ் முதலிய பொருள்கள் மூட்டையிடும் காலங்களில் அதிகரிக்கின்றன. எஸ்ட்ரோஜென் ஹார்மோன்கள் புறக்களின் உடலினுள் செலுத்தப்படும்போது பேராசைதரார்ப்பும் இதனுடன் செயல்படுகின்றது. புறக்களின் இரத்தத்தினுள்ள கேக்ஸியம் உப்பு வரம்பும் அதிகரிக்கின்றது.

பறவைகளின் இரத்தத்தில் விப்பிடுகள் அதிகரிப்பதற்கும் எஸ்ட்ரோஜென் ஹார்மோனின் செயல்படு தன்மையும் கட்டுப்பாடுமே காரணம் என்று தெரிகின்றது. வயசை போகும் பறவைகளில் தொலிவிநகடியிலும் உடற்குழி படலத்திற்கிடையிலும் கொழுப்புப் பொருள் சேகரிக்கப்பட்டு வைக்கப்படுவதற்கும் எஸ்ட்ரோஜென் ஹார்மோனின் தூண்டும் தன்மையே காரணமாகும்.

அண்ட்ரோஜென் (Androgen)

விடுகளில் வளர்க்கப்படும் கோழிகளில் கொண்டை வளர்ச்சி அண்ட்ரோஜென் ஹார்மோனின் கட்டுப்பாட்டுத் தன்மையாலேயே வளர்ச்சியுறுகின்றது என்பது தெளிவாகத் தெரிகின்றது. இவைபுதிர் காலங்களிலும் குளிர்காலங்களின் மத்தியிலும் சில பால் வழி மாறுபாடுகள் பறவைகளில் ஏற்படுவதும் அண்ட்ரோஜெனிலிருந்து சுரக்கப்படும் அண்ட்ரோஜென் ஹார்மோன்களாலேயே வாகும்.

ப்ரோஜெஸ்டினைன் (Progestins)


ப்ரோஜெஸ்டினைன் பறவைகளின் உடலிலும் பாதுகாப்புகளின் உடலிலும் உள்ளதாகக் கண்டு பிடிக்கப்பட்டுள்ளது. பறவைகளின் அண்ட்ரோஜென் நிரந்தரமான கார்ப்பல் விழுத்தியும் என்ற ஒரு பொருளை வளர்ச்சியுற் செல்வதில்லை. மூட்டையிடும் கோழிகளிலும், மூட்டையிடாத கோழிகளிலும் இரத்தத்தில் ப்ரோஜெஸ்டினைன் உள்ளன.

இன உறுப்பு நாளங்கள்

ஆண் பறவை

ஆண் பறவைகளில் இந்த உறுப்புகள் மிகவும் சாதாரணமாகவே அமைந்துள்ளன. ஒவ்வொரு பக்கத்திலும் விந்தகம், விந்த

கத்திவிடுத்து தோன்றும் நிறு குழாய்களான விந்து நாளம் (Vas efferens), எபிடிடிமஸ் (Epididymus), விந்து நாளம் (Vas deferens) முதலிய பகுதிகள் உள்ளன. விந்து நாளம் முக்கியமாக



அ

ஆ

படம் 48. (அ) ஆண் புற-இனப் பெருக்க மண்டலம்

1. அபீனஸ் சுரப்பி, 2. விந்தகம், 3. நிறு நீரகம், 4. விந்தக நாளம், 5. நிறு நீரக நாளம், 6. மலக்குடல், 7. நிறுநீரக நாளத் துவாரம், 8. விந்தக நாளத் துவாரம், 9. பொதுப் புணர், 10. பொதுக் கழிவறை.

(ஆ) பெண் புற-இனப் பெருக்க மண்டலம்

1. அபீனஸ் சுரப்பி, 2. நிறு நீரகம், 3. நிறு நீரக நாளம், 4. மலக்குடல், 5. நிறு நீரக நாளத் துவாரம், 6. பொதுப் புணர், 7. ஒடுக்கப்பட்ட வளை அண்ட நாளம், 8. புணர் குழல் (Vagina), 9. இடது அண்ட நாளத் துவாரம், 10. கருப்பை (Uterus), 11. இவ்விந்தகம், 12. மேகனம், 13. அண்ட தளப் புணல் (Punnal of osium), 14. இடது அண்டகம், 15. முதிர் கரு (முட்டை) (Ova).

எல்லாப் பறவைகளிலும் பின்பக்கமாக நீளும் இடத்தில் விந்துப்பை (Seminal vesicle)யாக மாறியுள்ளது. விந்துப்பைவிடுத்து பீச்சு நாளத்தின்மூலம் (Ejaculatory duct) பொதுக் கழிவறையின் பூரோடேயிப்பதினாள் விந்துக்களைச் செலுத்துகின்றது.

விந்தகத்தில் உதித்த விந்தணுக்கள் (Spermatozoa) விந்தக துண் குழாய் வழியாக விந்தகத்தின் ரெட்டி (Reti) நிறு குழாய்களை அடைகின்றது. விந்தகத்தினுள்ள துண் குழாய்கள் பாதுரட்டிகளில் உள்ளது போன்று இடைக்கதிரையால் பிரிக்கப்படாமல் ஒரு வளைப் பின்னல் போன்று அமைந்துள்ளது. விந்தகங்களினுள்ள ரெட்டி

நுண் குழாய்கள் இனப்பெருக்க உறுப்புகள் செயல்படாத காலங்களில் மிகவும் சிறியதாகவுள்ளன. இனப் பெருக்கக் காலங்களில் அவை பெரிதாகப்படுகின்றன. இனப்பெருக்கக் காலங்களிலும் இந்த ரெட்டி நுண் குழாய்களில் வித்தணுக்களைக் காண முடியாது. அவை அம்வளவு விரைவாக இந்த நுண் குழாய்களைக் கடந்துசென்று விடுவதாகக் கருதப்படுகின்றது. பின்பு வித்தணுக்கள், வித்தக நாளங்களை அடைகின்றன. இப்பகுதியும் இனப்பெருக்கக் காலங்களிலேயே வளர்ச்சியின் உயர்வை அடைகின்றன. இந்தப் பகுதியிலுள்ள எப்பித்தியல் செல்கள் கரப்பிசுளால் நிறைந்தது.

அடுத்த பகுதியான எப்பிடியுமல் என்ற உறுப்பும் இனப்பெருக்கக் காலங்களிலேயே நன்றாக வளர்ச்சியுற்று வெள்ளை நிறமாகக் காணப்படுகின்றன. இது ஒரு கருள் வடிவமுடைய குழாயாகும். இது வித்தகத்திற்கும் சிறு நீரகத்திற்கும் அருகாக அமைந்துள்ளது. சாதாரணமாக பெசுரைப் பறவைகளில் வித்தணுக்கள் இப்பகுதியில் சேமித்து வைக்கப்படுவதில்லை. ஆனால் சில சமயங்களில் எப்பிடியுமல் பகுதியில் வித்தணுக்கள் இருப்பதைக் காணலாம்.

பின்பு வித்தணுக்கள் தசைகளடங்கிய வித்து நாளத்தின் வழியாக எடுத்துச் செல்லப்படுகின்றன. இந்த வித்து நாளம் சிறுநீரகத்தின் வலிப்புப் புறம்பிக்கத்தில் சிறிது தூரத்திற்கு நன்றாக பொறித்த வாயு சாதாரண காலங்களில் அமைந்துள்ளது. இந்த வித்து நாளம் பின்பு புறம் நோக்கிச் சென்று பொதுக்கழிவறை வரை நீளுகின்றது. இனப் பெருக்கக் காலங்களில் இது மிகவும் நீளமாகவும் வளைவுகளுடனும் இருப்பிதாடல்களால் சிறுநீரகத்தில் பொறித்திருந்த பகுதி பிரிக்கப்பட்டு தவித்துக் காணப்படுகின்றது. இப்பகுதியிலிருந்து வித்தணுக்கள் வித்துப்பையை அடைகின்றன. வித்து நாளமும் வித்துப்பையும் பறவைகளில் மைய கழிவு நீரக நாளங்களிலிருந்து தொன்றிய பகுதிகளாகும். ஆனால் இந்தப் பகுதியை பாதுாட்டிகளின் இதேபகுதியுடன் ஒப்பிட்டுப் பார்த்தால் பறவைகளில் இப்பகுதிக்கு அம்வளவு முக்கியத்துவம் கிடையாது. பாதுாட்டிகளில் இப்பகுதி கரப்பிசுளடங்கிய பகுதி மட்டுமேயாகும். பறவைகளில் இது கரப்பிசுளால் நிறைந்திருப்பினும் ஒரு உறுப்பாகவும் செயல்படுகின்றது.

இனப்பெருக்கத்தில் ஈடுபடக் காலங்களில் வித்துப்பைகள் மிகச் சிறியதாகவும் சற்றே கருண்டும் காணப்படுகின்றன. இனப் பெருக்கக் காலம் நெருங்க நெருங்க, இவைகள் நன்றாக கருட்டப்பட்டு பெரியதாகக் காணப்படுகின்றன. இதன் வளர்ச்சியும் அளர்ச்சியும் தமாரிமோனின் கட்டுப்பாட்டைப் பொருத்துள்ளது. புணர்ச்சியின்மொழுது இந்த உறுப்பு சற்று வெளியே நீட்டப் பெற்று

வித்துக்களை பெண் இனப்பெருக்க உறுப்புகளினால் செலுத்துகின்றது. புணர்ச்சி உறுப்புகளைப்பற்றி நடத்திய பல்வேறு ஆராய்ச்சியின் பலனாக விறைப்பான பீச்சு நாளங்களும், நிணநீர்த்திகைத் தொங்கல் பகுதிகளும், இரத்த நாளம் சார்ந்த பகுதிகளும் வித்துக்களை ஆண் பறவைகளினின்றும் பெண் பறவைகளினால் செலுத்தப் பயன் படுவதால் அவைகளே பறவைகளில் புணர்ச்சி உறுப்பாகவும் கருதப் படுகின்றது.

பெண் பறவை

பறவைகள் குட்டி போடும் பழக்கமுள்ளவைகள் அல்ல. மற்றும் பெண் பாதுாட்டிகளின் இனப்பெருக்க உறுப்புகளுடன் பெண் பறவைகளின் உறுப்புகளை ஒப்பிட்டால், பெண் பறவைகளின் இய்வுறுப்பு மிகவும் சாதாரணமாக சிக்கலற்று காணப்படுகின்றது.

ஊர்வனவற்றிலிருந்து பறவைகளுக்குக் கிடைத்த முட்டையிடும் பண்பு மிகவும் சிக்கலானது. முட்டை வளர்ச்சியுறும் பொழுது அதில் மஞ்சள் கரு நிரம்பியுள்ளது. அண்ட நாளத்திலேயே அண்டம் கருவுறுதல், அண்டத்தை சுற்றி வெள்ளைக் கரு உற்பத்தியாகுதல், முட்டையைச் சுற்றி பல உறைகள் வளர்ச்சியுறுதல், முட்டையின் ஒரு வளர்ச்சியுறுதல் போன்ற பலதரப்பட்ட செயல்கள் அண்ட நாளத்தின் பல பகுதிகளில் ஏற்படுகின்றன.

எவ்வாறு பறவைகளினும் அண்டமும் அண்ட நாளமும் ஏறத் தாழ் ஒரே மாதிரியாகவே உள்ளன. ஆனால் பாதுாட்டிகளில் எவ்வாறு பிராணிகளினும் அவை அல்லாது ஒரே மாதிரியாக அமைந்திருப்ப தில்லை. பறவையின் அண்ட நாளம் மடிப்புக்களுடன் கூடிய ஒரு நீண்ட நாளமாகும். மடிப்புக்களுடன் கூடியிருப்பதால் அவை மீள் தன்மை பெற்றுள்ளது, இது தன் உள்பக்கம் குறு இழை (Cilia) களால் போர்த்தப்பட்டுள்ளது. மூதுருப்புற பந்தகத்தால் உடல் கவரை ஒட்டிக்கொண்டு தொங்கும் நிலையி் அமைந்துள்ளது. வயிற்றுப் புறப் பந்தகம், அண்ட கரப்பியின் அருகில் அமைந்து, அண்ட கரப்பியி லிருந்து அண்டம் வெளியேறும் பொழுது, அதை அண்ட நாளத் தினால் செலுத்த ஏதுவாக அமைந்துள்ளது. வயிற்றுப்புறப் பந்தகம் பின்புறமாகச் சென்று, புணர்புழை (Vagina) கவரில் பொருத்தப் பட்டுள்ளது. இந்த இரு பக்கப் பந்தகங்களும், அண்ட நாளம் அசைவதற்கு ஏதுவாகப் பொருத்தப்பட்டுள்ளன. இதில் முக்கியமான இரத்த நாளங்களும் அமைந்துள்ளன. அண்ட நாளத்தின் முன்பகுதி திறந்த இன்ஃபண்டிபுலப் பகுதியாகும். இது அண்ட கரப்பியிலிருந்து முடிர்ச்சியுற்ற மஞ்சள் கருவுடைய அண்டத்தை தன்னருகில் இழுத்துக் கொள்கின்றது. பின்பு அண்ட நாளத்தின் தன்னிச்சை தசை அலைகளால் ஏற்படும் அசைவினால் இன்ஃபண்டிபுலத்தின்

பறவைகளின் இனப்பெருக்க மண்டலம்

சிறிநீடை வழியாக அண்டம் உள்நே செல்கின்றது. இது போன்ற அசைவுகள் முட்டைகள் முதிர்ச்சியுற்று அண்ட நாளத்திற்குள் செல்ல தயாராகவிருக்கும் நிலையில் தான் ஏற்படுகின்றன. அண்ட நாளத்தின் மேக்னம் (Magnam) பகுதியை அண்டம் அடைகிற பொழுது, ஆண் பறவைகளிலிருந்து பெண் பறவைகளின் அண்ட நாளத்தினே அடைந்த வித்துக்கள் அண்டத்துடன் இணைந்து கருவுறுதல் நடைபெறுகின்றது. பெண் பறவைகளின் அண்ட நாளங்களை அடைந்த வித்துக்கள், ஒரு சிறிது காலத்திற்கு அழிந்து விடாமல், வாழும் தன்மையுடன் (Viable) இருக்கின்றன.

அண்ட நாளத்தின் உட்பரப்புச் செல்களின் மாற்றங்களின்பற்றித் தெரிந்து கொள்வதற்கு, ஆராய்ச்சிகள் நடத்தப்பட்டன. இனப்பெருக்கக் காலங்களில் முட்டைகள் முழுமையாக உற்பத்தி யாவதற்கும், எண்டோமென் ப்ளே ஜெண்டிபிரன் போன்ற ஹார்மோன்களின் உதவியினால் முட்டை முழு அளவு அமைப்பினைப் பெறுவது குறித்தும் விரிவான விளக்கங்கள் உள்ளன. இனப் பெருக்கக் காலங்களில் ஏற்படும் மிகையான அண்ட நாளங்களின் வளர்ச்சியில் மட்டுமல்லாமல், முட்டையின் ஆல்புமென் உற்பத்தியின் பொழுதும் ஹார்மோன்கள் பெரிதும் துணை புரிகின்றன. ஆல்புமென் பொருளின் உற்பத்தி, மஞ்சள் கரு சூழ்ந்த முட்டை அண்ட நாளத்தை அடையும் பொழுது அதிகரிக்கின்றது.

அண்ட நாளத்தின் மேக்னம் பகுதியில் உற்பத்தியாக்கப்பட்ட யென்னை ஆல்புமென், நான்கு அடுக்குகளாக அமைந்துள்ளது. ச்சனாசா (Chalaza) என்ற அடுக்கு முட்டையின் மஞ்சள் கருவை அடுத்து அமைந்துள்ளது. முட்டை அதைச் சூழ்ந்துள்ள ஆல்புமென் அடுக்குகளுடன் அண்ட நாளத்தின் கடைசிப்பகுதியான இஸ்துமஸ் (Isthmus) பகுதியை அடைகின்றது. இது அவ்வளவு சிறந்த கரப்பி கடைக்கிய பகுதி அல்ல. இருப்பினும் மஞ்சள் கரு, ஆல்புமென் அடுக்கு முதலியவற்றால் சூழப்பட்ட முட்டை கெட்டிப்படுத்தப்பட்ட உள்வெளி படவங்களை அண்ட நாளத்தின் இப்பகுதியிலிருந்துதான் பெறுகின்றது. அண்ட நாளத்தின் கடைசிப் பகுதி யூட்டிரென் பகுதி யாகும். இதில் ஓட்டினை உற்பத்தி செய்யும் தசைகளடர்ந்த கரப்பி களுள்ளன, இதில் கரப்பிகள் வரிசைக்கிரமமாக அமைந்துள்ளன. இந்த கரப்பிகளிலிருந்தே முட்டையின் ஆல்புமென், தண்ணீர், உப்புக்கள் முதலியவற்றைப் பெறுகின்றது. பின்னும் இப்பகுதி கிரேஸே, முட்டை கற்றிலும் உறைபோன்ற துணை துளைகளுடன் கூடிய (Porous) பெரிதான அமைப்பிையுடைய கேக்ஸியம் உப்பினுள்ள ஓட்டினைப் பெறுகின்றது. வீடுகளில் வளர்க்கப்படும் கோழி முட்டையில் கேக்ஸியம் காப்பனேட் 94 சதவீதமும், மெக்னீ

செயல் கார்பனைட் 1 சதவீதமும், கேக்ஸியம் கிபால்பேட் 1 சதவீதமும் உள்னன. புரதப் பொருளடங்கிய கரிம இடைவீட்டும் பொருள் (Matrix) 3 முதல் 4 சதவீதம் மூட்டை ஒட்டிக் உள்ளது.

புட்டிரஸ் என்ற ஒட்டுச் சுரப்பிகளான பகுதி கேக்ஸியம் உப்பை சேமித்து வைப்பதில்லை. எனும்புக்குழிகளினின்றும் நெற்று கேக்ஸியம் உப்பும், உண்ணும் உணவிலிருந்து பிரிக்கப்பட்ட நெறிதளவு கேக்ஸியம் உப்பும், பறவை மூட்டையின் ஒரு உற்பத்திக்கு பயன்படுகின்றது. இந்த காரணத்திற்காகவே சில பறவைகளில் ஆண் பறவைகளை விடப் பெண் பறவைகளில் எனும்பாக்கப்பட்டத்தன்மை அதிக நெற்பாக அமைந்துள்ளது.

நிறமிகள், ஒட்டுடன் கைக்கப்படுவதும் இந்தப் பகுதியிலேயே நடைபெறுகின்றது. புணர்முறை ஒரு கருக்குத் தகையினும் பாதுகாக்கப்பட்டுள்ளது. இதன் வழியாக மூட்டை பொதுக்கழி வதையை அடைந்து அங்கிருந்து வெளியேற்றப்படுகின்றது.

13. பறவை ஒரு பறக்கும் இயந்திரம்

ஓர் உயிர் ஓர் இடத்திலிருந்து மற்றொரு இடத்திற்கு சென்று அங்குள்ள சூழ்நிலைக்கேற்பத் தன்னை மாற்றிக் கொண்டு வாழ முயற்சித்தல் விலங்குகளின் வாழ்க்கையில் நடைபெறும் பொராட்டமாகும். கடுங்குளீர் கானங்களில் கவர்க்கொழிகளானது (Chickadee) இரைபுண்ணுமல் ஊன்கொழுப்பினால் (Suet) உடல் நிலையை ஒரே சீராக வைத்துக்கொண்டு சுற்றுச் சூழ்நிலைக்கேற்ப தன்னை மாற்றிக் கொண்டு வாழ முயற்சிக்கின்றது. உடற்செயலின் தன்மைகள் மானுடம் அமைத்திருக்க வேண்டும். இடைக்கப்பெற்றுள்ள வரம்பிற்குள் விலங்குகள் தம் குலங்களுக்குத் தேவையான வெப்பம், பிராணவாயு, சர்க்கரை பொருள், புரதம், உப்புக்கள், வைட்டமின்கள் முதலியவற்றை பெற்று உயிர்வாழ பழகிக் கொள்ளுதல் அவசியமாகும். இவ்வாறு ஒரு குறிப்பிட்ட வரம்பிற்குள் தாங்கள் வாழ வழிவகுத்துக்கொண்டிருக்கும் பொழுது அவ்விலங்குகளுக்கு வேறு விதமான மாற்றங்கள் சூழ்நிலையோ அவ்வது மற்றும் உணவுப் பொருள்களிலோ ஏற்படுமானால் அவை வாழமுடியாமல் இறந்துவிடுகின்றன. பறவைகள் தம் வியக்கத்தக்க பறக்கும் ஆற்றலினால் பெரிய சமுத்திரங்கள், பாசிவனங்கள், மற்றும் பல கண்டங்கள் முதலியவற்றைக் கடந்து பறந்து செல்கின்றன. அவ்வாறு பறக்கும் திறனும் பல இடங்களையும் கடந்து செல்லுதலால் பறவைகளுக்கு இயற்கையிலேயே உள்ளூறுப்புக்களின் செயல்படுதன்மை நல்ல முறையில் இடத்திற்கேற்ப இயங்கும் வண்ணம் அமைந்துள்ளன. பறக்கும் ஆற்றலினால் பறவைகள் வெளியுலகின் நிலைமைக்கேற்றவாறு தங்கள் உள்சூறுப்புக்களின் செயல்படும் திறனை அமைத்துக் கொண்டுள்ளன. மற்றும் பறக்கும் ஆற்றலினாலேயே பறவைகள் பலவாறான சூழ்நிலையிலும் வாழும்படியான திறன் பெற்று, உணவுப் பொருளைத் தேடி உண்ணுகின்றன.

பறக்கும் ஆற்றல் பெற்றுள்ளதால், பறவைகள் பூமியின் எந்த இடத்திற்கு வேண்டுமானாலும் பறந்து செல்லலாம், எங்கு வேண்டு.

மாணலும் உணவுப் பொருளைத் தேடி உண்ணலாம். எங்கு வேண்டுமாணலும் தேவைகளுக்கேற்ப கடுகிகள் கட்டிக்கொண்டு வாழலாம். இவ்வாறு பறக்கும் ஆற்றலைப்பெற்று பல்வேறு சூழ்நிலைகளிலும் உணவுப் பொருளைத் தேடிக்கொண்டும், கடுகிகள் கட்டிக்கொண்டும் வசிப்பதற்கு, அவற்றின் பண்புகள் அமைந்துள்ளபடியால், உலகின் எல்லா முதுகெலும்புள்ள பிராணிகளிலும் பறவைகளே எண்ணிக்கையில் அதிகமாகக் காணக்கூடிய பிராணிகளாகும். பாலூட்டிகளிலும், மீன் வகைகளிலும் சுமார் 15,000 நிறப்பினங்களே ஒவ்வொன்றிலும் தாம் காணலாம். ஆனால் பறவைகளில் சுமார் 25,000 நிறப்பினங்கள், பற்றிப் பரவி சிதறி உலகெங்கும் வசிப்பதைக் காணலாம்.

பல பறவை நிறப்பினங்களை ஒப்பிட்டு நோக்குங்கால் பொதுவாக ஒவ்வொன்றும், வெவ்வேறு அமைப்புடையன என்பதைக் காணலாம். அவை உடலின் எடை, அளவு, நிறம், பாடும் நிறம், பறக்கும் நிறம் முதலிய எல்லாப் பண்புகளிலுமே ஒன்றுகொன்று வேறுபட்டிருப்பதைக் காணலாம். ஆனால் கூர்ந்து ஆராயுமிடத்து, அவை பாலூட்டிகளைக் காட்டிலும் ஒன்றுக்கொன்று, ஏறத்தாழ ஒரேமாடுரியான பண்புகளையுடையதாய் இருத்தலையும் அறியலாம். ஒரு சிறிய பாடும் பறவையின் எடை சுமார் 1/10 அவுன்சாகும். ஆனால் ஒரு திக்கோழியின் எடை 125 பவுண்டாகும். ஒரு பெரிய திக்கோழியானது ஒரு சிறு பாடும் பறவையைவிட சுமார் 20,000 மடங்கு எடை அதிகமாகும். அதேபோன்று பாலூட்டிகளிலும் ஒரு திமிங்கிலம் 300,000 பவுண்டு எடை உள்ளது. ஒரு முஞ்சுறு 1/7 அவுன்சுதான் எடை உள்ளது. ஆனால் பறவைகளின் உடற்கட்டமைப்புக்தான், அவற்றிடையே உள்ள ஒற்றுமை எடுப்பாகத் தெரியும். பாலூட்டிகள் வால்ரசைப் போன்று (Walrus) பருத்தும், மரதாங்களைப் போன்று (Weasel) ஒடுக்கமாகும், சில எலுதுகளிலுள்ளது போன்ற டென் உரோமக்கற்றைகளை யுடையதாயும், பாலிய வளத்திலுள்ள எலிகளைப் போன்று உரோமங்களற்றும், திமிங்கிலத்தைப் போன்று உடல் நீண்டும், துண்ணெலிகளைப் போன்ற உடல் குட்டையாலும் இவ்வாறு பலவிதமாக இருப்பதைக் காணலாம். மேலும் அவையின் நீத்துவதற்கும், தவழ்வதற்கும், தோண்டுகதற்கும், ஏறுவதற்கும் போன்ற பல தகவமைப்புகளைக் கொண்டுள்ளன. ஆனால் பறவைகளில் உடல் எடை, நிறைபோன்றவைகள் ஒன்றுக்கொன்று வேறுபட்டாலும், அவை யாவும் பறக்கும் நிறையே மையமாகக் கொண்டுள்ளன. பறவைகளின் உடற்கட்டின் உள்ளுறுப்புக்களின் அமைப்பும் செயல்படுதிறனும், வெளித்தோற்றமும் அமைப்பும் அவை பறப்பதற்கேற்பவே அமைந்துள்ளன என்பது குறிப்பிடத்தக்கது. பறவைகளின் உடற்கூறுகளை (உள்ளும் புறமும்) ஆராய்ந்தே பறக்கும் இயத்திரங்களையும் இயற்றியுள்ளார்கள். பறவைகள் ஒலி

யுண்டாக்கும் காற்றியைக்க இயந்திரங்களை (Sound aerodynamics) போன்றனாக.

பறவைகள் அவற்றிற்கேவுரிய இறகுகள், இறக்கைகள், வெற்றிட ழுள்ள எலும்புகள், வெப்ப இரத்தத்தன்மை நிறப்பாக அமைப்பி் பெற்று கவாச உறுப்புகள், உறுதியான பலம் பொருத்திய இருதயம், பறக்க உதவும் மார்புத்தசைகள் முதலியனவற்றைக்கொண்டு ஒரு பறக்கும் இயந்திரமாக அமைந்துள்ளன. மேற்கூறிய தகவலமைப்பு களுடன் அதிக சக்தியும், குறைந்த எடையும்தான் பறப்பதற்கு வேண்டிய முக்கிய சாதனங்களாகும். பறவைகளில் வியர்வை சுரப்பிகளில்லை. வியர்வை சுரப்பிகள் இல்லாததால் பறவை களின் உடல் எடை மிகவும் குறைவாகவிருக்கும். இறக்கைகளும் ஈரமற்று வரண்டதாகக் காணப்படுகின்றன. அவ்வாறு இருத்தலும் பறவைகளின் உடல் கனத்தை குறைக்க ஏதுவாகவிருக்கும். இனப் பெருக்க உறுப்புகளும் பறவைகளில் ஒடுக்கப்பட்டிருக்கும். பெண் பறவைகளுக்கு ஒரே ஒரு அண்ட சுரப்பிதானுள்ளது. அதுவும் இனப் பெருக்கமற்ற காலங்களில் தேய்வுற்று காணப்படுகின்றது. டி. எச். பிஸ்சோனெட் (T. H. Blaissonette) என்பவர் ஸ்டார்லிங் (Starling), பறவைகளில் இனப்பெருக்க உறுப்புகள் இனப்பெருக்கக் காலங்களில் மூன்று சாதாரண காலங்களைவிட 1500 முறை கனமுள்ளதாக விருக்கும் என்பதை பறவைகளைப் பற்றிய தீவிர ஆராய்ச்சியின்மூலம் கண்டறிந்துள்ளார். தீண்ட நாட்களுக்கு முன்பே 1679 ஆம் ஆண்டி் லேயே இத்தாலியைச் சேர்ந்த பெனடிக் அறிஞர் ஜியோவானி போரெல்லி (Giovanni Boralli) என்பவர் விவக்குகளைப் பற்றி எழுதிய ஒரு நூலில் மனிதன் மற்றும் இதர விலங்குகளைவிட பறவையின் உடல் மிகவும் இலேசானது, கனமற்றது என்று குறிப்பிட்டுள்ளார். அவ்வாறு இலேசானதாகவிறுப்பதற்கு அவற்றின் எலும்புகள் துளை யுண்டையதாகவும் (Porous) எலும்புகள் இறகுகளின் வோர்களைப் போன்று வெற்றிடமுண்டையதாக விறுப்பதாறுமே ஆகும். பின்னும் அவற்றின் தோள்பட்டை எலும்பு, விலாவெலும்பு இறக்கைகளின் எலும்பு முதலியவைகள் ஒடுங்கிவிருத்தலும் பறவைகள் இலேசாக விறுப்பதற்குக் காரணமாகும் என்று கூறியுள்ளார். பறவைகளின் உடற்கூழியில் காற்றுப் பைகள் இருத்தலும், இறகுகளின் தன்மை யும்உடல் நிறப்பாக அமைந்திருப்பதாலும் அவை இலேசாக விருக் கின்றன என்பதை விளக்கமாகக் கூறியுள்ளார்.

புழுனின் எலும்புக்கூடு அதன் உடல் எடையில் 4:4 சதவீதமே உள்ளது. அதனைப் பாறுட்டிகளுடன் ஒப்பிட்டு நோக்குங்கால் வெள்ளை எலிகளில் அதன் எலும்புக்கூடு உடல் எடையில் 5:8 சதவீத முள்ளது என்று தெரிகிறது. இன்னும் சற்று தெளிவாகக் கூறவேண்டுமானால்

பறவைகளில் அவற்றின் பறக்கும் நிறணுக்கேற்ப மார்புத்தசைகள் மிகவும் சிறப்பாகவும் பலம் பொருத்தியதாகவும் அமைந்துள்ளன. அம்மார்புத் தசைகளின் பிணைப்பிற்கு உறுதியான மார்பெலும்புகள் இருத்தல் வேண்டும். பறவைகள் இரு கால்களிலும் நடப்பதை தாங்கிக் கொள்வதற்கு பிட்ட எலும்புகள் (Pelvic) பலம் பொருத்தியதாக அமைந்திருத்தல் வேண்டும். இவ்வாறான பல தகவலமைப்புகளைக் கொண்டிருந்தாலும் பறவைகளின் உடல் இயேசானதாகவிரும்புகின்றது. வெப்ப மண்டலங்களில் வரலும் உருவில் பெரிய பறவையாகிய கிரீக்கேட் (Frigate) இறக்கைகள் விரித்தவாக்கில் நோக்கிலும் ஏழு அடி பரப்புள்ளது. அவ்வாறான அகன்ற இறக்கைகளைக் கொண்ட பறவைகளின் எலும்புக்கூடு நடாங்கு அடிக்க எடை மட்டுமே உள்ளது என்பதை ஈபர்ட் ரூஷ்மான் மர்பி (Robert cushman murphy) என்ற பறவை நூல் அறிஞர் கண்டறிந்து விளக்கியுள்ளார்.

பறவைகளின் எலும்புக்கூடு மிகவும் இயேசானதாகவிரும்பினும், பலம் பொருத்தியதாகவும் தொய்வுடையதாகவும் (Elastic) உள்ளது. அவ்வாறு அமைந்துள்ளதாவேயே காற்றில் ஊடுருவிப் பறப்பதற்கு ஏற்றதாகவுள்ளது. விண்வெளியில் பறக்கும்பொழுது பவியைமான மறிதற்கண் எதிர்பார்த்தே செல்லுதல் வேண்டும். அம்மாதற்றங்கள் ஏற்படும்பொழுது தம்மை காத்துக்கொண்டு விண்வெளியில் பறப்பதற்கேற்ப பறவையின் உடலில் அமைப்புகள் உள்ளன. அவ் வமைப்புகளில் உடல் கவமற்றுவிடுப்பதும் மற்ற மூலகேலும்புள்ள பிராணிகளிட, பறவைகளில் வெற்றிடமாகவுள்ள எலும்புகளை புடையதாகவும் இணைக்கப்பெற்ற எலும்புகளைக் கொண்டதாய்வுருள்ள எலும்புக்கூட்டின் அமைப்புமே முக்கியமானதாகும். பறவையின் சேக்ரம் எலும்புப் பகுதியும் (Sacrum) பிட்ட எலும்புப் பகுதியும் ஒன்றுகூடப் பிணைக்கப்பட்டு மெல்லிய சூழாய் போன்ற உறுப்பாக உறுதியாகவும் இயேசாகவும் அமைந்து பறத்ததற்கு உதவி புரிகின்றன. பறவைகளின் விரல் எலும்புகள் பெரிதும் இணைக்கப்பட்டு காணப்படுகின்றன. வட்டமிட்டு பறக்கும் பறவைகளில் (Soaring) விரல் எலும்புகள் தள்ளு பிணைக்கப்பட்டு அவற்றின் உள்ளே ஒன்றுக்கொன்று பற்றிப் பிடிக்கும்படியான ஆதாரங்களுடன் அமைந்துள்ளன. அந்த ஆதாரங்கள் ஆகாயமிகைத்தின் விட்டங்களில் குறுக்காக உறுதிநாடி இடப்படும் இரும்பு ஆப்புகளைப் போன்றிருக்கின்றது. அம்மாதிரியான ஆப்புகளை இறக்கை, கால்கள் முதலிய எலும்புகளின் வெற்றிடங்களுக்குள்ளேயும் காணலாம்.

மற்றும் பறவைகளின் தலை மற்ற உறுப்புகளிட மிகவும் இயேசானதாகவுள்ளது. பறவைகளின் வாயில் பற்கள் கிடையாது. அவற்றிற்கு உறுதியான தாடைவும், தாடைத் தசைகளும் உள்ளன.

ஒரு புறவின் மண்டையோடு, எலியின் மண்டையோட்டில் ஆறில் ஒரு பங்கு எடையேயுள்ளது. புறவின் உடலின் கனத்தில் 100இல் ஒரு பங்கே அதன் மண்டையோட்டின் எடை உள்ளது. பறவைகளின் அரவைப் பை (Gizzard) அதன் உடலின் முனியூர்ப்பு மையம் (Centre of gravity) விலும் இடத்தில் அமைந்துள்ளது. உணவுப் பொருள்களை மறி பிர்ரானிகள் தங்கள் பற்களின் உதவியால் நிறு துண்டுகளாக்கி தான் துளாக்கி உண்ணுகின்றன. பறவைகளில் அரவைப் பைகளே மறி பிர்ரானிகளின் பற்களைப் போன்று உணவுப் பொருளை அரைத்துக் கொடுத்து உதவுகின்றது. பறவை மண்டையோட்டின் எலும்புகளும் இயோசனதாகவும் வெற்றிடப் பகுதிகளாகவும் அமைந்து, உறுதியானதாகவும் வியக்கத்தக்க முறையிலும் அமைந்துள்ளன. ஊர்வன முள்ளோர்களினின்றும் தொன்றிய முன்னர் தொன்மைப் பறவைகள் பல்பியின் வார்ப்பு போன்ற நீண்ட வார்ப்பு பெற்றிருந்தன. பின்பு அவை வால் முள்ளெலும்பின் கடைசிப் பகுதியில் ஒரு நிறு தட்டுப்போன்று ஒடுக்கப்பட்டு அமைந்துள்ளன. பறவைகளின் விவாவெலும்புகள் நீளமாகவும், தட்டையாகவும், ஒடுங்கியப் பறக்கும்பொழுதும் சுவாசிக்கும்பொழுதும் தள்ளாக விரிவடையும்படி அமைந்துள்ளன. அவ்வாறு ஒடுங்கி அமைந்திருந்தாலும், யோசனதாகவும், உறுதியாகவும் அமைந்துள்ளன. ஒவ்வொரு விவாவெலும்பும் அதனை அடுத்துள்ள விவாவெலும்பின் மீது பொருத்தி, கூடையில் பின்னப்பட்டச் சிம்புகள்போலப் பொருத்தி பணம் பெற்று உறுதியாக அமைந்துள்ளது.

பறவைகளின் தவிச் சிறப்புப் பொருத்தியதும் முக்கியமானது மாவிய இறகுகளுடன்கூடிய இறக்கைகளையுடையதாயுள்ள பண்பினும் பறவைகள் விண்வெளியில் பறக்கும்பொழுது காற்றை விரிபி போன்று தள்ளுவதற்கும், வெப்பதட்ப நிலையிலிருந்து (Weather) தங்களைப் பாதுகாத்துக் கொள்வதற்கும் உடலின் கனத்தைக் குறைத்துக் கொள்வதற்கும் ஏதுவாக அமைந்துள்ளன. பறக்கும் பொழுது ஒவ்வொரு முறையும் இறகுகள் மேலும் கீழும் அசைகின்றன. கீழே நோக்கி இறக்கை செல்லும்பொழுது தள்ளாக வளைந்து கொடுக்கும்படி அமைப்பெற்ற இறக்கைகளின் ஓரமானது மேல் நோக்கி வளைந்து விரிவின்றது. அவ்வாறு அவை வளைந்து விரிவடைவதால் மிகவும் உறுதியாக அமைந்துள்ளது. பறவைகளில் இறகுகள் மேலும் கீழும் வேகமாக அசையும்பொழுது அவை ஆகாய விமானத்தின் கழற்சிறிதிலின் விசையைப்போன்று சக்தியை ஏற்படுத்தி பறவைகள் மேலே எழும்பி பறப்பதற்கும், முன் பக்கமாக ஊடுருவிச் சென்று பறப்பதற்கும் உதவி புரிகின்றன. பறவைகள் பறந்துகொண்டிருக்கும்பொழுதும் கீழே இறங்கி வந்து இளைப்பாறும் பொழுதும், இளைப்பாறிக் கொண்டிருந்துவிட்டு மேலே எழும்பி

பறக்க ஆரம்பிக்கும்பொழுதும் பறவைகள் தம் இறக்கைகளை வேகமாக அடித்துக் கொள்கின்றன. அவ்வாறு இறக்கைகளை வேகமாக அடிப்பதால் இறக்கைகளிலுள்ள இறகுகளின் நுனிகள் பிளிக்கப்பட்டு துளை விளிம்புகள் அமைக்கப்படுகின்றன. அவற்றின் உதவியினால் பறவைகள் பறக்கும்பொழுது பெரிதும் பயனடைகின்றன. ஒரு சாதாரணமான சிறிய பறவைவாயியிட்டுக்குருவிபின்பறக்கும் திறனைக்கூட மனிதனால் அவ்வளவு எளிதாகக் கண்டுகொள்ள இயலாவிடும். பறவைகளின் பறக்கும் திறனின் அடிப்படைத் தத்துவத்தினாலே ஆகாய விமானங்களையும் அவைகளின் செயல்பாடு திறனையும் கண்டறிந்தனர். ஆகாயவிமானத்தைக் கண்டுபிடித்தல் என்பது மனிதனுக்கு அவ்வளவு எளிதாகிவிடுகவில்லை.

மற்றும் இறகுகளின் உதவியால் பறவைகள் துருவப் பிரதேசங்களில்கூட வசிக்க முடிவின்றது. இறகுகள் பறவைகளுக்கு ஒரு மேல் உடுப்புபோல் அமைந்துள்ளது. கடும் குளிரினின்றே, கடும் வெப்பத்தினின்றோ இறகுகளால் மூடப்பெற்றுள்ள தடுப்பு கவரின் உதவியால் பறவைகள் தங்களை பேணி காத்துக்கொள்கின்றன.

அடுத்து பறவைகளின் கப்பல் போன்ற உடனமைப்பு அவற்றிற்கு பெரிதும் பயனுள்ளதாக அமைந்துள்ளது. ஆகாயவிமானங்களைக் கட்டும் வித்தையில் தேர்ந்தவர்கள்கூட பறவைகளின் உடனமைப்பைக் கண்டு ஒருபுறம் வியத்திருப்பினும் மற்றொரு புறம் அவர்களால் பொருமை கொள்ளாமல் இருக்க முடியவில்லை. பறவைகளின் உடல் ஒரு கோணத்தில் அழகில்லாமலிருப்பினும் அவற்றின் உடலைப் பெரிய இறகுகள் அல்லது காண்டிள் இறகுகளினால் மூடப்பட்டுப் பட்டுபோன்று மிகுதுவாக அமைந்துள்ளது. பறவைகளுக்கு வெளியே தெரியுமாடி அமைப்பெற்ற காதுகள் அல்லது காது மடல்கள் இடையாது. பறக்கும்பொழுது பறவைகள் தங்கள் கால்களை மடக்கி அல்லது ஒடுக்கி வைத்த நிலையில் (Landing gear) பறக்கின்றன. இவ்வாறான பண்பிதமான பறக்கும் தகவமைப்புகளைப் பெற்றிருப்பதால் அவை நமக்குத் தெரிந்த விஸ்துக்களிலேயே அறிவேமூடப் பறக்கும் பிராணிகளாகும். வழவழப்பான கப்பல் போன்ற உடனமைப்பைக்கொண்ட வேட்டைப் பருத்துகள், மணிக் கு 288 கி. மீ. வேகத்தில் தன் இரையின்மேல் பாய்ந்து எடுத்துச்செல்வது, புகழ் பெற்ற ஒரு சாதனையாகும். தண்ணீரில் வசிக்கும் பிராணிகளில்கூட நீர்ப் பறவைகளே வேகமாக நீந்தக்கூடியவை ஆகும். பெங்குனின் பறவைகள் நீருக்கடியில் மணிக் கு 35 கி.மீ. வேகத்தில் நீந்திவிடுக்தலை மீ (Murphy) என்பவர் கண்டறிந்துள்ளார்.

வேடுவியவின் அடிப்படைத் தத்துவமானது ஒரு பொருளின் உள்நுழை 10 டிகிரி சென்டிமீட்டர் அநிகமாரும்பொழுது அதுபோன்ற

பறவை ஒரு பறக்கும் இயந்திரம்

இரு மடங்கு வேதியியல் மறுவினைகள் (Chemical reaction) ஏற்படுகின்றது என்பதாகக் கூறுகின்றது. மற்ற எல்லாப் பிராணிகளையும் விட பறவைகளுக்குத்தான் அதிகப்படியான வெப்பம் உடலில் உண்டாகி செயல்படுகின்றது. மனிதனின் உடல் வெப்பநிலை 98-6 டிகிரி சீபேரன்ஸீட்டான். ஆனால் ஒரு சிறு பிட்டுக்குருவியின் உடல் வெப்பநிலை 107 டிகிரி சீபேரன்ஸீட்டான் ஆகும். மற்றும் சில பறவைகளின் உடல் வெப்பநிலை 113 டிகிரி சீபேரன்ஸீட்டான் ஆகும். இவ்வாறு உடலின் வெப்பநிலை அதிகமாகிவிடுவதால் பறவைகளின் உடலில் ஏற்படும் வளர்சிதை மாற்றத்தின் அளவு விதமும் (Metabolic rate) அதிகமாகும். ஆகையால் பறவைகள் குறிப்பிட்ட சிறிது காலமே உயிர் வாழ்கின்றன. மிகக் குறைவான காலம் வாழ்ந்தாலும் வியக்கத்தக்க முறையில் வாழ்ந்து மறைகின்றன. பறவைகள் பொதுவாக கமார் இரண்டு எலுடங்களை வாழ்த்து இறக்கின்றன என்பது ஆராய்ச்சியின் முடிவாகும்.

பறவைகளின் கலாச மண்டலமும் இரத்த ஓட்ட மண்டலமும் மிகவும் சிறப்பாக அமைந்துள்ளன. பறவைகளில் இரு சுழற்சி (Double circulation) இரத்தஓட்டம் உண்டு. பறவைகளின் இருதயம் பாணுட்டிகளின் இருதயத்தைப் போன்றே நான்கு அறைகளைக் கொண்டதாகும். இருதயத்திலிருந்து அகத்த இரத்தம் நுரை வீரவிற்கு எடுத்துச் செல்லப்பட்டு, சுத்தமாக்கப்பட்டு பின்பு இருதயத்தை அடைகின்றது. பின்பு சுத்த இரத்தம் உடலின் எல்லாப் பாகங்களிலும் எடுத்துச் செல்லப்படுகின்றது. ஆக இரு சுழற்சி இரத்த ஓட்டம் பறவைகளில் உண்டு. பறவைகளின் இருதயம் பெரிவதாகவும் செயலாற்றல் மிகுந்ததாகவும் வேகமாக செயல்படுவதாலும் அமைந்துள்ளது. பாணுட்டிகளிலும் பறவைகளிலும் அப் பிராணிகளின் உடல் அளவுக் குறையக் குறைய இருதயத்தின் அளவும் அது செயல்படும் நிறமும் அதிகரிக்கின்றது என்பதை கன்கூடாகக் கண்டு விளக்கியுள்ளார்கள். அவ்வாறு பிராணியின் உடல் அளவுக் குறையக் குறைய இருதயத்தின் செயல்படுதன்மை அதிகரிக்கின்றது என்பது பாணுட்டிகளைவிட பறவைகளிலேயே பெரிதும் வெள்ளிடை மையோல் காணப்படுகின்றது. இருதயம் பலவினமடைந்த ஒரு மனிதன், மேல் மாடிக் கோ அதுபோன்ற இடங்களுக்கோ ஏறிச் செல்லுதல் எவ்வளவு கடினம் என்பதை அறிவான். ஆனால் ஏறிச் செல்லுதல் பறவைகள் மிகவும் எளிதாக எடுத்துக் கொள்வதிலிருந்து அவற்றின் இருதயத்தின் உறுதி வாய்ந்த தன்மையும் அவற்றின் இரத்த ஓட்டத்தின் சிறப்புத் தன்மையும் நன்கு புலப்படும்.

பறவைகளின் இரத்தத்தில் பாணுட்டிகளின் இரத்தத்தைப் போன்று அவ்வளவு தீமோக்ஸோபின் இரத்த நிறத்துகள்

கிடையாது. மனிதனின் இரத்தத்திலுள்ளது போன்றே புழுவின் இரத்தத்திலும் குள்ளவாத்து (Mallard) பறவையின் இரத்தத்திலும் ஒவ்வொரு கன சென்ட்டிமீட்டர் இரத்தத்திலும் 100-க்கு 15 ரொம் ஹீமோக்ஸிஜின் நிறத்துகொண்டான் உள்ளன. மற்றும் பறவைகளின் இரத்தத்தில் பாஸுட்டிகளின் இரத்தத்திலுள்ளதைப்போல இரு மடங்கு சர்க்கரைப் பொருள்கள் உள்ளன. இரத்த அழுத்தமும் பறவைகளில் அதிகமே. பொதுவாக ஒப்பிட்டுப் பார்க்கும்பொழுது புழுவின் இரத்த அழுத்தம் பாதரசத்தில் 145 மிமீவி மீட்டர் ஆகும். கோழிக்குஞ்சின் இரத்த அழுத்தம் 180 மிமீவி மீட்டர். மனிதனின் இரத்த அழுத்தம் 120 மிமீவி மீட்டர் பாதரச அளவு. இனிதெரிந்து பறவைகளின் உடலில் இரத்த அழுத்தம் அதிகம் என்பதை அறிவோம்.

சாதாரணமாக எல்லாப்பிராணிகளிலும் உள்ளது போன்ற நுரையீரல்கள் பறவைகளுக்கு இருப்பிலும் அதைத்தவிர நுரையீரல்களுடன் தொடர்பு கொண்டுள்ள 5 சோடி அல்லது இன்னும் அதிகமான காற்றுப் பைகளும் (Air sacs) சுவாச மண்டலத்தில் உள்ளன. இந்த காற்றுப் பைகளின் சிறு சிறு கிளைகள் உடலின் எல்லாப் பாகங்களிலும் காணலாம். காற்றுப் பைகளின் சிறு சிறு கிளைகள் கால்விரல்களிலுள்ள எலும்புகளிலிருந்து வெற்றிடமாக உள்ள எலும்புகளுக்குள்ளும் பரவியிருத்தலாகக் காணலாம் பறவைகளின் உடலுக்குள் காற்றுப் பைகள் இருப்பதால் உடல் கனம் அல்லவல்லாய்க்கலை. பறக்கும் ஆற்றலினும் பறவைகளின் உடலில் வேகமான வளர்சிதை மாற்றம் ஏற்பட்டு உடல் அதிக வெப்பமடைத்து விடுகின்றது. அதை குளிர வைக்க காற்றுப் பைகளும் நுரையீரல்களும் சிறப்பாக செயல்படுகின்றன. புழு பறக்கும்பொழுது அது உள்புள எடுத்துக்கொள்ளும் காற்றில் 1 பாகம் கலாசெத்தலுக்கும், 1 பாகம் உடல் வெப்பத்தை தணிப்பதற்கும் பயன்படுகின்றது.

மனிதனின் நுரையீரல்கள் அவன் உடல் அளவில் 5 சதவீதமான கன அளவை அடைத்துக் கொள்கின்றது. ஆனால் பறவைகளில் உதாரணமாக வாத்துகளில் சுவாச மண்டலம் 20 சதவீதம் உடலின் அளவை அடைத்துக் கொள்கின்றது. (அந்த 20 சதவீதத்திலும் 2 சதவீதம் நுரையீரலும் 18 சதவீதம் காற்றுப் பைகளும் உள்ளன.) நுரையீரல்களும் காற்றுப் பைகளும் பறவைகளில் சிறப்பாக அமைப்பு பெற்று தூய்மையான காற்று ஒரு பாதையில் சென்று உள்குறுப்பு களுக்குள்ளும் சென்று, பின்பு தூய்மையற்ற காற்று வேறுபாதையில் வெளியில் வருவதற்கும் ஏதுவாக உள்ளது. பாஸுட்டிகளில் இது போன்ற அமைப்பே கிடையாது. பறவைகளில் கலப்படமற்ற தூய்மையான காற்று அதிகமாகக் கிடைப்பதால் வளர்சிதை மாற்றத்

இந்த பயன்பாட்டு பறவை பறக்கும் திறனை நிறைப்பாகப் பெற்றுள்ளது. பொதுவாக பிராணிகள் காற்றை உள்செய்வதோடு, வெளியேயும் 'பொழுது மிகத் தூய்மையான காற்றுப்பாதை ஏற்பட இயலாது. காற்று உள்செய்யும் வெளியேயும் போல் வருவதால் கலப்படமான காற்றுதான் நுரையீரல்களில் காணப்படும். ஆனால் பறவைகளில் மட்டும் கலப்படமான காற்று நுரையீரல்களிலேயே காற்றுப்பைகளிலேயே காணமுடியாதபடி நுரையீரல்கள் காற்றுப்பைகள் அவற்றின் இணக்குழாய்கள் முதலியன மிகவும் நெருத்த முறையில் அமைந்துள்ளன.

உணவுப்பொருள்களைத் தேர்த்தெடுப்பதிலும் பறவைகள், தங்கள் விளைவெலி வாழ்க்கைக் கேற்பவே தேர்த்தெடுக்கின்றன. பொதுவாக அதிக சக்தியை உண்டாக்கக்கூடிய விதைகள், கொட்டைகள், பழங்கள், பூச்சிகள், எலிகள், மீன்கள் போன்றவற்றையே பறவைகள் பெரும்பாலும் தங்கள் உணவாகக் கொள்ளின்றன. அதிக சக்தியை உண்டாக்க இயலாத இனங்கள் புற்கள் முதலியவற்றை பறவைகள் உண்பதில்லை. பறக்கும் இயந்திரமாவை பறவைகளில், கட்டைகளை எரித்து சக்தி உண்டாக்கும் சாதனங்கள் இடையாது. பறவைகள் உட்கொள்ளும் உணவுப் பொருள்கள் விரைவாகவும், நிறப்பாகவும் சேர்த்துக்கொண்டு, இரத்தத்துடன் கலக்கின்றன. குஞ்சு கிடார் (Cidar) பறவைகள் பழங்களை இன்ற 27 நிமிடங்களில் அதன் சேண உறுப்புகளின் வழியாக சென்று விடுகின்றது என்று குறிப்பிட்டுள்ளனர். இரவு பறவைகள் கரும் பேரி பழங்களைவுண்ட 45 நிமிடங்களில் விதைகளை கழிவுப்பொருளாக வெளிக்கொணர்ந்து விடுகின்றன என்பதையும் அறிந்துள்ளனர். பாளுட்டிகளைவிட பறவைகள் தாங்கள் உட்கொள்ளும் உணவுப் பொருளின் பெரும்பாகத்தை சத்தாக மாற்றி இரத்தத்துடன் கலக்கச் செய்கின்றது. மூன்று வார குஞ்சு கிடார் (Stork) பறவை 1 பவுண்டு உணவை (பொதுவாக மீன், தவளை மற்ற மிருகங்கள் முதலியவை) உட்கொண்டு 3 பவுண்டு எடை அதிகரிக்கச் செய்கின்றது என்பதனையும் அறிந்துள்ளார்கள்.

மார்புத்தசைகளின் அமைப்பும் பறவைகளில் மிகவும் நெப்பாக அமைந்துள்ளது. மார்புத்தசைகளின் செயல் திறனுமேயே இறக்கைகளாவிய கழல் விநிதிகளை நிறைப்பட அசைத்து பறவைகள் பறந்து செய்கின்றன. நன்றாக பறக்கும் ஆற்றலையுடைய புது போன்ற பறவைகளில் மார்புத் தசைகளின் எடை உடல் எடையில் சுமார் இரண்டில் ஒரு பங்குக்குமேற்றும் அத்தசைகளில் நிறம் நமக்கு தென்னத் தெனிய புண்படுமன்றோ? மற்றும் ஆப்பெட்ரோஸ் (Albatross) போன்ற பறவைகளில் மார்புத்தசைகள் சற்று ஒருங்கியே காணப்படுகின்றன. இவைகள் வட்டமிட்டு பறப்பதால் தசை

பத்தகங்களும் (Ligaments) தசைநார்களும் (Tendon) தன்ளுக அமையப்பெற்று இப்பறவைகள் இறக்கைகளை நிரம்மிக்லாமல் வட்டமிட்டு பறக்கும்பொழுது வைக்கத்தக்க நிலைக்கு ஏற்றவாறு அமைந்துள்ளன.

பறக்க உதவும் மார்புத் தசைகள் நிறப்பாக அமைந்திருப்பினும் சில பறவைகளில் அந்தத் தசைகளுக்கு வேண்டிய இரத்த ஓட்டம் இல்லாமல் இருக்கும். இத்தகைய மார்புத் தசைகளை வான்சொழி, கோழி முதலியவற்றின் இறக்கையில் காணலாம். இப்பறவைகள் நிலத்தில் வெகு அருகிலே தான் பறந்துசெல்லும் ஆற்றல் உள்ளவை. உயரத்தில் பறக்க இயலாதவைகளாகும். இம்மாதிரி பறவைகளில் கால்களிலுள்ள தசைகள் இரத்த வியப்பு நிறமாகவிரித்தலை காணலாம். அவ்வாறு கரும் வியப்பு நிறமாகவிரிப்பதால் கால்களுக்கு நிறப்பாண இரத்த ஓட்டம் இருப்பதை அறியலாம். நிறப்பாண ஓட்டம் இருப்பதால் அவைகள் வேகமாக ஓடும் ஆற்றலுள்ள பறவைகள் என்பது புலனாகும்.

பறவைகளில் உள் கவாசத்தையிட வெளி கவாசமே நிறுந்றப்பாக நடக்கின்றது. அவை பறக்கும் பொழுது இறக்கைகளை விரித்து மூடுவதால் விளாவெல்லுப்புகளை அழுத்தி காற்றை அதிவிரைவாக வெளியே தள்ளுகின்றது.

மற்ற விவங்குகளைவிட நெடுஞல் இசைக்கும் நிறு பறவைகளினே (Humming birds) வளர்நதை மாற்றம் நிறம்பட நடைபெறுகின்றது. பறவைகள் வானில் நெகை விரித்த நிலையில் வட்டமிட்டு பறக்கும்பொழுது ஒன்னொரு நிராமிதும் சுமார் 80 கன சென்டிமீட்டர் பிராண வாயுவை ஒரு மணிக்குள் உபயோகிக்கின்றன. இஃப்பாறும் பொழுதும் அவைகளின் வளர்நதை மாற்றத்தின் மனிதனைவிட 50 தரம் வேகமாக செயல்படுகின்றது. நெகு விரித்து வானில் சுற்றி வட்டமிடும் ஒளி எழுப்பக்கூடிய பாடும் நிறு பறவைகள், செங்குத்தாக மேகெழும்பி இறக்கவல்ல நெகு வானூர்திகளாகிய நெகைபட்டர்களைப் போன்ற அதே சத்தியை உபயோகிக்கின்றன என்பது விவக்கத்தக்கதும், குறிப்பிடத்தக்கதுமாகும். அவ்வாறு வானூர்திகளைப் போன்ற வேகத்துடன் பறவைகள் பறக்கின்றன என்று குறிப்பிட்டதும், மனிதன் பறவைகளின் பறக்கும் நிறை குறிப்பாக அளவிட்டுக் கூறிவிட்டான் என்று கூறுவது கடினமாகும்.

இசைக்கும் நிறு பறவைகளின் இறக்கைகள் மிகச் சிறியதாகவிரிப்பதால் வானில் வட்டமிட்டுப் பறக்கும்பொழுது அது அதிகமான சத்தியை உபயோகிப்பதால் அது வெப்பறும் வெளியிலும்படி உள்ளது. புறவின் மார்புத் தசைகளைப் போன்று தாளுக்கு மடக்கு

அதிக சக்தி வாய்ந்த மார்புத் தசைகளை பாடும் சிறு பறவைகள் பெற்றுள்ளன.

தங்க ஃபிளவர் பறவைகள் தொடர்ந்து அதிக மைல் தூரம் பறக்கும் திறனுள்ளவைகளாகும். இப்பறவைகள் லேப்ரடர் (Labrador) என்ற இடத்திலிருந்து தென் அமெரிக்காவை அடைய சமூத்திரத்தின்மீது சுமார் 2400 கல் தொலைவு விடாமல் பறந்து வருகின்றன என்று குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. புறப்படும் இடத்திலிருந்து அவை வந்து சேரும் இடத்தை அடைவதற்குள் தங்கள் உடலின் எடையில் சுமார் 2 அவுன்சு குறைந்து காணப்படுகின்றதாம். பறவைகளின் பறக்கும் திறனுக்கு ஒப்பாக மனிதன் இன்னும் இப்படி யொரு விவக்கும் சாதனையைக் கண்டு பிடிக்கவில்லை என்பது ஒப்புக் கொள்ள வேண்டியதொரு விஷயமாகும்.

14. பறவைகள் பறப்பதற்கேற்ப அமைந்துள்ள தகவமைப்புகள்

(Adaptations for flight)

பறவைகள்—பறத்தல் என்னும் நெட்பு தன்மையைக் கொண்
டுள்ள பிராணிகளாகும்.

1. உடலின் வடிவமும் கட்டமைப்பும்

ஒரு பிராணி ஆகாயத்தில் ஊடுருவிச் சென்று பறக்கும்பொழுது அங்குள்ள காற்றினது, அப்பிராணியின் உடல் படகுபோல் அமைந்
திருக்குமாயின் அங்குடனுக்குச் சிறிதே எதிர்ப்பு ஏற்படும்படி செய்
கின்றது. பறவையின் உடல் படகு வடிவமாக அமைந்திருப்பதால்
விண்வெளியில் பறவை பறக்கும் பொழுது காற்றில் ஊடுருவிச்
செல்வ எளிதாக உள்ளது. பறத்தலுக்குச் சாதகமாக அமைந்துள்ள
இறக்கைகள் மிக உயரத்தில் பொருத்தப்பட்டிருப்பதும், பறவை
களின் பறக்கலுதவும் மார்புத் தசைகள், மார்புப் பகுதியில் மிக
உயரத்தில் பொருத்தப்பட்டிருத்தலும், ஸுரைவீரல் காற்றைப்பைகள்
முதலான எடைவற்ற உறுப்புகள் உயரத்தில் பொருத்தியிருப்
பதாலும், பளுவுள்ள தசைகள் தாழ்த்த நிலையிலிருப்பதாலும், மார்
பெனும்பு, சீரண மண்டலத்தைச் சேர்ந்த உறுப்புகள் முதலானவை
களின் சிறப்பான அமைப்பாலும் புவிசர்ப்புத்தானம் (Centre
of gravity) மிகவும் தாழ்த்த நிலையில் உள்ளதாலும் பறவைகள்
எளிதாகவும் விரைவாகவும் சிறப்புப் பொருத்திய நுகறலில் விண்
வெளியில் பறந்து செல்கின்றன. இங்ஙனான பல சிறப்புத் தன்மை
களைப் பெற்றிருப்பதாலேயே அவற்றால் எளிதாக பறந்து செல்வ
முடிவின்றது.


2. பறக்க உதவும் தசைகள்

நாற்கால் பிராணிகளின் காணப்படும் மூன்றுகால்களின்
தசைகள் பறவைகளின் பின்னும் சிறப்பாக அமைந்துள்ளது. விரை

வாகுப் பறக்கும் ஆற்றல் கொண்ட பறவைகளில், பெரிய மாட்புத் தசைகள் (Pectoralis major) இருபுறமும் நன்றாக வளர்ச்சிபெற்றுக் காணப்படுகின்றன. இத்தசைகள் பறவை இறக்கைகளை நீழ்ப்புறம் நோக்கி அழுத்தப் பெரிதும் பயன்படுவதோடும்பொருள் இறக்கைகளை நன்றாக அசைக்கவும், காற்றின் ஊடே உடலினைச் செலுத்திச் செல்வவும் பெரிதும் பயன்படுகின்றது. இந்தத் தசைகள் மிகவும் பலம் பொருத்தியதாகவும் சக்தி வாய்ந்தவைகளாகவும் காணப்படுகின்றன. இந்தத் தசைகளின் எடை உடலின் எடையின் ஐந்தில் ஒரு பங்கு உள்ளது. மாட்பெனும்பின் அடித்தட்டைக் கலத்தின் முழுப்பகுதியிலிருந்தும் மற்றும் நிவலிக்கின் எலும்புப் பகுதியிலின்றும் இத்தத் தசைகள் தோன்றுகின்றன. உடல் பகுதிக்கும் அடித்தட்டைக் கலத்திலும் இடையே யுள்ள பரப்பில் இத்தத் தசைகள் பரவிவுள்ளன. இது மேல்கரம் அல்லது தாழ்மேரல் எலும்பின் வலிந்துப் புறப்பகுதியில் துழைக்கப்பட்டுள்ளது. சிறிய மாட்புத் தசைகள் (Pectoralis minor) அல்லது சூப்பரா கோரகாய்டியல் (Supra coracoides) என்ற தசைகளின் உதவியால் இறக்கைகள் மேல் நோக்கி உயர்த்தப்படுகின்றன. மாட்பெனும்பிற்கு முன்புறத்தில் பெரிய மாட்புத் தசைகளுக்கு முதுகுப்புறப் பக்கத்திலிருந்து இத்தத் சிறிய மாட்புத் தசைகள் தோன்றுகின்றன. கிபர்குலா (Furcula) ஸ்கேப்புலா (Scapula) கோரகாய்டு (Coracoid) ஆகிய மூன்று எலும்புகளுக்கிடையேயுள்ள ட்ரைஆசியம் துளை (Foramen triossum) என்ற துளியினூடே இத்தத் தசைகளின் தசைநாண்கள் செல்லுகின்றன. அல்லாறு ட்ரைஆசியம் துளை வழியாகச் சென்ற தசை நாண்கள் மேல் கரத்தின் முதுகுப்புறப் பகுதியில் பொருத்தப்பட்டுள்ளது. ட்ரைஆசியம் துளை ஒரு கப்பி போன்று அமைத்து பறக்கும் பொழுது தசைகளின் திசையை மாற்றுவதற்கு பெரிதும் பயனுள்ளவைகளாக வுள்ளது. இந்தத் தசை நாண்கள் பின்பக்கமாக இழுக்கப்படிச் மேல் கரம் தூக்கப்படுகின்றது. இது சமயம் இறக்கைகளும் மேலே தூக்கப்பட்டு, பறத்தல் நடைபெறுகின்றது.

மேலே குறிப்பிட்ட இரண்டு மாட்புத் தசைகளல்லாமல் மற்றும் கோரக்கோ பிராக்கியாலில் ஷாக்கல் (Coraco brachialis longus) என்ற தசையும், கோரக்கோ பிராக்கியாலில் ப்ரேவியல் (Coraco brachialis brevis) என்ற தசையும் முறையே கோரக்காய்டு, ஸ்கேப்புலா எலும்புகளினின்றும் தோன்றி பறக்க உதவுகின்றன. இந்தத் தசைகள் மேல் கரத்தின் தலைப்பகுதியில் பொருத்தப்பட்டிருக்கின்றது. மேல் கரத்தின் தலைப்பகுதி க்ளினோய்டு குழியினுள் (Glenoid cavity) பொருத்தியுள்ளது. இந்த இரு தசைகளின் இயக்கத்தினால் க்ளினோய்டு குழியினுள் சுழல்வதால் இறக்கைகளும் அதனுள் சுற்றிச் சுழன்று பறத்தலுக்கு ஏற்றதாக இத்தத் தசைகள் அமைத்

துள்ளன. இறக்கைகள் இரண்டையும் விரிக்கும்பொழுது உடலின் முன் பெட்டாளியம் (Pre petagium) பகுதியும் விரிந்த நிலையில் இருப்பதற்கு டென்சார் லாங்கஸ் (Tensor longus) டென்சார் பிரேவியஸ்



படம் 49. புறவியின் பறக்கைதலும் மார்புத் தசைகள்

1. பெரிய மார்புத் தசை (Pectoralis major), 2. மார் பெலியம், 3. சப்கிளேவியம் (Subclavius), 4. கோரக்கோ ஹுமரேக்ஸிலியம், 5. கோரகால்டு, 6. பெரிய மார்புத் தசை ஹெட்டப்பட்டுள்ள நிலை, 7. மேல்கரம், 8. சப்கிளேவியம் தசையின் தாள், 9. ஸ்ரோயோவியம் துளை, 10. கிளேவிக்ளிக்.

(Tensor bravis) டென்சார் இணைப்புத் தசை (Tensor accessories) என்ற முக்கோண வடிவமுடைய மூன்று தசைகள் பவன்படுகின்றன. அதே போன்று பின் பெட்டாளியம் பகுதியிலே விரிந்த நிலையில் வைப்பதற்கு மேலே கூறியது போன்ற டென்சார் படலப் பின் அலையே (Tensor membrane posterioris alae) என்ற தசை உதவி புரிகின்றது.

மற்றும் முன் வலியின் மேல்கரம், இருதலைத் தசை (Biceps) மூப் புரித்தசை (Triceps) ஆகிய தசைகளைக் கொண்டு செயல்படுவதாக மூழ்கைப்பகுதி நீட்டலோ மடக்கலோ உதவி புரிகின்றன. அவ்வாறு மேல்கரம் அசைக்கப்படுவதால் அதனுடன் இணைந்துள்ள இறக்

கைகளும் பறத்தவின்பொழுது தேவைப்படுகின்ற திசையில் அவை விரைநன. மேலும் அல்லு, ரேடியஸ் ஆகிய இரு எலும்புகளுடன் இணைந்த எக்ஸ்டென்ஸர் கார்பை ரேடியாலில் (Extensor carpi radialis) என்ற தசையும், எக்ஸ்டென்ஸர் கார்பை அல்லூரில் (Extensor carpi ulnaris) என்ற தசையும் மேல் கரத்தின் இருதலைத் தசையுடனும் முப்புரீத் தசையுடனும் இணைந்து செயல்படுவதா யேயே பறவைகள் இறக்கைகளை மடக்குவதும் நீட்டுவதும் எளிதாக நடைபெறுகின்றன. இறக்கைகள் மையப்பகுதியை நோக்கி சுழல்வது மற்றுமீரு பிராக்கியோ ரேடியாலில் (Brachio radialis) தசைகளின் உதவியால் நடைபெறுகின்றது. பறவைகளில் விரல் களுக்கிடையில் தசைகள் அய்வனவு சிறப்பாக வளர்ச்சி யடைவ வியும். மேல் கரத்தின் முதல் விரல் மட்டும் சிறப்பானத் தசை களால் தனித்து இயங்கும் தன்மை வாய்ந்ததாகவுள்ளது.

பரிப்பன் (Purion) என்ற திபுணரின் ஆராய்ச்சியின்படி ராஜாஸி பறவை அறிவேமூடன் அதாவது ஒரு நிமிடத்திற்கு 55 அடிகள் பறத்து, மூன்று நிமிடங்களில் நம் பாரிலையிலிருந்து மறைத்துவிடு கின்றது என்று கூறியுள்ளார். இது மார்புத் தசைகள் மிகச் சிறப்புடன் அமைந்துள்ளதற்கு ஓர் எடுத்துக்காட்டாகும்.

இவ்வாறு பறவைகளில் பறக்க உதவும் தசைகள் சிறப்புடனும் பலம் பொருந்தியதாகவும் அமைந்து பறவை பறந்து செல்வதற்கு பெரிதும் துணைபுரிகின்றன.

3. எலும்புக்கூட்டின் சிறப்பான அமைப்பு

பறவைகளில், முன்னங்கால்களும் பின்னங்கால்களும் முறையே பறப்பதற்கும், திற்பது தடப்பது போன்றவற்றிற்கும் ஏற்ப பல மாறுதல்களை உடையனவாயும் சிறப்புப் பொருத்தியனவாயும் அமைத் துள்ளன. பறவைகளின் எலும்பு எடையற்று இருப்பதுடன் காற்றுக் குழிவுடன் கூடியதாயும் உள்ளது அவைகளின் பறத்தலுக் கான தகவமைப்புகளாகும். சில சமயங்களில் அவைகளுக்கு ஏற்படும் அதிர்வுகளைத் தாங்குவதற்கு அவை உட்புறமாக நிமிர்ந்த நிலையில் பொருத்தப்பட்டுள்ளன. எலும்புக்கூட்டின் பல எலும்புகள் காற்றுப் பைகளுடன் தொடர்புடையனவாக அமைந்துள்ளன. அந் திசைகளாகப் பறக்கும் பறவைகளில் முன்னங்கால் பின்னங்கால் எலும்புகள்கூடக் காற்றுக் குழிவுகள் கொண்டதாய் அமைந்துள்ளன. பறவைகளில் எலும்புகள் பெரும்பாலும் ஒன்றோடொன்று பிணைத் துள்ள தன்மை, அவைகளின் மற்றுமொரு பறப்பதற்கேற்ப அமைத் துள்ள சிறப்புப் பண்பாகும்.

முள்ளெலும்புத் தண்டு, முன்னங்கால், பின்னங்கால், மார்பு, இடுப்பு வளைவுகள் முதலிய எலும்புகள் அமைந்துள்ள நிலை, பறவையின் உடல் கனத்தை இரு வேறு முறைகளில் அதாவது சிறகு களிலோ, கால்களிலோ தாங்கிக் கொள்ளும்படி பொருத்தப் பட்டுள்ளன. இவ்வாறு இருவேறு முறைகளில் உடல் கனத்தைத் தாங்கும் நிலையில், மார்பெலும்புகளும் சிஸ்சேக்ரம் எலும்புகளும் விட்டம்போல் செயல்பட்டு இருவேறு நிலைகளில் வளைந்துள்ளன. தோல்பட்டை, இடுப்பு முதலிய பகுதிகளில் மூட்டுகளிலுள்ள தசைகளானது விட்டம்போல் அமைந்துள்ள முள்ளெலும்புத் தண்டு, சிஸ்சேக்ரம் முதலியவற்றின் முழுக்கனத்தையும் தாங்கப் பயன்படுகின்றன. மற்றும் அவை பறத்தலின் பொழுது சூரம்ப நிலையில் உந்தித் தள்ளிக் கொடுக்கவும் பயனுள்ளதாகவுள்ளன. இவ்வாறு ஏற்படும் அழுத்தம் பறக்கும்பொழுது பெரிய மார்புத் தசைகளிலிருந்தும், நடக்கும்பொழுது கால்களிலுள்ள பின்னிலுக்கும் தசை அல்லது ரிட்டிரக்டர் (Retractor) தசைகளிலிருந்தும் கிடைக்கப் பெறுகின்றன. பறவைகளின் அச்ச தலையைத் தவிர மற்ற முதுகெலும்புள்ளப் பிராணிகளின் அச்சைவிடக் குட்டையாக அமைந்துள்ளது. பறவைகளின் கழுத்துப் பகுதி நீளமானதாகவும் தள்ளு அசைவுப்படியும் பொருத்தப்பட்டுள்ளன. கழுத்து முள்ளெலும்புகள் பறவைகளில் சாதாரணமாக எண்ணிக்கையில் பதினாறு இருக்கும். ஆனால் நீளமான கழுத்தைவுடைய பறவைகளிலோ அவைகள் எண்ணிக்கையில் அதிகமாகிவிக்கும். கழுத்து முள்ளெலும்புகளின் சென்ட்ராக்ஸர் பக்கவாட்டில் குவித்து சேணம் போன்ற (Saddle shape) வடிவத்துடன் அமைந்துள்ளன. இவ்வாறான அமைப்பினால் கழுத்துப்பகுதி தள்ளு அசைய முடிவின்றது.

மார்புப் பகுதியில் நான்கு அல்லது ஐந்து மார்பு முள்ளெலும்புகள் உள்ளன. கடைசி மார்பு முள்ளெலும்பைத் தவிர மற்றவை இணைந்து காணப்படுகின்றன. விலாவெலும்புகள் பெரியதாகவும் இருதலைப் புடைப்புக்குடனும் முள்ளெலும்புகளுடன் சேர்த்தும் காணப்படுகின்றன. இவற்றில் அன்ஸினேட் நீட்சிகள் முள்ளெலும்புப் பகுதிகளில் உள்ளன. இத் நீட்சிகள் கொக்கி போல் அமைந்து, அடுத்த விலாவெலும்பின் மேல் படித்து, உறுதியான மார்புக் கூட்டுப்பகுதி உண்டாகும்படி செய்கின்றன. மார்பெலும்பின் விலாவெலும்புப் பகுதிகளில் பாதுாட்டிகளைப் போன்றிருவாமல் எலும்பாலான பெரிய அடித்தட்டைக் கைம் என்னும் பகுதியுள்ளது. சிறப்பாக பறக்கும் திறனைப் பெற்றுள்ள பறவைகளில் இந்த அடித்தட்டை கைம் மார்புத் தசைகள் பொருத்தப்படுவதற்கும், அவ்வாறு மார்புத் தசைகள் பொருத்தப்படுவதால் சிறமிகவும் உடலின் முழுக்கனத்தையும் தாங்கிச் செய்வதற்கும் பயனுள்ளதாக

அமைந்துள்ளன. பறவை பறக்கும்பொழுது மார்பு எலும்புகளே பெருவாரியான உடல் கனத்தைத் தாங்குகின்றன.

கடைசி ஐந்து மார்பு முள்ளெலும்புகள், இரண்டு இடுப்பு முள்ளெலும்புகள், பிட்ட முள்ளெலும்புகள், வால் முள்ளெலும்புகளில் முதல் ஐந்து ஆகிய முள்ளெலும்புகளின் சேர்க்கையால் ஆன சின்சேக்ரம் (Synsacrum) இடுப்பு வளை இடையில் எலும்புடன் பிணைந்துள்ளது. இவை ஒடுங்கிய தட்டையான நீள்வரை மேடுகளை யுடைய தட்டுப்போல் மாறி பறக்கும்பொழுது பறவையின் உடல் கனத்தைத் தாங்கி, போதுமான உறுதியை அளிக்கின்றது. வால் பகுதியில் ஆறு வால் முள்ளெலும்புகள் உள்ளன. அவற்றின் நான்கு ஒன்றாக இணைந்து கலப்பைப் போன்ற பாகமாக மாற்றப்பட்டு மேல் நோக்கி அமைந்துள்ளன. அவை வால் சிறகுகளுக்கு ஆதாரம் அளிக்கின்றது.

முள்ளெலும்புத் தண்டுப் பகுதியில் பிணைப்புகள் குறைக்கப்பட்டு கழுத்து முள்ளெலும்புகள், மார்பிற்கும் சின்சேக்ரத்திற்கும் இடைப் பகுதி முள்ளெலும்புகள், வால் பகுதி முள்ளெலும்புகள் ஆகிய பகுதிகள் மட்டுமே அசையும்படி பொருத்தப்பட்டுள்ளன. முதுகுப் புறத்தில் அமைந்துள்ள முள்ளெலும்புகளும், விலாவெலும்புகளின் சேர்க்கையும் தன் ஒரு விளைப்பான விட்டக்கால் (Sirut) போல அமைந்து, மார்புப் பகுதியின் கனத்தையும், உடல் உள்சூறுப்புள்ளின் கனத்தையும் தோள் வளைப்பகுதியுடனாவது, விலாவெலும்பு களுடனாவது இணைந்து தாங்கும்படியான நிலையில் உள்ளது. பறக்கும் பொழுது உடலின் முழுக்களமும் மார்புத் தசைகளுடனும் சிறகு களினாலும் தாங்கப்படுகின்றன. மார்புத் தசைகள் பொருத்தப் பட்டுள்ள மார்புக் கூடும் அதனுடன் சேர்ந்த விலாவெலும்புகளும் மார்பு வளைபுத்தின் கோரகாய்டு எலும்பும் பறக்கும் பொழுது உடல் கனத்தைத் தாங்கப் பயன்படுகின்றது. கோரகாய்டு எலும்பு பலம் பொருத்தியதாக அமைந்துள்ளது ஒரு சிறப்பானத் தன்மையாகும்.

பறவைகள் நீர்க்கும் பொழுதும் நடக்கும் பொழுதும் உடல் கனத்தைத் தாங்கவே தாங்குகின்றன. மற்ற முதுகெலும்புகள் பிராணிகளில் முள்ளெலும்புத் தண்டு ஒரு விட்டம் (Girret) போன்று உறுதியாக அமைந்து முதுகுப்புறத்தசைகள் பிணைப்பதற்கெற்ப அமைந்துள்ளன. ஆனால் பறவைகளில் முதுகெலும்புத் தண்டின் அச்ச பெரிதும் குட்டையாகவே அமைந்து அதனால் புவி ஈர்ப்புத்தாளமும் தரைக்கு மிகவும் அருகிலும் பின் பக்கமாகவும் விழும்படி அமைந்துள்ளது. இடுப்பு வளைபுத்தின் இடையில் முள்ளெலும்புத்தண்டுடன் பிணைந்து அதனுடன் உடல் பளுவைத்

தாக்கும் விவரமெல்லும்புகளும் வலிற்றுப் புறத்தகைகளும் பொருத்து மாறு அமைந்துள்ளன.

சிறகுடன் இணைந்த எலும்புகள்

பறப்பதற்குப் பயனுள்ளதாக விருக்கின்ற சிறகுகள் பொருத்தப் பட்டுள்ள முன்னங்கால்கள், ஒரு சில பகுதிகளில் நிறப்புடன் வளர்ச்சி புற்றும் மற்றும் சில பகுதிகளில் ஒடுக்கப்பட்டும் அமைந்துள்ளது. இறகுகள் முன்னங்கால்களின் மேக்கரத்தின் பின் அச்ச ஓரங்களிலும் முழங்கை எலும்புகளிலும், கைகளிலும் பொருத்தப்பட்டுள்ளன. சிறகின் வடிவம் இறகுகள் தகைகளாலும் படலங்களாலும் மேற் கூறிய எலும்புகளுடன் பொருத்தப்பட்டுள்ள நிலைக்கேற்ப அமைந்துள்ளது. முன்பெட்டாஜியமும், பின்பெட்டாஜியமும் முன்னங்கால் உடனுடன் சேருமிடத்தில் அமைந்துள்ளன. பறவைகளின் சிறகுகள் பறக்கும்பொழுது மேலும் கீழும், முன்புறமும் பின்புறமும் அசைவது பெரும்பாலும் மார்புத் தகைகளாலும், முட்டுகளினாலும் சிறகை விசிற்பதற்குதவும் சிறகின் தகைகளாலுமே ஏற்படுகின்றது. முன்னங்காலின் மேற்கரம் குட்டையாகவும் அகவமாகவும் பெரிய தலைப்பற்றி யுடனும் மார்புத் தகைகள் பொருத்துவதற்கேற்ப அமைந்துள்ளது. ரேடியஸ் அல்லது ஆர எலும்பும், அல்கு அல்லது முழங்கை எலும்பும் தண்டுக்குப் பெரியதாக வளர்ச்சி பெற்றுள்ளன. இவற்றின் அண்மைப் பகுதியில் இரண்டு மணிக்கட்டு எலும்புகள் உள்ளன. அதற்குப்பால் மற்ற மணிக்கட்டு எலும்புகள் இரண்டு கோல் போன்ற மணிக்கட்டு உள்னங்கை (Carpometacarpals) எலும்புகளாக மாற்றியுள்ளன. இரண்டாவது உள்னங்கை எலும்பு மட்டும் தள்ளுக வளர்ச்சிபுற்றிருக்கின்றது. அதில் இரண்டு அகன்ற விரல் எலும்புகளுள்ளன. உள்னங்கை எலும்பில் முதல் எலும்பும் மூன்றாவது எலும்பும் ஒவ்வொன்றும் ஒவ்வொரு விரல் எலும்புடன் அமைந்துள்ளன.

ஆரவே எலும்புக் கூட்டின் எல்லாப் பாகங்களிலும் பிணைப்புகள் உண்டாகியும், எலும்புகள் பொருத்தப்பட்டுள்ள நிலையில் மாற்றங்கள் கண்டும் அது பறவைக்குப் பறப்பதற்கு வேண்டிய ஆதாரத்தைக் கொடுத்துதவுகின்றது. முக்கியமாக எலும்புகள் களமற்று இணைாக விருப்பதும், காற்றால் நிரப்பப்பட்டுள்ள நிலையுமே இதற்குப் பெரிதும் துணைபுரிகின்றது.

4. காற்றுப்பைகள்


பறவைகளின் துரைவிரல்கள் இரண்டும் பல காற்றுப்பை களுடன் தொடர்புடையனவாகவுள்ளன. காற்றுப்பைகளும் துரை விரலும் சேர்த்து பறவைகளில் காற்று இடமாற்றம் செய்வும்

பரப்பானது மிகவும் அதிகமாகவுள்ளது. காற்றுப்பைகள் எலும்புக் கூட்டிலும் உட்கிடப்புறுப்புகளுடனும் தொடர்புடையனவாக உள்ளன. காற்றுப் பைகளுக்கு மண்டையோட்டுடன் மட்டும் தொடர்பு கிடையாது. காற்றுப் பைகளிலுள்ள காற்றோட்டம் உடல் வெப்பத்தைச் சீராக்கவும் பயனுள்ளதாகவிருக்கின்றது. இவ்வாறு காற்றுப்பைகள் பறவை பறக்கும்பொழுதும் நடக்கும்பொழுதும் இளைப்பாறும் பொழுதும் பயனுள்ளனவாய் இருக்கின்றன.

5. பறக்கும் குறைகளுக்கேற்ற தகவமைப்புகள்

பறக்கும்பொழுது பறவை தன் சிறகை மேலும் கீழும் அசைப்பதை நம்மால் காண முடிகின்றது. ஆனால் பறப்பதற்கு அவ்வகைகள் எவ்வாறு பயனுள்ளதாகவுள்ளன என்பதை அறிந்து கொள்ளுதல் அவ்வளவு எளிதல்ல. பவியீதமான பறக்கும் குறைகளுக்கேற்ப பறவைகளின் சிறகுகள் பல வடிவங்களில் அமைந்துள்ளன. இது பற்றி மேலும் அறிந்து கொள்வதற்குப் பறவைகள் முன்புறம் சுற்றித்தள்ளப்படும விலையை எவ்வாறு பெறுகின்றன என்பதை ஆராய்வோம். பறவைகள் பறக்கத் தொடங்கும் பொழுது முதலில் அதன் உடம்பு மேலே உயர்த்த வேண்டும். அவ்வாறு அதன் உடம்பு பறவை மேலே உயர்த்துவதற்குச் சிறகுகள் செயல்பட உதவும் பெரிய மார்புத் தசைகளே பயனுள்ளனவாகவும் சக்தி பொருந்தியவையாகவும் உள்ளன. ஒரு பொருள் விண்வெளியில் பறக்கும் பொழுது அது கீழே விழாமல் நிறுத்தி வைப்பதற்கு அதற்கு வலிமையான பறக்கும் வேகம் இருக்க வேண்டும். அதாவது அப்பொருளின் வேகம் அதன் எடைக்குச் சமமான உயர்த்து விசை (Lift force) உண்டாக்கும் வலிமை பெற்றிருக்க வேண்டும். பறக்கும் வேகம் ஒரு குறிப்பிட்ட வேகத்திற்குக் குறையுமானால் குறைக்கப்பட்ட விசையினால் உடலின் பறையைத் தாங்க முடியாமல் அப்பொருள் உடனே கீழே விழுந்து விடும். பறவைகள் அவ்வாறு கீழே விழாமல் பறவைகளின் சிறகுகள் சிறகு வீச்சால் வேகத்தை உண்டாக்கி ஆகாயத்தில் பறக்கின்றன. சிறகு வீச்சு பறவைகளுக்கு முன் உந்தும் விசையைக் கொடுப்பதோடல்லாமல் இரு சிறகு வீச்சுகளுக்கிடையில் குறைக்கப்பட்ட வேகத்தால் அது விழுந்துவிட்ட தூரத்தைச் சரி செய்யும் வண்ணம் மேல் நோக்கி உயர்த்தவும் பயன்படுகின்றது. சிறகு கீழ் வீச்சின் போது அதன் கீழே அழுத்தப்பட்ட காற்று தன் தெழுவத்திற்குள் விரிவடையும் பொழுது உண்டாகும் விசை பறவையை மேல் நோக்கியும் முன்னோக்கியும் உந்துகிறது. பறவை எவ்வளவு வேகமாகப் பறக்கின்றதோ அதற்கேற்பச் சிறகுகளுக்கடியில் காற்றின் அழுத்தம் அதிகமாகி பறவையானது ஆகாயத்தில் பறக்க உதவுகின்றது. பறவைகளின் சிறகுகள் விரிக்கப்பட்டால், அது மேல்

புறம் சற்றுக் குவிந்தும், கீழ்புறம் குழிந்தும் காணப்படுகின்றது. நீண்ட இறகுகள் முன்னங்காலில் பொருத்தப்பட்டுள்ள அமைப்பினுடையே அல்லாது மேற்புறம் குவிந்தும் கீழ்ப்புறம் குழிந்தும் காணப்படுகின்றது. அந்த இறகுகள் சற்று பின்புறத்திலும், கீழ்நோக்கிலும் நீட்டிக் கொண்டிருப்பதால் நீண்ட இறகுகளால்



படம் 56. புறவின் பறக்கவுதவும் ஈரீப்புத் தசைகளும் அதன் அமைப்பும் (வலிற்றுப்புறத் தோற்றம்)

1. தலை, 2. கண், 3. அலகு, 4. காற்றுக் குழாய், 5. உணவுக் குழாய், 6. இறகு, 7. இருபுடைப்புத் தசை இழை நாண், 8. இரு புடைப்புத் தசை, 9. ஊக்கக் தசை, 10. இயேலிக்கும், 11. கார்ப்பஸ் அக்ரோஸ் பகுதிகளின் தசைப் பகுதிகள், 12. இரண்டாம் படி இறகுகள், 13. கோரக்கோ பிராக்கியலின், 14. குப்ரா கோரகம்படெல், 15. வாய் இறகுகள்.

பின்னாலும், முன்னங்கால் எலும்புகளால் முன்னாலும் குழப்பப்பட்ட ஒரு உட்குழிவு தோன்றுகிறது. இவ்வுட்குழிவுஒரே சீரான உருவமைப்புடன் இருந்தால் நெகிழ் கீழ் விச்சின்போது அதனடியில் அடித்தப்பறம் காற்று தன் தெகழ்வுத் திறனாக விரிவடையும்போது

பறவையை மேல் நோக்கி மட்டுமே உயர்த்தும். ஆனால் பறவைகளில் இவ்வுட்குழியு ஒரே சீராக அமையாமல் அதன் மேல் தளம் மூன்று பக்கத்தில் ஒரு பெரிய செங்குத்தான சரிவாகத் தொடங்கிப் படிப்படியாகப் பிள்ளோக்கிச் சுவையும் சரிவாக அமைந்திருக்கிறது. இதனால் கிறகின் கீழ் வீச்சின் போது அழுத்தப்படும் காற்றினது ஒரு சாய்ந்த நிலையில் எதிர்த்துச்செய்த விசையடைவதால் பறவையை மேல் நோக்கி மட்டுமின்றி மூன்றோக்கிலும் உந்துகின்றது.

சமநிலை

பறவை உட்காந்து இனிப்பாறுத் திணியில் உட்கணத்தை இருப்பு வளைவறும் பின்னங்காக்களும் தாங்கிக் கொள்கின்றன. பறவை பறக்கும் பொழுது உடலின் கணத்தை மாம்பெணும்பு தாங்கிக் கொள்கின்றது. இவ்வாறு பறவையின் எலும்புக் கூடு உடலைச் சமநிலையில் வைத்திருப்பதற்கு பெரிதும் பயன்படுகின்றன.

உணர்ச்சி உறுப்புகள்


பறவைகளில் உணர்ச்சி உறுப்புகள் நிறைபுடன் அமைந்துள்ளன. ஆகாயத்தில் பறந்து நிரியும் பொழுது பறவைகள் தங்கள் பார்வை உணர்ச்சியினையே பெரிதும் நம்பி வாழ்கின்றன. காற்று வாழ்க்கைக்கு ஏற்றவாறு பறவைகளில் கண் பார்வை மிகவும் கூர்மையாகவுள்ளது.

பறவைகள் வெப்ப இரத்தப் பிராணிகளாகும். உடலின் வெப்பம் ஈப்பொழுதும் ஒரே சீராக அமைந்துள்ளது. இவ்வாறு உடலின் வெப்பம் ஒரே சீராக அமைத்திருப்பதற்கு மூளைப்பகுதியிலுள்ள தாலமஸ் என்ற பகுதியின் கட்டுப்பாட்டுத் தன்மையே காரணமாகும். இவ்வாறு பறவைகள் பறத்தலிற்கான பல தகவமைப்புகளைக் கொண்டுள்ள காரணத்தினாலேயே நிறைபுடன் பறந்து நிரிந்து மனிதன் அடைய முயற்சிக்கும் விண்வெளியையே தங்கள் சொர்க்க மாக்கிக் கொண்டு வாழ்ந்து வருகின்றன.

பறத்தலுக்கான இத்தகைய நிறைப்புப் பொருத்திய தகவமைப்பு களுடன், பறவைகள் தங்களுக்கே உரித்தான குத்தும் நிலையில் இருப்பதற்கும் (Perching mechanism) சில முக்கிய தகவமைப்புகளைக் கொண்டுள்ளவற்றைக் கீழே விவரிக்கப்பட்டுள்ளது.

தொடை, எலும்பின் தசைகள் பறவைகள் ஓடுவதற்கும் குத்தும் நிலையில் இருத்தலுக்கும் மிகவும் இன்றியமையாததொன்றாகக் கருதப்படுகின்றது. பறவைகளின் முழங்காவிலும் பாதத்திலும் ஒரு சிறிதே தசைகள் இருப்பதாலும், அப்பகுதிகள் இறக்ககனற்று

இருப்பதாலும், வெப்பம் இப்பகுதியிலிருந்து வெளியேற்றப்படுவது தடை செய்யப்படுகின்றது. தசைகளாலும் தசை நாண்களாலும் (Muscles, tendons) பறவைகளில் குந்தும் நிலை செயல்படுத்தப்படுகின்றது. பறவைகள் மரக்கிளைகளிலோ அல்லது வேறு சாதனங்களிலோ குத்தும்பொழுது அவற்றைத் தம் கால் விரல்கள் நன்றாகப்



படம் 51. பறவைகளில் குத்தும் நிலைக்கெற்ற தசைமைப்புகள்

1. பெர்போர்டி தசைகள்
2. கேஸ்ட்ரோனீயியஸ் தசைகள் (Gastrocnemius)
3. பெரோனியஸ் தசையின் தசை நாண்கள்
4. கேஸ்ட்ரோனீயியஸ் தசையின் தசை நாண்
5. மேலே குறிப்பிட்ட தசை நாண்களின் கட்டுத் தசை நாண்
6. பெர்போர்டித் தசையின் தசை நாண்
7. டாஸ்சோ மேட்ட டாஸ்சல்
8. பெரோனியஸ் மார்புகள் தசை
9. டிபீலோடாஸ்சல்

தசை (Peroneus radius muscle) உள்ளது. இதற்கு ஒரு தசை நாண் உள்ளது. இந்தத் தசை நாண் மூன்று தசை நாண்களாகப் பிரிக்கப்பட்டு மூன் மூன்று விரல்களிலுள்ளும் செல்கின்றன. மற்றுமொரு

பற்றிப் பிடித்துக் கொள்ளின்றன. விரல்கள் காக்களின் மேல் பகுதி கழுடன் தசைகளாலும், தசை நாண்களாலும் நன்றாகப் பிணைக்கப்பட்டிருப்பதாலேயே பறவைகளின் விரல்கள் இவ்வாறான பற்றிப் பிடிக்கும் செயலில் திறமையாகச் செய்கின்றன. பறவை குத்தும் நிலையில் கழுக்கால் வலையும் மொழுது விரல்களுக்கிடையிலுள்ள பெர்போர்டி தசைகளின் (Perforator muscle) வலையும் தன்மைமையுடைய தசை நாண்கள் நன்றாக நீட்டப்படுகின்றன.

மற்றும் சில பறவைகளில் ஆம்பிபிளன்ஸ் தசைகள் (Ambiens muscle) என்ற தசைகள் உள்ளன. இத் தசைகள் ப்ரூசின்லிற்று மூன்றாம் துழைக்கப்பட்டு தொடை எலும்பின் மூன்றாம் நீண்டு செல்கின்றது. இதன் தசை நாண்கள் முழங்காவலினைச் சுற்றிக்கொண்டு டிபியாவின் எதிர்பக்கம் வரை நீள்கின்றது. பின்பு மூன்றுபுறமாக இவற்றின் தசை நாண்கள் இரண்டாவது மூன்றுவது விரலுடன் அல்லது மூன்றுவது நாண்களவது விரலுடன் இணைந்துள்ளது. முதல் விரலின் வலையிற்கு இந்தத் தசை நாண்கள் பவன்படுவதில்லை.

கால் பகுதியில் மற்றுமொரு பெரிய பெரீயோனியஸ் ரேடியஸ்

தசை நான் கெண்டைக்கால் புடைப்புத்தசை (Gastro nemius or calf muscle) விளிருத்து கிளம்பி கணுக்கால் வரை பின்னும் நீண்டு, முன் மூன்று விரல்களிலுள்ளும் மேலே குறிப்பிட்ட தசை நான் கனூடன் இணைத்து செல்கின்றது. முழங்காலிலுள்ள விரையும் பொர்ப்போரான் (Flex or perforans) என்ற தசையிலிருந்து மற்ற மொகு தசை நான் கிளம்பி, முதல் விரலிற்குள் செல்கின்றது. பறவை குத்தும் நிலையில் இருக்கும் பொழுது முழங்காலும் கணுக்காலும் வளைகின்றது. முழங்காலும் கணுக்காலும் வளையும்பொழுது அதனுடன் இணைந்த தசை நாண்களும் வளைவதால் விரல்கள் தன்னுடைய ஸ்டிக் கொள்கின்றன. அப்போது விரல்கள் ஸ்டிக்கொள்ளும் பொழுது, பறவைகள் ஏதாவது ஒரு பொருளைப் பற்றிப் பிடித்துக் கொள்ளுமானால் விரல்கள் ஸ்டிக் நிலையில் அப்பொருளை இறுக்கமாகப் பற்றிப் பிடித்துக் கொள்வது மிகவும் எளிதாகவுள்ளது. ஒரு மரத்தின் கிளைவைப் பற்றிப் பிடித்துக்கொண்டு பறவை குத்தியிருக்கும் பொழுது அப்பறவை தூக்கத்தை மேற்கொள்ளுமானால் உடலின் கைம் சற்று விரிவாக்கப்பட்ட நிலையில் உடல் வளைகின்றது. கணுக்காலின் வளைவிலும் அதனுள்ளிருக்கும் தசை நாண்கள் பின்னும் இறுக்கமடைகின்றன. அதனும் தூக்கும் நிலையிலுள்ள பறவைக்கும் பின்னும் இறுக்கமானப் பிடிப்பு கிடைக்கின்றது. ஆகையால் தான் தூக்கும் நிலையிலும் பறவையானது குத்தும் நிலையிலும் கீழே விழாமல் கெட்டியாகப் பிடித்துக்கொண்டு மரக்கிளையில் குத்தியுள்ளது. துயில் நீங்கி உடல் மேலே எழும்பும்பொழுது தசை நாண்கள் தளர்ந்து, விரல்களும் குத்தியிருக்கும்பொழுது பூட்டியுள்ள நிலையிலிருந்து விடுவிக்கப்படுகின்றன.

15. பறவைகளின்-தகவமைப்பிற்கேற்ப வாழும் முறைகள்

பறவைகள் கிரீட்டேஷியஸ் (Cretaceous) காலத்திலிருந்து பூமியில் எண்ணிக்கையில் அதிகமாகவே தோன்றி வளிக்கத் தொடங்கியிருக்கின்றன. அவ்வாறு அவை அதிகமாக தோன்றியதால் தொடர்ச்சியாக அவற்றுள் பரிணாமமும் ஏற்பட்டது. அவ்வாறு அவை தோன்றிய பொழுது அவை வசிப்பதற்கு போதிய இடமும், ஒதுக்கி வாழத்தகுந்த நிலப்பரப்பும், தேவைக்கு அதிகமாகவே இருந்ததால் அவைகள் பின்னும் பற்றிப் பரவி பல வழிகளிலும் வசிப்பதற்கு ஏற்றதாக இருந்தது.

பறவைகள் மீசோ சோயிக் காலத்திலேயே இவ்வாறு பறவாடாக பரவி வளிக்கத் தொடங்கியிருக்கின்றன. பரவி வளித்தல் ஒரே சீராக அமைவாய்ம இடத்திற்கும் காலத்திற்கும் ஏற்ப அவை பறவாடாக பரவி வளிக்கத் தொடங்கின. இவ்வாறின் காலத்தின் கடைசியிலேயே தற்போது உலகில் உள்ள எல்லாப் பறவைகளும் அநேகமாக தோன்றியிருக்கின்றன. தற்போது பறவைகளில் சுமார் 28 வரிசைகளும் அதில் அடங்கிய சுமார் 8000 சிறப்பினங்களும் வளிக்கின்றன. சுமார் ஆறு வரிசை சார்ந்த பறவை இனங்கள் மறைந்துவிட்டதாகக் கருதப்படுகின்றது.

பறவைகள் பறக்கும் திறன் பெற்றிருப்பதாலேயே தங்கள் எதிரிகளிடமிருந்து தப்பித்து பல மைல்கள் பறந்து சென்று தங்கள் குஞ்சு ஏற்ற இடங்களில் வளிக்கத் தொடங்கின. பறவைகளுக்கு முன்னர் காங்கள் பறப்பதற்கென்ற இறக்கைகளாக மாறியிருப்பதுடன், வெகு தூரம் பறந்து செல்வதற்கெற்ப உடலின் பருமனும் அதிகமாகியும் வாயும் அமைந்திருக்கின்றது. பறவைகளில் முன்னர்கால்கள் இறக்கைகளாக மாற்றப்பட்டுவிட்டபடியால் நிலத்தில் இடம் பெயர்தலுக்கே, அவ்வது உணவுப் பொருள்களை எடுத்து வாங்குதல் செலுத்துவது

பறவைகளின்-தகவமைப்பிற்கேற்ப வாலும் முறைகள்

போன்றவற்றிற்கோ உபயோகப்படுத்துவதில்லை. இவ்வாறு பவனிதமான தகவமைப்புகளை (Adaptation) கொண்டிருத்தவானேயே, பென்சுனின் பறவைகள் (Penguin) பறக்கும் சக்தியற்ற பறவைகளான தீக்கோழி போன்றவைகள் நீரினும் கடல் பக்கத்திலும் மற்றும் பன இடங்களிலும் வசிக்கும்படியான வாய்ப்பைப் பெற்றுள்ளன. பரவிச் செல்லுதற்கும் பறவைகளுக்கு எல்லைத் தடைகள் இருந்து கொண்டுதான் உள்ளன. அவ்வாறு எல்லைத் தடைகளால் பாதிக்கப்படும் பொழுது பறவைகள் ஒரு குறிப்பிட்ட இடத்தில் வசிக்கத் தொடங்கி அவ்விடத்திலேயே பவ்வேறுபட்ட தகவமைப்புகளைப் பெற்று (Adaptive radiation) வசிக்கின்றன. ஒரு குறிப்பிட்ட இடத்தில் வசிக்கும் வேகவேறு பறவைச் சிறப்பினங்கள் (Different species) ஒரே மாதிரியான தகவமைப்புகளை பெற்றிருப்பதை நாம் காணலாம். இதற்கு உதாரணமாக தீக்கண்ட பறவைகளின் கூறலாம். ஆல்சிடே (Alcidae) குடும்பத்தைச் சேர்ந்த ஆக்ஸ் (Auk) என்ற பறவைகள் வடக்குப் பகுதியிலுள்ள சமூத்திரங்களில் வசிப்பவை. பெலிக்கானிடிடே (Pelecanoididae) என்ற குடும்பத்தைச் சேர்ந்த பெட்ரல் (Pteral) தெற்குப் பகுதியிலுள்ள சமூத்திரக் கரைகளில் வசிப்பவைகளாகும். பழைய உலகப் பருந்துகளும் புதுஉலகப் பருந்துகளும் ஈரர்க் குருளிகளும் வடஅமெரிக்கப் புய்வெளிகளில் வசிக்கின்றன. அதே போன்று ஆப்பிரிக்காவில் வசிக்கும் மேக்ரோனிக்ஸ் (Macronyx) என்ற பறவையையும் உதாரணமாகக் கூறலாம். மேற்கூறிய பறவைகள் உலகின் பன பாகங்களில் வசித்தாலும் அவை வசிக்கும் இடம் ஏறத்தாழ ஒரே மாதிரியான பகுதிகளாக வீழ்ப்பதால் அவற்றின் உடல் அமைப்பும் தகவமைப்புகளும் ஒன்று இருக்கின்றன.

பறவைகளின் இடம் பெயர்தலுக்கான தகவமைப்புகள்

பறவைகள் இறக்கைகளாலும் கால்களாலும் முக்கியமாக ஒரு இடம் விட்டு மற்றொரு இடத்திற்குச் செல்கின்றன. சில பறவைகளில் அவற்றின் வால்பகுதி பறக்கும் பொழுது காற்றில் ஊடுருவிச் செல்ல பெரிதும் பயன்படுகின்றது. பின்னும் சில சமயங்களில் பறவைகள் மரங்களில் ஏறிச்செல்லும் பொழுது வால்பகுதி உதவுகின்றது.

**பறவைகள் தரையில் இடப்பெயர்ச்சி செய்ய
ஏதுவாகவுள்ள தகவமைப்பு**

பறவைகள் நடப்பது, ஓடுவது, ஏறுவது, குதிப்பது, பற்றிப் பிடிப்பது, பவமானவற்றை தாங்கிப்பிடிப்பது, நீரில் நடப்பது, மிதுது


வான தரையில் நடப்பது போன்ற செய்கைகளால் இடப்பெயர்ச்சி செய்கின்றன. வளைதோண்டி, வளைவிலுள் வசிக்கும் பறவைகளின் கணில் இந்த மாநிலமான தகவமைப்புகள் கிடையாது.

ஓடும் செயலுக்கேற்ற தகவமைப்பு

நன்றாக ஓடும் நிறன் பெற்றவற்றின் பறவையினங்களின் பற்றி ஆராயும் பொழுது, நான்கு கால்களைக் கொண்ட ஓடும் நிறன் பெற்ற பாலூட்டிகளைப் பற்றியும் நிறிது தெரிந்து கொள்வது அவசியமாகும். வேகமாக ஓடும் தன்மைவுள்ள நான்கு கால்களையுடைய பாலூட்டிகளில் மூன்று கீதமான அமைப்புகளைக் கவனிக்க வேண்டும். சேய்மைக் கால் எலும்புகள் (Distal limb elements) அண்மைக் கால் எலும்புகளைவிட (Proximal ones) நீளமாக உள்ளதொன்றாகும். இரண்டாவதாக தரையில் படும்படியான பாதமானது மிகவும் நிறை தாக்கவுள்ளதன்மை, மூன்றாவதாக கிரம் எலும்புகள் எண்ணிக்கையில் குறைவாக உள்ள தன்மை, ஆகிய இம்மூன்று தன்மைகளையும் வேகமாக ஓடும் பாலூட்டிகளில் சாதாரணமாகக் காணலாம். பறவைகளின் மூன்றுகால்கள் பறப்பதற்கேற்ற இறக்கைகளாக மாற்றி அமைக்கப்பட்டிருப்பதால், இரு பின்ன்கால்களிலுமேயே இடப்பெயர்ச்சி செய்தல் வேண்டும். ஆனால் பென்ருவின் பறவைகளில் துருப்புகளாக மாற்றி அமைக்கப்பெற்றவற்றின் மூன்றுகால்கள் பின்ன்கால்கள் ஆக இரண்டிலுமே உபயோகித்துத்தான் பறக்கட்டிச் சரிவுகளில் இடப்பெயர்ச்சி செய்கின்றன. நான்கு கால்களிலும் நடக்கும் பிராணிகளைவிட இரு கால்களையுடைய பிராணிகளில் உடற்களத்தை சமமாக வைத்து இடப்பெயர்ச்சி செய்தல் கடினமான தென்பதாயேயே இவற்றின் பரிணாமத்தை அறிதலும் துணையுடையதாக உள்ளது. இரு கால்களிலும் நடக்கும் பிராணிகளில் அவற்றில் புனிர்ப்பு மையமானது பாதங்களுக்குமேல் அமவது இரு பாதங்களுக்கு இடையில் அமைதல் வேண்டும். நீண்ட கால்களையும் சூட்டையான பாதங்களையும் உடைய பறவைகளின் அவைகள் பூமியில் உட்கார்ந்து இளைப்பாறுவதற்கோ, இளைப்பாறிய பின் எழுந்தற்கோ அவற்றின் புனிர்ப்பு மையமானது பாதங்களுக்குமேல் விரும்படி அமைய அவற்றின் கால்களின் டி.பியோடார்சல் எலும்பும், பார்சோ மெட்ட டார்சல் எலும்பும் ஒரே அளவாகவிரித்தல் வேண்டும். பறவைகள் ஒரே ஒரு காலைத் தரையில் வைத்திக் கொண்டு, மற்றக் காலின் உதவியால் தலை பகுதிகளிலுள்ள இறக்கைகளைக் கொஞ்ச் சுத்தம் செய்கின்றன. மேலே குறிப்பிட்ட பறவைகளின் பாதங்கள் சூட்டையாகவும் கிரவென்ஸ்கைகளில் குறைவாகவும் இருப்பதால் ஒரு காலிலும் மட்டும் உடல் களத்தை தாங்கிக் கொண்டு மற்ற காலிலும் தலை இறகுகளைக் கொள்கிறவது

சற்று கடினமே. அங்ஙனம் செவ்வது கடினமாகியிருப்பதாலேயே, காக்களில் இரு விரல்கள் மட்டுமே கொண்டுள்ள திக்கோழி போன்ற பறவைகளில் தலை கழுத்து முதலிய பகுதியில் இறஞ்சேனை விடையது என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

ஒரு செயலுக்கேற்ற உறுப்புகளைக் கொண்ட பறவையினங்களை இருபிரிவுகளாகப் பிரிக்கலாம். ஒரு பிரிவுப் பறவைகள் தீன அடிப்பிட்டு வேகமாக அதிக தூரம் ஒடும் பறவையினங்களாகும். மற்றொரு பிரிவு குட்டையான காக்களை வுடைய அதிவேகமாக குறிப்பிட்ட தூரத்திற்குள்ளேயே ஓடக்கூடிய சக்தியுள்ள பறவை யினங்களாகும். முதலில் கூறிய பிரிவிற்கு திக்கோழியை உதாரணமாகக் கொள்வோம். திக்கோழியானது பறக்கும் திறனிழந்த, நீண்ட காக்கையுடைய, எதிரிகளிடமிருந்து தப்பி வேகமாக பலைமை தூரம் ஓடக்கூடியதான பறவையினமாகும். இரண்டாவது பிரிவிற்கு சேன்டர்லிங் (Sanderling) என்ற பறவையை உதாரணமாகக் கொள்ளலாம். சேன்டர்லிங் பறவைகள் கடற்கரையில் அனைகள் அடிப்பதற்கேற்ப இங்குமங்கும் ஓடக்கூடிய பறவைகளாகும். இங்ஙனம் குட்டையான காக்களுடன் வேகமாக இங்கும் அங்கும் ஓடக்கூடிய பறவைகளை கடற்கரையோரங்களில் சாதாரணமாகக் காணலாம். இப் பறவைகள் பாதுகாப்பான நிறங்களுடன் அதாவது அது தங்கியுள்ள இடத்திற்கையேற்றதாய் எதிரிகளிடமிருந்து தப்பிச்செல்ல ஏதுவாக இங்குமங்கும் விரைவாக ஓடுவதை காணலாம்.



படம் 32.

தடப்பதற்கான தகவமைப்பினைக் கொண்ட பாதங்களைக் கொண்ட பறவைகள்
1. கச்சி (Coursier)
2. திக்கோழி (Ostrich)

கடக்கும் செயலுக்கேற்ற தகவமைப்பு

மாமிச பட்சணிகளில்லாத திவுகளில் வசிக்கும் பறக்கும் திறனற்ற பறவைகளின் காக்கள் மேற்கூறியவாறு இருப்பினும் டிபிபோடார்சஸ் எழும்பு சற்று நீளமாகவேயிருக்கும். நியூஜிலாந்தில் வசிக்கும் மோலாய் (Moa) பறவைகளிலும், மடகாஸ்கர் பகுதியில் வசிக்கும் யானைப்பறவைகளிலும் (Elephant birds) இம்மாதிரியான காக்கள்

உள்ளன. டோடோ பறவைகளிலும் (Dodo) நியூஜிலாந்து நாட்டு ஆசுப்பார்னில் (Aptornis) பறவைகளிலும்கூட மேற்கூறியவாளுள் கால்களே உள்ளன. இப்பறவைகளில் கால் எலும்புகள் கனமானதாகவும், டார்ச்சோ மெட்ட டார்சங்கள் குட்டையானதாகவும் குட்டையான பாத விரல்கள் அகலமாக விரிக்கப்பட்டு, பரந்த பாதக் களாகவும் காணப்படும். பாசிகளில் கால் எலும்புகள் ஒரு செங்குத்தான கோட்டில் அமைந்திருக்கும். மோவால் பறவைகளிலும், பாசிய் பறவைகளிலும், பாசிகளில் உள்ளது போன்ற டிபியோ டார்சங்களும், டார்ச்சோ மெட்ட டார்சங்களும் ஒரு செங்குத்தான கோட்டில் அமைந்திருப்பினும் கீபீமர் எலும்பானது மூலமுறம் கீழ்ப்புறம் நோக்கி அமைந்திருக்கும். அய்வாறு அமைந்திருப்பதாலேயே பறவைகள் இருகால்களினால் நடக்கும்பொழுது முன்கூப்பு மைமம் இருப்பெனும்பு மூட்டிற்கு முன்னால் வீழும்படி அமைந்து இடம் பெயர்தலுக்கு உதவுகின்றது.

பறவைகளில் நடந்து அல்லது குதித்து செல்லுதற்கு ஏற்ப அமைந்துள்ள தகவமைப்பு

முதலில் தோன்றிய பறவைகள் மரங்களில்தான் வசித்திருக்க வேண்டும் என்று தோன்றுகின்றது. சில அல்லது கொம்பின பத்திக்கொண்டு அமர்வதற்கேற்ற கால்களையுடைய பறவைகளும் (Passarines) மரங்களிலேயே வசித்து வந்தன. இப் பறவைகள் பறக்கும் நேரம் தவிர மற்ற நேரங்களில் மரங்களில் இளைக்கும்விளை குதித்துச் சென்று தான் இடப்பெயர்ச்சி செய்தன. சிலைக் கொம்பு முதலியவற்றைப் பத்திக்கொண்டு அமர்வதற்கேற்ற கால்களையுடைய பறவையினங்கள் நிலத்தின் ஒதுக்கமானப் பகுதிகளிலும் வசிக்கின்றன. அவற்றிற்கு நடக்கும் சக்தியே அதிகமாகவுள்ளது. வானம்பாடி போன்ற பறவைகள் இதற்கு உதாரணம். குக்க (Cuckoo) குடும்பத்தைச் சேர்ந்த காக்கிலும் (Coccyzus) குரோட்டோகிபெகா, க்ரோபாக்சுசில் (Crotaphaga, geococcyus) போன்ற பறவைகளில் குதித்துக் குதித்து மரக்கிளைகளில் வசிக்கும்படி யான நிலைமை மெதுவாக மாறி தரையில் வேகமாக ஓடும்படியான நிலைமைக்கு ஏற்றவாறு உள்ளன. அய்வாறு அப்பறவைகள் வேகமாக ஓடும்படியான நிலைமை பெற்றதற்கு அவைகளின் நீளமான கால்களின் அமைப்பே காரணமாகும் என்று பெர்க் (Berger) என்ற பேரறிஞர் விளக்கியுள்ளார்.

பாதுாட்டிகளில் கங்காருவானது குதித்துக் குதித்து இடப் பெயர்ச்சிசெய்யும் ஆற்றல் பெற்று உள்ளது. அதே போன்று குதித்துக் குதித்து விளக்கத்தக்க வகையில் இடப் பெயர்ச்சி செய்வதற்கு

பறவைகளுக்கு ஆற்றல் கிடையாது. பெரும்பாலும் அவை பறந்து சென்றே எதிரிகளிடமிருந்து தப்பித்துக் கொள்ளின்றன.

பறவைகளின் ஏறிச்சென்று இடப்பெயர்ச்சி செய்தலுக்கான தகவமைப்பு

மரங்களில் ஏறிச் செல்லுதற்கேற்ப உடலமைப்புடனும் கால்களும் கொண்ட பறவைகளில் மரங்கொத்திவையும் அதனை போன்ற பறவைகளையும் உதாரணமாக எடுத்துக் கொள்வோம். இப் பறவைகள் மரங்களில் ஏறிச்செல்லும் பொழுது அவற்றின் வால் பகுதி அவற்றிற்கு பெரிதும் உபயோகமாகவுள்ளது. ஆனும் கொட்டைகளை உண்டு வாலும் பறவைகள் மரங்களில் ஏறிச் சென்று இடப்பெயர்ச்சி செய்யும் பொழுது அவற்றின் கால்களை அவற்றிற்குப் பெரிதும் பயனுள்ளதாகவுள்ளன. வால்பகுதியை மரங்களில் ஏறிச் செல்லுதற்கு பயன்படுத்தக் கூடிய மரங்கொத்தி போன்ற பறவை விலங்குகளில் வாலின் அடிப்பகுதியான பைகோஸ்டைல் (Pygostyle) வால்மூலங்களையும்புகள் (Caudal vertebrae) முதலியன தன்ளுக பெரிதாக அமைந்துள்ளன.

வால்பகுதியில் வால் இறகுகளான ரெக்ட்ரிட்ச்க்கள் உள்ளன. வால் மூன்றெலும்புகளாக உறுதியாக அமைந்துள்ள இப்பகுதியில் இறகுக் துண்டளால் (Barbs) தன்ளுக பயன்படுத்தப்பட்ட வால் இறகுகளான ரெக்ட்ரிட்ச்க்கள் உள்ளன. இப் பறவைகள் மரங்களில் ஏறிச் செல்லும் பொழுது கால்களால் தன்ளு - பற்றி ஏறிச் செல்லுகின்றன. அவ்வாறு பற்றி ஏறிச் செல்லுதற்கு அவற்றின் பாதங்களில் கூர்மையான நகங்கள் உள்ளன. வால் பகுதியை ஏறிச் செல்லுதற்கு பயன்படுத்தும் மரங்கொத்தி போன்ற பறவைகள், மரங்களில் ஏறும்பொழுது அடிமரத்திலிருந்து மேல் நோக்கி செல்லுகின்றன. இம்மாதிரி தகவமைப்புள்ள பறவைகளில் காலில் மூன்பக்கத்து விரல்களும், பின்பக்கத்து விரல்களும் அளவிலும் வடிவிலும் ஒரே மாதிரியாகவே விருக்கும். கொட்டைகளை உண்டு வாலும் பறவைகளில் மரங்களில் ஏறிச்செல்லும் முறை இரு வழியாகவும் இருக்கும். இவை மேலிருந்து கீழ் நோக்கியும் இடம் பெயரும், கீழிருந்து மேல் நோக்கியும் இடம் பெயரும். இப் பறவைகளின் கால்களிலுள்ள பிந்தோக்கி அமைந்துள்ள பின்பிரல் மூன்றோக்கி அமைந்துள்ள மூன்று விரல்களைக் காட்டிலும் மீ-வும் பெரியதாக அமைந்துள்ளன. இப் பறவைகளில் 4ஆவது விரல் நீளமாகவிருத்தலும் பின்னல் கால்கள் குட்டையாக அமைந்திருத்தலும் பெரியதாக அமைந்துள்ள பைகோஸ்டைலும், 4ஆவது விரல் சுழலும்படி அமைந்த தன்மையும், டிபியாவின் மூன் தசையின் (Tibialis anterior muscle) செயல்மையில் புகுத்தப்பட்டுள்ள

நிலைமையும் ஏறும் செவலுக்கேற்ப அமைந்துள்ளது. இங்வாறான தகவலைமேல்புள்ள பறவைகளை உ. எ. இ. உ. என்னப் பாகங்களிலும் காணலாம். சிட்டா (Sitta) என்னும் பறவையை ஓலார்க்கடி ஒலியன்டல் நிலப் பரப்புகளிலும், செந்தீயா (Certhia) என்னும் பறவை தோலார்க்குர்க்கடி நிலப் பரப்பிலும், சாக்போரீஸ் (Salporsis) என்னும் பறவை எதிரோப்பியா, ஒலியன்டல் முதலிய நிலப்பரப்புகளிலும் கிளாக்டீரியா (Climacteria) நியோ சிட்டா (Neositta) முதலிய பறவைகளை ஆஸ்திரேலியாவிலும், டேபேனோசிட்டா (Daphaenositta)வை நியூ கினியாவிலும், ரேப்டோர்னீஸ் (Rhabdornis) பறவையை பீகிப்பைபன்ஸ் பிரதேசத்திலும் ஹைப்போசிட்டா (Hypositta) பறவையை மடகாஸ்கர் பகுதிகளிலும் மத்திய தெற்கு அமெரிக்கப் பகுதிகளிலும் காணலாம். மரங்களில் ஏறிச் செல்லும் பறவைகளிலும் இரண்டு பிடிவுகள் உள்ளன. டிக்டைக்கோட்ரோமா (Tichodroma) போன்ற பறவைகள் கவரில் ஏறுவதற்கான தகவலைமேற்புடனும் கொட்டைகளை உண்டு வாரும் பறவையினங்களான சிட்டா முதலிய பறவைகள் மலை உச்சிகளுக்கு ஏறுப்படியான தகவலைமேற்புடனும் உள்ளன.



படம் 53. ஏறும் அல்லது பற்றித் தொக்குவதற்கான தகவலைமேற்பினக் கொண்ட பாதங்களையுடைய பறவைகள்

1. மரங்கொத்தி. 2. செரி. 3. ப்ரோகான் (Trogon),
4. மரக்கிடினெட் (Martinez), 5. அரசு மீன் கொத்தி.

செரி மற்றும் குறுக்கைகு (Cross bill) போன்ற பறவைகள் மரங்களில் ஏறும்பொழுது அவற்றின் நன்றாக வளைந்த அங்கங்களின்

உதவியானும் பாதங்களின் உதவியானும் இளைக்குக் இளை சென்று விரைவாக.

நீரில் நடப்பதற்கான தகவலைப்புகள்


நீரில் நடப்பதற்கான தகவலைப்புகள் கொண்ட பறவைகளில் நீரில் பல ஆழங்களுக்கும், பலவிதமான நீர் நிலைகளின் தரத்திற்கும் தகுந்தாற்போல் நடப்பதற்கு ஏற்றவாறு அவற்றின் கால்கள் அமைந்துள்ளன. இப்பறவைகளின் கால்களும் அவரும் கழுத்தும் மிகவும் நீளமாகவுள்ளன. நீளமான கால்கள் இருத்தவாயினால் இப்பறவைகளுக்கு இரைபுண்ணுவோ நீர் அருந்தவோ ஏற்றவாறு நீண்ட கழுத்தும் நீண்ட அவருகளும் உள்ளன. அவைகளின் கால்களில் டிபியோடார்சல் எனப்படும் டார்சோ மெட்டடார்சல் எனப்படும் ஒரே நீளமுள்ளதாகவுள்ளன. இப்பறவைகள் நீண்ட கால்களையும் நீண்ட அவருகளையும் தங்குக் நீட்டிக்கொண்டு பறக்கின்றன. அவ்வாறு நீட்டிப்பட்டு இருக்கும் கால்களும் அவரும் பறக்கும்பொழுது சீரான நடுநிலைமை ஏற்படும்படி செய்கின்றது (Counter balance). நாரைகளில் மட்டும் இதற்கு விதிவிலக்காக உள்ளது. அதாவது நாரைகளின் தங்குக் அகலமாக அமைந்துள்ள இறக்கைகளே அவை பறப்பதற்கு ஏற்றவாறு அமைந்து விட்டன. நாரைகள் பறக்கும் பொழுது கழுத்து உள்விலக்கப்பட்டே காணப்படும்.

கடற்கரையில் வசிக்கும் நீரில் நடப்பதற்கேற்ற தகவலைப்புகளைக் கொண்ட இப்பறவைகளிலும் பலதரப்பட்ட மாற்றங்கள் காணப்படுகின்றன. இப்பறவைகள் ஆழமான இடங்களுக்குச் சென்று இரை தேடி உண்ணுவின்றன. அம்மாதிரிக் கூட்டமாகக்கூடி இரை தேடி உண்ணும்பொழுது இப்பறவைகளில் உருவில் மிகப் பெரிதும் நீண்ட கால்களையும் கொண்ட பறவைச் சிறப்பினங்கள் மிகஆழமுள்ள பகுதிகளில் இரைதேடி உண்ணுவதைக் காணலாம். உதாரணமாக சான் பிரான்சிஸ்கோ (San Francisco) கடற்கரையில் பார்ப்தோ மாலும் 8ர மணற்பகுதியில் நிரியும் பறவை வகைகள் (Sand piper) கரைகளின் அருகிலும் மற்றும் டர்லிண்ட் டோவிட்சர் (Dun lin Dowlitcher) போன்ற பறவைகளை இன்னும் சற்று ஆழமான பகுதிகளிலும் அதாவது அவற்றின் நீரில் நடக்கும் நிறமைக்கேற்ப தண்ணீரில் நடந்து இரைதேடி உண்ணுவின்றன. நீரில் மிகுதுவான பகுதிகளில் அதாவது இலை முதலியவற்றின்மீது நடந்துசெல்லும் பறவைகளுக்கு பாதங்கள் மிகவும் அகலமாக உள்ளன. ஃபிளாமிங்கோ, அவோசெட் (Flamingo, Avocet) போன்ற பறவைகளில் நிற விரல்களுக்கிடையில் தொவிழைமங்கள் (Web) உள்ளன. சிறியதாக அமைந்துள்ள விரல்

களின் உதவியால் கிபிளாமிக்ஸோ பறவை ஒருவதற்கு ஏற்றதாக அமைந்துள்ளது. இறக்கைகள் உதிர்ந்து புதிதாக மூள்க்கும் சமயத்தில் இப்பறவைகள் பறக்கும் திறனை இழந்து விடுகின்றன. அப்பொழுது சிறிய விரல்களின் உதவியால் இவை ஓட முடிவின்றது. நாரைகளில் நீண்ட விரல்கள் இருப்பது அவை சேற்றில் நடக்கும் பொழுது ஆதாரமாகவிருக்கின்றதே அல்லாமல் அவைகளுக்கு ஒருவதற்கு பயன்படுவதில்லை.

மிருதுவான நிலத்தில் நடப்பதற்கான தகவமைப்புகள்

மிருதுவான நிலப்பரப்பிலோ அல்லது நீர்நிலைகளிலுள்ள தாவரங்களின் மேலோயோ நடப்பதற்கான தகவமைப்புகளைக்



படம் 54: நீர்மேல் நடப்பதற்கான தகவமைப்புகளைக் கொண்ட பாதங்களைக் கொண்ட பறவைகள்

1. நாரை 2. ஐக்காரு

கொண்ட பறவைகள் ஏறக்குறைய நாரைகள் கொண்டுள்ள தகவமைப்புகளையே பெற்றிருக்கும். இவை அல்லது கொம்பினை பற்றிக் கொண்டு அமர்வதற்கான தகவமைப்புகளைக் கொண்டிருக்கின்றனவாறு போன்ற பறவைகளின் காக்களில் கூரிய நீண்ட நகங்கள் உள்ளன. அவற்றின் காக்களில் பெருவிரல் (Hallux) மற்றவைகளை விட நீளமாக உள்ளது. சேற்றில் வசிக்கும் பறவைகளிலும் அதே போன்று காக்களில் கூரிய நீண்ட நகங்கள் உள்ளன. அதிகமாக நீரினுள்ள சேடி கொடிகளில் நடந்து திரியும் ஐக்காரு பறவைகள் போன்றவற்றில் காள்விரல்களும் நகங்களும் அதிகமாக நீண்டிருப்பதைக் காணலாம். மனலில் நடப்பதற்கான தகவமைப்புடைய டிரெனல் (Grouse) போன்ற பறவைகளின் பாதங்கள் அதற்கேற்றபோல் காள் விரல்களும் நகங்களும் குட்டையானதாகவும் அகலமாகவும் அமைந்துள்ளன. மற்றும் விரல்களில்

அடர்த்தியான இறகுகள் உள்ளன. அவ்வாறு அமைந்துள்ள பாதத்தின் உதவியினால் அப்பறவைகள் மணலில் நடந்து திரிவின்றன. லெனோரஸ் பறவைகளின் மற்றும் சில சிறப்பினங்கள் பனியில் நடப்பதற்கேற்றவாறு அமைந்துள்ளன. குளிக்காலத்தில் பனியில் நடப்பதற்கேற்ப இவற்றின் கால்களின் பாதங்களில் நீண்ட அகன்ற கூரிய நகங்கள் உள்ளன. மற்றும் தட்டையான ஒருவரிசையுள்ள



படம்-55. பனியில் நடப்பது போன்ற தகவமைப்பிற்குக் கொண்ட பாதங்களையுடைய பறவைகள்


1. டார்மிகான் (Ptarmigan) 2. லெனோஸ் பறவை (Grouse)

செதில்களும் விரல்களின் இருபுறமும் காணவாம். இவ்வாறு அமையப்பெற்று பாதத்தின் பரப்பு அகலப்படுத்தப்படுவதாகும். குளிக்காலத்தில் இப்பறவைகள் பனியில் நடப்பதற்கு முடிவின்றது. குளிக்காலம் முடிந்தவுடன் நகங்களும் செதில்களும் உதிர்ந்து அடுத்த பருவத்தில் மறுபடியும் மூள்கின்றன. அதே போன்று டார்மிகான் (Ptarmigan) என்ற பறவைகளில் பாதங்களில் அடர்த்தியான இறகுகள் குளிக்காலத்தில் தோன்றி பின் உதிர்ந்து விடுகின்றன. இப்பறவைகளின் பாதங்கள் குழி மூலங்களின் (Hare) பாதத்தை ஒத்திருப்பதாகும் இவற்றிற்கு லேகோப்பஸ் (Lagopus) என்ற பெயரும் உண்டு.

பற்றிப்பிடிப்பதற்கான தகவமைப்புகள்

பறவைகள் தோன்றிய பொழுதிருந்தே அவைகளில் இளைகள், மரங்கள் முதலியவற்றை பற்றிப்பிடித்து வசிப்பதற்கான தகவமைப்புகள் இருந்தன. இப்பொழுது நிசத்தில் வாரும் பறவைகளும் நீரில் வசிக்கும் சில பறவைகளும் இரவு நேரத்தில் மரங்களில் உட்காந்து பற்றிப்பிடித்திருப்பதைக் காணவாம். இவ்வாறு

அவை பற்றிப் பிடித்து மரங்களின் இலைகளில் உட்காந்திருப்பதற்கு அவற்றின் விரல்கள் கொக்கிபோல் (Clamp) அமைந்திருப்பதே காரணமாகும். நீண்டு வளையும் தன்மையுள்ள விரல்களின் தசைகளிலுள்ள தசை நாண்கள் (Tendon) கணுக்கால் எதும்பு மூட்டிற்கு பிள்ளை கற்றிச் சென்று பொருத்தப்பட்டுள்ளது. அவ்வாறு அமைந்திருப்பதால் பறவை திரும்பு பொழுது விரல்கள் நீட்டப்பெற்றும், பறவை



படம் 56.

இவை பற்றிப் பிடிப்பதற்கான தகவலைப்பினைக் கொண்ட பாதங்களின் மூலைய பறவைகள்

1. ஆஸ்பிரே (Osprey)
2. ஆத்தை

படம் 57. மரம் மூதாளவற்றில் குத்ததற்கான தகவலைப்பினைக் கொண்ட பாதங்களின் மூலைய பறவைகள்

1. ஃபிங்க் (Finch), 2. காட்டுக் காகம் (Jungle crow), 3. ராபின் (Robin), 4. சிட்டுக் குருவி (Sparrow).

இலைகளில் குத்தும் பொழுது கணுக்கால் எதும்புடன் பொருத்தப்பட்டுள்ள தசை நாண்கள் கருவி விரல்கள் பற்றிப்பிடிக்கும் படியான அமைப்பினாலும் காணப்படுகின்றன. ஆகையால் கணுக்கால் மூட்டுமூலையுடன் பின்புறமாக பொருத்தப்பெற்றுள்ள தசை நாண்களின் உதவியால் எவ்வித சிரமமின்றி பறவை பற்றிப் பிடிக்கும் நிலையைப் பெறுகின்றது. மரக்கிளைகளில் வாழும் சில பறவைகளினங்களின் பாதத்திற்கடியில் பெரிய செதில்களும், மெத்தை போன்ற மிருதுவான (Pad) பாகங்களும் உள்ளன. தசைநாண்களால்

பூட்டப்படுவது போன்ற நிலைமையை அடையும் பொழுது இவற்றின் விரல்களும் ஒன்றோடொன்று அருகருகே அமைந்து செதில்கள் மேத்தை போன்ற பகுதிகளுடன் சேர்ந்து, பற்றிப் பிடித்துக் கொள்ள ஏதுவாக உள்ளது. பின்னும் மரக்கிளைகளில் வாரும் பறவைகளில் வால்பகுதியும் பாதங்களும் நன்றாக அமைப்பெற்று, பற்றி ஏறுவதற்கேற்ப அமைந்துள்ளன.

பறவைகளின் தண்ணீரில் வசிப்பதற்கான தகவலைப்பு

ஆம்னியான் என்ற கருச்சல்கள் உள்ள பிராணிகளான ஊர்வன, பறவைகள், பாதுகாடிகள் முதலியவை நிலப்பரப்பிலேயே பெரும்பாலும் வசிக்கும் பிராணிகளாகும். மேலே குறிப்பிட்டவைகளில் சில உணவுப்பொருள்களுக்காக மறுபடியும் தண்ணீருக்குச் சென்று இரைதேடி உண்ண ஆரம்பித்தன. பாதுகாடிகளில் திமிங்கலம் முதலானவற்றைப் போன்று தண்ணீரிலேயே வசிக்கும் பிராணிகளாக மாறியுள்ள பறவைகள் தண்ணீரிலும் நீந்திப்பறவிக் கொள்ளுகின்றன.

பறவைகளின் நீந்துதற்கான தகவலைப்புகள்

பறவைகளில் பின்னங்கால்களே நீந்துதற்கான தகவலைப்பு களுடன் அமைந்துள்ளன. அவற்றின் பாதங்கள் தோலிழைமங்களாக மாற்றப்பட்டோ, இதழ்களாகவோ காணப்படுகின்றன (Webbed or lobed). இரண்டாவது மூன்றாவது நான்காவது விரல்களுக்கிடையில் தோலிழைமங்கள் 4 விதமாக மாறியுள்ளது. அதாவது வந்து-ஃபிளாயிங்கோ, பெரல்-பென்குவின், கல்-ஆக்-ஹன் வகை-கிரீட்டேஷியல் காலப்பிரிவில் தோன்றிய இத்தியார்னித்தென் வகை (Duck-flamingo line, petrel penguin line, gull auk-loon line and presumably cretaceous Icthyornithes) என்பனவாகும். இவ்வாறு பறவைகளாகத் தோன்றியவைகள் கடைசியில் பெய்க்கள் பறவைகளில் உள்ளது போன்று 4 விரல்களும் தோலிழைமங்களால் சேர்ந்து காணப்படும் தன்மை தோன்றியிருக்க வேண்டுமென்று தோன்றுகின்றது. எல் விரல்கள் இதழ் இதழ்களாகக் காணப்படும் முறை கிரெப்ஸ் (Grebs) ரெயில்கள் (Rails) பேலரோப்ஸ் (Phalaropes) கிரீட்டேஷியல் கால நெறல்பெரார்னித்தென் முதலியவற்றில் தனித்தனியே தோன்றியிருக்க வேண்டும் என்று கருதப்படுகின்றது. அங்ஙாறு தோன்றியுள்ள முறைவையும் ஆதாரப்பூர்வமாக பாரிக்கும் பொழுது இருவகைப்படுத்தலாம். கிரெப்ஸ் பறவைகளில் இதழ்களின் வெளிப்புறம் விரல்களுடன் நன்றாக கடினப் படுத்தப்பட்டு பொருத்தியுள்ளது. இப்பறவைகள் தண்ணீரில் நீந்தும் பொழுது


இவற்றின் பாதங்களில் மூட்பக்கம் தண்ணீரில் 90° கோணத்தில் கழன்று அச்சுமற்றியினால் கால்விரல்களிலுள்ள இதழ்களானது தண்ணீரை ஒரு கத்திபோன்று மிழித்துச் செல்லுதற்கு உதவுகின்றது. மற்றொரு வகைப் பறவைகளில் இதழ் போன்ற பகுதிகளைப்போல பாதங்கள் தண்ணீரில் கழன்று செல்லாமல், பக்கவாட்டில் தண்ணீரைத்தன்மிக் கொடுத்து பறவை நீரில் நீதி செல்லுதற்கு உதவி புரிகின்றது. நீதிச் செல்லுதற்கான கால் அமைப்புகளைக் கொண்ட பறவைகளை ஆராயும்பொழுது அவைகளின் தகவமைப்புகள் நீரில் நடக்கும் பறவைகளின் கால் அமைப்புகளினின்றும் தான் பலவாறுகத் தோன்றியிருத்தல் வேண்டும் என்று எண்ணும்படி அமைந்துள்ளன. ஆனால் தொழினுடயங்களைக் கொண்ட தண்ணீரில் நீதிச்செல்லும் ஆற்றல் பெற்ற பறவைகளின் தகவமைப்புகள், அப்பறவைகள் நீரிழைகளுக்குச் சென்று இரை தேடிமுடிவதைத் தொடங்கி மிதிது மிதிதாசு மாற்ற முற்று கடைசியில் தோலிழை மக்களாக மாற்றப்பட்டு இருக்க வேண்டுமென்று தோன்றுகின்றது.

மற்றும் தண்ணீரில் நீதிச் செல்லுதற்கு இப்பறவைகளுக்கு அகன்ற உடனமைப்பு உள்ளன. இவ்வாறு அகன்ற உடனமைப்பு உள்ளதால், இப்பறவைகள் நீரில் நிலையாக (Stability) கண்டுவிடச் செல்ல முடிகின்றது. பின்னும் இப்பறவைகளின் உடல் அடர்த்தி யான இறகுகளால் மூடப்பட்டுள்ளது. அவ்வாறு அடர்த்தியான இறகுகளால் மூடப்பட்டுள்ளதால் உடலின் வெப்பத்தை பாது காத்துக்கொள்ள முடிகின்றது. மற்றும் இவற்றிற்கு ஒரு பெரிய எண்ணெய் கரப்பி உண்டு. அந்த எண்ணெய் கரப்பியால் கரக்கப் படும் எண்ணெயைக் கொண்டு இப்பறவைகள் தன் இறகுகளுக்குள் தண்ணீர் புகாவண்ணம் (Water proof) பாதுகாத்துக் கொள்ள முடிகின்றது.

பறவைகளின் நீரில் மூழ்கி வசித்தலுக்கேற்ற தகவமைப்புகள்

இந்த தகவமைப்பானது நீரில் நீதிச் செல்வதற்கான தகவமைப் புகின்றும் மிதிது மிதிதாசு நீரில் மூழ்குதற்கு தோன்றியிருக்க வேண்டும். நீதிச் செல்லுதற்கு ஏற்றவாறு அமைந்துள்ள பின்னல் கால்களில் மேலும் மிதிது மாற்றமடைந்தோ அல்லது இறக்கைகளே தண்ணீரில்வழியில் பறவைகள் நீதித்தற்கு ஏற்றவாறு அமைப்பப் பெற்றுள்ளன. ஐரான்ஸ், ஹெய்ஸ், கார்போரேன்ட்ஸ், ஹென் பெரார்வித்தஸ் முதலிய பறவைகளில் பாதங்கள் தண்ணீரில் மூழ்கி நீதிச் செல்லுதற்கு ஏற்றவாறு அமைந்துள்ளன. பெட்ரங்கள், பென்சுலினிகள், ஆக் முதலிய பறவைகளில் இறக்கை(Wing) யானது

தன்னீரில் மூழ்கி நீந்திச் செல்லுவதற்கு ஏற்றவாறு அமைந்துள்ளன. மற்றும் வாத்துகளில் பாதங்களும் இறக்கைகளும் அவைகள் நீந்திச் செல்லுவதற்கு ஏற்றவாறு அமைந்துள்ளன. ஆனால் வாத்துகளில் பாதங்களும் இறக்கைகளும் நீந்திச் செல்லுவதற்கு ஏற்றவாறு அமைத்



படம் 58. நீத்துதற்கான தகவமைப்பிற்குக் கொண்ட
பாதங்களையுடைய பறவைகள்

1. அயோசெட் (Avocet), 2. கூட் (Coot), 3. க்ரேப் (Grebe),
4. வாத்து (Duck), 5. கார்மோரான்ட் (Cormorant).

திரும்பியும் ஓடும் பறவைகளிலுள்ளது போன்ற நெட்ப்பான அமைப்பு இவற்றில் இல்லை. இன்னும் சிலவற்றில் ஒரு பொதுவான (Genus)ப் பறவைகளை எடுத்துக் கொண்டால் பூப்பினன் மிரியெஸ் (Puffinus, griseus) என்ற நெட்ப்பினத்தில் இறக்கைகளும் கால்களும் மூழ்கி நீந்திச் செல்லுதற்கெற்றவாறு அமைந்துள்ளன. ஆனால் அபிதே பேரினத்தின் மற்றொரு நெட்ப்பினமாகிய பூப்பினன் வியோகோமினஸ் (P. Leucomelas) என்ற பறவையில் இறக்கைகளும் கால்களும் அங்ஙனவு நெட்ப்புடன் அமைவதில்லை என்பது விவக்கத் தகுந்ததே.

தெலுப்பெரார்வித்தென், ஓடும், மிரெப்ஸ் போன்ற நீரில் மூழ்கி நீந்தி வார்ப்பு பறவையினங்களுக்கு பொதுவாக நீண்ட மிகவும்

குறுகிய இடுப்பெலும்பும், அகிடாபுளமும் (Acetabulum), மேலும் இரண்டு தாழ்ப்பாள் போன்ற அமைப்புடன் கூடிய குட்டையான தொடை எலும்புகளுடனும், நீண்ட டிபியோ டார்சல் எலும்புடனும், பக்கவாட்டில் அழுத்தப்பெற்ற டார்சோமெட்ட டார்சல் களுடனும் காலில் அமைப்பு கணுக்கால் மூட்டுடன் பிணைக்கப்பட்ட தசைகளுடனுமாக பல தகவமைப்புகளைப் பெற்றுள்ளன.

மேலே குறிப்பிட்ட மூன்று பிரிவுகளும் ஒரு மையத்திலிருந்து தான் பிரித்து சென்றிருக்க வேண்டுமென்பதற்கு பல பண்டுகள் எடுத்துக்காட்டாக உள்ளன. ஹெல்பெரார்னித்தெல் பறவைகளில் நீயிலல் கிரெஸ்ட் (Cnemial crest) பெட்டெக்லா (Patella) எலும்புடன் இணைந்துள்ளது. ஹான் பறவைகளில் டிபியா நீட்டப் பெற்று, பெட்டெக்லா எலும்பு சிறியதாகவும் கணுக்கால் எலும்பு மூட்டுடன் இணைந்தும் அமைந்துள்ளது. கிரெப்ஸ் பறவைகளில் நீயிலல் கிரெஸ்ட் பெரியதாக அமைந்துள்ள பெட்டெக்லா நீளமான தாசுவுள்ள டிபியா ஆகிய இரண்டு எலும்புகளைக் கொண்டதாகவும் அமைந்துள்ளது.

இங்லாது பல ஒற்றுமைகளைக் கொண்டுள்ள இந்தப் பறவைகளின் முள்சூரிகளைப் பற்றி நமக்கு அதிகம் தெரியவில்லை. பறவைகளின் பரிணாமத்தில் பறவைகளுக்கு பறக்கக் கிடையாது என்று நாம் அறிந்திருப்பினும் நீரில் மூழ்கி மீன்களைப் பிடித்து உண்ணுவதற் கேற்ப ஹெல்பெரார்னித்தெல் பறவைகளில் வாயில் பற்கள் இருக்கின்றன. கிரெப்ஸ் பறவைகளின் புதைபடிவங்கள் ஆனிகோசீன் (Oligocene) காலப்பிரிவினிலிருந்து நமக்குக் கிடைத்துள்ளன. அவைகளைத் தற்போதுள்ள கிரெப்ஸ் பறவைகளுடன் ஒப்பிட்டு நோக்கினால் இரண்டும் ஒரே மாதிரியாகவே உள்ளன என்பது தெரிகின்றது. பழங்கால ஹான் பறவைகளான காலிம்பாய்மஸ் மைன்யூட்டஸ் (Colymboides minutus) பறவையை ஆனிகோசீனின் பிற்பகுதியிலும், மியோசீனின் முற்பகுதியிலும் இருந்ததாகத் தெரிகின்றது. அப்பறவைகள் தற்போதுள்ள ஹான் பறவைகளைக் காட்டிலும் சிறிது மூலப்பட்டு நீரில் மூழ்கி வசிப்பதற்கான தகவமைப்புகள் அவ்வளவாகத் தோன்றாமல் காணப்பட்டன. அப்பறவைகளில் இடுப்பெலும்பு அகமைப்பும், பீம்ஸ் (Femur) எலும்பு சற்று நீளமானதாகவும், நீயிலல் கிரெஸ்ட் சாதாரணமாக காணப்பட்டும் டார்சோமெட்ட டார்சல் அழுத்தப்பட்டும் இருந்தன. மற்றும் சில பண்டுகளில் இப்பறவைகள் கல் (Gull) மற்றும் கடற்கரை பறவைகளை ஒத்திருந்தன. ஆகையால் ஹான் பறவைகள் ஆக் பறவைகளைப் போன்று கல் போன்ற கடற்கரை பறவை முள்சூரிகளினின்றும் தோன்றியிருக்கின்றன என்று கருதப்படுகின்றது.

இதே போன்று பெஞ்சுவின் பறவைகளின் தொற்றமும் சர்ச் சைக்குரியதேயாகும். பெர்சிலோவ் (Percy love) போன்ற அறிஞர்கள் இப்பறவைகள் பறக்கும் சக்தியை விழுந்த ரேட்டைட்டே பறவை களின்மீதும் தொன்றியிருக்குமெய்வளாம், பறக்கும் முன்னோர் களின்மீதும் தொன்றியிருக்க முடியாது என்று கருதினர். ஆனால் தற்போது சிம்சன் (Simpson) போன்ற அறிஞர்கள் இப்பறவைகள் பறக்கும் திறனுள்ள பறவைகளின்மீதுதான் தொன்றியிருக்க வேண்டும், அங்ஙனம் தொன்றிய பொழுது தன் இறக்கைகளின் உதவியால் நீரிதும் ஆகாயத்திலும் இடப்பெயர்ச்சி செய்தன என்றும், பின்பு அவை நீரில் மூழ்கி நீந்திச் செல்ல பழகிக்கொண்டன என்றும் கருதினர். இப்பறவைகள் பறக்கும் திறனை இழக்கும்பொழுது நீரில் மூழ்கி நீந்திச் செல்ல ஏதுவாக இவற்றின் ரித்குகள் மாறிவிட்டன. இங்ஙனான தகவலைப்படி இறக்கைகளை தண்ணீரில் மூழ்கி செல்லு தற்காக மாற்றப்பட்ட பறவைகளில் காரணமாம். ஆனால் காய் களினும் மட்டுமே நீரில் மூழ்கி நீந்திச் செல்லும் பறவைகளில் சாதாரணமாக இறக்கைகளாக மாற்றப்பட்ட முன்னங்கால்களும் பறப் பதற்கு பயனுள்ள (Pectoral muscles) தசைகளும் தேவ்வடைந்து விடுகின்றன.

பெஞ்சுவின் பறவைகளில் நீரில் மூழ்கி நீந்துவதைச் செயல்படு வதை அறிய அவற்றின் உடலமைப்பையும் கவனிக்கவேண்டும். சாதாரணமாகப் பறவைகளின் உடல் மிகவும் இயைக்கொண்டதாக வுள்ளன. ஆகையால் பெஞ்சுவின் பறவை தங்கள் அதிகப்படியான சக்தியை உபயோகித்துத்தான் நீரில் மூழ்கி நீந்தவேண்டும். இப்பற வைகளின் காற்றப்பைகளும் வெற்றிடம் பொருத்திய எலும்புகளும் மிகவும் ஒடுக்கப்பட்டுள்ளன, பின்னும் இப்பறவைகள் இறகுகளுக் கடியில் உள்ள காற்றை நீரில் மூழ்கும்பொழுது மிகுந்த பிரயாசை யுடன் வெளியே தள்ளிவிடுகின்றபடியால் உடல் கனமில்லாவிடினும் நீருக்குள் மூழ்கி நீந்த முடிகின்றது. நீரில் மூழ்கும் பறவைகளின் தசைகளில் மயோக்ளோபின் (Myoglobin) என்ற ஒரு திறத்துகனிசுப் பதால் அவை கரும் சிவப்பு நிறமாக உள்ளன. இப்பறவைகள் நீரில் மூழ்கி நீந்துபொழுது மேற்கூறிய திறத்துகள்களில் சேகரித்து வைக் கப்பட்டுள்ள பிராண வாயுவை உபயோகப்படுத்தி அதிக நேரம் நீருக்குள் மூழ்கி நீந்த ஏதுவாக அமைந்துள்ளது. மாசுபு முன்னேனும் புகள் நீரில் மூழ்கி நீந்தும் பறவைகளில் ஹைரீரின் வயிற்றுப்புறம் குறுக்கான விவாவெலும்பு விளிம்பின் வயிற்றுப்புறமாக அமைத் துள்ள நீட்சிகள் பொருத்தும்படி அமைந்துள்ளன. அங்ஙனம் மாசுபு முன்னேனும்பு குறுக்காவமைத்துள்ள விவாவெலும்பு நீட்சிகள் வயிற்றுப் புறத்தைத் தொடும்படி அமைந்துள்ளதால் அவைகளே ஒரு புறச்சட்டமாக அமைத்து உள்நுழைப்புகளுக்கு பாதுகாப்பை

அங்கீகரிக்கிறது. அங்ஙனமே மிகுதுவான இறகுகளும் காற்றையோ தன்னையோ இறகுகளின் அடியில் இருத்து வெளியே தள்ளுவதற்கு ஏதுவாக அமைந்துள்ள தன்மை இந்த நீரில் மூழ்கி நீங்கும் பறவைகளுக்கு ஏற்றவாறு அமைந்திருப்பது போற்றிற்குரியதாகும்.

உணவு உண்ணும் முறைக்கேற்ற தகவமைப்புகள்

பறவைகள் உணவு உட்கொள்ளும் முறையை ஒப்பிட்டு நோக்குங்கால் இந்தப் பண்பைத் தவிர வேறு எந்த பண்புகளாலும் அவைகள் இத்தனைப் பிரிவுகளாக பிரிக்கமுடியாது என்பது தெள்ளத் தெளிவாகத் தெரிகலாம். முதல் முதலாகத் தோன்றிய பறவைகள் பூச்சிகளையும் சிறிய பிராணிகளையும் உண்டு வசித்திருந்தாலும் தற்போது வசிக்கும் பறவைவினங்கள் தாவர, விவங்கு இனங்களின் உண்ணும் பழக்கங்களுக்கு ஏற்றவாறான தகவமைப்புகளைக் கொண்டுள்ளன. மற்றும் சில பறவைகள் முதிர்ச்சியுற்ற பருவத்திலும் தாவர உணவையே உண்டு வசித்திருந்தாலும் அவைகள் அவற்றின் குஞ்சுகள் வளர்வதற்கு புறதச்சத்து அதிகமாக வேண்டியிருப்பதால் குஞ்சுகளுக்கு தேவைக்கேற்றவாறு புழுப்பூச்சிகள் உணவாகத் தேடிக்கொடுக்கின்றன.


பறவைகளின் முன்னங்கால்கள் பறப்பதற்குத் தேவையான இரக்கங்களாக மாற்றப்பட்டு விட்டபடியால் அவைகளின் அவசரங்களும், மற்றும் ஓரொரு சமயங்களில் பின்னங்கால்களும் உணவு தேடி எடுத்துண்ணுவதற்கான தகவமைப்புகளைப் பெற்றிருக்கின்றன. ஆகையால் அவைகளும் பின்னங்கால்களையும் உணவுதேடி எடுத்த துண்ணுவதற்கு ஏற்றவாறு அமைந்துள்ளன.

புலனெண்ணிப் பறவைகள்

உயிருள்ள பிராணிகளை இரைவாகத்தேடி உண்ணும் பறவைகளில் முக்கியமானவை பருத்தும் ஆந்தைமுகமாகும். இப்பறவைகள் இரண்டிற்கும் இரையை இறுகப்பற்றிப் பிடித்துத் தூக்கிச் செல்வதற்கெற்பு கால்களில் நீளமான கூரிய கக்கங்களும் (Talon) இரையை மீறு மீறு துண்டுகளாகக் கிழித்துத் தின்பதற்கெற்ற விரைந்த கூரிய அவசரங்களும் தகவமைப்புகளாக உள்ளன. ஆந்தைகளும், பருத்திகளும் இங்ஙனான தகவமைப்புகளுடன் பலவாறான பழக்கங்களுடன் பரவி வகிக்கின்றன. அநிவேகமாக பறக்கும் நிறுள்ள வய்றாறு அங்ஙனம் இராசாளிகள் (Falcons) தாங்கள் பிடிக்க விரும்பும் பறந்து கொண்டிருக்கும் இரையின் மீது பின்னிலே விட விரைவாகப் பாய்ந்து தாக்கி தங்கள் தேடுக்கமாக அமைந்துள்ள பாதங்களிலும் பற்றி

எடுத்துச் சென்று விடுகின்றன. அவ்வாறு அவைகள் பறக்கும் இரையின் மீது பாய்ந்து பறிநிப் பிடித்துத் தூக்கிச் செல்ல, அவற்றின் உடலின் மார்புப் பகுதியிலுள்ள முள்ளெலும்பு 5 அல்லது 6 மார்பு முள்ளெலும்புகள் இணைந்து அமைந்து, பறவைக்கு தன் இரையை பாய்ந்து அடித்து எடுத்துச் செல்ல சக்தியை அளிக்கின்றது. குறும் பருந்து வகை (Kestrels) பறவைகள் (இதில் அமெரிக்கப் பருந்து வகையும் அடங்கும்) ஒரு உயரமான இடத்தில் குத்தி அமர்ந்த வாறே (Perch) அங்கு இறக்கைகளை விரித்துக்கொண்டு அந் உயரத்தில் பறந்து மிதத்தவாறே தரையில் தனக்கு இரையாகக் கிடைக்கக்கூடிய பிராணிகளை எதிர்பார்த்துக் கொண்டேயிருந்து, இரை கண்ணுக்குத் தெரிந்தவுடன் அதி விரைவாக அதன்மேல் பாய்ந்து வேட்டையாடி எடுத்துச் செல்லும் நிறனுள்ளவைகளாகும். மற்றுமொரு பருந்து (Bozard) வகையான பூட்டியோ (Buteo) என்னும் பறவையும் அவற்றின் பொது இனங்களும் ஊன வெளியில் மிக உயரமான இடங்களில் பறந்து கொண்டேயிருந்து தரையில் வேகமிக்மாமல் இடப்பெயர்ச்சி செய்யும் தன் இரைமேல் பாய்ந்து பறி எடுத்துச் செல்லுகின்றன. சிறு பறவைகளைத் தூக்கி அழிக்கும் வேட்டை பருந்து வகைகள் (Harriers) தாழ்வாகப் பறந்து தன் இரைகளான சிறு பறவைகளை வேட்டையாடி உண்ணுகின்றன. ஜெராஸ்பைசா (Geranospiza) என்ற பருந்து வகைப் பறவையும், ஜிம்ஜீனில் (Gymnogenys) என்ற ஆப்பிரிக்க பொது இனப் பருந்து வகை பறவையும் மரம் அல்லது மலைப் பொந்துகள் பூமிக்கடியிலுள்ள பள்ளங்கள், பறவைகளின் கூடுகள் முதலியவற்றில் தேடி அங்கு கிடைக்கும் உணவை உண்ணுகின்றன. இப்பறவை தனக்கு நீண்ட காங்களும் சிறிய பாதங்களும் உள்ளன. மற்றும் டார்ச்சி எழும்பிற்கு இடையில் பொருத்தப்பட்டுள்ள மூட்டின் உதவியிலும் இப்பறவைகள் தங்கள் காக்களை முன்புறமும் பின்புறமும் ஒரே மாநிலியாக வளைக்கும் தன்மைவுள்ளவைகளாகும். இவ்வாறான அமைப்புகளினால் இப்பருந்து வகைகள் தங்கள் இரையை குறைபாடி (Forage) உண்ணுகின்றன. செஜிட்டெரியஸ் (Sagittarius) என்னும் ஆப்பிரிக்காவில் வாழும் கொக்கைப் போன்ற பறவைகள் ஊர்வன, சிறிய பாதுகாட்டிகள் போன்ற பிராணிகளை அடித்து மிதித்துக் கொண்டு இரையாக்கி உண்ணுகின்றன. வேட்டை பருந்து வகையான ஆகிபிடீஸ் (Accipiter) போன்ற அவற்றின் பொது இனப்பறவைகள் சிறு குன்று மேடு அல்லது புதர் வேலி வகை முதலியவற்றில் மறைந்திருந்து, இரையின் மேல் அநிகிரை வாகப்பாய்ந்து கொண்டு, விபக்கத்தக்க முறையில் தொடிக்குள் பாய்ந்து இரையைத் தூக்கிச் சென்று உண்ணுகின்றன. பின்னும் சில சமயங்களில் இப்பறவைகள் புதர்க்காடுகளில் இரையின்

பின்னும் கால்களிலும் நடத்து பின்பற்றி பின்பு அடித்து இரையாக உண்ணுகின்றன. இதே முறை மிக்ரேஸ்டர் (Microstus) என்ற இராசாளி வகைப் பறவையினும் நடைபெறுகின்றது.



படம் 59. (அ) கன்னுண்ணும் பறவைகளில் இரையைக் கிழித்து உண்ணுகிறதேற்ற தகவலையுட்க கொண்ட அய்குகள்

1. கழுகு (Eagle), 2. பிணத்தின்னிக் கழுகு (Vulture), 3. பருத்து (Hawk), 4. பால்கன் (Falcon), 5. ஆத்தை (Owl).

பெரிய குரங்கு வகைகளை இரையாக உண்ணும் பிளிகிப்பைன் தாட்டு பித்தெக்கோப்பைன் (Pithecopphaga) ஆப்பிரிக்க தாட்டு ஸ்டெபானோபெட்டஸ் (Stephano aetus) அமெரிக் தாட்டு மார்கிப்பைன் (Marphnus) போன்ற கழுகு வகைகளும், ஆசிய ஆப்பிரிக்க தாட்டு மெக்னேரெம்பஸ் (Machaeerhamphus) போன்ற வெணவால் தின்னும் கழுகு வகைகளும், குளவி தேவீ போன்றவற்றை இரையாக உண்ணும் பெர்னீஸ் (Pernis) போன்ற பருத்து வகைகளும், நத்தை தின்னும் பருத்து வகைகளும், உயிருள்ள பிராணிகளை அடித்துத் தின்னுதற்கெற்ப தகவலையுட்களைக் கொண்டிருக்கின்றன பறவை பிளப்பிரிவாகக் கருதலாம்.

நத்தைகளை உணவாக உண்ணும் ராஸ்ட்ரேமஸ் (Rostrhamus) மேற்குறிய பறவையினங்களில் மிகவும் பெயர் பெற்றது. இப் பறவை, வடிகில் பெரிய ஒரு நத்தைகளை மரக்கிளைக்கு எடுத்துச் செய்யும் கூட்டினில்தும் வெளிவரும்வரை அந்த நத்தைகளை வைத்துப் பார்த்துக் கொண்டேயிருக்குமாம். பின்பு நத்தைக் கூட்டை

கீட்டு வெளிவந்தவுடன் தன்னுடைய அலறலுக்கும் ஒத்தி அறைபுமாம். அங்ளாறு அறைந்தவுடன் தந்தை தன் சுயநினைவை இழந்து விடுமாம். இருப்பினும் அது கூட்டிற்குள்ளேயே இருக்கும். பின்பு பறவையானது சேதம் அடையாத தந்தையின் ஒட்டை அடைத்து அதற்குள்விருக்கும் தந்தையை அப்படியே விழும்பி விடுகின்றதாம். இங்ளாறு இப்பறவைகள் விந்தையாகவும் கொடுரமாகவும் தங்கள் இரையைத் தேடி உண்ணுகின்றன.

இங்ளாறு உயிருள்ள பிராணிகளை உட்கொள்ளும் பறவைகளில் ஆண் இனத்தை விட பெண் இனமே அளவில் பெரியதாகவுள்ளன. வட அமெரிக்காவில் வசிக்கும் வேட்டைப் பருந்து வகைகளில், தெருக்கி மரமேறும்படி காக்கையுடைய சிறிய பருந்து வகைகளில் குறுஞ்சிறகுடைய பெரிய வந்துறு வகைகளைக்காட்டிலும் பால் வழி இரு தோற்றம் (Sexual dimorphism) சிறப்பாக அமைந்துள்ளன. பால் வேற்றுமை சிறப்பாக அமைந்துள்ள இந்த சிறிய பருந்து வகைப் பறவைகள் தங்களுக்குள்ள பெரிய வடிவுள்ள இரையைத் தேடிக்கொள்ள பால் வேற்றுமை பயன்படுகின்றது. இங்ளாறு இரை மிடைக்கின்றபடியால் இப்பறவைகள் குறையாடி இரைதேட வேண்டுகின்ற அவசியமில்லை.

உயிருள்ள பிராணிகளை இரையாகப் பிடித்துத் தின்னும் பறவைகளுக்குக் கண்பார்வை மிகவும் கூர்மையாக அமைந்துள்ளது. ஆந்தைகளில் கேட்கும் திறனும் திறமையாக அமைந்து அந்த சிறப்புப்பொருத்திய கேட்கும் திறனுளையே அப்பறவைகள் இரையைத்தேடி உண்ணுகின்றன. ஆந்தைகள், பருந்து வகைகளைப் போன்று அவ்வளவு பிரிவுகளாகக் காணப்படாவிடினும் சில மீனைப் பிரிவு வகைகளும் இவற்றில் உண்டு. சுமார் 5½ அங்குல உயரமுள்ள சாதாரண ஆந்தைவகையிலிருந்து சுமார் 28 அங்குல உயரமுள்ள பெரிய வந்துறு போன்ற ஆந்தை வகை வரை ஒரு சில பிரிவுகளே உள்ளன. சாதாரணமாக ஆந்தைகளுக்கு இரவில்தான் கண்பார்வை தள்ளுத்தெரியும். ஆனால் உயரமான (Latitude) இடங்களில் வாலும் ஆந்தைகளுக்கு பசுவில் கண்பார்வை மங்கலாகவோ அல்லது மிகவும் தள்ளுக்கவோ தெரியும். பெருங்கடல் பறவை வகைப்பருந்துகள் பாதுட்டிகளையும் பறவைகளையும் இனப்பெருக்கக் காலங்களில் இரையாக உண்ணுகின்றன. தோலிழைமங்களுடன் கூடிய பாதங்களிலுள்ள தகங்களால் இரையைப்பறிதிப் பிடிப்பதோடல்லாமல், கூர்மையான அலகுகளாலும் இரையைப்பிடித்துக் கொண்டு தின்னுகின்றன.

மீனை அல்லது கொம்பைப் பற்றிக்கொண்டு அமருமாறு காக்கை வுடைய பறவைகளில் கொல்பறவை (Shrikes) வகைகளே அநிமமாக

பரிவி வலிக்கின்றன. இந்த கொல் பறவை வகைகளிலும் பெருந்தலைகளைவுடைய கொல் பறவைகளே (Logger head) தங்கள் இரைவைக் கொண்டு தூக்கிச் சென்று விரைந்த பல்ம் பொருத்திய அனகுகளிலும் குத்தித் திண்ணுகின்றன. இப்பறவைகள் நிறியதாகவுள்ள இரையை கிடைத்த இடத்திலேயே உண்டு விடுகின்றன. ஆனால் உருவில் பெரியதாக உள்ளவைகளை அனகிலும் தூக்கிக் கொண்டு தவித்த இடத்திற்குச் சென்று கூர்மையான ஒரு பொருளின் மீது குத்திச் செருகி வைத்து விடுகின்றது. பின்பு அனகிலும் இரையை நிறுநறு துண்டுகளாகி உண்ணுகின்றது. இவை களுக்கே குட்டையான உருண்டை வடிவான இறக்கைகளும் நீண்ட வாலும் உண்டு.


இயோசின் காலப்பிரிவில் வட அமெரிக்காவில் வாழ்ந்த பறக்கும் சக்தியற்ற டயட்ரிம்ஸ் (Diastyrmas) பறவைகளே மிகவும் பெரியதும் சக்தி வாய்ந்தது மான் கமார் ஏழு அடி நீளமுடைய மாயிசு பட்சணி பறவைகளாகும். ஆனிகோசின் காலப்பிரிவிலும் தென் அமெரிக்காவில் வாழ்ந்த கிபோரோ ரெக்காய்டு பறவைகள் மூன்று அடியதை விட சற்று அளவில் நிறிய பறவைகளாகும். பிரானிக்ஸ் அடித்து இரையாக உண்ணும் பாதுகாட்டிகள் அந்தக் காலப்பிரிவில் இயங்காததால் இப்பறவைகள் நிறப்பாக வாழ்ந்திருந்தன. பின்பு மாயிசு பட்சணி வகை சார்ந்த பாதுகாட்டிகள் தோன்றிய பிறகு இவை அதிக நாட்கள் உயிர் பிழைத்திருக்கவில்லை.

அழகும் பிணம்பிண்ணும் பறவைகள்

கழுகு போன்ற பகலில் மட்டும் இரைதேடி உண்ணும் பறவை வகைகள் புது உலகக் கழுகு வகைகளாகிய கேத்தார்ட்டிடே (Cathartidae) குடும்பத்தைச் சேர்த்தவைகளும், பழைய உலகக் கழுகு வகைகளாகிய ஏகிப்பிட்சிடே (Accipitridae) குடும்பத்தைச் சேர்த்தவைகளும், வயலாறு அல்லது இராசானி போன்ற கிபாக்கானிடே (Falconidae) குடும்பத்தைச் சேர்த்தவைகளும் ஆகும். அவைமேல் இயோசின் காலத்தில் கிபோமிக்ஸ் (Wyoming) இடத்திலிருந்த பழுவைகளிலிருந்து கிடைத்த நீண்டகால்களைவுடைய நியோ கேத்தார்ட்டிம்ஸ் (Neocathartes) என்ற பறவையானது புது உலக கழுகுகளைப் போன்றிருந்தது.

கிபிஷர் (Fisher) என்பவர் காத்தார்ட்டிடே (Cathartid) கழுகு வகைகளில் அவைகளின் அவரு மண்டையோடு மூதலியவற்றின் அளவு மூதலியவற்றை பழைய உலக கழுகு வகைகளுடன் ஒப்பிட்டு அவைகளின் உளவு உட்கொள்ளும் பல்வேறு மூறைகளை விவரித்த.

துள்ளாசி, ரேவன் (Raven) கல் (Gull) பருத்து வகை (flawk) பெட்டர்ல் (Petrel) மற்றும் இவை போன்ற பறவைகளே அழகுபெய் பிணங்களைத் தின்று உயிர் வாழ்கின்றன. அவை அழகுபெய் பிணங்களைத் தின்று உயிர் வாழ்ந்திருந்தாலும் அவற்றின் உடவமைப்பு



அ

படம் 59. (அ) உளவை வெட்டி உண்ணுதற்கான தகவமைப்பிற்குக் கொண்ட அழகுபெய்தைய பறவைகள்

1. கரட்டுக் காகம்; 2. ரேவன், 3. காகம்.

அதாவது அழகு பிண்ணங்கால்களின் தகவமைப்புகள் அதற்கு மட்டுமே பயன்படும்படி அமைவனவாக, இவை தங்கள் பெரும்பாலான நேரத்தை இரை கிடைக்கின்றதா என்று பார்த்துக் கொண்டே விருப்பதால் அவ்வளவாக பறந்து திரிவதில்லை. ஆகையால் அவற்றிற்கு அதிக சக்தியும் வேண்டியிருக்கவில்லைபாதலால் அதுவே அவற்றிற்கு உணவு உட்கொள்ளாவிடினும் பாதிக்கப்படாமல் இருக்க


ஏற்றதாகவுள்ளது. இப்பறவைகள் வின்வெளியில் அழகாக விதந்து திசையமாக பறந்து வட்டமிட்டவாறு இருப்பதற்கு ஏற்றவாறான தகவமைப்புக்களைக் கொண்டுள்ளன. இருப்பினும் இப்பறவைகளில் அதிக கனமில்லாத உடலினைக் கொண்ட வான்கோழி, கழுஞ் வகைகள் அதிகாலையிலேயே வட்டமிட்டு பறக்கத்தொடங்குவதிலிருந்து விலகின. அவற்றிலேயே உடல் பளுவுள்ள கருப்புக் கழுஞ்சுள், வின் வெளி வெப்பநிலைக்கேற்றவாறு காத்திருந்து வட்டமிட்டு பறக்கத் தொடங்குவின்றன. சுற்றுப்புற வெப்பநிலை, காற்றின் ஈரம் முதலிய வற்றை அறிந்து பின்பு பறக்கத் தொடங்கினாலும் உடல்பளுவுள்ள கருப்புக்கழுஞ் வகைகளே வின்வெளியில் அதிகநேரம் பறக்கின்றன என்பதைக் கண்டறிந்துள்ளனர்.

மீன்களை உணவாக உள்ளனும் பறவைகள்

பலவிதமான பறவைகள், பல வழிகளில் மீன்களைப் பிடித்து இரைவாக உண்ணுவின்றன. கிரிட்டோடையிட் காலத்திலும் வாழ்ந்த ஹெஸ்பெரோனித்கேஸ் (Hesperornithes) பறவைகளுக்கு வாயில் பற்கள் இருந்தன. மற்றும் மறைந்துவிட்ட ஓடாண்டோனித்கேஸ் (Ornithornithes) பறவைகளில் எலும்பினுள்ள கொம்பு போன்ற செட்டியான பொருளால் பம்போன்று தீட்டப்பெற்ற சிக்கலான பகுதிகளைக் காணலாம். மெரிகேன்சேர் (Mercurer) என்ற மீனும்எனும் நீர்மூழ்கி வாத்துப் பறவைகளையும், காத்துகளையும், குள்ளவாத்துகளையும் (Duck, goose) உள்ளது போன்று கொம்பு போன்ற செட்டியான பொருளாலான அங்குகள் உள்ளன. மீனை இரைவாக உண்ணும் பறவைகளின் அங்குகளின் ஓரத்தில் சொர சொரப்பான கத்தரிபோன்ற விலிப்புடன் கூடிய அங்குகள் உள்ளன. கடற்கரையில் வாழும் எளிதாக பிடிபடும் கடற்பறவைகளே மீனும்எனும் பறவை வகைகளாகும். மீனும்எனும் பறவைகளில் தள்ளுக் கைந்த பேலட் (Palate) என்னும் நாக்கும் உள்ளன, அவை பின்புறத்திலும் அமைந்துள்ளன, அவ்வாறு அச்சு என்னும் நாக்கும் தள்ளுக் கைத்து பின்புறத்திலும் அமைந்திருப்பதால் இப்பறவைகள் இரைவையப்பற்றிப் பிடிக்கவும், பிடிக்கப்பட்ட மீனை உணவுக்குழாயினும் (Oesophagus) தள்ளவும் இவை பயன்படுகின்றன. பெயிக்கன் பறவைகளில் நீண்ட கழுத்துப்பைகள் உள்ளன. அதே போன்ற சற்று அளவில் நிறியதான கழுத்துப் பைகளை, பெருத்தினி தின்று வின்ற வாத்தின் காலடியுடைய கார்மோராண்ட் (Cormorants) கடற்பறவைகளிலும் காணலாம். மீன்மீகாத்தித் தின்று கழுஞ் போன்ற பெரிய கடற்பறவை (Osprey) களான பேண்டியான் (Pandion) பறவைகள் தங்கள் பாதங்களை முதலில் தண்ணீரில்குள் ஒழுகும்படி அழுக்கி, பின்பு தக்கனாடைய கூர் தகங்களால் மீன்களைப்

பிடிக்கின்றன. மற்ழும் இப்பறவைகளின் கால்களில் செதில்களிலுள்ள சிறிய சிறிய முட்கள் போன்ற பகுதிகள் வழுவுழுப்பான இரையாகிய மீன்களை நழுவிச் செல்வாதவாறு பிடித்துக் கொள்கின்றன. ஆசியாவிலுள்ள கேடும்பா ஜெய்லோனென்ஸில் (Kemp's Jaylons) என்ற ஆத்தைகள் முதன் முதலில் மீன்களையே உண்டு உயிர் வாழ்ந்திருந்தன. இப்பறவைகளில் டார்சன் எலும்புகளில் இறகுகள் கிடையாது. இதனாலேயே இவை தங்கள் இனஉறவு தொடர்பு கொண்ட கொம்புடைய கழுது போன்ற ஆத்தைகளினின்றும் மாறுபட்டு காணப்படுகின்றன.

மீன்கொத்தி, கழுது போன்ற கடற்பறவைகளான பேண்டியான் பறவைகளைப் போன்றே மீனாண்ழும் ஆத்தைகளில் அவற்றில் கால்களின் பாதங்களிலுள்ள செதில்களில் முட்கள் போன்ற பகுதிகள்



படம் 80. மீன்களை கொத்தி எடுத்து உண்ணுதற்கான தகவமைப்பிற்கு கொண்ட அலகுகளையுடைய பறவைகள்

1. பாம்புதாரா (India's darter), 2. ஆசியின் கொத்தி,
3. கார்டோராஸ்ட்.

உள்ளன. அநேகமாக மீனை இரையாக உண்ணும் பறவைகளின் எண்ணிக்கை மிகவும் குறைந்ததேயாகும். மீனை இரையாக உண்ணும் பறவைகள் தங்கள் கால்களை நீரில் அழுத்தி, இருக்கிபோன்ற அலகுகளினால் மீனைப்பிடித்துத் திண்ணுகின்றன. மிக எளிதாக பிடிக்கக்கூடிய கடற்பறவைகள் முதலான மீதவெப்ப நாடுகளில் வாழும் பறவைகள், மீன்கொத்திப் பறவைகள் முதலிய பறவைகள் மேற்கூறியவாறே கால்களை தன்னிக்குள் மூழ்கி அழுத்தியவாறு நின்று கொண்டு இருக்கிபோன்ற அலகுகளினால் மீனைப் பிடித்துத் திண்ணுகின்றன. இவ்வாறு இருக்கி போன்ற அலகுகளினால் மீனைப் பிடித்து உண்ணுகின்றன என்று கூறிகுழும் அவை எவ்வாறு அலகுகளின் உதவியால்

மீனைப் பிடிக்கின்றன என்பதைப்பற்றி அய்வாறு தெளிவாகத் தெரியவில்லை. நாரைகள் (Heron) தங்கள் தலைகளை வேகமாக அசைப்பதனாலும் அவசூனிலும் பற்றிப் பிடிப்பதனாலும் மீன்களை பிடித்து உண்ணுகின்றன. இப்பறவைகளின் கழுத்துப் பகுதி அசையும் விசைவில் போன்ற (Trigger) வேகமாக சுழல்கிறது. அதனால் அவை வேகமாக தலையை அசைத்து அவசூனில் மீன்களைப் பிடித்து உண்ணுவதற்கு ஏற்றவாறு அமைந்துள்ளன. ஆப்பிரிக்க கருப்பு நாரைவகைகளான மெலனோபோயிக்சு (Melano phox) பறவைகள் மீன்களை இரையாகத் தேடி உண்ணும்பொழுது, தங்கள் கருத்த இறக்கைகளையும் பறக்க உதவும் இறகுகளையும் தண்ணீருக்கடியில் இருக்குமாறு வைத்து கூடாரம் போன்று விசித்து வைத்துக்கொள்கின்றது. இவ்வாறு இறக்கைகளை கூடாரம் போன்று விசித்து வைப்பதால், வெளிச்சத்தைவிட்டு இருட்டான இடம்பதேடி மீன்கள் வரத்தூண்டப் படுகின்றன. பின்னும் இப்பறவைகள் இறக்கைகளுக்கடியில் மீன்களை எளிதாகக் களையும், பிடித்து உண்ணவும் ஏதுவாகவுள்ளது. மஞ்சள் நிறக் காக்களைவுடைய மணற்புறப் பறவை வகைகள் (Tattlers) இருக்கி போன்ற தங்கள் அவசூனிலுமேயே மீன்களைப் பிடித்துத் தின்றுகின்றன. மற்றும் கரண்டிபோன்ற அவசூளைவுடைய பறவைகள் (Spoon bill) தங்கள் அகலமான அவசூளைவுடைய வாயை ஆழமான நீருக்கடியிலோ, மிகுதுவான செற்றிற்குள்ளோ துழைத்து, பக்கவாட்டில் நிறத்தவாறு நீந்தி வருகின்றன. அவ்வாறு நீந்த வரும்பொழுது மீன்கள் கூனிகூக்கள் (Shrimp) மெல்லுடலிகள் (Venus) மற்றும் பிற முதுகெலும்பற்ற பிராணிகள் (Invertebrates) போன்ற பல இவற்றிற்கு இரையாகக் கிடைக்கின்றன.

ரின்சோப்ஸ் (Rhynchops) என்னும் ஸ்கிம்மர் (Skimmer) பறவைகள் நீருக்கடியில் தங்கள் நீண்ட கத்திபோன்ற அவசூளை விசைத்து மூன்றும் பின்னும் அகித்துவரும். அவ்வாறு நிசித்து வரும் பொழுது மீன்கள் தட்டுப்படுமாயின் வரவை மூடி அவசூளுக்கு கடைவில் மீனைப்பிடித்து உள்சே செலுத்தி விடுகி விடுகின்றன.

பூச்சிகள் மற்றும் சிறிய முதுகெலும்பற்ற பிராணிகளை உணவாக உண்ணும் பறவைகள்

இவை அவ்வது கொம்பு முதலியவற்றைப் பற்றிப் பிடித்துக் கொண்டு அமர்வதற்கான காக்களைவுடைய (Passerine) பறவை வகைகளில் முதன் முதலில் தோன்றியவைகள் புழுபூச்சிகளையே உணவாகவுண்டு வந்திருந்தன என்பதற்கு ஆதாரமாக பாடும் பறவைகளைக்கூடப் போன்று (Warblers) அவைகளுக்கு குட்டையான மெலித்த அவசூகள் இருந்தன. அத்தகைய பறவை வகைகள்

தற்பொழுதும் பலவிதமாக பரவி ஏராளமாக வளிக்கின்றன. வட அமெரிக்காவில் பாடும் இது பறவை வகைகள் சிவ்-டோதோரஸ் (Cistothorus) தாண்டி புதர், கோரைப்புல் வளர்த்துள்ள புதர்கள் முதலிய இடங்களில் வளிக்கின்றன. பறவை உடம்பு பிரதேசத்தில் ஆக்ரோசெய்ஸஸ் போன்ற தாண்டிபுதர் பாடும் பறவைகள் (Red warbler) வளர்கிறது. அதே போன்ற இடங்களில் தென் அமெரிக்காவில் கிளைகளைப்பற்றி அமரக்கடிய ஈடரன்ட் பறவைகள் (Tyrant)-டெச்சூரிஸ் (Tachuris) பறவைகள் முதலியன வாழ்க்கிறார்கள்.

காடுகள் மண்டியுள்ள எந்த இடத்திலேயும் பூச்சிகளைப் பிடித்துள்ளும் பல விதமான பறவைவினங்களைக் காணலாம். சில பறவை வினங்கள் இவ்வகையிலுள்ள பூச்சிகளையும், சில கிளை கொம்பு முதலான இடங்களிலுள்ள பூச்சிகளையும், சில கிளையின் உச்சியிலுள்ள பூச்சி வகைகளையும், சில மரத்தின் அடிப்பாகம் மற்றும் மேல் தரைகளிலுள்ள பூச்சி வகைகளையும் தின்று வளிக்கின்றன. இது போன்ற பூச்சிகளைத் தின்று உயிர் வாழும் பறவைகளில் சிலவற்றிற்கு சிறிய அளவுகளும், மற்றும் சிலவற்றிற்கு தடித்த ஆனம் நுனி வளைந்த அளவுகளும் உள்ளன. சில பறவைகள் மரங்களிலிருந்து பறந்து ஆகாயத்தில் பறந்து திரியும் பூச்சிகளைப் பிடித்துத் தின்று உயிர் வாழ்கின்றன. சக்களைப் பிடித்துத் தின்று பறவைகளின் அகலமான அளவு நுண்ணிய இனங்களாக குழப்பட்டு சக்களைப்பிடித்து உண்பதற்கேற்ற தகவமைப்புகளைக் கொண்டதாகவுள்ளது. இது போன்ற தகவமைப்புகள் தனித்தே தோன்றியிருக்க வேண்டுமென்று கருதப்படுகின்றது.

கிளை கொம்பு முதலியவற்றைப் பற்றி உட்காருப்படி அமைந்துள்ள காய்களைமுடைய பறவைகளானத (Non-Passerine) பறவைகளில் ஸ்விப் பறவை வகைகள் (Swift) மற்ற இனப்பறவைகளாகிய ஸ்வாலோ (Swallow) முதலியவற்றைக் காட்டிலும் பண்பில் மேம்பட்டு காண்கின்றன, ஸ்விப் பறவைகளுக்கு பறக்கும் திறன் அதிகமாகவுள்ளது. மற்றும் இரவில் ஒருவித செய்வற்ற பருவத்துறையில் (Torpid) கொண்டவதாக அதிக சக்தியையும் இப்பறவைகள் இழப்பதில்லை. இரவு நேரங்களில் பறந்து செல்லும் பறவை வகைகளும் (Night jays) அவற்றின் இனங்களுமாயிசு கேப்ரிமுல்யிபுஸ்சில் (Caprimulgus)வரிசை சேர்ந்த பறவைகள் விண்வெளியில் பறந்து திரிந்து பூச்சிகளை பிடித்து இரைவாக உண்ணுகின்றன. பூச்சிகளைப் பிடித்து இரைவாக வுண்ணும் பறவைகளுக்கு இரண்டு விதமான அவசியம் உள்ளன. முதல் வகை குட்டையான பசுமற்ற அமகு வகை, இரண்டாவது வகை நீண்ட தடித்த அமகு வகையாகும். முதல் வகை அமகுளை ஸ்வாலோ (Swallow) ஸ்விப்

(Swift) இரவில் வேகமாகப் பறந்து திரியும் பறவை (Night jays) பூட்டுல் (potoos) முதலியவற்றில் முதல் வகையைச் சேர்ந்த குட்டையான பனமற்ற அன்குகள் உள்ளன. ஆப்பிரிக்காவில் வசிக்கும் சூடோக்கெலிடாஸ் (Pseudochelidan) ஆப்ட்டாமியா (Artamia) என்ற மரக்விலோலோ (Wood swallow) பறவைகளுக்கும், தலசைலார் (Frogmouth) பறவைகளுக்கும் இரண்டாவது வகை அன்குகளின் நீண்ட தடித்த அலகுகள் உள்ளன. பூச்சிகள் வேகமாகப் பறந்து திரியும் பொழுதே இப்பறவைகள் பூச்சிகளைப் பிடித்துத் தின்றுகொள்ள. அங்ஙனம் வேகமாக பறக்கும் பூச்சிகள், பறவையின் வாயினால் நுழையும் பொழுது அந்த அதிர்ச்சியினால் பறவை பாதிக்கப்படாமல் தாங்கிக் கொள்வதற்காகவே மேலே குறிப்பிட்ட பறவைகளுக்கு வாய் அகலமாக அமைந்துள்ளது. வாய் அகலமாக உள்ளதால் அது வாயின் கூரைக்கு போதிய ஆதாரம் அளித்து, வேகமாக பறந்து உள்ளே நுழையும் பூச்சிகளினால் ஏற்படும் அதிர்ச்சிக்கு ஆதாரம் அளிக்கின்றது. வாயின் கூரை இங்ஙனம் ஆதாரம் அளிப்பதற்கு வாயில் அமைந்துள்ள அண்ண எலும்பே (Palata) காரணமாகும்.

மரங்களின் அடிமரம் கிடீர முதலியவற்றில் நுழைத்து அகலது ஏறி பூச்சிகளைப் பிடித்து உண்ணும் பறவையினங்கள் அவை வகிக்கும்



படம் 61.

பூச்சிகளை இரையாகவுண்ணுதல் காரண தகவமைப்பிற்குக் கொண்ட அன்குகளையுடைய பறவைகள்



1. ராபின் (Robin), 2. தூக்கனல் குருவி (Swift), 3. வார்ப்லர் (Warbler), 4. அரசப் பறவை (King bird), 5. ஆடு உறிஞ்சி (Goat sulker), 6. பக்கி குருவி (Nightjar), 7. உப்பு (Hoopoe), 8. மரக்கொத்தி (Wood pecker.)


இடம் உணவு உட்கொள்ளும் முறை முதலியவற்றிற்கு ஏற்ப பறவைகளாகப் பிரிந்துள்ளன. மரங்களில் வாழும் மர ஏறிப்பறவைகளான (Tree creeper) செர்தியா (Certhia) பறவைகள் அவைகளின் மேற்புறமாக வளைந்த துளியையுடைய மெல்லிய அலகுகளால் மரப் பொத்துகளை துளைத்துக் கிணறி அங்குள்ள பூச்சிகளை உண்ணுகின்றன. மற்றும் தடித்த கெட்டியான அலகுகளையுடைய ஹீவர் பறவைகளான (Heaver) டென்ட்ரோகோலேபாடஸ் (Dendro colaptas) போன்ற பறவைகள் மரத்தின் அடிப்பாகமாகிய மட்டைகளை உரித்து உரித்துத்தான் பூச்சிகளைத் தேடி உண்ணுகின்றன. கிளியோரின்க்கஸ் (Glyphor hynchus) போன்ற மரங்கொத்திப் பறவைகள் தங்கள் உணவான புற பூச்சிகளை மரப் பொத்துகளில் தேடும் பொழுது, மரத்தைத் துளைத்துப் பொடிப் பொடியாக்குகின்றன. மரங்கொத்திப் பறவைகளிலும் பவவானான முறைகள் உள்ளன. அரினான் போன்ற வடிவுடைய அலகும் நீண்ட எலிதாக துழையக் கூடிய முட்டைகூடக் கூடிய நாக்கும், கெட்டியான மண்டையோடும் இப்பறவைகளுக்கு அடிப்படையான சிறப்பு அம்சங்களாக அமைந்துள்ளன. இப்பறவைகள் மரங்களைத் துளைத்துப்பூச்சிகளை இரைவாகப் பிடித்து உண்பதற்கேற்ப அரினான் வடிவமுடைய அலகும், நீண்ட எலிதாக துழையக் கூடிய முட்டைகூடக் கூடிய நாக்கும் பறக்கும் பூச்சிகள் வாயினுள் துழையும் போது அந்த அநிர்ச்சியைத் தாங்கிக் கொள்வதற்கான கெட்டியான மண்டையோட்டுடனும் இப்பறவைகளில் மிகச் சிறியதாகவும், உடலில் அதிக புள்ளிகளற்றதுமான மரங்கொத்தி பறவைகளிலிருந்து, மிகப் பெரிய தந்தம் போன்ற திறத்தை யுடைய அலகுகளையுடைய மரங் கொத்திகள் வரை எம்மாத் பறவைகளுக்கும் உண்டு. இந்த மரங்கொத்திப் பறவைகளின் தனித்தனிச் சிறப்பினங்கள் தங்கள் உடனமைப்பிற்கேற்ப பலவிதமான இடப் பகுதிகளை இரைதேடி தேர்த்தெடுக்கின்றன. உருவில் மிகச்சிறிய மரங் கொத்திகள் மரத்தில் சிறு சிறு கிளைகளையும் சிறிய அடிமரப் பகுதிகளையும் இரை தேடியுள்ள தன் இடமாக தேர்த்தெடுக்கின்றன. உருவில் மிகப்பெரிய மரங்கொத்திகள் பெரிய மரங்களின் பெரிய பெரிய கிளைகளை தங்களது இரைதேடி புண்ணும் இடமாக தேர்த்தெடுக்கின்றன. காகத்தின் அளவுள்ள மரங்கொத்திப் பறவைகள் அநேகமாக மரங்களின் அடிப்பகுதிகளையே தங்கள் இரைதேடி புண்ணும் இடமாகத் தேர்த்தெடுக்கின்றன. ஸ்பைரோபிர்க்கஸ் என்னும் மரக் கழிகளை உண்ணும் பறவைகள் மரங்களில் வரிசையாக துளை செய்து, அத்துளைகளின் வழியாக செடிகளின் சாறுகளை (Sap) உறிஞ்சி உண்ணுகின்றன. பச்சை நிறமுடைய மரங்கொத்திகள் எறும்புகளையே உண்ணுகின்றன. எறும்புகளை உணவாக உண்ணும் பச்சை மரங்கொத்திப் பறவைகளுக்கு ஒரு சோடி உமிழ் நீர்

கரப்பிகள், நீர்போன்ற குறை அடர்த்தியுள்ள உயிற் தீரையும், மற்றுமொரு சோடி உயிற்றிற் கரப்பிகள் அடர்த்தியான கோழை போன்ற திரவத்தையும் கரக்கச் செய்கின்றன. இரண்டாவது சோடி உயிற் தீர் கரப்பிகளால் கரக்கச் செய்த அடர்த்தியான கோழை போன்ற திரவம் நாக்கைச் சுற்றிலும் பூசப்படுகின்றது. அதன் உதவியால் இப்பறவைகள் எலும்புகளை எளிதாகப் பிடித்து உண்ணுகின்றன. பாலூட்டிவகையைச் சேர்ந்த எலும்பு தின்னிகள் (Ant eaters) போன்றே இப்பறவைகளும் மேற்கூறியவற்று எலும்புகளைப் பிடித்துத் தின்னுகின்றன. கருவானிக் ஓக் கொட்டை (Acorn) முதலியவற்றை உண்ணும் மரங்கொத்திகள் பூமியில் மறைவிடங்களில் கருகட்டி வசிக்கின்றன. மறைவிடப் பொத்துகளில் தங்கள் உணவுப் பொருளான கருவானிக் கொட்டைகளைப் பதுக்கி வைத்து உண்ணுகின்றன.

மற்றும் சில பறவைகள் மணிகளில் செங்குத்தான பகுதிகளில் வசிக்கின்றன. இப்பறவைகள் மற்ற மரங்கொத்திகளைப் போன்றே உணவு தேடி உண்ணுகின்றன. மரப் பொத்துகளில் தங்கள் இரைகளைத் தேடி உண்ணும் பறவைகளுக்கு மார்புப் பகுதி வெள்ளை நிறமாக உள்ளது. அவ்வாறு வெள்ளை நிறமாக இருப்பதால் அப்பறவைகள் மரப்பொத்துகளில் இருட்டினும் துழையும் பொழுது வெள்ளை நிற மார்புப்பகுதி வெளிச்சத்தை பிரதிபலிப்பதற்கு உதவும் என்று கிரின்னெல் (Grinnell) என்ற அறிஞர் விளக்கி கூறியுள்ளார்.

மற்றும் சில பூச்சி தின்னும் பறவைகள் தரைமீறையே இரைதேடி வசிக்கின்றன. கேலினேரியல் (Callinaceros) பறவைகள் ஒரு காலிலால் நின்று கொண்டு, மற்றொரு காலிலால் நிலத்தைச் செறி பூச்சிகளைப் பிடித்து உண்ணுகின்றன. பின்னும் சில பறவைகள் டிப்ச்ச்செஸ் (Finches) போன்றவைகள் நிலத்தில் நடக்காமல் குதித்துக் குதித்து செல்கின்றன. அவ்வாறு குதித்துக் குதித்துச் செல்லும் பொழுது, தரையை இருகால்களினுடும் உதைப்பதால் மண்ணைச் செறி பூச்சிகளைப் பிடித்து உண்ணுகின்றன. இதேபோன்ற அலகு களையும் இப்பறவைகள் பலவாறாகத் தோண்டித் துக்கும் செலுத்துக்கும் ஏற்ப உபயோகிக்கின்றன. டாக்சோஸ்டோமா பறவைகள் (Toxostoma) நிலத்தைத் தோண்டி பூச்சிகளைப் பிடிப்பதற்கான அலகுகளைக் கொண்டுள்ளது. அதே டாக்சோஸ்டோமா குடும்பம் (T. Rufum) என்ற நிறப்பிணம் பூமியைச் செறி பூச்சிகளைப் பிடித்து உண்ணுகின்றன. கலிபோர்னியாப் பகுதிகளில் வரலும் (Callifornia) இதே இனப் பறவைகள் நிலத்தைப் பறித்து, அவ்வாறு பறிக்கும்பொழுது ஏற்படும் துவாரங்களில் உள்ள புழுபூச்சிகளைப் பிடித்து உண்ணு


கின்றன. புது உலக வானம்பாடிப் பறவைகளான ஸ்டர்னெல்லா (Star nelli) பறவைகளும் பழைய உலக ஸ்டர்னஸ் (Sturnus) பறவைகளும் ஒரு மூறையாக மண்டித்தொண்டி பிளவுகள் ஏற்படும்படி செய்கின்றன. அப்பிளவிற்குள் மூடியநிலையில் அவகிளைச் செலுத்தி பின்பு நியத்தின் தன்மையறித்து அவருகளைத் திறத்து பூச்சிகளை உண்ணுகின்றன. அங்ஙாறு பூமிக்குள் அமகிளைச் செலுத்தி, பூச்சிகளைப் பிடிக்கவேண்டி மிகுத்தலாய் அவற்றின் கண்கள் மண்டையோட்டின் மூள் பகுதியில் இருப்பதால் இப்பறவைகள் நியத்தினுள்ள பிளவுகளில் பூச்சிகளை எளிதாகக் காணமுடிவின்றது. இங்ஙானான தகவமைப்புக்களுக்கு இப்பறவைகளின் மேல் அவகிளை அசைவிக்கக் கூடிய தசைகளும், மேல் அவகிளை அசைவிக்கக் கூடிய தசைகளும் தன்மையாக அமைந்துள்ளன என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.



படம் 62. (அ) செற்றில் அமைந்து இரைதேடி உண்ணுதற்கான தகவமைப்புக்கொண்ட அவருகிளையுடைய பறவைகள்
1. ஸ்டில் (Stilt), 2. அவோசெட் (Avocet), 3. மஞ்சள் கால் நாணர், 4. கரீங்கு (Curlew), 5. மரச்சேவல் (Wood cock),

கடற்கரையில் வசிக்கும் பறவைகளில் உலகவு உட்கொள்ளும் மூறை பவவானாகப் பரவியுள்ளது. உலகவான் (Snipe) மரச்சேவல் (Wood cock) காட்விட்ஸ் (Godwits) முதலிய பறவைகளில் ப்ளேவர் (Plover) டாட்டர் (Tattler) முதலிய பறவைகளைப் போன்று

தங்கள் அனுகூல இடங்கி (Forceps) போன்று உணவும் பொருளை எடுத்து உண் பதற்கு பயன்படுத்துகின்றன. ஜூகல் எலும்பு விட்டமும், அண்ண எலும்பும் மூலப்புறமாக நகரும் பொழுது டேட்லர் பறவைகளின் அலகில் அண்ணம் துனி தெற்று வளைந்து, அதனாக கீழ் அவகு (Mandible) எலும்பை தெற்று தூக்கிக் கொடுக்கின்றன. குறுக்கு வெட்டுத் தொற்றத்தில், உள்னானின் அண்ணம் பகுதியின் அலகைப் பார்த்தோமானால் அது ஆங்கில எழுத்தான T வடிவமாக உள்ளது. அவ்வாறு T வடிவமாக இருப்பதால் அது உறுதியாக உள்ளது. அதே சேர்மை துனியினுள்ள அலகின் மூன் மெக்ஸிலாலானது (Premaxilla) மிகவும் ஒடுங்கியுள்ளது. மெக்



படம் 82. (ஆ) இரக பவனிக உணவுள்ளும் பழக்கத்திற்கேற்ற தகைமைப்படுடைய அனுகூலியுடைய பறவைகள்

1. திறந்த அவகுப் பறவை (Open bill), 2. பெலிக்கன், 3. கரண்டி வாய்ப்பறவை (Spoon bill), 4. காலனி வடிவ அவகுப் பறவை (Shoe bill), 5. அண்ணம் (Swan), 6. பூப்பினை, 7. மூத்துச் சிப்பியுள்ளும் பறவை, 8. கிவி, 9. கத்தரி அவகுப் பறவை.

கெல்லரி (Maxillary) எலும்பிற்கு ஜூகல் எலும்பு, விட்டத்திலிருத்தும் அண்ண எலும்பிலிருத்தும் செலுத்தப்பட்ட சக்தியினால் 2/3 பங்கு

சேய்மை அவகிள் பகுதி மேலே தூக்கப்படுகின்றன. கடற்கரைப் பகுதிகளில் வசிக்கும் பறவைகளின் அவகிள் நீளம், அவை உண்ணும் உணவிற்கும் அவை நிலத்தை நோண்டி அல்லது மிளறி அவகிள் அதற்குள் விட்டு உணவு எடுக்கும் முறை முதலியவற்றைப் பொருத்தே உள்ளன.

ஃபேலோரோப்ஸ் (Phalaropes) பறவைகள் தங்கள் நீந்தும் நிறை உணவு தேடி உட்கொள்ளும் முறையுடன் சேர்த்து மிகவும் சக்தி வாய்ந்ததாக அமைப்பு பெற்றிருக்கின்றன. நீந்தும் பொழுது கால் களில் உதவியால் தண்ணீரை சுழலவைத்து அதில் மிடைக்கும் சிறு சிறு பிராணிகளையும் மிதக்கும் (Planktonic) பிராணிகளையும் பிடித்து உண்ணுகின்றன. அவாசெட் (Avocet) பறவைகள் மூன்றாமாக நகரும் பொழுது தங்களை ஒடுக்கிய தட்டையான மேற்புறமாக வளைந்த அங்குகளை, பக்கவாட்டில் தண்ணீரில் அசைத்துச் சென்று இரை பிடித்து உண்ணுகின்றன. முத்துச் சிப்பிகளை (Oyster) பிடித்துத் தின்னும் பறவை வகைகள் அவைகளை முதலில் தங்களது அவகிலும் தாக்கி, பின்பு எடுத்து விழுங்கி விடுகின்றன. ப்ரீசிகோல் கோலிஸ் (Pratincoles) பறவைகள் ஊளில் பறக்கும் பூச்சிகளை ஸ்வோலோ (Swallow) பறவைகளிடம் போன்றே பிடித்து உண்ணுகின்றன. பர்கினஸ் (Burhinus) என்ற பறவை, பூச்சிகளைப் பிடித்து இரையாக உண்ணுவதல்லாமல் சிறிய பாலூட்டிகளையும் கூடுகளி லுள்ள குஞ்சுப்பறவைகளையும் கூட இரையாக உண்ணுகின்றன. தைனோகாரிடே (Thinocaridae) குடும்பத்தைச் சேர்ந்த பறவைகள் புல் பூண்டுளை மட்டுமே உண்ணுகின்றன.

சிபினாமிகோ பறவைகளிலும், வரத்துகளிலும் அவகுகளில் வடிதட்டுபோன்ற துளைகள் இருக்கின்றன. சேறிதையும் தண்ணீ



படம் 82. வடிதட்டும் தகவலமைப்புக்கொண்ட அங்குகளையுடைய பறவைகள்

1. சிபினாமிகோ, 2. வரத்து.

ரையும் சிறு புழுபூச்சிகளையும் சேர்த்து வாயினால் எடுத்துச் சென்று தண்ணீரையும் சேறிதையும் அவகிள் வடிதட்டு வழியே வெளியேற்றி புழு பூச்சிகளை இரையாக உண்ணுகின்றன. ஃபீனிகோப்ஸ்டிரெஸ் ஆன்ட்டிகோரம் (Phoenicopterus antiquorum) என்ற சிபினாமிகோ


பறவைகள் மேற்கூறியவாறு சேற்றையும் நீரையும் சேர்த்து வாயினால் கொண்டு செக்கும்பொழுது பச்சைப் பாசிகள் (Green algae) டயாட்டோம்கள் (Diatoms) முதலியவற்றை சேர்த்து எடுத்துச் சென்று சேற்றையும் நீரையும் வெளியேற்றி மற்றவற்றை உண்ணுகின்றன.

ஸ்டெர் (Eider) ஸ்கோட்டர் (Scoter) முதலிய பறவைகளில் நன்னீர் மட்டி (Fresh water mussel) மற்றும் ஒட்டினை உடைய செல்லுடனிகளை உண்ணுவதற்கேற்ப அகன்ற ஒட்டினை நொறுக்கும் படியான அமைப்புடைய அவகுகள் உள்ளன.

தேனீக் கூடுகளிலுள்ள தேன் மெழுகை (Bee wax) தேன் வழிகாட்டி (Honey guide) என்னும் பறவைகள் உண்ணுகின்றன.

பழங்க்கிை உணவாகவுண்ணும் பறவை வகைகள்

காசாவாரி, ஈழ, புழு, கிளி, கக்க, பார்பெட், டுகான் (Toucan), ஹார்ன் பில் (Hornbill) காட்டிங்கேஸ் (Cotinges) முதலிய



படம் 64. பழம் நிண்ணும் தகவமைப்புக்கேற்ப அமைந்த அனகுடைய பறவைகள்

1. கிளி, 2. ஹீரோக்ஸாஸ் (Horn bill), 3. டுகான் (Toucan), 4. குக்கட்டோ (Cockatoo).

பறவைகள் பழங்க்கிை உணவாகவுண்ணும் பறவைகளாகும். அமெரிக்க ஓயர்லா குருவி வகையான பூபோனியான் பறவைகளும்

மற்றும் டிகேம்பேட் குடும்பத்தைச் சேர்ந்த சில பறவைகளும் ஸ்விஸ்ஸூரூஸி பெரிகனிக்ஸே (Mistle toe berry) இரைவாக உண்ணுகின்றன. இவ்வாறு கனிக்ஸே உணவாக உண்ணும் பறவைகளின் அவகு குட்டை-வானதாகவும் அகலமானதாகவும் உள்ளது. மேலும் உணவுப்பானை வானது விரிவடைத்த பைப்போன்ற இரைப்பை (Stomach) முதலியப் பகுதிகள் இவ்வாறும் எல்லாம் ஒரே சீராக குழாய் போன்று அமைந்துள்ளது. இப்பறவைகள் கனிக்ஸே சதைப்பற்றுள்ள பகுதியை மட்டுமே உண்ணுகின்றன. மிகப்பெரிய அவகினைவுடைய அமெரிக்க வெப்பமண்டலப் பறவைகளுக்கு நீண்ட அகலமான அவகுகள் இருப்பதும் அவை கனிக்ஸே எட்டிப்பிடித்து எடுத்து உண்பதற்காகவே என்று வேண்ட்டைன் (Vantyne) என்ற ஆசிரியர் குறிப்பிட்டுள்ளார். அவகுகள் இப்பறவைகளுக்கு எதிரிகளிடமிருந்து தப்புவதற்கும், அதன் அழகான நிறம் அதன் இனத்தில் அவற்றின் இனச்சேர்க்கை காலத்தில் பயன்படுத்தலுக்கும் ஆகும். பெரதுவாக பழங்களை உணவாக உண்ணும் பறவைகள் தங்கள் குஞ்சுகளுக்கு புழு பூச்சிகளையே உணவாகக் கொடுக்கின்றன. மற்றும் ட்ரோகாஸ் (Trogon) பறவைகள் பழங்களையும் பூச்சிகளையும் உணவாக உண்ணுகின்றன. மற்றும் சில பாடும் பறவையினங்களான நிரஷ்ஷர் (Thrasher) பறவைகள் ஒரு குறிப்பிட்ட காலத்தில் பூச்சிகளையும் மற்றும் சில காவங்களில் பழங்களையும் உணவாக உண்ணுகின்றன. தென் அமெரிக்காவின் கேப்ரி முக்கிப்பார்ம் (Capri mulgiformes) குடும்பத்தைச் சேர்ந்த ஸ்டெர்னாஸ்டீஸ் (Sternornis) என்ற எண்ணெய்ப் பறவைகள் பழங்களை மட்டுமே உண்ணுகின்றன.

விதை கொட்டைகளை உணவாக உண்ணும் பறவை வகை

விதை கொட்டைகளை உணவாக உண்ணும் பறவைகளில் பிளின்ச் வகை (Finch) பறவைகள் மிகவும் முக்கியமானதாகும். இப்பறவைகளில் அவகுகள் அகலமானதாகவுள்ளன. அவ்வாறு அமைந்த அகன்ற அவகுகளால் இப்பறவையினங்கள் பெரியதும் உறுதியுடைய துமான ஒட்டிகளை உடைத்து அதற்குள் இருக்கும் கொட்டைகளை உண்ணுகின்றன. கொட்டைகளை உண்ணும் எல்லாப் பறவையினங்களிலும் அவகுகள் அகன்றதாக அமையவில்லை. ஒரு சிலவற்றில் சற்று நிறையதும் மற்றும் சிலவற்றில் பின்னும் நிறையதும் ஆக பலவிதமான அவகுகள் உள்ளன. நித்திரி பறவை அல்லது தங்க நிற பிளின்ச் குருவி வகைப் பறவைகள் (Siskins or goldfinches) காட்டு மரவகைகளையும் (Birch) அகன்ற ஓரப்பரிகளைவுடைய இலைகளையும் மஞ்சள் நிற பூக்களைவுடைய செடிய வகைகளையும் (Dandelion) சிறு கொட்டைகளையும் உண்ணுதற்கேற்ப நிறிய அவகுகளைக் கொண்டிருக்கின்றன.

மற்றும் கக்கத்ரேஷ்டெஸ் (Cocco thrusters) என்னும் மற்றுமொரு குருளி வகைகள் செரீரி (Cherry) ஆலிவ்ஸ் (Olive) முதலியவற்றின் கொட்டைகளை உடைத்து உண்ணுதலுக்கேற்ப பெரிய அவகுகளை கொண்டுள்ளன.

ஒக் மரத்தில் கிடைக்கும் தீவி வகைகளே பல பறவைகளுக்கு முக்கியமான உணவுப் பொருளாக அமைந்துள்ளன. வான்கோழி, புழு ஒபான்ற பறவைகள் கருவானிக் கொட்டைகளை (Acorn) முழுமையாக உண்ணுகின்றன. பின்பு அக்கொட்டைகள் அறுவையுபவனின் (Gizzard) உதவியால் உடைக்கப்படுகின்றன. வண்ண இறகுகளையுடைய சவசவக்கும் ஐரோப்பிய 'ஜே' பறவையுடைய (Jay) மரங்கொத்தி பறவையுடைய கத்தி போன்ற அவகுகளினால் கொட்டைகளை உடைத்து அதனுள்ளிருக்கும் பருப்புகளை உண்ணுகின்றன. வட அமெரிக்காவில் வசிக்கும் குவிஸ்கேலஸ் (Quiscalus) போன்ற காக்கையினப் பறவைகளுக்கு (Grackle) அண்ண எலும்பினிருத்தும் சிற்றோர்க்கி அமைந்திருக்கும் கெட்டியான உறுப்பினால் கருவானிக் கொட்டைகள் போன்றவற்றை உடைத்து உண்ணுதற்கேற்ப அமைந்துள்ளன. லாக்ஸியா (Loxia) என்ற பறவை ஊசி இலைக் காடுகளிலுள்ள கொட்டைகளையும், விதைகளையும் உண்ணுதற்கேற்ப அவகுகளை உடையதாக உள்ளன. இப்பறவைகளின் அவகுகள் ஒரு பாதித் திறந்த அளவில் குறுக்காக ஒன்றன்மேல் ஒன்றாக அமைந்திருக்கும். சித்திராடை அலகின் நுனியும், மேத்தாடை அலகின் நுனியும் எதிர் எதிராக அமைந்து அத்துனியை இப்பறவைகள் தேவதாரு இலைகளின் செதில்களினால் நுழைத்து அகியிருக்கும் உணவை எடுத்து உண்ணுகின்றன. இப்பறவைகளில், அலகின் நுனி மரத்தின் செதில்களைப் பிரித்து வழிவகுப்பதாக, நாக்கினால் விதைகளை எடுத்து உண்ணுதலுக்கேற்ப அவகுகள் அமைந்துள்ளன. பிள்ளும் தாடைத் தசைகள் ஒரே சீராக (Asymmetry) அமைவாமல் சித்திராடை அவகு நோக்கியுள்ள திசையில் தசைகள் பலம் பொருந்தியதாக அமைந்துள்ளன. இவ்வாறு குறுக்காக அமைப்பெற்ற அவகுகளையுடைய பறவைகளிலும் (Cross billed) வெள்ளை இறகுகளையுடைய லாக்ஸியா லியோகாப்பியூரா (L. leucoptera) பறவைகளுக்கு மிகவும் மெலித்த பலமற்ற அவகுகளும் லாக்ஸியா பிட்யுபோஸிட்டாகஸ் (L. Pyropeithacus) பறவைகளுக்கு பலம் பொருந்திய அவகுகளும் உள்ளன. இப்பறவைகளின் அலகின் நீளம், பலம் முதலிய பண்புகளுக்கும் அவை உண்ணும் தேவதாரு மரங்களின் தன்மைக்கும் தொடர்புண்டு என்பதை அறியலாம். லேக் (Lack) என்ற அறிஞர் போன்றவர்கள் கிளி போன்ற குறுக்கவகுகளையுடைய பறவைகள் கடினமான தேவதாரு மரங்களின் விதைகளை உணவாக உண்ணுகின்றன என்று கூறியுள்ளார். சிவப்பு நிற குறுக்கவகுகளைக் கொண்ட பறவைகள்

கனியினை மரங்களின் மேன்மையான பாகங்களையும் உணவாக உண்ணுகின்றன. வெள்ளை நிறமுடைய குறுக்கவகுக்கையுடைய பறவைகள் நிறிய மிகுதுவான கற்பூரத் தைவம் தரும் ஊடுவிலை மரவகைகளின் பாகங்களை உணவாக உண்ணுகின்றன. நுமிமாவயப் பிரதேசத்தில் வசிக்கும் ஊக்கியா க்வினாஸ்டீசா ஒரிமாவயன்சில்



படம் 85. விதை கொட்டைகள் முதலியவற்றை உண்ணுதற்கான தகவலைப் பூக் கொண்ட அங்குகளை யுடைய பறவைகள்

- 1: சிட்டுக் குருவி. 2: குறுக்கவகுப் பறவை (Cross bill),
3: கிரோஸ் அங்குப் பறவை (Gros beak), 4: ஃபிளச் (Flinch),
5: கார்டினல் (Cardinal).

(*L. curvirostra himalayensis*) என்ற குறுக்கவகுக்கையுடைய ஒரே பறவையினத்திற்கு நிறியதான அங்குகள் உள்ளன. அவை தேவதாரா மரங்களிலேயே தங்கள் உணவுப் பொருள்களைத் தேடி உண்ணுகின்றன. மற்றும் ஒருசில இராசாளி, வல்லுறுப்போன்ற பறவைகள் தாவரங்களையே தங்கள் உணவாக உண்ணுகின்றன. ஆப்பிரிக்காவில் வசிக்கும் பனைமரக் கொட்டைகளை உண்ணும், ஜிப்போகிராக்ஸ் (*Gypohierax*) போன்ற வல்லுறுகள் (Palm nut Vulture) என்னென்ற கொடுக்கும் கொட்டைகளையும், பனைமரக் கொட்டைகளையும் உண்ணுவதன்மையால், பிராணிகளையும் உணவாக உண்ணுகின்றன.

பூந்தாது அல்லது மகரத்தம், தேன் முதலியவற்றை உண்ணும் பறவை வகை

லோரியன் (*Lorias*) பாடும் பறவைகள் (Humming birds) மற்றும் சிவிப்பிடிட்டன், வெள்ளை கண் உடைய பறவை, தேனுண்ணும் பறவை, இலைப்பறவை போன்ற பேசுனரன் இனத்தைச் சார்ந்த பறவைகளில் பூந்தாது தேன் முதலியவற்றை உண்ணுதலுக்கேற்ற அங்குகள் அமைந்துள்ளன. இப்பறவைகளின் நாக்கு குழல் போன்றும் நுனியில் முரட்டு குஞ்சம் போன்ற (Brush) அமைப்புக் களுடனும் அமைந்துள்ளது. பாடும் பறவைகளின் அங்குகள் பல வகை அமைந்துள்ளன. இப்பறவைகள் எந்த வடிவமுடைய

பூக்களில் தேவிர சேகரிக்கின்றனவோ அதற்கெற்றத்போல அவை அவசூகன் அமைந்துள்ளன. பீச்சர் (Beecher) என்பவர், சரிசுடே



படம் 56. பூக்களில் தேவிரணுதற்கான தவணைமப்புக் கொண்ட அவசூகியுடைய பறவைகள்

1. சட்டி அங்குப் பறவை (Sword bill), 2. அகிலான் மூக்குப் பறவை (Sickle bill), 3. நெருங்கி (Hermit).

களின் (Coerebidae) குடும்பப் பறவைகளில் பாகுனீடே பறவைகளில் (Parulidae) தேவிரணுதலிற்கும் இக்குடும்பத்தைச் சேர்ந்த மற்றும் சிலவற்றில் பூத்தாறு போன்றவற்றை உண்ணுதலிற்கும் ஏற்றவாறு அமைந்துள்ள அவசூகிப்பற்றி விளக்கிக் கூறியுள்ளார். இப்பிரிவைச் சேர்ந்த டிக்ளோசா (Diglossa) பறவைகள் விரைந்த மேக தாடை



படம் 57. நீண்ட நாக்குப் அவசூகியுடைய ஹம்பில் பறவைகள் 1 & 2. பூக்களில் தேவிர உறிஞ்சும் தோற்றங்கள்

அவசூகி குழம் வடிவமுள்ள பூவின் பூவிதழின் அடிப்பகுதியில் வைத்து, கீழ்த்தாடையின் உதவியால் ஒரு துவாரம் செய்கின்றது.

அத்துவாரத்தின் வழியாக குழல் வடிவமுள்ள நாக்கிளை பூவின் உள்பே செறுத்தி தேனை உறிஞ்சிப் பருகுகின்றன.

இலிந்தை முதலியவற்றை உண்ணும் பறவை வகைகள்

குள்ள வாத்துகள் (Geese) தங்கள் இலி வடிவ அமைதிகளினால் புற்களை உண்ணுகின்றன. அனாட்டிடே (Anatidae) குடும்பப் பிரிவில் நீசோச்சென் (Nesochen) என்ற பறவைகள் மலிப் பகுதிகளில் ஒருவதற்கும் ஏறுவதற்கும் ஏற்ற அமைப்பினக் கொண்டுள்ளன. தென் அமெரிக்காவில் வாழும் ஹோட்டிஸ் (Hoatzin) என்ற பறவையான இவைகளை உண்ணும் பிராணிகளுக்கு ஏற்ற உதாரணமாகும். பெரும்பாலும் இவைகளையே ஹோட்டிஸ் பறவைகள் உணவாகக் கொள்கின்றன. இப்பறவைகளில் அடித்தட்டைக் கலம் (Keel) பெரும்பாலும் ஒடுக்கப்பட்டு, தீனிப்பை (Crop) பெரியதாகவும் தசைப்பறிநுடனும் கிழிக்குவா (Furcula) வின் வயிற்றுப் புற பகுதியினும் மாறிப் கூட்டின் மூன்புறமும் அமைந்துள்ளன. நியூஜீலாந்து நாட்டில் வசிக்கும் காக்கேப்போ (Kakapo) அல்லது ஆந்தைக் கிளிகள் (Owl parrot) இவைகளையும் இனத்தண்டுகளையும் தங்கள் உணவாகக் கொள்கின்றன. இப்பறவைகள் இவைகளையும் இனத்தண்டுகளையும் செடியினிடுத்து மெல்லி எடுக்காமலேயே மென்று அதன் சாரத்தைக் (Juice) குடிக்கின்றன. பின்னும் சில சமயங்களில் அவை இவைகளையும் இனத்தண்டுகளையும் அவசரமாக உண்டு, தங்கள் தீனிப் பைகளில் சேகரித்து வைத்துக்கொள்கின்றன. பின்பு அவைகள் தாங்கள் இனப்பாலும் இடங்களுக்குச் சென்று, மூன்பே தீனிப் பைகளில் சேகரித்து வைத்திருந்த இலி தழைகளை மறுபடியும் வாய்க்குக் கொண்டு வந்து தள்ளுக மென்று, அதன் சாரத்தைக் குடித்துவிட்டு, சக்கையைத் துப்பிவிடுகின்றன.

பறக்கும் நிறை இழந்த மோவான் (Moa) பறவைகளினமும், உணவு உண்ணும் முறைகள் பண்பாடுகள் உள்ளன, இவைகள் இவைகளை உண்ணுகின்றன. மேலும் கிரெஸ், குருவி வகை (Grouse) போன்ற பறவைகள் மரங்களிலுள்ள பூவின் மொக்குகளை உணவாகக் கொள்கின்றன.

வேர்களை உணவாக உண்ணும் பறவைகள்

சில பறவைகள் வேர்களையும் கிழங்குகளையும் உணவாகக் கொள்கின்றன. தலைக் குட்டும் வண்ண அழகுமிக்க இறக்கைகளைக் கொண்ட வான்பொழி வகைப்பறவைகளில் (Impeyan pheasant) நீண்ட அகன்ற அமைதிகள் உள்ளன. அவற்றின் உதவியால் நிவந்தைத் தோண்டி வேர்களையும் கிழங்குகளையும் இப்பறவைகள் உண்ணுகின்றன.

மற்றும் சிட்டானிக்ஸ் (Cyrtornyx) பறவைகளில் பாதங்களும் நிலத்தைத் தொண்டுதலுக்கெற்ப அமைந்துள்ளன. நான்கு கால், கொக்குகள், வாத்துகள் முதலியவைகளும் வேர்களை உணவாகக் கொள்கின்றன. அவை நீண்ட அகலமான அலகுகளின் உதவியால் நீரில் மிதக்கும் தாவரங்களை உண்ணுகின்றன.

16. பறவைகளின் வகைபாடு

(Classification of Birds)

பறவைகளை இருபெரும் வகைப் பிரிவுகளாகப் பிரிக்கலாம். அவையாவன : (1) ஆர்க்கியோர்னிதீஸ் (முற்காலப் பறவைகள்) (Archeornithes) (2) நியோர்னிதீஸ் (தற்காலப் பறவைகள்) (Neornithes) என்பனவாம்.

உள்வகை-1 (Sub class)

ஆர்க்கியோர்னிதீஸ் (Archeornithes)

ஆர்க்கியோப்டெரிக்ஸ் (Archaeopteryx)

என்ற பழமையான பறவைகள், இப்பிரிவைச் சேர்ந்ததாகும். இவற்றின் புதை படிவங்கள் பனேரியா தேசத்திலுள்ள ஜூராசிக் படுக்கையிலிருந்து தோண்டி எடுக்கப்பட்டுள்ளன. மேற்கூறிய பறவைகளின் இரண்டு புதை படிவங்களின் தோற்றத்திலிருந்து முற்காலப் பறவைகளின் தனிச்சிறப்பியல்புகளை ஒருவாறு ஆராய்ந்தறிந்துள்ளனர். அவையாவன—18 20 வயல் மூன்றெலும்புகளுடன் கூடிய வாயானது பல்வியின் வாயை ஒத்திருந்தது. வாயின் இரு பக்கமும் வாய் இரகுகள் உள்ளன. மண்டையோடு தற்காலப் பறவைகளில் உள்ளதுபோன்று உருண்டையாகவும், மண்டையோட்டுப் பொருத்து வாய்கள் பிணைந்து வெளியே தெரியாதபடியும், காற்றுக் குழிவுகளற்றும் உள்ளன. கண்களில் கண் சூழ்வரை எலும்புகள் உள்ளன. பற்கள் குழிகளில் பொருத்தப்பட்டு இரண்டு தாடைகளிலும் உள்ளன. மூன்றெலும்புகள் ஆம்பீகோலஸ் (Amphicoelous) அல்லது இருகுழி வகையைச் சார்ந்தது. வாயிலிலுறியில் மூன்றெலும்புகள் ஒன்றாகச் சேர்ந்து கலப்பை போன்ற பைகோஸ்டைஸ் என்ற பாகமாக மாற்றி அமைக்கப்படவில்லை. மேலே கூறப்பட்ட புதை படிவப் பறவைகளின் உடல் தோற்றத்திலிருந்து மார்புக் கூட்டினப்

பற்றி ஒன்றும் சரிவரத் தெரியவில்லை. புவியுமான கவை எலும்பு (Femur) இரண்டு கழுத்துப்பட்டை எலும்புகளுக்கும் நடுவில் உள்ளது. மார்புப்புற வலிந்துப்புற விவாவெலும்புகளுள்ளன. மார்புப்புறமுள்ள விவாவெலும்புகளில் அன்சினேட் பகுதிகள் இல்லை. மூங்கால், பிங்கால் எலும்புகள் தற்காலப் பறவைகளில் உள்ளது போன்றேவுள்ளன. கை விரல்களும், கால் விரல்களும் ஊர்வன வற்றில் உள்ளதைப் போன்றுள்ளன.

இறகுகள் கை எலும்புகளுடனும் முழங்கை எலும்புகளுடனும் இணைக்கப்பட்டுள்ளன. இடுப்பெலும்பும் பிண்ணங்கால் எலும்புகளும் தற்காலப் பறவைகளில் உள்ளதைப் போன்று இருக்கின்றன.

ஆர்க்கியாப்பெடிக்ஸ் : முற்காலப் பறவை வகையின் ஒரு சிறந்த உதாரணமாகவுள்ள ஆர்க்கியாப்பெடிக்ஸ் பறவைவாணது உருவத்தில் தற்காலப் பறவைகளுள் ஒன்றான காக்கையின் உருவத்தையும், சிறைத்து பறக்க முடியாத நிலையையும் உடையதாய் இருத்திருக்கும் என்று கருதப்படுகின்றது. அது ஊர்வனவற்றையும், பறவைகளையும், பிணக்கும் ஒரு சங்கிலிக் கொக்கியாக உள்ளபடியாய் அதன் முக்கியத்துவம் நமக்கு நன்கு புலப்படுகின்றது. நீளமான வால், பற்களையுடைய நாடைகள், தவித்தனியான கை விரல்கள், கூரிய நகங்களையுடைய விரல்கள் முதலிய பண்புகளால் ஊர்வனவற்றையும், இறகுகள், மூங்கால், பிங்கால், பாதம், மண்டையோட்டு எலும்புகள் அமைந்துள்ள விதத்திலிருந்து பறவைகளின் பண்புகளையும் கொண் டிருக்கின்றன.

உள்வகுப்பு 2. கியார்னித்திஸ் (தற்காலப் பறவைகள்)

இக்கிளைவாணது தற்காலத்திலுள்ள பறவைகளையும் (Existing) ஒரு காலத்திற் வாழ்ந்து தற்போது மறைந்துபோன (Extinct) பறவைகளையும் கொண்டது.

இக்கிளையில் அடித்தட்டைக்கலம் இல்லாத பறவைகளை ரேட்டைட்டே (Ratitae) என்றும் அடித்தட்டைக்கலம் உள்ள வற்றை கேரினேட்டே (Carnitae) என்றும் முதலில் இரு பெரும் வகைகளாக வகைப்படுத்தினர். ஆனால் அடித்தட்டைக்கலமுள்ள பறவைகளின் மார்புக்கூடு ரேட்டைட்டேயின் மார்புக்கூட்டைப் போலிருந்ததால் இந்தப் பிரிவு வகை அவ்வளவு சரியானதாகத் தோன்றவில்லை. ஆகையால் தற்காலப் பறவை வகையை அண்ண எலும்பின் அமைப்பிற்கொப்ப மூன்று மேல் பெரும் வரிசைகளாகப் (Super order) பிரித்துள்ளனர்.

மேல்வரிசை.1 : பேலியோநேத்நே :—(Palaeognathae)

மேல்வரிசை.2 : ஸ்பென்ஸிபார்மிஸ் (Sphenisciformes)

மேல்வரிசை.3 : நியோநேத்நே (Neognathae)

மேல்வரிசை : 1. பேலியோநேத்நே : பழைய ரேட்டைட்டேப் பிரிவினாள் பறவைகள் இதில் அடங்கும். பழைய பண்புடைச் (Primitive) தற்காலப் பறவைகளில் இருப்பதைவிட இவற்றிற்கு தவிரான சில சிறப்பியல்புகள் உள்ளன. இடை நாகி எலும்பு (Vomer) அல்லது லோமர் எலும்பு நீளமானதாகவும், ஒரு புறம் பேலட்டைலுக்கும் டெரிகாப்டுக்கும் இடையிலும் மற்றொரு புறம் பேலிப்பீனாட்டு ராஸ்ட்டரத்திற்கு இடையிலும் அமைந்துள்ளது. இவ்வகையான அண்ண எலும்பின் நினைவை, டிரோமியோநேத்தன் (Dromaeognathos) என்று அழைக்கப்படும். பேலியோநேத்தன் வரிசையைச் சேர்ந்த எல்லாப் பறவைகளும் பறக்கும் சக்தியற்றவை வாய்ந்தன. அவற்றில் தனிச் சிறப்புப் பண்புகளாவன :—

(1) மார்புக் கூட்டில் அடித்தட்டைக் கலம் இல்லை.

(2) கழுமல் பறவையைத் தவிர மற்றவற்றில் தோள்பட்டை (Scapula) கோரகால்லு முதலான எலும்புகள் ஒரே நேர் கோட்டில் அமைந்துள்ளன. கழுத்துப்பட்டை எலும்புகள் (Clavicles) இடையாகு.

(3) அண்ண எலும்பின் அமைப்பு டிரோமியோநேத்தன் வகையைச் சார்ந்தது.

(4) நீழ்த்தாடை முள்ள எலும்பு நீட்சிகள் உறுதியுள்ளனவாக யிருக்கின்றன.

(5) மண்டையோட்டுப் பொருத்து வாய்கள் தற்காலப் பறவைகளில் இளமையிலேயே பிணந்துவிடுவது போலியினாமல் பொருத்து வாய்கள் வெகு நாட்களுக்குப் பிரிந்து தெரிகின்றன. குவாட்டிரேட் நீழ்த்தாடையுடன் ஒரே ஒரு குமிழால் பொருத்தப்பட்டுள்ளது.

(6) உறுதியான கொம்பு போன்ற பொருளினான அலகு ஒரே துண்டினால் ஆக்கப்படாமல் பிரிக்கப்பட்ட பல துண்டுகளாலாகியுள்ளது.

(7) வாயின் கடைசி ஆறு ஏற்த வாக் முன்னெலும்புகள் ஒன்று சேர்ந்து பைகொல்டைக் என்ற கலப்பைப் போன்ற பகுதியாக மாற்றப்படவில்லை.

(8) விளாவெலும்புகளிலுள்ள அக்ரினேட் என்ற பிரத்தியேகமான பகுதி இவற்றில் கிடையா. இவியளும் இலக்கியமும் பிள்ளும் சேர்க்கப்படவில்லை.

(9) நெருகல் உருவத்தில் மிகவும் நிறியதாக மாறியிருக்கின்றன. அவை பறப்பதற்குப் பயன்படுத்தப்படவில்லை.

(10) சிலி, டிஸ்டம்ஸ் பறவைகளின் தவிர இப்பிரிவைச் சார்ந்த மற்றப் பறவைகளில் என்செய்ச் சுரப்பிகள் இல்லை. டிஸ்டம்ஸ் பறவையைத் தவிர மற்றப் பறவைகளில் ஒழுங்காக அடுக்கப்பட்ட நெருகலையுடைய டெரினே (இறகுத் தடங்கல்) (Pterylic) கிடையா. பிள்ளும் இவற்றின் தலையிலும் கழுத்திலும் இறகுகள் இல்லை.

(11) முதிர்ச்சியுற்ற பறவைகளின் இறகுகளில் தனித்தனியான இறகுத் துய்களும் (Barbs) இறகு துண்டுகளும் (Barbules) உள்ளன. ஆனால் அவற்றில் துய்கொக்கிகள் கிடையா.

(12) சில பறவையைத் தவிர இப்பிரிவைச் சேர்ந்த மற்றப் பறவைகளில் சத்தம் உண்டாக்கக் காரணமாகவுள்ள சிரிங்கில் அங்மறு ஊதுகுழல் அல்லது ஒலிப்பெட்டி என்ற மாகம் கிடையாது.

(13) கூலிய நகங்கள் பின்னங்கால்களின் பிள்ளும் நீண்டுள்ள விரலிலும் முள்ளும் நீண்டுள்ள முதல் விரலிலும், உண்டு. சில சமயங்களில் முள்ளும் நீண்டுள்ள இரண்டாவது விரலிலும் உண்டு.

(14) ஆண் பறவைகளில் பெரியதாகவுள்ள மையப் புணர்ச்சி வுறுப்பு உண்டு. பெரும்பாலும் ஆண் பறவைகளே முட்டையை அடைகாக்கின்றன.

(15) குஞ்சுப் பறவைகள் முட்டையிலிருந்து வெளிவந்தவுடன் அவைகளே அவற்றைப் பாதுகாத்துக்கொள்ளும் நிறனுள்ளதாக விடுகின்றன (Precocious).

பறக்கும் சக்தியற்ற ரேட்டைட்டே பறவைகளின் மரபுமுறம் (Origin of Ratitae)

பறக்கும் சக்தியற்ற பறவைகள், பறக்கும் சக்தியே மிகவாத முன்போர்களினின்றும் தோன்றியதா அல்லது முதலிலிருந்தே பறப்பதைவிட்டு ஓடும் நிலையிலேயே விரிந்ததா அல்லது பறக்கும் சக்தியுடைய முன்போர் மரபிலிருந்து தோன்றிப் பின்பு பறக்கும் சக்தியை யிழந்துவிட்டனவா என்பன ஐயப்பாட்டிற்குரிய செய்தி வெகுநாளாயாக வுள்ளனவாகும்.

பறவைகளின் வகைபாடு

பறப்பதற்கு ஏற்றதாகவுள்ள பல நிறப்புப் பண்டுகளை ரேட்டைட்டே பறவைகள் பெற்றுள்ளன. அவற்றின் முன்னோர்கள் மேற்கூறிய பண்டுகளைப் பெற்றிருந்தும் அவற்றைப்பயன்படுத்தவில்லை என்பது எண்ணிப்பார்க்கக் கூடியதாக இல்லை.

ஊர்வனவற்றின் செதில்கள் பறவைகளில் பறக்கும் வாழ்க்கைக் கேற்ப இரகுகளாக மாறியுள்ள நிலை ரேட்டைட்டேயின் முன்னோர்கள் பறக்கும் நிலையில்தான் இருத்திருக்குமென்பதைத் தெளிவாக புலப்படுத்துகின்றது. பறவைகளின் முன்னோர் என்று கருதப்படும் ஆர்க்கியாப்டெரிக்சு, ஆர்க்கியாப்டெரிக்சு முதலிய பறவைகளின் உடனையபு மேற்கூறிய கூற்றை விவாதத்திற்குரியதாக ஆக்குகின்றது. பின்னும் அப்பறவைகளின்மீடும், மரங்களில் வாழ்ந்து வந்ததாகவும், அவைகளுடைய சிறகுகளின் அமைப்பு நன்றாகப் பறப்பதற்கு பயனுள்ளதாக விருத்திசெய்துள்ளன. ஹலியஸ் (Haliastur) என்ற விலங்கியல் நிபுணரின் கத்துவப்படி இப்பறவைகள் மீளையிலிருந்து ஆர்க்கியாப்டெரிக்சுபோன்ற பறவைகள் தோன்றுவதற்கு முன்பே ரேட்டைட்டே தோன்றியிருக்கவேண்டும் என்றும் அப்படி தோன்றியிருப்பினும் தற்காலப் பறவைகளிலுள்ளது போன்று இரகுகளும் எலும்புக்கூடும் அமைந்திருந்தும் அவை பறத்ததெயில்கலை என்றும் கூறியுள்ளார்.

ரோமர் (Roman) என்ற நிபுணரின் எண்ணப்படி பறவைகள் நிலத்திலுள்ள விரோதிகளைத் தவிர்ப்பதற்காகவே பறக்கும் சக்தியைப்பெற்றன என்று சொல்லப்படுகின்றது. ஆனால் தீவுகள் முதலியவற்றிலிருந்து பறவைகள் மற்றப் பறவைகளிலிருந்து பிரிந்து வாழ்ந்ததால் அவற்றிற்கு விரோதிகள் அவ்வளவாக இல்லை. ஆதலால் அவை பறக்கும் சக்தியை இழந்து அத்தீவுகளில் நிலத்திலேயே வாழ்ந்தன. ஆகையால் ரேட்டைட்டே பறவைகள் மாயிசு பட்சணிகளாலும் பாஸ்ட்டிகுகள் இல்லாத நிலங்களில் பறக்கும் சக்தியை விழந்து வாழ்ந்து வந்தன, வாழ்ந்து வருகின்றன என்று கருதப்படுகின்றது. உதாரணமாக மீனியின் ரேட்டைட்டே பறவை வாழும் தீவுகளிலிருந்து தீவிலும், தீக்கோழிகள் வாழும் குறிப்பிட்ட ஆப்பிரிக்காக்கள் கண்டத்திலும், ரிபா பறவைகள் வாழும் தெற்கு அமெரிக்காவிலும், ஈரூ, காசாவாசி பறவைகள் வாழும் ஆண்டு ரேவியா, மலேவா தீபகற்பம் முதலிய இடங்களிலும் அவைகளுடைய விரோதிகளாலும் மாயிசு பட்சணி வகையைச் சேர்ந்த பாஸ்ட்டிகுகள் கிடையா. நிலத்தில் அவைகளுக்கு விரோதிகள் இல்லாதபொழுது பறக்கும் தன்மையை இழந்து நிலத்திலேயே அவை வாழ்ந்தன என்று கருதுவதற்கு ஆதாரங்கள் மேற்கூறிய பறவைகளின் வாழ்க்கையி-

விரித்து புலப்படுகின்றன. எனவே ரேட்டைட்டே பறக்கும் சக்தியை அடைய பறவைகளிலிருந்து தோன்றி பின்பு பறக்கும் சக்தியை இழந்துவிட்டன என்று முழுமனத்தோடு ஒப்புக்கொள்ளப்படுகின்றது.

பெலியோதேதே (Palaeognathae) மேல் வரிசையைச் சேர்ந்த பறக்கும் சக்தியை இழந்த பறவைகளை ஏழு வரிசை (Orders) களாகப் பிரிக்கலாம்.

வரிசை-1.-ஸ்ட்ருத்தியானி வாரியல் (Struthioni formes)

ஆப்பிரிக்கா தேசத்து நெருப்புக்கொழிகள் இவ்வரிசையைச் சேர்ந்தவை. தற்போதுள்ள பறவைகளிலெல்லாம் இவைகளே



படம் 88. ஸ்ட்ருத்தியோ கேமெல்லஸ் (Struthio camelus) (கூக்கொழிகள்)

மிகவும் பெரிய தோற்றமுடையவை. நிறமும் மிகப்பெரிய நீண்ட இறகுகள் (Quill) உள்ளன. இவற்றின் இறகுகள் விற்பனைக்கு மிகவும் நிறத்தவைகள். இவ்விறகுகளில் பின்தண்டு இறகுக்குஞ்சம் அல்லது ஆக்பட்டர் ஷேப்ட் (Aftershaft) டைடயாது. தலை அதன் மிகப்

பெரிய உடலிற்றுச் சிறியதாகவும் கழுத்து நீளமானதாகவும் அமைந்துள்ளன. தலையிலும், கழுத்திலும் இறகுகள் இயங்கி, அவரு அகலமானதாகவும், தட்டையானதாகவும் உள்ளது. கழுத்துப்பட்டை (Clavicle) ஏழம்புகள் கிடையாது. பின் கால்கள் இரண்டும் நீளமானதாகவும், உறுதியுடையனவாகவும் இறகுகளால் மூடப்படாமலும் உள்ளன. பாதத்தில் (மூன்றாவது நான்காவது வரிசையைச் சேர்ந்தது) இரண்டு விரல்களில் மட்டுமே விரல்களுக்கடியில் நீள் தண்டுகள் (Paddles) உள்ளன. மூன்றாவது விரல் நீளமாகவும், கூர் தகத்துடனும் அமைந்துள்ளது. நான்காவது விரலில் தகங்கள் கிடையா. தன்றாக வளர்ச்சியுற்ற ஆண் பறவையானது ஆறு அல்லது ஏழு அடி உயரம் இருக்கும். பெண் பறவை சற்றுச் சிறியதாக இருக்கும். திக்கோழிகள் அனைத்துண்ணிப் பறவைகளாக இருப்பினும் இவை பெரும்பாலும் புல் பூண்டு முதலியவற்றையே உண்ணுகின்றன. இவை கறிகள், எலும்புகள், ஆணிகள் முதலியவற்றையும் எழுங்கும். தண்ணீர் இல்லாமலேயே பவநாள் உயிர் வாழும் தன்மை உடையவை. ஆண் பறவைகள் ஒரு பருவத்தில் ஒன்றிற்கு மேற்பட்ட இயிணவு தோழமைவுடையதாகவுள்ளது (Polygamous) பெண் கோழி ஒரு சமயத்தில் அளவில் பெரிய ஒரு மூட்டையை-ஆண் கோழி ஏதேனெனப் பறித்து வைத்திருப்பியில் இருக்கின்றது. மூட்டையை ஆணும் பெண்ணும் மாறிமாறி அடைகாக்கின்றன. பறவையின் குஞ்சு மூட்டையிலிருந்து வெளிவந்தவுடன் தன்றாக ஓடும் நிலையில் உள்ளது.

உதாரணம் : ஆப்பிரிக்கா, அபிரேயா பாலைவனத்திலுள்ள திக்கோழிகள், ஸ்ட்ருத்தியோகேமெல்யஸ் (Struthi : camelus).

வகை-2-கிவி பறவிகள் (Rheiformes)

(கியா-தென்அமெரிக்க தெருப்புக் கோழிகள்) மூன்கால்கள் மிகவும் குறைக்கப்பட்டு விட்டபடியால் இறகுகள் மிகவும் சிறியதாகவுள்ளன. கழுத்து நீளமாகவும், அவருகள் தட்டையாகவும் அகலமாகவும் உள்ளன. தலையும் கழுத்தும் சிறிய இறகுகளால் சிறிது மூடப்பட்டுள்ளன. இறகுக்குஞ்சும் அல்லது ஆகிப்பர்ஷாப், வாக் இறகுகள் முதலியன கிடையா. பின்கால்கள் மிகவும் நீளமானதாகவும் தடித்தும் பாதங்களில் கூர் தகங்களையுடைய மூன்று விரல்களுடனும் உள்ளன. இல்க்கியாடிக் எலும்பொருக்கெண்ணவும், கிரிங்கு அல்லது ஊதுகுழாயும் உண்டு. உதாரணம் : கியா அமெரிக்கா (Rhea americana) அல்லது தென்அமெரிக்க தெருப்புக் கோழிகள். இவை தென்அமெரிக்க சமவெளிகளில் வாழ்கின்றன. இவை வேகமாக ஓடும் தன்மையுடையவை. இவை புல், பூண்டு, விதைகள், பூச்சிகள், சிறிய ஊர்வன போன்ற பவயற்றையும் தின்னும்.

பழக்கமுடையன. இவைகளும் தக்கோழிகளைப் போல ஒரு பருவத்தில் ஒன்றிற்கு மேற்பட்ட இனவு தோழமைமுடையவை.



படம் 59. ரீயா அமெரிக்கா (Rhea americana)

பல பெண் கோழிகளிட்ட பல முட்டைகளை ஒரே ஆண் கோழி அடைகாக்கின்றது.

வரிசை-3.காசோரியன்கள் (Casuariiformes)

எழு, காசோரி முதலியன.

கழுத்து நீளமாகவுள்ள இப்பறவைகள் பார்வைக்கு மிகவும் பெரியவை. சிறகுகள் மிகவும் நிறியவைகளாகவும், சிறகுகள் நீளத்திற்கு இறகுக்குஞ்சுவிழைகளும் ஆகிப்படர் சேகரிக்கப்பட்டனும் உள்ளன. கொம்பு போன்ற கெட்டியான தலைக்கவசம் தலைநீள் உச்சியில் உள்ளது. அவைகள் மிகவும் நெருக்கமாக அமைப்பப்பெற்றது நுனியில் வளைக்கப்பட்டுள்ளன. பிங்காலில் கூர்நகர்களைமுடைய இரண்டாவது மூன்றாவது, நான்காவது விரல்கள் உள்ளன. உதாரணம் : காசோவாரி (Casowary) நியூகினியாவின் அடர்ந்த காடுகளிலும், வடக்கு குவிவளாத்திலும் உள்ள இப்பறவைகள் வேக

மாக நீந்தக் கூடியனவாகவும் வேகமாக ஓடக்கூடிய தன்மையுடையனவாகவுமுள்ளன.

படம் 70. காசாவாரி
பறவை (Cassowary)



ட்ரோமியல் (Dromaeus)
அல்லது எமு (Emu)
இவற்றிற்குத் தலைக்
வெசும் இடையாது. மற்ற
தன்மைகளில் காசாவாரி
பறவையை ஒத்துள்ளது. ஆஸ்திரேலியாவின் நிறத்த காடுகளிலும்
புல்வெளிகளிலும் இவற்றைக் காணலாம்.



படம் 71. ட்ரோமியல் அல்லது எமு (Dromaeus or Emu)
(இது உலகில் வசிக்கும் பறவைகளில் இரண்டாவது பெரிய பறவையாகும்)

வரிசை-4-எப்டெரிஜியாபார்மிஸ் (Apterygiformes)

உதாரணம்: கீவி (Kiwi) இவை உருவத்தில் மிகவும் சிதிர்தாகவுள்ளன. தற்காலப் பெட்டைக் கோழிகளை ஒத்துள்ளன. இவற்றிற்கு நீளமான ஒடுங்கிய கீழ்ப்பக்கமாக வளைந்த அவுசுகள் உண்டு. மேக்தாண்டலின் நுனியில் வெளிநாசித்துவாரங்கள் உள்ளன. பருத்த பின்னங்காலங்களில் நால்கு விரல்கள் உள்ளன. மூத்த விரல் பின்



படம் 73. கீவி (Kiwi)

பக்கமும் மற்ற மூன்றும் முன்பக்கமும் நீண்டு உள்ளன. விரல்கள் நீளமானதாகவும் கூரிய வளைந்த நகங்களுடனும் அமைந்துள்ளன. மயிரிழை போன்ற பறவை இறகுகளாகச் சிதிர்தாகவுள்ள இறகுகள் மறைக்கப்பட்டுள்ளன. ஆக்டாச்சேக்பீட் கிடைபாது. கீவி (Kiwi) நியூஜியாந்து சுரப்பகுதிகளைவுடைய காடுகளில் வாழ்கின்றன. இவை புழு, பூச்சிகளை வுண்ணும். சுரக்கப்பாறைப் போன்ற குழிகளில் முட்டையிடுகின்றன. ஆன் பறவைகள் முட்டையை அடைகாக்கின்றன.

வரிசை-5-ட்டினாமியாபார்மிஸ் (Tinamiformes)

இப்பறவைகள் அடித்தட்டைக்கனமுள்ள மார்புகூட்டுடனும் மற்ற பண்புகளில் ரேட்டைட்டே பறவைகளின் பண்புகளுடனும் உள்ளன. இவை பேலியோநாத்தா கிளையில் தனிவாகத் தொன்றி யிருக்கும் என்று கருதப்படுகின்றது.

உதாரணம் : டட்டினாமஸ் (Tinamus) இது தென் அமெரிக்காவில் வாழும் பறவை இனங்களாகும்.

வரிசை-6-டைனோர்னிதிடியை (Dinornithidea)

உதாரணம்: டைனோர்னிஸ் (Dinornis). இவ்வரிசையைச் சார்ந்த பறவைகள் ஒரு காலத்தில் வாழ்ந்து இப்பொழுது மறைந்துவிட்டன. இவை 12 அடி உயரம் கொண்டு உருவத்தில் மிகவும் பெரியவைகளாயிருந்தன. சுமார் 500 வகுடங்களுக்கு முன்பு நியூஜிலாந்தில் வாழ்ந்து வந்தன. நீளமானகழுத்தும் நீளமான பின்னங்கால்களும் இவற்றிற்கு உண்டு. நெருக்கம் மேம்பட்டவைகளாய் இவ்வை, கூரிய நகங்களுடன் கூடிய மூன்று விரல்கள் இவற்றிற்கு உண்டு.

வரிசை-7-ஏப்பியோர்னிதிடியை (Aepyornithidae)

உதாரணம்: ஏப்பியோர்னிஸ் (Aepyornithes). (வாஷிப் பறவை). இப்பறவைகளும் ஒரு காலத்தில் வாழ்ந்து இப்பொழுது மறைந்து போனவை. இவை மடகாஸ்கர் தீவில் சுமார் இரண்டாயிரம் வருடங்களுக்கு முன்பு வாழ்ந்தன. இவைகளுக்கு நீளமானதும், தடிப்பானதுமான கால்களும், மேம்பட்டவையாக விலகாத நெருக்களுடன் சுமார் ஏழு அடி உயரமுள்ளதாக இருந்தன.

மேல்வரிசை-2-ஸ்பெனிக்சியார்னிட்ஸ் அரிசை இம்பென்னை (Sphenisciformes or Impennae)

உதாரணம்: பென்குவின் (Penguin). இவை தென்கடலோரங்களில் கூடி வாழ்விட தன்மைவுள்ள, பறக்கும் சக்தியற்ற பறவைகளாகும். அண்ணம் ஸைசோநேத்தஸ் (Schiognathos) பிரிவைச் சேர்ந்தது. பெனிடெரிகாய்டு நீட்சிகள் கிடையாது. நெருக்கம் நீண்ட இறகுகளுக்குப் பதிலாக செதில் போன்ற இறகுகளால் மூடப்பட்டு நீத்துவதற்குரிய துருப்புகள் போல் அமைந்துள்ளன. கால்களின் பெரும்பகுதி உடனிலுள்ளனமத்து பாதங்கள் மட்டும் வெளியே தெரிகின்றன. அப்பாதங்கள் தண்ணீரில் நீத்துப்பொழுது வழியறித்து நிரப்புகிற சாதனமாக அமைந்துள்ளன. விரல்கள் சவ்வுத் தோலினால் இணைக்கப்பட்டுள்ளன. மார்புக்கட்டில் அடித்தட்டைக் குயம் உண்டு. இப்பறவைகளின் அனகுகள் அந்தந்த பொது இனங்களின் பண்புக்கேற்ப வேறுபாடுகளுடையதாகவுள்ளன. இவை நீரில் மூழ்கி செப்பியா போன்ற தடக்காலிகளையும், மீன்களையும் கிரவ்ஸேசியா வகையைச் சேர்ந்த பிராணிகளையும் பிடித்து உண்ணுகின்றன. இவை மனித வாடையற்ற மீன்களில் இனப்பெருக்கம் செப்கின்றன. ஒரு முறைக்கு இரண்டு அவ்வது மூன்று மூட்டைகளிட்டு அவற்றை ஆண்பறவை பெண்பறவை இரண்டும் அடைகாக்கின்றன. இப்பறவை பாதி சீரணிக்கப்பட்ட உணவை உணவுக்

குழாய்க்கிருத்து வெளியே உமிழ்ந்து அங்வுணவை குஞ்சுகளுக்கு ஊட்டுகின்றன. இவை தென்மேற்குப் பகுதியைச் சார்ந்த கண்டம் எனிலும் நீவுகளிலும் பெரும்பாலும் பரவிவுள்ளன.



படம் 73. பெங்குவின் (Penguin)

உதாரணங்கள்: 1. ஏப்டோடைய்டெஸ் (Aptenodytes). நனமான மேய்கிய வகைந்த அவரு இவற்றிற்கு உண்டு.

2. ஏப்டோடைய்டெஸ்:பார்க்கெரி (Aptenodytes forsteri) அல்லது பேரர்க பெங்குவின். இப்பறவையானது மற்ற பறவை களைவிடக் குறிப்பிடத்தக்கது. இதில் பாதங்களுக்கிடையில் தோலினால் அமைந்த ஒரு பையில் அது இடும் ஒரே முட்டையை வைத்து, நின்று கொண்டு அடைகாக்கின்றது.

3. யூடைய்டெஸ் (Eudyptes): சற்று சிறிய அளவான அகன்ற அன்குள் இவற்றிற்கு உண்டு.

4. ஸ்பீனிகஸ் (Spheniscus) : சிறிய தடித்த நெருக்கப்பட்ட அங்கு இவற்றிற்கு உண்டு.

மேல்வரிசை. 3-நியோதேத்தே (Neognathae)

இறகுத்துய்கள், இறகு நுன்துய்களுடன் நன்றாக வளர்ச்சி வடைந்த இறகுகளையும் பறக்கக்கூடிய தன்மையையும் உடையவை, இப்பிரிவைச் சேர்ந்த பறவைகள், இப்பறவைகளில் இறகுப்பாதைப் பகுதி அங்கு டெர்னே என்று நன்றாக இறகுகள் பொருத்தும் பகுதிகள் உண்டு, எண்ணெய்ச் சுரப்பிகளும் உண்டு, வாக் இறகுகள் பிறையோல் அடுக்கப்பட்டுள்ளன. அண்ணப்பகுதி நியோதேத்தல், அலித்தோதேத்தல், ஷெனோதேத்தல் அங்கு டெர்னோதேத்தல் பிரிவைச் சார்ந்தது. மார்புக் கூட்டில் அடித்தட்டைக் கைம் உள்ளது. கோரகாய்டும் நோல்பட்டை எனும்பும் ஒன்றாய் இணைந்திவ்வாயல் தரை நார்களால் பிணைக்கப்பட்டுள்ளன. அழுத்துப்பட்டை எனும்புகள் ஒன்று சேர்ந்து கவை எனும்பாக (Furcula) மாறிவுள்ளது. இவையுமும் இலக்கியமும் புதுபோ இலக்கியாட்டிக் துவாரத்துடன் சேர்ந்துள்ளது. ஆண் பறவைகளில் புணர்ச்சி உறுப்புகள் கிடைவா. நியோதேத்தே மேல் வரிசையை இருபத்து மூன்று வரிசைகளாகப் பிரிக்கலாம்.

வரிசை. 1-கொலிம்பேயர்யில் (Colymbiformes)

உதாரணம் : ஞாள் கொலிம்பஸ் (Loony Colymbus) முதலியன. இவை கடலில் வாழும் நீர்ப்பறவை. இப்பறவைகளின் உடல் அமைப்பு மற்றவைகளிடச் சிறப்புப் பொருத்தியதாகவுள்ளது. பாதங்களில் வீரங்களைப் பிணைக்கும் சவ்வு உள்ளது. நெருக்கக் கூர்மையானதாகவும், குறுகலானதாகவும், சிறியதாகவும் உள்ளன. தண்ணீரில் முழிவ மீன், கிரஸ்டேஷியன்கள் முதலியவற்றை பிடித்து உண்ணும். இவற்றின் அங்கு உறுதியுள்ளதாகவும், நேராக திண்டும், அழுத்திவைக்கப்பட்டுள்ளதாகவும் அமைந்துள்ளது. இதன் மண்டையோடு ஷெனோதேத்தல் அண்ணப்பிரிவைச் சேர்ந்தது. ஞாள் பறவைகள் நன்றாகப் பறக்கக்கூடிய நிறன் பெற்றிருப்பினும் அவை நிலத்தின் மேல் நடக்கும்பொழுது அருவருக்கத்தக்க நிலையில் இருக்கும். கொலிம்பஸ் பறவைகளில் ஐந்து சிறப்பினங்கள் கொண்ட ஐந்து பறவைகள் வட தருவத்தினும் பசிபிக் மகாசமுத் திரத்தினும் வாழ்கின்றன.

வரிசை. 2-பிரோசெல்லாரி:யர்யில் (Procellariiformes) அக் குறு புழுகிரேயில் (Tubinares)

உதாரணம் : ஆல்பெட்ரால், பெட்ரல் (Albatrosses, Petrels) முதலியன. இவை மிகப்பெரிய சமுத்திரப் பறவைகளாகும். இவை

மிகவும் நன்றாகப் பறக்கும் நிறமையுடையவை. இதன் மண்டை போடு ஷைபேசுதேத்தன் அண்ணப்பிரிவைச் சார்ந்தது. நாசித் துளாரங்கள் குழாய்வுடனாய் அமைந்துள்ளன. கொம்பு போன்ற அலகு பல பகுதிகளால் ஆனது. செப்பியா, மீன் இவற்றை இவை இரையாக்கிக் கொள்ளின்றன. ஆம்பெட்ராஸ் பறவைகளைத் தெற்கேவும் பசிபிக் மகாசமுத்திரத்திலும் கலாபாகாஸ் நீவுகளிலும் காணலாம். இவை மூன்று அல்லது நான்கடி நீளமுடையதாகவும் மிகப்பெரிய நிறஞகளை உடையதாகவுமுள்ளன. இவை கறுப்பு, பழுப்பு, வெள்ளை முதலிய நிறங்களையுடையன. காக்களின் முன்பக்கவிரல்கள் தொவிழைமங்களுடன் காணப்படுகின்றன. பாத்தகிள் முதல் விரல் மிகவும் சிறியதாகக் காணப்படும். இவை களுக்கு சக்தி பொருத்திய இதர்க்கைகள் உள்ளன. இவற்றின் உதவியால் இவை மிகவும் திறம்பட பறக்கும் சக்தியை யுடையன.

உதாரணங்கள் : பம்பினஸ் (Puffinus)

இப்பறவைகள் உருவில் சாதாரணமான உருவம் கொண்ட பறவைகளாகும். இவற்றிற்கு நீண்ட, ஒழுங்கிய அழுத்தப்பட்ட துளியில் நன்றாக வளைந்த அலகுகள் உள்ளன. இப்பறவைகளில் சிறவுரு கிழப்புறமாக வளைந்து காணப்படுகின்றன. மற்றும் இப் பறவைகளுக்கு நாசித் துளாரங்கள் குழல் வடிவமாக அமைந்திருப்பதோடல்லாமல் இரண்டு குறுக்கையமைந்த நாசித் துளாரங்கள் அவ்வீழ் துளியில் காணப்படுகின்றன. நிறகுகள் நீளமானதாகவும், மூதல் நிறகுகள் நீளமானதாகவும் இருக்கும். இதன் நிறமில் 12 நிறகுகள் உள்ளன. அவை நீளமாகவும் துளியில் வட்ட வடிவத் துடலும் காணப்படுகின்றன. இப்பறவைகளுக்கு கீழ்க்கத்திரி ரிஸ்கு பறவைகள் (Shear waters) என்று பெயர்.

பப்பினஸ் பொது இனப் பறவைகளில் பல நிறப்பினப் பறவைகளுள்ளன. பப்பினஸ் பேசிக்ரீக்கஸ் இதை (Puffinus pacificus). ஆப்புக்கட்டை வால் பறவை அல்லது பச்சை அலகு நீர் வாழ் கத்தரி மூக்குப் பறவை என்று அழைக்கலாம் (Wedge-tailed or green-billed Shear water). இவை 17 அங்குல நீளமுள்ளவை. வால் பகுதி 5 அங்குலம் நீளமுடையது. நிறகுகளில் 11 நிறகுகளுள்ளன. இவைகளின் அலகுகள் பச்சை நிறமுடையன. இவைகளின் கால்களும், பாத்தங்களும்க் வெள்ளை நிறமுடன் சதைப் பற்றுடன் காணப்படுகின்றன. இப்பறவைகள் கறுப் பழுப்பு நிறமுள்ள பறவைகளாகும். அவற்றின் வயிற்று புறப்பகுதி வெணீர் அல்லது சாம்பல் நிறமுடன் உள்ளது. இதன் கழுத்துப் பகுதியில் சாம்பல் நிறம்.

பறவைகளின் வகைபாடு

குறிப்பாகத் தெரிபும்படி அமைந்துள்ளது. ஆண் பறவைகளும் பெண் பறவைகளும் உருவில் ஒரே மாதிரியாகவிரிக்கும்.

பம்:பினஸ் பெர்சிக்ஸஸ் (Puffinus Persicus)

இப்பறவை சுமார் 13 அங்குலம் நீளமுடையது. அதன் வால் சுமார் 3 அங்குலமுள்ளது. இதன் அலகு அடியில் நீல நிறமுடன் வெளிர் பழுப்பு நிறமுள்ளவை. ஆண் பறவைகளும், பெண் பறவைகளும் உருவத்தில் ஒத்தேயிருக்கின்றன.

இந்தச் சிறப்பினப் பறவை ஒன்று நிருவனந்தபுரத்திற்கு 4 மைல் தூரத்தில் கிடைத்ததாகக் கூறப்படுகின்றது.

டேப்டியன் கேப்பென்ஸ் (Daption capense)

இதைச் சாதாரணமாக கேப்பெட்ரல் (Cap petrel) என்று அழைப்பர். இது சுமார் 16 அங்குலம் நீளமும், வால் 4 அங்குலம் நீளமும் உடையது. இதன் அலகு கறுப்பு நிறமுடையவை. இதன் கால்களும் பாதமும் கரும்பழுப்பு நிறமுடையவைகள். பாதங்களிலுள்ள விரல்கள் பக்கங்களில் புள்ளிகளுடன் வெண்மை நிறமுடன் இருக்கும். பெண் பறவைகள் ஆண் பறவைகளைப்போன்றே உருவத்தில் அமைந்திருக்கும்.

இப்பறவைகளை தெற்குக் கடற்கரை ஓரங்களில் காணலாம். இப்பறவைகள் கப்பல்களை தொடர்த்து சென்று கப்பல் தளங்களில் கிடைக்கும் உணவுப் பொருட்களை பொறுக்கியுண்ணும் தன்மையால் இவை 'கேப் பூஞ்சன்' (Cape pigeon) என்று கப்பல் மாலுமிகளால் அழைக்கப்படுகின்றன.

வரிசை-3 - போடிசிபிபைன்ஸ் (Podicipiformes)

உதாரணம் : ஹிரெப் பறவைகள் (Grebes). இவைகளும் நீர் வாழும் பறவைகளே. மண்டையோடு வலுசோடுதத்தல் அண்ணப் பிழைவச் சேர்த்தது. இவைகளை ஒடைகளிலும் குளம் குட்டைகளிலும் காணலாம். கால்களிலுள்ள முன்பக்க விரல்கள் அனைத்தும் அகன்ற பக்க இதழ்களால் சூழப்பட்டு துனியில் ஒன்று சேர்த்துள்ளன. இவற்றின் தாண்டாவது விரல் நீளமாகவிரிக்கும். நகங்கள் அன்றும் மழுங்கியும் காணப்படும். இவைகளின் வால் பகுதி ஒடுக்கியேயிருக்கும். கழுத்து முன்னெறுப்புகள் எண்ணிக்கையில் 17 முதல் 21 வரை இருக்கும். முதுகுப்புற முன்னெறுப்புகளின் இணைப்புகள் நன்றாக விடைத்துக் காணப்படுகின்றன. சிறகுகளில் 12 முதற்படி இறகுகள் உள்ளன. இப்பறவைகளுக்கு இடது

கரோட்டிட் தமனி மட்டுமே உள்ளது. இவற்றின் கடுகள் கோரைப் புற்களுக்கிடையில் இலைதழைகளால் ஆக்கப்பட்டு மிதந்து கொண்டேயிருக்கும். குஞ்சுப் பறவைகள் முட்டையிலிருந்து வெளி வந்தவுடன் நீரில் நீந்தும் தன்மையுடையவனாக உள்ளன. இப் பறவைகள் தங்கள் இறகுகளையே உண்ணும் பழக்கமுள்ளவைகளாகும். இவற்றின் அரவைப் பையில் கற்கள் கிடையாது. கற்களுக்குப் பதில் இறக்கைகள் அரவைப் பையில் காணப்படுகின்றன. இவற்றின் சிறகுகள் மிகவும் சிறியவைகளாகும். இவை நீரில் மூழ்கி மீன் முதலியவற்றைப் பிடித்து உண்ணும். தாய்ப் பறவை நீரில் மூழ்கும்போது குஞ்சுகளைத் தன் முதுகின்மீது சுமந்து செல்லுமாம்.

உதாரணம் : போடிசெயில் குயில்கோலில் (*Podiceps ruficollis*)

இவற்றைப் பொதுவாக 'டெப் குஞ்சு' (Dabchick) என்று அழைப்பர். இவைகளை சிறிய இந்தியன் கிரெப் (Indian little grebe) என்றும் கூறுவர். இதன் உடலின் நீளம் சுமார் ஒன்பது அங்குலமாகும். சிறகின் நீளம் சுமார் 4 அங்குலமாகும். இதன் அளகு குழப்பாகவும், துணியில் வெள்ளையாகவும் இருக்கும். கால்களும் பாதங்களும் கரும் பச்சை நிறமாக இருக்கும். இவற்றின் மேற்புற சிறகுகள் கரும் பழுப்பு (Dark brown) நிறமாகவிரும்பும். இதன் வயிற்றுப்புறப் பகுதி பட்டு வெண்மை நிறமாகவிரும்பும். மார்பும் பகுதி கரும் பழுப்பு நிறத்தில் வெள்ளை கலந்து காணப்படும்.

ஆண் இனமும், பெண் இனமும் உருவத்தில் ஒரேமாதிரியாகவே விரும்பும். இப்பறவைகளை உலகின் எல்லாப் பகுதிகளிலும் காணலாம். இவைகளை அசையாமல் இருக்கும் நீர்நிலைகளுக்கருகிலும், குளம் குட்டைகளிலும் சாதாரணமாகக் காணலாம். இப்பறவைகள் தென்மேற்கு பருவக்காற்று வீசும் தருணத்தில் இனப்பெருக்கம் செய்கின்றன என்று கூறப்படுகின்றது.

இப்பறவைகளின் கடுகள் இலை தழைகளால் ஆனது, நீர்நிலைகளில் நாணற்புற்களின் மத்தியில் மிதப்பதைக் காணலாம். இப்பறவைகள் கடுகளையிட்டு செல்லும்பொழுது கூட்டினை இலைகளால் மூடிவைத்துவிட்டே செல்லும் பழக்கமுடையவைகளாகும்.

இது 4 முதல் 6 முட்டைகளை இடும். முட்டைகள் இட்டதும் அவை வெள்ளை நிறமுடையவனாகவிரும்பும். உள்சேயுள்ள தோல் பச்சை நிறமுடன் இருக்கும். அம்முட்டைகள் அடைகாக்கப்பட்டு வரும்பொழுது குஞ்சு உள்சேய் வளர வளர, முட்டையின் நிறம்

மாறிக்கொண்டே வருகின்றது என்பதற்கு வேண்டிய ஆதாரங்கள் உள்ளன.

வரிசை-4.-பெலிக்கானி வார்ப்பில் ஆல் ஐது வகைகளுப்போடெல்,
(*Pelecani formes or steganopodes*)

இவ்வகையை ஐத்து குடும்பங்களாகப் பிரிக்கலாம்.

குடும்பம் 1. பெலிக்கானிடே (*Pelecanidae*)

குடும்பம் 2. கிபேலாகிரோக்கோரோசிடே (*Phalacrocoracidae*)

குடும்பம் 3. சுலிடே (*Sulidae*)

குடும்பம் 4. கிபேத்தேசனிடே (*Phaethonidae*)

குடும்பம் 5. கிப்கிடேட்டிடே (*Fregatidae*)

இக்குடும்பங்களில் சேர்ந்த பறவைகள் பொதுவாக நீரில் மூழ்கி மின்பிடித்து உண்ணுதலுக்கேற்ப உடலமைப்புக்கொண்ட நீர்ப் பறவைகளாகும். மண்டையோடு டெல்மோதேத்தன் அண்ணப் பிரிவைச் சார்ந்தது. பாதத்தின் நாக்கு விரல்களும் தோலிதழைகளால் சேர்க்கப்பட்டு காணப்படுகின்றன. பாதத்தின் முது விரலான நேரல்கள் அங்கு கட்டைவிரல் தன்ருக (*Hallux*) வளர்ச்சியுற்றுக் காணப்படுகின்றது. கவை எனும்பு மார்பெலும்பின் அடித்தட்டைக் கவத்துடன் விரைப்பாகப் பொருத்தப்பட்டுள்ளது. இப்பறவைகளின் எண்ணெய்ச் சுரப்பிகளைச் சுற்றி இழைக் கொத்து உள்ளது. இப்பறவைகளின் நாக்கு மிகவும் ஒடுங்கியே காணப்படுகின்றது. மூட்டைகளிலிருந்து குஞ்சு வேளியந்தவுடன் கண்கள் மூடிய நிலையிலேயே இருக்கும். பொரித்து கொஞ்ச நாட்களுக்கு அவை பெற்றோர்ப் பறவைகளின் பாதுகாப்பிலேயே இருக்கும். பொடி இறகுகள் முனித்த பின்பே அவை தாங்களாக வாழத் தொடங்குகின்றன.

குடும்பம்-1. பெலிக்கானிடே (*Pelecanidae*)

இக்குடும்பத்தின் பெலிக்கானஸ் (*Pelecanus*) என்ற ஒரே ஒரு பொது இனப்பறவைதான் உள்ளது. இப்பறவையை உலகின் வெப்ப மிதவெப்ப மண்டலப் பிரதேசங்களில் காணலாம். இப்பறவைகளுக்கு 17 சுழுத்து முன்செலும்புகள் உள்ளன. இப்பறவைகளுக்கு ஊதுமூலத் தசைகள் (*Syringal muscles*) இல்லையா. மேலாக குறு வியும் துளியில் தூக்கலாகவும் அகன்றும் தட்டையாகவும் காணப்படும். வெளிப்புறத்தில் குவிந்த பரப்புடன் காணப்படுகின்றன. கிழங்கு மெல்லியதாகவும் வளைபும் தன்மைபுடைய இரு வளைவுகளுடன் பொருத்தப்பட்ட ஒரு பெரிய

பையுடனும் காணப்படுகின்றது. இந்த பையின் தசைகள் படலத்தினால் மூடப்படாமல் காணப்படுகின்றன. இப்பறவைகளுக்கு தலையின் பக்கங்களிலும் கண்களைச் சுற்றிலும் இறகுகள் கிடையாது. இறகுகள் தடித்துக் காணப்படுகின்றன. வால் குட்டையாகவுள்ளது.

உதாரணங்கள் :

பெலிக்கேனஸ் ஒக்ரோக்ரோக் கோட்டேனஸ் (Pelecanus onocrototus)

இவைகள் கிழக்குப்பகுதி வெள்ளை பெலிக்கன்கள் அல்லது இளஞ்சிவப்பு பெலிக்கன்கள் (Eastern white or rosy pelican) என்றும் அழைக்கப்படும். இவை சுமார் 5 அடி நீளமுள்ள பறவைகளாகும். இவற்றின் வால் 8 அங்குல நீளமும், இறக்கைகள் சுமார் 2½ அடி நீளமும் இருக்கும்.

முதிர்ச்சியுற்ற பறவைகளில் மேலவகு ஊதாநிறமுடன் இருக்கும். இப்பறவையின் பையானது இளம் மஞ்சள் நிறத்துடன் இருக்கும். மூக்கும் மஞ்சள் நிறமாக இருக்கும். பாதத்தின் விரல்கள் இளஞ்சிவப்பு நிறத்துடன் இருக்கும். தோலினழமங்கள் மஞ்சள் நிறமாக இருக்கும்.

முதிர்ச்சியுற்ற வயதான பெண் பறவைகளில் சுமார் 4 அங்குல நீளமுடைய கொண்டையைக் காணவாம். ஆண் பறவைகட்கு கொண்டை கிடையாது. வாலில் 12 இறகுகள் இருக்கின்றன.

பெண் பறவைகள் ஆண் பறவைகளினிட உருவத்தில் தெரியதாக இருக்கும்.

பெலிக்கானஸ் பிலிப்பைன்சில் (Pelecanus philippensis)

இப்பறவைக்கு அவகில் புள்ளிகள் உள்ளன. ஆண் பறவைகள் சுமார் 5 அடி நீளமுள்ளன. இவற்றின் இறகுகள் 2 அடி நீளமுடையவைகள். வால் 1½ அடி நீளமுள்ளது. அவகு வெள்ளி ஊதா நிறமுடன் இருக்கின்றது. அதன் துணி மஞ்சள் நிறமுடன் உள்ளது. மூகத்தில் இறகுகள் கிடையாது. இப்பறவைக்கு தலையும் கழுத்தும் சாம்பல் நிறமாக இருக்கும். இப்பறவைகளின் இறகுகள் போர்வை போன்றிருக்கும். இவைகளுக்கு ஒரு தெரிய கொண்டை உண்டு. மேல்புற இறகுகள் சாம்பல் கலந்த வெண்மை நிறமுடையன, வால் பகுதியும் சாம்பல் நிறமாகவே இருக்கும். பொதுவாக இப்பறவை பார்வைக்கு சாம்பல் கலந்த வெண்மை நிறமாகவே இருக்கும். பெண் பறவைகளும் ஆண் பறவைகளும் உருவத்தில் ஒரே மாதிரி

பறவைகளின் வகைபாடு

யாகவே இருக்கும். இப்பறவைகள் மீன்களை ஆகாரமாக உண்ணும் இனம். நீர்நிலைகளுக்குள் நீதிச் சென்று மீன்களைப் பிடித்து தன் கழுத்தின் கீழ் பைகளுக்குள் நிரப்பிக் கொண்டு கரை நிலம்பும். இவ்வாறு இப்பறவைகள் அதிகப்படியான மீன்களைப் பிடித்து இரை



படம் 74. பெலிகானஸ் . பிலிப்பைன்ஸ் (Pelecanus philippensis)
(அங்குலம் புள்ளிகளோடடைய பெலிகான் பறவை)

யாக உண்பதால், மீனினத்திற்கு பெரிதும் சேதம் விளைகின்றன. இவை விரைவாக பறக்கும் சக்திவற்றவைகளாகும். இவை இரவு நேரங்களில் மரங்களின் மீது ஏறிக்கொண்டு துயில் கொள்ளின்றன.

இப்பறவைகள் பெருவாரியாக சேர்த்து கடப்பை ஜில்லாவில் கருகில் கூட்டமாகக் கூடி இனப்பெருக்கம் மேற்கொண்டதாகக் கூறப்படுகின்றது. இவற்றின் கூடுகள் வேப்ப மரங்களிலும் புளிய மரங்களிலும் காணப்பட்டன. இப்பறவைகளுடன் ஸ்டோர்க் (Stork) பறவைகளும் சேர்த்து வசித்ததாகவும், ஸ்டோர்க் பறவைகளின் மூட்டைகள் இப்பறவைகளின் மூட்டைகளுடன் கலந்திருந்ததாகவும்

கூறப்படுகின்றது. மூட்டையிலிருந்து இரு இனப்பறவைக் குஞ்சுகள் வெளியிவந்தன. அவற்றை இரு இனப்பறவைகளும் இரண்டு மைல் கனூக்கப்பால் சென்று நீர்த்தளையகளைக் கொண்டு வந்து குஞ்சுப் பறவைகளுக்கு ஊட்டி வளர்த்ததாகக் கூறப்படுகின்றது.

இப்பறவைகளில் சில ஹூஸின் மாதங்களிலும் மற்றும் சில நவம்பர் மாதங்களிலும் இனப்பெருக்கம் செய்ததாகக் கூறப்படுகின்றது. இவைகளின் கூடுகள் குச்சிகளாலானது. ஒரு சமயத்தில் மூன்று மூட்டைகளை இட்டு குஞ்சு பொருகின்றன.

குடும்பம்-2. ஃபேலாக்ரோக்கோரேசிடே (Phalacrocoracidae)

இந்தக் குடும்பப் பறவைகளை இரு வகைக்குடும்பங்களாகப் பிரிக்கலாம். கார்மோரான்ட் பறவைகளும் (Cormorants) பம்பு தாராய் பறவைகளும் இந்தக் குடும்பத்தைச் சேர்த்தவைகளாகும். இவை நீரில் மூழ்கி மீன்களை இரையாகப் பிடித்துண்ணும் பறவைகளாகும். இவற்றின் உடலின் மேல் பகுதி கறுப்பு இறகுகளால் போர்த்தப் பட்டுள்ளது. இவைகளுக்கு மிகவும் நீளமான கழுத்தும் நீண்டு ஒடுங்கிய அவுள்களும் உள்ளன. இவற்றின் வால் இறகுகள் விளைப் பாக இருக்கும். நாகித் துவாரங்கள் மிகவும் சிறியதாக இருக்கும். கழுத்துப் பகுதியில் 50 கழுத்து மூன்றெனும்புகளுள்ளன. இவற்றிற்கு ஒயிப்பெட்டித் தசைகள் (Syringal muscles) உள்ளன.

வகைக் குடும்பம்-1. ஃபேலாக்ரோக்கோரேசினே (Phalacrocoracinae)

இக்கிளைக் குடும்பத்தைச் சார்ந்த பறவைகளுக்கு அவதின் துவி நன்றாக வளைந்து காணப்படும். அவுள்கள் மெல்லியதாகவும் பக்க வளட்டிகள் ஒதுக்கப்பட்டும் இருக்கும். கழுத்திற்குக் மேற்ப்பை உண்டு. சிறகுகள் சாதாரண வடிவத்துடன் காணப்படும். வால் பகுதி 12 அல்லது 14 இறகுகளுடன் உருண்டை வடிவத்துடன் காணப்படும். இவற்றின் கால் விரல்களில் இறகுகள் உள்ளன. விரல்களில் நகங்கள் மிகவும் வளைந்து காணப்படும்.

உதாரணங்கள் :

ஃபேலாக்ரோக்கோராக்ஸ் கார்போசினேன்சிஸ் :— (Phalacrocorax Carboisensis) (அல்லது பெரிய இந்திய கார்மோரான்ட் பறவை) (The Indian large Cormorant)

இப்பறவைகள் சுமார் 33 அங்குல நீளமுடையவைகள். சிறகுகள் சுமார் 14 அங்குல நீளமிருக்கும். இவற்றின் அவுள்கள் மழுப்பு நிற

மாகவும் தெற்றி வெவீர் பச்சை நிறமாகவும் கழுத்துப்பை மஞ்சள் நிறமாகவும் இருக்கும். கால்களும் பாதங்களும் கறுப்பு நிறமாக இருக்கின்றன. இவற்றின் இறகுகள் சூனையானது. இனப்பெருக்கக் காலங்களில் ஆண் பறவைகளுக்கு தலையிலும், கழுத்திலும் வெள்ளை நிற மயிர் கற்றை போன்ற இறகுகள் தோன்றுகின்றன. பெண் பறவைகள் உருவத்தில் ஆண் பறவைகளை ஒத்தே காணப்படுகின்றன.

மூட்டையிலிருந்து வெளிவரும் குஞ்சுகளுக்கு உடலில் நிறகுகள் கிடையாது. குஞ்சு பொரித்த சில நாட்களுக்குப் பிறகே பொடி. இறகுகள் முளைக்கின்றன.

பெணிகள் பறவைகளைப் போன்றே கார்மோராண்ட் பறவைகளும் அகிதப்படிவான மீன்களை உணவாக உண்ணுகின்றன. இப் பறவைகள் தன் உடல் முழுவதும் தண்ணீரிலுள் அடித்தியிருக்கும்படி. வெகு அழகாக மூழ்கி நிரிந்து வரும் ஆற்றல் உள்ளப் பறவைகளாகும். இப்பறவைகள் நிறமையாகவும் விரைவாகவும் கழுத்தை நீட்டிக்கொண்டு பறக்கும் ஆற்றலுள்ள பறவைகளாக இருப்பினும் தரைவில் நடக்கும்பொழுது அருவகுப்பை மூட்டும்படி உள்ளன. இவைகளை சாதாரணமாக மரக்கிளைகளின் மீதோ குத்துச் செடிகளின் மீதோ வெய்யில் காய்த்துகொண்டோ அல்லது அடியிலும் இறகுகளைக் கொதித்தும் செய்துகொண்டோ இருப்பதைக் காணலாம். இவை இனப்பெருக்கக் காலங்களில் மரங்களிலோ, மீன்களிலோ கூட்டமாக கூடி வசிப்பதைக் காணலாம். இவைகளை பெல்சாரி ஜில்லாவில் அதிகமாகக் காணலாம். இவை ஒரே சமயத்தில் 4 முதல் 7 மூட்டைகள்வரை இடும்.

இதர உதாரணங்கள் :

ஃபேலாக்ரோக்கோரேக்ஸ் ஃபூஸிக்லேவில் (Phalacrocorax fuscicollis)

இவை சுமார் இரண்டடி நீளமுள்ள பறவைகள். நிறகுகள் 1 அடி நீளமிருக்கும். இவற்றின் அங்குகள் கரும் பழுப்பு நிறமுள்ளவைகள். அங்குலக்கடியில் சிவப்பு நிறமாக இருக்கும். உடல் மஞ்சள் நிறமாக இருக்கும். செவ்வையிலும் அதன் கற்றப்புறங்களிலும் இப்பறவைகளைக் காணலாம்.

ஃபேலாக்ரோக்கோரேக்ஸ் நைகர் (Phalacrocorax niger)

இவை சிறிய கார்மோராண்ட் பறவைகளாகும். இவை சுமார் 1½ அடி நீளமுள்ள பறவைகளாகும். இதன் நிறகுகள் சுமார் 9 அங்குல நீளமே இருக்கும். வால் 6 அங்குல நீளமிருக்கும்.

இவைகளை ஆறு, குளம், குட்டை முதலான இடங்களில் சாதாரணமாகக் காணலாம்.

கிளைக் குடும்பம்-2. அங்ஹிங்ஜினே (Anhinginae)

இப்பறவைகளின் அமைதி நீண்டும் மூளை கூர்மையாக கட்டிக் கொட்டும் வண்ணமும் உள்ளன. இது அவைகளின் கடைசி ஓரப் பகுதி களும் பற்கள் போன்ற கூர் விளிம்புகளுடன் காணப்படுகின்றன. வெளிநாடுத் துவாரங்கள் மிகவும் சிறியதாக உள்ளன. கழுத்து மிகவும் ஒவ்வியவாதாக உள்ளது. கழுத்துப் பகுதியில் 8ஆவது 9ஆவது கழுத்து மூன்றெலும்புப் பகுதியில் ஒரு வளைவு குறிப்பிட்டுச் சொல்லும் அளவிற்கு செம்மையாக காணப்படுகின்றது. இது போன்ற கழுத்து வளைவு அப்பறவைக்கு அநிலிரைவில் மீள்களை இரையாகப் பிடிப்பதற்குப் பயன்படுவதற்கான ஒரு தகவமைப்பு என்று கூறப்படுகின்றது. நிறங்களும் கூர்மையாகவே அமைந்துள்ளன. வால்பகுதியும் நீண்டு காணப்படுகின்றது.

உதாரணம் :

அங்ஹிங்ஜா மெலனோகேஸ்டர் (Anhinga melanogaster)

இந்திய டார்ட்டர் பறவைகள் அல்லது பாம்புதாரா (Indian darters or Snake bird) ஆன் பறவைகள் சுமார் 35 அங்குல நீள முடையவைகளாகும். பிள்ளும் இவற்றின் நிறங்கள் 13 அங்குலம் முதல் 14 அங்குலம்வரை இருக்கும். வால்பகுதி சுமார் 9 அங்குலம் இருக்கும்.

இப்பறவைகளிலும் கழுத்துப் பைகள் மஞ்சள் நிறமாக இருக்கும். கால்கள் கறுப்பு நிறமாக இருக்கும். தலை, முந்தலை, கழுத்து, முதுகுப் புறம் முதலிய பகுதிகள் கருமையான பழுப்பு நிறத்துடன் காணப்படுகின்றன. கழுத்தின்மேல் பகுதியிலும் முதுகுப்புற மேல் பகுதியிலும் உள்ள இறகுகள் தொற்றத்தில் செதில்களைப் போன்று காணப்படுகின்றன. கழுத்தின் முதுகுப்புற மையப் பகுதி மற்ற எல்லாப் பகுதிகளைவிட மிகவும் கருமையாக காணப்படும். கழுத்தின் ஓரப் பகுதிகளை மார்புப் பகுதியினின்றும் பிரித்துக் காணும்படி ஒரு வெளிர் நிற கோடு காணப்படுகின்றது. பிள்ளும் முதுகுப்புறத்தின் பின்பகுதியில் இறகுகள் கருமையான பழுப்பு நிறத்துடன் இருப்பதுடன், இறக்கைகள், முட்டை வடிவ வெள்ளைப் புள்ளிகளையுடையவையாக உள்ளன. இந்த வெள்ளைப் புள்ளிகளின் வடிவம் மார்பு வட்டையத்தின் விகேப்புலார் பகுதி வரும்போது உருவில் சற்று பெரிதாகிக் கொண்டே செல்லுமாறு அமைந்துள்ளது. மூகம்,

கண்மப்பகுதி தொண்டை முதலானவைகள் பழுப்புநிறப் புள்ளி களுடன் கூடிய வெள்ளை நிறமுடன் இருக்கின்றன.



படம் 75. அந்தரில்லா மெலனோஸ்டேசு (Anhinja melanogaster)
(பரம்புகாரா அல்லது டார்ட்டர்)

பெண் பறவைகள் வடிவில் ஆண் பறவைகளையே ஒத்திருக்கின்றன.

இவை மீன்களையே இரையாக உண்ணும் காரணத்தினால் நீர் நிலைகளுக்கருகில் காணலாம். இவைகளும் கார்மோரான்ட் பறவை களைப்போன்ற தலை, கழுத்து மட்டும் வெள்ளைத் தெரியும்படி நீரில் மூழ்கி நீந்தி மீன்களைப் பிடித்து உண்ணுதலாக் காணலாம். இப் பறவைகளை முக்கியமாக தென்இந்தியாவில் திருவிதாங்கூர், சென்னை, செங்கல்பட்டு முதலான இடங்களில் காணலாம். இனப்பெருக்கக் காலங்களில் கூட்டமாக கூடி வசிக்கும். இனப்பெருக்கக் காலங்களில் இப்பறவைகளைக் கார்மோரான்ட் பறவைகளுடனும் மற்ற பறவை களுடனும் சாதாரணமாக கூட்டமாக கூடி வாழ்வதைக் காணலாம். ஒரு சமயத்தில் 3 அல்லது 4 முட்டைகளிட்டுக் குஞ்சு பொரிக்கின்றன.

குடும்பம்-3. சுலிடே (Sulidae)

பனம்பொருத்திய மூளை கூர்மையான அலகுகள் இக்குடும்பத்தைச் சார்ந்த பறவைகளுக்குண்டு. மூதிரச்சிபுற்ற பறவைகளில் வெளிநாகித்துவாரம் மூடிய நிலையில் இருக்கும். கழுத்தில் 18 முள்ளெலும்புகளுள்ளன. கீழ்க்கின் உள்பகுதி ரம்பம் போன்றிருக்கும். இப்பறவைகளுக்கு நீளமான கூர்மையான சிறகுகள் உள்ளன. பாதத்தின் மையவிரலில் அகன்ற சீப்பு போன்ற ஓரங்களைவுடைய கூர் நகமுள்ளது.

உதாரணம் 1. குள வியோக்கோகேட்டர் ப்ளோட்டஸ் (Sula leucogaster plotus)

இதை பழுப்பு கானெட் பறவைகள் (Brown gannet) என்றும் அழைக்கலாம். ஆண் பறவை சுமார் 32 அங்குல நீளமுள்ளது. இதன் வால் 8 அங்குல நீளமும் சிறகு 15 அங்குல நீளமும் உள்ளன.

அலகு வெளிர் மஞ்சள் கலந்த வெண்மை நிறத்துடன் உள்ளது. வாலில் 18-19 இறகுகள் உள்ளன. பெண் பறவைகள் கருவத்தின் ஆண் பறவைகளை ஒத்தேயிருக்கும்.

இப்பறவைகளை தென் இந்தியாவில் எங்காள விரிசுடா பகுதி, மலபார் கடற்கரைப் பகுதிகளில் காணலாம். இவை சமுத்திரப் பறவைகளாகும். இவை மீன்புச்சிகளின்மீது தனித்த பகுதிகளில் இனப்பெருக்கம் செய்கின்றன. இவை ஒரு சமயத்தில் ஒரே ஒரு முட்டைதான் இடும். இவை மிகவும் திறமையுடன் பறக்கும் சக்தி வாய்ந்த பறவைகளாகும். இவைகளும் மீன்களையே உணவாக உண்ணுகின்றன. இப்பறவைகளை எளிதில் பிடித்துவிட முடியும்.

உதாரணம் 2. குள குள ருப்ரியஸ் (Sula Sula rubripes)

இவை ஆந்திரேலியாவில் வசிக்கும் செங்காக்களைவுடைய கானெட். (The Australian Red legged gannet) பறவைகளாகும். இவற்றின் கழுத்துப் பைகள் சதைகளின் நிறத்தை ஒத்திருக்கும்.

உதாரணம் 3. குள டேக்ஸ்டேட்டா டர்சனேட்டா (Sula lactylatra petronata)

இப்பறவைகளை ஆந்திரேலியாவின் மாலக் கானெட் அல்லது பூபி (The Australian Masked gannet or Booby) என்று அழைப்பர். இறகுகளின் கீழ்ப்பகுதி வெங்கை நிறமுடன் அமைந்திருக்கும். மேல்புறம் கறுப்பழுப்பு அல்லது கறுப்பு நிறமுடையது.

குடும்பம்-4. :பேத்தோனிடே : (Phaethonidae)

இக்குடும்பத்தைச் சேர்ந்த பறவைகள் உருவில் ஒரு சிறிய கல் (Gall) பறவையை ஒத்திருக்கும். இவைகளில் கார்டோராண்ட் கானெட் ஆகிய இரு பறவைகளின் பண்புகளும் கலந்து காணப்படும். இவற்றின் பழக்கவழக்கங்கள் பெண் பறவைகளை ஒத்திருக்கின்றன. இப்பறவைகளுக்கு நல்ல வெண்மைபான நிறமும் அதில் கறுப்புப் புள்ளிகளும் காணப்படுகின்றன. இவற்றின் அவதூறுகள் வளைந்து காணப்படாமல் கூர்மைவாகவுள்ளன. கழுத்தில் 15 முள்ளெலும்புகளுள்ளன. ஊதாழும் தசைகள் இவற்றிற்கு உண்டு. மற்றும் இக்குடும்பத்தைச் சேர்ந்த பறவைகளின் மூட்டைகளில் புள்ளிகளை யுடைய மூட்டைகளை இடுவது சிறப்புப் பொருத்திய செயலாகும். அங்கு தடித்து காணப்படும், சிறகுகள் மிகவும் நீளமாக உள்ளன.

உதாரணம் : 1. :பேத்தோன் ருப்ரிகாண்டா ருப்ரிகாண்டா (Phaethon rubricanda rubricauda)

இவை வெப்பு வானிலையுடைய வெப்ப தேசத்து பறவைகளாகும் (The red tailed tropic birds). இவை சுமார் 3 அடி நீளமுள்ள பறவைகளாகும். சிறகுகள் 1½ அடி நீளமும் வால் 1 அடி நீளமும் உள்ளது. இவற்றின் அலகு மஞ்சள் நிறமுடையதாக உள்ளது. கால்களும் பாதத்தின் அடிப்பகுதியும் மஞ்சள் நிறமாக இருப்பினும் பாதத்தின் மறி பகுதி கறுப்பாக உள்ளன. வாலில் 16 வால் இறகுகள் உள்ளன. இவைகளும் வங்காள விரிசுடாவில் கடற்கரை பகுதிகளில் காணப்படுகின்றன.

உதாரணம் : 2. :பேத்தோன் லெப்துரஸ் லெப்துரஸ் (Phaethon lepturus lepturus)

வெள்ளை நிறமுடைய வெப்ப மண்டலப் பறவைகள் (The white tropic birds). இவை வெள்ளை நிறமுடைய பறவைகளாகும். இவைகளை இந்தியாவின் கடற்கரைப் பறவைகள் என்றும் கூறலாம்.

குடும்பம்-5. :ஃரிக்கேட்டே (Fregatidae)

இக்குடும்பத்தைச் சேர்ந்த பறவைகளின் பாதத்தில் நான்கு விரல்களும் ஒரு படவத்தினால் மூடப்பட்டிருக்க காணப்படுகின்றன. கைவ எலும்பு, மார்பெலும்பின் அடித்தட்டைக் கலந்துடன் தள்ளாக விநாடப்பாக அமைந்துள்ளது. இவற்றிற்கு 15, கழுத்து முள்ளெலும்புகள் உள்ளன. அவதூறுகள் நீண்டு, மிகவும் நீளமாக காணப்படுகின்றன. நுனியில் மிகவும் வளைந்துமுள்ளன. இரு அவதூறுகள் நுனியில் சிறு தோக்கி வளைந்துள்ளன. இவற்றிற்கு ஒரு

பெரிய குளார் (Gular) பை உள்ளது. கிறித்கள் மிகப்பெரியவாக உள்ளன.

உதாரணம் : ஃப்ரிகேட்டா அன்ட்ரூவ்ஸி (Fregata andrewsi)

இவை சுமார் 40 அங்குல நீளமுள்ள பறவைகள். கிறித்கள் 24 அங்குலம், வால் 19 அங்குல நீளமும் உள்ளன.

ஆண் பறவைகளின் உடல் கறுப்பு நிறத்துடனும் வயிற்றுப் பகுதிமட்டும் வெள்ளையாகவும் இருக்கும். பெண் பறவைகளின் உடல் கறுப்பாக இருப்பினும் தொண்டை பகுதி வெள்ளை நிறமாக இருக்கும். இப்பறவைகளை தென் இந்தியாவில் மங்கலூர், மலபார் கடற்கரைப் பகுதிகளில் காணலாம் என்று கூறப்படுகின்றது. இவைகளுக்கு சிறப்பான பறக்கும் திறன் உள்ளன. இப்பறவைகள் காமெட், கல், டென் முதலான பறவைகளை துரத்திச் சென்று பிடித்து இரையாக உண்ணும் பழக்கமுள்ளவைகள். இவைகளின் கடுகன் குச்சிகளினால் ஆனது. இக்கடுகளை மல்களினும், புதர்களினும் காணலாம். இப்பறவைகள் ஒரு சமயத்தில் ஒரே ஒரு மூட்டை வெள்ளை நிற மூட்டை இடுகின்றன.

வரிசை 5. சிக்கோனிடார்யில் (Ciconiiformes) அடங்கு ஹீரோடியோனெஸ் (Herodiones)

இப்பறவைகளின் அண்ணம் டென்மோநேத்தஸ் பிரிவைச் சேர்ந்தது. இவற்றிற்கு இரண்டு கரோட்டிட் தமனிகளுள்ளன. என்னெனய்ச் கரப்பிகள் இழைக் கொத்துக் குஞ்சம் போன்ற பகுதி வுடன் காணப்படுகின்றன. இவற்றிற்கு மிகவும் நீளமான பிள்ளை கால்களும் நீளமான விரல்களும் நீரில் நடந்து செல்லுதற்கேற்ப அமைந்துள்ளன.

இவ்வரிசையை மூன்று கிளை வரிசைகளாகப் பிரிக்கலாம் :

உள் வரிசை-1. ப்ளேட்டாலியா (Platalea)

உள் வரிசை-2. சிக்கோனியே (Ciconiidae)

உள் வரிசை-3. ஆர்டீயா (Ardeae)

உள் வரிசை-1. ப்ளேட்டாலியா

இப்பறவைகளின் மேலகு பின்புறமாக நீண்டும், வளைத்தும் காணப்படும். கழுத்தில் 17 மூன்றெழும்புகள் உள்ளன. கைதுகுழம் தசைகள் உள்ளன.

ப்ளேட்டாலியே : இக்குடும்பப் பறவைகளுக்கு இரண்டு அககுப் பகுதிகளும் தங்கு தட்டையாக நீட்டப் பெற்று மூன்புறம் கரண்டி

வடிவில் அமைந்திருக்கும், நாளித்துவாரங்கள் அனகின் அடியில் அமைந்துள்ளது. காங்கள் மிகவும் நீளமாக இருக்கும், காங்களின் விரல்கள் நீளமாக இருப்பதுடன் அடியில் தோலிழைமங்களால் பிணக்கப்பட்டுள்ளன.

உதாரணம் : ப்ளேட்டாவியா ஸ்பூகோரோடியா மேஜர் (*Platalea leucorodia major*)

இவை சாதாரண இடம்பெயர் கரண்டி வாய்ப் பறவைகளாகும். இவை சுமார் 33 அங்குல நீளமிருக்கும், வால் 5 அங்குல நீளமுடனும் இறகுகள் 15 அங்குல நீளமுடனும் உள்ளன. அவரு கறுப்பு நிறத்துடன் இருத்தாலும் துவியில் மஞ்சள் நிறத்துடனானது. தொண்டைக் கூடியில் செம்மை கலந்த மஞ்சள் நிறமுள்ளது. காங்களும் பாதங்களும் கறுப்பு நிறமாக உள்ளன.



படம் 76. ப்ளேட்டாவியா ஸ்பூகோரோடியா மேஜர் (*Platalea leucorodia major*)
கரண்டிவாய்ப் பறவை (Spoon bill)

இறகுகள் வெண்மை நிறத்துடன் உள்ளது. இவை புழு பூச்சிகள், கிரன்டேஷியன்கள், நீர்த்தாவரங்கள், சிறு சிறு பீன்கள், தவளைகள் முதலானவற்றை உணவாகக் கொள்கின்றன. குவீர் காலங்களில் கூட்டமாகக் கூடி இனப்பெருக்கம் செய்கின்றன. இவற்றின் கூடுகளை மரங்களில் காணலாம். இவை ஒரு சமயத்தில் 4 முட்டைகளிலும் பழக்கமுள்ளவைகளாகும்.

குடும்பம் : த்ரஸ்க்கியார்னிடே (Threskiornidae).

இக்குடும்பத்தைச் சேர்ந்த பறவைகள் மிகவும் உயரமானவைகளாகும். அவைகள் நீளமாக உள்ளன. அவைகள் பக்கவாட்டில் ஒடுங்கியும் முன்புறம் மேடுநாக்கி சிறிது வளைத்தும் காணப்படும். தலையும் கழுத்தும் இறகுகளற்றுக் காணப்படுகின்றன. கால் விரல்கள் நீளமாகவும், தேரவிழைமத்தால் சேர்க்கப்படும் காணப்படுகின்றன. வாலில் 12 வாலிறகுகள் உள்ளன. இனப்பெருக்கக் காலங்களில் ஆழ்மீட நிறமுடைய இறகுகள் முளைக்கின்றன.

உதாரணம் : த்ரஸ்க்கியார்னிடே மெலனோசெபாலஸ் (Threskiornis melanocephalus) அல்லது வெள்ளை ஐபில் பறவை (White ibis)

இவை சுமார் 30 அங்குல நீளமுள்ளன. அவைகள் கறுப்பு நிறமுடையவை. கழுத்தும் தலையும் கருநீல வண்ணமுடன் காணப்படுகின்றன. இறகுகள் பொருத்தியுள்ள தோல் இரத்தச்



படம் 77. த்ரஸ்க்கியார்னிடே மெலனோசெபாலஸ் (Threskiornis melanocephalus) (ஐபில் பறவை-Ibis)

வெப்ப நிறமுடையது. இறகுகள் வெள்ளை நிறமுள்ளவை. இனப்பெருக்கக்காலங்களில் கழுத்தைச் சுற்றிலும் வெண்ணைமையான இறகு

கனாக் மூடப்பெற்றிருக்கும். பெண் பறவைகள் ஆண்பறவைகளைப் போன்றே இருக்கும். இவை புழுபூச்சிகள், மெல்லுடவிகள் முதலானவற்றை உணவாகக் கொள்ளின்றன. இப்பறவைகள் எப்பொழுதும் மந்தைவாக நீர் திங்களுக்குருகிலுள்ள ஈரப்பகுதிகளில் வாழும் பழக்கமுள்ளவைகளாகும்.

இனப்பெருக்கக் காலம் நவம்பர் முதல் பிப்ரவரி மாதம் வரை வாகும். பெரிய மரங்களில் கூடுகட்டுகின்றன. ஒரு சமயத்தில் 2 முதல் 4 மூட்டைகளிலுள்ளன.

உதாரணம் : சூட் ஐயில் பேய்நிலோசஸ் (*Pseudibis papillosus*)

இது இந்திய சுறுப்பு ஐயில் பறவையாகும் (*The Indian black ibis*). முதிர்ச்சியுற்ற பறவைகளின் கொண்டை சிவப்பு மூழ்கனாக் மூடப்பட்டுக் காணப்படுகின்றது. இப்பறவைகளின் கால்களும் பாதங்களும் சிவப்பு நிறமுடையவைகள். மேற்குக் கடற்கரைப் பகுதி களில் இப்பறவைகளைச் சாதாரணமாகக் காணலாம். தென் இந்தி யாவின் மைசூர் பகுதிகளிலும் காணலாம். இவை ஈரப்பாங்கான இடங்களிலே வரண்ட பகுதிகளையே விரும்பி அங்கீகரிக்கவில்லை. இவை சோடிகளாகவோ அல்லது சிறிய கட்ட மாகவோதான் வாழ விரும்புகின்றன. இவை தானியங்கள், புழு, பூச்சிகள், கிரம்பேஷியங்கள் முதலானவற்றை உணவாகக் கொள் ளின்றன. இவை பெரிய மரங்களில் குத்தி இருக்கும் தன்மை உள் ளைகள். இனப்பெருக்கக் காலங்களில் இவை பெரிய குரவில் கத்தும் பழக்கமுள்ளவைகளாகும்.

உதாரணம் : ப்ளிகேடில், பால்சினெல்லஸ், பால்சினெல்லஸ் (*Plegadis, falcinellus, falcinellus*)

இவற்றை க்ளோசி ஐயில் (*Glossy ibis*) பறவை என்றும் கூறுவர். இவை 22 அங்குல நீளமுள்ளவை. சிறகுகள் 10 அங்குல நீளமுள்ள வைகள். அவருகள் வெணீர் பச்சை நிறமுடையவை. இவை மரங்களில் கூடுகட்டுகின்றன.

உள்ளரிசை-2, சிக்கோனியே (*Ciconiidae*)

ஸ்டோர்க் (*Stork*) பறவைகளே இவ்வூர் வரிசைக்கு முக்கிய உதாரணங்களாகும். இவைகளுக்கு 17 அங்குல நீளமுள்ள பாதங்களே உள்ளன. இவைகளுக்கு ஊதுமழம் தளசுகள் இவ்வாறு காரணத்தினாலேயே இவை ஒலி எழுப்பும் நிறைந்த பறவைகளாகும். அவருகளை உரசி ஒலி எழுப்புகின்றன. பாதத்தின் மையவிரலில் குறிப்பிடத் தக்க சீப்பு போன்ற ஓரத்தினை யுடைய கூர் தகம் கிடையாது.

உதாரணம்: சிக்கோனியா சிக்கோனியா (Ciconia ciconia)

வெள்ளை ஸ்டார்ச் பறவை (White stork)

ஸ்டார்ச் பறவைக்கு நீண்ட, தடித்த நுனியில் செவ்வச் செவ்வக் கூர்மையான அலகுகள் உள்ளன. இவை 3½ அடி நீளமுள்ள பறவைகளாகும். அவை இரத்தச் சிவப்பு நிறமுடன் காணப்படும். கால்களும் சிவப்பாகவே காணப்படும். இறகுகள் வெண்மையாகக் காணப்படும்.

ஆண் பறவைகளும் பெண் பறவைகளும் உருவத்தில் ஒரே மாதிரி பாகவே இருக்கும். இவை வடஇந்தியாவிலும், நக்காணப் பகுதியிலும் வசிக்கும் பறவைகளாகும். இவை தவளைகள், மீன்கள், பாம்புகள் முதலானவற்றை இரையாக உண்ணுகின்றன. இவை குளிக்காலங்களில் வலசை போகும் பழக்கமுள்ள பறவைகள்.

உதாரணம்: டிஸ்ஸெஸுரா எப்பிஸ்கோபா (Disoura episopa)

இவை இந்தியாவில் வசிக்கும் வெள்ளைக் கழுத்து ஸ்டார்ச் பறவைகளாகும். இவைகளுக்கு முந்தைய, முகப்பகுதி முதலிய பகுதிகள் இறகுகளற்ற காணப்படும். கொண்டை கறுப்பாக இருக்கும். இவை தென்இந்தியாவில் நீலநிசிப் பிரதேசத்தில் வசிக்கின்றன. இவை ஆறு, குளம், குட்டைக்கருகிலும், நெல் வயல்களிலும் சாதாரணமாகக் காணப்படும் பறவைகளாகும்.

உதாரணம்: சிக்னோரின்க்கல் ஆசியாட்டிக்கல் (Xenorhynchus asiaticus)

இவை கறுப்புக் கழுத்தினையுடைய ஸ்டார்ச் பறவைகளாகும். அவைகள் கறுப்பாக இருக்கும். கால்களும் விரல்களும் பவளச் சிவப்பாக இருக்கும். இவை நீர்நிலைகளருகிலே வசிக்கும்.

உதாரணம் : லெப்டாப்டீலஸ் டூபியஸ் (Leptopelis dubius)

இவைகளுக்கு அட்ஜுடன்ட் (Adjutant) என்ற மறு பெயரும் உண்டு.

இவை ஐந்தடி உயரமுடைய மிகப்பெரிய பறவைகளாகும். வயர் சுமார் ஓரடி நீளமும் இறக்கைகள் சுமார் 3½ அடி நீளமாகவும் இருக்கும். இவற்றின் அவு குவெலிர்சிவப்பு (Pink) நிறமாக உள்ளது. தலைப்பகுதியும் சிவப்பாக இருக்கும். ஆனால் முந்தையப் பகுதி கறுப்பு நிறமாக உள்ளது. கழுத்து குறிப்பிடத்தக்க முறையில் குங்குமப்பூ நிறம் கலந்த மஞ்சள் நிறத்துடன் உள்ளது. கழுத்துப்பை வெளிரிவப்பு நிறமாக உள்ளது. கால்களும் விரல்களும் நச்சு

பழுப்பு நிறமாக உள்ளன. இப்பறவைகளில் சுழத்துப்பை சுமார் 13 அங்குலம் முதல் 16 அங்குலம் வரை நீளமுள்ளதரவும் தேவைக் கேற்ப நீளமாக்கவும் சுருக்கவும் கூடிய தன்மையுடன் அமைந்திருப்பது குறிப்பிடற்குச் சொல்லக் கூடிய ஒரு அம்சமாகும்.

ஆண் பறவைகளும் பெண் பறவைகளும் உருவில் ஒரே மாதிரியாகவே விருக்கும்.

இப்பறவைகள் தென் இந்தியாவில் பொதுவாகக் காணப்படுவ திவ்லை. மைசூரில் இப்பறவைகளைக் காணலாம்.

இவை கூட்டம் கூட்டமாக கூடி வாழும் தன்மையுடையவை. இனப் பெருக்கம் செய்யும் காலங்களில் பர்மாவில் கூட்டமாகக் காணப்பட்டன.

உதாரணம் : மெட்டாப்டிலாஸ் ஜவானிக்ஸஸ் (*Leptopilos javanicus*)

இவை சிறிய அட்ஜுடன்ட் பறவைகளாகும் (*Smaller adjutant*). இப்பறவைகள் மேற்குறிய பறவையை ஒத்தே இருக்கும்.



படம் 78. மெட்டாப்டிலாஸ் டூபியஸ் (*Leptopilos dubius*)
[அட்ஜுடன்ட்-*Adjutant*]

உதாரணம் : அனஸ்டமஸ் ஆசிடன்ஸ் (*Anastomus oscitans*)

இவை திறந்த அவகுப்பறவைகள் (*Open billed birds*). இவை சுமார் 32 அங்குல நீளமுள்ள பறவைகளாகும். வால் 7 அங்குல நீளமும் இறக்கைகள் 17 அங்குல நீளமும் உடையன. இவைகளின் அவகுகள் வெளிப்பாச்சு நிறமுடையன. ஏரி, குளம், குட்டை முதலிய இடங்களில் இப்பறவைகளைப் பார்க்கலாம்.

உள் வரிசை 3. ஆர்டேசே (*Ardese*)

நாரைகளும் அதன் இனப்பறவைகளும் இங்வுள் வரிசையில் அடங்கும். 18 முதல் 20 வரை சுழுத்து முள்ளெலும்பிகள் இவற்றிற்குண்டு.

குடும்பம்-ஆர்டிடே (*Artidae*)

இக்குடும்ப பறவைகளுக்கு அவகுகள் மிகவும் குறுகியும் நீண்டும் காணப்படும். கால்களும் நீண்டு காணப்படும். வால் குடையாகக் காணப்படும். தலையில் கொண்டை உள்ளது.

உதாரணம் : ஆர்டியா மான்யூரியா மேனியென்சில் (*Ardea purpurea manillensis*)

கிழக்குப் பகுதி வெள்ளைநா நாரைகள் (The eastern purple heron)

இவற்றின் அவசுகள் மஞ்சள் நிறமாக இருக்கும். தலையில் அழகான கொண்டைச் சிகரம் உண்டு. இறகுகள் சாம்பல் நிறமாக இருக்கும். இவற்றின் வால் இறகுகள் கனர்ப்பாக இருக்கும். இவைகளை ஆறு, குளம், குட்டை முதலான நீர்த் தீவங்களிலுள்ள கானலாம். இப்பறவைகளை கோதாவரி, கர்டூல், தர்மபுரி, திருவிதாங்கூர் முதலிய ஜில்லாக்களில் காணலாம். இவை பிற பிராணிகளால் அச்சுறுத்தப்படும் பொழுது பெரிய குரலில் ஒலி எழுப்பும் தன்மை உடையவை.

உதாரணம் : ஆர்டியா சினிரியா ரெக்டிரோஸ்ட்ரில் (*Ardea cinerea rectirostris*)

கிழக்குப் பகுதி சாம்பல் நாரைகள் (Eastern gray heron)



படம் 79. ஆர்டியா சினிரியா ரெக்டிரோஸ்ட்ரில்
(*Ardea cinerea rectirostris*)
[சாம்பல் நாரைகள் (Grey herons)]

இப்பறவைகளில் தலை வெள்ளை நிறமுடன் இருக்கும். சாதாரணமாக நீர் நிலைகளுக்கருகில் காணலாம்.

உதாரணம்: எக்ரெட்டா அல்பா மடெஸ்டா (*Egretta alba modesta*)
கிழக்குப் பகுதி பெரிய எக்ரட் (The Eastern large egret)

இவற்றின் அறக்கள் ஆரஞ்சு கலந்த மஞ்சள் நிறமுடையவை. கால்களும் பாதங்களும் கறுப்பு நிறமுடன் உள்ளன. இவற்றின் இறக்கள் வெள்ளை நிறமுடையவைகளாகும். வேட்டைநாய்க்கு என்னும் பறவைப் புகலரையில் இப்பறவைகள் வசிக்கின்றன.

உதாரணம்: எக்ரெட்டா இன்டெர்மீடியா இன்டெர்மீடியா (*Egretta intermedia intermedia*)

இந்திய சிறு எக்ரட் பறவை (Indian smaller egret)

இப்பறவைகளின் இறக்கள் வெள்ளை நிறமாக உள்ளன. நீர் நிலைகளுக்கருகே வசிக்கின்றன. இவற்றிற்குக் கொண்டைப் பகுதி இடையாது.

உதாரணம்: எக்ரெட்டா கார்செட்டா கார்செட்டா (*Egretta garzetta garzetta*)

சிறிய எக்ரெட் பறவையாகும் (small egret)

இவை நீர்த்நிலைகளுக்கருகில் காணப்படுகின்றன. கொண்டைப் பகுதி இரண்டு நீளமான மெல்லிய இறக்களால் ஆனது.

உதாரணம்: பிபுல்பஸ்க்கஸ் ஐபிஸ் காரோமேன்டஸ் (*Subulcus ibis coromandus*)

இப்பறவைகளை மாட்டுமத்தை எக்ரெட் பறவைகள் (The cattle egret) என்றும் அழைக்கலாம்.

இப்பறவைகளை நெல் வயல்களுக்கருகில் மத்தைகளாக காணலாம். மாடுகளின் கூட்டத்திலும் தனித்தோ கூட்டமாகவோ இப்பறவைகளைக் காணலாம். இவை வெட்டுக்கிளிகளையும் மற்ற பூச்சிகளையும் உணவாக உண்ணுகின்றன.

உதாரணம்: டீனிக்ரெட்டா ஆஷா (*Demigregatta asha*)

இந்திய ஈரணம் ஈரக்கை (The Indian reef heron)

இப்பறவைகளை கழிமுகங்களுக்கருகிலும் (Estuary) கடற்கரை ஓரங்களிலுமே காணலாம். நிருவிதாங்கூர், எண்ணூர் முதலான இடங்களில் வசிக்கின்றன.

உதாரணம்: ஆர்டிகோலா கிரேயி (*Ardeola greyii*)

இவைகளை குள நாயகன் அல்லது வயல் பறவைகள் (Pond-heron or Paddy bird) என்று அழைக்கலாம். அவை ஊதா நிறமுடைய உள்ளது. இப்பறவைகளை நெல் வயல்களுக்குடில் சாதாரணமாகக் காணலாம்.

உதாரணம்: ப்யூட்டோரைடெஸ் ஸ்ட்ரீயேட்டஸ் ஜவானிகஸ் (*Butorides striatus javanicus*)

இவற்றை சிறிய பச்சை நிற இந்திய நாயகன் (The Indian Little green Heron) என்று அழைப்பர்.

இப்பறவைகள் மரங்கள், புதர்கள் முதலிய இடங்களில் மறைந்திருப்பதால் பகல் நேரத்தில் காணமுடியாது. இவை அதிகாலையிலோ, அந்நி மாலையிலோ உணவைத் தேடி உண்ணுகின்றன. நீர்த்நிலைகளுக்குடில் இவை வசிக்கின்றன. கொண்டை வெள்ளை நிறமுடையது.

உதாரணம்: நிக்டிகோரேக்ஸ் நிக்டிகோரேக்ஸ் (*Nycticorax nycticorax*)
இரவுநாயகன் (The night Heron)

இவை பகல் பொழுதில் மரத்தின் மீதும் புதர்களிடையேயும் மறைந்திருந்து இருட்டுகின்ற மாலையிலோ நேரத்தில் வெளிவந்து உணவைத் தேடுகின்றன. பறக்கும் பொழுது இவை பெரிய ஒலி எழுப்பிக் கொண்டே பறக்கின்றன.

உதாரணம்: கர்ஸாக்ஸியஸ் மெலனோபஸ் (*Gorsakius melano phus*)
மலேயா பிட்டர்ன் (The Malay Bittern)

இப்பறவைகளுக்கு தலையும் கொண்டையும் கறுப்பு நிறமாக இருக்கும். கொண்டையிலுள்ள இறகுகள் ஒவ்வொன்றிற்கும் ஒரு வெள்ளைப் புள்ளி உண்டு. நாகித் துவாரங்கள் கண்ணாக்கு மேலே அமைந்துள்ளன. இவைகளை நீலநிற மலைப்பிரதேசங்களில் காணலாம். நிரூபிதாங்கூர்ப் பகுதிகளை இனப்பெருக்கம் செய்யும் இடங்களாக இப்பறவைகள் தேர்ந்தெடுத்ததாகக் கூறப்படுகின்றது.

வரிசை-6. ஃபோனிக்சே ஃப்டெரி ஃபர்மிஸ் (Phoenicopteriformes)
அவற்று ஃபோனிக்சே ஃப்டெரி (Phoenicopteri)

இவ்வரிசை சார்ந்த பறவைகளுக்கு அவைகள் குறிப்பிடத்தக்க மூன்றுவிடம் அமைந்துள்ளன. இப்பறவைகளின் அவைகள் மென்மையான மெய் தோலினால் மூடப்பட்டுள்ளன. அவகின் துணி

கீழ்ப்புறமாக வளைந்து காணப்படுகின்றன. கீழங்கு தடித்தும் அசையாமல் பொருத்தப்பட்டும் உள்ளது. மேலங்கு நிறியதாகவும் அசையும்படி பொருத்தப்பட்டும் உள்ளது. இப்பறவைகளுக்குக் கழுத்துப் பகுதியும் காங்கும் மிகவும் நீண்டு இவைகளின் உணவு உண்ணும் தகவமைப்பிற்கேற்ப அமைந்துள்ளன. அவைகளின் இரு ஓரத்திலும் தட்டு போன்ற அமைப்புள்ளது. இப்பறவைகள் ஆழமான தண்ணீரிலுள் நின்று கொண்டு கழுத்தினை நன்றாக கீழ் நோக்கி வளைத்து தலைப்பகுதியை தலைகீழ் நிலையில் வைத்துக் கொள்கின்றன. அவ்வாறான நிலையில் கீழங்கு மேலே தெரியும்படி அமைகின்றது. தலையை பக்க வாட்டில் அசைக்கும் பொழுது தண்ணீருடன் உணவுப் பொருட்களும் சேறும் சேர்ந்து வாயிலுள் சென்று, அவைகளின் ஓரக் கலிலுள்ள குறிப்பிடத்தக்க தட்டுகளின் வழியாக நீரும் சேறும் வெளிப்பெறிகின்றது. இவற்றின் பாதங்கள் குட்டையாக இருக்கும். முன்பக்க விரல்கள் தோலிழைமயக்களுடன் காணப்படுகின்றன. பின்பக்க விரல் பெரிதும் ஒடுங்கியே காணப்படுகின்றது. கழுத்தில் 18 அல்லது 19 முள்செண்களும்புகளும்உள்ளன. கரோட்டிட் தமனிகளில் வலது புறத்தமனி இடப்புறத்தமனியைவிட நீளமாகவும், கழுத்தின் அடிப்பகுதியில் இரு கரோட்டிட் தமனிகளும் இணங்கும் காணப்படுகின்றன. சீக்கங்கள் அல்லது முட்டுக் குழாய்கள் இவ்வரிசை சார்ந்த பறவைகளில் மிகவும் பெரியதாகியிருக்கின்றன.

குடும்பம்: ஃபோனிக்டேர் (Phoenicopteridae)

உதாரணம்: ஃபோனிக்டேர் அன்டிகுவோரம் (Phoenicopterus ruber antiquorum)

ஃபிளமிங்கோ (Flamingo)

ஆண் பறவைகள் சுமார் 50 அங்குல உயரமுள்ளதாக உள்ளன. அதன் நெருக்கம் 1½ அடி நீளமுள்ளவையுள்ளன. அங்கு சதைபின் நிறத்தைப் போன்று இளஞ்சிவப்பு நிறம் உள்ளது. அவளின் துணிப் பகுதியும் ஓரப்பகுதிகளும் கறுப்பாக உள்ளன. இப்பறவைகளின் காங்களும் பாதங்களும் வெளிர் சிவப்பு நிறம் கலந்த சிவப்பு நிறத் துடன் காணப்படுகின்றன. பெண் பறவைகள் ஆண் பறவைகளைவிட உருவில் நிறியதாக இருக்கும். ஆண் பறவைகளைக் காட்டிலும் பெண் பறவைகளுக்கு இறகுகளில் பல வண்ணங்கள் கிடையாது.

குஞ்சப் பறவைகளில் தலை, கழுத்து, உடல் முதலிய பகுதிகளில் சாம்பல் கலந்த பழுப்பு நிறமாக உள்ளன. செவ்வியை அடுத்துள்ள சிவ பகுதிகளில் இப்பறவைகளைக் காணலாம். தலையுட்கோடி முதலிய இடங்களிலும் இப்பறவைகளைக் காணலாம். இவை கூட்டமாக நடக்கும் பொழுது ஒரே சீராகவும் ஒழுங்காகவும் நடக்கின்றன.

கனவுப் பொருளை உண்ணும் பொழுது தலையை தண்ணீர்க்கடியில் தலைமீறாக வைத்துக் கொண்டு சேற்றிணையும் தண்ணீரையும் ஊய்ந்து எடுத்துச் சென்று அத்துள்ள புழுப் பூச்சி முதலியவற்றினை



படம் 80. கிபொலிக்கொப்ரைஸ் குப் ஏஷ்டிக்கோரம்
[கிபொலிக்கோ (Flamingo)]

கட்கொண்டு தண்ணீரையும் சேற்றிணையும் அவருளின் ஓரங்களி லுள்ள தட்டுகளின் வழியாக வெளியே விட்டு விடுகின்றன. இவை மத்தை மத்தையாக ஏலிக்கரை ஓரங்களிலும், கடற்கரை ஓரங்களிலும் தண்ணீரிலும் இரைதேடி அவ்வதைக் காணலாம். இவைகளின் இனப்பெருக்க இடங்கள் இவங்களின் தென்மேற்குப் பகுதி என்று கூறப்படுகிறது.

வரிசை 7. ஆன்செரியாஸ்கில் (Anseriformes)

இவ்வரிசை சார்ந்த பறவைகளில் மூன்பக்க விரல்களினத்தும் தொலிவழமத்தால் பிணைக்கப்பட்டுள்ளன. கடைசி விரலும்

இப்பறவைகளில் உண்டு. கடைசி விரல் குட்டையாகவும் காலின் டாச்சை எழும்புடன் மித விரல்களைக் காட்டிலும் வெகு உயரத்திலேயே பொருத்தப்படும் அமைந்துள்ளது. இப்பறவைகளின் அவசரத் தட்டையாகவும் ஒரு மெல்லிய படலத்தினால் மூடப்படும் உள்ளன. இப்பறவைகளுக்கும் அவசரத்தின் ஓரங்களில் தட்டுகள் போன்ற படலம் சூழ்ந்துள்ளன. மண்டையோடு டென்மோநேத்தல் பிளவைச் சார்ந்தது. கணை கிழிசுறா எனும் பு. பி. வடிவமாகக் காணப்படுகின்றது. இரண்டு கிரோட்டிட் தமனிகள் உள்ளன. மூட்டுக் குழாய்கள் பெரியதாக உள்ளன. கழுத்தில் இறக்கைகளற்ற பகுதியே கிடையாது. இப்பறவைகளின் நாக்கு பெரியதாகவும், சதைப்பற்றுடனும் காணப்படுகின்றது. ஆண் பறவைகளுக்கு ஒரு பெரிய நெருப்புணர்ச்சி (Intromittent) உறுப்புள்ளது. இவ்வரிசையில் எவ்வாச் சிறப்பின ஆண் பறவைகளும் ஒரு மெட்டையுடன் (Monogamous) மட்டுமே இணைவுத் தோழமைகளாகும் பழக்கமுள்ளவைகளாகும். பொதுவாக இவை புற்களினமே இவை தழைகளாகவே மரங்களினோ பொத்துகளினோ கூடுக்கும் பழக்கமுள்ளவைகளாகும். குளிக்காவல் களில் பெண் பறவைகள் தங்கள் சிறகுகளினாலேயே கூடுகளைப் பாதுகாத்து மூட்டைகளை அடைகாக்கின்றன. மூட்டைகளிலிருந்து குஞ்சுகள் வெளியுத்தவுடன் பொடி இறகுகளால் மூடப்பட்டுள்ளன. அவை உடனே ஒருவதற்கும் தண்ணீரில் நீத்துவதற்கும் உரிய ஆற்றலைப் பெற்றுள்ளன. இப்பறவைகளில் இறகுதிர் காலங்களில் (Moulting) நீண்ட இறகுகள் யாவும் உதிர்ந்து, புதிய இறகுகள் மூளாக்கும் காலம் வரை இவை பறக்கும் சக்தியற்றுக் காணப்படுகின்றன.

குடும்பம் : அனாட்டிடே (Anatidae)

உள் குடும்பம் - பிளெக்டிரோப் டெரினே (Plectropterinae)

இவை நாம் சாதாரணமாகக் காணும் வாத்துகளாகும். கால்களின் பின்விரல் நீளமாக உள்ளன. உடலிலிட கழுத்து குட்டையாகக் காணப்படுகின்றது. ஆண் பறவைகளின் மேல் புற இறகுகள் பளபளப்பாக இருக்கும். வால் இறகுகள் மிகவும் நீண்டு காணப்படுகின்றன.

உதாரணம் : சர்க்கிடியோர்னிட் மெலானோட்டஸ் (Sarkidiornis melanotus)

இவை மிகவும் பெரிய பறவைகளாகும். இரு பால் பறவைகளின் சிறகுகளின் அமைப்பு - திறம். முதலியன ஒரு சிற்றே மாறுபட்டுக் காணப்படுகின்றன. ஆண் பறவைகள் பெண் பறவைகளிலிட

பெரியதாக உள்ளன. இவை சுமார் 30 அங்குல நீளமுள்ள பறவைகளாகும். அவைகளும் கொண்டையும் கறுப்பாக இருக்கும். கால்களும் பாதங்களும் கரும் பழுப்பு நிறமுடன் காணப்படுகின்றன.

தலையிலும் கழுத்திலும் பளபளப்பான கறுப்பு நிறத்தில் வெள்ளைப் புள்ளிகள் உள்ளன. பெரிய குளங்கள் ஏரிகள் முதலானவற்றில் இவற்றை காணலாம். பெண் இனப் பறவைகள் ஆண் இனப் பறவைகளைவிட அளவில் சிறியதாக உள்ளன.

மைசூரின் தெற்குப் பகுதியிலும் போத்தனூர்க்கருகிலுள்ள பெரிய குளத்திலும் இவைகளைக் காணலாம். ஒரு சமயத்தில் 7 முதல் 12 வரை முட்டையிடும்.

உதாரணம் : ரோடோனியா கேரியோபால்லேசியா (Rhodocessa caryophyllacea)

இவை வெளிச் சிவப்புநிறத் தலை உடைய வாத்து வகைகள். இவை சுமார் 2 அடி நீளமுள்ள பறவைகளாகும். வால் 3-5 அங்குல நீளமுடையது. நெஞ்சுள் 1 அடி நீளமிருக்கும். அவை மிகவும் வெளிச் சிவமாக இருக்கும். நீர்நிலைகளில் தாண்டி புதர்களுக்கு கிடையில் இவை வசிக்கும்.

உள் குடும்பம் - சீனோனெட்டினே (Chenonettinae)

இவ்வுட்குடும்பப் பறவைகளுக்கு குள்ள வாத்துகளை (Geese) ஒத்த அங்குகளும், தலையில் நன்றாக நட்டுக்கும்படியாக அமைப்ப் பெற்ற பாதங்களையும் உடையவைகளாகும்.

பொது இனம் - நெட்டாப்பன் (Nattapus)

இவைகளை ஆப்பிரிக்கா—இந்திய ஆந்திரேஸியா முதலிய இடங்களில் காணலாம்.

உதாரணம் : நெட்டாப்பன் கரோமேன்டெல்லியானஸ் (Nattapus coromandelianus) (குறு வடிவ நன்னீர் பஞ்சு வாத்து வகை) (The cotton teal)

இவை சிறிய வாத்து வகைகளாகும். அவைகளும் தலையும் கறுப்பு நிறமுடையவைகளாகவும் பளபளப்பாகவும் உள்ளன.

பெண் பறவைகளின் முந்தலை மிகவும் குறுகு காணப்படும். கருவில் ஆண் பறவைகளைவிட சிறியதாகக் காணப்படும். இப் பறவைகளை நம் நாட்டில் எங்கும் காணலாம். இவை கூட்டமாகக்

கூடி வசிக்கும் தன்மைமுள்ளவை. ஒரு சமயத்தில் 5 முதல் 10வரை மூட்டை இடுகின்றன.



படம் 81. நெட்டாப்பல் கரோமண்டெல்லியானஸ்
(Nattapus coromandelianus)
[குறுவடிவ தன்மீர் பஞ்ச வாத்து (The common teal)]

உள்நுழையும் - அன்செரினே (Anserinae)

பாதத்தில் பின் விரல் சாதாரணமாக அமைந்துள்ளது. வால் இறதகள் குட்டையாகக் காணப்படுகின்றன. மேல் பரப்பு பள பளப்பாகக் காணப்படவில்லை.

உதாரணம் : அன்செர் இன்டிகஸ் (Anser indicus)

இவற்றின் அவகு குட்டையாகவும் தொண்டையின் அடிப் பகுதிக்கு மேல் பொருத்தப்பட்டுமுள்ளது. சுமார் 30 அங்குல நீள முடையவை இப்பறவைகள், வால் 6 அங்குலமும் இறக்கைகள் சுமார் 18 அங்குலமும் நீளமுடையவைகள். அவகு ஆரஞ்சு கலந்த மஞ்சள் நிறமாக உள்ளது. கால்களும் பாதங்களும் ஆரஞ்சு நிறமாக உள்ளன. மூதுருப்புமுள்ள இறதகள் பழுப்பு கலந்த சாம்பல் நிறமாக உள்ளன. தொண்டைப்பகுதி வெள்ளையாக உள்ளது. பெண் பறவைகள் உருவில் சற்று சிறியதாக உள்ளன.

இப்பறவைகள் இந்தியாவில் நெல்நூர், கடப்பை நிலவாக்களில் பெருவாரியாக வசிக்கின்றன என்று கூறப்படுகின்றது. மற்றும் இவைகளை பெரிய ஆறுகள் ஏரிகள் குளங்கள் முதலிய நீர் நிலைகள் கனக்கருகில் கூட்டமாக வசிப்பதைக் காணலாம். பின்னும் இவை சில சமயங்கள் பாம்பன் தீவுகள்வரைப் பறந்து சென்று கடற் கரைகளில் வசிக்கும் பழக்கமுள்ளவை என்றும் கூறப்படுகின்றது.

உதாரணம் : டென்ட்ரோசைக்ஞ ஜாவானிக்கா (*Dendrocygna javanica*)

இவை நீர்திசையங்களுக்கருகில் ஊழும் சிறு வாத்து பறவைகளாகும். இவை கூட்டமாக வாழும் தன்மை உள்ளவை. அக்கறுத்தப்படுமபொழுது ஏரிலையோ குளத்தையோ மந்தையாகச் சுற்றிச் சுற்றி வருவதுடன் சத்தமாக ஒலியை உண்டாக்கிக் கொண்டே பறந்து திரியின்றன.

உதாரணம் : டென்ட்ரோசைக்ஞ டபிவா (*Dendrocygna fulva*)

இவை உருவில் பெரிய வாத்துப் பறவைகளாகும்.



படம் 82. டென்ட்ரோசைக்ஞ ஜாவானிக்கா (*Dendrocygna javanica*)
(குளம் வாத்து)

உதாரணம் : கானர்கா டபெருமினியா (*Casarca ferruginea*)

இதை பார்ப்பன வாத்து (Brahminy Duck) என்று அழைப்பர். இவை நீர் திசையங்களுக்கருகில் வசித்திருந்தாலும் புல், செடிகளையே உண்ணுமின்றன.

உதாரணம் : ஆனஸ் போயிசில்லோரின்னா (*Anas poecilorhyncha*)

அவருகையில் புள்ளிகள் உள்ள வாத்து அல்லது சாம்பல் நிற வாத்து (Spot bill or grey duck), மைசூர்ப் பகுதிகளில் இந்த வாத்துக் களைக் காணலாம். இவை கூட்டமாகக் கூடி ஊழும். இவை மூக்கியமாக ஏரிக்கரைகளிலேயே அதிகமாக வசிக்கின்றன.

உதாரணம் : நெட்டியான் க்ரீக்கா (*Nettion crecca*)

பொதுவாக இவை நன்னீர் பகுதிகளுக்கருகில் ஊழும் வாத்துகளாகும். இவை குளங்களில் இந்தியாவின் மலபார் பகுதியைத்

தவிர மற்ற பகுதிகளுக்கு வரும் குளிர்கால விருந்தாடிகளாகும் (Winter Visitors).

உதாரணம் : டேரியா அக்யூட்டா (*Darius acuta*)

மேற்கூறிய பறவைகளில் போன்றே இவைகளும் குளிர்காலத்தில் இந்தியாவின் மலபார் பகுதியைத் தவிர மற்ற பகுதிகளுக்கு வலகை செல்லும் குளிர்கால விருந்தாடிகளாகும்.

உதாரணம் : க்வர்க்யூடுலா க்வர்க்யூடுலா (*Querquedula querquedula*)

இப்பறவைகளும் குளிர்காலங்களில் நம் தேசத்திற்கு வலகை வரும் பறவைகளாகும். பெரிய குளம் சூட்டடகளில் இவற்றைக் காணலாம்.

உதாரணம் : ஸ்பேட்டிகலா க்ளிப்பேட்டா (*Spatula clypeata*)

அனகு கறுப்பு நிறமாக உள்ளது. இதன் கால்கள் நிறத்தில் ஆரஞ்சு முதல் சிவப்புவரை இருக்கும். இவைகளும் குளிர்கால விருந்தாடிகள் பறவைகளேயாகும். தனித்தோ இணையாகவோ இப் பறவைகளை நீர்நிலைங்களிலுள்ள கானலாம். இப்பறவைகளின் அலகுகள் கரண்டி போன்றிருக்கும் (*Spatulata*). கரண்டியாகிய பறவைகள் என்றும் இவற்றை அழைப்பர். தலைமேலிட அனகுகள் நீளமாக இருக்கும். வாலும் நெருங்கும் கூர்மையாக இருக்கும்.

உதாரணம் : நெட்டா ரூப்பினா (*Netta rufina*)

சிவப்புக் கொண்டைப் பறவைகள் (The red crested pochard). இதன் அனகுகள் அடிப்பகுதியில் பருத்தும், முன்புறம் செவ்வச் செவ்வ நுனி கூர்மையாகவும் அமைந்திருக்கும். அனகுகளின் இரு புறமும் அமைந்துள்ள படலங்கள் பலம் பொருத்தியதாகவும் எடுப்பாகத் தெரியும்படியும் அமைந்துள்ளன. ஆண் பறவைகளுக்கு குறிப் பாகக் காணும்படியான கொண்டைப் பகுதிகள் உள்ளன. குளிர்காலங்களில் ஏரி, குளம், சூட்டடக்களில் மந்தை மந்தையாகக் காணலாம்.

உதாரணம் 1 நைரோகா பெரினா (*Nyroca ferina*)

வாத்து வகை (Pochard). இவை வட இந்தியாவில் மட்டுமே காணப்படும் பறவைகளாகும்.

உதாரணம் : கைரோகா ரூபா (Nyroca rufa)

இப்பறவைகள் வெள்ளைக் கண்ணாடியுடைய பறவைகளாகும். இப்பறவைகளைத் தென் இந்தியாவில் காண இயலாது.

உதாரணம் : கைரோகா பம்பூலிகுலா (Nyroca fuligula)

இப்பறவைகள் வட இந்தியாவிலேயே பெரும்பாலும் காணப்படும் பறவைகளாகும். இப்பறவைகளுக்கும் கொண்டைப் பருதியுண்டு, இவை நீரில் மூழ்கி இரைபிடித்துண்ணும் பழக்கத்தினை நிறப்பாகப் பெற்றுள்ளன.

வகை 8. பால்கோனி பார்யின் (Falconiformes) அடங்கியது
அக்ஸிப்பிட்ஃஃகஸ் (Accipitres)

இவ்வகை சார்ந்த பறவைகளுக்கு உறுதியான அவகுகள் உள்ளன. மேலகரு, கீழகனகவிட நீளமாக உள்ளது. அவகின் உச்சிப்பகுதி மிகவும் வளைந்து அணிப்பகுதி நன்றாக வளைந்து காணப்படும்படி நறுமணம் அடிப்பகுதி சிவம் அல்லது ஒரு படலத்தினால் மூடப்பட்டுள்ளது. இப்படலத்தினை துளைத்துக்கொண்டு வெளிநாசித்துவாரங்கள் வெளியே நிறங்கின்றன. பாதங்கள் நன்றாக பலம் பொருத்தியதாகக் காணப்படுவதுடன் அவற்றின் கிரகங்களில் சக்தி வாய்ந்த கூரிய நகங்கள் உள்ளன. நேரத்தில் எவற்ற முதல் கிரகம் பாதத்திலுண்டு. இப்பறவைகளில் என்னெனம்ச் கரப்பி அமைந்துள்ள இடத்தில் இறகைக் கொத்துள்ளது. இப்பறவைகளுக்கு 11 முதலாய்ப்படி இறகுகள் உள்ளன. இவற்றின் அண்ணம் டென்மோபேதந்தஸ் வகையைச் சார்ந்தது. இரு பக்கத்து சரோட்டிடித் தமனிகளும் உள்ளன. குடலின் முட்டுக் குழாய்களும் இப்பறவைகளுக்குண்டு. இவற்றின் கூடுகள் குச்சிகளாலானது. அக் கூடுகளை மரத்தினாலிலோ மலைப் பொந்துகளிலோ காணலாம். மூட்டையிலிருந்து வெளிவந்த குஞ்சுப் பறவைகள் தங்களைத் தாங்களே காத்துக்கொள்ளும் நிலையின்கண். இக்குஞ்சுப் பறவைகளின் உடல் தூவி இறகுகளால் போர்த்தப்பட்டுள்ளன. கூடுகளிலேயே பெற்றோர் பறவைகள் இக்குஞ்சுப் பறவைகளைச் சிறிது காலம் பேணி வளர்க்கின்றன. இவ்வகை சார்ந்த பறவைகளில் எவ்வளம் ஆண்டுகளிட, பெண் பறவைகள் உருவத்தில் பெரியதாகவே காணப்படும்படி. இப்பறவைகளின் தலையிலும் கழுத்திலும் இறகுகள் உள்ளன. இவை இறந்து போன பிராணிகளின் உடலைத் திண்ணும்.

குடும்பம்-1. பண்டியோனிடே (Pandionidae)

இக்குடும்பத்தைச் சார்ந்த பறவைகளுக்கு இறகுகளில் இறகைக் குஞ்சம் (After shaft) இடையாது என்பதே குறிப்பிட்டுச் சொல்லக் கூடியதொன்றாகும்.

பறவைகளின் வகைபாடு

உதாரணம் : பேண்டியான் ஹேலியேட்டஸ் (Pandion haliaetus)

இவை மீன் கொத்தித் திண்ணும் பெரிய கடற்பறவை கழுஞ்சுவை (Osprey). பெரிய நீர் நிலைக்களுக்குமேல் இப்பறவைகள் தங்கள் சக்தி வாய்ந்த இறக்கைகளின் உதவியால் வட்டமிட்டுப் பறந்து கொண்டே இருக்கும். தங்களது இரையான மீன்களைப் பார்த்தும் பொழுது பாய்ந்து சென்று எடுத்துண்ணும் பழக்கமுள்ளவைகளாகும். இவை சுமார் 2 அடி நீளமுள்ளவைகளாகும்.

குடும்பம்-2. அஜிபிடே (Aegypiidae)

இக்குடும்பப் பறவைகளுக்குக் கழுத்தும் தலைப்பகுதியும் இறகுகளற்றுக் காணப்படுகின்றன. தலையின் கொண்டைப் பகுதியிலும் இறகுகள் கிடையாது.

பிணந்தின்னிக் கழுவுகள் அல்லது பெருங்கழுவுகள் (Vultures) இக்குடும்பத்தைச் சார்ந்தவைகளாகும். இவற்றிற்கு உறுதியான அழுத்தப்பட்ட ஆழமான அலகுகள் உள்ளன. அவைகள் நுனி பெரிதும் வளைந்து காணப்படுகின்றது. சிவப் பகுதி பெரியதாகவும் கொம்பு போன்று கெட்டியாகவும் காணப்படுகின்றது. கழுத்தில் 15 முள்ளெலும்புகளுள்ளன. இவற்றிற்கு உறுதியான நீண்ட சிறகுகள் (Wings) உள்ளன. னாவில் 12 அல்லது 14 இறகுகள் உள்ளன.

உதாரணம்: சர்க்கோஜியஸ் கேல்வஸ் (Sarcogyps calvus)

இதைக் கறுப்புக் கழுவு அல்லது பாண்டிச்சேரிப் பெருங்கழுவு (The black or Pondicherry vulture) என்று அழைப்பர். சூலிர் காண்களில் நீலமிர் மலைப் பகுதிகளில் அந்த பெருங் கழுவுகள் காணப்படுகின்றன என்று கூறப்படுகின்றது. இவை அதிக உயரத்தில் வட்டமிட்டுப் பறந்து வரும்பொழுது ஊது ஒலியைப் போன்ற ஒரு பெரு ஒலியைக் கிளப்பிக் கொண்டே பறந்து திரியின்றன. இவை அழகிய நாய், தரி போன்றவற்றின் பிணங்களைத் தின்னும் பழக்கமுள்ளவைகளாகும். இம்மாதிரியான பிணங்களை அவை கூட்டமாகக் கூடி உண்ணுகின்றன.

உதாரணம்: ஜிபில் இன்டிகசஸ் (Gyps indicus)

இவை இந்தியாவில் வசிக்கும் நீண்ட அலகுப் பிணந்தின்னி கழுவு வகைகளாகும் (The Indian long billed vulture). நீலமிர் மலைப் பகுதிகளில் இவைகளைப் பொதுவாகக் காணலாம்.

உதாரணம்: சூடோஜிப்ஸ் பெங்காலென்சிஸ் (*Pseudogyps bengalensis*)

இது இந்தியாவில் வசிக்கும் வெள்ளை முதுகுப் பெருங்கழுகு வகையாகும் (*The Indian white backed vulture*). இவற்றை



படம் 82. ஜிப்ஸ் இன்டிகஸ் (*Gyps indicus*)
(பேனத்தினி கழுகு)

பொதுவாக என்ன இடங்களிலும் காணலாம். கடற்கரைப் பகுதிகளில் இவை காணப்படுவதில்லை. இவை கரர் ஓரப் பகுதிகளிலுள்ள அழுதின இறந்த பிராணிகள் முதலானவற்றை உண்ணுகின்றன.

உதாரணம்: நியோப்ரோன் பெர்க்ரூப்ப்டர்ஸ் (*Neophron perenopterus*)

இது சிறிய அளவுடைய வெள்ளைத் தோட்டிக் கழுகு வகை (*The smaller white scavenger vulture*) ஆகும். இவை மலைப் பகுதிகளிலேயும், புல்வெளிகளிலும் பெரிதும் வசிக்கின்றன. கடற்கரைப் பகுதிகளில் இவைகளைக் காண முடியாது. இவை மயங்களை உண்ணுகின்ற காரணத்தால் நகரம் மிராமம் முதலானவற்றின் ஒதுக்குப் புரப்பக்கங்களில் காணலாம்.

குடும்பம்-3. ஃபால்கானிடே (*Falconidae*)

இக் குடும்பப் பறவைகளுக்கு இறகுகளில் இறகுக் குஞ்சம் உள்ளன. இவற்றிற்கு தலையிலும் கழுத்திலும் இறகுகள் உள்ளன. இந்தக் குடும்பத்தைச் சேர்ந்த எல்லாப் பிராணிகளுக்கும் வாயில் 12 இறகுகளும் கழுத்தில் 14 முள்ளெலும்புகளும் உள்ளன. எல்லாப்

பறவைகளின் வகைபாடு

பறவைகளும் ஊனுண்ணும் (Carnivores) பறவைகளே. இவை உயிருள்ள பிராணிகளையே இரைபாகப் பிடித்து உண்ணும் பழக்கமுள்ளவைகளாகும். மற்றும் இக்குடும்பப் பறவைகள் தனித்து வசிக்கும் தன்மைபுடைபணவாகவும், ஓர் ஆண் ஒரு சமயத்தில் ஒரே ஒரு பெண்ணுடன் மட்டும் இணையும் தன்மைபுடைபணவாகவும் உள்ளன.

உதாரணம்: ஃபால்கோ பெரிகிரின்ஸ் (Falco peregrinus)

இப்பறவைகளை உதகமண்டலத்திலும் காணலாம். மற்றும் மலை உச்சிகளிலும் தாழ்த்த நிலப்பரப்புகளிலும் காணலாம். இவை குவிச் காலங்களையே நம் நாட்டிற்கு வருகின்றன. இவை நீர் நிலையங்களுக்குமிடம் வாயும் வாத்து வகைகள், கொளதாரிகள் போன்றவற்றை உணவாக உண்ணுகின்றன. இப்பறவைகள் தங்களது பின்பக்க விரலின் கூர்நகங்களால் வாத்து போன்ற பறவைகளை அடித்துப் பிடித்து எடுத்துச் சென்று உணவாக உண்ணுகின்றன.

உதாரணம்: ஃபால்கோ பெரிகிரின்ஸ் பெரிகிரி கெட்டர் (Falco peregrinus perigrinaster)

அடர்ந்த காடுகளுக்கருகிலுள்ள மலைப் பகுதிகளிலும் பேரீய மலைப் பிரதேசங்களுக்கருகிலுள்ள தேசங்களிலும் இவை வசிக்கின்றன. இவை பறவைகளையோ மற்ற உயிருள்ள பிராணிகளையோ அடித்து அவற்றை இரையாக உண்ணுகின்றன.

உதாரணம்: ஃபால்கோ ஜக்கர் (Falco juggar)

பிற்பட்ட சிபாக்கள் பறவை (The laggar falcon). இவை மற்ற பறவைகளை வேட்டையாடி உண்ணும் தன்மைபுள்ளவை. சென்னைக்குத் தெற்கிலுள்ள பகுதிகளில் இவைகளைச் சாதாரணமாகக் காணலாம்.

உதாரணம்: ஃபால்கோ சிவிரஸ் ரூபெடாய்டெஸ் (Falco severus rufepedoides)

இப்பறவைகள் உருவில் நிறியதாகவிருந்தாலும் மற்ற பறவைகளை வேட்டையாடி உண்ணும் பழக்கமுள்ளவைகளாகும். மற்ற பறவைகளை அடித்து இரையாகக் கொள்கின்றன. இவை எப்போதாவதும் மீடத்தில் அதிகமாகக் காணப்படுகின்றன.

உதாரணம்: ஃபால்கோ சிக்ஜூரா (Falco chiquera)

இவை வெவ்வு திறத்தவையுடைய பறவைகளாகும். இவை இணை இணையாகவே வாழ்கின்றன. வெப்ப நாட்களில் மிக உயரத்தில்

பறக்கின்றன. மற்ற பறவைகளை அடித்து உண்ணும் பழக்கமுள்ளவைகளாகும்.

உதாரணம்: எரித்தோப்பல் ஆம்பூடுகளில் (*Erythropus aeneus*)

மேற்குப் பகுதிகளில் வாழும் செங்கால் கிபாக்கள்கள் (*The eastern red legged falcon*). சென்னைிலும் அதன் சுற்றப் புறங்களிலும் இப்பறவைகளைக் காணலாம். இவை வறண்ட போதும் நாட்களில் கூட்டமாகப் பறந்து திரிவதைக் காணலாம். இவை பூச்சிகளை உணவாக உண்ணுகின்றன. இவை இரவு நேரங்களில் மூங்கில் காடுகளில் உறக்கமுற்ற நிலையில் குத்தியிருப்பதைக் காணலாம். ஒவ்வொரு மூங்கிலின்மீதும் சுமார் 20 பறவைகள் இருத்ததாகக் கூறப்படுகின்றது.

உதாரணம்: செச்சியல் டீபுனன்குலஸ் டீபுனன்குலஸ் (*Cerchneis tinnunculus tinnunculus*)

ஐரோப்பியக் கழுது வகை (*The european kestrel*). குளிர் காலங்களில் இப்பறவைகள் இந்தியா முதல் இலங்கை வரைப் பறந்து செல்கின்றன. குளிர் காலங்களில் மட்டுமே இந்தியாவிற்கு வரும் பறவைகளாகும்.

உதாரணம்: செச்சியல் டீபுனன்குலஸ் அப்ஸ்கேட்டஸ் (*Cerchneis tinnunculus obscurus*)

இவை தென் இந்தியாவிலேயே வசிக்கும் கழுது வகைகளாகும். இனப்பெருக்க காலங்களில் மலைப்பகுதிகளுக்குச் சென்றுவிடுகின்றன. மற்ற காலங்களில் சமவெளிப் பகுதிகளில் வசிக்கின்றன. இப்பறவைகள் ஊர்த்து கொண்டிருக்கும் எலி, கண்டெலி, பம்பி, வெட்டுக்கிளி, சிறு பறவை முதலியவற்றின் மீது பாய்ந்து எடுத்து இரைவாக உண்ணுகின்றன. இவ்வாறு இரையின் பிடிக்கும் பொழுது சிறகுகளை வேகமாக அடித்துப் பறக்கின்றன.

உதாரணம்: செச்சியல் நாமன்னி பெக்கினென்சில் (*Cerchneis naumanni pekinensis*)

சைனு கழுது வகை (*The chinese lesser kestrel*). இவை மேலே குறிப்பிட்ட கழுது வகையை ஒத்ததாகும். ஆனால் இவை கூட்டமாகக் கூடி வாழும் தன்மையுள்ளவை. இவை சிறு பறவைகளையும் புழு பூச்சிகளையும் இரையாகப் பிடித்துண்ணுகின்றன.

உதாரணம்: அக்ஸ்டிரா - நிப்பெனென்சில் (*Aquila nipalensis*)

மேற்குப் பகுதி வடபாலை கழுதுவகை (*The eastern steppe eagle*). இப்பறவைகளை திருவிதாங்கூரின் தென் பகுதியிலும், வட

பகுதியிலும் குவீர் காலங்களில் காணலாம். இவை சிறிய பாணூட்டிகள் பறவைகள் முதலானவற்றை உணவாகக் கொள்ளின்றன. இவை ஒரு வெகுளிப்பறவை, பெரிய தவிற்று மரங்களின் உச்சிக் கிளைகளில் தவித்து குத்திக்குத்தியாக் காணலாம்.

உதாரணம்: அக்பூக்ளா கிளேங்கா (Aquila clanga)

புள்ளிக் கழுருவகை (The greater spotted eagle), இப்பறவைகளை கர்நாடகப் பகுதிகளிலும் மலபார் கடற்கரைகளிலும் காணலாம். சரப்பசையுள்ள தென் வயல்களுக்குள்ளும் இவை வளிக்கின்றன.

உதாரணம்: அக்பூக்ளா போமாரினா (Aquila pomarina)

இவை சிறிய புள்ளிக் கழுரு வகைகள் (The small Indian spotted eagle), இப்பறவைகளை தென் இந்தியாவில் அயலணவாகக் காணமுடியாது. இது மற்றப் பறவைகளின் கூடுகளைத் திருடிச் செய்லும் தன் மையுள்ளது. மற்றும் இப்பறவைகளின் கூட்டை மற்றப் பறவைகள் தாக்கிலும் மூட்டைகளை எடுத்துச் சென்று வேற்று இடங்களில் வைத்து காப்பாற்றும் தன்மைவுடையது.

உதாரணம்: ஹிரேட்டல் ஃபேசியேட்டஸ் (Hieraetus fasciatus)

பாசெல்லியின் கழுரு (Bonelli's eagle), இது குவீர் காலங்களில் மட்டும் திருவிதாங்கூர் பகுதிக்கு வரும் கீருத்தாளிப் பறவை யாகும். இவற்றை மேற்குத் தொடர்ச்சி மலைப்பகுதிகளிலும் காணலாம், மற்றும் சென்னையிலும் காணலாம். இப்பறவைகள் புழு போன்ற பறவைகள் பலவற்றையும் சிறுபாணூட்டிகளையும் உணவாக உண்ணுகின்றன.

உதாரணம்: லோஃபேட்ரேயார்க்கிஸ் கியென்செனி (Lophotriorchis kieneri)

செம்பழுப்பு வயிற்றுப் பகுத்துக் கழுரு வகை (The rufous bellied hawk eagle), இது அரிதாகக் காணும் ஒரு பறவையாகும். இது காடுகளில் வசிக்கும் பறவையாகும். பெரிய மலைகளுக்கருகிலுள்ள அடர்த்தி புதர்க்காடுகளில் இவை வளிக்கின்றன. கப்பாக்கள் பறவைகளை ஒத்தே இவை பெரிய இறக்கைகளால் பறந்து திரிவதுடன் இயற்றிற்கு எதைக் கண்டாலும் அச்சம் இடையாது. இப்பறவைகள் பறந்து திரியும் பறவைகளின் மீது பாய்ந்து அடித்துக் கொன்று இரையாக உண்ணுகின்றன. இவை அதிகுறிதமாகப் பறந்து திரியும் ஆற்றல் உள்ளவை. அவ்வாறு பறந்து திரிதலின்பொழுது சில சமயங்

களில் எதிரெயுள்ள மரக்கிளை போன்ற பொருளின்மீது மோதினாலும் அவை அவற்றை பெரிதாகக் கருதுவதில்லை.



படம் 84: கெர்.பேரட்டையார்க்கில் இயென்சர்
(*Lophotriorchis kieneri*)

(செம்பழுப்பு வயிற்று பருத்து கழுஞ்
(The Rufous bellied hawk eagle))

உதாரணம்: இக்டினேட்டஸ் மலேயன்சில் (*Ichinaetus malayensis*)

இந்திய கறுப்புக் கழுஞ் வகை (The Indian black eagle). தென் இந்தியாவின் மேற்குப் பகுதியிலும் கன்னியாகுமரி மாவட்டத்திலும் இயற்றைக் காணலாம். இது அடர்ந்த காடுகளில் வசிக்கின்றது. இவை தவளை, சிறு பறவைகள், பல்வி, புழு பூச்சிகளை உணவாக உண்ணுகின்றன. மற்றும் மற்ற பறவைகளின் கூடுகளிலுள்ள முட்டைகளையும் குஞ்சுப் பறவைகளையும் திருடி உணவாகக் கொள்கின்றன. இப்பறவைகளின் கூடுகளை மற்ற பறவைகள் தாக்கும்பொழுது பெருங்குரலில் இவை சத்தம் எழுப்புகின்றன.

உதாரணம்: ஸ்பைரேட்டஸ், சிர்ரேட்டஸ் (*Spizactus cirrhatus*)

தனிமுகடுடைய இந்தியப் பருத்து கழுஞ் வகை (The Indian crested hawk eagle). தென் இந்தியா முழுவதிலும் இப்பறவைவினை காணலாம் என்று கூறப்படுகிறது. பெரிய மரங்களின் உச்சிக் கிளைகளில் அமர்ந்துகொண்டு, சிறு பறவைகள், குழி முயல்கள் முதலான வற்றைப் பார்த்துக்கொண்டேயிருத்து அவற்றின் நடமாட்டம் தெரியும்பொழுது பாய்ந்தெடுத்து உண்ணுகின்றன.

உதாரணம்: செர்கேட்டஸ் கேலிக்கஸ் (Circus gallicus)

சிறு விரல் கழுஞ்சுள் (The Short toed eagle). இவை சிறிய மரங்களின் கிளைகளில் குத்தி இருத்தலைக் காணலாம். சில சமயங்களில் மிக உயரத்தில் வட்டமிட்டு பறந்து திரிதலை ஒரு விளையாட்டாகச்



படம் 85. செர்கேட்டஸ் கேலிக்கஸ் (Circus gallicus)
[சிறு விரல் கழுஞ்சுள் (The short toed eagle)]

செய்கின்றன. சாதாரணமாக அவை தனித்தே காணப்படுகின்றன. பாம்புகளையும் பல்லிகளையும் இவை விரும்பி உணவாகக் கொள்கின்றன. மற்றும் எலி, நண்டு, சிறு பறவை, தவளை, பெரிய பூச்சிகளையும் உணவாக உண்ணுகின்றன.

உதாரணம்: ப்யூட்டாஸ்டர் டீஸா (Butastur teesa)

வெள்ளைக் கண் பருந்து வகை (White eyed buzzard eagle). புல் வெளிகளில் சாதாரணமாக இப்பறவைகளைக் காணலாம். மரங்களடர்ந்த காடுகளிலும் இவற்றைக் காணலாம். சிறு பாதுகாட்டிகள், பல்லிகள், நண்டுகள் முதலியவற்றை இவை உண்ணுகின்றன.

உதாரணம்: இத்தியோபேகஸ் இத்தியோபேட்டஸ் (Ichthyophaga ichthyosus)

மீன் பிடிக்கும் சாம்பல் நிற பெரிய தலைமுடைய கழுஞ்சுள் (The large grey headed fishing eagle). மீன்களை உணவாக உண்ணும்

கின்றன. தென் இந்தியாவின் எல்லாப் பகுதிகளிலும் காணலாம். இவை பெரிக்குரலில் சப்தம் எழுப்பும் ஆற்றலுள்ளவை.

உதாரணம்: ஹேலியாஸ்டர் இன்டஸ் (Haliastur indus)

பார்ப்பனக் கழுஞ் (The brahminy kite). கடற்கரையிலும் புல்வெளிகளிலும் இப்பறவைகளைக் காணலாம். இவை மீன்களையும் தண்டுகளையும் உணவாகக் கொள் கின்றன. இவை சிறு பறவைக் குஞ்சு களையும் உணவாக உண்ணுகின்றன. இவை பகல் நேரத்தில் தனித்தனி யாகப் பிரித்து சென்று உணவு தேடி வந்தாலும் இரவு நேரங்களில் பொது வாக கூட்டமாகச் சேர்ந்தே மரங் களில் வசிக்கின்றன.



படம் 86. நேரலியாஸ்டர் இன்டஸ் (Haliastur indus)
[பார்ப்பனக் கழுஞ் (The brahminy kite)]

உதாரணம்: மில்வஸ் மைகிரேன்ஸ் (Milvus migrans)

பறையக் கழுஞ் (The common pariah kite). இது சாதாரணமாக எல்லா இடங்களிலும் காணப்படும் கழுஞ் வகையாகும்.

உதாரணம்: ஆஸ்டர் பேடியஸ் (Astur badius)

இந்திய வேட்டைப் பருத்து (The Indian shikra). இவை சிறு பறவை களை வேட்டையாடி உண்ணுகின்றன.

உதாரணம்: அசிம்பிட்டர் னைசஸ் (Accipiter nisus)

ஆசியப் பருதி சிட்டுக்குருவி பருத்து வகை (The Asiatic sparrow hawk). இவை குளிர் காலங்களில் மலைப் பகுதிகளுக்கு வரும் பறவை களாகும். சிறு பறவைகளை வேட்டையாடி உண்ணும் பழக்கமுள்ள வகையினாகும்.

வரிசை-9. கேலி:பார்மிஸ் (Galliformes) அல்லது கேலினை (Gallinae)

இவ்வரிசையில் வேட்டை பறவைகள் அடங்கும். இப்பறவை களுக்கு தடித்த அங்குகளும் உறுதியான கால்களும் பாதங்களும் உள்ளன. பருத்த உடல் இவற்றிற்கு உண்டு. உறுதியான பாதம்,

கால் முதலியவற்றின் உதவியால் இப்பறவைகள் தரையில் நடக்க ஏதுவாக உள்ளன. இவைகளுக்கு உருண்டை வடிவ இறக்கைகள் உள்ளன. ஆண் பறவைகளில் டார்ச்சஸ் எழும்புக்கருகில் ஒன்று அல்லது பல குதி மூட்கள் (Spar) உள்ளன. சில பறவை இனங்களில் பெண் பறவைகளிலும் குதி மூட்கள் உள்ளன. இவற்றிற்கு (Hallux) என்ற பெரு விரல் உண்டு. விரங்களின் நகங்கள் குட்டையாகவும், மழுங்கியும் சிறிது வளைத்தும் காணப்படுகின்றன. இப்பறவைகளின் நீண்ட இறகுகளில் இறகுக் குஞ்சும் (After shaft) உண்டு. பொதுவாக இப்பறவைகளுக்கு எண்ணெய்ச் சுரப்பிகள் உள்ளன. இவைகளின் குட்டை பகுதியின் மூட்டுக் குழாய்கள் பெரியதாக உள்ளன. இருபக்க கரோட்டிடட் தமவிகளும் உள்ளன. அண்ணம் னைவேர நேத்தன் வகையைச் சார்ந்தது. இவைகளுக்கு 16 கழுத்து மூள் எழும்புகள் உள்ளன.

உள் வரிசை : அலெக்டோரோபோடெஸ் (Alectoropodes)

பின் பக்க நேரவக்கல் மற்ற விரங்களைக் காட்டிலும் சிறிது தூக்கவாக அமைந்துள்ளது. பின்னும் அவ்விரல் குட்டையாகவும் அமைந்துள்ளது.

குடும்பம்: பீசியானிடே (Phasianidae)

நாசித்துவாரங்கள் இறகுகளால் மூடப்பட்டிருக்கவிடின் டார்ச்சஸ் எழும்புப் பகுதிகளிலும் இறகுகள் கிடையாது. ஆண் பறவைகளில் ஸ்பார் பகுதி உண்டு.

உள் குடும்பம்: பேவோனிடே (Pavonidae)

இவ்வுட்ப் குடும்பப் பறவைகளில் ஆண் பறவைகளுக்கு மிகவும் நீளமான மேல்ப் பகுதியில் வாக இறகுகள் இனப்பெருக்கக் காலங்களில் தோகைகளாக மாறி அமைந்துள்ளன.

உதாரணம்: பேவோ க்ரீஸ்டேட்டஸ் (Pavo cristatus)

இது சாதாரணமாக நாம் காணும் மயில்களாகும் (Peafowl).


மயில்: ஆண் பறவைகள்

நகம், கழுத்து, மார்பு முதலிய பகுதிகள் பச்சை கலந்த ஊதா நிறத்துடனும், உலோகங்கள் மின்னுயது போன்ற பளபளப்பான பரப்புடனும் உள்ளன. முதுகுப் பகுதி பச்சை நிறமாக உள்ளது. இறகுகள் செதில் போன்றுள்ளது. இறகுகளின் ஓரங்கள் கறுப்பாகவும் செம்பு உலோகத்தின் பளபளப்பின் ஒத்துமுள்ளன. தலையில் குறிப்

பிடத்தக்கக் கொண்டைப்பருதி உள்ளது. இறகுகளில் நீலம், பச்சை, ஊதா, பழுப்பு போன்ற பல வண்ணங்கள் காணப்படுகின்றன.

மயில் : பெண் பறவைகள்

இப்பறவைகளுக்கு மூன் தலைமும், கொண்டையும் பழுப்பு நிறமாக இருக்கும். ஒவ்வொரு இறவின் துளியிலும் ஒரு பச்சைப் புள்ளி உள்ளது; ஆண் பறவைகளிலிட பெண் பறவைகளின் கொண்டைப்பருதி அவ்வளவு எடுப்பாகவோ பளபளப்பாகவோ காணப்படுவதில்லை.



படம் 87. பேயோ கிறிஸ்டேட்டஸ் (Pavo cristatus) (மயில்)

இப்பறவைகளை புற்கள் நிறைந்த காடுகளில் காணலாம். இராமங்களில் கோயில் முதலானவற்றிற்கு அருகிலுள்ள தோட்டங்களில் இப்பறவைகளைக் காணலாம். அன்னாம்பா மாகாணத்தில் அதிகமாக வளிக்கின்றன. இவைகளுக்கு உறுதியான சாங்கள் உள்ளன. திருவிதாங்கூர்ப் பருதிகளிலும் மிகுதியாகக் காணலாம்.

உள் குடும்பம்: ஃபேசியானிடே (Phasianinae)

நீண்ட வாலிலையுடைய பகட்டு வண்ணக் கோழிகளும் வேட்டைப் பறவைகளும் இவ்வுட்குடும்பத்தைச் சார்ந்தவைகளாகும். இவை மிகவும் பெரிய பறவையினங்களாகும். ஊர், நெருக்கிலிட நீளமாக உள்ளது.

உதாரணம்: கேலஸ் பேங்க்வின (Gallus bankiva)

சிவப்பு நிற காட்டுக் கோழிகள் (The common red jungle fowl). இப்பறவைகள் கோதாவரி நதிக்குத் தெற்கில் அங்லனவாகக் காணப் படவில்லை. இவை சமீபந புத்ஸெலிகளையும் மூங்கில் காடுகளையும் பெரிதும் சேதப்படுத்துகின்றன. இப்பறவைகள் நன்றாக ஓடும் திறம் பெற்றுள்ள பறவைகளாகும். அவ்வாறு அவை ஓடும் பொழுது வால் பகுதி கீழ்புறம் நோக்கி அமைந்துள்ளது. இப்பறவைகள் புழு பூச்சிகளையும், தாவரவயர்களையும் உணவாக உண்ணுகின்றன. இப்பறவைகளின் ஆண் இனம் அதிகாலையிலும் மாலைதும் கூவும் தன்மை உள்ளவை. இவை மற்ற பறவைகளுடன் வலியச் சண்டை செய்யும் தன்மைவுள்ளவை.



படம் 38. கேலஸ் பேங்க்வின (Gallus bankiva)
(சிவப்பு நிற காட்டுக் கோழி (Red jungle fowl))

உதாரணம்: கேலஸ் சன்னிசேட்டி (gallus sonneratti)

சாம்பல் நிறக் காட்டுக் கோழி வகை (The grey jungle fowl). இவை பார்வைக்கு மிகவும் அழகான பறவைகளாகும். இவைகளும்

காடுகளில் வசிக்கும் பறவைகளேயாகும். இவை நீலநிற மலைப்பிரதேசத்திலுள்ள அடர்ந்த காடுகளில் வசிக்கின்றன.

உதாரணம்: கேளோப்பெர்டிக்ஸ், ஸ்பேசியசு (Galloperdix spadicea)

சிவப்பு குதிரைக் கோழிகள் (Red spur fowl). இப்பறவைகளை சென்னைிலும், மைசூரிலும், வடப்பகுதி கோயமுத்தூரிலும், பழனி மலையிலும், திருவிதாங்கூர் பகுதிகளிலும் காணலாம். இவைகளும் காடுகளில் ஊரூம் பழக்கமுள்ளவைகளாகும். இவை புழு, பூச்சி, தாவரங்கள் முதலானவற்றை உணவாக உண்ணுகின்றன.

உதாரணம்: எக்ஸ்கேல்டோரியசு கைனென்சிஸ் (Excalfactoria chinensis)

நீல நிற மார்புப் பகுதியிலுள்ள புடைய கௌதாரி வகை (The blue-breasted quail). சென்னை மாகாணத்தில் அதிகமாகக் காணலாம். மைசூரிலும் வசிக்கின்றன. இப்பறவைகளின் குரல் மிக மெல்லியதாகவே ஒலிக்கும். இவை அதிகநேரமாகப் பறக்கும் ஆற்றலுள்ள பறவைகள். விதை, கொட்டை முதலியவற்றை உண்ணுகின்றன.

உதாரணம்: காட்டூர்நிக்கல், காட்டூர்நிக்கல் (Coturnix coturnix)

சாதாரணமாகக் காணும் சாம்பல் நிற கௌதாரி வகை (The common or grey quail). சென்னைக்குத் தெற்கிலும், திருவிதாங்கூர் பகுதியிலும் சாதாரணமாகக் காணலாம். இவை குளிர் காலங்களில் வீரத்தாளியாக வரும் பறவைகளாகும். வரண்ட புல் வெளிகளையே இவை பெரிதும் விரும்புகின்றன. இவை புழு பூச்சிகளையும் விதை கொட்டைகளையும் உணவாக உண்ணுகின்றன.

உதாரணம்: பிரான்க்கோலினஸ் பிக்டஸ் (Francolinus pictus)

தென் பகுதி கௌதாரிகள் (The southern painted partridge). இவை தென் இந்தியாவில் காணப்படும் கௌதாரிகள். கரையாள் பூச்சிகளை விரும்பி உணவாக உண்ணுகின்றன. இவை அச்சுறுத்தப்படும் போழுது ஒலி எழுப்பும்.

உதாரணம்: பிரான்க்கோலினஸ், பாண்டிச்சேரியானஸ் (Francolinus pondicerianus)

தென்பகுதி சாம்பல் நிறக் கௌதாரிகள் (The southern grey partridge). புல்சமவெளிகளில் இப்பறவைகளைச் சாதாரணமாகக்

காணலாம். அச்சுறுத்தப்படும் பொழுது இவை ஒலி எழுப்பி கூவுகின்றன.



படம் 89. ஃரான்க்லினஸு பிக்டசு (Francolinus pictus)
[தென் பகுதி கௌதாரிகன் (The southern painted partridge)]

வரிசை-10. ஆப்ஸித்தோகோமி ஃபார்மிஸ் (Ophthocomi formes)

உதாரணம் : ஹோட்டிஸின்

இது தென் அமெரிக்காவில் வசிக்கும் பறவை. இதைப் பவர் மேயை கூறிய கேலிப்பார்மில் வரிசையில் சேர்த்துள்ளனர். இதன் உய்தோற்ற வெளித்தோற்ற இயல்புகள் தனித்தன்மை பொருந்தியவை. இது உருவத்தில் புழுவைப் போல இருக்கும். உடல் ஒவ்வியாகவும் நீண்டும் உள்ளது. அடித்தட்டைக் கவம் சரிவர அமைவப்படவில்லை. இதற்குப் பறக்கும் சக்தியும் சற்று குறைவுதான். இதன் அவகு உறுதியுள்ளதாக அமைந்துள்ளது. இவற்றின் தங்குபைகள் பெரியதாக உள்ளன. இவை இவை தழைகளையும் பழங்களையும் உணவாக உண்ணுகின்றன. அவைகள் நன்றாக உறுதியானதாகவும் மேலவகு ரம்பம் போன்று அமைந்தும் உள்ளது.

வரிசை-11. க்ரூலி கிபார்மிஸ் (Graciformes)

இவ்வரிசைப் பறவைகளுக்கு காக்கள் மிக நீளமாகவும் டிபியாப் பகுதி இறகுகளிலும் காணப்படுகின்றன. அண்ணம் ஸைனோ நேத்தன் வகையைச் சார்ந்தது. இவற்றிற்கு ஹோம்ஸ் எனும்பு உள்ளது. இதில் கிரோட்டிட் தமனிகளும் உள்ளன. இவை மீன், ஊர்வன, மெத்துடனிகள் முதலியவற்றை உண்ணுகின்றன. இவற்றிற்கு தங்குபைகள் கிடையாது.

உதாரணம் : ஹைப்ரோட்டேனிடே ஸ்ட்ரேபேட்டா

கீலக் கோட்டுமாப்பு இந்திய ரெயில் பறவை (The Indian blue breasted banded rail). கண்ணனூர், திருவிதாங்கூர் முதலிய பகுதிகளில் இப் பறவைகள் வசிக்கின்றன. இவற்றை சுரப்பாங்கான பூவெலிகளில் பெரிதும் காணலாம். இவை மிகவும் பயிற் தன்மைவுள்ள பறவைகளாகும். இவை அச்சுறுத்தப்படும் பொழுது பறந்து சென்று தப்பிப்பதை விட, ஒடி ஒளித்தே தப்பிக்கப்பார்க்கின்றன. ஆகையால் இவற்றின் கால்கள் மிகவும் பலமுள்ளதாகவும் தீளமாகவும் அமைந்துள்ளன. இவை தத்தை போன்ற மெல்லுடனிகள், புழு, பூச்சிகள், இயி, தழை, காய்கறிகள் முதலானவற்றை உணவாக உண்ணுகின்றன. இவைகளுக்கு தடித்த குட்டையான அலகுகள் உண்டை.

உதாரணம் : போர்சானா பஸிலிசா (Porzana pusilla)

இப்பறவைகளை இந்தியாவின் எல்லாப் பகுதிகளிலும் காணலாம். இவை வயசை போதும் பழக்கமுள்ள பறவைகளாகும். இவை சுரப்பாங்கான சமவெளிப் பகுதிகளிலும், தென்வயல்களிலும் மிகுதியாகக் காணப்படுகின்றன. இப்பறவைகளும் ரொயில் பறவைகளைப் போன்று அமைதியான ஆனால் பயிற் தன்மைவுடைய பறவைகளாகும். புழு, பூச்சிகள், காய்கறிகள் முதலானவற்றை இவை உண்ணுகின்றன.

உதாரணம் : அமாரோனில் ஃபோனிக்ஸுஸ் (Amaurornis phoeniceus)

வெள்ளை மாடு நீர்க்கொழி வகை (The white breasted water hen). இவற்றை திருவிதாங்கூரின் தென்பகுதிகளில் காணலாம். இவை சமவெளிப் பகுதிகளிலும், ஆறு, குளம், குட்டைக் கருவியுள்ள சுரப்பாங்கான பகுதிகளிலும் வசிக்கும் பறவைகளாகும். இவை எப்போழுதும் வானின் மேலும் கீழும் ஆட்டிக் கொண்டு ஒரு இறுமாந்த நோக்குடன் நிரிந்து வரும் பறவைகளாகும். இவை எப்போழுதும் அதிகமாக ஒலி எழுப்பிக் கொண்டு நிரிந்து வருவதால் இவற்றின் ஒலி மனிதர்க்கு ஒரு வெறுப்பாகவே தோன்றும்படி செய்கின்றது. இவை மரம், புதர் முதலானவற்றில் ஏறும் பழக்கமுள்ள பறவைகளாகும்.

உதாரணம் : கேலிக்லூசா க்ளோரோபஸ் (Gallinula chloropus)

இந்திய சிவப்பு காட்டுக்கொழி வகை (The Indian moorhen). இப்பறவைகளின் தலையில் ஒரு சிறு வசைம் உள்ளது. நாகித்

பறவைகளின் வகைப்பாடு

துவாரங்கள் நீண்டு காணப்படுகின்றன. காலின் விரல்கள் மிகவும் நீளமாக இருப்பதுடன் படலத்தினால் இணைக்கப்பட்டுக் காணப்படுகின்றன.



படம் 90: கேலித்யூஸ க்ளோரோபஸ் (*Gallinula chloropus*)
[இந்திய சிவப்பு திசை காட்டுக் கோழி (*The Indian Moorhen*)]

சென்னைப் பகுதிகளிலும் திருவிதாங்கூர் பகுதிகளிலும் இவற்றைக் காணலாம். ஏரி, குளம், குட்டைக்கருகில் இவை வசிக்கின்றன. இவை நீர்த் தாவரங்களை உண்ணுகின்றன. இவைகளுக்கு நன்றாக நீர்த் தி, மூழ்கும் தன்மையுள்ளது. இவை விரைவாக ஓடும் தன்மையையும் பெற்றுள்ள பறவைகளாகும். காய்கறிகளையும் பூச்சிகளையும் இவை உணவாக உண்பதுடன் சில சமயங்களில் மீனையும் உணவாகக் கொள்கின்றன.

உதாரணம் : கேலிக்ரெக்ஸ் சினேரஸ் (*Gallinix cinera*)

கோராப் பறவைகள் (*The kora or water cock*). தலைக்கவசம் பெண் பறவைகளிடம் ஆண் பறவைகளில் வெகு நேர்த்தியாக அமைந்திருக்கும். இவற்றின் விரல்கள் மிகவும் நீளமாக இருக்கும். அவற்றில் மைய விரல் மட்டும் கூர் நகமற்றுக் காணப்படுகின்றன. இவை மலபார் கடற்கரைப் பகுதிகளில் மிகுதியாகக் காணப்படுகின்றன. இவை நீர் நிலையங்களுக்கருகில் நீர்த்தாவரங்கள் அதிக முள்ள இடங்களில் வசிக்கின்றன. இவை நெல் முதலான பயிர்களை


உண்ணும் பழக்கமுள்ளவை. இருப்பினும் நீர்த்தாவரங்கள், சிறு மெல்லுடவிகள், புழு, பூச்சிகள் முதலானவற்றையும் இவை உண்ணுகின்றன. இவை அதிகமான ஒலியினை எழுப்பும் பழக்கமுள்ளவைகளாகும். மற்றும் இனப்பெருக்கக் காலங்களில் அதிகமான ஒலியை எழுப்புகின்றன.

உதாரணம் : பழுவிக்கா ஏட்டா (*Fulica atra*)

கூட்ட பறவைகள் (The coot). இப்பறவைகளுக்கு நீளமானவிரல்களும் அவ்விரல்களைப் பினைக்கும்படியான படலமும் உள்ளன.



படம் 91. பழுவிக்கா ஏட்டா (*Fulica atra*)
[கூட்ட பறவை - (The coot)]



படம் 92.

மெட்டோபிடியஸ் இன்டிகஸ் (*Metopidius indicus*)
[வெண்கல நிற இறக்கையுடைய நெடுக்காசு (*The Bronza winged Jacana*)]

இவற்றின் இறகுகள் கருமைபான் சாம்பல் நிறமாகவோ, கறுப்பாகவோ உள்ளன. இவற்றிற்கு நன்றாக நீந்தும் நிறமும், நீரில் மூழ்கி வரும் நிறமும் உண்டு. இவை புழு, பூச்சி, மெல்லுடவிகள் முதலியவற்றை உண்ணுகின்றன. இவை அதிகமான ஒலியெழுப்பும் ஆற்றலுள்ள பறவைகளாகும்.

உதாரணம் : மெட்டோபிடியஸ் இன்டிகஸ் (*Metopidius indicus*)

வெண்கல நிற இறக்கையுடைய நெடுக்காசுப்பறவை (*The Bronza winged Jacana*). இப்பறவைகளுக்குப் பொதுவாகத் தனி

பறவைகளின் வகைபாடு

சிறியதாக உள்ளது. அவ்வுகன் நீளமாகவும் பக்கவாட்டில் தட்டையாகவும் காணப்படுகின்றன. இவைகளுக்கு குட்டையான வால் உள்ளது. இவைகளுக்கு நீரில் நடந்து செல்லும் தன்மைவுள்ளது. நீர் நிலைவங்களுக்குக்கருகில் இவை வசிக்கின்றன.

உதாரணம் : க்ரஸ் க்ரஸ் (Grua grus)

விக் குப் பகுதி கொக்குகள் (The eastern cranes). இப்பறவைகளின் தலைப்பகுதியில் இறகுகள் கிடையாது. தலையின் பக்கப்பகுதிகள் பகுத்து இறகுகளால் மூடப்பெற்றுள்ளன.



படம் 93. க்ரஸ் க்ரஸ் (Grua grus)
[விக் குப் பகுதி கொக்கு (The eastern crane)]

இவற்றின் இறகுகள் மிகவும் நீளமாக உள்ளன. வால் குட்டையாக உள்ளது. பாதத்திலுள்ள விரல்கள் குட்டையாகவும் உறுதியாகவும் உள்ளன. இவை குளிர் காலங்களில் இந்தியாவிற்கு வரும் வீசுத் தாளிப் பறவைகளாகும். இவை தென் வயல்களுக்குள் புகுத்து தெற் பயிர்களைத் தின்னும் பழக்கமுள்ளவை. இரவு நேரங்களில் கூட இரை தேடும் பழக்கமுள்ளவை. அதிக வெப்பமான நாட்

களில் இப்பறவைகள் நீர் நிலங்களில் ஒரு காவிலும் மட்டுமே நின்று கொண்டிருப்பதைக் காணலாம். இவை கூட்டமாகப் பறந்து நிரியும் இயல்புடையவை. இவை வாத்திய இசை போன்ற ஒரு ஒலியை எழுப்பும் தன்மைமையுடையன.

வரிசை : 12. கேரடிரி டிராமின் (Charadriiformes)

இவ்வரிசை சார்ந்த பறவைகளுக்கு நிறங்கள் நீளமாக உள்ளன, மற்றும் நிறங்களில் 11 முதற்படி நிறங்கள் உள்ளன. இவற்றிற்கு எண்ணெய்ச் சுரப்பிகள் உள்ளன. அண்ணம் னவுலோநேத்தல் வகையைச் சார்ந்தது. சிபர்குலா அல்லது கவை எனும்பு V வடிவ மாக உள்ளது. இரு கரோட்டிட் தம்னிகள் உள்ளன. இவற்றிற்கு மூட்டுக் குழாய்கள் உள்ளன.

உதாரணம் : பஹினஸ் இடிக்மஸ் (Burhinus oedicnemus)

இந்திய அழகுரல் எழுப்பும் வளை மூக்குக் கல் பறவை (The Indian stone curlew). இந்தியாவின் தெற்குப் பகுதிகளில் சாதாரணமாக இவற்றைக் காணலாம். புல், செடி, கொடிகளடர்ந்த காடுகளிலும், கற்களையுடைய நிறத்த நிலப்பரப்பிலும் இவை வளிக் கின்றன. மூங்கில் புதர்களுக்குள்ளும் இவற்றைக் காணலாம். இப்பறவைகள் பகல் நேரத்தில் வெளியில் வரும் பறக்கமுள்ளவையல்ல. சில சமயங்களில் பகல் நேரத்தில் மூங்கில் காடுகளில் மறை விடங்களில் அசையாமல் நின்று கொண்டிருப்பதைக் காணலாம். இவைகளுக்கு அதிகமாக பறக்கும் திறன் கிடையாது. சிறிது தூரம் பறந்து சென்றாலும் பின்பு தரையில் ஒடித்தான் இடப்பெயர்ச்சி செய்து ஒளிந்து கொள்கின்றன. இது தரையின் நிறத்தையே உடையதாக இருப்பதால் நிற்கும்பொழுது நடக்கும் பொழுது அவ்வளவு குறிப்பாகத் தெரிவதில்லை. மூதிரச்சியற்றப் பறவைகளைப் போன்றே குஞ்சுப் பறவைகளும் தங்களை புதர்களுக்குள்ளோ கற்குளியங்களுக்குள்ளோ மறைத்துக் கொண்டு ஒளிந்து வாரும் தன்மைமையுடையன. அந்தி வேளையில் பகல் பொழுது மூடித்து இருட்டுகின்ற சமயத்தில் இப்பறவைகள் ஒரு அழகுரல் எழுப்பி (Curlew) சத்தம் செய்யும் பறக்கமுள்ளவைகளாகும். இவை புழு, பூச்சிகள் உணவாக உள்ளன.

உதாரணம் : கிரேரியோலா மால்டிவாரம் (Glaucola maldivarum)

பெரிய இந்திய ஸ்வோலோ ப்ளேவர் பறவை (The large Indian swallow plover). குளிக்காலங்களில் இந்தியாவிற்கும் இலங்கைக்கும் வரும் பறவைகளாகும். வயல்களிலும், சுரப்பாக்களில் இடங்களிலும்,

ஆறுகளிலும், குளம், குட்டைகளுக்கருகிலும், பூச்சிகளைப் பிடித்து உணவாக உண்ணுவதற்காக வளிக்கின்றன. வெப்பமாக உள்ள நாட்களில் குளக்கரைகளில் நின்று கொண்டிருக்கின்றன.

உதாரணம் : ஸாரஸ் இக்தியேட்டஸ் (*Larus ichthyaetus*)

பெரிய கறுப்புநீலக் கப் பறவை (The great black headed gull). அனகுள் தடித்தும் அழுத்தப்படும் காணப்படுகின்றன. மேலாக நீண்டும் மேலவின் துளிப்பகுதிக்குடிக் வரிசையும் காணப்படுகின்றது.

சென்னைக் கடற்கரையிலும் திருவனந்தபுரத்திற்கருகிலும் இப்பறவைகளைக் காணலாம். இவை நீர் நிலைகளுக்கு மேல் மேது ஸாகப் பறந்து கொண்டோ அல்லது தண்ணீரின் மீது மிதந்து கொண்டோ இருத்தலைக் காணலாம். தரையிலும் நன்றாக நடக்கும் ஆற்றலை இப்பறவைகள் பெற்றுள்ளன. இவை மீது பறவைகளையும் மீன், புழு, பூச்சிகளையும் உணவாக உண்ணுகின்றன.

ஸாரஸ் என்ற பொது இனத்தினையே பல நிறப்பின்பு பறவைகள் உள்ளன. ஸாரஸ் பிப்பிட்டஸ் என்னும் நிறப்பின்பு பறவையை அனை மழுப்புப் ஒலி சிளிப்பதைப் போன்று இருப்பதால் சிபிக்கும் கப் பறவை என்று அழைக்கின்றனர். பின்னும் ஸாரஸ் பிரின்னீசெ



படம் 34. ஸாரஸ் பிரின்னீசெ. பாட்டஸ் (*Larus brunnicephatus*)
[மழுப்பு நிறத்தலையுடைய (க)கப் பறவை—(Brown headed gull)]

பிப்பிட்டஸ் (*L. brunnicephatus*) என்ற மழுப்பு நிறத்தலையுடைய கப் பறவை, ஸாரஸ் பிப்பிடஸ் (*L. fuscus*) என்ற மழுக்குப்புறம் கறுத்த நிறமுடைய கப் பறவை, ஸாரஸ் அர்ஜன்டேட்டஸ் (*L. argentatus*) என்ற மஞ்சள் கால்களையுடைய கப் பறவை என்ற பல நிறப்பின்பு பறவைகளும் உள்ளன.

உதாரணம் : ச்லிடோனியஸ் லியூக்கோபேரியா (*Chlidonias leucoparcia*).

இந்திய டெர்ன் பறவை (*The Indian whiskered tern*). இப்பறவையின் அயகு குட்டையாகவும் மெல்லியதாகவும் காணப்படும். அங்குசவிரண்டும் ஒரே நீளமுள்ளனவையே. வால் பகுதி இரண்டாகப் பிரித்து காணப்படும். கால்களும், மாதங்களும் நிறியதாகக் காணப்படும். இவை சரப்பல் நிறமுடைய பறவைகளாகும். சென்னை, மலபார் கடற்கரைப் பகுதிகளில் இவைகளைக் காணலாம். இவைகளைப் பொதுவாக கூட்டம் கூட்டமாக கடற்கரைப்பகுதிகளிலும், கடற்கரையிலிருந்து கடலினுள் பல மைல்களுக்குப் பாலுறும் காணலாம். இவை மீன்களைத் தாக்கிப் பிடித்து உணவாக உண்ணுகின்றன. இவை மணற்பாங்கான கடற்கரைகளிலும் பவளத் தீவுகளையும் சாதாரணமாக இனப்பெருக்கம் செய்ய ஏற்ற இடங்களாகத் தேர்ந்தெடுக்கின்றன.

உதாரணம் : ஸ்டெர்னா ஆரன்டியா (*Sterna aurantia*)

ஆற்றங்கரைகளில் காணப்படும் இந்திய டெர்ன் பறவைகள் (*The Indian river tern*). இவை இந்தியப் பகுதிகளிலேயே வசிக்கும் நிரத்தரவாசியாகும். பெரிய ஆறு, ஏரி முதலானவற்றிற்கருகில் சத்தமிட்டு பறந்து நிரிந்துகொண்டு மீன்களைப் பிடித்து உணவாக உண்ணும் பறவைகளாகும்.

உதாரணம் : ரிகர்விராஸ்ட்ரா அவோசெட்டா (*Recurvirostra avocetta*).

அவோசெட் பறவைகள் (*Avocet*). அவ்ருகள் கறுப்பாக உள்ளன. குஞ்சுப் பறவைகளில் அயகு நீண்டு நேர் கோட்டில் காணப்படும்.



படம் 95. ரிகர்விராஸ்ட்ரா அவோசெட்டா (*Recurvirostra avocetta*)
(அவோசெட் பறவை (*Avocet*))

பறவைகளின் வகையாடு

பின்பு ஒரு சில நாட்களுக்குள் மேற்புறம் நோக்கி வளைந்திருப்பதைக் காணலாம். இது தென் இந்தியப் பகுதிகளில் அபூர்வமாகக் காணப்படும் பறவையாகும். இவை நீர் நிலைப்பங்களுக்குள் தங்களது உணவான தண்ணீரில் வசிக்கும், சிறு புழு, பூச்சிகளை பிடிக்கும் பொருட்டு கூட்டமாகக்கூடிப் பறந்து திரிவதைக் காணலாம். நீரில் மூழ்கி நீந்தும் -ஆற்றலையும் இப்பறவைகள் பெற்றுள்ளன.

உதாரணம் : ட்ரிங்கா ஹைபோலெுகாஸ் (*Tringa hypoleucos*)

சாதாரணமாக மணல் பரப்பில் காணப்படும் குழாய் வடிவ அங்குடைய பறவைகள் (The common sand piper). இவை சாதாரணமாக கடற்கரைகளிலும் மற்றும் எல்லா இடங்களிலும் காணப்படும் பறவைகளாகும். இவைகளுக்கு நீரில் மூழ்கி நீந்தி வரும் திறன் மேன்மையாக அமைந்துள்ளது.

உதாரணம் : சேரேட்ரியஸ் ட்யூபியஸ் (*Charadrius dubius*)

சிறியவளைவமுள்ளப் போவார் பறவைகள் (The little ringed plover). குளிரினத்தில் இந்தியாவிற்கு வரும் பறவைகளாகும். இப்பறவைகளுக்குக் கழுத்தை சுற்றிலும் ஒரு சிறு வளைவுள்ளது. இவைகளுக்கு பாதத்தில் மூன்றே விரல்கள்தான் உள்ளன. இவைகளின் சிறகுகள் மிகவும் பெரியதாக அமைந்துள்ளன. இவை சிறுசிறு கூட்டமாக வாலும் பறவையினங்களாகும்.

உதாரணம் : செட்டுசியா க்ரிகேரியா (*Chettusia gregaria*)

சேப்ளிங் (The sociable lapwing). இவை இந்தியாவில் காணப்படும் பறவைகளினங்களாகும். போவார் பறவைகளில் உள்ளது போன்ற அவகுகளை உள்ளன. இவை வண்டு, வெட்டுக்கிளி போன்ற பூச்சிகளை உணவாக உண்ணுகின்றன.

உதாரணம் : ஹிமான்டோப்ஸ், ஹிமான்டோப்ஸ் (*Himantopus himantopus*)

கறுப்பு இறக்கைகளையுடைய ஸ்டிக்ட் பறவைகள் (Stilt). இது சாதாரணமாக நம் நாட்டில் காணப்படும் பறவையாகும். இதன் அவகுகள் நேராகவும் கேட்டியாகவும், மெல்லியதாகவும், கூர்மை வாகவும் காணப்படுகின்றது. நாகித் துவாரங்கள் அவகின் அடிப் பகுதியில் காணப்படுகின்றன. இறக்கைகள் நீளமாகவும் கூர்மை வாகவும் காணப்படுகின்றன. வால் குட்டையாக உள்ளது. கால்கள் மிகவும் நீளமாக இருக்கின்றன. பாதத்தில் பின்பக்க விரல்கள் கிடையாது. மைய விரல்களில் அகன்ற தோவிறைமங்களும் முதல்

விரம் மூன்றும் விரல்களுக்கிடையில் ஏடுவிய தொவிழை மிக்கழைகள்.



படம் 38. நரிமாங்கோம்பல் நரிமாங்கோம்பல்
(Himantopus himantopus)

[சுறுப்பு இறக்கைக்கொடியுடைய ஸ்டிக்ட் பறவை (Stilt)]

உதாரணம். க்ரோசித்தியா அல்பா (Crocethia alba)

சேண்டர்லிங் பறவை (Sanderling). இதன் அங்கு சுறுப்பாக உள்ளது. குளிர்காலங்களில் இந்தியாவுக்கு அபூர்வமாக வரும் பறவைகளாகும்.

உதாரணம் : எரோலியா மைனியூட்டா (Erolia minuta)

செதிர ஸ்டிக்ட் பறவைகள் (The little stint). குளிர்காலங்களில் நம் நாட்டில் காணப்படும் பறவைகளாகும். ஈரப்பாக்கான பகுதிகளில் கூட்டம் கூட்டமாகக் காணப்படும் பறவைகளாகும். இவற்றை ஆறுகளிலும், கடற்கரைப் பகுதிகளிலும் காணலாம். இவை நீரில் மூழ்கி ஊழும் பறவைகளாகும். அவ்வு சிறப்புறமாக நோக்கி வளைந்திருப்பதுடன் இவற்றிற்கு நீண்ட இறக்கைகளும், குட்டையான வால் பகுதியும், குட்டையான விரல்களும் உள்ளன.

உதாரணம் : ஸ்கோலோபெக்ஸ் ரஸ்டிகோலா (Scolopax rusticola)

மரச்சேவல் (The wood cock). மலையுச்சிகளில் இப்பறவைகள் வாழுகின்றன. இவை மெதுவாக பறக்கும் ஆற்றலுள்ள பறவைகளாகும்.

உதாரணம் : கேப்பெல்ஸ் நிமோரிக்ஸேசா (Capella nemoricola)

மர உள்ளாள் பறவைகள் (Wood snipe). இப்பறவைகள் கூடுவில் மிகவும் பெரிய பறவைகளாகும். மரச் செவ்வகங்கட்கும் உள்ளாள் பறவைகளுக்கும் வேறு வேறு விதமான இறகுகள் உள்ளன. டிப்பியாவின் சிழிப்பகுதி இறகுகளற்றுக் காணப்படுகின்றது. வாலில் 12 முதல் 28 வரை வாலிறகுகள் உள்ளன. இவை நன்கு கம்பறக்கும் திறனுள்ள பறவைகளாகும். இவை வண்டுகளையும் வண்டுகள் போன்றன கறுப்பு நிற விதைகளையும் உணவாக உண்ணுகின்றன. இவை மிகவும் அமைதிபாசம் பறவைகளாகும்.

உதாரணம் : கேப்பெல்ஸ் சாலிடேரியா (Capella solitaria)

கிழக்குப் பகுதி தனித்து வாழும் உள்ளாள் பறவை (The eastern solitary snipe).

உதாரணம் : கேப்பெல்ஸ் கேலினேகோ (Capella gallinago)

விசித்ரி வால் உள்ளாள் பறவை (The common or fantail snipe).



படம் 97. கேப்பெல்ஸ் கேலினேகோ (Capella gallinago)
[விசித்ரிவால் உள்ளாள் பறவை - (The common or fantail snipe)]

உதாரணம் : கேப்பெல்ஸ் மீடியா (Capella media)

பெரிய உள்ளாள் பறவை (The great snipe). இப்பறவைகளின் வெளி வால் இறகுகள் மிகுதுவாக உள்ளன. வெள்ளை நிறமுடையன. இவை அதிகவிரைவாகப் பறக்கும் ஆற்றலுள்ள பறவைகள்.

உதாரணம் : அல்கா இம்பென்னிஸ் (Alca impennis)

இது பறக்கும் திறனற்ற பெரிய ஆக் (Auk) பறவைவாகும். இவை கடற்கரையில் வாழும் தடித்த கூடலுடைய பறவைகளாகும்.

கால்கள் குட்டையாக இருந்தன. பாதங்கள் சிறியதாகவும் முள் பக்க விரல் தோல் இழைமக்களாடல் இருந்தன. இரக்கைகள் குட்டையாகவே இருந்தன. இவை மலை உச்சியிலும் மற்றும் உள் நாட்டுக் காடுகளிலும் இனப்பெருக்கம் செய்யும் தன்மையுள்ளவைகளாகியிருந்தன. இப்பறவைகள் 1844ஆம் ஆண்டிற்குப் பின் மறைந்துவிட்டன.

உதாரணம் : மெர்கேலஸ் அலே (Mergallus alle)

இவை சிறிய ஆக் பறவைகளாகும். நன்றாகப் பறக்கும் திறனுடைய பறவை வகைகளாகும்.

உதாரணம் : கேத்தாரேக்டா ஸ்குவா (Catharacta skua)

ஸ்க்குவாப் பறவைகள், கறுப்பு நிற கடற்பறவைகளாகும். அவை தடித்தும் முன்புறம் வளைந்தும், கால்கள் தடித்தும் நெருக்கம் நீண்டும் காணப்படுகின்றன. இவை நினைத்தில் வலிக்கும்பொழுது சிறு பாலூட்டிகள், பெரிய பெரிய பூச்சிகள் முதலானவற்றை இரைவாக வேட்டையாடி உண்ணுகின்றன. மற்றும் இப்பறவைகள் கல், டெர்ன் முதலான பறவைகள் அனைத்து தேடி சேகரித்து வந்த உணவிலைத் தட்டிப் பறித்து எடுத்துண்ணும் பழக்கமுள்ளவையாகும். இவை பொந்துகளில் புறிகளினால் கூடு கட்டுகின்றன. இப்பறவைகள் தம் உணவை வேட்டையாடிப் புரிப்பதால் வேட்டைப் பறவைகள் என்றே அழைக்கப்படுகின்றன.

உதாரணம் : ரீன்காப்பஸ் ஆப்பிக்கோலிஸ் (Rhyachops albicollis)

இந்திய ஸ்கிம்மர் பறவைகள் (The Indian skimmer). இவை கத்தரீக்கோல் போன்ற அழகுகளையுடைய கடற் பறவைகளாகும். இவற்றிற்கு குட்டையான கால்களும், சிறிய பாதங்களும் உள்ளன. பாதத்தின் விரல்கள் தோலிழைமக்களால் சேர்க்கப்பட்டுள்ளன. வால் பகுதி சிறிது வெட்டப்பட்டு இரு பிளவுகளாகக் காணப்படுகின்றது. இப்பறவைகளின் கீழைகு மேலைகுக்கு மேலே தீட்டப் பெற்றுள்ளது. இரு அங்குகளின் ஓரங்களும் கத்தியின் விளிம்பினைப் போன்ற அமைப்புள்ளது. வால் மூடிய நிலையில் கீழவின் கத்தி போன்ற விளிம்புப் பகுதி மேலவின் பொருத்தி வைப்பதற்கு வரிப் பள்ளத்துடன் நெடுபாசவும் குறிப்பிடத்தக்க முறையிலும் அமைந்துள்ளது. இவை மீன்களையே உணவாக உண்ணுகின்றன. இவை நீரினுள் வானைத் திறந்த நிலையில் மூழ்கி நீர்த் துருகின்றன. அவ்வாறு நீர்த் துருகும்பொழுது அதன் இரைவான சிறு மீன் முதலானவைகள் அவைகளுக்குள் செல்லும், அவைகள் மூடி மீனையோ மற்றவற்றையோ பிடித்து உண்ணுகின்றன. இதன் அழகுகள்

குறுக்காக அமைப்பில்லையாதலால் இவற்றின் அவயவின் கத்தரிக்கோல் அளவு என்று கூறுவதும் சரியானதாகாது. இவை நம் தாட்டில் கடற்கரை ஓரங்களிலும் பெரிய ஆதிரங்கரைகளிலும் காணப்படுகின்றன. இவை கூட்டம் கூட்டமாக கூடி வலிக்கின்றன.

உதாரணம் : சிங்காயில் பிளவிராண்டிசில் (*R. flavirostris*)

இவை ஆப்பிரிக்க ஸீம்கிள் பறவைகள்.

உதாரணம் : சிங்காயில் கைகிரா (*R. nigra*)

சிங்காயில் சினேரான்சென்ஸ் (*R. cinerascens*). இவை அமெரிக்க ஸீம்கிள் பறவைகளாகும்.

வரிசை 13. குக்குலிபாஸ்சில் (*Cuculiformes*)

இவ்வரிசை சார்ந்த பறவைகளுக்கு முதல் விரலும் நான்காவது விரலும் பின்புறமாக நீண்டும், இரண்டாவது மூன்றாவது விரல்கள் முன்புறமாக நீண்டும் காணப்படுகின்றன. குடம் பகுதியில் முட்டுக் குழாய் உள்ளன. இருபக்க கரோட்டிட் தமலிகளும் உள்ளன. நீண்ட இறகுகளுக்கு பின் குழல் தண்டு கிடையாது. இப்பறவைகளுக்கு எண்ணெய்ச் சுரப்பிகள் உள்ளன. இவ்வுலூகப் பறவைகளுக்குப் பொடி இறகுகள் கிடையாது. இவைகளுக்கு கூர்மையான நீண்ட இறக்கைகள் உள்ளன. அழகு வளத்தும் இருபினவாகவும் உள்ளது. வாயில் 10 வாய் இறகுகளுள்ளன.

உதாரணம் : குக்குலஸ் கெனோரெஸ் (*Cuculus canorus*)

ஆசிய ஆயில் வகை (*The Asiatic cuckoo*). இவை இளவேனில் காலத்தில் நீலநிற மயில் பகுதிகளுக்கு வரும் பறவையினமாகும். இவை நன்றாக குரல் எழுப்பும் தன்மை உள்ளவை. சிலவற்றிற்கு இனிமையான குரல் உண்டு. இவை கம்பளி பூச்சிகளையும், மற்ற மென்மையான புழுப் பூச்சிகளையும் உணவாக உண்ணுகின்றன. இப்பறவைகள் ஒட்டுண்ணிகளாகக் கருதப்படுகின்றன. தங்கள் குழட்டைகளை மற்ற பறவைகளின் கூடுகளில் வைத்து பொரிக்கும் தன்மையுள்ளவைகளாகும். இவை சாதாரணமாக முட்டைகளை நிலத்தில் இட்டு அவைகள் உதவியுடன் எடுத்துச் சென்று மற்றப் பறவைகளின் கூடுகளில் வைத்தாலும் பழக்கமுடையப் பறவைகளாகும். இவைகளுக்கு வலசை போகும் பழக்கமுண்டு. இப்பறவைகளுக்கு தலைவிட கொண்டை கிடையாது. இறக்கைகள் நீண்டும் கூர்மையாகவும் காணப்படும். வாய், இறக்கைகளிலிட சிறியதாகக் காணப்படுகின்றது. முதிர்ச்சியுற்ற பறவைகள் கரும் சாய்பல் அல்லது கரும் பழுப்பு நிறமாக உள்ளன. வயிற்றுப் பகுதி வெள்ளை நிறமாக உள்ளது.

உதாரணம் : குக்குலஸ் மைக்ரோப்டெரஸ் (*Cuculus micropterus*)

இவை இந்திய குயில் பறவை (The Indian cuckoo). இவை திருவிதாங்கூரில் மிகுதியாகக் காணப்படும் பறவைகளாகும். இப் பறவைகளுக்கு மிகவும் இனிமையாக பாடும் திறனுள்ளதாகக் கூறப் படுகின்றது. இந்தியாவில் மற்றப் பகுதிகளிலும் இவை காணப்படுகின்றன.

உதாரணம்: ஹீரோகாட்சிக்ஸ் வேரியஸ் (*Hi-rocoocyx Varius*)

பெரிய பருத்து குயில் வகை (The common hawk cuckoo). இவை "ஹீரோக்காய்ச்சம்" பறவை என்று பொதுவாக அழைக்கப்படும். இவைகளுக்கு மிகவும் சிறிய இறக்கைகள் உள்ளன. இவை பருத்து கிபாய்க்கன்களைப் போன்ற திறமூடைய பறவைகளாகும்.

உதாரணம் : ஸ்கோலோபேசியஸ் (*Eudynamis scolopacea*)

இந்தியக் குயில் வகை (The Indian koel). இவைகளில் அனகு தடித்து காணப்படும், சிறகுகளும் வால் பகுதியும் ஒரே நீளமுள்ள



படம் 98. ஸ்கோலோபேசியஸ் (ஆணுக் பெண்ணுக்) (*Eudynamis scolopacea*) [இந்தியக் குயில் - (The Indian koel)]

வைகள். டார்சல்கள் நீண்டும் தடித்தும் காணப்படுகின்றன. இரண்டாம் பறவைகளும் உருவில் ஒரே மாதிரியாக இல்லை. குஞ்சுப் பறவைகள் ஆண் பறவைகளை ஒத்திருக்கின்றன. புற்சமஸெஸிப் பகுதிகளில் இவைகளைச் சாதாரணமாகக் காணலாம். காரணம்

விருத்து இரவு நேரம் வரை ஒலி எழுப்பிக்கொண்டே இருக்கும் தன்மைவுள்ளவை இப்பறவைகள்.

வகை-14. கொரரசி :பாங்கில் (Coraciiformes)

அண்ணம், டெம்மோநேத்தல் வகையைச் சார்ந்தது. நேரவகை என்ற முதல் விரல் இயற்றிற்கு உண்டு. மூன்றுமாக மூன்று விரல்கள் அடிப்பகுதியில் பிணைக்கப்பட்ட நிலையில் நீண்டுள்ளது.

குடும்பம்: கொரரசிடே (Coraciidae)

அயகு நீண்டுள்ளது. மெலமகு துலியில் வருவுடைபதாய் அமைந்திருக்கும். அவதின் அடிப் பகுதியில் நாகித்துவாரங்கள் அமைந்துள்ளன. நெடுகில் பத்து முதற்படி இறகுகளும், வானில் 12 இறகுகளும் உள்ளன. இதுபால் பறவைகளும் உருவத்தில் ஒரே மாதிரியாக இருக்கும்.

உதாரணம்: கொரரசியல் பெங்காலென்சில் (Coracias bengalensis)

தென் இந்தியப் பனங்காடைப் பறவைகள் (The Southern Indian roller). இப்பறவைகளின் அவதிகள் பக்கவாட்டில் சற்று



படம் 99: கொரரசியல் பெங்காலென்சில் (Coracias bengalensis)
[தென் இந்திய பனங்காடைப் பறவை அல்லது ஊதா நே பறவை
(The Southern Indian roller or blue jay)]

குட்டையாகவும் நீளமாகவும் உள்ளன. இதை நீல நிற ஜே பறவைகள் (Blue Jay) என்று சாதாரணமாக அழைப்பர். இவை அடர்ந்த காடுகளிலும் புல் சம வெளிய்பகுதிகளிலும் பெரிய தோட்டங்களிலும் பொதுவாகக் காணப்படும் பறவைகளாகும். இவை மின்சாரக் கம்பிகளிலோ, மரக்கிளைகளிலோ குத்தி அமர்ந்துகொண்டு தண்ணீர் சுற்றியுமுள்ள சுற்றுச் சூழ்நிலையை ஆராய்ந்துகொண்டே இருக்கும். தன் உணவான பூச்சிகளை அவ்விடங்களில் கண்டால் உடனே அதன்மீது பாய்ந்து எடுத்து அதை உண்ணும்.

உதாரணம்: யூரிஸ்டோமஸ் ஓரியண்டலிஸ் (Eurystomus orientalis)

இது அகன்ற அலகுக்கொடியுடைய பனங்காடைப் பறவைகள் (The broad billed roller). அங்கு குட்டையாகவும் மேலங்கு துணி வளர்த்தும் காணப்படுகின்றது.



படம் 100. மீரோப்ஸ் ஓரியண்டலிஸ் (Merops orientalis)
(இந்தியப் பஞ்சுட்டான் பறவை
(The common Indian bee eater))

இவற்றின் அங்கு நீண்டு மெல்லியதாகவும் கூர்மையாகவும் காணப்படுகின்றன. நாகித்துவாரங்கள் இறகுகளால் மூடப்

பெரும்பாலும் கானவாம். இவை அதிக ஒலியை எழுப்பிக் கொண்டும் ஒழுங்கற்ற முறையில் இங்குமங்கும் பறந்து திரிந்து கொண்டும் இருப்பதாக இவை மற்றவர்களின் கவனத்தை ஈனிடிக் கவர்ந்துகொள்ளின்றன.

குடும்பம்: மீரோப்பிடே (Meropidae)

இக்குடும்பப் பறவைகளில் அவகு நீளமாகவும் மெல்லியதாகவும் உள்ளது. இது அவகுகளும் துளியில் கூர்மையாக உள்ளன. பாதங்களும் கால்களும் மிகவும் மெலிந்து காணப்படுகின்றன. வாலில் 12 இறகுகள் உள்ளன. சிறகில் பத்து முதற்படி இறகுகள் உள்ளன. இதுபால் பறவைகளும் ஏறத்தாழ ஒரே மாதிரி வாகவே இருக்கும்.

உதாரணம்: மீரோப்ஸ் ஓரியண்டலிஸ் (Merops orientalis)

இந்திய பஞ்சுட்டான் பறவை (The common Indian bee eater).

இவற்றின் அங்கு நீண்டு மெல்லியதாகவும் கூர்மையாகவும் காணப்படுகின்றன. நாகித்துவாரங்கள் இறகுகளால் மூடப்

பட்டுள்ளன. இறகுகள் நீளமாகவும் கூர்மைவாகவும் அமைந்துள்ளன. இவை சாதாரணமாக நம் நாட்டில் எல்லா இடங்களிலும் காணப்படும் பறவைகளாகும். 8000 அடி உயரமுடைய மலைப்பகுதிகளிலும் இவற்றைக் காணலாம். புதர்களிலோ, மரங்களிலோ உள்ள வெளியே நஞ்சுத் தெரிவும்படியான ஒரு மிணியிலோ மின்சாரக் கம்பிகளினோ குத்தும் நிலையில் இவை இருப்பதைக் காணலாம். அம்மாதிரி குத்தும் நிலையிலிருந்து அடிக்கடி பக்கத்து இடங்களுக்கு பறந்து சென்று பூச்சி களைப் பிடித்துவதைக் காணலாம்.

உதாரணம்: மேரோப்ஸ் சூப்பர்கிலியோசஸ் (Merops superciliosus)

நீல நிற வாலிசையுடைய பஞ்சகுட்டான் பறவை வகை (The blue tailed bee eater). இவையும் பொதுவாக நாம் எல்லா இடங்களிலும் காணும் பறவைகளாகும். நீர் நிலைங்களுக்குருகில் இவற்றைக் காணலாம். நெல் வயல் பகுதிகளிலும் ஆற்றங்கரைகளிலும் கழி முகங்களிலும் (Back water) இப்பறவைகள் வசிக்கின்றன.

குடும்பம்: அல்சிடினிடே (Alcedinidae)

இக் குடும்பப் பறவைகளுக்கு இரண்டு கரோட்டிட் தமலிகளும் உள்ளன. எண்ணெய்ச் சுரப்பியைச் சுற்றிலும் குஞ்சும் போன்ற இறகுகளுள்ளன. இவற்றின் குடம் பகுதியில் முட்டைக் குழாய்க் கலக்கிய.

உதாரணம்: செரிலி குடல் (Ceryle rudis)



படம் 101. செரிலி குடல் (Ceryle rudis) [இந்திய அரசு மீன் கொத்தி (The Indian pied king fisher)]

இந்திய அரசு மீன் கொத்திப் பறவை (The Indian pied King fisher), இறகுகள் வெள்ளையும் கறுப்பும் கலந்த நிறமுடையவைகளா

புள்ளன. அவை நீண்டும் ஒடுக்கப்படும் காணப்படுகின்றது. வால் நீளமாக உள்ளது. இவை ஆறு, குளம், குட்டை முதலான இடம் களுக்குச் சென்று திரும்பி புவிவெளிப் பகுதிகளில் வசிக்கும் பறவைகளாகும். தண்ணீருக்குள் செங்குத்தாகச் சென்று தன்னுடைய இரையான மீன் இறக்கைகளின் உதவியால் தூக்கி வருகின்றபடியால் இவை மிகவும் குறிப்பிட்டுச் சொல்லக்கூடிய பறவைகளாகும்.

உதாரணம்: அல்கிடோ ஏத்தில் (Alcedo atthis)

இவர்களை வாழ அரச மீன் கொத்திப் பறவைகள் (The common Ceylon king fisher). இவற்றின் முதுகுப்புறம் மிகவும் பளபளப்புள்ள நீல நிறமாக உள்ளது. தலை கறுப்பு நீல நிறம் ஆகிய இரு நிற பட்டைகளாகத் தெரிகின்றது. அவை நீண்டும் அழுத்தப்பட்டும் காணப்படுகின்றன. வால் குட்டையாகவும் உருண்டை வடிவாகவும் காணப்படுகின்றது. இவற்றின் கால் மிகவும் மென்மையானது. இவை நீர் நிலையங்களுக்கு அமர்ந்து தன்னுடைய இரையான மீனைப் பிடித்துத் தின்னுக்கின்றன.

உதாரணம்: சிபிக்ஸ் டிரைடேக்டைலஸ் (Ceyx tridactylus)

மூன்று விரல் இடைய அரச மீன்கொத்தி பறவைகள் (The Indian three toed king fisher). இவற்றிற்கு காலில் மூன்று விரல்கள் மட்டுமே உள்ளன. வால் குட்டையாகவும் உருண்டையாகவும் காணப்படுகின்றன. நிறங்களின் நிறம் பளபளப்பாக உள்ளன. அடில் சிவப்பு நிறம் அதிகமாகக் காணலாம்.

இப்பறவைகள் பெரும்பாலும் அடர்த்த காடுகளிலேயே வசிக்கின்றன. இவை சைத்தி, புழு, பூச்சிகள் உணவாகக் கொள் கின்றன.

குடும்பம்: பூசெரோட்டிடே (Bucerotidae)

இக்குடும்பத்தைச் சேர்ந்த பறவைகளான மீன்கொல்லிகள் (Horn bill) பறவைகளுக்கு நெருங்கு மூட்டுக்குழாய்கள் கிடையாது. எண் ணெய்ச் சுரப்பிகளைச் சுற்றிலும் மயிர்க்களை குஞ்சுப்பகுதியுள்ளது. இரு சரோட்டிப் தமனிகளும் இவற்றிற்கு உண்டு. நீண்ட இறகு களில் இறகுக்குஞ்சம் கிடையாது. இறக்கைகளில் 11 முதலாம் படி இறகுகளும் 10—16 இரண்டாம் படி இறகுகளுமுள்ளன. இப் பறவைகள் பறக்கும் பொழுது அதிகமான ஒலி ஏற்படுகின்றது. வாலில் 10 இறகுகள் உள்ளன. அவை எப்பொழுதும் மிகவும் பெரியதாக அமைந்திருக்கும். கண் இமைகளில் நீண்ட கண்மயிர்கள்

உள்ளன. இது பாக் பறவைகளும் உருவில் ஏறத்தாழ ஒன்று போலிருக்கும்.

உதாரணம்: டைக்லோசீராஸ் ஐபிகர்னீஸ் (*Dichoceros bicornis*)

மிகப்பெரிய மலைமொங்கான் பறவை (The great horn bill). இவை உருவத்தில் மிகவும் பெரிய பறவைகளாகும். அனஞ்சன் பெரியதாகவும் தடித்தும் வளைந்தும் காணப்படுகின்றன. தலைக்கவசம் அகன்றதாகவும் பெரியதாகவும் உள்ளது. நீரிமிடிமலைப் பகுதிகளிலுள்ள அடர்ந்த காடுகளில் இவற்றைக் காணலாம். நிகுவிதாங்கூர் பகுதிகளிலும் இவை காணப்படுகின்றன.

உதாரணம்: லோஃபோசீராஸ் ஐபிராஸ்ட்ரீஸ் (*Lophoceros birostris*)

சாம்பல் நிற மலைமொங்கான் பறவை (The common grayhorn bill). இவை உருவில் சிறிய பறவைகளாகும். அனஞ் வளைந்து காணப்படுகின்றது. வடம் நுனிப்பகுதி செவ்வச் செவ்வ குறுகி காணப்படு



படம் 102. லோஃபோசீராஸ் ஐபிராஸ்ட்ரீஸ் (*Lophoceros birostris*)
(சாம்பல் நிற மலைமொங்கான்- (The common grey horn bill))

கின்றது. இவை பொதுவாக சாம்பல் நிறமுடைய பறவைகளாகும். மலபார், நிகுவிதாங்கூர் முதலிய பகுதிகளின் கடற்கரைப் பகுதிகளைத் தவிர இம்நிலாவின் மற்ற எல்லாப் பகுதிகளிலும் காணலாம். காடுகளிலும் திறந்த புல்வெளிகளிலும் இவை வசிக்கின்றன. இவை

சோடி சோடியாகவோ, சுட்டமாகவோ சேர்த்து வாரும் தன்மை வுடைய பறவைகள். இவை ரீயீ (pee-ye) என்ற குறிப்பிடத்தக்க ஒலியை எழுப்புகின்றன. இவை பொதுளாகப் பழங்களை உணவாக உண்ணும் பறவைகளாகும். ஆனால் சிறு பூச்சிகள், ஊர்வனப் பிராணிகள் முதலியவற்றையும் உணவாக உண்ணுகின்றன.

குஞ்சுப், உப்பூயிடே (Upupidae)

இக்குஞ்சுப் பறவைகளுக்கு ஒரே ஒரு இடதுபக்கக் கரோட்டிடம் தமனி மட்டுமே உள்ளது. இப்பறவைகளின் பாதத்தில் மூன்றுவது நாங்காவது விரல்கள் அடிப்பகுதியில் இணைக்கப்பட்டு உள்ளன.

உதாரணம்: உப்பூயிபா ஸ்போபில் ஒரியண்டலிஸ் (Upupa epops orientalis)

இந்தியக் கொண்டலாத்தி பறவைகள் (The Indian hoopoe). இவற்றின் அலகு மிகவும் மெல்லியதாகவும் அடிப்பகுதியில் வளைந்தும் காணப்படுகின்றது. நாக்கு மிகவும் குட்டையாகக் காணப்படு



படம் 103: உப்பூயிபா ஸ்போபில் ஒரியண்டலிஸ் (Upupa epops orientalis)

(இந்திய கொண்டலாத்தி பறவை-The Indian Hoopoe)

கின்றது. கொண்டலாத்தி இவற்றிற்குண்டு. பின்பக்க இறகுகள் மிகவும் நீளமாக உள்ளன. டார்ச்சு பகுதி குட்டையாகவுள்ளது. இவற்றிற்கு மிக அழகான பல நிறங்களுள்ளன.

உதாரணம்: உப்புப்பூ எபோப்ஸ் சிளோனென்சிஸ் (Upupa epops ceylonensis)

இலங்கை கொண்டனாத்திப் பறவை (The ceylon hoopoe). இவை சமயேலிப் பகுதிகளில் காணப்படும் சாதாரணப் பறவை யினங்களாகும். ஆனால் இனப்பெருக்கக் காலங்களில் இவை மலைப் பகுதிகளுக்குச் சென்றுவிடும் பழக்கம் உள்ளவை. இவை புழு, பூச்சிகளை உணவாக உண்ணுதற்கெற்ற தோட்டங்கள், காடுகள் முதலிய இடங்களில் கொண்டைத் தொங்கிய நிலையில் இரைதேடி உண்ணுவதைக் காணலாம். ஆனால் அக்கலத்தப்படும் பொழுதோ, அழிவிரையாகப் பறந்து சென்று மரங்களில் வினை முதலியப் பகுதி களில் உட்காரும் பொழுதோ கொண்டைப் பகுதி நேராக நிமிர்ந்த அழகான நிலையில் இருத்தல்க் காணலாம். இனப்பெருக்கக் காலங் களில் இவை சத்தமிடும் பழக்கமுள்ள பறவைகளாகும்.

வகை-15. பீலி:பாம்பில் (Piciformes)

இவ்வினச் பறவைகளுக்கு பித்தப்பை மிகவும் நீளமாகவும் குழாய் வடிவத்துடனும் காணப்படுகின்றன. இவற்றின் பாதங்கள் மரங்களில் விளைகளில் ஏறிச் செல்வதற்கெற்றதாக அமைந்துள்ளன. இவை பெரும்பாலும் பூச்சிகளையே உணவாக உண்ணுகின்றன. இவற்றின் பாதத்தில் முதல் விரலும் நான்காவது விரலும் பின்பக்க மாகவும் இரண்டாவது விரலும், மூன்றாவது விரலும் முன்பக்க மாகவும் நீண்டுள்ளன. இத்தகைய தன்மைக்கு ஹைகோடேக்ஸ்டிலி (Zygodactyly) என்று பெயர்.

தடித்த உறுதியான இதன் அனகு மரத்தை கொத்துவதற்குரிய சாதனமாகப் பயன்படுகின்றது. இப்பறவைகளில் நாக்கு நீளமானதாகவும் வெளியில் நீண்டு உள்ளே இழுத்துக் கொள்ளக் கூடியதாகவும் உள்ளது. நாக்கின் துணி ரம்பப் போன்றுள்ளது. நாக்கினைத் தாங்கும் நாவடி ஏலும்பின் மூளை மிகவும் நீளமுள்ளதாக உள்ளது. இவை மண்டையோட்டின் அடிப்பாகத்திலிருந்து அவகின் அடிப்பாகத்திற்கு நன்றாக வளைந்து கொடுக்கும்படி நாவடி உறுப்பின் மூளைகள் தசைப் பைக்குள் நன்றாகப் பொருத்தப்பட்டுள்ளன. வால் இறகுகள் பறவை மரத்தில் ஏறும்பொழுது உட்கை தாங்குதற்குப் பயன்படுகின்றன. முட்டைகள் மரப்பொந்துகளில் இடப்படுகின்றன.

குடும்பம். பீலிடே (Picidae)

அனகு உறுதியாக அமைத்திருப்பதுடன் பொருட்களை வெட்ட உதவும் கருவியாகவும் பயன்படுகின்றது. மேலனவின் துளி செங்குத்

தாக கத்தி போன்றுள்ளது. நாயடி உறுப்பின் கொம்புகள் நீண்டு காணப்படுவதுடன் மண்டையோட்டின்ச் சுற்றி அமைந்துள்ளது.

உதாரணம்: நிக்கல் வைட்டேட்டஸ் (*Picus vittatus*)

வயிற்றுப் பகுதியில் செதில் உடைய பச்சை மரங்கொத்திப் பறவை (The little scaly bellied green wood pecker). நாகித் துயரங்கள் இறகுகளால் மூடியுள்ளன. நான்கு விரல்களுள்ளன. ஆண் பறவைகளும் பெண் பறவைகளும் நிறத்தில் வேறு வேறு உள்ளன. ஆண்பறவைகளின் தலையில் கொண்டை இருப்பதுடன் தலை



சிகப்பு நிறத்துடன் காணப்படும். பெண் பறவையில் கொண்டைப் பகுதியில் சிகப்புநிறம் கிடை யாது. 5000 அடி உயரத்திற்கு மேலுள்ள மலைப்பகுதிகளில் இப் பறவைகள் வசிக்கின்றன. இவற் றின் சிறகுகள் பச்சை நிறமாக உள்ளன.

உதாரணம் : பிக்கல் க்ளோரோ ஹேப்பஸ் (*Picus chlorolophus*)

இந்திய சிதில மரங்கொத்திப் பறவைகள் இவை பொதுவாக எம்மள இடங்களிலும் காணப் படும் மரங்கொத்திப் பறவைகள்.

உதாரணம் : பிரேக்ஸிடெர்னஸ் பெங்காலென்சிஸ் (*Brachypterus benghalensis*)

படம் 104. பிரேக்ஸிடெர்னஸ் பெங்காலென்சிஸ் (*Brachypterus benghalensis*) [தென்பகுதி தங்க முதுகுப்புறமுடைய மரங்கொத்தி— (The Southern golden backed wood pecker)]

தென்பகுதி தங்க முதுகுப்புற முடைய மரங்கொத்தி (Southern golden backed wood pecker). இவைகளை சாதாரணமாக சம வெளிப் பகுதிகளில் காணலாம். இவை மாமரம், பனைமரம் முத

லில இடங்களில் வசிக்கும் பழக்கமுள்ளவை.

குடும்பம். கேபிட்டுடோனிடே (*Capitonidae*)

இக்குடும்பப் பறவைகளுக்கு வால் இறகுகளும், இறக்கையின் முதலாம்படி இறகுகளும் எண்ணிக்கையில் ஒவ்வொன்றும்

பத்துள்ளது. அவரு தடித்தும் உறுதியாகவும் உள்ளது. வால் உருண்டை ஸ்டீவ்ஸனாக உள்ளது.

உதாரணம்: தெரிசிரெக்ஸ் சிலேன்னிக்கஸ் (*Theriaceryx zeylanicus*)

இவ்வகை பச்சை பார்பெட் பறவை (*The ceylon green barbet*). இவற்றின் இறகுகளெல்லாம் பச்சை நிறமாக இருக்கும். மேலங்கு சிழவகிளை நன்றாக மூடிவிடும்படி அமைந்துள்ளது. நாகித்துவாரங்கள் இறகுகளால் மூடப்படவில்லை.

உதாரணம்: சேன்த்நோலேமா ஹேமசெயாஸா (*Xantholaema haemacephala*)

இந்திய சிகப்பு மார்பு பார்பெட்டுகள் (*The Indian crimson breasted barbet*). இவற்றின் அவகு குட்டையாகவும் அடர்த்தியாகவும் உள்ளது. இவை டுக் டுக் என்ற ஒலியை மரங்களில் எப்பொழுதும் ஏற்படுத்தும் பறவைகளாகும். இவை தன் அடியினால் மரங்களில் குத்துவதிலும் ஏற்படும் ஒலிகூட இவற்றின் உடல் பச்சை நிறமாக இருப்பதால், மரத்திலின்றும் இவற்றைப் பிரித்துக் காணாதல் கடினமாகும்.

வரிசை-16. சிட்டாசிடாமியில் (Psittaciiformes)

இவ்வரிசை சார்ந்த பறவைகளுக்கும் மேலே குறிப்பிட்ட வரிசை விதுள்ளது போன்றே ஹாகோடேக்கடையி பரப்பு கிரகங்களில் காணப்படுகின்றன. அவகு குட்டையாகவும் தடித்தும் உறுதியாக வளைத்தும் காணப்படுகின்றது. மேலங்கு நன்றாக அசையும்படி மண்டையோட்டுடன் பொருத்தப்பட்டுள்ளது குறிப்பிடத்தக்க தொன்றாகும். அண்ணம் டெஸ்மோதேத்தஸ் பிரிவைச் சார்ந்தது. அவின் நுனியில் சதைப்பற்றுள்ள சிவப் பகுதி, ஊனுண்ணும் பறவைகளில் உள்ளது போன்று இப்பறவைகளுக்கும் உள்ளது. இதன் நாக்கு அடர்த்தியாகவும், சதைப் பற்றுடனும் காணப்படுகின்றது. இவற்றிற்கு முட்டுக்குழாய்கள் கிடையாது. பித்தப்பையும் கிடையாது. கிப்பர்குலா எனும்பு மிகவும் மேன்மையாக உள்ளது. நீண்ட இறகுகளில் பிக்குழல் தண்டுள்ளன. எண்ணெய்ச் சுரப்பிகளுள்ளன. காலில் 13 இறகுகள் உள்ளன.

குடும்பம். சிட்டாசிடே (Psittacidae)

உதாரணம்: சிட்டாக்குலா யூபேட்சியா (*Psittacula eupatria*)

இவ்வகை பெரிய கிளி வகை (*The large ceylonese paraquet*). ஆண் பறவைகள் பெரியதாகவும், பெண் பறவைகள் சற்று சிறிய

தாகவும் காணப்படுகின்றன. அனகு மிகவும் ஒடுக்கப்பட்டுக் காணப்படுகின்றது. வால் மிகவும் நீளமாக இருக்கும். அவரு அடர்த்தியாகவும் ஆழமாகவுமுள்ளது. மேலைகு பக்கங்களில் புடைப்புடன் காணப்படுகின்றன. இப்பறவைகளை மைசூர், மனபார் பகுதிகளிலும் காணலாம். இவை மந்தை மந்தையாகக் கூடி சத்தமிட்டுக் கொண்டே பறந்து திரியும்.

உதாரணம்: சிட்டாக்குளா க்ரேமெரி (Psittacula krameri)

வேளிர் கெப்பு கழுத்து வளையமுள்ள வெர் லகை (The rose ringed parakeet). இப்பறவைகளில் தலையும் உடலும் வெர்ப்பச்சை நிறமுள்ளன. கழுத்தைச் சுற்றி ஒரு சிறிய கறுப்பு வளையம் உள்ளது. இத்தொடரில் வசிக்கும் சாதாரண கிளிவகைகள் இப்பறவைகள். இவை கனகும்



படம் 105. சிட்டாக்குளா-க்ரேமெரி (Psittacula krameri) (வேளிர் கெப்பு கழுத்து வளையமுள்ள வெர்-
(The Rose ringed parakeet))



படம் 106: சிட்டாக்குளா சயரே செட்டாஸா (Psittacula cyanocephala)

[மேற்குப் பகுதி மொட்டுத்தலை வெர் - (The western bloom headed parakeet)]

மந்தையாகவே வசிக்கின்றன. தோட்டங்களிலும் காடுகளிலும் இவற்றைக் காணலாம். இவை சோளப்பயிருக்கு பெரிதும் சேதம் விளைவிக்கின்றன. இவை பறக்கின்றபடி பெருமளவில் கூண்டுவென்ற

படியாகப் பழத் தோட்டங்களுக்கும் சேதம் விளைவிக்கின்றன. கொய்யா மரத்திலுள்ள கொய்யாப் பழங்களை இவை பெரிதும் விரும்பி உண்ணுகின்றன.

உதாரணம்: சிட்டாக்குள சைனோசெபாலஸ் (*Psittacula cyanocephala*)

மேற்குப் பகுதி மொட்டுத்தலை 'மினிவகை' (The western bloom headed parakeet), இவை 3500 அடி உயரத்திற்கு மேலுள்ள நீலநிலி மலைப்பகுதிகளில் வசிக்கின்றன. திருவிதாங்களுக்கருகிலுள்ள மலைப் பகுதிகளில் இவற்றைக் காண முடியாது. இவை வேகமாகப் பறந்து திரிவும் பறவைகளாகும்.

உதாரணம்: சிட்டாக்குள கொலம்பாய்டெஸ் (*Psittacula columboides*)

ஊதா நிற நிறமினியுடைய மினிவகை (The blue winged parakeet), சுமார் 4500 அடி உயரமுள்ள நீலநிலி மலைப் பிரதேசங்களில் இவை வசிக்கின்றன. மைசூரிலும், பழனி மலைப்பகுதிகளிலும் இவற்றை காணலாம். மற்றும் அடர்த்தியான காடுகளிலும் உயர்ந்த மரங்களிலும் இவற்றைக் காணலாம். இவை பழங்களை உணவாக உண்ணுகின்றன.

வரிசை-17. கேப்ரிமுல்கி வகையில் (*Caprimulgi* formes)

இவ்வகை சார்ந்த பறவைகளின் அண்ணம் ஷைசோதேத்தஸ் வகையைச் சேர்ந்தது. குடல் பகுதியில் முட்டுக் குழாய்களுள்ளன. நீண்ட இறகுகளினெல்லாம் சிறிய பிள் தண்டு உள்ளன. இவை இரவு நேரங்களில் மட்டுமே இரைதேட வெளிவரும் பழக்கமுள்ள இராப்பகு பறவைகள். இவை பவம் பொருத்திய இறகுகளின் உதவியால் பறந்து திரிந்து வண்ணத்திப் பூச்சி, வண்டுகள் முதலான வற்றைப் பிடித்து உண்ணுகின்றன. பிள்ளங்களின் மூன்றுமாக நீட்டிக் கொண்டுள்ள மையவிரலில் சீப்பு போன்ற கருவி அமைந்துள்ளது குறிப்பிடத் தக்கச் சிறப்புத் தன்மைவாகும். இவற்றிற்கு குட்டையான பவமற்ற சற்று வளைந்த அலகுகள் உள்ளன. இதன் இறகுகள் சாம்பல் கலந்த மஞ்சள் நிறத்துடனும், அதில் பழுப்பு வெள்ளை கலப்பு முதலிய நிறங்களுடனும் இருப்பதால் அந்த வண்ணங்கள் பறவைகளுக்கு அந்தந்த இடத்திற்கேற்பத் தங்களைப் பாதுகாத்துக் கொள்வதற்கும் பயன்படுகின்றன. இப்பறவை கூடு கட்டுவதில்லை. புதர்களுக்குள் முட்டைகிடுகின்றன. இதன் வாய்க் கருவியில் நீண்ட உரோமங்களுள்ளன.

உதாரணம் : கேப்ரிமுல்கஸ் மேக்ரோபூரஸ்

நீண்ட வாலினைவுடைய பக்டிக் குருளி (The long tailed night jar). இப்பறவைகளின் அககுடல் குட்டைப்பாகவும் பண்பற்றதாகவும், வளைவுத்தன்மைபுடனும் காணப்படுகின்றன. இவற்றிற்கு நீண்ட வால் பகுதியுண்டு. பாதத்தின் முன்புற மையவீரல் மிகவும் நீளமாக உள்ளது. இப்பறவைகளில் ஆண் பறவை பெண் பறவைகளைப் பிளித்தறிதல் எளிதாகும். ஆண் பறவைகளுக்கு வாலினும் இறக்கை யிலும் வெள்ளைப் புள்ளிகள் உள்ளன. பெண் பறவைகளுக்கு அந்த வெள்ளைப் புள்ளிகள் இடையாது.

இப்பறவைகளை நீலவிரி மலைப்பகுதிகளில் காணலாம். சூரியன் மறைத்து இருள் பரவும் நேரத்திலேயே இப்பறவைகள் உணவு தேட வெளிவருகின்றன. இவை கற்கள் அல்லது மரங்களின் மீது குத்தியிருந்து கொண்டு இரையைத் தேடுகின்றன. இவை ஒரு விநோதமான குரலில் சத்தம் எழுப்புவதால் இவற்றை (பனிக்கட்டிப் பறவை) என்றும் அழைப்பர்.

உதாரணம் : கேப்ரிமுல்கஸ் ஆசியாட்டிக்ஸஸ் (Caprimulgus asiaticus)

இந்திய பக்டிக் குருளி (The common Indian night jar). இவை மலைப் பிரதேசங்களில் காணப்படுவதில்லை. இவற்றை பெரும்பாலும் புல் சமவெளிகளிலும் தோட்டங்களிலும் புதர்களிலும் காணலாம்.

வரிசை-18. ஸ்ட்ரிஜிபாஸியில் (Strigi formes)

இவ்வரிசை சார்ந்த பறவைகளுக்கு வெளிப்புறமாக அமைப்புப் பெற்ற வீரல் எதிர்புறமாக நீட்டிக் கொண்டிருத்தல், முகத்தின் பெரிய கண்கள் நேர்புறமாக நோக்கிய பார்வைமிக் அமைந்திருத்தல், அவரு குட்டைப்பாகவும் வளைதலும் துலியில் கொக்கி போன்ற அமைப்புடன் வளைந்திருத்தல், நாளித்துவாரங்கல் அவகின் அடியில் சிவரப்பகுதியினால் மூடியிருத்தல், முகத்தைமும் முன் தலையைமும் இறகுகள் மூடியிருத்தல் முதலிய சிறப்புப் பண்புகளுள்ளன. இவ்வரிசையினங்களும் அதேக பறவைகளுக்கு முகம் வட்ட வடிவத் துடன் இருப்பதோடல்லாமல், இறகுகள் கண்கள் பகுதியினின்றும் தோன்றி வெளிப்புறமாக நோக்கிச் சென்று பரப்பப்படுகின்றன. அவ்வாறு முகமானது ஒரு உருண்டை தட்டு போன்று அமைதி திருப்பது அந்த ஒரு வரிசைப் பறவைகளிலே மட்டுமே காணக்கூடிய தொன்மையும், இவற்றின் பாதங்கள் உறுதியாய்த்ததாக இருப்ப தோடல்லாமல் அவற்றில் உறுதியான நகங்கள் உள்ளன. ஹோக்கிள் என்ற பெருவிரல் உண்டு. நீண்ட இறகுகளில் பிந்தவற்று பகுதி இடையாது. சிறகில் 11 முதற்படி இறகுகளுள்ளன. அண்ணம்

டெஸ்டிமோதேதஸ் பீசிலைச் சார்ந்தது. இப்பறவைகளுக்கு இரு கரோட்டிடும் தமனிகளும் இருப்பதுடன், குடம்பகுதியின் முட்டுக் குழாய்களும் உள்ளன. கழுத்தில் 14 முள்ளெலும்புகளுள்ளன.

குடும்பம். டைட்டோனிடே (Tytonidae)

இக்குடும்பப் பறவைகளுக்கு மண்டையோடு நீளமாகவும் ஒடுங்கியும் இருக்கும். கவை எலும்பு மாப்பெலும்பின் அடித் தட்டைக் கவத்துடன் இணைந்துள்ளது.

உதாரணம்: டைட்டோ ஆல்பா (Tyto alba)

இந்திய டார்ன் ஆத்தை (The Indian barn owl). இவற்றின் முகத்தட்டு நங்குக வளர்ச்சியுற்றுக் காணப்படுகின்றன. முகத்தட்டு பெரியதாகவும், முரட்டு இறக்கைகளால் சூழப்படும் காணப்படுகின்றது. அவரு உறுதி வற்றும் அழுத்தப்படும் அதன் அடிப் பகுதியில் வளைவாமை நேராகவும் உள்ளது. இப்பறவைகளின் கால்கள் நீளமாக உள்ளன. நெருக்க நீளமாகவும் கூர்மைவாகவும் உள்ளன. நீலநிற மலைப்பிரதேசங்களில் இவை வசிப்பதாகக் கூறப்படுகின்றது. மலைப்பிரதேசங்களில் மரங்களின் பொந்துகளில் இவற்றைச் சாதாரணமாகக் காணலாம். சென்னை விலும் இவற்றைக் காணலாம். இவை எலி, சுண்டேலி முதலிய சிறு பாலூட்டிகளை உணவாக ஏற்றுக்கொண்டாலும், சிறு பறவைகளையும் அடித்துண்ணுகின்றன.



படம் 107. டைட்டோ ஆல்பா (Tyto alba) (டார்ன் ஆத்தை (The Indian barn owl))

உதாரணம்: டைட்டோ லாங்கி (Tyto longimembris)

புல் ஆத்தைகள் (The grass owl). இது சாதாரணமாக தென் இந்தியாவிலும் அதன் அடுத்தான் மலைப்பகுதிகளிலும் காணப்படும். ஆத்தை வகையாகும்.

குடும்பம். ஆசியோனிடே (Asiidae)

இக்குடும்பப் பறவைகளின் மண்டையோடு அகலமாக இருக்கும். கீழ்க்குள எலும்பு மார்பெலும்புப் பகுதியுடன் இணைக்கப்படவில்லை.

உதாரணம்: ஆசியோ ஃளேம்மியஸ் (Asio flammeus)

சிறு காதுகளைவுடைய ஆந்தை (The short eared owl). இப்பறவைகளில் காது துவரங்கள் மிகவும் பெரியவாக உள்ளன. அவை குட்டையாகவும் உறுதியாகவும் உள்ளது. நெருக்க நீளமாகவும் கூர்மையாகவும் அமைந்துள்ளன. குவீர் காலங்களில் மலிப்பிரதேசங்களுக்கும் சமவெளிப் பிரதேசங்களுக்கும் வரும் பறவைகளாகும். இவைகளைச் சென்னைவிலும் சுற்றியுள்ள இடங்களிலும் சாதாரணமாகக் காணலாம். பெரிய புல் வெளிக்கிடையில் இவை வசிக்கின்றன. இவை சிறு பாதுகாட்டிகள், பறவைகள், ஊர்வன, பூச்சிகள் முதலானவற்றை உணவாக உண்ணுகின்றன.

உதாரணம்: ஸ்ட்ரிக்சு இன்ட்ரேனி (Strix indranee)

பழுப்பு நிற ஆந்தை வகை (The brown wood owl). இப்பறவைகளின் காதுகளில் மூடியுள்ளது. அவை குட்டையாக உள்ளது. டார்ச்சஸ் நெருக்களால் மூடப்பட்டுள்ளது. எல்லா இந்திய நிறப்பினங்களிலும் பாதத்தின் விரல்கள் நெருக்களால் மூடி உள்ளது. விரல்களின் கூர்நடம் மிகவும் உறுதியானது. இப்பறவைகளின் முகத்தட்டு நன்றாக வளர்ச்சியுற்றுக் காணப்படுகின்றது. நெருக்க வட்டவடிவமாக உள்ளது. அவை ஒரு வித ஒலியை எழுப்பும் பழக்கமுள்ள பறவைகளாகும்.

உதாரணம்: ப்யூபோ ப்யூபோ (Bubo bubo)

இந்திய கொம்புள்ள ஆந்தை வகை (The Indian great horned-bill). இவை உருவிய மிகப்பெரிய ஆந்தைகளாகும். இவற்றின் கூர்நடங்கள் வளைந்தும் பலம் பொருத்திப்பதாகவும் காணப்படுகின்றன. உள் விரலின் கூர்நடம் மிகவும் நீளமாக உள்ளது. இறக்கைகள் ஸட்டமாக உள்ளன. இவைகளைச் சென்னைவிலும் மற்ற பகுதிகளிலும் காணலாம். பெரிய மலைப்பகுதிகளிலும் இவை வசிப்பதைக் காணலாம். இவை எலிகள், சிறு பறவைகள், ஊர்வனப் பிராணிகள், பாம்புகள், நண்டுகள், மிகப்பெரிய பூச்சிகள் முதலானவற்றை உணவாக உண்ணுகின்றன.

உதாரணம் : ஹ்லுதுயா நைபலென்சிஸ் (Huhva nipalensis)

பகுந்து வகைக் காட்டு ஆத்தை (The forest eagle owl). இப் பறவைகளுக்கு நிறங்கள் வட்ட வடிவமாகவிரும்பும். உள் விரலின் கீழ் நகம் மிகவும் பெரிவதாகவிரும்பும். இவை காடுகளிலுள்ள மரங்களில் இயைகளுக்குள் ஒளிந்துகொண்டுள்ளன.

உதாரணம் : ஆத்தினே பிராமா (Athene brama)

தென் இந்தியப் புள்ளி உடைய ஆத்தை வகை இவை (The southern spotted owl). இவை உருவில் சிறிய பறவைகளாகும். இறகுகள் புள்ளிகளையுடையது. விலா பகுதி தடித்து காணப்படுகின்றது. நாசித் துளாரங்கள் வட்டமாகவுள்ளன. முகத்தட்டு அல்லாவுத் தெளிவாகத் தெரியவில்லை. சமவெளிப் பகுதிகளில் சாதாரணமாகக் காணலாம். மாலை நேரத்தில் சூரியன் மறைந்த பிற்பே இவை இரை தேட வெளியே செல்கின்றன. இவை கண்டெலிகள், பல்லிகள், வண்டுகள் முதலானவற்றை இரைகளாக உண்ணுகின்றன. இவற்றில் ஒரு பறவை கத்த ஆரம்பித்தால் அதைத் தொடர்ந்து மற்ற ஆத்தைகளும் ஒலி எழுப்புகின்றன.



படம் 108. ஆத்தினே பிராமா (Athene brama) (தென் இந்திய புள்ளி உடைய ஆத்தை— (The Southern spotted owl))

வரிசை 19. மைக்ரோபோடிபாக்கிள் (Micropodiformes)

தூக்களுக்குள் போன்ற இவ்வரிசை சார்ந்த பறவைகளுக்குத் தட்டையான மெக்கரமும் கைப்பகுதி நீளமாகவும் இருக்கும். இப் பறவைகளுக்கு பின்னர் கால்களில் விரல்களெல்லாம் முன்புறமாக நீண்டு காணப்படும்.

குடும்பம். மைக்ரோபாடிடே (Micropsidae)

இவைகளுக்கு அண்ணம் அஜித்தோநேத்தன் (Aegithognathus). வகையைச் சார்ந்தது. மாள்பெலும்புடன் சூழமான அடித் தட்டைக்கலம் பொருத்தப்பட்டுள்ளது.

உதாரணம் : மைக்ரோப்பஸ் மெல்பர் (Micropus melba)

ஆல்பைன் தூக்கனாங்குருவி (The alpine swift). தூக்கனாங்குருவிகளில் 1 விரல்களும் மூன்று பக்கமாக நீண்டுள்ளன. அவற்றில் முதல் விரலும் நான்காவது விரலும் பின்புறமாக மடக்கக்கூடியன.



படம் 109. மைக்ரோப்பஸ் மெல்பர் (Micropus melba)
(ஆல்பைன் தூக்கனாங்குருவி—(The alpine Swift))

டார்சஸ் பகுதியில் இறகுகள் இருப்பதுடன் மரங்களில் ஒட்டிக் கொண்டு தொங்கும்படியான தகவமைப்பினைக் கொண்டுள்ளது. இவற்றின் இறகுகள் நீளமாகவும் உறுதியாகவும், கூர்மையாகவும் அமைந்துள்ளன. இரப்பால் பறவைகளும் ஒரே மாதிரியாகவே உள்ளன.

திருவிதாங்கூர், நீலகிரி மலைப்பகுதிகளில் இப்பறவைகளைக் காணலாம். அந்நிலைவாசல் பறக்கும் ஆற்றிய இப்பறவைகள் பெற்றுள்ளன.

உதாரணம் : டேக்கர்ஸின் பேட்டாசியன்சில் (Tachornis batasiensis)

வங்காளத்து பனைமர தூக்கனாங்குருவி வகை (The Bengal palm swift). விரல்கள் இவை இனமாக அமைந்துள்ளன. முதல் விரலும்



படம் 110. டேக்கர்ஸின் பேட்டா
'சியன்சில் (Tachornis batasiensis)
(பனைமரத் தூக்கனாங்குருவி—
(The palm swift))

இரண்டாவது விரலும் மூன்றுபுறமாக நீண்டும், மூன்றாவது விரலும் நான்காவது விரலும் பின்புறமாக நீண்டுமுள்ளன.

பனை, தென்னை மரங்கள் அதிகமாகவுள்ள பகுதிகளில் இவை வசிப்பின்றன. மலைப் பகுதிகளில் இவை வசிப்பதில்லை. இதன் கூடுகள் அதிகமானதொன்றாகும். அது ஒரு சிறு பை போன்று இருக்கும். ஒரு பறவை பல கூடுகளைக் கட்டி மூட்டையிட்டு, அக் கூடுகளைச் சுற்றி வட்டமிடுவதைக் காணலாம்.

வகை 20. டிரோக்லிடேயாஸியில் (Pteroclitiformes)

இவ்வகையைப் பறவைகளில் காக்கையில் 4 விரல்கள் இருப்பினும் முதல் விரல் நேரல்கள் மிகவும் சிறியதாக உள்ளது. எல்லா விரல்களும் ஒரே அளவாக உள்ளன. எண்ணெய்ச் சுரப்பிகளுள்ளன. நீண்ட இறகுகளுக்கு பின் குழல் தண்டுப் பகுதிவுள்ளது. முதற்படி இறகுகள் 11 எண்ணிக்கையில் உள்ளன. வாலில் 14 முதல் 16 வாக இறகுகளுள்ளன. அண்ணம் ஹெனோநேத்தல் வகையைச் சார்ந்தது. மார்பெலும்பின் அடித்தட்டைக்கலம் உயரத்தில் பொருத்தப் பட்டுள்ளது. பித்தப் பைவும், இரு கரோட்டிடட் தமனிகளும் இப் பறவைகளுக்கு உண்டு.

குடும்பம். டிரோக்லிடே (Pteroclitidae)

இக்குடும்பப் பறவைகளுக்கு டார்சஸ் பகுதி குட்டையாகவும் இறகுகளால் மூடப்பெற்றும் காணப்படுகின்றது. நெருகல் நீள் மரகவும் கூர்மையாகவும் அமைந்துள்ளன.

உதாரணம் : டிரோக்லிடில் ஓரியண்டலில் (Pterocles orientalis)

பெரிய கறுப்பு நிற வயிற்றுப் பகுதியினைவுடைய மணல் கிரௌஸ் பறவைகள் (The large imperial or black bellied sand grouse). அனகு சிறியதாகவும், மேற்புறம் வளைந்தும் காணப்படுகின்றது. நெருகல் நீளமாகவும், கூர்மையாகவும் காணப்படுகின்றன. விரல்கள் குட்டையாகக் காணப்படுகின்றன. இவை குளிரகாலத்தில் இந்தியாவிற்கு வரும் பறவைகளாகும். மிகவும் வேகமாகப் பறக்கும் ஆற்றலுள்ள பறவைகளாகும்.

உதாரணம் : டிரோக்லிடில் எக்ட்டஸ் (Pterocles ectus)

இந்திய மணல் கிரௌஸ் பறவை (The common Indian sand grouse). மணற்பாங்கான இடங்களிலும், பாலைவனங்களிலும் இப் பறவைகளைக் காணலாம். இவற்றிற்கு தங்குதல் பறக்கக்கூடிய தன்மையுண்டு. குறைந்த நேரத்தில் வெகுதூரம் பறந்து சென்று இவை வலசை போகின்றன. லீகைகளையும், தானியங்களையும் உண்ணுகின்றன. இவற்றிற்குத் தங்களைப் பாதுகாத்துக் கொள்ளக்

-கடிப வண்ணங்களால் இதற்குள் மூடப்பட்டுள்ளன, இவை கூட்டமாகக் கூடி பறந்து திரியும் பறவைகளாகும்.

-வரிசை 21. கொலம்பிபார்மிஸ் (Columbiformes)

இவ்வரிசை சார்ந்த பறவைகளுக்கு மேலவகு இரு பிரிவாகப் பிரிக்கப்பட்டுள்ளது. இதன் துணி புடைப்பாகவும், கெட்டியாகவும் உள்ளது. அதன் அடிப்பகுதி மிகுதுவாகவும் தோலினால் மூடப்பட்டு முள்ளது. நாளித்துவாரங்கள் நீசப்பாய்காள் துவாரங்களாக உள்ளன. விரல்களுக்கிடையில் தோலினழமங்கள் கிடையாது. பாதம் மரங்களில் வலிப்பதற்கேற்ப அகன்று காணப்படுகின்றது. ஆனால் தரைமீல் தரவியங்களைக் கொத்தி உண்ணும் இதே வரிசை சார்ந்த பறவைகளுக்கு அளகு சற்று ஒடுக்கமாகக் காணப்படுகின்றது. நீண்ட இறகு கலில் பின் குழல் தண்டு கிடையாது. வால் இறகுகள் ஒவ்வொரு நிறப்பிணத்திலும் எண்ணிக்கையில் மாறுபட்டே காணப்படுகின்றது. அண்ணம் எவுசோநேத்தல் வகையைச் சார்ந்தது. கழுத்தில் 15 மூள்எனும்புகளே உள்ளன. கணை எலும்பு பி லடிவாக உள்ளது. எண்ணெய்ச் சுரப்பிகளும் அவ்வளவாக வளர்ச்சியடையவில்லை, ஒரு சில நிறப்பிணங்களில் பித்தப் பை உள்ளது. இரு பக்கக் கரோட்டிட் தமலினும் இப்பறவைகளில் உள்ளன.

-உதாரணம் : க்ரோக்கோப்பஸ் ஃபோனிகசுப்டெர்ஸ் (Crocopus phoenicopterus)

தென் பகுதியில் வாழும் பச்சை நிறப் புழு வகை (The southern green pigeon). இவற்றின் அவகு குட்டையாகவும், பாதிப் பகுதி மிகுதுவாகவும், பாதிப் பகுதி கெட்டியாகவும் காணப்படுகின்றது. துணி நன்றாக வளைந்து காணப்படுகின்றது. இறக்கைகள் நீளமாகவும் கூர்மைவாகவும் காணப்படுகின்றன. இதன் வால் சதுர வடிவடிக் காணப்படுகின்றது. இருபால் பறவைகளும் ஏறக்குறைய ஒரே மாதிரி இருக்கும். கூட்டமாகக் கூடி வாழும் இயல்புடையவைகள் இப் பறவைகள். ஊழை மரங்களிலுள்ள வரிப் பள்ளங்களுக்குள் புகுந்து வாழைப் பழங்களை உண்ணுகின்றன. இவை சோடி சோடியாக பட்டுப்போன மரங்களில் குத்தியிருப்பதைக் காணலாம்.

-உதாரணம் : டென்ட்ரோஃபேசா-பம்பாடேரா (Dendrophassa pompadora)

சாம்பல் நிறம் கலந்த பச்சை நிற புழு வகை (The grey fronted green pigeon). இருபால் பறவைகளும் உருவில் ஒரே மாதிரியாக இல்லை. நிகுவிதாங்கூர்ப் பகுதிகளில் மலைப் பகுதிகளிலும் மற்றும் தாழ்த்த நிலப் பரப்புகளிலும் இவற்றைக் காணலாம்.

உதாரணம் : டெட்ரோபேசா-பிக்ரின்சுடா (Dendrophassa bicincta)

இந்திய ஆரஞ்சு மார்புப் பச்சைப் புழு வகை (The Indian orange breasted green pigeon). மலபார் கடற்கரைப் பகுதிகளில் இவற்றைக் காணலாம். இவைகளும் கூட்டமாகவே கூடி வாழும் தன்மைபுள்ளவைகள். இவை பழங்களையே உணவாக உண்ணுகின்றன. இவை வேகமாகப் பறக்கும் தன்மை உடனவை. இவை சிழிக்கை அடிக்கும் ஒரு ஒலியை எழுப்பும் தன்மைபுள்ளவை.

உதாரணம் : டூக்லுலா பேடியா (Ducula badia)

அரசு புழு வகை (Imperial pigeon). வாக் நீலமாக உள்ளது. கண்ணனூர் குடகு நாடு முதலிய இடங்களில் இவை அதிகமாக உள்ளன. நீலநீர் மரீப் பகுதிகளிலும் காணலாம்.

உதாரணம் : மஸ்காடியுலேரா ஏனியா (Muscadivora aenea)

பச்சை நிற இவர்களை அரசு புழு வகை (The Ceylon green imperial pigeon). மலேஷியம் சமவெளிப் பகுதிகளிலும் இப்பறவைகளைக் காணலாம். பொதுவாகக் கூட்டமாகவே வசிக்கின்றன. இவை அதிகமான ஒலியை எழுப்பும் ஆற்றலுள்ள பறவைகளாகும். இவை அளவில் மிகப் பெரிய பழங்களை விழுங்கும் தன்மைபுள்ளது.

உதாரணம் : சாம்போயாஸ்-இன்டிகா (Chalcophaps indica)

ஊதா நிற இந்திய புழு வகை (The Indian emerald dove). மேற்குத் தொடர்ச்சி மலைப் பகுதிகளிலும் திருநெல்வி, குன்னூர் முதலிய பகுதிகளிலும் இப்பறவைகளைக் காணலாம். காடுகளிலேயே பொதுவாக இவை வசிக்கின்றன. இவை தானியங்களை உணவாக உண்ணுகின்றன.



உதாரணம் : கொலம்பா லிவியா (Columba livia)

நீல நிற இந்திய மலைப்புறக்கன் (The Indian blue rock pigeon). மலைகளிலும் சமவெளிப் பகுதிகளிலும் இவற்றைச் சாதாரணமாகக் காணலாம். இவை கூட்டமாகப் பறந்து நிரியும் பழக்கமுள்ள

படம் III. கொலம்பா லிவியா (Columba livia)

[நீல நிற இந்திய மலைப்புறக்கன் (The Indian blue rock pigeon)]

னைவகை. அங்ஙனம் பறத்து திரியும் பொழுது வழியிலுள்ள பரிசுப் பச்சைகளை மேய்த்து அழித்துவிடுகின்றன. தானியங்களையும் கிதைகளையும் இவை பெரிதும் உணவாகக் கொள்கின்றன.

உதாரணம் : கொலம்பா எல்பினஸ்டோனி (Columba elphinstoni)

நீலநிறப்பகுதியில் மரத்தில் வாழ்கின்ற புழு வகை (The Nilgiri wood pigeon). இவை நீலநிற மலைப் பகுதிகளில் வாழ்கின்ற புழுக்களாகும். மரங்களில் பழைகளைத் தள்ளுபடி பழுத்துத் தொக்கும் பொழுது இவை கூட்டம் கூட்டமாகக் கூடி அவற்றை உண்ணுகின்றன.

உதாரணம் : ஸ்ட்ரெப்டோப்ரீலியா ஒரியண்டாலிஸ் (Streptopelia orientalis)

வட இந்தியப் பகுதி வாழ் ஆமை மாடப்புழு வகை (The northern Indian rufous turtle dove). இவை தென் இந்தியாவிலும் வசிக்கும் பறவை வகைகள். இப்பறவைகள் தென் அரவடைக்குப்பின் வயல்களில் சிதறிக் கிடக்கும் தானியங்களை உண்ணுதலாக் காணலாம்.

உதாரணம் : ஸ்ட்ரெப்டோப்ரீலியா சைனென்சிஸ் (Streptopelia chinensis)

புள்ளியுடைய இந்திய மாடப்புழு வகை (The Indian spotted dove). தேசட்டங்களையும் மலைப் பகுதிகளையும் இவை தங்கள் வசிக்கும் இடங்களாக தேர்ந்தெடுத்துக் கொள்கின்றன.

உதாரணம் : ஸ்ட்ரெப்டோப்ரீலியா டிகாடாக்டோ (Streptopelia decarcto)

வளைவழைடைய இந்திய மாடப்புழு வகை (The Indian ring dove). இவை சமவெளிகளிலும் காணப்படுகின்றன. மற்றும் 2000 அடி உயரத்திற்குட்பட்ட மலைப் பகுதிகளிலும் வசிக்கின்றன.

உதாரணம் : டோடோப்பறவை (Dodo)

இவைகளும் இவ்வரிசையைச் சார்ந்த பறவைகளே. தற்போது இவை மறைந்து விட்டன.

வரிசை-22. டர்னிடிடபார்மீஸ் (Turniciformes)

இப்பறவைகளின் அங்ஙனம் வடிவோநேத்தல் வகையைச் சார்ந்தது. நேரலைகளில் விரல் கிடையாது. இடது கரோட்டிடம்

தமனி மட்டுமே உள்ளது. எண்ணெய்ச் சுரப்பி நிறகுளாக் மூடப் பட்டுள்ளது. கழுத்தில் 14-15 கழுத்து முள்ளெலும்புகள் உள்ளன. சிறியதான அங்கிலும் தானியங்களையும் பூச்சிகளையும் தனீர் இலை களையும் கொத்தித் தின்றுகின்றன. சிறிய குஞ்சுப் பறவைகளுக்கு தூவி இறகுகள் உள்ளன.

உதாரணம் : டர்னிக்ஸ் சஸ்சிட்டேட்டர் (*Turnix suscitator*)

அவகு மேல்வியதாகவும், நீண்டும், ஒடுக்கப்பட்டும் காணப்படு கின்றன. நாசித்துவாரம் நீண்டு காணப்படுகின்றது. பின்னங்கால் கனிக் பின் கிரல் கிடையாது. தெற்குப் பகுதியில் கன்னியாகுமரி மூளை வரை பரவி உள்ளது. புல்வெளிகளிலும் மலைப்பகுதிகளிலும் இப்பறவைகளைக் காணலாம். இவை புல், பூண்டு மற்ற தானியங்கள் முதலானவற்றையே உணவாகக்கொள்கின்றன. இவை பூச்சிகளையும் உண்ணுகின்றன.

உதாரணம் : டர்னிக்ஸ் டஸ்ஸுமியெரி (*Turnix dussumieri*)

இவை சிறு வேட்டைப் பறவைகளாகும். இந்தியாவின் எல்லாப் பகுதிகளிலும் இப்பறவைகளைக் காணலாம். இவைகளை புல்வெளி களில் காணலாம். இவை தனித்து வாழும் இயல்புடைய பறவை களாகும். தானியங்களை உணவாக உண்ணுகின்றன.

உதாரணம் : டர்னிக்ஸ் மேக்ஸுமேட்டஸ் (*Turnix maculatus*)

திருநெல்வேலி, திருவிதாங்கூர் முதலியப் பகுதிகளில் இவை களைக் காணலாம். புல்வெளிகளிலும் காடுகளிலும் இவற்றைக் காணலாம். தானியங்களையே இவை உணவாக உண்ணுகின்றன.

வரிசை. 23. பேஸ்சரீ:பாஸ்சிஸ் (*Passeri formes*)

தற்பொழுது வசிக்கும் பறவைகளில் பாதிக்குமேற்பட்டவை இவ்வரிசையில் அடங்கும். இவை உருவத்தில் மிகவும் சிறிய பறவைகள். பாதங்கள் கிளைகளைப் பற்றிக் கொள்ள ஏதுவாக மூன்று விரல்கள் மூன்புறமும், ஒரு விரல் பின்புறமும் நீண்டுள்ளன. அண்ணம் அஜித்தோதேத்தல் வகையைச் சார்ந்தது. இவை பலவித மான கூடுகளைக் கட்டுகின்றன. முட்டைகளும் பல நிறம் கொண்டவைகளாகும். சிவீங்கல்லின் தன்மையையொட்டி இவைகளை பாடும் பிரிவைச் சார்ந்தவை, பாடாத பிரிவைச் சார்ந்தவை என்று இரண்டு பிரிவுகளாகப் பிரிக்கலாம்.

இவ்வரிசையைப் பின்னும் சுமார் 25 குடும்பங்களாகப் பிரிக் கலாம்.

குடும்பம்-1, கர்விடே (Corvidae)

அவளுகனில் ஓரம் இக் குடும்பப் பறவைகளுக்கு வழவழப்பாக இருக்கும். சிறகுகளில் 10 முதற்படி. இறகுகள் உள்ளை. நாகித் துவாரங்கள் முந்தலிப் பகுதியில் அமைந்துள்ளன. அவை இறகு களால் மூடப்பட்டுள்ளது. சிறகுகள் பளபளப்பாக இருக்கும்.

உதாரணம்: கார்வஸ் கரோனாய்டெஸ் (Corvus coronoides)

தென் பகுதி காட்டுக் காக வகை (The southern jungle crow).
நாகித் துவாரங்கள் முன் தலிக்கு முங்குல் அதாவது அவகின்



படம் 112. கார்வஸ் கரோனாய்டெஸ் (Corvus coronoides)
[தென்பகுதி காட்டுக் காகம் (The Southern jungle crow)]

நிலத்தில் முன்றில் ஒரு பங்கு என்ற தூரத்தில் அமைந்துள்ளது. நேசம் பகுதியிலுள்ள உரோமங்கள் விதைப்பாகவும் விலையாமல் நீண்டும் அமைந்துள்ளன. இப்பறவைகள் பொதுவாக மலைப்பகுதிகளிலும் மரங்களடர்த்த காடுகளிலும் வசித்தல் தன. இவை சிறு பறவைகள், மூட்டை, ரொட்டி, துண்டு, இலைச்செடி, பழங்கள், பல்லிகள், வெட்டுக்கிளிகள், கரைவான்கள் முதலிய எண்ணப் பொருட்களையும் இரையாக உண்ணும் பழக்கமுள்ள பறவைகள். இவைகளை அகிதத் துண்ணிப் பறவைகள் (Omnivorous) என்று சாதாரணமாக அழைப்பர்.

உதாரணம்: கர்வஸ் ஸ்பென்டென்ஸ் (Corvus splendens)

இந்தியாவில் வீடுகளில் காணப்படும் காக வகைகள் (The common Indian house crow). இவை சாதாரணமாக நாம் நம் வீடுகளில் காணும் காகங்களாகும். இப்பறவைகளும் எல்லாவிதமான பொருட்களையும் உணவாக உபயோகிப்பதால் காரணத்தினால் அவைத் துள்ளிப் பறவைகள் என்று அழைப்பர். இவைகளை ஆகாயத்தோட்டி என்றும் கூறுவதுண்டு.

உதாரணம்: டென்ட்ரோசிட்டா ரூபா (Dendrociitta rufa)

இந்திய மரப்பைப் பறவைகள் (The Indian tree pie). மூக்குக் கருகிலுள்ள உரோமங்கள் சிறியதாக உள்ளன. வால் பகுதி நீண்டு அடுக்காக அமைந்துள்ளது. சமவெளிப் பகுதிகளில் இப்பறவைகளைக் காணலாம். இவை சோடி, சோடியாகவோ அல்லது சிறு கூட்டமாகவோ பறந்து நிர்த்திக் காணலாம். இவை எப்பொழுதும் ஒலி உண்டாக்கிக் கொண்டே இருக்கும் பழக்கமுள்ளவை. இவை மூட்டைகளையும் சிறு குஞ்சுப் பறவைகளையும் உணவாகக் கொள்வதால் அவற்றை பெரிதும் அழித்து விடுகின்றன.



குடும்பம்.2. பேரிடே (Paridae)

இக் குடும்பப் பறவைகளுக்கு அனகு நீண்டு காணப்படுகின்றது.

படம் 112. டென்ட்ரோசிட்டா ரூபா—(Dendrociitta rufa)
[இந்திய மரப்பை பறவை—
(The Indian tree pie)]

உதாரணம்: பேரஸ் மேஜர் (Parus majar)

தென்னிந்திய சாம்பல் நிற டிப்பறவை (The Southern gray tit). தமிழில் கொண்டை கிடைவாது. வால் சிறிது வட்டவடிவமாகக் காணப்படும். இவை மலைகளிலும் புல் சமவெளிப் பகுதிகளிலும் வாசிக்கும் பறவைகளாகும். இவை தோட்டப் பக்கங்களில் சிறு சிறு

கூட்டமாகக் கூடி வசிப்பதைக் காணலாம். இவை கம்பளிப் பூச்சிகளையும், பூச்சிகளையும் உணவாகக் கொண்டுவின்றன. பிள்ளும் பழத்



படம் 114. பேரல் மேஜர் (Parus major) [தென் இந்திய சாம்பல்திற டிட் பறவை (The southern grey tit)]

தோட்டங்களுக்குள் புரட்டு பழங்களைவும் உணவாக உண்ணுமின்றன.

உதாரணம்: மேக்லோ லோயம்பல் ஸாந்த்ரோஜென்ஸில் (Machlolophus xanthogenys)

தெற்குப் பகுதி மஞ்சள் கன்னப் பகுதியுடைய டிட் பறவை (The southern yellow cheeked tit). இவைகளுக்கு கூர்மையான கொண்டைப் பகுதியுள்ளது. இவை மலைப் பகுதிகளிலும் காடுகளிலும் வசிக்கின்றன.

குடும்பம்-3. சிட்டிடே (Sittidae)

இப்பறவைகளுக்கு மூன்று பக்க முதல் விரலும் நான்காவது விரலும் ஒரே நீளமாகவியலை.

உதாரணம்: சிட்டா கேஸ்ட்டா நிவென்ட்ரீஸ் (Sitta casta niventris)

செத் தவிட்டு திற வகிற்றுக் கொட்டைத் தின்னிப் பறவைகள் (The chestnut bellied nut hatch). இது காடுகளில் வசிக்கும் பறவையாகும்.

உதாரணம்: சிட்டா ஃப்ரன்ட்டாலிஸ் (Sitta frontalis)

பளபளப்பான முள் பகுதி உடைய கொட்டைத் தின்னிப் பறவை (The velvet fronted nut hatch). இவை மலைப்பகுதிகளில் திரத்தரமாக வாழும் பறவைகள். இவ் சமயங்களில் தேரட்டங்களிலும் காணலாம். இவை மரங்களில் இளைகளிலும் அடிமரத்திலும் நடந்து நிரிந்து பூச்சிகளைப் பிடித்துத் தின்னும் பழக்கமுள்ள பறவைகளாகும். அவ்வாறு ஆய்ந்து நிரியும் பொழுது இவ் சமயங்களில் பற்றிப் பிடித்துக் கொண்டு தீய சிமராகத் தொங்கு இன்றன.



படம் 115. சிட்டா கேஸ்டா வென்ட்ரிஸ் (Sitta castaneiventris) (செத்தலிட்டி திற் லலித்துப் பகுதி டுடைய கொட்டை தின்னிப் பறவை - (The chestnut bellied nut hatch))

குடும்பம்-4. டீமலிடே (Timalidae)



116. கேரூலாக்ஸ் டி.லெக்செர்ட்டிஸ் (Garrulax delesserti)

(விபத்தாடு சிக்கும் திரஷ் பறவை - (Wynaad laughing thrush))

இக் குடும்பப் பறவைகளின் தாவித்துவாரங்கள் இறகுகளால் மூடப்பெற்றிருக்கின்றன.

உதாரணம்: கேரூலாக்ஸ் டி.லெக்செர்ட்டிஸ் (Garrulax delesserti)

வாக் நாட்டுச் சிக்கும் திரஷ் பறவை (Wynaad laughing thrush). இவைகளுக்கு தாவித் துவாரங்கள் நன்றாக வெளியே தெரியும்படி அமைந்துள்ளன. இவை மலைப்பகுதியில் வாழும் பறவைகளாகும். இவை சிறு சிறு கூட்டங்களாக அடர்ந்த காடுகளிலும் வசிக்கின்றன.

உதாரணம்: ட்ரோக்கேலோய்ச்சியம் கேச்சின்னேன்ஸ் (Trochalopteron cachinnans)

சிக்கும் தீயநிலி திரஷ் பறவை (The nilgiri laughing thrush). இவைகளுக்கு தாவித்துவாரங்கள் தனித்தும் இறகுகளால் மூடப்

பெருமதும் காணப்படுகின்றன. இவை மலைப்பகுதிகளில் வரலும் பறவைகளாகும். இப்பறவைகள் சிறு சிறு கூட்டமாக சத்தமிட்டுக் கொண்டே வரலும் பறவைகளாகும். இவை புதர்க்கிடையில் குதித்துக் கொண்டும் தவழ்த்துக் கொண்டும் வளிக்கின்றன. இவை புழு, பூச்சிகளையும் கம்பளிப் பூச்சிகளையும் உணவாக உண்ணுகின்றன.

உதாரணம் : டாட்டாய்டெல் டெரிக்ஸோலர் (*Turdoides terricolor*)

இந்திய காட்டு பேய்மர் பறவை (*The Indian jungle babler*). இப்பறவைகளின் நாகித்துவாரங்கள் சிறிய மெல்லிய படவத்தினால் மூடப்பட்டு உரோமங்களற்றுக் காணப்படுகின்றன. வாய் பகுதிகளும் சிறகுப் பகுதிகளும் ஒரே அளவாக உள்ளன. மலைப்பகுதிகளில் இப்பறவைகள் வளிக்கின்றன. சிறு சிறு கூட்டமாக வளிக்கின்றன. இப்பறவைகளுக்கு பறக்கும் நிறம் அல்லவாக இல்லாத காரணத்தினாலும், தங்களுக்குள் சண்டையிட்டுக் கொள்கின்ற தன்மையாலும் பகுத்துகள் இவற்றை வளிதல் பிடித்து உணவாக உண்ணுகின்றன.

உதாரணம் : அஜித்தினு டிபியா (*Aegithina tiphia*)



படம் 117. அஜித்தினு டிபியா அல்லம் பெண்ணும் (*Aegithina tiphia*) (அயோராப் பறவை—*The common iora*)

சாதாரணமாகக் காணப்படும் அயோராப் பறவை (*The common iora*). சமவெளிப் பகுதிகளில் இப்பறவைகளை சாதாரணமாகக் காணலாம். இப்பறவை மரங்கள் அடர்ந்த காடுகளில் பூச்சிகளைப் பிடித்து உணவாக உண்ணுகின்றன. அவ்வாறு உண்ணாத தேடி அலையும் கொழுது சத்தமிட்டுக் கொண்டே அலைகின்றன. , தலைநினை தீவந்தில் மூன்றில் இரண்டு பங்கு நீரை அனகு உள்ளது. சிறகுகள் வட்ட வடிவமாக உள்ளன. வாய்க்குட்டையாகவும் சதுரமாகவும் உள்ளது.

உதாரணம் : மைக்ரோஸ்கெல்லிஸ் பைராய்டெல் (*Microscella psaroides*)

தென்னிந்திய கறுப்புநிற புல்யில் பறவை (*The South Indian black bulbil*). இவற்றின் அனகு மிகவும் மெல்லியதாகவும், தலைநினை

அளவு நீளமுள்ளதாகவும் உள்ளது. இதற்குக் கூர்மையான கொய்கை உண்டு.

குடும்பம்.5. செர்திடே (Certhidae)

இக்குடும்பப் பறவைகளுக்கு பத்து முதல் பது இறகுகள் உள்ளன. நாக்கு குழாய்போன்று அமைப்பிலுள்ள. தாமித நுடாரங்கள் முத்தலைப் பகுதியில் அமைந்துள்ளன. தாமித நுடாரங்கள் இறகுகளால் மூடப்பட்டிருக்கவில்லை.

உதாரணம்: சால்போர்னியல் மெல் ஸ்டேட்டஸ் (Salpornis melanostris)

சாம்பல்திற புள்ளிகளையுடைய ஊர்ந்து செல்லும் பறவை வகை (The spotted grey creeper). அபூர்வமாகச் சென்னையில் வட மேற்குப் பகுதியில் வசிக்கும் பறவை இவை. இவை பெரிய மரங்களில் வசிக்கின்றன. இம்மரத்தின் பல கிளைகளிலும் ஓடிக்கொண்டும், அங்கப்பொழுது நிதானமாக மரத்தைச் சுற்றிப் பறந்து கொண்டும் இருப்பதைக் காணலாம். மரங்கொத்திப் பறவைகளிலிட வேகமாகப் பறக்கும் ஆற்றலுள்ளவைகள் இப்பறவைகள்.



படம் 118. மைக்ரோசெல்லிஸ் ஸால்போர்னியல்

(Microscellus psaroides)

[மேல் இத்திய கறுப்புநிற புயலில் பறவை - (The South Indian black bulbill)]

குடும்பம்.6. டர்டிடே (Turdidae)

நாசித்துவாரங்கள் இக்குடும்பப் பறவைகளில் உரோமங்களால் மூடப்பட்டிருக்கவில்லை. வகுடத்திற்கு ஒரு தரம் இப்பறவைகளில் இறகுகள் உதிர்ந்து புதிய இறகுகள் முளைக்கின்றன. சிறகில் 12 அல்லது 14 முதற்படி இறகுகளுள்ளன.

உதாரணம்: ப்ரேகிப்பெடிகிஸ் மேஜர் (Brachypteryx major)

மெல்லிதிற வயிற்றுப் பகுதியிலையுடைய குட்டை இறகுப் பறவைகள் (The white bellied short wing). இப்பறவைகளுக்கு தலையில் நீளத்தின் பாதி அளவு அயலின் நீளம் இருக்கும். அவை கூறுதியாகவும் அடிப்பகுதியில் அகன்றும் காணப்படுகின்றது. இவற்றிற்கு சிறகுகள் குட்டையாகவும் கருகான வடிவத்துடனும் காணப்

படுகின்றன. வால் குட்டையாக உள்ளது. பழனி மலைப்பகுதிகளில் இப்பறவைகளைக் காணலாம். இவை எதிரியமற்ற கோழைப் பறவைகள். ஆதலால் இவற்றை ஆய்வளவாக வெளியில் காண முடியாது. திருவிதாங்கூர்ப் பகுதியிலுள்ள மலைப்பகுதிகளிலும் இவற்றைக் காணலாம்.

உதாரணம்: லார்விவோரா ப்ரன்னே (Larvivora brunnea)

சிதிர இத்திய ஊதாநிறப் பாடும் பறவை வகை (The Indian blue chat). இவை மலைப்பகுதிகளில் வசிக்கும் பறவை வகை. இவற்றிற்கு அளகு மிகவும் மெல்லியதாக விரும்பும். நாகிததுவாரங்கள் நீள் உருளை வடிவமாகக் காணப்படும். வால், சிறகுகளைவிட குட்டையாக இருக்கும். இரு பாத் பறவைகளும் நிறத்தில் வேறு வேறு விரும்பும்.

உதாரணம்: சேக்ஸ்கோலா டார்க்பூட்டா (Saxicola torquata)

புதர்ப்பகுதியில் வசிக்கும் இத்திய சிறு பாடும் பறவை (The Indian bush chat). இவை பம்பாய் மாகாணத்தில் குளிர்காலங்களில் வந்து செல்லும் பறவைகளாகும். இவை புதர்களில் வசிக்கும் பழக்கமுள்ளவை. இவை புதர்களிடையே குத்தியிருக்கும் நிலையில் காணப்படுகின்றன. அவற்றின் உணவான பூச்சிகள் கிடைக்கும் பொழுது அவற்றைப் பிடித்து உண்ணுகின்றன.



படம் 119. சேக்ஸ்கோலாய்டெல் ப்யூலிகேட்டா (Saxicoloides fulicata) (கறுப்பு நிற முதுகினைவுடைய இந்திய ராபின் பறவை — (The Blue backed Indian robin))

உதாரணம்: சேக்ஸ்கோலாய்டெல் ப்யூலிகேட்டா (Saxicoloides fulicata)

கறுப்புநிற முதுகுப்பகுதியினைவுடைய இந்திய ராபின் பறவை வகை (The blue backed Indian robin). இப்பறவைகளுக்கு டார்க்சி


எனும்பு நன்றாக வளர்ச்சியுற்றுக் காணப்படுகின்றது. அவரு மெல்லியதாகவும் கீழ்தோக்கி வளைந்தும் காணப்படுகின்றது. சிறகுகள் நீளமாகவும் கூர்மையாகவுமுள்ளன. சமவெளிப் பகுதிகளிலும் மலைப்பகுதிகளிலும் இவற்றைச் சாதாரணமாகக் காணலாம். இவை மனிதர்களால் பழக்கப்படுவதற்கேற்ற சிறு பறவைகளாகும்.

குடும்பம்-7. முயலிகேப்பிடே. (Muscicapidae)

இக்குடும்பப் பறவைகளுக்கு இவையுதிர் காலங்களில் இறகுகள் உதிர்ந்து வேறு இறகுகள் முளைக்கின்றன. நாகிதழுவாரங்களைச் சுற்றி நீண்ட வளைந்த உரோமங்களுள்ளன. டார்ச்சு எனும்பு குட்டையாக உள்ளது.

உதாரணம்: சிஃப்பியா பார்வா (Siphia parva)

சிகப்புநிற மாஸ்பீனியவுடைய இத்தியா எப்பிடிக்கும் பறவை வகை (The Indian red breasted fly catcher). இப்பறவைகளில் இரு பால்



வட்டம் 120. சிஃப்பியா பார்வா (Siphia parva) (ஆணும் பெண்ணும்)
[சிகப்பு நிற மாஸ்பீனியவுடைய இத்தியா எப்பிடிக்கும் பறவை -
(The Indian red breasted fly catcher)]

பறவைகளுக்கும் வெவ்வேறு நிறமுண்டு. ஊரின் அடிப்பகுதி இரு-பறவைகளிலும் வெள்ளையாக உள்ளது. இவற்றின் அவகு மிகவும் சிறியதாகவுள்ளது. சிறகுகள் மிகவும் கூர்மையாக உள்ளன. இப்-பறவைகளை இத்தியானிலும் இலங்கையிலும் காணலாம். இவை இனப்பெருக்கம் செய்ய காஷ்மீரத்திற்குச் செல்கின்றன.

உதாரணம்: ரிப்பிட்யூர பெக்டோரலிஸ் (Rhipidura pectoralis)

வெள்ளைப் புள்ளி விசிதி வானினைவுடைய சப்பிடிக்கும் பறவை வகை (The white spotted fantail flycatcher). இப்பறவைகளுக்கு வால் மிகவும் நீளமாக உள்ளது. மலைப்பகுதிகளில் இவை வசிக்கும். இப்பறவைகளுக்கு வால் பகுதியை விசிதி போன்று விசித்துக் கொண்டு மரங்களின் மீதும் தளரவிலும் நடனமாடிக் கொண்டு நிரீந்து வரும் பழக்கம் உள்ளது. இவை மாறும் நிறவற்ற பறவைகளாகவிரும்பினும் ஒரு மெல்லிய ஒலியை எழுப்பிக் கொண்டு உணவுப் பொருளைத் தேடி அவையும் தன்மையுள்ளவைகளாகும்.

குடும்பம்-8. லேனிடே (Laniidae)

இக்குடும்பப் பறவைகளுக்கு நாகித் துவாரங்களைக் கற்றிலும் முரட்டு உரோமங்கள் உள்ளன. இவையுதிர் காலங்களில் இப்பறவைகளுக்கு இறக்கைகள் உதிர்ந்து புதிய இறகுகள் முளைக்கின்றன.

உதாரணம்: லேனியஸ் வைட்டேட்டஸ் (Lanius vittatus)

ஷரீக் பறவை (The bay backed shrike). இப்பறவைகளுக்கு வால் பகுதி அடுக்கடுக்காக உள்ளது. மேல் அலவின் நுனிப்பகுதி உறுதியாக அழுத்தப்பட்டும், பற்களுனுடம் காணப்படுகின்றன. பூச்சமவெளி களிலுள்ள தோட்டங்களிலும் புதர்களடர்த்த காடுகளிலும் இப்பறவைகளைக் காணலாம். இவை புதரின் உச்சிக் கிளைமிக் குத்திய நிலையில் அமர்ந்திருப்பதைக் காணலாம். அவ்வாறு உட்கார்ந்த நிலையிலேயே அருகில் பறந்து நிரியும் வண்டு, பூச்சி முதலியவற்றைக் கைவித்துக் கொண்டிருக்கும். மின்பு இவை அவற்றின் மீது பாய்ந்து பிடித்து உண்ணுகின்றன.

குடும்பம்-9. பெரிக்ரோக்கோட்டிடே (Pericrocotidae)

இக்குடும்பப் பறவைகளுக்கு சிறகுகள் மிகவும் நீளமாகவும் கூர்மையாகவும் உள்ளன. காய்களும் பாதங்களும் பலமற்றுக் காணப்படுகின்றன.

உதாரணம் : பெரிட்ரோக்ஸோட்டஸ் ஸ்பீசியோசஸ் (Pericrocotus Speciosus)

செம்மஞ்சள் நிற மிளிவெட் பறவைகள் (The orange minivet). இவற்றின் அனகு உறுதியாகவும் வளைந்தும் காணப்படுகின்றது. நெருகல் நீளமாகவும் கூர்மைவாகவுமுள்ளன. வால் பகுதியும் நீளமாக உள்ளது. பாத்தங்கள் பலமற்றுக் காணப்படுகின்றன. இவை மலைப்பகுதிகளில் பெரிய மரங்களில் கூட்டமாக வாழும் பறக்கம் உள்ளவைகளாகும்.

குடும்பம்.10. ஆர்டாமிடே (Artamidae)

இக்குடும்பப் பறவைகளுக்கு மிகவும் நீளமான உறுதியான நெருகலுள்ளன, வால் குட்டையாகவும் சதுரமாகவுமுள்ளது.

உதாரணம் : ஆர்டாமஸ் பஸ்க்ஸ் (Artamus fuscus)



படம் 121. ஆர்டாமஸ் பஸ்க்ஸ் (Artamus fuscus)
(சாம்பல் நிற ஷரீக் பறவை)



படம் 122. மர ஷரீக் பறவை (Common wood shrike)



படம் 123. கறுப்புத் தலை குக்ஷ ஷரீக் பறவை (Black headed cuckoo-Shrike)

சாம்பல் நிற ஸ்வோலோ ஷரீக் பறவை (The ashy swallow-shrike). இவை பசியமரங்களில் வாழும் பறவைகளாகும். நெருகல்

வாவினைவிட நீளமாகவுள்ளது. இவை ஸ்வோலோப் பறவைகளைப் போல்தே பறக்கும் படியானத்திறனைப் பெற்றுள்ளன.

குடும்பம்-11, டைக்ரூரிடே (Dicruridae)

இக்குடும்பப் பறவைகளின் நாசித்துவாரங்கள் உரோமங்களால் மூடப்பட்டுள்ளன. இருபால் பறவைகளும் உருவில் ஒரே மாநிலியாக உள்ளன.

உதாரணம் : டைக்ரூரஸ்மேக்ரோ செர்கஸ் (Dicrurus macrocerus)

கறுப்பு ட்ரோங்கோப் பறவை (The black drongo). இப்பறவைகளின் அனகுகள் தடித்துக் காணப்படுகின்றன. வாக்பகுதி இருபினவாக பிளவுபட்டுக் காணப்படுகின்றது. மலைப்பகுதிகளில் இந்த “அரசக் காகம்” என்று பொதுவாக (King crow) அழைக்கப்படும் இப்பறவைகளைக் காணலாம்.

குடும்பம்-12, சில்விடே (Sylviidae)

இக்குடும்பப் பறவைகளுக்கு நாசித் துவாரங்கள் தெளிவாகத் தெரிகின்றன.

உதாரணம் : அக்ரோசெல்பாஸஸ் ஸ்டென்ட்ரோசியஸ் (Acrocephalus stentoreus)

நாணற்புதரில் காணப்படும் பெரிய இந்திய வார்ப்னர் பறவைகள் (The Indian great reed warbler). இப்பறவைகளின் அனகு மிகவும்



படம் 124. ஆக்ரோ செல்பாஸஸ்
ஸ்டென்ட்ரோசியஸ்
(Acrocephalus Stentoreus)
(இந்திய வார்ப்னர் பறவை
(The Indian great reed warbler))



படம் 125. ஃபீதிலாஸ்
வார்ப்னர் பறவை—
(Fantail warbler)

மெலித்து-காணப்படுகின்றது. வால் நீளமாகவும், இறகுகள் குறுகியும் கூர்மையாகவும் அமைந்துள்ளன. இவை சமவெளிப்பகுதிகளுக்கு குவீர் காலங்களில் வரும் பறவைகளாகும்.

உதாரணம்: ஆர்த்தோட்டோமஸ் சூட்டோரியஸ் (Orthotomus sutorius)

இந்திய தையற்காரக் குருவி (The Indian tailor bird). இப்பறவைகளுக்கு அவரு தலை யின் நீளத்தை ஒத்துள்ளது. டாரிசஸ் எனும்பு நீளமாகவும் எது.

இவை சமவெளிப் பகுதிகளில் காணப்படுகின்றன. பூச்சிகள் சிவந்திகள் சக்கள் முதலியவற் றைப் பிடித்து உணவாக உண்ணு கின்றன. இவை இனங்களை ஒன்று டன் ஒன்று அளவின் உதவியால் ஒன்றாகச் சேர்த்துத் தைத்து கூடு கட்டுகின்றன.



படம் 135. ஆர்த்தோட்டோமஸ் சூட்டோரியஸ் (Orthotomus sutorius) [இந்திய தையற்காரக் குருவி (The Indian tailor bird)]

குடும்பம்-13. ஐரினிடே (Irenidae)

உதாரணம்: ஐரோபூலா (Irena poella)

நீல நிறத்தேவதைப் பறவை (The fairy-blue bird). இவற்றின் அவரு நீண்டும் தடித்தும் வளைந்தும் காணப்படுகின்றது. சிறகுகள் நீளமாக உள்ளன. இவை மலைப்பகுதிகளில் காணப்படுகின்றன. பெரிய மரங்களில் வசிக்கின்றன. பறக்கலையும் பூச்சிகளையும் உணவாக உண்ணுகின்றன. இவை இனிமையான ஒலியை எழுப்புகின்றன.

குடும்பம்-14. ஓரியோலிடே (Oriolidae)

சிறகுகளில் 10 முதற்படி இறகுகளுள்ளன;

உதாரணம்: ஓரியோலஸ் ஓரியோலஸ் (Oriolus oriolus)

இந்திய ஓரியோல் பறவை (The Indian oriole). சிறகுகள் நீளமாகவும் கூர்மைபாசவுமுள்ளன. வேப்பமரங்களில் பொதுவாக இப்பறவைகளைக் காணலாம். இப்பறவைகள் வேப்பம்பழத்தை மிகவும் விரும்பி உண்ணுவதால் அம்மரத்திலேயே கூடு கட்டி வசிக்கின்றன. அவரு நீளமாகவும் சிறிது வளைந்தும் காணப் படுகின்றது.

குடும்பம்.15. யூலாபிடீடே (Eulabetidae)

இக்குடும்பப் பறவைகள் மரங்களில் வசிக்கும் பழக்கமுள்ளவை. இவை புள்ளிகளைவுடைய முட்டைகளை இடுகின்றன.



படம் 137. ஓரியோலஸ் ஓரியோலஸ் (Oriolus oriolus)
(இந்திய ஓரியோல் பறவை—(The Indian oriole))

உதாரணம்: யூலாபெஸ் ரிவீஜியோசா (Eulabes religiosa)

தென் பகுதி அமேரிக்கில் பறவை (The southern grackle). இப்பறவைகளின் இறகுகள் பளபளப்பாக உள்ளன. இவை மரங்களில் ஊர்வும் பறவைகள். பழங்களைக் கூண்டாக உண்ணுகின்றன.

குடும்பம்.16. ஸ்டர்னிடே (Sternidae)

உதாரணம்: ஸ்டடர்னஸ் வல்கேரீஸ் (Sturnus vulgaris)

ஃபிஷர்ஸின் ஸ்டார்லிங் பறவை (Finsch's starling). இவற்றின் மூன் தலையின் இறகுகள் குட்டையாக இருக்கின்றன. அவை தடித்தும் மழுங்கலாகவும் காணப்படுகின்றது. இறகுகள் பளபளப்பாக உள்ளன. குவீரிகாயத்தில் நம் நாட்டிற்கு வரும் இப்பறவைகள் கூட்டமாக ஊர்வும் பழக்கமுள்ளவை.

உதாரணம்: அக்ரிடோத்தீரஸ் ட்ரிஸ்டீஸ் (Acridotheras tristis)

மைனா (The common myna). இப்பறவைகளின் நேசப்பகுதி மூன் தலையிலே முதலிய பகுதிகளில் இறகுகள் நீளமாகவும் விரைப்பாகவும் உள்ளன. கண்ணிற்குக் கீழும் பின் புறமுள்ள நோல்

இறகுகளற்றுக் காணப்படும். அவரு தலையை விடக் குட்டையாக இருக்கும், வாய் உருண்டையாக உள்ளது. நாம் பொதுவாக எம்மா



படம் 128. அக்ரிடோதிரஸ் ட்ரிஸ்டிஸ் (Acridothera tristis)
[மைனா (The common myna)]

இடங்களிலும் இப்பறவைகளைக் காணலாம். இப்பிராணிகளை வளர்ப்புப் பிராணியாகக் காணலாம். இவை ஒருவித ஒலியை உண்டாக்கவும் பேசவும் எனிடில் கற்றுக் கொள்ளும் தன்மையுள்ள பறவைகளாகும்.

குடும்பம். 17. ப்ளோசிடே
(Ploceidae)

இறகில் 10 முதற்படி இறகுகள் உள்ளன. அவரு கூம்பு வடிவமாக உள்ளது.

உதாரணம்: ப்ளோசியஸ் பில்லிபினஸ்
(Ploceus philippinus)

பாயாப்பறவைகள்(The bayas).

இப்பறவைகள் அவரு தடித்தும் முனியும் சிறிது வளைத்தும் காணப்படுகின்றது. சமவெளிப் பகுதிகளில் இவற்றை சாதாரணமாகக் காணலாம். நன்றாக முதிர்க்கொற்று விளைந்துள்ள வயல்வெளிகளில் இவை கூட்டம் கூட்டமாக பறந்து நிரிந்து அப்பயிர்களுக்கு சேதம் விளைவிப்பதைக் காணலாம்.

உதாரணம்: முனியா மெலாக்கா ஒரியண்டாலில் (Munia melacca orientalis)

கறுப்பு தலைத் தலையினைவுடைய முனியாப்பறவைகள் (The black headed munia). இவைகளை தமிழ் நாட்டின் எம்மாப் பகுதிகளிலும்



படம் 129. மைனா (Munia)

சாதாரணமாகக் காணலாம். அவை வெளிப்பட்சமாகக் கவந்த நிலம் பறக்கும் உடனது.

குடும்பம். 18. பிளின்னிகிடே (Fringillidae)

இக்குடும்பப் பறவைகளுக்கு நிறத்தில் 9 மாதப்படி இறகுகள் உள்ளன. அவை கூம்பு வடிவமாக உள்ளது. இரு பால் பறவைகளும் வெவ்வேறுகக் காணப்படும்.



படம் 130. கார்போடேக்கல் எரித்ரீனஸ் (ஆணும் பெண்ணும்) (Carpodacus erythrinus) [இந்திய வெளிர் கிம்பு - பிச்சுப் பறவை - (The common Indian rose finch)]

உதாரணம்: கார்போடேக்கல் எரித்ரீனஸ் (Carpodacus erythrinus)

இந்திய வெளிர் கிம்பு பிச்சுப் பறவைகள் (The common Indian rose finch). இவைகளின் இறகுகள் கூர்மையாகவுள்ளன. இவை மலைப் பகுதிகளுக்கு குளிரகாலங்களில் வரும் பறவைகளாகும். இவை பூக்களின் மொட்டுகளையும் தானியங்களையும் உணவாகக் கொண்டுள்ளன. இவை மூங்கில் காடுகளுக்குச் சென்று மூங்கில் விதைகளையும் கொண்டுள்ளன.

உதாரணம்: பேஸ் டொமஸ்டிகஸ் (Passer domesticus)

பர்மிய கிட்டுக்குருவி (The Burmese house sparrow). இவைகளின் அவை குட்டையாக இருக்கின்றது.

குடும்பம். 19. ஹிரூடினி டே (Hirundinidae)

இக்குடும்பப் பறவைகளின் அவை தட்டையாக உள்ளது. குறுகிய பறவைகள் மூதிர்ச்சியற்ற பற்பறவைகளாக ஒத்திருக்கின்றன.



படம் 131. பேசுட்ரொமஸ்டிகஸ் (Passer domesticus) [கிட்டுக்குருவி - (House sparrow)]

உதாரணம்: டெலிக்சன் ஆர்பிகா (Delichon urbica)

கிட்டு மார்புடைய பறவைகள் (The house martin). இப்பறவைகளின் மார்பில் பகுதியும் வீரப்பகுதியும் இறகுகளுடன் காணப்

படுவென்றன. இது நம் பகுதியில் வெகு அரிதாகக் காணப்படும் பறவையாகும்.

உதாரணம்: ஓதிருண்டோ ஈஸ்ட்டிகா
(*Hirundo rustica*)

சுவோலோப் பறவை (The common swallow), இப்பறவைகளின் இறகுகள் கருமையாகவும் பளபளப்பாகவும் காணப்படுகின்றன. இவை குளிக்காய்களில் சமவெளிப் பகுதிகளுக்கு வரும் பறவைகளாகும்.

உதாரணம்: ஓதிருண்டோ ஸ்மித்தி
(*Hirundo smithi*)

இது கம்பி போன்ற வாலினை ஏகாடபல் ஸோலோப் பறவைகள் (The Indian Wire tailed swallow), இப்பறவைகளின் வால் பகுதி கம்பி போன்று சுமார் 5 அங்குல நீளம் வெளியே நீட்டிக் கொண்டிருக்கிறது. இவற்றை நீலகிரி மலைப் பகுதியில் பொதுவாகக் காணலாம்.



படம் 133. ஓதிருண்டோ ஸ்மித்தி
(*Hirundo smithi*)

(இது கம்பிவால் ஸோலோப் பறவை
(The Indian wire-tailed swallow))

குறும்பம்-20. மோட்டாசில்லிடே (*Motacillidae*)

இக்குறும்பப் பறவைகளுக்கு நிறமில் 9 முதற்படி. இறகுகள் உள்ளை, அவை நீளமாகவும் மெல்லியதாகவும் உள்ளன.

உதாரணம்: மோட்டாசில்லா அல்பா (*Motacilla alba*)

வெள்ளை நிற இந்திய வாலாட்டிக் குருளிகள் (The Indian white wagtail), இப்பறவைகளுக்கு வால் பகுதியும் நிறமற்றும் ஒரே நிறமாக உள்ளன. மலைப்பகுதிகளிலும் சமவெளிப்பகுதிகளிலும் இவற்றைச் சாதாரணமாகக் காணலாம். இவை எப்பொழுதும் வாலினை ஆட்டிக்கொண்டே இருக்கும் பறவைகளாகும்.

உதாரணம்: ஆந்த்ரஸ் ட்ரெவியாலிஸ் (Anthus trivialis)

மரப் பிப்பிட்டுகள் (The tree pipit). இவற்றிற்கு வால் சிறியதாக உள்ளது. இவை குவீரிகாவங்களில் நம் பகுதிக்கு வந்து செல்லும் பறவைகளாகும்.



படம் 133. மோட்டா சில்லா அம்பா (Motacilla alba) [வேங்கை நிற இத்திய ஊளட்டிக் குருவி—(The Indian white wagtail)]

வாறு செல்லுமாக பறந்து கொண்டிருப்பதைச் சாதாரணமாகக் காணலாம். இவை இவை இளைப்பாக மரங்களில் குத்தும் நிலையில் இருத்தியும் பொதுவாகக் காணலாம்.

குடும்பம்.22. ஷோல்மோம்பிடே (Zosteropidae)

உதாரணம்: ஷோல்மோம்பிஸ் பால்ப்பிரோசா (Zosterops palpebrosa)

வேங்கைக் கண் இத்தியப் பறவைகள் (The Indian white eye). இப்பறவைகளுக்கு மெலித்த அங்குகள் உள்ளன. டார்ச்சு எலும்புகள் நீளமாகவும் தடித்தும் காணப்படுகின்றன. வால் சிறியதாகவும் சதுரமாகவும் உள்ளது. மலைப்பிரதேசங்களில் பொதுவாக இப்பறவைகளைக் காணலாம். இவை புழு, பூச்சிகளையும், பழக் களையும் சிறப்பாக ஆப்பின் பழங்களையும் உணவாக உள்ளனும் பறக்க மூன்று பறவைகளாகும்.

குடும்பம்.23. நெக்டாரினிடே (Nectariniidae)

இக்குடும்பப் பறவைகளின் நசுக்கு குழாய் வடிவமாக உள்ளது. அவரு நீளமாகவும் கூம்பு வடிவமாகவும் அமைந்திருப்பதுடன், இரு

குடும்பம்.21. அலாவுடே (Alaudidae)

இக்குடும்பப் பறவைகளுக்கு நிலையில் கொண்டைப் பகுதி புண்டு. பின்பக்க கிரவின் கூர் நகம் நீளமாக உள்ளது.

உதாரணம்: அலாவுடா குல்குலா (Alauda gulcula)

சிறிய இத்திய ஊளம்பாடிப் பறவைகள் (The small Indian sky lark). இவற்றின் அலகுகள் மெல்லியதாகவும் பல மறும்காணப்படுகின்றன. புல்வெளிகளில் இப்பறவைகளைக் காணலாம். ஒரு குறிப்பிட்ட உயரத்தில் இப்பறவைகள் வட்டமிட்ட

அவளுளின் துவிப்பகுதி ஓரங்கள் ரம்பம்போன்ற அமைத்துள்ளது. குஞ்சுப் பறவைகள் வடிவத்தில் முதிர்ச்சிபெற்ற பெண் பறவைகளை ஒத்துள்ளது.

உதாரணம் : லெப்ட்டோக்ஸோமா மினிமா (*Leptocoma minima*)

சிறு தேன் உறிஞ்சும் பறவை வகை (The small sun bird). இப் பறவைகளை மலைப் பகுதிகளிலும் சமவெளிப் பகுதிகளிலும் காண



படம் 134. லெப்ட்டோக்ஸோமா மினிமா (ஆணும் பெண்ணும்)
(*Leptocoma minima*)

(சிறு தேன் உறிஞ்சும் பறவை (The small sun bird))

வரம். பூவிலுள்ள தேனை உறிஞ்சும் பழக்கமுள்ளவைகள் இப் பறவைகள்.

குடும்பம்-24. டிக்சேயிடே (*Dicaeidae*)

இக்குடும்பப் பறவைகளுக்கு அவகு குட்டைபாகவும் முக்கோண வடிவமுடனும் உள்ளது. இரு அவகுகளும் துவிவின் ஓரத்தில் ரம்பம் போன்ற அமைப்புடன் அமைத்துள்ளன.

உதாரணம் : டிக்சேயம் மின்பூம் (Dicaeum minsum)

பூக்களை கொத்தும் வெளிர்நிறப் பறவை வகை (The plain coloured flower pecker). இப்பறவைகளுக்கு நிறமில்லாத முத்திர்படி

இறகுகளே உள்ளன. அவை மெல்லியதாக உள்ளது. இவை உருவில் மிகவும் சிறிய பறவைகளாகும். இவைகளைப் பொதுவாக மலைப் பகுதிகளில் காணலாம். இவை சோடி சோடியாக மரங்களின் தடித்தப் பகுதியினைக் குத்திக்கொண்டே பூச்சிகளை வேட்டையாடிக் கொண்டு திரிந்து வருதலைக் காணலாம். இவை ஒரு நிலையாகவில்லாமல், பறந்து திரிதலையும் உருவில் மிகவும் சிறிய பறவைகளாக இருத்தலால் அநிலைரவாகப் பறந்து திரிவதையும் காணலாம்.

குடும்பம்-25. பிட்டிடே (Pittidae)

இக்குடும்பப் பறவைகளுக்கு நெடில் 10 முதற்படி இறகுகளுள்ளன. டார்ச்ஸ் எலும்பு மிகவும் நீண்டு காணப்படுகின்றது. உச்சித் தலைப் பகுதியிலுள்ள இறகுகள் இப்பறவைகளுக்கு வேண்டும் சமயத்தில் குத்தாக நின்று கொண்டையாகக் காணப்படுகின்றது.

உதாரணம் : பிட்டா பிராக்ரெயூரா (Pitta brachyura)

இந்திய பிட்டா பறவைகள் (The Indian pitta). இப்பறவைகள் குளிக்காலங்களில் சமவெளிய் பகுதிகளுக்கு வரும் பழக்கமுள்ளப் பறவைகளாகும். இப்பறவைகளில் மற்றும் சில நிறப்பிணக்கள் செவ்வியிலும் அதைச் சுற்றியுமுள்ள இடங்களிலும் வசிப்பதாகத் தெரிகின்றது. இவை புதர்களைடர்ந்த காடுகளுக்குள் சென்று அங்குள்ள புழு, பூச்சிகளை உணவாக உண்ணுகின்றன. இவை மிகவும் கோழைப் பறவைகளாகும்; அச்சுறுத்தப்படும் போழுது, இவை புதர்களுக்குள் மறைந்து கொள்ளும் பழக்கமுள்ளவைகளாகும்.

17. பறவைகள் வலசை போதல்

பறவைகள் வலசைபோதல் என்பது வியங்கு உலகில் நம் அனைவரது கண்ணிலும் கருத்தையும் ஈர்க்கின்ற மூக்கிய நிகழ்ச்சிகளில் ஒன்றாகும். இது பல நூற்றாண்டு காலமாக மனிதர்களிடையே பலவாறான விவாதத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது. மூற்காலத்தில் இத்தகழ்ச்சி பற்றிய விவாதம் விநோதமாகவும் அதே சமயத்தில் மனதை ஈர்க்கின்ற ஒரு நிகழ்ச்சியாகவும் அமைந்திருந்தது. தூக்கனாக்குருவி வகைகளில் சில சேற்றில் புதைந்து செயலற்ற தூக்கத்திலிருந்ததாகக் கருதப்படுவதிலிருந்து, பறவைகள் சூனீர் காண்களில் சத்திரமண்டலத்திற்கே பறந்து சென்று வந்தன என்பது வரை மேற்கூறிய விவாதங்களில் மூக்கிய அம்சங்களாகும். சுமார் இரண்டாயிரம் ஆண்டுகளாக இதுபற்றி விவாதித்திருப்பினும் தற்போது 50 வருடங்களாக நடத்திய சோதனைகளிலிருந்து நமக்கு பல குறிப்புகள் கிடைத்திருப்பினும் பறவைகள் வலசை போதலைப் பற்றிய பல விஷயங்களை நாம் இன்னும் தெளிவாகக் கண்டுக்கொள்ள இயலவில்லை. பறவைகளின் இனப்பெருக்க வரம்பு (Breeding range), சூனீர்கால தங்குமிடங்கள் (Wintering grounds) வலசைபோகும் மூக்கிய பாதைகள் முதலியனபற்றி ஒருவாறாக அறித்திருத்திருப்பினும் அவை ஏன் அவ்வாறு தங்கள் இருப்பிடங்களிலிருந்து பிரி இடங்களுக்குச் சிவகாலங்களில் செல்லுகின்றன, அவ்வாறு செல்லும் பொழுது அவற்றின் பழக்கவழக்கங்கள் முதலியன பற்றிய கருத்துகள் இன்னும் நமக்குச் சரியாக விளங்கவில்லை.

பல வியங்குகள் வலசைபோகும் பழக்கமுடையவைகளாயிருப்பினும், மூக்கியனாக பறவைகளையே நாம் இச்செயலுக்கு சிறந்த உதாரணமாக எடுத்துக்கொள்கிறோம். கடலில் வாரும் பல முதுகெலும்பற்ற பிராணிகளுக்கு வலசைபோகும் தன்மை உள்ளது. அவ்வாறு அவை ஒரு இடத்திலிருந்து மற்றொரு இடத்திற்கு பருவ காலங்களிலும் கடலிலேயே ஏற்ற இறக்கங்களுக்கு ஏற்றவாறும் (Tide) செல்கின்றன. எனினும் அதைப்பற்றியும் விரிவாகத் தெரிய

விடலை. காற்றில் மிதக்கும் சிலந்தி வகைபோன்ற காற்று மிதவை உயிரிகள் (Aeroplankton) தன்னுள்ளேயே காற்றில் செலுதாரம் மிதத்து செல்கின்றன. பட்டுப் பூச்சிகளிலும் சில குளிர்காயங்களில் தெற்கு நோக்கிச் சென்றும், மற்றும் சில கடலின் மீது தற்கேடான (Suicidal) நிலையில் வலகை போலின்றன. திவநீர் வாழ்வன (Amphibia) ஈற்றிலும் சில குறிப்பிடத்தக்க பருவ நிகழ்வுகளுக்காக இனப்பெருக்க காலங்களில் தன்னுளுக்கு வெளியேயும் உள்ளேயும் பயணம் செல்கின்றன. ஊர்வன பிராணிகளும் குளிர்காயங்களாகத் தவிர்ப்பதற்காக ஒரு இடத்திலிருந்து மற்றொரு இடத்திற்குச் செல்வதைக் காணலாம். மீன்களிலும் சும், சால்மன் போன்றவைகள் கடலிலிருந்து, நன்னீருக்கோ நன்னீர்நிலையிலிருந்து கடலுக்கோ வலகை போலவது குறிப்பிடத்தக்க தொன்றாகும். வயல்எலி போன்ற கொறி விலங்குகளாகிய பாதுகாட்டிகளிலும் வலகை போகும் தன்மை அதாவது மீண்டும் மீண்டும் சுழன்று வரும் தன்மை சிறப்பாக அமைந்துள்ளது. மற்றும் கீயமான் வகைகளில் சில புல்மேயும் இடம் களுக்கும், பாலைவனங்களில் வாழும் விலங்குகள் உணவிற்காக வேறு இடங்களுக்கும், மலையிரதேசங்களில் வாழும் விலங்குகள் தங்களது பருவகால வெப்ப நிலைகளுக்கேற்ப பல தேவைகளுக்கும் வலகை போதலைக் காணலாம்.

வலகை போவதன் குறிக்கோளும் விளக்கமும்

கான் (Cahn) என்ற அறிஞர் 1925ஆம் ஆண்டு குறிப்பிட்டுள்ளபடி வலகை போதல் என்பதைப் பொதுவாக விளக்கிச் கூறவேண்டுமானாலும் இது பருவ காலங்களுக்கேற்ப பிராணிகள் ஒரு இடத்திலிருந்து மற்றொரு இடத்திற்கு செல்லும் செயல் என்பதாகும். பின்னும் உட்பரி (Wood bury) 1941ஆம் ஆண்டு பின்னும், சிறிது விரிவாக அது பற்றிக் கூறியுள்ளார். அதாவது விலங்குகள் சுற்றுச் சூழ்நிலைக்கேற்ப பருவகாலங்களிலோ, அல்லது தங்கள் வளர் பருவத்தில் இடமாற்றத்திற்கானவோ ஒரு இடத்திலிருந்து மற்றொரு இடத்திற்குச் செல்லுதலையே வலகைபோதல் எனலாம் என்று குறிப்பிட்டார்.

பறவைகள் தங்கள் நிலைக்கேற்ப வலகைபோதலை நான்கு வகை வாகப் பிரிக்கலாம்.

1. ஊர்வரி வலகைபோதல் (Daily)

காக்கை, ஸ்டார்லிங் போன்ற பறவைகளும் கொக்கு போன்ற பறவைகளும் தங்கள் இருப்பிடங்களிலிருந்து நாள்தோறும் பல இடங்களுக்குச் சென்று பின்பு தங்களது கூட்டிற்கே வந்து சேர்தல்.

2. மதிநிலை வலகை போதல் (Lunar)

கடல்மீயின் ஏற்ற இறக்கத்திற்கேற்ப கடலில் வாழும் மீயங்கு வகைகள் வலகைபோதல் அதாவது வருடத்தின் மாதங்களுக்கேற்ப செயல்பாடில் மதிநிலைக்கேற்றவாறு ஒரு இடத்திலிருந்து மற்றொரு இடத்திற்குச் சென்று நிரும்புதல்.

3. பருவகாலங்களுக்கேற்ப வலகை போதல் (Seasonal)

சில மீயங்குகள் முறைபாடையும் அவற்றில் மற்றும் சில முறை கோடையும் பருவகாலங்களுக்கேற்ப வலகைபோதலின்றன.

4. சுழற்சிமுறை வலகை போதல் (Cyclic)

பருவகாலங்களையாத நிலைமையும் சில பறவைகள் ஒரு குறிப்பிட்ட இடத்திலிருந்து புறப்பட்டு வேகதூரம் சென்று பின்பு மறு படியும் அதே குறிப்பிட்ட இடத்திற்கு நிரும்பும் முறையை சுழற்சி முறை வலகைபோதல் என்று குறிப்பிடலாம்.

மேலே குறிப்பிட்டுள்ளவைகளில் பருவகாலங்களில் வலகை போதலும் சுழற்சிமுறை வலகைபோதலுமே பறவைகளில் மூக்கிய மானதாகும்.

சுழற்சிமுறை வலகை போதல்

சில சமயங்களில் தாவரவுண்ணி (Herbivorous) மீயங்குகள் அவை வகிக்கும் இடத்தில் அவற்றிற்கு வேண்டிய உணவு கிடைக்காமல் போவதாலும், எண்ணிக்கையில் மிக அதிகமாக இனம்பெருகி விடுவதாலும், அங்கீகரிக்காத இடத்திலிருந்து புறப்பட்டு வேற்றிடங்களுக்கு பரவத்தொடங்கி செல்ல நேரிடுகிறது. அவ்வாறு ஏற்படும் நிகழ்ச்சி தொடர்ச்சியற்றதாகவோ, சீரானதாகவோ அமைந்திருக்கும். இப்பிராணிகள் ஒரு குறிப்பிட்ட நிகழ்ச்சி செயல்பாடுகளையொத்த இடத்தை வலகை போவதாயினும் கருதுவதில்லை. ஆனால் அந்நகரிகள் (Insects) அவ்வாறு இடநெருக்கடி காரணமாகவோ, உணவுக்காகவோ கூட்டமாக ஒரு இடத்திலிருந்து கிளம்பி நிகழ்ச்சியொத்த வேற்றிடங்களுக்குச் செல்லுமாயின் அவைகளின் அடுத்த நிலைமுறை பூச்சிகள் பழைய இடத்திற்கே வந்து சேர்த்திருப்பதையும் சிலர் கண்டறிந்துள்ளனர். வயல் எலிகள் மூன்று அல்லது ஐந்து வருடங்களுக்கொரு முறை இனப்பெருக்கம் அதிகமாகிவிடும் போழுது பரவத்தொடங்கி இடத்திலிருந்து மற்றொரு இடத்திற்குச் செல்லும்படியான நிலை ஏற்படுகின்றது. அவ்வாறு அவை கிளம்பிச் செல்லும்போழுது சில சமயங்கள் நிகழ் தப்பி கடலிலுள் சென்று மூழ்கி இறந்துவிடுவதும்

உண்டு. அவ்வாறு கடலில் மூழ்கி இறந்துவிடும்படியான நிலைக்கேண்டுகேவியா (Scandinavia) பகுதியில் உள்ள கடற்கரைகளி் மேயை பெரும்பாலும் ஏற்படுகின்றது.

இம்மாதிரியான நிலைமை பறவைகளில் காணமுடியாததொன்றாகும். சிரேப்டெஸ் பேரோடாக்சஸ் (Syrhaptes pharodaxus) என்ற புது போன்ற பறவைகள் ஆசியாவின் மையப்பகுதியில் வசிக்கின்றன. மேற்கூறியவாறு இனப்பெருக்கம் அதிகமாகிவிடும் பொழுது அவைகளில் பல கூட்டமாக ஐரோப்பாவிற்கு பறந்து சென்றன. அவ்வாறு பறந்து சென்ற 1863 பறவைகளில் 700 பறவைகள் மட்டுமே ஐரோப்பாவை அடைந்தன என்று கணக்கிடப்பட்டுள்ளது. சில பறவைகள் மேற்கு ஐரோப்பிய நாடுகளில் இனப்பெருக்கத்திற்காகத் தங்கிவிட்டதாகக் கருதப்படுகின்றது. மற்றும் வடஅமெரிக்காவில் வாழும் கிரேஸஸ் (Grass) பறவைகளிலும் இதுபோன்ற பவந்த மாண வலசைபோகும் முறை ஏற்பட்டதாக கேட், பக்லி (Cade, Buckley) போன்றவர்கள் விளக்கியுள்ளார்கள். அப்பறவைகள் ஓரே கூட்டமாக அலங்காலியூள்ள டேனா பன்னத்தாக்கில் செல்லும் பொழுது அக்கூட்டம் (Alaskas in tanana valley) இரண்டு அல்லது மூன்று மைல் நீளமும் சுமார் ஒன்றரை மைல் அகலமும் பரவி பறந்து சென்றதாக கூறியுள்ளனர். இவ்வாறு இப்பறவைகள் பிரிந்து சென்ற பரவல்தான் ஒரு இடத்தில் ஏற்படும் மிக அதிகமான இடநெருக்கடி யிலிருந்து பிரிந்து பறவைகள் எளிதாக வசிக்க உதவி புரிகின்றது.

உணவுப் பற்றாக்குறையை பூர்த்தி செய்வதற்காக இது போன்ற பரவிச் செல்லும் முறைகள் பறவைகளில் பொதுவாகக் காணலாம். இது போன்ற கழற்சி முறை வலசைபோதனை மூன்று அல்லது ஐந்து வருடங்களுக்கொருமுறை, வெள்ளை ஆந்தைகளிலும், வட்டாறுகளிலும், குறுக்கு அளவு பறவைகளிலும், கொட்டை நின்றும் பறவைகளிலும் காணலாம். வெள்ளை ஆந்தைகள் மூன்று அல்லது ஐந்து வருடங்களுக்கொரு முறை எண்ணிக்கையில் அதிகமாகப் பெருகிவிடும் பொழுது மற்றொரு இடத்திற்கு அவற்றில் பல கூட்டமாகச் செல்லத் தொடங்கி, வயல் எங்களுடையேயே சுற்றி வருகின்றன. இவ்வாந்தைகள் வயல் எங்கிலையே பெரும்பாலும் தங்கள் உணவாகக் கொள்வதால் அதனுடையே இனவகளும் கழற்சி முறையில் வலசை போகின்றன. அவ்வாறு வயல் எங்கில் (Lemmings) இனரயாகக் கிடைக்காதபொழுது வேறு இடங்களுக்கு இரைதேடி செல்கின்றன. 1945—46 ஆம் ஆண்டுகளில் சுமார் 13502 ஆந்தைகள் ஐக்கிய நாட்டின் வடபகுதியிலிருந்து தெற்குக் கனடா பகுதிக்கு பறந்து வந்திருந்ததாக கணக்கெடுக்கப்பட்டுள்ளது. மேலே கூறியபடி இந்த ஆந்தை வகைகள் வயல் எங்கில் இனரயாகப்

பறவைகள் வலசை போதல்

பிடித்து உண்பதற்காக அவைகளுடனேயே சுழற்சிமுறை வலசை போனாலும், அவை கிடைக்காத காலங்களில் கூட எண்ணிக்கையில் அதிகமாக பெருகியிருக்கும் பொழுது ஒரு இடத்திலிருந்து கூட்டமாகக் கிளம்பி மற்றொரு இடத்திற்கு அதிலும் பெரும்பாலும் வடநிசைபி விரிந்து தெற்குத் திசை நோக்கியே வலசை போகின்றன.

குறுக்கவகுப் பறவைகளில் (Cross-bills) வலசை போகும் பழக்கம் சீராக அமையவில்லை. யின்னும் குறிப்பாக தெற்கு நோக்கி அவை பறந்து செல்வதோ அல்லது குளிக்காவத்திற்காக அங்கிடைத்தை விட்டுச் செல்வதோ இல்லை. முக்கியமாக இவை விதை கொட்டைகள் அதிகப்படியாக உற்பத்தியாகும், வடதுருவப் பகுதிகளுக்கு கூட்டமாகச் சென்று விதை கொட்டை முதலானவற்றை 'உண்பதற்காகவே செல்கின்றன. இவைகளின் இனப்பெருக்க காலங்களும் இடங்களும் குறிப்பாக அமையாமல், மேற்கூறியவாறு உணவு தெருக்கடி காரணமாக உணவுப் பொருள் எங்கு அதிகமாகக் கிடைக்கின்றதோ அங்கேயே கூடுகட்டி முட்டை இட்டு குஞ்சு பொலிக்கின்றன. விவீடன் தகடுக்கு இரண்டு மூன்று வருடங்களுக்கொரு முறை சில பறவை இனங்கள் பழங்கள் அதிகமாக பழுத்திருக்கும் பொழுது வந்திருந்து இரண்டு முறை மார்ச் மாதத்திலும், ஜூன் மாதத்திலும் முட்டையிட்டு குஞ்சு பொலித்து அங்கு தங்கி பழங்க்கையும் பூச்சிகளையும் நின்று செல்வதாக ஸ்வீடன் என்பவர் விளக்கிக் கூறியுள்ளார்.

சீதோஷண நிலையில் ஏற்படும் கோளாறுகள் கூட சில சமயங்களில் பறவைகளின் வலசைபோகும் ஆற்றலை தடைசெய்து விடுவதால், வலசைபோதல் சீராக அமையவில்லை.

ஆஸ்திரேலியாவில் குளிக்காவமோ செல்ப காவமோ ஒரு குறிப்பிட்ட சமயத்தில்தான் ஏற்படும் என்ற நிலையற்ற பிரதேசமாக விருப்பதால் அங்கு பறவைகள் சீராக வடநிசை நோக்கியோ தென்நிசை நோக்கியோ வலசை போகும் முறையைப் பின்பற்றுவதில்லை. இங் வாறு நிலையற்ற செல்பநிலை உள்ள பிரதேசமாக ஆஸ்திரேலியா இருப்பதால், மழைக் காலத்தில் மற்ற இடங்களுக்குச் சென்று கொட்டை விதை, பூச்சிகளை இரையாக உண்டு பின்பு திரும்பி வருகின்றன. அவ்வாறு அநிமிதமான உணவுப் பொருள் கிடைக்கக்கூடிய வேற்றிடங்களுக்குச் செல்லும்பொழுது அங்கேயே கூடுகட்டி முட்டையிட்டு குஞ்சு பொலித்து வந்து சேர்கின்றன. இது போன்ற பறவைகளுக்கு அதாவது அதிக குளிர்ச்சி அல்லது அதிக வெப்பம் முதலியவற்றைத் தாங்கிக் கொண்டு வசிப்பதற்குப் பழகிக் கொள்கின்ற சக்தியும் தகவமைப்பும் அதிகமாக இருக்கும் என்று கருதப்படுகின்றது.

பருவகாலங்களுக்கேற்ப வலசை போதல்

பருவகாலங்களில் இடம்விட்டு இடம் செல்லும் பறவைகளும் கட ஓரே சிராக செய்வாயில் சில சமயங்களில் உணவுப்பொருள் அதிகமாகக் கிடைக்கும் இடத்திற்கோ அல்லது வேறு தேவைகளுக்காகவோ வேற்றிடங்களை நாடிச் செல்லுகின்றன. இவ்வாறு பருவ காலங்களுக்கேற்றவாறு சிராக வலசை போகாத பறவைகளின் வலசைபோகும் முறையை காடோடி வலசைபோதல் அல்லது அலைந்து திரியும்- வலசைபோதல் (Vagrant migration) என்று அழைக்கலாம். அவ்வாறு அப்பறவைகள் அலைந்து திரிந்தாலும் குளிக்காலங்களிலும், இனப்பெருக்கம் செய்யும் காலங்களிலும் சிராகத் தங்கள் இருப்பிடங்களுக்குத் திரும்பி வந்துவிடுகின்றன. இவ்வாறான காடோடி வலசை போதல் முறையை தென்நிலையிலுள்ள இனப்பெருக்கத் தஞ்சுமீடல் களிலிருந்து வடநிலை நோக்கிச் செல்லும் நாகரகளிலும், கல் (Gull), டெர்ன் (Tern), ஆத்தை (Barn owl) களிலும் மற்றும் சில பறவைகளிலும் காணலாம்.

பருவகாலங்களுக்கேற்ப வலசைபோகும் முறையில் ஒருவகை, வடபகுதியிலுள்ள உயர்ந்த பகுதியிலுள்ள பறவைகளிடமிட வெப்ப மித வெப்பப் பகுதிகளிலும் (Tropical & Sub tropical) பறவைகள் குறிப்பாக வலசை போவதைக் காணலாம். இம்முறைக்கு ஈரப்பத ரிதம்கேற்ப வலசை போதல் (Moisture rhythm) என்று உட்பரி (Wood bury) என்பவர் அழைத்துள்ளார். இதுவும் ஆஸ்திரேலியா நாட்டிலுள்ள பறவைகளின் வலசை போகும் முறையில், ஆனால் ஒரே சிராகப்போகக் கூடியதொரு முறையாகும். தென் அமெரிக்காவிலும் ஆப்பிரிக்காவிலும் உள்ள நிலப்பரப்பு மிக அருகிய வெப்ப மண்டலச் சமதளப் புல்வெளிகள் (Savanna) ஈரப்பதையும் காய்ந்த தன்மையுமுள்ள அகன்ற பகுதிகளாகும். இப்பகுதிகளுக்கு வரும் பறவைகளே ஈரப்பதச்சுக்கேற்ப வலசை போதல் என்ற முறையில் அங்கீகரிக்கப்பட்டு செல்லுகின்றன. இந்த இடங்களுக்கு வரும் பறவைகளின் இனப் பெருக்க காலம், அக்காலத்தில் அங்கு அபரிமிதமான உணவுப் பொருள் கிடைக்கும்படியாகவும், மற்றும் மழைகாலமாக அமைந்து விடுகிறபடியாகவும் உள்ளதால் அக்காலம் பறவைகளுக்கு மிகவும் சாதகமாக உள்ளது. இவ்வாறாக வலசை போகும் முறையால் ஆப்பிரிக்கப் பறவைகள், வடபகுதி தென்பகுதி சமதளப் புல்வெளிகளுக்கு மத்தியிலுள்ள யூமத்தியரேகை மழைக்காடுகளை, வருடத்தில் இரண்டுமுறை கடந்து செல்லுகின்றன.

வடக்கில் குறுக்குக்கோட்டு (Latitude) பகுதியிலுள்ள பறவைகளின் பருவகாலங்களில் வலசை போகும் முறையினை மூன்று வகையாகப் பிரிக்கலாம். 1. உயர்ந்த இடங்களுக்கு வலசை போதல் (Altiminial). அதாவது உயர்ந்த மலைப் பகுதிகளுக்கு

பறவைகள் வகைப் போதல்

மேலே சொன்று பின்பு இறங்கி வர்தல். இதனைச் செங்குத்தாக-வகைப் போதல் மூறை (Vertical) என்று நீக்க வாரும் பிராணி களைப்பற்றி விவரிக்கும் பொழுது அழைப்பர். 2. நீர்க்கரையைப் பகுதிகளில் வகைப் போதல் (Longitudinal), 3. அட்சரேகைப் பகுதி களில் வகைப் போதல் (Latitudinal) என மூன்று வகைப்படும்.

உயர்த்த இடங்களுக்கு வகைப் போதும் மூறையினை மேற்கு-துக்கிய நாடுகளில் வசிக்கும் (Western united states) ஜேஸ் (Jays)- லிக்காடெஸ் (Chickadees) கொட்டைடிண்ணிகள் (Nuthatches)- கிங்லெட் (Kinglet) ஜுன்காஸ் (Juncas) போன்ற பறவைகளில் காணலாம். இப்பறவைகள் நாளான வடக்கு தெற்கு திசைகளில் வகைப் போதும் மூறையினைக் கைவிடுத்து மேலே குதிப்பிட்டவாறு உயர்த்த பகுதிகளுக்கு, அங்கு ஏற்படும் பருவ காலங்களுக்கு தக்க வாறு வகைப் போகின்றன. பின்னும் இப்பறவைகள் மேற்கு பகுதி களினுள்ள உயர்த்த இடங்களை விட மிழக்குப்பகுதியினுள்ள உயர்த்த-இடங்களுக்கே அதிகமாக வகைப் போகின்றன. மேற்குப் பகுதியில் வாழும் பறவையினங்கள் பொதுவாக உயர்த்த பகுதிகளுக்கே பருவ காலங்களில் சென்று கூடு கட்டுகின்றன. தாழ்த்த பகுதிகளுக்கு-குளிர்காலங்களில் வந்து செல்கின்றன.

மிழக்கு மேற்காக வகைப்போதும் மூறையினை கிடைப்புத் தலை-வாத்துகளில் (Red head duck) காணலாம். இப்பறவைகள் உடாக்- (Utah) பிரதேசத்தினுள்ள பேர் நதி (Bear river)ச் சேறிப்பகுதிகளில் கூடுகட்டி வாழ்த்திருந்து அதே உயரமான அட்டாளாடிச் கடற்-கரைக்கு குளிர்காலத்தைத் கடக்கச் செய்கின்றன. கிராஸ் பீக் (Gros beak), கலிபோர்னியாவில் வசிக்கும் கல் (Gull) பறவைகள் அம்மாதிரி மிழக்கு மேற்கு திசை வகைப் போதும் மூறைக்கு-உதாரணங்களாகும்.

மேற்கூறிய உயர்த்த பகுதிகளை நாடிச் செல்லுதல், மிழக்கு மேற்கு திசைகளில் செல்லுதல் போன்ற வகைப் போதும் மூறை-களல்லாமல், பொதுவாக பறவைகள் வடக்குப்பகுதிகளுக்கு கோடை-காலங்களிலும் (இனப்பெருக்கம் செய்யவும்), தெற்குப் பகுதிகளுக்கு-குளிர்காலங்களிலும் வகைப் போகின்றன. உள்கின் வடகோளத்தில் மிகப்பெரிய நிலப்பரப்புகள் உள்ளன. பின்னும் அங்கு அதிக குளிர் காலங்களும், அதிக வெப்பம் அல்லது கோடை காலங்களும் உள்ளன. அதனும் அப்பிரதேசங்களினுள்ள பறவைகளே அதிகப்படியான வகைப் போதும் மூறையைக் கையாளுகின்றன. தெற்கு கோளத்தில்-அவ்வளவாக நிலப்பரப்பு இடையாது. பின்னும் தெற்கில் வெப்ப-நிலையும் மிகவும் அதிகமாகவோ மிகவும் குறைவாகவோயினாலாமல்-ஒரே சீராக அமைத்திருப்பதால் வட பகுதிகளில் வசிக்கும் பறவை

களைப் போன்று தெற்குப் பகுதிகளில் வசிக்கும் பறவைகள் வளைசை போகும் முறையை அங்ஙனமாக கடைபிடிப்பதில்லை. தென் அமெரிக்கா, தென் ஆப்பிரிக்கா முதலிய தென் பகுதிகளில் வசிக்கும் பறவைகள் பூமத்தியபேரகை நோக்கு மிகச்சிறிய தூரமே பறந்து சென்று திரும்பிவிடுகின்றன. மற்றும் சில பூமத்தியபேரகையை தாண்டிச் சிறிது தூரம் சென்று திரும்பிவிடுகின்றன. இதற்கு உதாரணமாக ஆட்டிங்கோராசவிகோலூயிக்கா (*Atticora cyanoleuca*) என்ற நீல நிற, வெள்ளை நிற ஸ்வோனோ (*Swallow*) பறவைகளைக் கூறலாம். இப்பறவைகள் தென் அமெரிக்காவின் தெற்குப்பகுதியில் சுருகட்டி வசிக்கின்றன. ஆனால் இப் பறவைகள் 2200 மைல் தொலைவைக்கடந்து காஸ்டா ரீகா (*Costa Rica*) என்ற வடக்குப் பகுதிக்குச் சென்று இனப்பெருக்கம் செய்கின்றன.

வருடந்தோறும் கோடைகால தங்குமிடங்களிலிருந்து குளிர் கால தங்குமிடங்களுக்குச் சென்று பின்பு திரும்பச்செல்லும் வளைசை போகும் பறவைகளில் தூரம் மிகவும் அதிகமாகவோ அல்லது மிகவும் குறைவானதாகவோ இருக்கலாம். சில பறவைகள் நினைவாக ஒரே இடத்தில் வசித்திருப்பதும் உண்டு. வெண்ட்டிட் (*Wrenit*) என்ற கேமெய்டே (*Chameidae*) குடும்பத்தைச் சேர்ந்த பறவைகள் கலிஃபோர்னியாவில் வசிக்கும் பறவைகள் தங்கள் வாழ்நாளில் ஒரு சில ஏக்கர் தூரத்திற்கு மேல் பறந்து சென்று தாண்டிப் பறப்பதில்லை என்று கூறப்படுகின்றது. கேலிகூசியல் பறவைகளும் வளைசை போகும் ஆற்றல் அற்ற பறவைகளாகும். மப் ஒவ்ட் (*Bob white*) என்ற அமெரிக்க பறவை ஒரு சில சமயங்களில் சுமார் 25 மைல் தொலைவு பறந்து செல்லக்கூடும் என்று 1957 ஆம் ஆண்டு அகி (*Aren*) என்பவர் கூறிவுள்ளார். மற்ற சமயங்களில் தங்களது சிறிய எல்லைக் குவியேயே சுற்றி பறந்து நிரியும். இதுபோன்ற இன்னும் சில பறவைகள் $\frac{1}{2}$ மைல் தூரம் மட்டுமே பறந்து சென்று திரும்பும் என்றும் மற்றும் சில சுமார் ஒரு மைல் சுற்றளவிற்குள்ளேயே தங்கள் வாழ்நாள் முழுதும் சுற்றிப் பறந்துவரும் என்றும் மர்டி, பாஸ்கட் என்ற நிபுணர்கள் 1952 ஆம் ஆண்டு கூறிவுள்ளார்கள். ஆந்தைகள் சிலவும் வளைசைபோகும் ஆற்றல் அற்றவை என்று கண்டுள்ளனர்.

மற்றும் சில பறவைகளில் முதிர்ச்சியுற்ற பறவை (*Adult*) இனப் பெருக்கம் செய்ய தன்னுடைய நிலப்பரப்பை உறுதியாக ஏற்படுத்திக் கொண்டு அங்கேயே தங்கிவிடுகின்றன. அதனால் அவை வளைசை போகும் ஆற்றல் அற்றவைகளாகும். அதே இனக்குஞ்சு பறவைகள் தங்களது உடைய முதல், இரண்டாவது வருடங்களில் அதிக தூரம் பறந்து சென்று வளைசை போகின்றன, உதாரணமாக ஹெரரிங் கல் (*Herring gull*) பறவைகள் திபு இங்கிலாந்தின் கடற்கரைப் பகுதியில்

முட்டைகளிலிருந்து குஞ்சாக பொரித்து வெளியாகின்றன. அதன் முதல் வயதில் குளீர்காவத்தைக் கழிக்க ஃளாரிடா (Florida) நகரத்திற்குச் செல்லுகின்றன. இரண்டாவது வயது குளீர்காவத்தைக் கழிக்க அண்டாஸ்டிக் கடற்கரையின் மத்தியப் பகுதிக்குச் சென்று நிறம்புகின்றன. பின்பு நீரிழையுள்ள வட பகுதிகளில் தங்கி இனப் பெருக்கம் செய்வ ஆரம்பித்துவிடுகின்றன. பார்ன் ஆத்தை (Barn owl) என்ற மேற்புறம் வைக்கோல் நிறமாயும் கீழ்ப்புறம் வெண்மை நிறமாயுமுள்ள ஆத்தை வகைகள் அமெரிக்காவின் மிக்ஸிகன் (Michigan) பகுதியிலேயே முதன் முதலில் இனப் பெருக்கம் செய்வ ஆரம்பித்த நாளிலிருந்து வசித்ததாகக் கூறப்படுகின்றது.

முதிர்பெய்த பறவைகளிடையே குஞ்சுப் பறவைகளே அதிகமாக வவசை போகின்றன. சில பறவைகளினங்களில் சாதாரணமாக வவசை போகும் பறவைகள்கூட சில சமயங்களில் அவ்வாறு போவதில்லை. அதற்கான காரணமும் சகீவரத் தெலியனில்லை. வார்ப்ளர் (Warbler), ஒரியோல் (Oriole), திரஷ்டஸ் (Thrushes) போன்ற மற்ரும் சில பறவைகள் குளீர்காவத்தில் வட பகுதியில் வசிப்பவைகள் தெற்குப் பகுதியை நோக்கிச் சென்று விடுகின்றன. கடற்கரையின் வசிக்கும் பறவைகள் மைய அல்லது தென் அமெரிக்காவில்கோடை காலங்களில் தங்கியிட்டு பின்பு ஆர்டிக் தருவத்தை நோக்கி (Arctic) கூடுகட்டி முட்டையிடுவதற்குச் செல்கின்றன. சில சமயங்களில் உடலில் ஏற்படும் காயங்களும் பறவைகள் வவசை போதலைத் தடுத்துவிடுகின்றதாகக் கருதப்படுகின்றது.

வவசை போதல் தோன்றிய விதமும் அதற்குரிய முக்கிய காரணங்களும்

ஒரு இடத்தில் குளீர்காவமாகவிற்குக்கும் பொழுது குளீர் அதிகமாகவிற்குப்பதாலோ அல்லது உணவுப் பற்றாக்குறையினாலோ அதுவும் பூச்சிகள் உணவாகக் கிடைக்காத பொழுதோ பறவைகள் வவசை போவதைச் சாதாரணமாகக் கண்டோம். வட பகுதியில் வசிக்கும் சிறிக்கும் பறவை ஸ்பெராலோ பறவைகள் குளீர்காவத்தில் சக்கள் கிடைக்காத காரணத்தினால் வேறு பகுதிகளுக்கு பறந்து சென்று விடுகின்றன. ஃபோபி (Phoebe) குளீர் காவத்திற்கு ஐக்கிய நாட்டிற்கும் மற்ற சிறிக்கும் பறவைகள் அமெரிக்காவின் மத்தியப் பகுதிகளுக்கும் செல்கின்றன. ஸ்பெராலோ பறவைகள் பூமத்திய ரேகையைத் தாண்டி பறந்து செல்கின்றன. பறவைகளின் முக்கியமான குடும்பங்களாகவுள்ளனவே உணவுப் பொருள்தேடுதல் உண்ணும் முறை முதலியவற்றில் ஒரே மாதிரியுள்ள சிறப்பினப் பறவைகளில் கூட குளீர்காவங்களைக் கழிக்க சில வடக்குப் பிரதேசங்களுக்கும், சில அமைக்கையும் தாண்டி வெகுதூரம் செல்வதையும் கண்டோம்.

சில வாத்துகளும் குவிர் காலங்களிலிருந்து தப்பிக்க வடபகுதி பிரதேசங்களுக்கும் மற்றும் சில ஊதாநிறமுடைய இறக்கைகளைக் கொண்ட குறுவடிவ வகை வானில் வாத்துகள் (Blue winged teal) மெக்சிகோ மற்றும் அதனையும் தாண்டியுள்ள நாடுகளுக்கும் வலசை போகின்றன. சிலப்பு வானிலேயுடைய வலுறுறுகளில் சில குவிர் காலங்களிலிருந்து தப்பிக்க, வட பகுதி பிரதேசங்களுக்கும் மற்றும் சில தென் கனடா பகுதிகளுக்கும் செல்கின்றன. ஆனால் விரிந்த இறக்கைகளையுடைய வலுறுறுகள் (Broad winged hawk) தென் அமெரிக்கப் பகுதிகளை நோக்கிச் செல்லுகின்றன. அதே போன்று ரென் (Wren) லார்ப்சர் (Warblers) ஐசிடிட்ஸ் (Icterides) ஃபிரிங்கிலிட்ஸ் (Fringillids) போன்ற பறவைகளும் சில வடபகுதி பிரதேசங்களை நோக்கியும் மற்றும் சில தென்அமெரிக்க நாடுகளுக்கும் வலசை போவதைக் காணலாம்.

மேலே குறிப்பிட்டுச் சொல்லி வந்ததையெல்லாம் ஆராய்ந்தோமானால் பொதுவாகப் பறவைகள் உணவு பற்றிக் குறை ஏற்படும் பொழுது அதிகக் குவிர் அல்லது அதிக வெப்ப நிலையிலிருந்து தங்களைக் காத்துக் கொள்வதற்கு வலசை போகின்றன என்பதைத்தான் கண்டறிந்தோம். ஆனால் உணவுப் பொருள் கிடைப்பது அவ்வளவு கடினமானதல்ல என்ற நிலையிலும், இனவேலிர் காலங்களிலும் (Migrations) பறவைகள் தங்கள் இருப்பிடங்களைவிட்டுப் பறந்து சென்று வேற்றிடங்களுக்குச் செல்கின்றன என்பதற்கும் சிறந்த உதாரணங்கள் உள்ளன. குறிப்பாக கடற்கரையில் வசிக்கும் பறவைகள் இனப்பெருக்கம் செய்யும் இடங்களையெல்லாம் ஊசியிலைப் பகுதிகளிலிருந்து ஐசிட்ஸ், ஐசிட்ஸ் மாதங்களிலேயே பறந்து சென்று விடுகின்றன. அப்பருவங்களில் அவ்விடத்தில் பறவைகளுக்கு வேண்டிய பூச்சிகளும் ஏராளமாக கிடைக்கும்படியாகத்தான் உள்ளது. அதே போன்று ஸ்வாலோ, ஈ பிடிக்கும் பறவைகள் லார்ப்சர், கொட்டைடிவான்றும் பாபோலிங்க் (Bobolinks) போன்ற பறவைகள் ஐசிட்ஸ், ஐசிட்ஸ் மாதங்களில் கூடு கட்டி முட்டைவிட்டு குஞ்சு பொரித்து குஞ்சுகளைப் பேணி வளர்த்தல் போன்ற தங்களது செயல்களை காரணம் எதுவுமில்லாமல் விழுத்திவிட்டு தென்நிலைப் பகுதிகளுக்கு பறந்து செல்ல ஆரம்பித்து விடுகின்றன. ராபின் (Robin), கிழக்குப் பகுதி ஊதாப் பறவைகள் (Eastern blue birds) தங்களது இருப்பிடங்களில் போதிய உணவுப் பொருள்கள் கிடைத்தாலும் உணவுப் பொருள் கிடைப்பது பற்றி அவ்வளவு உறுதியாக கூற முடியாத வடக்குப் பகுதியின் நோக்கி பறந்து செல்கின்றன.

இவ்வாறு பறவைகளின் பறவிச் செல்லுதற்கான காரணங்கள் ஒன்றுக்கொன்று முரணாகக் கொண்டுவரப்படுவதற்கு சரியாக ஆராய்ந்தோ

மானால் அதற்குரிய காரணங்களும் நமக்குப் புலப்படும். கிபோயிப் (Phoebe) என்ற கிழக்குப் பகுதிகளில் வசிக்கும் பறவையானது தனக்குக் கிடைத்துள்ள இடத்தை பெரிதும் பயன்படுத்தி நீரில் வாரும் பூச்சிகளைப் பிடித்து உண்ணுகின்றன. இப்பறவைகளைப் போன்று ௪ பிடித்துத் திண்ணும் மற்ற பறவைகளுக்கு வேண்டிய போதிய உணவு அவ்வளவு எளிதாகக் கிடைப்பதில்லை. கடற்கரைப் பறவைகளில் தூத்திரப் பிரதேசத்திலிருந்து தங்கள் கூடு கட்டி வசிக்கும் இடங்களை விட்டுப் புறப்பட்டு செல்லுபவைகள் பெரும்பாலும் பெண் பறவைகளேயாகும். இப்பெண் பறவைகளே அவை செல்லும் இடங்களில் இனப்பெருக்கத்திற்கு முட்டையிட்டு குஞ்சு பொரிக்கின்றன. பெண் பறவைகள் அவ்வாறு பறந்து சென்று விடுகிறபடியால் மீதமுள்ள குஞ்சுகளுக்கு உணவு அதிகமாகக் கிடைக்க ஏதுவாக உள்ளது. அவ்வாறு அப்பறவைகள் முட்டையிட்டுக் குஞ்சு பொரித்து குஞ்சுகளைப் பேணி வளர்க்கும்பொழுது அதே பருவ காலத்தில் அவ்விடத்தில் க்டோன் பூச்சிகள் (Stone flies) மே பூச்சிகள் (May flies) முதலியன அதிகமாக உற்பத்தியாகின்ற காலமாகவும் இருப்பதால், அதனால் அப்பறவைகள் பெரிதும் பயனடைகின்றன. அது போன்றே மற்ற பறவைகளும் ஒரு இடத்திலிருந்து மற்ற இடங்களுக்கு வளரைப் போவதற்கான காரண காரியங்கள் பல இருக்கின்றன. ஆராய்ந்துள்ளனர், இவ்வாறான ஆராய்ச்சியின் பலனாக நமக்கு எவ்வளவோ செய்திகள் தெரிந்திருப்பினும் நமக்கு அவற்றின் சரியான பதில் இன்னும் எவ்வளவோ தெரிய வேண்டியதாய் உள்ளது.

வளரைப் போகும் பழக்கங்களைக் குறித்து ஆராயும் பொழுது அதற்குரிய பல கோட்பாடு (Theories) களையும் அறித்து கொள்ளுதல் வேண்டும். அவ்வாறு ஆராய்ந்தறிந்த பல கோட்பாடுகளில் ஒன்று கூட பறவைகள் வளரைப் போகும் பண்பினைக் குறித்து முழுதும் விளக்கிக் கூறுவதாகவியல்லை. லின்கன் (Lincoln) என்ற அறிஞர் பல கோட்பாடுகளையும் ஆராய்ந்து பலவாறாக மாற்றி இறுதியில் தாന്റെ புதிய கோட்பாட்டில் (Hypothesis) அடக்கியுள்ளார். அப்படியான கோட்பாட்டாவது :-

1. வட பகுதியை இருப்பிடமாகக் கொண்ட முன்னோர் மரபு கோட்பாடு (Northern ancestral home theory)
2. தென்பகுதியை இருப்பிடமாகக் கொண்ட முன்னோர் மரபு கோட்பாடு (Southern ancestral home theory)
3. புவிக்கண்ட பெயர்ச்சி (Continental drift)
4. ஒளி பருவ திசை (Photo periodism) என்பனவாகும்.

வடபகுதியை இருப்பிடமாகக் கொண்ட மூன்றோர் மரபு கோட்பாட்டின்படி மிகப்பழைய மண்ணியல் கோட்பாடு, [அதாவது பனித்தகடு அல்லது பனிக்கட்டி நிரம்பிய ஊழி மூல முதற்காலத்தில் (Ice sheet or glacial epoch)] வயசைபோகும் ஆற்றலற்ற பறவைகள் வடபகுதியை தங்கள் இருப்பிடமாகக் கொடுத்திருந்தன என்றும் பின்பு அங்கு சிறிது வெப்பநிலை மாறியபோழுது பனைமரங்கள் தோன்றின. அவைகளாப்பகுதியில் வாணிகள் வசிக்கத் தொடங்கின. ஆயினும் அங்குள்ள பறவைகளுக்கு வயசைபோகும் எண்ணம் இருக்கவில்லை என்றும் விளக்கப்பட்டுள்ளது. பிளீஸ்டோசீன் காலத்தில் ஏற்பட்ட பனிக்கட்டி உறைந்து நிரம்பிவிட்டபடியால் அங்கிருந்த பறவைகள் தெற்கு நோக்கி பவந்தமாக புறப்பட்டு போகும்படி ஏற்பட்டது, அல்லது அங்கிருந்து பனிக்கட்டி காரணமாக தெற்கு நோக்கிப் பறந்து செல்லாவிடின் அழிந்துபட வேண்டியிருந்தது. அங்குள்ள பனி மூடி (செலிகை) (Ice cap) களர்த்து தரூபி பனிக்காலம் மாறிவிடுவதால் பறவைகள் தங்களது பழைய இருப்பிடமானிய வட பகுதியிலே தாடி திரும்ப வந்து விடுகின்றன. வெப்பப் பிரதேசத்தி லுள்ள இட தெருக்கடியாலும் இப்பறவைகள் வடதிசை நோக்கி வந்து விடுகின்றன என்று கணக்கெடுத்துள்ளனர். பின்னும் வட பகுதியிலுள்ள பனிக்காலமும் பனி சார்ந்த இடங்களிலும் பனிக் கட்டி உறைந்திருக்கின்ற காலங்கள் சிறிது சிறிதாக மாறி குளிர் காலமும் கோடைகாலமும்மாயிப் பருவகாலங்கள் வட பகுதிகளில் மெதுவாக உண்டாக்கப்பட்டு, பறவைகள் அவ்விடத்திலேயே வசிக்கத் தொடங்குவதால் வயசை போகின்ற திசை முதலியவை மரபு வழி தொடர்ந்து பழக்கங்களாக மாறிவிடுகின்றன.

பனிக்கட்டி உறைந்திருக்கும் தன்மையானது தற்போதுள்ள பறவைகளின் வயசை போகும் நிறத்தையும், பரவி வசிக்கும் தன்மையையும் பெரிதும் பாதித்திருக்கின்றன. வட அமெரிக்கப் பகுதியில் பனிப் படவமானது, அந்தப்பகுதியை மிகுக்கு மேற்குப் பகுதிகளாகப் பிரித்துவிட்டன. அதே போன்று ஐரோப்பாவின் மையப்பகுதிகளின் பனிப்படவத்தின் தன்மையானது அக்கண்டத்தில் வசிக்கும் ஐனத்தொகையையே மிகுக்கு மேற்குப் பகுதிகளாகப் பிரித்து விட்டு உள் நிறப்பினங்கள் (Sub species) தோன்றக்கூடும் என்றும் கண்டறிந்துள்ளனர். டெர்ஷியரி (Tertiary) காலப்பிரிவி லிருந்து பனிக்கட்டி உறைதலினால் உயகில் விவ்வினங்கள் சிதறி வசித்தல், நிறப்பினங்கள் ஏற்படுதல், வயசைபோவதற்கு முக்கியமான பாதைகள் தோன்றுதல் போன்ற செயல்கள் ஏற்படக் காரணமாக இருப்பினும், வயசைபோகும் பழக்கங்களின் மூல காரணத்தை அறிவதற்குப் பயன்படவில்லை.

தென் பகுதியை இருப்பிடமாகக் கொண்ட மூன்றோர் மரபு கோட்பாடான இரண்டாவது புனைவு கோளானது மேலே கூறிய வடபகுதி மூன்றோர் மரபு புனைவு கோட்பாட்டினின்றும் முற்றும் மாறுபட்ட ஒன்றாக உள்ளது. இந்தக் கோட்பாட்டின்படி பறவைகள் வெப்பமண்டலத்தில் வசித்ததாகவும், அவ்வாறு வசிக்கும் பொழுது அவைகள் எண்ணிக்கையில் மிக அதிகமாகப் பெருகி, அந்த இடத்தை அடைத்துக் கொண்டு வசித்ததால் அவைகள் வடபகுதியை நோக்கி இனப்பெருக்கம் செய்யவும் இடநெருக்கடியைத் தவிர்க்கவும், பறந்து சென்றன என்றும், இனப்பெருக்கம் முடிந்தவுடன் பின்பு தங்கள் இருப்பிடமாகிய வெப்ப மண்டலங்களுக்கே திரும்பி வந்துவிடுகின்றன என்று கூறப்படுகின்றன. இந்த கோட்பாட்டை ஆராய்ந்து பார்த்தோமானால், வவசைபோதும் சில பறவைகள் தங்கள் இருப்பிடங்களிலிருந்து வேறிடங்களுக்குச் சென்று, அங்கு இனப்பெருக்கம் முடிந்தவுடன் போதிய உணவு வசதியுடைய இடம் தங்கள் பழைய இருப்பிடங்களுக்கே திரும்பி வந்து விடுகின்றதை விளக்கும். சிறகிலும் இசை எழுப்பும் பறவைகள் (Humming bird) டேனேஜெர்கள் ((Tanagers) சமீபத்துள்ளும் பறவைகள் முதலியன தென் அமெரிக்காவில் வசிக்கும் பறவைகளாகும். இப்பறவைகளும் மேலே குறிப்பிட்டவாறு வடபகுதிக்குச் சென்று இனப்பெருக்கம் செய்து பின்பு தங்கள் இருப்பிடமாகிய தென் பகுதிக்கே வந்து சேர்ந்து விடுகின்றன. பின்பும் இனவேனிற் காலத்தில் பசுவில் 15 முதல் 20 மணிநேரம் இருப்பதால் வெளியே பறந்து சென்று தங்கள் குஞ்சுகளுக்கு பசுவிலேயே இரைதேடிச் சென்று தங்கள் இருப்பிடங்களை அடைய ஏதுமாகவுள்ளது.

வடக்கு தெற்கு நீளப்பரப்புப் பகுதிகள் தற்போதுள்ள கண்டங்கள் எனக் பிரித்துள்ளமைக்கு முன்னாலது கோட்பாடாகிய புனிக்கண்ட பெயர்ச்சி போக்கு என்னும் பொதுக்கருத்தே காரணமாகுமென்று பல ஆசிரியர்கள் கருதினார்கள். அவ்வாறு தற்போதுள்ள கண்டங்கள் எனக் பிரித்த பின்பே வவசைபோதும் முறைகளும் தோன்றியிருக்க வேண்டுமென்றும் பலரும் கருதினார்கள். ஆனால் பல மண்ணுயிரியல் அறிஞர்கள் வவசைபோதும் ஆற்றல் பறவைகளில் தோன்றியதற்கு முன்பே உலகில் தற்போதுள்ள பல கண்டங்களும் தோன்றிப் பிரிக்கப்பட்டுவிட்டன என்று கூறிபுள்ளார்கள். தாங்களாவதான ஒளி பருவ நினைவிலும் பறவைகள் வவசை போதும் திறன் பெற்றுள்ளன என்ற கோட்பாட்டினை இன்னும் அழகாகக் கீழ்க்கண்டவாறு விளக்கி யுள்ளனர். இனவேனிற் காலத்தில் பசுப்பொழுது அதிகமாக இருக்கின்ற படியால் பறவைகளின் இனப்பெருக்க மண்டலங்களின் உறுப்புகள் நன்றாக தோன்றி செயல்படுகின்றன. அதே சமயம் பசு

பொழுது அதிகமில்லாமலிருக்கும் பொழுது அவைகள் அவ்வளவாக செயல்படுவதில்லை.

மேலே குறிப்பிட்ட பகல் பொழுது அதிகமாகும் பொழுது இனப்பெருக்க உறுப்புகளும் அதிவிரைவாக செயல்பட்டு, வயதை போதலையும் மேற்கொள்ளுகின்றன என்பதற்கு உதாரணமாக பல சோதனைகளை ரோவன் (Roven) ஆல்பர்ட்டா (Alberta) கேனடா (Canada) போன்றவர்கள் ஜன்கால் (Juncos) காகங்கள் (Crows) முதலிய பறவைகளில் நடைமுறையில் காட்டியுள்ளனர். பறவைகளின் கூடுகளை வெளி இடங்களில் அமைத்து சாம்பல் நிற ஜன்கால், காகம் முதலான பறவைகளை குவிக்கால் பெப்பரிஸையை செயற்கையாக அமைத்து அதில் வைத்திருந்தார்கள். ஆனால் அப்பறவைகளை வைத்திருந்த இடம் குவிர்ச்சியாகவிரும்பினும், இனவேலிற்காலத்தில் உள்ளது போன்ற அழகப்படியான அல்லது நீண்டபகல் நேரமாக அப்பறவைகள் உணரும் வண்ணம் விளக்குகளையும் அமைத்து வைத்திருந்தனர். இனவேலிற் காலங்களிலுள்ளது போன்ற அழகப்படியான பகல் பொழுதை உண்டாக்கியிருந்த படியால் பறவைகளின் இனப்பெருக்க உறுப்புகள் நன்றாக வளர்ச்சி புற்று இருந்தன என்பதை அவைகளை அறுவை செய்து கண்டறிந்தனர். பின்னும் குவிர்காலம் போன்றதொரு சிதோஷ்ண நிலையை உண்டாக்கி அதில் அவைகளை வைத்திருந்தபடியால் அவைகள் வடபகுதியை நோக்கி வயதை போதலை ஆரம்பித்துவிட்டன என்பதையும் சோதனைகள் மூலம் கண்டறிந்துள்ளார்கள். அவ்வாறு வடபகுதியை நோக்கிச் சென்ற பறவைகளை பற்றி பின்னும் அறிந்து கொள்ள இயலவில்லை. பின்பு பிஸ்சான்ட்டி (Bissonette) என்பவர் 1937—39 ஆண்டுகளில் மேற்கூறியபடியே இனவேலிற் காலம் போன்ற, குவிர் காலம் போன்ற சிதோஷ்ண நிலைகளை ஏற்படுத்தி ஸ்டார்லிங் (Starling) ஊதா ஜேய் (Jay) முதலிய பறவைகளின் இன உறுப்புகளில் கண்ட மாற்றத்தை விளக்கியுள்ளார். அழகப்படியான வெளிச்சமானது நாளமில்லா கரப்பினான பீட்டிஹட்டரி கரப்பினின் மூன் பகுதியை (Anterior) செயல்படும்படி தூண்டுின்றதென்றும் அத்தூண்டுதலினால் பீட்டிஹட்டரி கரப்பி செயல்படுதலினால் இனப்பெருக்க உறுப்புகள் பெரிதாக்கப்பட்டன என்றும் அவர் விளக்கிக் கூறியுள்ளார்.

இது போன்ற மற்ற பல சோதனைகளையும் உல்ப்சன் (Wolfson) ஃபார்னெர் (Farner) மில்லர் (Miller) போன்ற அறிஞர்கள் சமீபத்தில் விளக்கிக் கூறியுள்ளார்கள். இவர்கள் பறவைகளைக் கூண்டுகளில் அடைத்து வெளியிலிருந்து கொடுக்கும் தூண்டுதலானது (Stimuli) எவ்வாறு அவைகளின் உள்ஊறுப்புகளில் மாற்றங்களை

ஏற்படுத்துகின்றன என்பதை சோதனைகளால் காட்டியுள்ளனர். அதிக வெளிச்சம் கொடுப்பதால் பறவைகளில் இனப்பெருக்க உறுப்புகள் எவ்வாறு அழிவினரவாக செயல்படுகின்றன என்பதை விளக்கிக் கூறினர். வவசைபோதும் பறவைகளின் உடலில் அறுவை செய்து பார்த்த பொழுது அவைகளின் உடலில் கொழுப்புச்சத்து சேர்த்து வைக்கப்பட்டிருந்ததைக் கண்டறித்தனர். இப்பறவைகள் அதிக தூரம் பறக்கும் பொழுது கொழுப்புப் பொருளை பெரும் பாலும் உபயோகப்படுத்திவிடுதலும் வவசை போதனைவிடுத்து தங்கி வசிக்கும் பொழுது மறுபடியும் கொழுப்புப் பொருளைத் தன் உடலில் சேகரித்து வைக்கின்றன என்பதையும் சோதனைகள் மூலம் கண்டறிவோம். பொதுவாக பறவைகள் வவசை போகாத காலங்களில் உணவுப் பொருளின் கொழுப்புப் பொருள் வடிவில் உடலில் சேகரித்து வைத்தும், வவசை போகும் காலங்களில் அதனை உபயோகித்துச் சென்றும் சில பறவைகளில் அது மாற்றியான பறக்கல்கள் கிடைப்பது என்பது, உலகில் எதற்கும் சிதிலிக்கக் குண்டு என்பதற்கு உதாரணமாகும். ஜோஜே ட்ரைக்கியா (Zonotrichia) பறவைகள் உடலில் கொழுப்புப் பொருளை சேகரித்து வைத்துக் கொண்டு வவசை போதலை தொடங்குகின்றன. ஆனால் மரத்தில் வாழும் சிட்டுக் குருவிகள் (Tree sparrow) கொழுப்புப் பொருளைச் சேகரித்து வைப்பதில்லை. பொதுவாக அதிக தூரம் வவசை போகும் பறவைகள் வெளிச்சத்தைப் பொருட்படுத்துவதில்லை. உதாரணமாக கிராம்பீக் (Grosbeak) பறவைகள் பிழக்கு மேற்காக வருடத்தில் ஒரு முறை குளிக்காலத்தில் வவசை போகின்றன. அப் பறவைகள் ஒரு நாளில் உள்ள பசுமையான அடுக்கையோடு குறைவாகவோ இருப்பதைப் பொருட்படுத்தாமல் வவசை போகின்றன. குளிக்காலத்தில்தான் கல் (Gull) பறவைகள் மேற்கு நோக்கி பசுமையான காலங்களைப் பொருட்படுத்தாமல் வவசை போகின்றன. பின்னும் பிம்ப்ளர் என்பவர் ஆண்டியன் சிட்டுக் குருவிகள் (Andean sparrow) வருடத்தில் இருமுறை வவசை போகும் பறக்கமுள்ளவைகளாக உள்ளன என்பதை விளக்கியுள்ளார். ஒவ்வொரு முறையும் வவசை போகும் பொழுதும் முதல் நான்கு மாதங்களில் இனப்பெருக்க உறுப்புகள் தள்ளு கவளச்சியுற்று செயல்பட்டும், மற்ற இரண்டு மாதங்களில் இனப்பெருக்க உறுப்புகளுக்கு ஒய்வு பெற்றும் மறுபடியும் செயல்படுபவர்கள் செயல்படும் நிலைக்கான ஆக்கமும் தடைபெறுவதாகக் கண்டுள்ளார். சூட்டி டெர்ன் (Sooty tern) என்னும் பறவைகளில் வவசைபோகும் காலம் 10 மாதங்களுக்கொருமுறையாகும். அதாவது சந்திரனின் இடப் பெயர்ச்சிக்கும் அதன் தோற்றத்திற்கும் தகுந்தாற்போல் 10 மாதங்களுக்கு ஒரு முறை அப்பறவைகள் வவசை போகின்றன. ஆல்பெட்ராஸ், கலிக்போர்னியா காண்டர்

(Albatross, California cander) போன்ற சில பறவைகளில் குஞ்சுப் பறவைகள் மிகவும் மெதுவாகவே முதிர்ச்சியடைகின்றன. அதனும் முதிர்ச்சியுற்ற போதும் பறவைகளும் இரண்டு வருடத்திற்கொருமுறை இனப்பெருக்கம் செய்யும் ஆற்றல் உடையவையெனக் உள்ளன. ஆர்கன்சாஸ் (Arkansas) பகுதியிலுள்ள சதுப்பு நிலங்களில் வாழும் குட்டையான அலகுக்கையுடைய ரென் (Wren) பறவைகள் கோடை காலத்தின் பிற்பகுதியில் வயல்களில் தெற்குநில்கள் நன்றாக முதிருமலரை காத்திருந்து கூடுகட்டி இனப் பெருக்கம் செய்கின்றன. அப்பொழுதுதான் அவற்றின் குஞ்சு பறவைகளுக்கு வேண்டிய போதிய உணவு கிடைக்குமென்று அவை காத்திருந்து கூடு கட்டுகின்றன. மற்றும் கிட்டுக் குருவிகளில் ஒரு சிறப்பினமான குபஸ் இறக்கைகையுடைய கிட்டுக் குருவிகள் (Rufous winged sparrow) கோடை மழை காலம்வரை பொருத்திருந்த பின்பு தன் குஞ்சுகளுக்குப் போதிய உணவு கிடைக்கும்படியான நிலையில், தானின் பசுக் தேரம் முதுகானவற்றைப்பற்றிச் சித்திக்காமல் கூடு கட்டி மூட்டையிடுதல் முதலியன மூன்று நாட்கண்ட வினக்கத்திற்கு தேர்மானத்தாகும்.

பறவைகளில் வலசை போதலையும் இனப்பெருக்கம் செய்தலையும் பற்றி விரிவாக ஆராய்ச்சி நடத்தியதன் பயனாக இரு செயல்களுமே சிக்கலுள்ளவைகளே என்பது புலனாகும். பின்னும் பறவைகளில் அவற்றை தனித்தனியே பிரித்து விளக்கம் தருவதும் இயலாது. ஒவ்வொரு வருடமும் பறவைகளின் உடலிலுள் ஏற்படும் வலசை போவதற்குரிய தூண்டுதலானது அது ஒரு குறிப்பிட்ட வளர்சிதை மாற்றங்கள் அல்லது ஊன்ம ஆக்கச் சிதைவின் பயனாகவோ (Metabolic) அல்லது உடலுறுப்புகளின் செயற்பாட்டின் பயனாகவோ (Physiological) ஏற்பட வேண்டுமென்று பல அறிஞர்களும் விவரித்துள்ளார்கள். அவ்வாறு ஏற்படும் ஊன்ம ஆக்கச் சிதைவின் பயனாகவோ அல்லது உடலுறுப்புகளின் செயற்பாட்டின் பயனாகவோ ஏற்படும் தூண்டுதலினாலே சில பறவைகளில் இனப்பெருக்க உறுப்புகள் அழிவிரவாகவும் முழுமைவாகவும் செயல்படுகின்றன என்றும் மற்றும் சிலவற்றில் கொழுப்புப் பொருள் உடலில் சேமித்து வைக்கப்பட்டு வலசை போகும்பொழுது பயன்படுத்தப்படுகின்றன என்றும் கூறப்படுகின்றது. மற்றும் வலசை போகும் தன்மையுள்ள பறவைகள் வலசை போகும் பருவங்களுக்கு சற்று முன்பு இரவில் சாதாரணமாக நிதானமிழ்த்து காணப்படும் என்றும் கூறப்படுகின்றது. பருவகாலங்களுக்கேற்ப வலசை போகும் பறவைகளுக்கு வெப்ப நிலையைப் பற்றிய வெளித் தூண்டுதல் மிகவும் அவசியமாகும்.

வகைப் போதலின் முக்கிய நிகழ்ச்சிகள்

பறவைகள் வகைப் போதலைக் குறித்து பல விதமான நிகழ்ச்சிகள் கண்டறியலாம். வகைப் போதல் பறவைகளில் சில இரவு நேரங்களில் வகைப் போதல் (Nocturnal). மற்றும் சில பகல் நேரங்களில் வகைப் போதல் (Diurnal). ஆக, வகைப் போதல் நேரத்தைக் கொண்டு பறவைகளை இரு பிரிவுகளாகப் பிரிக்கலாம். பூச்சிகள் இரையாக உண்ணும் பறவைகள் இரவு நேரங்களிலேயே தங்கள் இருப்பிடத்தைவிட்டு வேற்றிடங்களுக்கு பறந்து செல்பவர்கள். அவ்வாறு வகைப் போதும்பொழுது பகல் நேரத்தில் உணவுப் பொருளைத் தேடிக் கொண்டும், இனப்பாறியும் இருத்து, இரவு நேரங்களில் பறந்து செல்பவர்கள். சில சமயங்களில் பறந்து செல்லும்பொழுது காற்று வெப்பநிலை முதலியவை சாதகமில்லாவிடில் ஒரு குறிப்பிட்ட இடத்தில் நீண்ட நேரம் தங்கியும் செல்பவர்கள். எவோலோ, ஸ்வீப்பிடு (Swallow, Swift) போன்ற பறவைகள் பகல் நேரத்தில் வகைப் போதல். வயலுறு, இராசாவி போன்ற பறவைகளும் பகலிலேயே வகைப் போதல். அவ்வாறு போதும்பொழுது ஒரு குறிப்பிட்ட பாதையிலேயே பயணம் செய்பவர்கள். ஏனெனில் கடற்கரை ஓரங்களிலோ, மலைத் தொடர்ச்சியின் அருகிலேயோ பறந்து செல்லும் பொழுதுதான் அவைகளுக்கு இனப்பாற இடம் கிடைக்கும்.

இரவில் பயணம் மேற்கொள்ளும் பறவைகள் சுமார் 3000 அடி உயரத்தில் பறந்து செல்பவர்கள். இதிலும் வெப்பநிலை, பறக்கும் உயரம் முதலியன ஒவ்வொரு நிறப்பின்பு பறவைகளிலும் மாறுபட்டு காணப்படும். வகைப் போதலின்போது நடு இரவில் பறவைகள் வெகு உயரத்தில் பறந்து செல்லுமா. மேகம் மூடியுள்ள இரவுகளில் பறவைகள் மிகவும் தாழ்ந்த உயரத்தில்தான் பயணம் செய்யும். அவ்வாறு தாழ்வான உயரத்தில் பறந்து செல்லும்பொழுது வழியில் காணப்படும் உயரமான அட்டிடங்கள், தொண்டை காட்டி கருவிகள் அமைக்கப்பட்ட கோபுரம் முதலான தடைகளின்றி மோதி தீழே விழுந்துவிடுவது உண்டு.

பெரிய மலைப் பகுதிகளைத் தாண்டிச் செல்லும்பொழுது பறவைகள் மிகவும் உயரத்தில் பறந்து செல்லும். கொக்குகள் தானாக முதலியன சுமார் 8500 அடி முதல் 15000 அடி உயரம் வரை பறந்து செல்லும். இமாலய மலையத் தாண்டிச் செல்லும் ஒருவகை வாத்துகளை (Geese) மிகவும் உயரம் என்று கருதப்படும் 29000 அடி உடத்து செல்வதாக குறிப்பெடுத்துள்ளனர்.

வவசை போகும் பறவைகளில் வவசை போகும் தூரம் ஒரு நாளைக்கு சாதாரணமாகக் குறைவாகவேயிருப்பினும், சில பறவைகள் எங்குமே தங்காமல் தொடர்ச்சியாக பறந்து சென்று வேறிடத்தினை அடைகின்றன. கிழக்குப் பகுதி தங்க பிளவர் (Golden plover) பறவைகள் லோனா ஸ்காட்டியா (Nova scotia) என்னும் இடத்திற்கும் தென் அமெரிக்காவிற்கும் இடையேயுள்ள தூரமாகிய 2400 கல் தொலைவை 48 மணி நேரத்தில் கடந்துவிடுகின்றன என்று அறிந்துள்ளனர். மெக்ஸிகோ வளைகுடாவை பல பறவையினங்கள் எங்கும் தங்காமல் ஒரே தடவையில் பறந்து கடந்து விடுகின்றன.

சில பறவையினங்கள் தனித்தனியாகவே பறந்து செல்கின்றன. மற்றும் சில கூட்டமாகச் சென்றாலும் ஒன்றுகூடச் சேர்ந்து செல்வாமல் சிதறிச் செல்கின்றன. அவ்வாறு சிதறிச் செல்லும்பொழுது ஒன்றுக் கொன்று குரல் கொடுத்துக் கொண்டேதான் செல்கின்றன. மற்றும் லாத்துகள், குள்ள லாத்துகள், கடற்கரையில் வசிக்கும் பறவைகள், கூட்டமாக வாழும் தன்மையுள்ள மரங்களில் குத்தி வசிக்கின்ற சிறு பறவைகள் முதலியன கூட்டம் கூட்டமாகவே பறந்து செல்கின்றன. சில சமயங்களில் ஒரு பறவையினக் கூட்டம் முழுவதும் பறந்து செல்வதைக் காணலாம். 1957 ஆம் ஆண்டில் சுமார் 70000 குள்ள லாத்துகள் அடங்கிய கூட்டம் புனித லாரென்ஸ் பகுதியிலிருந்து (Saint lawrence) ஒரே சீராக அட்லாண்டிக் கடற்கரைக்குப் பறந்து சென்றதை கண்டறித்ததாக மோரிசன் (Morrisson) என்பவர் 1960 ஆம் ஆண்டு எழுதி வைத்துள்ளார்.

பறவைகள்—சரிவான நிசைத் தொடர்பு அமைவிக்கும் முறை அவ்வது நிசையமைவு

பறவைகள் வவசை போகும்பொழுது தங்களின் சரிவான நிசைத் தொடர்பு அமைவித்துச் செல்லும் முறையை அவ்வது நிசையறிந்து செல்லும் முறையை ஆராய்விட்டது அது இன்னும் சரியாக ஒருவராலும் கண்டுகொள்ள முடியாத ஒரு சிக்கலாகும். ஒரு சில குறிப்புகளைக் கொண்டே பறவைகள் ஆயிரக்கணக்கான மைல் தூரம் தங்கள் வழிகளைக் கண்டு பிடித்து பறந்து செல்லுகின்றன. அதுவும் இரவு வேளையில் பறந்து செல்லும்பொழுது குறிப்பாக அறிந்து செல்வக்கூடிய நிலக்குறிப்புகள் எதுவுமில்லாமல் வெகுதூரம் பறந்து செல்லுகின்றன. மற்றும் குஞ்சுப் பறவைகள் தங்கள் முன்பு கண்டறியாத பல வழிகளில் முதிர்ச்சியுற்ற பறவைகளினின்றும் பின்பு தனியே நிசையறிந்து செல்லுகின்றன என்பது குறிப்பிடத்தக்கதொன்றாகும். இவ்வாறு பறவைகள் தங்கள் நிசைகளை உணர்ந்து

தாங்கள் கடைசியாக அடைய வேண்டிய இடம் மிகச் சேய்மைவாய்
இடத்திலுள்ள பசிபிக் சமுத்திரத்தின் அருகிலுள்ள தீவுகளாக இருத்
தாலும், வட பகுதி வளங்களைக் காடுகளிலுள்ள குறிப்பிடத்தக்க கூடு
கட்டும் இடங்களாக இருந்தாலும், மழைக் காடுகளிலுள்ள ஒதுங்கிடங்
களாக இருந்தாலும் பறந்து சென்று அவ்விடத்தை அடைகின்றன.

பறவைகள் திசையறிந்து செல்லும் ஆற்றலைக் கண்டு கொள்ள
பல சோதனைகள் நடத்தி வருகிறார்கள். அங்ஙனம் நடத்திய சோதனை
களில் வாட்சன் (Watson) லேஷி (Lashley) போன்றவர்கள்
1915ஆம் ஆண்டு கண்டறிந்து வெளியிட்டுள்ளவற்றில் சில கீழே
குறிப்பிடப்பட்டுள்ளன. வெப்ப மண்டல நீர் மூக்குடைய கடற்
பறவைகள் (Noddy sooty terns) சாதாரணமாக வறண்ட டாங்கோ
தீவுகளை (Dry tortugas islands) தங்களது இனப் பெருக்கம் செய்யும்
இடங்களாகக் கொண்டுள்ளன. அவற்றில் சில பறவைகளை அவ்விடம்
களைவிடுத்து அகற்றி ஃபிரிடாவின் (Florida) தென்மேற்குக் கடற்
கரைக்கு எடுத்துச் சென்று அங்கு விட்டுவிட்டால், ஒரு சில மணி
நேரத்திற்குள் அவை திரும்பவும் தங்களது இருப்பிடமானிய
டாங்கோ தீவுகளுக்கு வந்து சேர்ந்து விடுகின்றன. சில நூறு மைல்
களுக்குப்பால் கொண்டு சென்று விட்டு வந்தால் ஒரு சில
நாட்களுக்குள் மேலே கூறியவற்றை தங்கள் இருப்பிடங்களுக்கே வந்து
சேர்ந்து விடுகின்றன என்பதை பல சோதனைகளின் மூலம் கண்டறித்
துள்ளனர். இது மாநில சோதனைகள் மூலம், பறவைகளின் திசை
யறிவும் ஆற்றலுணர்வுகளை ஒருவரது அறியலாம். இதே போன்று
பெட்ரல் (Petrels) பறவைகளும் அவைகளின் இருப்பிடங்களிலிருந்து
கமார் 470 மைல்களுக்குப்பால் கொண்டு சென்று அங்கு விட்டு
விட்டாலும் அவை கடலின்மீது கடல் பறந்து தங்கள் இருப்
பிடத்திற்கே திரும்பி விடுகின்றன என்பதை கிரிபின் (Griffin)
என்பவர் 1940ஆம் ஆண்டு நடத்திய சோதனைகளின் மூலம் குறிப்
பிட்டுள்ளார். ஐரோப்பாவின் மேன்நீலினைச் சார்ந்த அரிவான்
போன்ற மூக்கிலிவடிவைய பறவைகளை (Manx shearwater) கமார்
3200 மைல்களுக்குப்பால் கொண்டு சேர்த்து விட்டு வந்தாலும்
வியக்கத்தக்க முறையில் திரும்பவும் தங்கள் இருப்பிடங்களுக்கே
வந்து சேர்ந்து விடுகின்றனவாம். ஒரு நாளைக்கு கமார் 250 மைல்
வீதம் பறந்து கமார் 12, 13 நாட்களுக்குள் 3200 மைல்களையும்
கடந்து வந்து சேர்ந்து விடுகின்றன. அதுபோலவே ஆல்பெட்ராஸ்
(Albatross) பறவைகளிலும் சோதனைகள் நடத்தியுள்ளனர். கமார்
18 மூன்றாம் பறவைகளை அவைகளின் இருப்பிடங்களிலிருந்து ஆறு
மெய்மேறு இடங்களுக்கு எடுத்துச் சென்று விட்டு வந்தனர். ஆறு
மெய்மேறு இடங்களிலிருந்து 18 பறவைகளில் 14 பறவைகளும்
கமார் 4120 மைல்களை 32 நாட்களுக்குள் கடந்து பழைய இருப்

பீடங்களுக்கே வந்து சேர்ந்துவிட்டன என்பதை கென்யன் (Kenyan) என்பவரும் ரைஸ் (Rice) என்பவரும் 1958 ஆம் ஆண்டு கண்டுபிடித்துள்ளனர். அதே போன்ற ஆற்றலை மற்றும் பல பறவைகளிலும் கண்டுள்ளனர்.

பகலில் பறந்து சென்று வலசைபோகும் ஆற்றலுள்ள பறவைகளில் சில நிலக் குறிப்புகளினும் பறந்து செல்லுதலும் உண்டு. வெகு தூரம் கடற்கரைப் பகுதிகளிலேயே செல்லவேண்டுமானால், சில பறவைகள் கடலைக்கடந்து தாரததைக் குறைத்துக்கொண்டும் பறந்து செல்லுகின்றன. குறைந்த தூரம் வலசை போகும் பறவைகளுக்கு சில நிலக்குறிகள் பயனுள்ளவைகளாகியுக்கும். ஆனால் மிக அதிக தூரம் வலசை போகும் பறவைகளுக்கு இந்நிலக்குறிகள் பயன்படா. இருப்பினும் வெகுதூரம் வலசை போகும்போழுது பறவைகள் குறிப்பிட்ட இடத்திலிருந்து கிளம்பிச் செல்லும் இடங்களிலும், கடைசிவாக சென்று அடையும் இடங்களிலும் ஒரு சில நிலக் குறிகளை மனதில் கொண்டும் செல்லுகின்றன. இவ்வாறு நிலக் குறிகளை மனதில் கொண்டு வலசை போகும் பறவைகளை இறுதிப் பறவைகள் (Terminal) என்றும், திசையறியும் ஆற்றல் கொண்டு வலசை போகும் பறவைகளை அயல் பறவைகள் (Trans migrants) என்றும், பிளேக்கி (Blake) என்பவர் அழைத்துள்ளார்.

பறவைகளின் திசையறியும் ஆற்றலைப் பற்றிய ஆராய்ச்சி நான்கு நாள் மிகவும் விரிவடைந்துள்ளது. பறவைகள் கோரியோலிந்திசை என்ற பூமியின் சுழற்சியைக் கொண்டு தங்கள் திசையை அறிந்து கொள்கின்றன என்று ஒரு கோட்பாடு வலியுறுத்துகின்றது. ஆனால் பூமியின் சுழற்சி, பூமத்தியரேகை முதலிய இடங்களில் மிகவும் வலிவற்றுள்ளதனால் அதைக் கொண்டு பறவைகள் திசையறிதல் என்பது அவ்வளவு பொருத்தமல்ல என்று கிரிஃப்ரின் (Griffin) போன்ற மற்ற ஆராய்ச்சியாளர்கள் கருதினார்கள். சக்லி (Yeagley) என்பவர் புறக்கணிக் கொண்டு இது போன்ற பல சோதனைகளை நடத்தினார். பறவைகளிலுள்ள காந்தசக்தி பரப்பின் (Magnetic field) ஆற்றலானது கோரியோலிந்திசை சக்தியுடன் இணைந்து பறவைக்கு திசையறியும் ஆற்றலை அமைத்துக் கொடுக்கின்றன என்றும் அதன் உதவியால் பறவைகள் திசைநேரணையை ஒட்டி நீளவாக்கிலோ, அச்ச நேரணையை ஒட்டி குறுக்குவாக்கிலோ திசையறிந்து வலசை போடுகின்றன என்பதைக் கண்டறிந்துள்ளனர். அவ்வாறு பல சோதனைகளை நடத்தி மேற்கூறிய முடிவிற்கு சக்லி போன்றவர்கள் வந்தாலும், அம்முடிவும் அவ்வளவு ஏற்றுக்கொள்ளக் கூடிய முடிவாகவில்லை என்று கருதப்படுகின்றது. மற்றும் சிலர் இன்ஃப்ரா ரெட்பு (Infrared) கதிர்கள் வீசும் அளவின் ஆற்றலிலிருந்து பறவைகள் திசையைப்பறிந்து கொள்கின்றன என்று கருதினர்.

கடந்த நூற்றாண்டில் இதுபற்றி மிக முக்கியமானதான ஆராய்ச்சிகள் நடந்து வந்திருக்கின்றன. கிராமர் (Kramar) என்பவர் 1955, 1961ஆம் ஆண்டுகளில் ஹெர்மனியியூள்ள ஸ்டார்லிங் (Starling) பறவைகள் குறி தவறாமல், சூரியன் அமைதி இருக்கும் இடத்திற்கு ஏற்றவாறு தென்மேற்கு திசையிலோ வடமேற்கு திசையிலோ காயநேரத்திற்கு ஏற்றவாறு வலனை சென்று தங்கள் இருப்பிடங்களுக்கு நிகழ்புகின்றன என்பதைக் கண்டறிந்துள்ளார். இதே போன்று புழு, நெஞ்சில் கல் (Herring gull), ஸில்விட் (Sylvide) பறவைகள் போன்றவைகளும் குறித்த காய நேரங்களில் குறிப்பிட்ட பகுதிகளுக்கு வலனை சென்று நிகழ்பியதைக் கண்டறிந்துள்ளனர். மேற்கூறியபடி சூரியனது இருப்பிடத்தையும், திசையையும் ஆதாரமாகக் கொண்டு பறவைகள் வலனைப் போவதை, சூரியன் மோகங்களுக்கிடையில் தெனிலற்று தெரியும்பொழுது செயற்கையான சூரியன் உண்டாக்கி அதன் வெளிச்சத்தால் இப்பறவைகள் வலனைப் போகும்படியும் செய்துள்ளார்கள். ஸில்விட் (Sylvids) பறவைகள் இரவில் வலனைப் போகும் பறவைகளாகும். மற்றும் சில பறவைகள் மோகம் மூடிய பகல்பொழுதினிலும், இளவெனிற்காலங்களிலும் குளிக்காலைகளிலும் கூட வலனைப் போகின்றன.

ஹேமில்டன், ஹேமன்டு (Hamilton, Hammond) என்பவர்கள் 1960ஆம் ஆண்டு வரத்துகளில் பல சோதனைகளை நடத்தினார்கள். வரத்துகளில் இறக்கைகளை வெட்டி அதிக தூரம் பறக்க முடியாமல் செய்தால் கூட அவை நான் ஒன்றுக்கு சுமார் 1½ மைல் தூரம் பறந்து சென்று இளவெனிற்காலங்களில் வடமேற்கு திசையை நோக்கி வலனைப் போகின்றன. இறக்கைகளை வெட்டி விரைவாக பறக்க முடியாமல் செய்தால் கூட அவைகளுக்கு குறிப்பிட்ட காலங்களில் குறிப்பிட்ட இடங்களுக்குப் பறந்து செல்ல வேண்டுமென்ற இச்சை உண்டாகும்பொழுது அவை சென்றே நிற்கும்.

சூரியன் உதிக்கும் நேரம், திசை, மறைதல் இவற்றைக் குறிவைத்துப் பகலில் வலனைப் போகும் பறவைகள் செய்கின்றன. அதே போன்று இரவில் வலனைப் போகும் பறவைகள் சூரியன் மறைவும் நேரம், சந்திரன், நட்சத்திரங்கள் முதலியவற்றின் உதிக்கும் இடம், நேரம் முதலியவற்றைக் குறிவைத்து வலனைப் போகின்றன. பொதுவாக இரவில் வலனைப் போகும் குணமுள்ள பறவைகள் நடு இரவிற்கு முன்போ அல்லது விடியற்காலம் நேரங்களிலோதான் வலனைப் போகின்றன.

மற்றும் மேற்கூறிய பல சோதனைகளிலிருந்து ஊனம் இரவிலோ, பகலிலோ மோகங்களால் குறித்து தெனிலற்றதாக உதிக்கும்பொழுது பறவைகள் தாங்கள் வலனைப் போகும் திசையை அறிய முடியாதன

வாகவும்ள்ள. பின்னும் அவ்வாறு பறவைகள் திசையை அறிய முடிவாதவைகளாக கீழ்ப்பீனும் மேகம் மூடிய நாட்களில் இரவில் பெரும்பாலான பறவைகள் வலையை போகின்றன. காற்று விகம் திசையைக் கொண்டு பறவைகள் திசையை அறிந்து கொள்வதனுலேயே அவ்வாறு இரவில் பெரும்பாலான பறவைகள் வலையை போகின்றன என்று கிராபர், கொச்சர் (Grabert, Cochran) போன்ற பறவை நூல் அறிஞர்கள் 1960ஆம் ஆண்டு கூறியுள்ளார்கள்.

இவ்வாறு பவனிதமான சோதனைகளால் பறவைகளில் வலையை போகும் திசை திறன் மூதலியவற்றை ஆராய்ந்தாலும், மற்றும் இது பற்றி எவ்வளவோ செய்திகளை நம்மால் இன்னும் அறிந்துகொள்ள இயலவில்லை. பறவைகள் தங்களுக்குரிய திறமையால் பவனிதமான வழிகளில் வலையை போகின்றன.

வலையை போகும் மரக்கடங்கன்

பறவைகள் பொதுவாக வடஅமெரிக்கப் பகுதிகளிலெல்லாம் வலையை போகின்றன என்பதை அறிந்திருந்தாலும், ஒரு சில முக்கியமான குறிப்பிட்ட மரக்கடங்கனும் உள்ளன. வடஅமெரிக்காவிற்கும் தென்அமெரிக்காவிற்கும் இடையில் வலையை சென்று திரும்பும் பறவைகளுக்கு நிலப்பரப்பிலோ நீர் பரப்பிலோ தங்கிச் செல்ல ஏற்ற இடங்கள் உள்ளன. ஆனால் ஐரோப்பியப் பகுதிகளில் வாரும் பறவைகளுக்கு மெயுட்டிரேனியன் மரக்கடங்கனில் செல்லும்பொழுது அத்தகைய தங்கிச் செல்லும் இடங்கள் கிடைப்பாது.

வடஅமெரிக்க நீர்க் கோழிகள் (Water fowl) வலையை போகும் பொழுது ஒரு குறிப்பிட்ட மரக்கடங்கனே செல்லும் என்று கூறப்படுகின்றது. மற்றும் சில பறவைகள் இவையுதிர் காவம் இளவேனிற்காவம் முதலியவற்றிற்கு ஏற்றற்போல் தங்கள் திசையை மாற்றிக்கொண்டு வலையை போகின்றன. பனைமரத்தில் வசிக்கும் வார்ப்பார் (Palm warbler) பறவைகள் இவையுதிர் காவத்தில் புது இல்லொன்று மார்க்கத்திலும், பின்பு இளவேனிற்காவத்தில் மீளிரிப்பி மார்க்கத்திலும் வலையை போகின்றன. கடற்கரையில் வசிக்கும் பறவைகளும் அதே போன்று பல வேறுபாடான பாதைகளை இளவேனிற்காவங்களிலும், இவையுதிர் காவங்களிலும் உபயோகப்படுத்துகின்றன. இப்பறவைகளில் மூதிர்ச்செயற்ற பறவைகளும் குஞ்சுப்பறவைகளும் தனித்தனியே பிந்ததுதான் வலையை போகின்றன. நீர்க்கோழிகளும் இதே போன்று அவற்றில் ஒரு பிரிவு ஒரு கூட்டமாக ஒரு திசையில் சென்று ஒரு இடத்தைவும் மற்றொரு பிரிவு வேறு வழியாக வேறிடத்தை அடைதலையும் காணலாம்.

18. பறவைகளின் பழக்க வழக்கங்கள் (Bird-Behaviour)

கடத்த பத்து வருடங்களாக பறவைகளின் பழக்க வழக்கங்களைப் பற்றிய ஆராய்ச்சிகள் புதுப்பிக்கப்பட்டும் முக்கியத்துவம் பெற்றும் வளர்ந்து வருகின்றது. புதிய அறிவியல் வளர்ச்சியின் பலனாக விவங்கு களின் பழக்க வழக்கங்கள் ஒரு குழப்பத்தைத் தரும் வர்ணனைச் சொல்லாகவே இருந்து வந்தது. இது பற்றிய பண்டைக்கால ஆராய்ச்சிக்கும், புதிய அறிவியல் ஆராய்ச்சிக்கும் பல வேறுபாடுகள் உள்ளன. விவங்குகளின் பழக்க வழக்கங்களையும் அவை செயல்படும் முறைகளைப் பற்றி விவரிப்பதற்கும் பல முயற்சிகள் அறிவியல் முறையில் நரம்புத்தசை சார்ந்த மண்டலங்களின் அடிப்படையில் மேற்கொள்ளப்பட்டன. எம்.எல்.எம். (Emeleon) என்பவர் 1955ஆம் ஆண்டு விவங்குகளின் பழக்க வழக்கங்களுக்கு ஒரு விளக்கம் கூறி யுள்ளார். அவர் கூற்றின்படி விவங்குகள் வெளிப்படையாக தோன்று கிவிடின்றதும், இனின்று நடத்துகின்றதுமான வாழ்க்கை நிகழ்ச்சி களுக்கு விவங்குகளின் பழக்க வழக்கங்கள் அவ்வது 'வாழ்க்கை முறை' என்று கூறுவர்.

வாழ்க்கை முறையின் விளக்கமும் கோட்பாடும் (Definition & concept)

தூண்டுதல்கள் பற்றி செயல்பாட்டுக் கொள்கையின் (Stimulus response) மூலம் பல ஆயிரங்கள் வாழ்க்கை முறைகளை விளக்கியுள்ளனர். அத்தூண்டுதல்கள் அகத்தூண்டுதல்களாகவோ (பசி, தூர்மோசன்களின் சமநிலைப் படுத்துமுறை) அல்லது புறத் தூண்டுதல்களாகவோ (சூழ்நிலை, கூட்டமாக வாழும் முறை) இருக்க வலாம். இத்தூண்டுதல்கள் செயல்களை வெளிப்படுத்தும் இயக்கங் களாகச் (Releasers) செயல்பட்டு அவை நிலைதிமான இயக்கங்களை அவ்வது முயற்சிகளை உண்டாக்கி தூண்டுதல்களினால் உண்டாக்கப் படும் புதிய நிலையை சமீப்படுத்துகின்றன. ஆனால் இவ்விளக்கமானது:

சில சமயங்களில் முற்றிலும் வேறுபட்ட கூடியதாயும் கணக்கிட முடியாததாயும் உள்ளன. வேறுபட்டக்கூடிய இயக்கங்கள் ஹாவேண்டு விதி (Howard law)யின் மூலம் விளக்கப்படுகின்றது. அதன்படி தூண்டுதல் தொடர்ச்சியாக செலுத்தப்படும்போது ஒரு குறிப்பிட்ட சூழ்நிலையில் விவங்கானது எந்த நிலையில் தூண்டப்படுகின்றதோ அந்த நிலையில் இயங்கும். சில சமயங்களில் இந்த இயக்கம் இரண்டு விதங்களில் தடைபெறும், (1) ஏக்க இயக்கம் (Appetitive) (2) நிறைவு இயக்கம் (Consummatory) என்பன.

கோழிகுஞ்சு தாயைத் தேடி அணைத்து, கோழி குஞ்சைத் தேடி அணைத்து, உணவு தேடி அணைத்து ஆகியவை ஏக்க இயக்கமாகும். கோழி குஞ்சை அடைந்த உடன் மகிழ்ச்சியினால் ஏற்படுகின்ற இயக்கம், குஞ்சு தாயை அடைந்தபின் மகிழ்ச்சியினால் ஏற்படுகின்ற இயக்கும், உணவு கிடைத்தபின் ஏற்படுகின்ற இயக்கும் நிறைவு இயக்கமாகும். அதாவது எதைத் தேடி அணைத்ததோ, அத்தேவை பூர்த்தி செய்யப்பட்டவுடன் ஏற்படும் மகிழ்ச்சியினால் உண்டாகும் இயக்கம். பறவைக்கு உணவு கிடைத்தபின் ஏற்படும் இயக்கம் முதலியன நிறைவு இயக்கமாகும்.

முட்டையை விட்டு வெளிவந்த சில மணி நேரத்தில் சில குஞ்சுகள் தாம் வாழும் சூழ்நிலைகளின்னது, பல பறக்க வழக்கங்களைக் கற்றுக்கொள்கின்றன. இதனை நினைவிற் பதித்தல் (Imprinting) எனலாம். இவை அதனுடைய வாழ்க்கையின் இறுதிவரைத் தேவைப்படும் பறக்கங்களைப் பதித்துக் கொள்கின்றன. இவ்வாறு வாழ்க்கைக்குத் தேவையான பறக்கவழக்கங்களை உறுதிப்படுத்தும் ஒருவித நிழற்சி ஆழ்ந்து பதித்தல் எனப்படும். இதன்மூலம் குஞ்சுகள் தன் பெற்றோரை அடையாளம் கண்டு கொள்வது முதல், முதலில் பார்த்த பறவையைத் தன் வளர்ப்புத்தாயாக ஏற்றுக் கொள்ளுதல், மேலும் தான் பார்க்கின்ற பொருளோடு ஒட்டி உறவு கொள்ளுதல் முதலானவற்றை அறிந்து கொள்கின்றன. செயற்கை முறையில் அடைகாக்கப்பட்ட குஞ்சு மனிதனைக் கூட உறவினனாகவோ அல்லது எவ்வகாரப் பெற்றோராகவோ எடுத்துக்கொள்ளத் தயாராகி விடுவதோடக்கூடியதாம். அவற்றை உணவாகக் கொள்கின்ற மனிதர்களையே ஒரு தோழனாக ஏற்றுக்கொள்ளும் தன்மையுடையது. மேலும், இச்சமயத்தில் அது தன்னுடைய இனப்பறவைகளைக்கூட உறவினனாக ஏற்றுக்கொள்ள மறுத்துவிடுகின்றது. மேலும் தன் ஒரே இனத்தினுள்ள பறவைகளுடன் தோழமை கொண்டிருப்பதில்லை. ஹெஸ்(Hess) என்பவர் 5700 பறவைகளில் அதன் நினைவுப்பதிவுகளைப் பற்றி ஆராய்ந்து அப்பறவைகளின் வேறுபட்ட சிறப்பினங்களின் வேறுபட்ட உயர்த்த நிலையிலிருந்து தாழ்ந்த நிலைவரை வகைப்

படுத்தியுள்ளார். ஆழ்ந்த பதிலொத்தம் நிலையிலுள்ளதற்கு உதாரணம்-கனடா குள்ளவாத்துகள், தாழ்ந்த நிலையிலுள்ளதற்கு-உதாரணம் காட்டு வார்த்து. இய்வித நிலையு பதிவுகளை இவை ஒரு குறிப்பிட்ட சில நாட்களிலேயே கற்றுக்கொள்ள வேண்டும். அவை குஞ்சு பொசிக்கப்பட்ட சில நாட்களிலேயே நிலையுப் பதிவுகளைக் கற்றுக்கொள்ளவேண்டும். ஏனென்றும் அவை குஞ்சு பொசிக்கப்பட்ட சில நாட்களிலேயே நிலையுப் பதிவுகளைக் கற்றுக் கொள்ளும் திறமையை இழந்துவிடுகின்றன. நிலையு பதிவுகளை ஏற்படுத்திக் கொள்ளுதல், முயற்சி தோல்வி (Trial and error)ப் பதிவுகளின்மீண்டும் நேரப்பட்டது. முயற்சி தோல்வியானது வாழ்க்கையின் பிற்பகுதியில் வரும் நிகழ்ச்சி. அதாவது குஞ்சானது உண்ணத் தக்கது என, உண்ணத்தகாதது என எல்லு வேறுபடுத்துதல் முதலியவற்றையும், பாடுவதற்கும் பறப்பதற்கும் கற்றுக்கொள்ளின்றது. பறத்தல், பாடுதல், உணவு உண்ணுதல் முதலியன பிறப் பொரு இறந்தவைகளாகவிருத்தபொதியும் அவற்றை முயற்சி-தோல்வி முறையால் மாறுபடச் செய்யலாம் அன்றி மேன்மேலும் பண்பட்ட தாகச் செய்யலாம் இயலும்.

பழக்கப்படுத்திக் கொள்ளுதல் (Habituation)

இந்தப்பதமானது செய்பத்தகாதவற்றைப் பிரித்தறியும் நிகழ்ச்சியைக் குறிக்கும். இதில் பகையர்களைப் பிரித்தறியுதல் அடங்கும். ஒரு பறவையானது அதற்குத் தீங்கு ஏதும் விளைவிக்காதப் பட்டுப்பூச்சி அல்லது தீங்கு விளைவிக்கக்கூடிய அவையகளை உணவாகக் கொள்ளக்கூடிய ஒரு பிராணியால் திடுக்கிடச் செய்தால் அது உடனே தீங்கு விளைவிப்பதையும் விளைவிக்காததையும் வேறுபடுத்தி அறிகின்றது. பழக்கப்படுத்திக் கொள்ளுதல் என்பது அந்த பறவையின் வாழ்க்கைக்குக் கூட பயன்படுகின்றது. ஏனென்றும் அது அந்தப் பறவைகளுக்கு எதை ஒதுக்குவது எதை ஏற்றுக் கொள்வது போன்றவற்றை அறிய உதவுகின்றது. இது தெரிபாவிட்டால் அந்தப்பறவையானது தீங்கிழைக்காத ஒரு உயிருக்குக்கூட பயன்பட வேண்டிய தேவை ஏற்படும்.

இனப்பெருக்கப் பழக்கவழக்கங்கள் (Breeding habits)

அநேக வியக்கத்தக்க பழக்க வழக்கங்கள் இனப் பெருக்கக் காலங்களில் நடைபெறுகின்றன.

போட்டி நடத்தை (Agonistic behaviour)

இக்காலத்தில் சில குறிப்பிட்டப் பறவைகளுக்கிடையே குறிப்பாக ஆண் பறவைகளிடையே பகையை உண்டாகும், இவ்வாறு

அறிந்து கொள்ளக்கூடிய மாற்றத்தை நாம் முதல் நிலையில் காணலாம். உணவு உப்கொண்ட பறவைகளோ ஆகஸ்து கூட்டமாக ஒன்று சேர்ந்துள்ள பறவைகளோ, குளிர் காலத்தில் சமாதானமாக இருக்கும். ஆனால் அவை இனப் பெருக்கக் காலங்களில் பகைமையை உண்டு பண்ணிக் கொள்கின்றன. பொதுவாக ஆண் பறவைகள் ஒன்று சேர்ந்து ஒரு பகுதியைப் பாதுகாக்கின்றன. இந்த விதமான எதிர்ப்புத் தன்மைக்கு (Aggressiveness) காரணமாக அமைவது அவற்றின் தாளமிக் வாச் சுரப்பிகளின் சுரக்கும் அதிகப்படியான தாராயோன்களே என்று கருதப்படுகின்றது. இனப் பெருக்கக் காலங்களில் ஆண் பறவைகள் தங்கீகத்தானே விளம்பரப்படுத்திக் கொள்கின்றன. இவை இடைவிடாமல் தொடர்ச்சியாகப் பாடிக்கொண்டு இடையூறு செய்யும் பறவைகளைத் தேவை பட்டபொது தாக்கித்தான் இருக்கும் இடத்திலிருந்து விரட்டி வெளியே அனுப்புகின்றன. இந்த பாட்டுப் பாடுதலும் கவரும் காட்சிகளும் பொதுவாக எதிர்ப்புத் தன்மையைக் குறைக்கின்றது. இதனால் சண்டை விடுவது குறைவதுடன் அச்சத்தி் சேமிக்கப்பட்டு மறிற் செய்யக்கூடாது உதவுகின்றது.

பறவைகள் எதிர்ப்புத்தன்மையிலும் அந்த எதிர்ப்புத் தன்மையின் தேவையிலும் ஒன்றுக்கொன்று வேறுபட்டே காணப்படும். ஆக்ஸி ராயின் என்ற பறவையின் பழக்கத்தை லேக் (Lack) என்பவர் 1943ஆம் ஆண்டு ஆராய்ந்தார். இது குறிப்பாக எதிர்க்கும் தன்மைவுடையது. ஆண் பறவைகள் தாம் ஆக்ரமித்துக் கொண்டிருக்கும் இடத்தில் வரும் பறவைகளைத் தாக்கும் இயல்புடையன. ஆண் பறவைகளும் பெண் பறவைகளும் அவை இருக்கின்ற இடத்திலுள்ள பொம்மைகளை எதிர்க்கும் தன்மைவுடையன. இவ்வாறு எதிர்க்கும் தன்மைக்கு ராயினில் விவப்பு நிற மார்பு ஒரு குறிப்பாக இருந்தது. குஞ்சுகளின் மார்பும், முதிர்ந்த பறவைகளின் மார்பும் பழுப்பு நிறமாக மாற்றப்படும்பொது அவைகளை தாக்குவதில்லை. ஆனால் அதில் ஒரு குச்சியில் சில நெருக்கிப் பொருத்தி அதில் விவப்பு நிறத்தைச் செலுத்தினால் அவை தாக்கப்படுவதைக் காணலாம். சில பெண் பறவைகள் காலியாசு வெற்றிடத்தைக் கூடத் தொடர்ச்சியாக எதிர்க்கும் தன்மை வாய்ந்ததாக உள்ளன. மூன்று பறவைகள் பொம்மைகளுடன் எதிர்த்து அவற்றைத் தம் இடத்திலிருந்து விரட்ட முடியாததால் தங்களுடைய சொந்தக் கூடுகளையே அழித்துக்கொள்ளும் தன்மைவுடையதாக உள்ளன. சில பறவைகள் தங்கள் முட்டையிலும் காலங்களில் கூட தங்கள் இடங்களைப் பாதுகாப்பதில்லை. சில பறவைகள் எதிர்க்கும் தன்மையேயற்றும் காணப்படுகின்றன.

யிப்ப எதிர்ப்பு போட்டி மனப்பான்மையின் அவசியமற்ற தோற்றம்

பறவைகள் தங்களுடைய பிம்பத்தைவே சன்னங்களிலோ அல்லது பிரதிபலிக்கும் பரப்பிலோ எதிர்க்கும் போட்டி மனப்பான்மை கொண்டவைகளாகும். சில சமயங்களில் அவசியமற்ற இந்தச் செயலை சில முயற்சிகளுக்குப் பிறகு விட்டுவிடும். அல்லது தொடர்ந்து விட்டுவிட்டுச் செய்யும் தன்மையுடையவைகளாகும். இவ்வாறு தொடர்ந்து செய்யும் செயலால் தன்னுடைய கண்பின் காரணத்தால் அந்த முயற்சியை அதாவது மற்ற பறவைகளை தன் இடத்தை விட்டு துரத்துவதன் முயற்சியையே அறவே விட்டுவிடுகின்றது.

எதிர்க்கும் தன்மை பெரும்பாலும் செவ்வேறு நிறப்பின்பு பறவைகளுக்குள்ளேயே (Intra specific) இருக்கும். சிலசமயங்களில் ஒரு நிறப்பினத்துக்குள்ளேயும் தடைபெறலாம். பகைமை நிறப்பினங்களுடைய இனத்தோடு உணவுக்காகவோ அல்லது மற்றதேவைகளுக்காகவோ எதிர்க்கும் தன்மை ஏற்படும். கூட்டடைத் திருடுகின்ற பறவைகளும் மற்ற பறவைகளை உணவாகக் கொள்வதற்கு பறவைகளையும் உணவாகப்போகும் பறவைகள் குழித்து கொண்டு பாயமுறத்துவதும் உண்டு. இதற்குத் தாக்கும் தன்மை (Mobbing character) என்று பெயர். உதாரணம்: ஆந்தைக்கும் காகத்துக்கும் இடையே நீடித்திருக்கும் பகை.

௧௨ அமைக்கும் தன்மை (Nestling behaviour)

௧௨ கட்டுத்தன்மை இயற்கையாலும் செயற்கையாலும் தோன்றுகின்ற பழக்கங்களை தன்னுடைய பட்டம் பிடித்துக் காட்டுகின்றன. ஒவ்வொரு நிறப்பினத்திற்கும் எந்த இடத்தில், எவ்வாறு, எதைக் கொண்டு ௧௨ அமைக்கவேண்டும் என்பது ஒரே நிலையான தன்மை அடைபதாலும். பழக்கங்களை பற பறவைகள் சூழ்நிலைக்கேற்ப மாற்றிக் கொள்வதுமுண்டு. உதாரணம்: மனிதனால் உண்டாக்கப் பட்ட வசதிகளை மாற்றி கூடாகக் கொள்ளுதல், புகை போக்கிகளையும் கூட்டிடங்களின் மேலும் உள்ளேயும் ௧௨ கட்டுதல் (ஸ்டார்லிங்க்கள், ராபின் ஸ்வோனோன், போப்சு) (Phobes) அல்லது அவை செயற்கைப் பெட்டிகளைத் தங்களுடைய கூடுகளாக ஏற்றுக் கொள்ளுதல், இவ்வாறு செய்வதனால் சில சமயங்களில் எதிர்பாராத துன்பங்களுக்கு ஆளாகின்றன. இதற்கு உதாரணமாக ராபின் பறவைகளைக் கூறலாம். அப்பறவை தகடுகின்ற ஊர்திகளின் மேல் ௧௨ கட்டக்கூடும். மற்றும் பறவைகள் கோணி, காகிதம், கயிறு முதலியவைகளைக் கூடுகட்டும் பொருளாகத் தேர்ந்தெடுக்கின்றன. இதற்குப் போதிய காரணம் கூறமுடியாவிடினும் அப்பொருள்கள்

எளிதாகக் கிடைக்கின்ற காரணத்தால் அவைகளை கூடுகட்டும் பொருளாகத் தேர்த்தெடுத்தும் கொள்கின்றன என்று கருதப்படுகின்றன. பகட்டான கத்தியை, சாயலுமிலுவாக கூடு, பறவைகளுக்கு நஷ்டத்தையே கொடுக்கின்றன. ஏனென்றும் அது பகட்டாக உள்ள காரணத்தினால் இப்பறவைகளுடன் பணைமை பாராட்டுகின்ற பறவைகளிலும் எளிதாக அடையாளம் கண்டு கொள்ள ஏதுவாக உள்ளதுடன் அவற்றை அழித்துவிடக் காரணமாகவும் அமைகின்றது.

மற்றும் பறவைகள் கூட்டமாக வாழும் இடங்களிலும் கூடு கட்டும் பொருள் திருட்டுப் போவது மிகச் சாதாரணமாக நடைபெறும் ஒரு நிகழ்ச்சியாகும். இந்தநிகழ்ச்சி பரம்பரை பரம்பரைவாக நடந்து வரும் ஒரு குறிப்பான நிகழ்ச்சி என்று கருதப் படுகின்றது. இந்தக் குறிப்பான நிகழ்ச்சி கூட்டமாக வாழும் வழக்கமுடைய பெண்களின் பறவைகளிலேயே முக்கியமாக நிகழ்கின்றது. பெரிய பறவையானது கூடு கட்டும் இடத்தைத் தேர்த்தெடுத்தது, கற்களைச் சேகரிக்க ஒரு யாரத்திற்கு மேல் எடுத்துக் கொள்ளும். கூழாங்கல்லைக் கொண்டு வந்து இவை கூடுகட்டும் இடத்தை அடையாளம் போட்டு பின்பு அந்த இடத்தைக் குறிப்பாக சிறிய பெரிய கூழாங்கற்களினால் அடையாளம் செய்து வைக்கும். ஆன் பறவைகளினால் சேகரிக்கப் பட்டு அடையாளம் போட்டு வைத்த இடத்திலுள்ள கூழாங்கற்களைப் பெண் பறவைகள் ஒழுங்கு படுத்தும். அவ்வாறு பெண் பறவைகள் கூழாங்கற்களை ஒழுங்கு படுத்தும் பொழுது, அக்கற்கள் மற்றப் பறவைகளினால் திருடப்படுவது என்பது வீர்தையான ஒரு செயலாகும். பெண் பறவைகள் கூழாங்கற்களைத் திருட வரும் மற்ற பறவைகளுடன் போராடி வெற்றி பெறுவதுமுண்டு. சில பறவைகள் போராடித் தோற்று விடுவதுமுண்டு. தங்க பிச்சை (Gold finches) பறவைகள் தங்கள் இனங்களை மற்ற இனங்களினின்றும் வேறு படுத்தி அறியும் திறமை வாய்ந்தவைகளாகும். இவை கூடு கட்டும் பொருட்களைச் சேகரிப்பதில் மிகவும் கறு கறுப்பாக இயங்கும் என்று கற்ப்படுகின்றது.

மற்றும் சில பறவை இனங்கள் கூடுகளிலிருந்து ஈழே விழுந்து விட்ட முட்டைகளையோ அல்லது மற்றப் பறவைகளினங்களுடன் கலந்து விட்ட முட்டைகளையோ மிசித்து அறியும் தன்மையுடையவைகளாகும். அவ்வாறு ஈழே விழுந்த முட்டைகளைச் சற்று தூரத்தில் காணப்படினும் கூட, டெர்ன் (Gull, tern) போன்ற பறவைகள் தங்கள் அலகுகளினால் உருட்டிக் கொண்டே வந்து கூட்டினால் சேர்த்துவிடும் திறமை உள்ளவையாகும். மூரில் (Moor) என்ற பறவைக்கு கூடு கட்டும் வழக்கமே கிடையாது. இவை தம் முட்டைகளை மற்றக் கூடுகளில் இட்டாலும் ஒவ்வொரு முட்டையையும் தனிப்படுத்தி

அறிவும் திறனுடைய தொன்றாகும். அப்பறவை எங்கே முட்டை இட்டதாலும் வேறு இடத்திற்கு எடுத்துச் செல்லப்பட்டால் சுமார் 1105 கனம் வரை உருட்டிக் கொண்டே வந்து பாதுகாப்பான இடத்தில் சேர்க்கும். திறன் பெற்றுள்ளது என்று கூறிக் கொள்வதற்கு வாய்?

வளர்க்கு - ஒட்டுண்ணி முறை (Brood-parasitism): இது சில பறவை இனங்களில் காணப்படும் தனிப்பட்ட நிறப்பு வாய்ந்த விடப்பட்டுகின்ற கூடுகட்டியில் போது உண்டாகின்ற ஒரு சந்தித் திட்டமாகும். கக்க, தேன்சிட்டு போன்ற சிலை நாட்டுப் பறவை களின் பன நிறப்பிளங்களில் இந்த வாய்க்கை முறை தடை பெறு கின்றது. இந்தநிறப்பிளப்பறவைகள் தங்களுடைய முட்டைகளை மற்ற பறவைகளின் கூட்டில் இட்டுவிடுகின்றன. இவைகள் தங்களுடைய இனப் பறவைகளைக் காட்டிலும் அளவில் சிறிய பறவைகளின் கூடு களைப்ே இதற்குத் தேர்த்தெடுக்கின்றன. இப்படி இடப்படுகின்ற முட்டைகளானது வளர்ப்புப் பெற்றோர்களின் உதவியால் பொரிக்கப் பட்டு அவை ஏற்றுக் கொள்ளப்படுகின்றன. இந்த வளர்ப்புப் பெற்றோர்கள் தங்களுடைய சொந்த குஞ்சுக்குப்ே போதிய பாது காப்பு அளிக்க முடியாமல் அவை அறிந்துவிடுவதும் உண்டு. இச் செயல் ஒரு அரும்பெரும் திவாகமே ஆகும்.

மற்றும் சில பறவைவினங்களில் வேறு பன விபக்கத் தக்க சந்தித் திட்டம் நடக்கின்றது. பழப்பு நிறத்திலையையுடைய பசுப் பறவை (Cov bird) இனங்களில் சில, பன நிறத்தையுடைய அவை தெளி வாகத் தெரிவின்ற முட்டைகளை இடுகின்றன. ஆகவே இவற்றின் முட்டைகளை எளிதில் பிரித்தறிய முடியும். மஞ்சள் ஊர்ப்புப் பறவைகள் பசுப் பறவைகளின் கூடுகளில், அவற்றின் முட்டை களுக்கு மேலே தளம் அமைத்து அதில் தங்களுடைய முட்டைகளை இடுகின்றன. இவ்வாறான சந்திச் செயல்களைக் குறித்து கண்டுபிடிக்கப் பட்டு உள்ளது.

சிலை நாட்டு கக்க பறவைகளானது தன்னுடைய விருந்தோம் பியின் முட்டைகளின் நிறத்தை ஒத்த முட்டைகளையே இடுகின்றது. தேன் வழிகாட்டிப் பறவைகள் (Honey guide) அவ்வது தேன்சிட்டுப் பறவைகள் தங்கள் முட்டைகளை மரக்கொத்தியின் கூட்டில் இடுகின்றன. தேன் சிட்டுக் குஞ்சுகள் தங்கள் மூக்கின் மேதுள்ள கொக்கியால் மற்ற குஞ்சுகளைத் துன்புறுத்துகின்றன. ஆனால் இந்தக் கொக்கிகள் குஞ்சு பொரித்த சில நாட்களுக்குள் மறைந்து விடுகின்றன.

காயமுற்றவைப் போல் நடத்துத் தப்பித்தல்

சில சிறப்பினப் பறவைகளில் பெற்றோர்ப் பறவைகள் தங்கள் குஞ்சுப் பறவைகள், முட்டைகள் முதலானவற்றைப் பிறப் பறவைகளிலின்றும் காப்பாற்றும் பொருட்டு தன்னுடைய நெகால் படபட வென்றடித்து சத்தம் எழுப்பி காயமுற்றது போல் நடத்து அவற்றின் கவனத்தை வேறுபுறம் திருப்பி விட்டுவிடுகின்றன. அவை தங்கள் கூடுகளை பாதுகாக்க விரும்புவதே இதற்குக் காரணமாகும். இவ்வாறு காயமுற்றதுபோல் நடக்கும் நிறனுக்கு அறிஞர்கள் இரு மாறுபட்ட கருத்து விளக்கங்கள் தந்துள்ளனர். முதலைய இயற்கை உயிரியல் அறிவியலாளர்கள் (Naturalist) பறவைவாணது தன்னுடைய கூட்டைப் பாதுகாப்பதற்கு காயமுற்றது போல் நடப்பது உணர்ந்து செல்கின்ற ஒரு செயலே ஆகும் என்று கூறியுள்ளார்கள்.

பின்னும் ஆராய்ச்சி செய்த பறவை நூல் வயதுநர்கள் பறவை தங்கிச்செய்கவே செயல்படும் ஒரு வகை முக்கிய உறுப்புகளின் தாண்டுகளிலும் இச்செயல் ஏற்படுகின்றது என்று கூறியுள்ளனர். இவை இரண்டு எதிர்ப்பட்ட உணர்ச்சிகளால் உண்டாக்கப்படுகின்றன. ஒன்று பறவை தான் கூட்டைக் காக்க முடியாமல் போய் விடுமோ என்ற பயத்தினால் தோன்றுகின்ற பயமாகவே தன்னைப் பாதுகாத்துக் கொள்ள வேண்டுமென்ற நினைவானே இயக்கப்படுகின்றன என்று கருதுகின்றனர்.

காயமுற்றது போன்ற நடப்பு முட்டைகளிலும் பறவைகளில் பொதுவாகக் காணப்படுகின்றது. கடற்கரையில் வாலும் பறவைகளிலும் இத்தகைய செய்கையைக் கரணவாய், கூட்டமாக வாலும் பறவைகளிலும் மரத்தின்மேல் கூடுகட்டி வாலும் பறவைகளிலும் இத்தகைய செய்கையைக் காண்பதரிது.

ஒரே சமயத்தில் எல்லா முட்டைகளும் குஞ்சாகப் பொங்காத, உயிருள்ள இரையைப் பிடித்து கொண்டு தின்னும் பருந்து வகை, ஆந்தை வகை முதலிய சில பறவைகளில் பெரிய குஞ்சுகள் சிறிய பலமற்ற குஞ்சுகளை தாக்கி உணவாகக் கொள்கின்றன.

வாழ்க்கை முறையும் உணவுப் பழக்கமும்

(Behaviour & feeding habits)

பறவைகளின் உணவுப் பழக்கவழக்கங்களை துடிப்பூட்டுகிற தகவலையிடுகளின் மூலம் உதாரணங்களால் விளக்கலாம். சில பருந்துவகைகள் தந்தைகளை மட்டுமே உணவாகக் கொள்கின்றன.

அவ்வாறு நத்தைகள் உணவாகக் கிடைக்காதபோழுது மறிற் உணவுப் பொருட்களை ஏற்காமல் இப்பறவைகள் அறிந்து விடுகின்றன.

இதற்கு நேர்மாறாக சில பறவைகள் புதிய உணவுப் பொருட்களைக் கண்டால் அதனை சேமித்து வைத்துக் கொண்டு உணவாக உண்ணும் ஆவணப் பெறுகின்றன. காகங்கள் உணவுப் பொருட்களைச் சேமித்து வைக்கும் பழக்க மூன்றாவதாகும். அவை வசத்த காலத்தில் புதிதாக கிடைக்கப்பட்ட சோளத்தினை நோண்டி வெடுத்து சேமித்து வைக்கும் ஆற்றலுள்ளவைகளாகும். மீன்களைப் பிடித்து வந்து உணவாக உண்ணும் பழக்கமும் காகங்களுக்கு உண்டு. மறிற் சில சமயங்களில் எலிகளை எலிவிரைகளிலிருந்து தேடி வெளியே எடுத்துத் தின்பதற்கும் பழக்கப்பட்டுள்ளன. பல காகங்கள் ஒன்று சேர்த்து வேட்டையாடும் பழக்கமூன்றாவது கனாயுமுள்ளன.

பின்னும் கோர்ட்டின் என்ற பறவையானது மீனவனின் வலையைக் கூடத் தன் அங்கிலை இழுத்து மீன்களை உணவாக உள் பதற்குக் கற்றுக் கொண்டுள்ளன என்பது அறிந்தால் நம்மிடம் விவக் காதாசி யார்? மீனவன் வலையை விசித்ததும் இப்பறவை அவ்வாறு விளங்கி இங்கும் அங்கும் நடந்து திரியுமாம். தன் உணவான மீன் வரும் வரையில் இச்செயலை தொடர்ந்து செய்யும் என்று கூறப்படுகின்றது. நான்கு ரொட்டித் துண்டுகளைக் கரையிலிருந்து தன்னுள் குக்குள் வைத்து, அதை உண்ண வரும் மீன்களை பிடித்து உணவாக உண்பதைக் கண்டு அறிஞர்கள் விளக்கி யுள்ளார்கள்.

மறிற் கக், காகம் முதலிய பறவைகள் சில சமயங்களில் நத்தைவை ஒட்டுடல் கொண்டு வந்து ஒட்டிக் காற்குக்கலின் மீது தட்டி உடைத்து நத்தையின் மென் உடலை உண்ணும் பழக்க மூன்றாவதாக உள்ளது கூறப்படுகின்றது. இதே போன்று ஐரோப்பாவில் வசிக்கும் பண்ணாடு பறவைகள் ஆமைகளை கொண்டு வந்து ஆமை ஒட்டைக் கல்லின் மீது மோதி உடைத்து உண்ணுகின்றன என்று கூறப்படுகின்றது.

இவ்வாறு உணவுப் பொருட்களை சேமித்து வைத்து உண்ணும் பழக்கமூடையாவதாக சில பறவைகள் இருப்பினும் எதிர்பாராத சூழ்நிலைகளால் புதிய உணவு சேமிப்பானது அப்பறவைகளுக்கு எப்பொழுதுமே பவன் தகுந்தாக அமைதல்லை. கழுதிகள் விவசாயிகளில் கோழிக் குஞ்சுகளை உணவாக உட்கொள்ள பிடிக்கும்பொழுது அவையனை பிடிப்பட்டு இறந்து விடுவதுமுண்டு. இவ்வாறே மீன்களை உணவாக உண்ணும் பறவைகள் பறவை கண்காணிப்பவர்களிடமுள்ள உணவை உட்கொள்ளச் செய்குமையில் பிடிப்பட்டு இறந்து விடுகின்றன. சிலா என்ற திபுட்டினாந்துப் பறவை செம்மதியாட்டில்

சிறு நீரகக் கொழுப்புப் பொருளை எடுத்து உண்ணும் நிறைவு வாய்ந்தது. இந்த வியா என்ற இராட்சசக் கிளிகன் ஆடுகளை மேல்க்கும் இடைவாக்களால் பெரும்பாலும் அழிக்கப்பட்டுவிட்டன வாகக் கருதப்படுகின்றது.

பறவைகளின் உணவு சேமிப்பு, அனலில், பீவர்கள் போன்ற பாலூட்டிகளின் உணவு சேமிப்பை போன்ற உச்ச நிலையை அடைந்ததில்லை. ஆனால் உடனாசக் குருவி (Jay) மரங்கொத்தி போன்ற சில பறவைகள் உணவு சேமிப்பதில் மிகுந்த ஆர்வம் காட்டுகின்றன. இப்பறவைகள் சேமிக்கும் தொழிலை முறைபுடனும், முயற்சியுடனும், பயிற்சியுடனும் செய்கின்றன. சில சமயங்களில் இவ்வாறு அப்பறவைகள் சேமித்து பாதுகாக்கப்பட்டு வரும் உணவுப் பொருள் மற்ற விலங்குகளால் திருடப்பட்டு விடுவதும் உண்டு.

மற்றும் சில சமயங்களில் மரக் கொத்திகள் புதியதொரு தனிப் பட்ட முறைகளையும் உணவு சேமிப்பதற்குக் கையாளுகின்றன. சிலப்புத் திணையுடைய மரக் கொத்திகள் குளிர்காலத்துச் சேமிப்பு களில் மீது முத்திரை இடுகின்றன. அவைகளை மரத்தின் பட்டைகளிலும் முத்திரையிட்டு அடைப்பதோடல்லாமல் அப்பறவைகள் தனைந்த மரத்துண்டுகளைக் கொண்டு பொத்துகளை அடைத்து விடுகின்றன. மேலும் பொத்துகளை மூடிவும் விடுகின்றன. அதனால் மற்ற பறவைகள் இந்த இடத்தை எளிதாகக் கண்டு பிடிக்கலாம் உணவுப் பொருளை எடுத்துக் கொள்வதென்பதோ இயலாது. ஆகையால் மரங்கொத்திகள் மேற்கூறிய முறையில் தங்கள் உணவுப் பொருட்களைச் சேமித்துவைத்து மற்ற பறவைகளுக்கு தெரியாதபடி மறைத்து வைத்து விடுகின்றன.

ஜோஸப் கிரிணல் (Joseph grinnel) என்பவர் மேலை நாட்டு மலைகளில் பறவைகள் கொட்டைகளை மறைமுகமாகக் கொண்டு வந்து புதைத்து விடுவதைக் குறித்து விவரித்துள்ளார். அவை கொட்டைகளை அடிக்கடி அவ்வாறு கொண்டு வந்து புதைப்பதால் பல சமயங்களில் அவ்விதைகள் முளைத்து அவ்விடங்களில் செடிமரமும் மரங்களும் வளர்ந்ததாகக் கூறிவுள்ளார். உயரமான அந்த மலைச் சரிவுகளில் பறவைகளினாலேயே செடி கொடிகள் முளைக்கின்றன என்பதை அவர் ஆதாரப்பூர்வமாக விளக்கிக் காட்டியுள்ளார். இப்பறவைகளின் அவர் குன்றின் மீது விதை நட்டு பயிர் வளர்க்கும் பறவைகள் (Uphill planters) என்று அழைத்துள்ளார்.

ஷ்ரிக்ஸ் (Shrikes) என்னும் பறவைகள் வெட்டுக் கிளி, எலி போன்ற தங்கள் உணவுப் பொருட்களை மரம், செடி, கொடிகளினுள்ள மூட்களாலும் வேலியோரங்களினுள்ள மூள் கம்பிகளாலும் மிழித்து

உண்பதைக் காணலாம். கழுஞ்சளும் ஆத்தைகளும் கூட இவ்வாறு கிழிக்கப்பட்ட உணவை தம்முடைய கூட்டில் சேமித்துவைக்கும் பழக்கமுள்ள பறவைகளாகும். இதே பழக்கத்தைத் தம் குஞ்சு களுக்கும் இப்பறவைகள் கற்றுக் கொடுப்பதாகக் கூறப்படுகின்றது. இது பற்றி ஆராய்ச்சி நடத்தியதன் படி ஒரு பார்ன் ஆத்தை (Barn owl)யின் கூட்டினுள் 30 கண்டெலிகள் சேமித்து வைத்திருந்த தாசையும், மற்றுமொரு மேற்கூறிய நிறப்பின ஆத்தையின் கூட்டில் 6 முட்டைகளும் 73 கண்டெலிகளும் சேமித்து வைத்திருந்ததாகவும் கூறப்படுகின்றது.

பறவைகளின் இதர செயல்கள்

மேற்கூறிய வகைகள் எதிலும் சேராத சில பழக்க வழக்கங்களும் சில பறவைகளிடம் காணப்படுகின்றன. இந்த ஒரு சில பழக்கவழக் கங்கள் உணவுப் பழக்கங்களுக்கோ, இனப்பெருக்க பழக்கங் களுக்கோ தேவையில்லாததாக இருத்த போதிலும் ஒரு சில பறவை களில் காணப்படுகின்றன. ஒரு சில பறவைகள் எறும்புகளை கொத்தி எடுத்து தம் உடலின் மீது விட்டுக் கொள்கின்றன. இந்தச் செயலை எறும்பு வேட்டை (Anting) என்று அழைப்பர். ஒயிட் டெக்ஸர் (Whitaker) என்பவர் 1957 ஆம் ஆண்டு எம்மாச் குய்திரி களைப் பூறுப்பித்து மாற்றி அமைத்து ஆர்ச்சர் ஒரீயோல் (Archard-ovale) என்ற இப்பறவைகளைக் குறித்து ஆராய்ந்தார். இந்த ஆராய்ச்சியின் ஆர்ச், ஒரீயோல் என்பவர்கள் மேலும் ஆராய்ந்து பல கருத்துகளைச் சேர்த்தனர். அவர்கள் எறும்புகளை உடலின் மீது விட்டுக் கொள்ளும் பறவைகள் கறுசறுப்பாக இவங்களை காரணத் திலும் அவைகளை ஐரிதப்பறவைகள் என்றும் மற்றவற்றை துரீதமற்ற பறவைகள் என்றும் கூறினார்கள். இவ்வாறு எறும்புகளை உடலில் விட்டுக் கொள்ளும்பொழுது எறும்புகளினும் கரக்கப்படும் பார்மிக் அமிலம் என்ற நிரலம் எறும்புகள் கடிப்பதனால் பறவைகளின் உடலினுள் செலுத்தப்படும் பொழுது பறவைகளுக்கு ஒரு கிளர்ச்சி ஏற்படுகின்றது. இதுபோன்ற உணர்ச்சி தோலுடன் மட்டுமே தொடர்பு கொண்டிருத்தபோதிலும் பறவைக்கு உடல் முழுவதும் ஒருவித கிளர்ச்சியை உண்டாக்கும் வகையில் அமைவது குறிப் பிட்டுச் சொல்லக்கூடிய தொன்ருதும், மற்றும் சில பறவைகள் வெப்பத்தை கிரும்புகின்றன. சூரிய வெப்பத்தின் தன்னுடைய நிரகுகளைப் பரப்பி அவற்றை குடுபடுத்துகின்றன. வெப்பமான இடங்களில் இப்பறவைகள் விழுந்து புரளுகின்றன. இதுபோன்ற பறவைகளுக்கு எறும்புகள் உடலில் ஊறும்பொழுதும் வெப்பம் உடலைத் தாக்கும்பொழுதும் ஒருவித இன்பக்கிளர்ச்சியை அடைவ தாகக் கருதப்படுகின்றன. ரஷ்யாவில் இது குறித்து ஆராய்ச்சி

செய்ததன் பவனாக, பறவைகள் எழும்புகளை தங்கள் உடலில் விட்டுக் கொள்வதனும் அவைகள் புற ஒட்டுண்ணிகளாக மாறி (Ectoparasites) ஒருவித தக்கதிரவத்தை பறவைகளின் உடலினால் செலுத்தப்படுகின்றதென்றும் அதனும் இறகுகள் உதிர்ந்தும் மற்றும் பல பேருகளையும் விலைவாசிகின்றது என்றும் கருதப்படுகின்றது. இருப்பினும் இப் பறவைகள் இதுபோன்ற தாதைச் செயல்களைச் செய்து கொள்ளுதல் இருக்கின்றன.

மற்றும் சில பறவைகள் தங்கள் இறகுகளை அடிக்கடி விரித்து மூடுதல் செய்கின்றன. இவ்வாறு செய்வதால் இறகில் உள்ள வெண் புள்ளிகள் பூச்சிகளைக் கவர ஏதுவாகின்றது. பின்னும் இப்புள்ளிகள் மறைவிவிருக்கும் பூச்சிகளை வெளிப்படச் செய்கின்றது. இறகில் புள்ளிகள் இவ்வாறு பறவைகளும் இறகுகளால் பூச்சிகளைப் பிடிக்கும். ஹைல்மேன் (Hailman), ஸெலாண்டர் (Selander & Hanter) என்ற அறிஞர்கள் 1950 ஆம் ஆண்டு இது பற்றி ஆராய்ச்சி நடத்தி இச்செய்கை எவ்வளவு கால்களும் பறவைகளுக்கு எதிராகிய மிரட்டக் கூடிய ஒரு செயலாகக் கருதினார்கள். திரஷ்ஷஸ் (Thrushes) பறவைகளில் இதுபோன்ற படைகளையே விவரிக்கும் செயல்களைக் காணலாம் என்று அறிஞர்கள் கருதுகின்றார்கள்.

காணசத்தம் என்பது மற்றொரு வகைச் செய்கையாகும். இச்செய்கை திரஷ் பறவைகளிடம் சண்டையிடும் பொழுது காண்பதும் ஒரு செய்கையாகும். மற்றும் கொக்குகளிலும் தாளர்களிலும் இச்செயல் உணவைப் பிடிக்கும் பொழுதும் அனைத்துத் தொடர்ந்து உண்ணும்பொழுதும் நடைபெறுகின்றது. திரஷ் பறவைகள் இசைக் கேட்ப காலசைத்ததும் குறிப்பிடீறச் சொல்லக்கூடிய தொன்றாகும்.

மற்றுமொரு விதத்தையான குறிப்பிட்டச் சொல்லக்கூடிய பறவைச் செயல் தலைமைச் சொரிதல் செயலாகும். இச்செய்கை உடலில் உள்ள பூச்சிகளின் தொல்லைகளும், சில சமயம் உடலில் ஏற்படும் எதிர்ப்பு நடவடிக்கையாகவும் இருக்கலாம். இச்செய்கை பலவிதமாக பறவைகளில் செயல்படுத்தப்படுகின்றது. காலினால் தலைமைச் சொரியும்பொழுது சில பறவைகள் காலினால் இறகுகளின் மேலும் மற்றும் சில காலினால் இறகுகளிலுள்ளனாக வைத்துக்கொள் கின்றன என்று கூறப்படுகின்றது. இந்தச் செயல் சில பறவைகளுக்கு ஆர்வமுட்டும் செயலாகக் கருதப்படுகின்றது.

சமூக வாழ்க்கை (Social organisation)

கூட்டமாக அல்லது மத்தையாக வாழும் பறவைகளில் சமூக வாழ்க்கை அல்லது கூட்டுசேரும் முறையை பொதுவாகக் காணலாம்.

இனப்பெருக்கக் காலத்தின் பிற்பகுதியில் பறவைகள் ஒன்று கூடுதல் இயற்கையாகும். இதை கோடைக்கால கூட்டுச் சேர்க்கை அல்லது கோடைக்கால சமூக வாழ்க்கை என்று அழைக்கலாம். கோடைக் கால இந்த சமூக வாழ்க்கை மிகவும் சிறப்புப் பொருத்திய தொன்றாகும். சிதறி வசிக்கும் பறவைகளின் ஒரு குறிப்பிட்ட இனமோ அல்லது வெவ்வேறு சிதற்பிணத்தைச் சேர்ந்த பறவைகளோ இக்காலத்தில் ஒன்றுசேர்ந்து வசிக்கும். உண்ணும் உணவும் உணவைச் சார்ந்த பழக்கங்களும் இச்சேர்க்கைக்கு முக்கிய காரணமாகும்.

மேலும் ஊனுண்ணும் எதிரிப் பறவைகள்கூட சாதாரணமாக இம்மாதிரி பறவைக் கூட்டத்தை எதிர்க்காது என்பதும் மற்றுமொரு முக்கிய காரணமாகும். இக்கூட்டுச் சேர்க்கை சில சமயம் குளிர் காலத்திலும், அடுத்த இனப்பெருக்க காலங்கள் வரையிலும் நீடிப்பதுண்டு என்று கூறப்படுகின்றது.

இதுபோன்ற கூட்டு வாழ்க்கையில் மிகவும் சக்தி வாய்ந்த பறவையே இன்றியமையாத தொன்றாகக் கருப்பட்டு அதற்கு தலைமைப்பதனி அளிக்கப்படுகின்றது. வாக்து போன்ற பறவை இனத்தில் அதிக எண்ணிக்கையுள்ள குடும்பத்திற்கு முக்கிய எந்தானம் அளிக்கப்படுகின்றது என்று ஹாசன் (Hausan) என்பவர் 1953ஆம் ஆண்டு குறிப்பிட்டுள்ளார். மற்றும் சில பறவை இனங்களுள் ஆண் முக்கியமானதாகவும் வேறு சில கூட்டத்தில் பெண் பறவை முக்கியமானதாகவும் கருதப்படுகின்றது. மற்றும் சில பறவைகள் கூட்டு சேராமலே பலதரப்பட்ட பறவை இனங்களுடன் சமாதானமாக வித்தியாசமேதுமின்றி ஒன்றி வாழும் தன்மைமுடையதாகவும் இருக்கும் என்றும் தெரிய வருகின்றது.

19. பறவைகளின் வருடாந்தர

வாழ்க்கைச் சுழற்சி-பகுதி-I

(Annual cycle-I)

வசந்த காலத்தில் சாதாரணமாக பறவைகள் இனப்பெருக்கத் திறமாக குறிப்பிட்ட இடங்களைச் சென்று அடைகின்றன. முக்கியமாக வலசைப்போகும் பறவைகள் வடக்கு திசையிலிருந்து பகல் பொழுது நீண்டிருக்கும் மீதலெப்பமுள்ள தெற்கு திசையை நோக்கி செல்கின்றன. 'வலசை' போகாத பறவைகள் சில புதுமையான செய்கைகள் மூலம் இனப்பெருக்கக் காலத்தின் ஆரம்பத்தைக் குறிக்கின்றன. உதாரணமாக பகல் காலங்களில் பாட்டிசைத்தல், பறவைகள் வலசை போதலுக்கு அவற்றின் இனப்பெருக்க உறுப்புகளில் ஹார்மோன்களினால் ஏற்படும் மாறுதல்களையாகும் இம் மாறுதல் பறவைகளை அந்தந்த சூழ்நிலைக்கேற்றவாறு தங்களை மாற்றிக் கொண்டு இனப்பெருக்கத்தை முடிக்கவும் வலசை போதல் முறை செய்வதனை செய்யவும் உதவுகின்றது. எனவே வசந்தகாலம் அங்கு மீதலெப்ப சீதோஷ்ண காலம் பறவைகளை இனப்பெருக்கத் திற்கு வசதியான இடங்களுக்கு செல்வதே தூண்டுகிறது. இது வாழ்க்கைச் சூழலின் ஒரு பகுதியாகும். இச் செய்கைக்கு முக்கிய காரணம் நீண்ட பகல் பொழுதால் சுரக்கும் ஹார்மோன்களால் ஏற்படும் மாறுதலையாகும். சீதோஷ்ணதிலையும், கிடைக்கும் உணவின் அளவும், இனப்பெருக்கத்திற்கான தகுந்த இடவசதியையும் பறவைகளின் உடலின் உட்புறத்தின் இயற்கை தன்மையை மாற்றி யமைக்கின்றன.

மீதலெப்ப சீதோஷ்ண காலத்தில் (பிரவரி முதல் ஜூன் வரை) வடக்கு நோக்கி வலசைப்போதல் நிகழ்கிறது. ஒவ்வொரு குறிப்பிட்ட இனமும் குறித்த காலத்தின் குறிப்பிட்ட இடத்தின் வருவதை

நிரீண்டிகை மூடியும், தெற்கில் குளிக் காலத்தில் வசிக்கும் பறவைகள் ஏப்ரலில் வலையாட்போகும் தன்மையுடையவை. இவை தங்கள் வசிக்குமிடத்தின் சீதோஷண நிலைப் பாதிக்க படாதாணவாய் குறித்த காலத்தில் தங்கள் நிரந்தர வசிக்குமிடத்திற்கு திரும்பி வந்து சேருகின்றன. தென்அமெரிக்காவின் குளிக்காலப் பறவைகள் மே மாதத்தில் வலையாட்போய் குறிப்பிட்ட நாளில் ஒவ்வொரு வருடமும் திரும்பும் வழக்கமுடையவை. சில சமயம் வலையாட சென்று முன்னதாக திரும்பும் பறவைகள் வழியில் சென்று இளைப்பாறியும், திசைமாறியும் வருவதுண்டு. ஒரு சில புயல் காற்றில் அகப்பட்டு இறந்தொழிதலும் உண்டு. சில கடலிலைகளில் மிதந்து வருவதைக் காணலாம். இரனில் பிரயாணம் செய்யும் பறவைகள் பசுவில் ஓய்வேடுத்தும் உணவு உட்கொண்டும் செல்கிறது. தனக்கு வேண்டிய கொழுப்புப் பொருளை உடலில் பிரயாணத்திற்காக சேமித்து வைத்துக்கொள்கிறது.

சில பறவைகள் பல மையங்கள் தொடர்ந்து பறக்கும் சக்தியுடையவை. பிறகு சென்று நாட்கள் களைப்பாறியின்றும் பிரயாணத்தைத் தொடரும். மற்றும் சில பிரயாணத்தின் ஆரம்பத்தில் மெதுவாகவும், கடைசிப் பகுதியில் துரிதமாகவும் செல்கக்கூடியவை. வசந்த காலத்தில் எவ்வாறு பறவைகளும் ஒன்றுட ஒரே சமயத்தில் வந்து சேருவதெனில், உதாரணம்: திபூயார்க்கில் வசிக்கும் சிவப்பு சிறகுடைய கருப்பு 'பறவையாகும்' (Red winged black bird at Ithaca New York). இவை பல வகையில் வெவ்வேறு காலங்களில் இனப்பெருக்க இடத்திற்கு வந்து சேருகின்றன. இவ்வினக்கம் வடக்கு திசையிலின்றி வரும் நிலப்பறவைகளுக்கே உரித்தாகும். தெற்கு பகுதியில் வலையாட்போதல் முறை அதிகம் இல்லாததால் பறவைகள் அதிகமாக வெளிப்புற சூழ்நிலையால் பாதிக்கப்படுகின்றன.

எக்ஸோகன்

இனப்பெருக்க காலத்தில் ஒவ்வொரு ஆன் பறவையும் கூடுவட்ட போதுமான அளவு இடத்தை தேர்த்தெடுத்து பாதுகாக்கும். இந்த இடத்திற்கு 'கூடுகட்டுமிடம்' என்றும் அந்த பரப்பளவிற்கு 'எக்ஸோகன்' என்றும் பெயர். இவ்விடத்தை ஆன் பறவை தனியாகவோ அல்லது ஆன் பெண் இரண்டும் சேர்ந்தோ பாதுகாக்கும். இவ்வெய்க்கைகள் இனப்பெருக்கத்திற்காக மட்டுமன்றி, உணவிற்காகவும், பறவைகளால் தேர்த்தெடுக்கப்படுகின்றது. இப்பழக்கம் இ. மு 350 ஆம் காலத்தொட்டே இருந்து வருகிறது என்பதை அரிஸ்டாட்டில் எழுதிய குறிப்பிலிருந்து தெரிய வருகின்றது. இவ்ஹும் பல அறிஞர்கள் இ. பி. 1621 முதல் பறவைகள் கூடுகட்டும் இடங்களைத் தேர்த்தெடுத்து பாதுகாக்கும் வழக்கத்தை

குறிப்பிட்டு வந்திருக்கின்றனர். உதாரணம் : அடுபென் குறிப்பு (1835), ஹாவர்ட் (1930) என்பவர்கள் எக்ஸ்கலீன் மூக்கியத் துவத்தைக் குறிப்பிட்டிருக்கின்றார்கள்.

எங்களைத் தேர்த்தெடுப்பதில் பறவைகளுக்குள் பலவித வேறுபாடுகள் உள்ளன. இனப்பெருக்க எங்கை அவற்றில் முக்கியமானதாகும். இவ்விடத்தில் இனச்சேர்க்கை, கூடமைத்தல், உணவு எடுத்தல் போன்ற முக்கிய வேலைகள் நடைபெறுகின்றன. வயசைப் போகும் பறவைகளில், முதலில் ஆண் பறவை தன் இடத்தை அடைத்து எங்கையை ஏற்படுத்தும். இவ்விடம் மூன்றே தேர்த்தெடுத்த எங்கையாக இருந்தால் அவ்விடத்தை மற்ற பறவைகளிடமிருந்து போரிட்டு கைப்பற்றும். பின்னர் ஆக்ரமிப்பை பறைசாற்றும் வகையில் இன எழுப்பியோ அவ்வுறு மற்ற செவகைகள் மூலமோ அறிவிக்க மாற்படும்.

இசைப்பாடும் பறவைகள் சில குறிப்பிட்ட இடங்களைத் தேர்ந்தெடுத்து அங்கீதத்தினின்றும் பாடி மற்ற பறவைகளுக்கு தெரிப்படுத்தும். இவ்வெகிலை ஆக்ரமிப்பில் அநேகமாக ஒரே இனப் பறவைகளிடம் சண்டை ஏற்படுவது உண்டு. ஆனால் வெவ்வேறு இனத்தவர்களிடம் பறவைகள் அடுத்தடுத்து கூடுகூடி வாய்மையாகக் கலாசனம்.

ஒவ்வொரு இனப்பறையையும் ஒவ்வொரு விதத்தில் இவ்வெலினை களை அமைக்கிறது. ஒவ்வொரு இனத்திலும் எல்லைகள் பரப்பு, சேகரிக்கும் பொருள்கள், உண்ணும் உணவு வகைகள் யாவும் மாறுபடுகின்றன. சில பறவைவினத்திற்கு ஒரு ஏக்கர் வில்தீரணம் போதுமானது. ஆனால் ஊன் உண்ணும் ஒரு கோடி பெலிய பறவைக்கு சில மைல்கள் வில்தீரணம் கொண்ட எல்லைகள் அவசியமாகின்றது. உதாரணம்: கலிபோர்னியாவில் வசிக்கும் கோய்டன் ஸ்கிள் என்ற பறவையினத்தும், பருத்து (Hawk) போன்ற பறவைகள் குறைந்த வில்தீரணமூன்று சிறிய இடத்தில் கூட்டமாக ஒன்று சேர்ந்து வாழ்கின்றன. ஆனால் உணவு தேட பல மைல் வில்தீரணத்தை நாடிச் செல்கின்றன.

ஒவ்வொரு வகை பறையினத்தின் எல்லைப் பல வடிவம் கொண்டதாயிருக்கும். எல் கோழிமுட்டை வடிவமுடையதாகவும், சில நீண்ட விலிநீரணுள்ள நீரோடை, ஆறு போன்ற நீரோட்டத்தையொட்டி அமைந்ததாகவும் இருக்கும். சாதாரணமாக பறையினங்கள் தேர்ந்தெடுக்கப்படும் இடங்கள் பெரும்பான்மையாக இனப்பெருக்கத்திற்காகவேயாகும். வசந்த காலத்தில் எல்லைகள் தேர்ந்தெடுக்கப்படும் அக்காலம் முடிவடைந்ததும் பறையினச் எல்லைகளை விடும் செல்லுகிறது. வலசை போகாத பறையினங்கள், குளிர்

காலங்களில் அவ்வெக்டோக்குள்ளே இளவாசியாகப் பிசிந்து தனித்தனி எக்டோக்கோடுகள் வகுத்து வாழ்ந்து வரும். மறுபடியும் வசத்தகாலம் தொடங்கியதும் மீண்டும் இணைச்சேரும் தன்மைவுடையவை.

மாறுபட்ட எக்டோகள்

சில பறவைகள் இனப்பெருக்கத்திற்கென்று குறைந்த விவதிரண முள்ள எக்டோக்குள் கூட்டமாக சேர்ந்து வசிக்கும். உணவு தேடுவதற்குப் பல மைம்கள் சென்று மறுபடியும் இவ்வெக்டோக்கே திரும்பும்.

உதாரணம் :

கூட்டமாக வாழும் கக், டெர்ன் போன்ற கடற்பறவைகள் (Gull, tern) மற்றும் ஸ்வாலோஸ் (Swallows) முதலியன.



படம் 135. சிறு டெர்ன் பறவைகளில் இனப் பெருக்கக் காலத்தில் நடத்தும் கலியாட்டம்

வாத்து போன்ற பறவைகளில், ஆண் பறவை தனக்கும் தன் சோடிக்கும் தனிமையான இடத்தைத் தேர்த்தெடுக்கும். பெண் வாத்து ஆணிற்கு தெரியாமல் ஒரு இடத்தில் கூட்டை அமைத்து,

அடிக்கடி ஆண் வாதத்தை சந்திக்கும். இங்ஙனமாக இனச் சேர்க்கைக்கு ஒரீடமும், கூடு அமைக்க வேறீடமும் தேர்த்தெடுக்கப் படுகின்றன.

‘கோய்ட் பீன்ச்’ போன்ற பறவைகள் கூடமைக்க எவ்விதமே தேர்த்தெடுப்பதற்குமுன்பே இனச் சேர்க்கையை மேற்கொள்கின்றது. பீன்னர் கூடுகட்டும் இடத்தைத் தேடி செல்கின்றது. இது போன்ற செயலுக்கு மற்றொரு உதாரணம் பிட்டுக்குருவியாகும்.

சில எவ்விதக் பறவைகள் ஒன்று கூடி தங்கள் திறமைகளினை காட்டும் அரங்கமாக அமைகின்றது. இவ்விடங்களில் ஆண்பறவைகள் ஒவ்வொரு பெண் பறவையோடும் இனச் சேர்க்கைக் கொள்கிறது. இனச் சேர்க்கைக்குப் பிறகு பெண் பறவைகள் ஆண்களுக்குத் தெரியாமல் கூடமைத்து முட்டையிட்டு குஞ்சு பொரிக்கின்றன. இத்தகைய எவ்வித ஆண் பறவைகள் குளிர்காலத்தில் ஒன்று கூடும் இடமாகவும் வசத்தான இனச் சேர்க்கைக் கொள்ளும் அரங்கமாகவும் அமைகின்றது. சில எவ்விதக் பறவைகள் பாதகராகப் பட்டாதகராக அமைக்கப்படுகிறது. இவ்விடத்தில் ஆண் பறவைகள் பல பெட்டைகளோடு இனச் சேர்க்கை கொள்ளும் தன்மையுடையவை. ஆனால் இவை எவ்விதமாக காக்கும் தன்மையற்றது.

எவ்விதங்களின் பயன்கள்

1. பறவைகளை ஆண் பெண் வகையாகப் பிரித்து இனச்சேர்க்கைக்கு தகுந்த இடத்தையும் தனிமையையும் ஏற்படுத்தி கொடுக்கின்றது.

2. பறவைகள் இடவசதிக்கேற்றவாறு தேடுகூடி ஏற்படாமல் பரிசீலித்து வாழ உதவுகின்றது.

3. குஞ்சுகளுக்கு உணவு சேகரித்தறிக்க உதவுகின்றது.

4. ஊன் உண்ணும் விரோதிகளிடமிருந்து காக்கின்றது.

முதலாவதாக இனச்சேர்க்கையின்போது பறவைகளுக்கு தனிமை மிகவும் அவசியம். உதாரணமாக வாத்து இனத்தில் ஆணின் எண்ணிக்கை அதிகமிடுப்பதால் இனச் சேர்க்கை காலத்தில் அவை இடைபுற விலைவிக்கும். அமைதியாகக் கூடமைத்து குஞ்சு பொரிக்கவும் எவ்விதக் உதவுகின்றன.

இரண்டாவதாக எவ்வித பிரிவு பறவைகளை ஒரே இடத்தில் தேடுக்கமின்னாமல் பரவலாக சென்று இடத்தின் வசதிக்கேற்ப வாழ

உதவுகின்றது. சில பறவைகள் குறிப்பிட்ட இடத்தில் கூட்டத்தை தளிக்கவேண்டி இனப்பெருக்க இடங்களைத் தேடி செல்கின்றன.

மூன்றுவதாக உணவு சேகரிக்கவும், எம்மை உதவுகின்றது. குஞ்சுகளுக்கு அதிக உணவை ஒரு நாளில் பல முறை சேகரித்தனிக்க அருகாமையில் உணவு கிடைக்குமிடம் தேவைப்படுகிறது. இவ்விடங்கள் மற்ற பறவைகள் கண்டுபிடிக்க முடியாத இடங்களாக அமைகவேண்டும். சில சமயம் ஆண் பறவைகளின் கண்காணிப்பு பொதாமையாலும், குஞ்சுகளைக் கவனிப்பதில் அதிக கவனம் செலுத்துவதாலும் எம்மையைக் காக்க முடியாமல் போவது முண்டு.

நான்காவதாக எம்மைகள், பறவைகளை எதிரிகளிடமிருந்துக் காக்கிறது. அதாவது எதிரிகளிடமிருந்து தங்களைக் காக்க பறவைகள் வேகமாக தப்பி வெளியேற வேறு வழிகளையும், ஒளியும் இடங்களையும் தன்ருக அறிந்து வைத்திருக்கும்.

இனக் சேர்க்கையும் அதன் தந்துவரும்

இனச்சேர்க்கைக்கு முன்பேயுடையாக சில றுதன பழக்க வழக்கங்களைப் பறவைகளிடம் காணலாம், ஆணியம் பெண்ணினத்தைக்.



படம் 135. ஆண் மயில்—இனப் பெருக்கக் காலத்திலும் தன் நீண்ட அழகிய தோகையை விசித்து நடனமாடி பெண் மயிலைக் கவரும் நிலை

கவர பல விதமான செய்கைகளை மேற்கொள்ளும், சில அழகாகவும், சில வேடிக்கையாகவும் இருக்கும். இத்தகைய செயல்கள் சில பறவைகளிடம் இனப்பெருக்கக் காலத்திற்கு சில நாட்களுக்கு முன்பே

ஆரம்பமாகி அக்காலம் முடியும்வரை நீடிக்கும், வாத்து, பெங்குவின், மற்றும் சில கடற்பறவைகளிடம் சூனிக்கால் ஆரம்பத்திலேயே இச்செய்கை ஆரம்பமாகிவிடுகிறது. இச்செய்கை பெருவாரியாக ஆணினத்தில் காணலாம். பெங்குவின் போன்ற பறவைகளிடம் இரு இவத்திடமும் இச்செய்கையைக் காணலாம்.

இச்செய்கைகளில் ஒன்று பாட்டிசைத்தல்: சூயிஸ், வானம்படி போன்ற பறவைகள் இசைப்பாடி இனத்தைக் கவருகின்றன. இரண்டாவதாகப் பாடத் தகுதியற்ற பறவைகள் தங்கள் அழகான வண்ணக்கவலைகளையிவ இறகளைப்பாலும், எல்லைகளில் அமைக்கப் பட்ட அரங்கங்களில் பலவிதமாக ஆடியும் வண்ணக்கலை எடுத்துக் காட்டியும் பெண்ணினத்தை கவரும். உதாரணம்: மயில், கொண்டை மூட்டைய நாரைகள், மரக்கொத்தி, கிரொஸ் போன்ற பறவைகள் பலவிதமான சப்தங்களை உண்டாக்குகின்றது. உள்ளான் (Snipe) போன்ற பறவைகள் ஆகாயத்தில் பறக்கும்பொழுது பலவிதமான செய்கைகளை மேற்கொள்ளுகின்றன. ஒரு சில பறவைகள் சண்டைகளில் வெற்றிப் பெற்று தமது வலிமையைக் காட்டுகின்றன.

நியூகிவி என்ற ஊரில் பாரஸ்டல் என்ற பறவை தலைமேலாக நடனமாடியும், சிறகை அழகாக விரித்து ஆடியும் தனது அழகை



படம் 137. கொண்டையுள்ள கொக்குகள் (Crowned cranes).
(இவப்பெருக்கக் காலத்தில் அழகாக இருபாக் பறவைகளும் சேர்த்து கொண்டு கலியாட்டத்தில் ஈடுபடும் நிலை)

வெளிப்படுத்துகிறது. ஆஸ்திரேலிய பேளவர் (Bower) என்ற பறவை தங்கள் எல்லைகளில் நடனமாடும் அரங்கத்தை, பலவித இலைகள்,


ஞ்சிக்கள் முதலியவைகளைக் கொண்டு மண் போன்று அமைக்கிறதும் நிறமை வாய்ந்தது.

பறவைகள் இளை சேருதல்

எல்லா அமைத்தனரால் ஆண் பெண் என்ற இரு பறவைகளும் இனச் சேர்க்கைக்காக ஒன்றுசேருதல்—என்பது மிகவும் முக்கியமான அம்சமாகும். ஆண் பறவை மற்ற பறவையைப் பவமுறுத்தி அவ் விடத்திலின்றும் வெளிப்பேற்றும். இடம்விட்டு இடமாறி சுற்றிவரும் பெண் பறவையைப் பாட்டிசைத்து நிரும்பி அழைக்கும். சில பறவைகள் தனது இன ஜோடிக்காக சில வருடங்கள்கூட காத்திருப்பதுண்டு. ஜோடிப்பிடுதல் அடிக்கடி ஜோடி மாற்றுவதல் போன்ற செய்கைகள் இனச்சேர்க்கையில் நிகழ்வதுண்டு.

இனத்தைக் கண்டறிதல்

பறவைகளுள் ஆண், பெண் இனங்களுக்குள் வித்தியாசமான மாறுபாடுகள் இருக்கலின் அமைந்துள்ளன. ஒரேவிதமான இருகளை



படம் 138. மணல் கரெளஸ் பறவைகளின் கவியாட்டம் (இவை இனப் பெருக்கக் காலத்தில் விவக்கத்தக்க பவமிகரமான கவியாட்டங்களைப் புரிகின்றன; ஆல்பாளுக் கவியாட்டங்களால் தக்கனது இனப்பெருக்க எல்லைவைக் காப்பதுடன், மற்ற இனப் பறவைகளை அங்கீகரிப்பதற்கு விரட்டி விடுகின்றன)

சுட்டைய பறவைகள் நடைமுறையில் வித்தியாசமான தனிச் சிறப்புகளை அடைந்துள்ளன. ஒரு முறை இனச்சேர்க்கை கொண்ட

ஆண் பறவைக்கு தனது பெட்டைப்புடலிற்ற பறவைகளிலிருந்து பிரித்து அதிலும் சக்தி உண்டு.

இனச்சேர்க்கை

பறவைகள் முதலில் ஆண் பறவையே தேர்த்தெடுத்து கூடு கட்டும் எல்லையை அடைத்து பாதுகாக்கின்றது. பிறகு இசை எழுப்பியும், நடனம் முதலிய செய்கைகளாலும் பெண் பறவையைக் கவர்ந்து பிறகு இனச்சேர்க்கை கொள்ளும். சில பறவைகளில் பெண் பறவையின் அழைப்பு குரலாக இனச் சேர்க்கை ஏற்படுகிறது. இனப் பெருக்கக் காலத்தில், முட்டையிடும் காலத்திற்கு முன்னும் பின்னும் பழுவை இனச் சேர்க்கை ஏற்படுகிறது. உதாரணம்: சிட்டுக்குருவி, வாத்து முதலியன. ஒவ்வொரு பறவையின் இனச்சேர்க்கை காலமும், இடைவெளியும் வித்தியாசப்படும். சில பறவைகளில் ஆண் பறவை யானது அரங்கை தேடிவரும் பல பெட்டைகளுடன் இனச்சேர்க்கை கொள்ளும். பெட்டைகளும் அரங்கில் உள்ள தனது விடுப்பத்திற் றுக்கத் ஆணுடன் இனச்சேர்க்கை கொண்டு தவியாக கூட்டிற்குத் திரும்பும். பறவைகளின் ஆண், பெண் இனச் சேர்தலில் பற வைகயுண்டு.

ஒரு ஆண் ஒரே பெட்டையுடன் வாழ்வது என்பது மானோகமி (ஒரு தாரப்பழக்கம்) (Monogamy) எனப்படும். மானோகமி குறுவிய காலமாகவும் இருக்கலாம். அவ்வது வாழ்க்கை முழுவதும் அமைவதாம். வாழ்க்கை முழுவதும் ஒரே பெட்டையுடன் வாழும் பறவைகள் அன்வப்பட்டு, பருந்துகள், கிளிகள், ஆம்பட்ராஸ் முதலியன.

ஒரு முறைக்கு மேல் ஒரே பெட்டையுடன் இனச் சேர்க்கை கொள்ளும் பறவைகள்—கடற் பறவைகள், பெண்குளின் முதலியன.

ஒரு இனப்பெருக்கக் காலத்திற்கு மட்டுமே இனச் சேரும் பறவைகளுக்கு உதாரணம்: வாத்து, குருவி, காகம் முதலியன.

ஒரு முறை முட்டையிட்டு குஞ்சு பொரிக்க இனச் சேருதல் உதாரணம்: கோழி, நீசப்பறவைகள். அதிகம் பெட்டை யுள்ள இனத்தில் ஒரு முறை முட்டையிடும். காலத்தில் பழுவை இனச் சேருதல் உதாரணம்: எதயல் குருவி, மரங்கொத்தி முதலியன.

ஆண், பெண் இரு பிசீவும் பல பெட்டையுடனும் ஆணுடனும் இனச்சேருதல் பானிகமி எனப்படும். ஆண், இரண்டுக்கு மேற்பட்ட பெட்டையுடன் இனச் சேருதலுக்கு பானிகமி என்று பெயர். உதாரணம்: நீக்கோழி, கோழியினம் முதலியன. பெண், இரண்டுக்கு

மேற்பட்ட ஆணுடன் இணைச் சேரும்பதற்கு யாவியாண்டுகள் என்று பெயர், உதாரணம்; ஆணும் பெண்ணும் குறிப்பிட்ட பெட்டை யுடனோ, ஆணுடனோ இணைச்சேராமல் இனச்சேர்க்கை கொள்வதற்கு மராவில்க்கூடி என்று பெயர்.

உதாரணம் : பாரடைஸ் குயில் முதலியன, இனப்பெருக்க வயதை வடையாத பறவைகள் மற்ற பறவைகளுக்கு குஞ்சுகளைப் பராமரிக்க உதவியாக இருப்பதைக் காணலாம். இணைச் சேர்ந்த பறவைகளில் ஒன்று இறந்துவிட்டால் உடனே வேறு பறவையுடன் இணைச் சேரும் தன்மையும் பறவைகளுக்கு உண்டு.

இசையும் அமைப்பும்

இனப்பெருக்கக் காலத்திற்கு முன்னும் பெட்டைகள் எவ்வளவு வந்தடைவதற்கு முன் எவ்வளவுக் காக்கும் பொழுட்டு ஆண் பறவைகள் இசை எழுப்பி அதைகளும், பின்னர் இவ்விசை பெட்டையை அழைக்கவும் உதவுகிறது. இனச்சேர்க்கை முடிந்தவுடன் அநேகமாக இசையும் அழைப்பும் நின்றுவிடும், அழைக்கும் குரலானது பன்முகப்பட்டது. இணைச்சேரவும், எவ்வளவுக் காக்கும் குரலாகவும், பறவைகள் ஒன்று சேரும் குரலாகவும், எச்சரிக்கை குரலாகவும் இருக்கலாம், உணவு உண்ண குஞ்சுகளை தட்டி எழுப்பும் குரலாகவும் இது அமைகிறது. ஒரு சில பறவைகள் மூன்றுவிதமாக குரலெழுப்பி மூன்று விதமான செய்கையை வெளிப்படுத்தும். அதாவது இனப்பெருக்க காலத்தின் துவக்கத்தில் ஒருவித குரலெழுப்பி எவ்வளவுக் காக்கும், பெட்டைகளைக் கவரவும், இணைச் சேரவும் மற்றொருவகை குரலெழுப்பும், மூன்றாவதாக ஆண் பெண் இரண்டும் ஒன்றுக்கொன்று அறியவும், குஞ்சுகளுக்கு தங்கள் வகுையை அறிவிக்கவும் குரலெழுப்பும், இவ்வாறு இசையும் அழைப்பும் பறவைகளின் உள்வெழுப்பியை அறிவிக்கவும், பலவித செய்கைகளுக்கு உதவியாகவும் அமைகின்றது.

தினசரி எழுப்பும் இசை

காகம், ராபின், ஊதா நே போன்ற பறவைகள் தினசரி குறிப்பிட்ட நேரத்தில் காலை முதல் குரலெழுப்புவதைக் கேட்கலாம். பின்னர் நேரமாக ஆக இசை நின்றுவிடும். மீண்டும் மாலைக் இசை எழுப்புகின்றது. ரென் போன்ற சில பறவைகள் (Wren) நாள் முழுவதும் பாடிக்கொண்டேயிருக்கும். காலை முதல் பாடுவதற்கும், மாலை முதல் பாடுவதற்கும் இசையில் வேற்றுமைக் காணலாம். வானம்பாடி போன்ற பறவைகள் வானத்தில் பறக்கும்போதே பாடிக்கொண்டேயிருக்கும்.

கொண்டே பறக்கும். இவைச் சேர்ந்த பின் பறவைகள் பாடுவதை நிறுத்திவிடுகின்றன.

பருவக்கால இசை

இத்தகைய இசை இனப்பெருக்கக் காலங்களிலும், எக்ஸ்சைஸ் அமைக்கும் காலங்களிலும் எழுப்பப்படுகிறது. ஆனால் பறவைகள் இனப்பெருக்க காலத்திற்கு முன்னறிவிப்பாகவும், எக்ஸ்சைஸ் அமைக்கும் காலத்திலும், இன்ஸ்சேசும் காலத்திலுமே அதிகமாக இசையை எழுப்பும் தன்மைவாய்ந்தது. சில சமயம் எக்ஸ்சைஸ் தாக்கப் பட்டாலேய் அல்லது இவை தவறியிட்டாலேய் மறுபடியும் பறவைகள் அதிக குரலோசையை எழுப்புவது இயற்கை. இதற்கு உடலில் உள்ள வித்து சுரப்பியில் ஏற்படும் மாற்றமும் அதனால் உண்டாகும் உணர்ச்சி வேகமும் தான் காரணம். எல்லா பறவைகளும் கூடுக்கும் நிலையிலேயே இத்தகைய இசையே எழும்பாது. ஆனால் சில பறவைகள் மூன்றும் பின்னும் இனப்பெருக்க காலத்தை அடைவதாகும், அவை நடுநடுவே இசை எழுப்புகிறது. இனப்பெருக்ககாலம் முடிவடைந்ததும் சில பறவைகள் மென்மையாக இசை எழுப்பும். குஞ்சுகளும் அவ்வப்போது இசையை எழுப்புவது உண்டு. இசை எழுப்புவது ஆண் பறவைக்கேயன்றி பெண் பறவைக்கும் உண்டு.

உதாரணம் :

கார்டினல், த்ரஷ் (Cardinal, Thrush) போன்ற பெண் பறவைகள் இசை எழுப்பவல்லன. ஆனால் ஆணினமே அதிகமாக இசைப்பாடுவது வழக்கம்.

பறவைக் குஞ்சுகள் வழிவழியாக பெற்றோரிடமிருந்து இசை பாடும் தன்மையை அடைகிறது. சில சமயம் பெற்றோரிடமிருந்து இசை எழுப்ப பழகிக் கொள்வதுமுண்டு. அவ்வப்போது பாடிப் பழகுவதாக நாளடைவில் நன்றாக குரலிசைக்க குஞ்சுகளுக்கு ஏதுவாகிறது. விட்டில் வளர்க்கப்படும் பறவைகளால் சாதாரணமாகத் தான் பாட முடியும். ஆனால் அவற்றை மறுபடியும் சிடிக்கப்பட்ட இடத்தில் கொண்டு விடப்பட்டால் வசத்தகால இசை எழுப்புவதை கேட்கலாம். இதனின்றும் பறவைகள் பிறப்பிலேயே குரலிசைக்கும் ஆற்றலை அடைகின்றன என்பது புலனாகின்றது.

19. பறவைகளின் வருடாந்தர

வாழ்க்கைச் சுழற்சி-பகுதி-II

(Annual cycle-II)

கூடுகள், முட்டைகள், அடைகாத்தல்,
குஞ்சுபொரித்தல் முதலியன

கூடுகள்

சாதாரணமாக பெண் பறவை, ஆண் பறவையால் தேர்ந்தெடுத்து பாதுகாக்கப்பட்டு வரும் எக்சுக்குள் கூடமைக்கும் இடத்தை தேர்ந்தெடுத்தும், சில சமயங்களில் ஆண் பறவை கூடுகட்டும் இடத்தை தேர்ந்தெடுத்தும், மரப்பொந்துகளில் கூடமைக்கும் பறவையினத்தில் ஆண் பறவை பெட்டைமையத் தான் தேர்ந்தெடுத்த எக்சுக்குள் அமைத்துச் செல்லுகிறது.

கூடுகட்டுமிடங்கள் பல வகைப்படும். தரையில் குழிகளை அமைத்து கூடுகட்டுவதும், செடிகளினிடையேயும், மரங்களிலும், ஆறு, கடல் இவற்றின் கரைகளிலும், குகைகளிலும், நீரின் மேலும், மனிதனால் உண்டாக்கப்பட்ட செயற்கை கூடுகளிலும் பறவைகள் கூடுகளை அமைக்கின்றன.

பறவைகளின் கூடுகள் பழையதாகவும், நிரந்தர வேலைபாடுகளுடனும் அமைக்கப்படுகின்றது. சில பறவைகளுக்கு மிகச் சாதாரண பொருள்களைக் கொண்டு வியக்கத்தக்க முறையில் கூடுகள் அமைக்கும் திறமையுண்டு.

கூடுகட்டும் பறவைகள்

கரைகளில் வாழும் பறவைகள் குறிப்பாக ஏதும் கூடு அமைப்பதில்லை. நிலத்திலேயே எந்த இடத்திலும் முட்டைகளையிடும் வழக்கமுடையன, மீன்களில் வாழும் கடற்பறவைகள் பாறையிடுக்கு

களில் முட்டைகளைவிடும். சரிவான கூடு ஏதும் அமைப்பதில்லை. தேவதை டெர்ன் (Fairy tern) என்னும் பகிழ்ச்சி நிலையில் உள்ள பறவை மரக்கிளை யிருக்கில் தன் ஒரே முட்டையை கூடு ஏதாவிய்றி வைத்து குஞ்சு பொரிக்கின்றது. ஜெகானா (Jacana) என்னும் ஆப்பிரிக்க பறவை விலகி இலைமீதும், நீர்பாசியின் மீதும் முட்டைகளை வைக்கின்றது. எம்பரர் பென்சுவின் (Emperor penguin) என்னும் இனத்தில் ஆண் பறவையானது முட்டையை காவின் ஐயலால் மூடி, அடிவயிற்றில் வைத்து அடைகாக்கின்றது. புங் போன்ற பொருள்களால் அமைக்கப்பட்ட சாதாரண கூடுகளை டெர்ன், கல் போன்ற கடிற்பறவைகள் தரையில் கட்டுவதைக் காணலாம்.

உதாரணம்: வார்ப்பலர், திரஷ் போன்ற பறவைகளாகும், இவை தரையில் புங், குச்சி முதலிய பொருள்களால் கூடுகளை அமைக்கின்றன. வானம்பாடி போன்ற சில பறவைகள் மூடியுடன் கூடிய கூடுகளையும் அமைக்கின்றன. உயரமான மரங்களில் கூடுகளும் பறவைகள் சிறத்த முறையில் கூட்டை ஆழமாகவும், மரக்கிளைகளின் இடையில் ஆடாமதும், பல பொருள்களைக் கொண்டு அமைப்பது வழக்கம். கொக்கு, நாரை போன்ற பறவைகள் கரடுமுரடான குச்சிகளைக் கொண்டு மேடை போன்ற கூட்டை கட்டுகின்றன. சில சமயம் பழைய கூட்டையே மறுமுறையும் உபயோகிக்கும்.

கவன் உண்ணும் பறவைகள் சாதாரணமாக இலைகளாலும் குச்சி, பஞ்சு போன்ற பொருட்களாலும் பெரிய கட்டிடம் அமைத்து வருடா வருடம் அக்கட்டிடம் மேலும் பெரிதாக்கி அதில் முட்டை யிடுகின்றன.

உதாரணம் :

காகம், பருத்து, ஆந்தை முதலியன.

ராவின் (Robin) என்னும் பறவை மண் கூடு அமைக்கும் தன்மையைக் கொண்டுள்ளது. இக்கூடு கடினமாயும், குழியுள்ளதாயும் அமைகின்றது. பெருத்த மழையும் காற்றும் இக்கூட்டை அழிக்க முடியும். பார்ன் ஸ்வாலோ (Barn swallow) பாவத்தையும் பெரிய தட்டிடங்களையும், மண் கூடு அமைக்க தேர்ந்தெடுக்கிறது. இக்கூடுகள் அடிபாகத்தில் கவரோடு ஒட்டவைக்கப்பட்டிருக்கும்.

அமெரிக்கன் தங்க பிபிச்சி, மஞ்சள் வார்ப்பலர் போன்ற பறவைகள் தாவர கழிவு பொருள்களால் மிகவும் ஆழமுள்ளது, எனினில் அழிய முடியாததுமான கூட்டை அமைக்கின்றன.

சில பறவைகள் கைக்கென் என்ற படரும் தாவரத்தின் உதவி யாலும், பூக்களின் இதழ்களாலும், சிலந்தி நூலிழையாலும் கூடு

கட்டுவின்றன. இக்கூடு பச்சை நிறமாவிறப்பதால் எதிரிகளின் பார்வையிலிருந்து காக்கப்படுகிறது. தரைப்பாசியின் உதவி கொண்டும் சில பறவைகள் கூடுகளை அமைக்கின்றன.

உதாரணம் :

பாருவா வார்ப்பர் (Parula warbler).

இறகுகளால் ஆள கூடுகள்

வாத்து, அன்னம் போன்ற பறவைகள் தமது தூய் இறகுகளாலோ அல்லது வேறு பறவைகளின் இறகுகளாலோ கூடுகளை கட்டுவின்றன. பெண் பறவைக்கு இனப்பெருக்க காலத்திற்கென குறிப்பிடத்தக்க தூய் இறகுகள் உடலில் உண்டாவதால் அதை சிவத்தெடுத்து கூடு கட்ட பண்படுத்துகின்றது. இவ்விறகுகள் தன்ளுக முட்டைகளை மூடி பாதுகாக்க உதவுகின்றன.

தொங்கும் கூடுகள்

சில பறவைகள் மரக்கிளைகளின் கொம்புகளிலுள்ள மரப்பட்டைகளின் உதவியால் தொங்கும் கூடுகள் அமைக்கின்றன.

உதாரணம் :

தூக்கனாங்குருவி, ஓரிபோல். இக் கூடுகள் மிகவும் ஆழமுள்ளதாகவும், தடுவில் ஒரு அறைபுடலும் கூட்டின் வாயில் மேற்புறத்திலுமாக அமைக்கப்படுகிறது. சில கூடுகளில் வாய் கீழ் தோக்கிவிடுப்பதால் இடும் முட்டைகள் உருண்டு கீழே விழாமல் காக்க அப் பறவைகள் கதவு போன்ற தடுப்புகளை அமைக்கின்றன.

பொத்துகளில் கட்டும் கூடுகள்

மரக்கொத்தி, மிளி, ஆத்தை போன்றவை மரப் பொத்துகளிலும், கிரௌஸ் போன்ற பறவைகள் தரையில் குழிகளிலும் முட்டைகளைவிட்டுக் குஞ்சு பொரிக்கும் பழக்கமுள்ளவை.

மீன்கொத்தி, கரையிற் வாழும் மீன்கொல்லாள் போன்ற பறவைகள் கரையில் நீண்ட கரங்கள்



படம் 139. ஓரிபோல் பறவையின் கூடு

பாதை போன்ற கூடுகள் அமைக்கும் பழக்கமுள்ளவைகளாகும். கீவி (Kivi) என்னும் பறவை பூமிக்கு அடியில் கரங்க் பாதைபோல் கூடு அமைக்கும். சில பறவைகள் ஏறும்பு புற்குகள் இருக்குமிடமாகப் பார்க்கு பூமியின் அடியில் கரங்கம் போன்ற கூட்டை அமைக்கின்றன.

நீர்மீனையருகில் கட்டும் கூடுகள்

கொக்கு, நாரை, கிரெப், அன்னம் போன்ற நீர்ப்பறவைகள் கரையிலுள்ள புற்குகள், மரங்கள், செடிகளினூடே மேடை போன்ற கூடுகளை அமைக்கின்றன. நீர்த் தாவரங்களைக் கொண்டு கூடுகள் உருவாக்கப்படுகின்றன. சில பறவைகள் வெள்ளக் காலத்தில், கூடுகள் நீரில் மூழ்காமலிருக்க மிதக்கும் கூட்டினை கட்டுகின்றன.

பிளமிங்கோ (Flamingo) என்ற பறவை இறுசிய மண்மேடுகளைக் குடைந்து கூடுகளை அமைக்கின்றன. சாதாரணமாக சரப்பசை



படம் 140. உதயநகரக்குருவி
கூடு அமைக்கும் நிலை

புடைபய நீர்ப்பாசியைக் கொண்டு இப்பறவைகள் கூட்டை அமைக்கின்றது. குகைகளில் கூடுகட்டும் பழக்கமும் சில பறவைகளிடம் உண்டு. ஸ்வீசிப்ட், ஸ்வாலோ (Swift, Swallow) பறவைகள் இருளடர்ந்த குகைகளில் கூடு கட்டி வாழ்கின்றன, புதைபோக்கி ஸ்வீசிப்ட் என்ற பறவை கட்டிடங்களின் புதைப் போக்குகளில் மேடை போன்ற கூட்டை குச்சிகளால் அமைத்து உயிற்றின் உதவிபால் குச்சிகளை ஒன்றோடொன்று ஒட்டி பண்படுத்துகிறது. இக்கூட்டை கட்டிடத் தொழில் அல்லது மரப் போத்திலோ மேற்கூறிய பசையின் உதவிபால் ஒட்டவைக்கும்.

டிப்பர் என்னும் பறவை வேகமான நீரோட்டமூள்ள ஒடைக் கரையின் இருக்குகளில் நீர்ப்பாசியிலான உருண்டை வடிவமான கூட்டை அமைக்கிறது. இக்கூட்டின் உட்பாகம் உலர்த்த புயல்களானது. வெளிப்பாகம் எப்போதும் சரத்தால் பசுமை நிறமுடையதா

விகுக்கும். கருமை அமைகடைய மாக்பி (Magpie) என்ற பறவை சில அடிகள் ஆழமுள்ளதும் பல தடுப்புகளைக் கொண்டதுமான பெரிய கூடுகளை அமைக்கின்றது. இக்கூடு தங்குமிடமாகவும், இனப்பெருக்க கூடாகவும் உதவுகிறது. தையற் பறவைகள் (Tailor birds) பெரிய குடை வடிவமான பல அளதகளைவுடைய கூட்டை அமைக்கின்றன.

ரென்ஸ், கூட்டன், கிரெப்ஸ் (Wrens, Coots, Grebs) போன்ற பறவைகள் பல கூடுகளைக் கட்டி குஞ்சுகளுக்கும், சில சமயம் இரண்டாவது இனப்பெருக்கத்திற்கும் ஏற்றதாக அமைக்கின்றன. ஆண் பறவைகள் இக்கூடுகளை தன் உறங்குமிடமாகவும் உபயோகிக்கின்றன.

கூடு அமைக்கும் பொருள்கள்

கூடுகட்டும் முறையும், பொருள்களும், பறவைக்கு பறவை வேறுபடுகின்றது. பொதுவாக புழுவிற் குச்சிகளும், இறகுகளும்,



படம் 141. நீண்ட வானிலையுடைய ட்ரோங்கோ (Drongo) பறவையின் கூடு

ராபினுக்கு (Robin) மண்ணும், புல் லும், வாத்து இனத்திற்கு சிறப் பாள தூயி இறகுகளும் கூடு அமைக்க அவசியமாகின்றன. சில குருவி வகைகள் கூட்டின் உட்புறத்தை அலங்கரிக்க குதிரை மூடியை தேடித்

திரியும். பாரீஸ் ஸ்வானோ மிகவும் நிரம்பப்பட்டு பறவை குஞ்சுகளின் இறகுகளைக் கூட்டிக்கொடுத்த தேடித் திரியும். ௪ பிடிக்கும் பறவைகள்



படம் 142. ஜேக் டா (Jack daws) பறவையின் குச்சிகள் கள்ளிகள் முதலானவற்றால் ஆன செடிப் புதரிலுள் கட்டப் பட்ட கூடு

(Great crested fly-catcher) போன்றவை கூடு அமைக்க பாம்புத் தோவிலை தேடித் திரியத் தன்மையுடையன. கூடு அமைக்கப் பயன்படும் பொருள்கள் பெருவாரியாகத் தாவரங்களும் மற்ற பிராணிகளின் முடி, இறகுகள், தோல், இன்னும் எலும்பு துண்டுகள் போன்ற பொருள்களும் தான். பாரீஸ் ஆந்தை தோவியும் எலும்பையும் கூடு கட்டும் பொருளாக உபயோகிக்கின்றது. மீன்கொத்திகள் மீன் முட்டிகளையும் செடிகளையும் உபயோகப்படுத்தும்படித் தின்றது.

சில பறவைகள் இயற்கை பொருள் களுக்குப் பதில் மனிதனால் ஏற்படுத்தப் பட்ட செயற்கைப் பொருள்களை உபயோகப்படுத்தவும் திறமையுள்ளனவாகவுள்ளன. சாண்டுவீயர் போன்ற அலை கார விளக்குகள், காலனிகள் போன்ற பொருள்களையும் பறவைகள் கூடு கட்ட உபயோகிக்கின்றன.

கூடுகட்டும் முறை

பறவைகள் கூடுகட்டும் பொருள்களை சேகரிக்கவும், கொண்டு செல்லவும், கட்டவும் தங்களது அலகையும், கால்களையும் பயன்படுத்துகின்றன. உடனடி கழற்றுவதன் மூலம் கூட்டில் தன் உடலமைப்பிற்கேற்ப வட்டவடிவமான குழியை உண்டாக்கிக் கொள்கிறது. மரங்களின் போத்துகளில் கூடுகட்டும் பறவைகள் தனது அலகால் கொத்தி மரத்தைக் குடைகின்றது. மீன்கொத்திகள் ஆற்றின் கரைகளில் அவகாஸும், காலாஸும், கரங்கத்தை அமைக்கின்றன. தொங்கும் கூடுகளை அமைக்க அவதூறு என்னும் மிகவும் பயன்படுகின்றன. தைபர் பறவைகள் ஒரு இலையின் ஒரு பக்கத்திற்கு பதினாறு ஒட்டைகள் வீதம் போட்டு தாவர நூலாலேயே கூடாகதைக்குத் திறன் படைத்தனவ. பறவைகள் கூடுகளை அமைக்க எடுக்கும் நேரம் இனத்திற்கு இனம் வேறுபடும். கூடுகட்டும் காலம் பறவைகளின் வேலைத் திறனைப் பொறுத்தது. சாதாரணமாக குருவி

வைகைகள் கூடுகட்ட 3 முதல் 13 நாட்கள் எடுக்கின்றன. ராபின் 6 முதல் 20 நாட்கள் எடுக்கும். மழைக்காலங்களில் இன்னும் அதிக நாட்களாகும். ஆணும், பெண்ணும் சேர்ந்து ஒரே தாளில் கூடு அமைப்பதும் உண்டு.

வடக்கு திசையிலுள்ள பறவைகள் தெற்கு திசையிலுள்ளதை விட விரைவாக கூடு அமைக்கின்றன. ஆர்க்டிக் பகுதியில் பறவைகள் பழைய கூட்டையே மறுபடியும் உபயோகப்படுத்திக் கொள்கிறது. உயிழ்நீரைக் கொண்டு கூடுகட்டும் பறவைகளுக்கு, உயிழ்நீர் சுரத்தல் அவ்வப்பொழுது தடைபடுவதால் கூடுகட்டுவது தாமதப்படுகின்றது. சுத்திதலை நீர்ப்பறவைகள் கமாரி தாண்டி மாதத்தில் களிமண்ணைக் கொண்டு சூக்கிகள், புடி போன்ற பொருள்களின் உதவியால் கூடு அமைக்கின்றது.

பறவைகள் கூட்டை உடனடியாகக் கட்டி முடிப்பதில்லை. காணியில் சில மணி நேரம் கூடுகட்டும் வேலையில் ஈடுபடுகின்றது. பிறகு சிறிது நேரம் வானாவிக்கும், இடைப்பெருக்கக் காலத்திற்கு முன்பே கூடுகட்ட ஆரம்பிக்கும் பறவைகள் சிறிது தாமதமாகவே கட்டி முடிக்கின்றது. தாமதமாக கட்ட ஆரம்பிக்கும் கூடுகள் சிக்கிரமாக முடித்துவிடுவதுண்டு. சில சமயம் பருவக் காலங்களில் கூடுகட்டுதலை தாமதப்படுத்துவதும் உண்டு. கூடுகட்டும்போதே சில பறவைகள் முட்டையிட்டு அடைக்காப்பதும் உண்டு.

உதாரணம் :

நாரை, பருந்து, புழு போன்றவை.

பறவையினத்தில் சில கூட்டை கட்டிக் கொண்டிருக்கும்போதே வேறு கூட்டை நோக்கி போவதுண்டு. சில சமயம் பெட்டைபாணது கூட்டையும், தவினையையும் கூட விட்டுப் பிடித்து போவதுமுண்டு. எனவே கூடு அமைப்பதானது பிறப்பிலேயே அமைந்த, ஒரு பண் பென்று கூறலாம்.

கூடுகட்டுவதில் ஆண் பறவைவையிட பெண் பறவை அதிக ஆர்வத்தைக் காட்டுகிறது எனலாம். பொதுவாக இடத்தைத் தேர்ந்தெடுப்பதிலிருந்து கட்டுவது வரை பெண் பறவை செய்கிறது. ஆண் பறவை கூடுகட்டும் பொருள்களைச் சேகரித்துக் கொண்டு வருவதில் உதவி செய்கிறது. சில சமயம் இரண்டாமே சேர்ந்து, பொருளைச் சேகரித்து கூட்டை அமைக்கின்றன. வீட்டு ரென் (House wren). போன்ற பறவைகள் இவை தேடுவதற்கு முன்பே கூட்டை அமைக்கின்றன. பின்னர் துணியோடு சேர்ந்து கூட்டை

முடிக்கின்றன. திக்கோழி, சீனி, டிரூமல் போன்ற பறவைகளில் ஆணினம் கூடுகட்டும் வேலையை மேற்கொள்கிறது. வார்த்து போன்ற பறவையினத்தில் ஆணினத்திற்கே கூடு சம்பந்தப்பட்ட வேலை இடையாது. மரத்தைக் குடைதல், கரைகளில் சுரங்க கூடுகள் அமைத்தல் போன்ற வேலைகளில் ஆண், பெண் இரண்டும் சேர்ந்து பிடித்து அவ்வேலையைச் செய்கின்றன.

உதாரணம் :

மரங்கொத்தி, மீன் கொத்தி.

பொது சிறப்பியல்புகள்

பறவையினத்தில் மூட்டைகள் பல்வேறு வகையானவை. வேறு பட்ட அளவு, வடிவம், நிறம் கொண்டவை. சிறிய பறவைகளான பாரும் பறவைகள் (Humming birds) மிகச்சிறிய மூட்டைகளையினும். திக்கோழி போன்ற பெரிய பறவைகள் பெரிய மூட்டைகளை இடுகின்றன. அதிக அளவும், நிறையும் உள்ள மூட்டைகள், நிறைந்த சக்தியுள்ள உண்டைப் பொருளை கொண்டதாயிருக்கும். சில சமயம் சிறிய பறவைகள் பெரிய மூட்டைகளை வீடுதலும், பெரிய பறவைகள் சிறிய மூட்டைகளிடுதலும் உண்டு.

மூட்டைகள், உருண்டையாகவும், நீள் உருளை வடிவமாகவும், இரண்டு முனைகளும் நீண்டும், பலவாறாக உள்ளதைக் காணலாம். கிரேட் ஹார்ன் ஆத்தைவின் மூட்டைகள் உருண்டை வடிவமுள்ளதாக இருக்கின்றது. வேகமாக பறக்கும் பறவைகள் நீண்ட வடிவ முடைய மூட்டைகளையிடுகின்றன. மூட்டையின் அகல திணத்திற்கும், பறவையின் பறக்கும் வேகத்திற்கும் தொடர்பு உண்டு என்பதையும், அண்ட நாளத்தின் அகலத்திற்கேற்றவாறு, மூட்டையின் வடிவம் அமைகின்றது என்பது குறிப்பிடத்தக்கது. கூட்டில் அமைப்பிற்குத் தகுந்தார் போன்றும் பறவையின் மூட்டையின் வடிவங்கள் அமைகின்றன எனலாம். மலையிடுக்குகளில் இடப்படும் மூட்டைகள் கூர்மையான முனைகளையுடையன. இவ்வடிவம் மலைகளினின்றும் மூட்டைகளை உருண்டுகிழாமல் தடுக்கிறது.

மூட்டைகளின் நிறம்

மூட்டைகள் அநேகமாக வெண்மையாகவும், புள்ளிகளுடையதாகவும் காணப்படும். மஞ்சள், கிசப்பு போன்ற ஆழ்ந்த நிறமுடைய மூட்டைகள் காணப்படா. நிறந்த கூடுகளில் இடப்படும் மூட்டைகள் சாதாரணமாக புள்ளிகளுடையதாகவும் சாம்பல் அல்லது வெளிச் தீவநிறமாகவும், வெளிச் பச்சையாகவும் இருக்கும். வெண்மை

நிறமூடைய மூட்டைகள் நெருக்கமான புள்ளிகளுடையதாக இருப்பதால் குறிகள் எதுவும் சரியாக காணப்படாது. மூட்டைகளில் காணப்படும் குறிகள் அண்ட நாளத்திலே மூட்டைகள் சுழன்று எழும்போது உண்டாகிறது. புள்ளிகள் மூட்டைகள் அசைவாமல் இருக்கும்போது ஏற்படுபவை.

தரஸ் பறவையினுடைய மூட்டைகள் நீலநிறமூடையதாக இருக்கும். கூட் (Coat) பறவைகளுடைய மூட்டைகள் பச்சைநிற மூடையதாக காணப்படும். ஜப்பானில், சில்விட் (Sylvia) என்ற வார்ப்புள் சிகப்பு மூட்டையிடும். தென் அமெரிக்காவில் உள்ள டிஜுமல் பவ நிறமூடைய மூட்டைகளை இடுகின்றது. மூட்டையின் நிறம் வளர்ச்சியின்போது மாறும் தன்மையுடையது.

உதாரணம் :

சீவா என்ற பறவையின் மூட்டை இரும்பொழுது பச்சை நிறமாக இருக்கும்; பின்னர் மஞ்சள் நிறமாக மாறும். பிறகு நீலமாகவும் கடைசியாக வெண்மைவாகவும் மாறும். ஈழ என்னும் ஆந்திரேசிய பறவை பச்சைநிற மூட்டையிடும். பின்னர் இம் மூட்டைகள் கறுப்பு நிறத்தையடைகின்றன.

சில மூட்டைகள் முதலில் மெல்லிய தோலுடையதாகவும், பின்னர் கண்டுருவிப்பார்க்கும் அளவு கண்ணாடி போன்ற தோலாக மாறி கடைசியாக வலிமையுள்ள கண்ணாடி நிறமூடைய ஓடாக மாறுகின்றது. டிஜுமல் என்னும் பறவையின் மூட்டைகள் மென்மைவாக பீங்கான் போன்று பளபளப்புள்ளதாகவும், கோள், தீக்கோழி போன்ற பறவைகளின் மூட்டைகள் புள்ளிகளும், கோடுகளும் உடையதாகவும், வாக்ஹோன்ற தீர்ப்பறவைகளின் மூட்டைகள் வழுவுறும்பும், தீர் புகாததுமான தோலையுடையதுமாகவும் காணப்படுகின்றன.

மூட்டைகளின் எண்ணிக்கை

பறவைகள் ஒன்று முதல் இருபது மூட்டைகள்வரை கிடும் தன்மையுடையன. பெங்குவின், ஆப்பிரான், மலியில் வாரும் ஆக்ஸிடீஸ் போன்ற பறவைகள் ஒரே ஒரு மூட்டையிடும். கழுநூன், புழு, ஆத்தை போன்ற பறவைகள் யாவும் இரண்டு மூட்டைகள் இரும் தன்மையன. இயற்றில் இரண்டும் சில சமயம் பொரிக்கப்படும். பூபிள், ஸ்கவால் போன்ற பறவைகள் இரண்டில் ஒன்றைத்தான் பொரிக்கும். இரண்டும் பொரிக்கப்பட்டால் ஒரு குஞ்சை தாவிப்பறவை தின்றுவிடும். பாணரைன் பறவைகள், கடற் பறவைகள் முதலியன மூன்றிலிருந்து ஐந்து மூட்டைகள் வரை

பொரிக்கும், இவை அநேகமாக நான்கு முட்டைகள் தான் இடுவது வழக்கம். மரங்கொத்து போன்ற பறவைகள் ஆறு முதல் பத்து முட்டைகள் வரை இடும். வாக்ஷு அதிக முட்டைகளையும், காட்டு வாக்ஷு பதினைந்து நாட்களில் இருபது முட்டைகள் வரையிடும்.

முட்டைகளின் எண்ணிக்கை அதன் அழிவைப் பொருத்தே அமைகின்றது. குறைவான முட்டையிடும் பறவைகள் தங்கள் முட்டையை தனியான, மிகவும் பாதுகாப்பான இடங்களில் இட்டு பொரிக்கப்படுகிறது. இவ்வாறு எதிரிகளிடமிருந்து காப்பாற்றப் படுவதால் வெகுகாலம் உயிர்வாழ ஏதுவாகிறது. ஆனால் கோழி களும், வாக்ஷுகளும் மனிதனால் வேட்டையாடப்படுவதற்கு முன் சேய்வே பன ஆபத்துகளை கடக்கவேண்டி யிருக்கிறது. கிரேட்டோர்ஸ் ஆக்ஸை வகுத்திற்கு இரண்டு முட்டைகளே யிருக்கின்றன. ஆனால் பார்ஸ் ஆக்ஸை ஆறு அல்லது அதற்கும் அதிகமாக வகுத்திற்கு இருமுறை முட்டையிடுகின்றது. வெவ்வேறு திசையில் வாழும் ஒரே இனப் பறவைகள் ஒரு திசையிலுள்ளதைவிட குறைவான முட்டை களையிடுகிறது. கடற்பறவைகள், புழுக்கள் போன்ற பறவைகள் எந்த இடத்திலிருந்தாலும் ஒரேவிதமாக முட்டையிடும் தன்மை வுடையன. அவை கமார் இரண்டு அல்லது மூன்று முட்டைகள் இடும் என்பது மீத சிதோஷ்ண நிலையில் சாதாரணமாகக் காணலாம். ஆனால் வடக்கு திசையில் இவ்வெண்ணிக்கை அதிகமாகும். எனவே முட்டையின் எண்ணிக்கைக்கும் நாட்களின் நீளத்திற்கும் தொடர்பு அதிகமுண்டு. மேலும் கிடைக்கும் உணவின் அளவைக் கொண்டும், முட்டையின் எண்ணிக்கை நிர்ணயமாகின்றது. லேக் (Lack) என்பவர் முட்டையின் எண்ணிக்கை பிறப்பின் வழியாகவும், கிடைக்கும் உணவின் அளவிற்கேற்றவாரும் அமைகின்றது என்று கருதினார். வேக்னர் (Wagner) என்பவர் முட்டையின் எண்ணிக்கை பிறப்பின் வழியாக ஏற்பட்டிருந்தாலும் கிடைக்கும் உணவிற்கேற்றவாரும், உடலில் சேமிக்கப்பட்டிருக்கும் உணவிற்கேற்றவாரும் எண்ணிக் கையில் அமைகின்றது என்று கருதினார். வடப்பகுதியில் வசிக்கும் பறவைகளின் உடலில் ஏராளமான கொழுப்புச் சத்து சேர்த்து வைக்கப்பட்டிருக்கும். ஆனால் தெற்கு பகுதியில் வசிக்கும் பறவை களின் உடலில் கொழுப்பு சத்தோ, சேகரித்த உணவோ இருக்க வாயில்லை.

முட்டையிடும் தன்மை : தாவியத்தை உணவாக உண்ணும் பறவைகளும், தாவியம் உண்ணாத பறவைகளும் ஒரு நாளைக்கு ஒரு முட்டை வீதம் தனது இனத்தின் எண்ணிக்கைக்கேற்றவாறு இடுகின்றன. சாதாரணமாக கார்டு வேலையில் தான் எல்லா பறவை களும் முட்டையிடுவது வழக்கம். ஆனால் குயில் போன்றவை, மறி

பறவைகளின் உட்புல் மூட்டையிடும் வழக்கமுடையன. ஆதலால் அக்கூட்டின் பறவை வெளியேறும் வரைக் காத்திருந்து பின்னர் மூட்டையிடும்.

பெரிய பறவைகள் தினமும் மூட்டையிடுவதில்லை. வாக்ஸு நான் தோறும் மூட்டையிடும் தன்மைவுடையது. ஆனால் பகுத்து, ஆத்தை போன்றவை ஒருநாள் விட்டு அடுத்தநாள் மூட்டையிடும் வழக்கமுடையது. பறவைகள் தேவையான அளவிற்கு மூட்டையிடும் சக்திவுடையது. ஒரு சமயத்தில் நான்கு மூட்டைகளிடும் வழக்கமுள்ள பறவை, அந் நாள்கொடு நிறுத்திக்கொள்ளும் சக்தியையும் பெற்றிருக்கின்றது. மேலும் அண்டநாளத்தில் உண்டாகும் மூட்டைகள் அவிடத்திலேயே அழிக்கப்பட்டு விடுவதுமுண்டு. குறிப்பிட்ட அளவு இட்ட மூட்டைகள் களவு போனாலோ, அழிக்கப்பட்டாலோ விற்று கால இடைவெளிக்குப் பின் மேலும் மூட்டையிடும் சக்தி பெற்றுள்ளன.

ஆனால் ஹரிக் கல் (Herring gull) போன்ற ஒரு சில பறவைகள் மூன்றிற்கு குறைவாகவோ அல்லது அதிகமாகவோ மூட்டையிடாது. இத்தகைய தன்மைக்கு தீர்மானிக்கப்பட்ட அடுக்கு (Determinate layer) என்று பெயர். மற்ற வகைக்கு தீர்மானிக்கப்படா அடுக்கு (Indeterminate layer) என்று பெயர்.

அடை காத்தல் : பறவைகள் ஒருமுறை மூட்டையிடும் எண் ணிக்கை பூர்த்தியானதும் அம்மூட்டைகளை அடைகாக்க துவங்குகிறது. அதிகமாக பெண் பறவைகள் அடைகாப்பது வழக்கம். பெண் பறவையின் உடலின் அடிப்பாகத்தில் இறகுகளிலானது ஒரு பகுதிக்கு அடைகாக்கும் பாகம் என்று பெயர். இவ்விடத்தில் இரத்த குழாய்கள் அதிகமாக பரவி இருப்பதால் மூட்டைகளைப் பொரிக்கும் அளவிற்கு உஷ்ணம் தருகிறது. மூட்டைகளின் மேல் இப்பாகத்தை வைத்து உட்காரும் பறவை தனது அடிவயிற்றுப் பகுதி இறகுகளை உதிர்த்து மூட்டைகளை மூடி பாதுகாப்பதுடன் அக்ஷணம், உஷ்ணத் தையும் வெளியேறாமல் தடுக்கிறது. அடை காக்கும் பெண் பறவைகளின் அடிவயிற்றுத் தோலின் உஷ்ணம் ஆண் பறவையின் அப்பகுதி உஷ்ணத்தைவிட அதிகமிருக்கும்.

பறவைகளின் அடிவயிற்றில் தோன்றும் அடைகாக்கும் பகுதி தூவி இறகுகளின் மாறுபாட்டாலும், அதிகமாக இரத்தக் குழாய்கள் பரவுதலாலும் ஏற்படும் மாறுதலேயாகும். இம்மாறுதலுக்கு முக்கியமாக என்ட்ரோடியல், பிரோலாக்டின் (Estradiol and Prolactin) என்னும் ஹார்மோன்கள் தான் காரணமாகும். சில பறவைகளில் இப்பகுதி சாதாரணமாக பெட்டையின் அடிவயிற்றில் தோன்றும்.

சில சமயம் ஆண், பெண் இரண்டினமே அடைகாக்கும் தூண்டுதல்கள் ஏற்படும். சில பறவைகளிடம் அடைகாக்கும் பகுதியானது அடிவயிற்றினும், பக்கங்களினும் தோன்றி இரண்டும் ஒன்றாக கவந்து விடுவதுமுண்டு. தானியம் திண்ணும் பறவைகளில் ஆணினத்திற்கு பெரும்பாலும் இப்பகுதி ஏற்படுவதுண்டு.

பறவைகள் சிறிது நேரம் விட்டுவிட்டு மூட்டைகளை அடைகாப்பதால் மூட்டைகளுக்கு மாறி மாறி உண்ண நிலை ஏற்படுகிறது. சில பறவைகள் அனலில் நீரைக் கொண்டு வந்து அய்யப்போது மூட்டைகளில் உண்ணத்தைத் தணிப்பதும் உண்டு. சில பறவைகள் இறகுகளை நீரில் நனைத்து வந்து மூட்டைகளின் மேல் உதிர்ப்பதுண்டு. நிரத்த கடுகளிவிடப்படும் மூட்டைகளைப் பறவைகள் வெளியினின்றும் மறைத்து நிழல் கொடுக்கிறது. ஒருசில பறவைகள் மூட்டைகளை அடிக்கடி திருப்பி விடுவதுமுண்டு.

மூட்டையின் உஷ்ண நிலை சாதாரணமாக 90—94°F வரை இருக்குமென்று கண்டுபிடிக்கப்பட்டிருக்கிறது. கூட்டின் நடுவில் மூட்டைகளின் வெப்பம் அதிகமாகவும், ஓரப் பகுதிகளில் குறைவாகவும் இருக்கும். கருவளர்ச்சி 82°F நிலையில் நின்றுவிடும். ஆனால் காற்றின் வெப்பம் சிறிது நேரத்திற்கு அதிகம் குறைந்தாலும் கூடு அழிவதில்லை. பெரிய மூட்டைகள் நிரத்த வெளிகளில் அதிக நேரம் இருந்தாலும் பழுது படுவது இல்லை.

காலை, மாலை நேரங்களிலும் காற்று, மழைக் காலங்களிலும் பறவைகள் கூட்டைவிட்டு அசையாமல் இருக்கும். நடுப்பகல் நேரங்களில் தான் கூட்டையும், மூட்டைகளையும் விட்டு விவாகச் செல்லும். மறுபடியும் குறித்த நேர இடைவெளிக்குப் பின் திரும்பி வந்து அடைக்காக்கும்.

நீண்ட நேரம் அடைகாத்தலை தானியம் திண்ணும் பறவைகளிடம் காணலாம். அதுவும் ஆண் பறவையானது பெண்ணிற்கு உணவைச் சேகரித்து வந்து கூட்டிலேயே ஊட்டுகிறது.

உதாரணம் : ஹார்ன்ஹில் (Horn hill) என்ற பறவையிடம் இத்தகைய பழக்கத்தைக் காணலாம்.

ஒரு நாளைக்கு மூன்று அல்லது நான்கு முறை ஆண் பறவை பெட்டைக்கு உணவு கொடுக்கிறது. பெண் பறவையை கூட்டினுள் போய் வைத்து அனகு மாத்திரம் வெளியே தெரியும் அளவிற்கு இடைவெளி ஏற்படுத்துகிறது. உணவிற்காகவே இவ்விடைவெளி பயன்படுகிறது. பெரிய பறவைகள் சாதாரணமாக அதிகநேரம் அடைகாக்கும் தன்மைவுடையவை. சில சமயம் ஆணும் பெண்ணும் குறிப்பிட்ட நேரம் மாறி மாறி அடைகாக்கும் செயலில் செயலும்.

உதாரணம் : கடற்பறவை.

ஆண், பெண் இரண்டும் அடைக்காத்தாலும் பெண் பறவைக்கு தான் அதிகம் அடைக்காத்தல் என்னும் தொழில் உரித்தாகிறது. ஆனால் ஆண் அடிக்கடி முட்டைகளின் உஷ்ணத்தைக் குறைக்கும். மேலும் இனப்பெருக்க எல்லையை காத்தல் ஆண் பறவைகளின் முக்கிய வேலையாகும். அதோடு குஞ்சு பொரித்தவுடன் குஞ்சுகளுக்கு உணவு சேகரிக்கவும், பாதுகாக்கவும் செய்கின்றது. வாத்து, அன்னம் போன்ற பறவைகளில் ஆண் பறவையானது கூட்டின் அருகிலேயே நின்றுவாறு பாதுகாக்கிறது. சில சமயம் பெண் பறவைக்கு சிறிது ஒய்வு கொடுத்து தானே அடைக்காக்கும் தொழிலை செய்கிறது. மீன் கொத்தி பறவைகள் இப்பேலையை நேரத்திற்கு நேரம் ஆணும் பெண்ணும் மாற்றிக் கொள்கின்றன. சில பறவைகள் பல செய்கைகளின் மூலம் தனது துணையை அழைத்து வேலையை மாற்றிக் செய்கின்றன. அடெலி பெங்குவின் (Adelie penguin) பறவையானது தனது கூட்டிலும் இடத்திலிருந்து உணவு தேடுமிடம் மிகத் தூரத்தில் (அதாவது 500 மைல்) இருப்பதால் தனது ஆண் துணையிடம் அடைக்காத்தல் தொழிலை ஒப்படைத்துவிட்டு இரண்டு அல்லது நான்கு வாரங்களாகச் சென்று திரும்பும். அதுவரை ஆண் பறவை உணவுகூட உண்ணாமல் காவல் காத்து வரும். ராபல் ஆல்ப்ரான் என்றும் பறவையும் பறிகுங்கு அல்லது இன்னும் அதிக நாட்கள் வரை உணவு ஏதுமின்றி முட்டைகளை காத்துவரும்.

நிக்கோழி, சியா, ஸுர போன்ற பறவைகள் அடைக்காக்கும் தொழிலை ஆணிடம் ஒப்படைத்து விடும். சில கடற்பறவைகளில் (உதாரணமாக புள்ளியுடைய சாண்டைப்பப்பி) பெண் பறவை முட்டைவிட்டதும் கவனிப்பீன்றி மற்ற வேலைகளை ஆணிடம் ஒப்படைத்து விட்டு சென்றுவிடும். ஆண் பறவைகள் அடைக்காத்த வின்போது பெண் பறவையை பாதுகாத்தும் உணவு அளித்தும் பராமரிக்கின்றன. குஞ்சு பொரித்ததும், குஞ்சுகளுக்கும் பெண் பறவைக்குமாய் சேர்த்து உணவு தேடி வருவது வழக்கம். இவ்வாறு செய்வதால் கடைசியில் ஆண் பறவையானது இளைத்து சக்தியிழந்து போய்விடுகிறது. குஞ்சுகளும் பெண் பறவையும் பொலிவுடனும் ஆரோக்கியத்துடனும் கூட்டினின்றும் வெளிவருகின்றன.

உதாரணம் : ஹார்ன்டிக்.

அடைக்காக்கும் காலம்

இக்காலம் இனத்திற்கு இனம், பறவைக்கு பறவை வித்தியாசப் படும். 10 நாட்களிலிருந்து 80 நாட்கள்வரை அடைக்காத்தல் நீடிப்பதுண்டு. அடைக்காத்தவின்போது அதிகநேரம் இடைவெளியெடுப்பது

அமைதியின்மை, காற்று மழை போன்ற பருவ கோளாறு முதலிய காரணங்களால் அடைக்காத்தல் காலம் தாமதப்படுவதுண்டு.

அடைக்காக்கும் காலம் முட்டையில் அளவைப் பொருத்தும், வெளியும் குஞ்சின் வளர்ச்சியைப் பொருத்தும் அமைகின்றது. அளவு பெரியதாயுள்ள முட்டைகள் குஞ்சு பொரிக்க அதிக நாட்களும், சிறியதாயுள்ளவை குறைந்த நாட்களும் எடுத்துக்கொள்கின்றன. அதிக நாட்கள் கழித்து வெளியாகும் குஞ்சுகள் நன்றாக நகர்ந்து செல்வக்கூடியவையாய் இருக்கும். மற்ற கூடுகளில் முட்டைகளை வைக்கும் பறவைகளின் குஞ்சுகள் குறைந்த நாட்களில் வெளியாகும். அதாவது எந்தப் பறவையின் கூட்டில் முட்டைகளை வைக்கின்றதோ அந்த பறவையின் அடைக்காக்கும் காலத்திற்கேற்றபடி இம்முட்டைகளின் காலம் அமைகிறது. பொதுவாக குளிர்ப் பறவைகளில் முட்டைகள் குஞ்சு பொரிக்க அதிக நாட்களும், கோடை காலத்தில் குறைந்த நாட்களும் ஆகின்றன. பாசனரன் அல்லா பறவைகளில் அடைக்காக்கும் காலம் சாதாரணமாக அதிகமாகும்.

உதாரணம்: பெஞ்சுவின், ஆம்பெட்ராஸ், பெட்ரால், சீசி, நீர்க்கோழி, ஈழ.

சில பகுதிகளில் பறவைகள் குறிப்பிட்ட எண்ணிக்கையளவு முட்டைகளைவிடும் வரை முதலிலிட்ட முட்டைகளை சரிவர அடைக்காப்பது இடையாது.

ஒரு சில பறவைகள் அடைக்காத்தலில்லாமல் முட்டைகளை நேராக குளிய உஷ்ணம் இடைக்கும்படி செய்கின்றன. சில பறவைகள் பழைய, மட்டிய தாவரங்களைக் கொண்டு முட்டைகளை மூடி அவ்வுஷ்ணத்தை குஞ்சு பொரிக்கப் பயன்படுத்துகின்றன. ஆன் பறவைகள் அப்பொருள்களை அடிக்கடி திறந்து முடுவதால் உஷ்ணத்தை ஓரளவு அளவாக நீயி நிறுத்த முடிகிறது. எனவே மெகாபோடல் என்ற இப்பறவைகளுக்கு உஷ்ணமான பறவைகள் என்று பெயர்.

அடைக்காக்கும் காலத்தில் முட்டைகள் வெப்பத்தால் வற்றிப் போவதால் 10-விரித்து 20 சதவீதம் எடைமீது குறைகிறது. அடிக்கடி முட்டைகளை குளிர்ப்பதன் மூலம் அதன் எடை குறைதல் தடுக்க ஏதுவாகிறது.

குஞ்சு பொரித்தல்

குறிப்பிட்ட காலம் அடைக்காத்தல் முடிந்ததும் ஒரு நன்றாக வளர்ந்து உயிருள்ள குஞ்சாக வெளியாகிறது. குஞ்சு பொரிப்பதற்கு முன் முட்டையில் குஞ்சு வெளியாகும் அறிகுறி உண்டாகிறது.

பின்னர் குஞ்சு உள்ளிருந்து முட்டையை உடைத்துக்கொண்டு வெகு நிரமத்துடன் வெளிவருகிறது. குஞ்சுகளின் அனஞ்சலின் மேல் பாகத்தில் முட்டைப் பல் என்னும் கூர்மையான பல் ஒன்று தோன்றி முட்டையை உடைத்து வெளிவர உதவுகிறது. குஞ்சு வெளிவந்ததும் அப்பல் மறைத்து விடுகிறது. சில சமயங்களில் முட்டைகளில் ஏற்படும் அறிகுறி ஒரே நூட்கள் வரை தொடரும். பின்னர் குஞ்சு ஒரே நூட்கள்வரை வெளிவர நிரம்பப்பட்டு மெதுவாக குரல் கொடுத்துக் கொண்டிருக்கும். அச்சமயம் குஞ்சு முட்டையில் உள்ள ஊவுவை உட்கொண்டு உயிர் வாழ்கிறது. முட்டையின் மேல்விய பகுதியில் விரிசல் உண்டாகி அவ்விரிசல் முட்டையைச் சுற்றி ஏற்படுகிறது. குஞ்சு பின்னர் ஒட்டை தள்ளிக்கொண்டு வெளி வருகிறது. பெற்றோர் பறவைகள் குஞ்சுகள் முட்டையிலின்றும் வெளிவருவதை பார்த்துக் கொண்டிருக்கும். சில சமயம் ஒட்டை உருட்டி அசைத்து குஞ்சு வெளிவர உதவி செய்வதுமுண்டு. அதிகமாக ஏதேனும் செயல்களை பெற்றோர் பறவை, குஞ்சு வெளிவருவதற்காக உதவி செய்யுமெயானால் மஞ்சக் கருவின் ரத்தக் குழாய்கள் அறுபட நேரிடும்.

குஞ்சுகள் வெளிவந்ததும் பெற்றோர் பறவைகள் முட்டை ஒட்டையும் சம்பந்தப்பட்ட தோளையும் கூட்டினின்றும் வெகு தூரத் திற்றி அப்புறப்படுத்தி தாற்றத்தையும், அவற்றும் சரீக்கப்படும் எதிரி களையும் தவிர்க்கின்றது. எனவே குஞ்சு பொரித்தவுடன் ஒரு, ஒதுக்கப் பட்ட தோல் முதலியவற்றை உடனே அகற்றுவது மிக அவசியமானதாகக் கருதப்படுகின்றது. வளத்து, கோழி போன்ற பறவைகள் ஒரு முதலிய பொருள்களை கூட்டினேயே விட்டுவிட்டு போய்விடும் தன்மையன. கல், டெர்ன் போன்ற பறவைகள் கூட்டினேயே தங்கு வதாயிருந்தால் முட்டை, தோல், ஒரு போன்றவைகளை அகற்றி விடுகின்றன.

பெற்றோர் பறவை முட்டையிலின்றும் குஞ்சுகள் வெளிவருவதை மிகவும் ஆர்வத்தோடும், பதட்டத்தோடும் கவனித்து குஞ்சுகளுக்கு உதவி செய்பும். குஞ்சுகள் அவஸ்தைப்படுவதைக் காணும் தாய்ப் பறவை கவக்கமடைந்து பலமுறை பாடவும், ஆண் பறவைகளை அழைக்கவும், வெளிவராத குஞ்சுகளுக்கு உணவு சேக்கித்து வரவும் செய்கிறது. பெண் பறவை கூட்டைவிட்டு ஒரு கணமும் நகராமல் குஞ்சுகள் வெளிவருவதையே கவனித்துக் கொண்டிருக்கும்.

ஒரு கூட்டில் எவ்வா முட்டைகளும் அநேகமாக ஒரே சமயத்தில் பொரிந்துவிடும். சில பறவைகள் குஞ்சு பொரித்தவுடன் கூட்டை விட்டு குஞ்சுகளுடன் பறந்துவிடும் வழக்கமுடையன.

உதாரணம் :

வாத்து, பீனோவர், சான்ட் பைப்பர். இரண்டு மூன்று முட்டைகளிலும் கல், டெர்ன் பறவைகளின் முட்டைகள் ஒரே சமயத்தில் பொரிப்பதில்லை—ஒரிசுதான் இடைவேளையிலுக்கும், குஞ்சுகள் கட்டிற் கருகியேயே தங்கியிருக்கும். தான்கு முட்டைகளையிலும் பாசரைன் பறவைகளின் முதல் மூன்று முட்டைகள் ஒன்றாகவும், தான்காவது முட்டை கடைவியாகவும் பொரிக்கப்படுகின்றன. இவ்வாறு பொரிக்கப்படுவதால் ஊன் உண்ணும் பறவைகளின் குஞ்சுகள் ஒன்றை ஒன்று தின்னும் வழக்கத்தை மேற்கொள்ளுகிறது. மேலும் இடைக்கும் உணவிற்கு தகுந்தவாறு குஞ்சுகளின் எண்ணிக்கையை தணிக்கை செய்வவும் இம்முறை உதவுகிறது.

முட்டைகள் குறித்த நேரத்தில் பொரிக்கப்படாவிட்டால் பெற்றோர் பறவைகள் அடைவாக்கும் காலத்தை மேலும் இருமடங்கு நீடிக்கின்றன.

19. பறவைகளின் வருடாந்தர வாழ்க்கைச் சுழற்சி-பகுதி-III (Annual cycle-III)

குஞ்சுகளின் வாழ்க்கை

மூட்டையிலின்றும் வெளிவந்த குஞ்சுகள் கூட்டிலும், கூட்டிற்கு வெளியிலும் நடத்தும் வாழ்க்கையை விவரிக்கிறது இப்பகுதி.



படம் 143. வார்ப்பைப் பறவை-தன் இனம் அக்ஷிரிசியல் (Altricial)
குஞ்சுகளுக்கு உணவிற்காக கொண்டு வந்து வட்டும் நிலை.

குஞ்சுகளை இருவகைகளாகப் பிரிக்கலாம். அவையாவன :

(1) அக்ஷிரிசியல் (Altricial) என்பது இறகுகளற்ற வளர்ச்சி வடையாத, பெற்றோரின் கண்காணிப்பில் வளரும் இனக்குஞ்சுகள்.

(2) பிரிகாசியல் (Precocial) நன்றாக வளர்ச்சியடைந்த தூவி இறகுகளையுடைய இடம் விட்டு இடம் நகரக்கூடியதுமான தாமரக உணவு உண்ணக்கூடிய குஞ்சுகள்.

இவ்விரண்டாம் வகைக் குஞ்சுகளுக்கும் பெற்றோரின் உதவி ஓரளவிற்கே வேண்டியிருக்கிறது. ஆனால் முதல் வகையைச் சேர்ந்த குஞ்சுகளுக்கு பெற்றோர் பறவைகளின் பராமரிப்பு மிகவும் அதிகமாகத் தேவைப்படுகிறது.

உதாரணம் :

கம், டெர்ன், ஆய்லிட் முதலியன. எனவே பறவை இனத்தைப் பற்றிய ஆராய்ச்சியில் பறவையினப் பிரிவில் (Ornithology) கீழ்க்கண்ட விதிகள் குறிப்பிடத்தக்கவை (Definitions). அதாவது பறவையினத்தை நான்கு வகையாகப் பிரிக்கலாம்.

(1) கீடிகோலஸ் (Nidicolous) இறமில்லாத தோலை மாத்திரம் கொண்ட குஞ்சுகளைப் பொறிக்கும் பறவைகள், இவற்றின் குஞ்சுகள் சிறிது காலம் கூட்டிலேயே தங்கி வளர்கின்றன.

உதாரணம் :

நாரைகள், கம், டெர்ன், ஆய்லிட், பருந்து, ஆகியவை போன்ற பறவைகள்.

(2) கிடிகுலஸ் (Nidifugous) பொரித்தவுடன் கூட்டைவிட்டு வெளியேறும் குஞ்சுகளைப் பொறிக்கும் பறவைகள்.

உதாரணம் :

ஹன், கிரப், அதாடிட்ஸ், கேலிபார்ம், குருமியோர்ம் பறவைகள்.

(3) பிலோபேடிக் (Ptilopaedic) இறமில்லாத, தோலுடல் கொண்டதும், தூவி இறகுகளை மாத்திரம் கொண்டதுமான குஞ்சுகளைப் பொறிக்கும் பறவைகள்.

உதாரணம் :

பாசரைன் பறவைகள், மரங்கொத்தி, மீன்கொத்தி, ஸ்விஃப்ட்ஸ், ஹம்மீஸ் பறவை, குயில், கிவி, புழு போன்றவை.

(4) டீலோபேடிக் (Ptilopaedic) பிறக்கும்பொழுதே தூவி இறகுகளைப் பொரித்திய உடலையுடைய குஞ்சுகளைப் பொறிக்கும் பறவைகள்.

உதாரணம் :

சில அநாடிப் பறவை காலினைவழியல். பொரித்ததும் பாசனரன் குஞ்சுகள் பார்வைநிலவாமதும், இறகுகளில்லாமதும் வளர்ச்சியடைவாததுமாக இருக்கும்.

உதாரணம் :

சிலவின்வீக்ப்பட்டல், சிட்டுக் குருவி போன்ற பறவைகளின் குஞ்சுகள் முற்றிலும் வளராத நிலையில் பொரிக்கப்படுகின்றன. பெரிய கண்களைவுடைய ஒரு தலைவும் மஞ்சள் ஒரு கொண்டைப் போன்ற வயிற்றுப் பகுதியும் குஞ்சின் முக்கிய பாசனங்களாகக் காணப்படும். கால்கள் உடலில் தாங்க முடியாத நிலையில் இருக்கும். உடல் அதிக இரத்த ஓட்டத்தால் சிவந்த நிறமுடையதாகும். மெல்லிய தோவால் மூடப்பட்டு உள்ளிருக்கும் உறுப்புகளைத் தெனிகாக்க காட்டும் நிலையில் அமைந்திருக்கும். வாய் பெரியதாகவும், கூட்புறம் சிவந்த நிறமுடையதாகவும் காணப்படும். இந்த பருவத்தில் குஞ்சு குவிர்த்த இரத்தமுடையதாக இருக்கும். அடிக்கடி தாய்ப் பறவை குஞ்சுகளை அடை காத்து குடு உண்டாக்குகிறது.

குஞ்சு மிகவும் வேகமாக வளர்ச்சி அடைகிறது. இறகுகள் உடலில் குறிப்பிட்ட இடங்களில் கரும் புள்ளிகளாக முதலில் காணப்பட்டு பின்னர் இறகுகளாக மாறுகின்றன. கூட்டைவிட்டு பிசியும் சமயம் இறக்கைகளிலும் இறகுகள் வளர்கின்றன. கண்கள் முதலில் ஒரு கோடாக தோன்றிப் பின்னர் பார்வையும், பயப்படும் உணர்ச்சியும் ஒன்றாக ஏற்படுகின்றன. அக்குஞ்சுப் பறவைகள் பெற்றோர் பறவைகள் உணவோடு வந்ததும் அதை உணர்ந்து சத்தம் உண்டாக்கும். எதிரிகள் எதிர்பாராமல் தாக்க தேரிட்டால் குஞ்சுகள் கூட்டினின்றும் துள்ளி குதித்து வெளியேறி வேறு பறவைகளிடம் சிக்கிக்கொள்ளும். கூட்டிலிருந்து வெளியேறும் பொழுது இறகுகள் நன்றாக வளர்ந்து, பெற்றோர் பறவைகளுக்கு ஒப்பான நிறையோடு வளர்ந்து விடுகிறது. அமகு, இறகுகள், காலின் வீரங்கள் வெகு துரிதமாக வளர்கின்றன. துரிதமாக கூட்டை விட்டு வெளியேறும் பறவைகளுக்கு பெற்றோர் பறவையின் நிறைக்கு சிறிது குறைவான நிறை உண்டாகிறது. கூட்டில் சில நாள் தங்கி வெளியேறும் குஞ்சுகளுக்கு பெற்றோரின் நிறையளவு வளர்ச்சி உண்டாகிறது. பறவைகளில் பாசனரன் பறவைகள் 9 முதல் 14 நாட்கள் வரை கூட்டிலிருக்கும். அதிலும் சில மாறுதல்கள் உண்டு. சில பறவைகளில் வளர்ச்சி மீதமாக அமைவதால் 20 நாட்கள் வரை கூட்டிலேயே தங்குகின்றன. மரங்கொத்தியின் குஞ்சுகள் மெதுவாக வளர்ச்சியடைவதால் ஒரு மாத காலத்திற்கு கூட்டிலேயே தங்க

நேருவின்றது. ஆந்தை, பருத்து போன்ற பறவைக் குஞ்சுகள் கூட்டில் 6 முதல் 12 வாரம் வரை தங்குவின்றன. பெட்ரல் பறவைகள் 8 வாரமும், பெங்குவின் பறவைகள் சில மாதங்களும், ராயல் ஆல்பெட்ரல் 8 அல்லது 9 மாதங்களும் கூட்டில் தங்கி வளர்ச்சி யடைகின்றன.

கேலிசேசியன் பறவைகளின் குஞ்சுகள் பிறந்தவுடன் கறுப்புப் பாக ஓட ஆரம்பிக்கும். வாத்தின் குஞ்சுகள் நீந்த ஆரம்பிக்கும் தன்மையுள்ளவைகள். தாய்ப் பறவையும் அவைகளை இரை தேட கூட அழைத்து செல்கின்றன.

அன்சரிபாரிமில் பறவைகளில், பறக்கும் இறகு முளைப்பதவும், பறத்தலும் தாமதமாக ஏற்படுகின்றன. வெப்பத்தை சூழ்நிலைக் கேற்றவாறு மாற்றி அமைக்கும் சக்தி சில பறவைகளுக்கு தாமதமாகவும், சிலவற்றிற்கு பிறப்பதற்கு முன்பேயும் உண்டாகிறது.

கரங்கம் போன்ற கடுகளில் வாழும் பறவைகளுக்கு சூழ்நிலைக் கேற்ப உடல் உஷ்ணத்தைச் சரியாக அமைத்து வாழும் சக்தி குஞ்சு மூட்டையிலிருந்து வெளியே வந்த நாளிலிருந்தே ஏற்படுகின்றன.

பெற்றோர் பறவைகளின் கவனிப்பு

முதலாவதாக மூட்டைகளை இட்டதும் அவற்றை அடைகாத்து அவற்றின் வளர்ச்சிக்கு வேண்டிய வெப்பத்தை அளிப்பது பெற்றோரின் முதல் கடமையாகும். வலியைவிடலாத நன்றாக வளர்ச்சி பெறாத குஞ்சுகளைப் பொரித்த பறவைகள் சில நாட்கள் வரை அடைக்காத்து அவற்றின் வளர்ச்சிக்கு வேண்டிய உஷ்ணத்தைக் கொடுக்கிறது. பின்னர் நாட்களாக ஆக இறகுகள் தோன்றியவுடன் அடைக்காத்தல் குறைந்துகொண்டே வருகிறது. இரவில் பெற்றோர் பறவை குஞ்சுகளுடன் தங்குவதோடு நிறுத்திக்கொள்கிறது. சூலிச் பிரதேசங்களில் வசிக்கும் பறவைகள் அடிக்கடி அடைக்காக்கும் தன்மையுடையன. அடைக்காத்தல் அந்த இடத்தின் வெப்ப நிலையை பொருத்தே அமைகின்றது. காற்றடைக்கடிய மழைக்காலங்களில் தாய் பறவை கூட்டிலேயே குஞ்சுகளுடன் அடைக்காத்திருக்க, ஆண் பறவை குஞ்சுகளுக்கும் தாய் பறவைக்குமாகச் சேர்த்து உணவு தேடி கொடுக்கின்றது.

பிறக்கும்போதே நன்றாக ஓடவும், இறகுகளுடையதனால் பறவைக் குஞ்சுகளுக்கும் ஓரளவு அடைக்காத்தல் தேவைப்படுகின்றது. ஏனெனில் வெளி உஷ்ணத்தால் அவை பாதிக்கப்பட்டு உடலினுள்ள உஷ்ணம் வெளியேறுகிறது. எனவே அவைகளை கூட்டி

வின்றும் வெளிப்பெறும்வரை அடைக்காக்க வேண்டிய அவசியம் ஏற்படுகிறது.

உதாரணம் : வாத்து அடிக்கடி குஞ்சுகளை ஒன்று சேர்த்து தனது இறகுகளால் அடைக்காப்பது வழக்கம். காலிபோஷியல் பறவைகள் இரவு நேரங்களிலும், பகலில் ஒருசில சமயங்களிலும் அடைக்காக்கின்றது.

உணவு சேகரித்தல்

குஞ்சுகளின் வளர்ச்சிக்கேற்ப உணவு சேகரித்தலிப்பது பெற்றோர் பறவைகளின் மற்றொரு முக்கிய வேலையாகும். வளரும் குஞ்சுகள் அதன் நிறையைக் காட்டிலும் அதிகமான அளவு உணவை உட்கொள் குகின்றன. எனவே பெற்றோர் பறவைக்கு அவற்றிற்கு உணவுத் தேடும் வேலையே தான் முழுதும் முக்கியமாக உள்ளது. ஒவ்வொரு இனத்திற்கேற்றவாறு அதன் உணவுத்தேடும் முறையும் அமை கின்றது. பிறக்கும்போது நன்றாக வளர்ச்சியடைந்த குஞ்சுகளுக்கு உணவு அளிப்பது அவ்வளவாக கிரமமில்லை எனலாம். தாய் பறவையோ அல்லது தந்தைப் பறவையோ சிறிது நாட்களுக்கு குஞ்சுகளை உணவு கொடுத்து காக்கின்றது. பிறகு குஞ்சுகளுக்கு தானே இரைதேடும் வலிமை உண்டாகி கூட்டடைவிட்டு பறந்து சென்று விடுகின்றன.

வளர்ச்சியடையாத சிறிய குஞ்சுகளுக்குப் போதிய உணவு அளித்தல் அத்தியாவசியமாகிறது. ஆண் பெண் இரண்டுமாக போதிய உணவைச் சேகரித்து குஞ்சுகளுக்கு அளிக்கின்றன. சில சமயங்களில் ஆண் பறவை, பெண் பறவைக்கும் குஞ்சுகளுக்கும் சேர்த்து உணவுச் சேகரித்தலுக்கிறது. சில பறவைகளில் ஆண் உணவைத் தேடி கொண்டுவர பெண் பறவை பாதி வழிவரைசென்று அதை வாங்கி குஞ்சுகளுக்கு அளக்கும் பழக்கமும் உண்டு.

உதாரணம் : சதுப்பு நிலப் பறந்து (Marsh hawk). பிறகு இரண்டும் சேர்த்து உணவைச் சேகரித்தலிப்பதுமுண்டு. ஆனால் பொதுவாக ஆண் பறவை 85% உணவைச் சேகரிக்கிறது. பெண் பறவை அடைக்காக்கும் தொழிலி செய்வதால் ஆண் பறவை முதல் சில நாட்கள் வரை பெண் பறவைக்கும் உணவைத் தேடி வழங்கு கின்றது. மழைக் காலங்களிலும், புயல் வீசும் நாட்களிலும் குஞ்சு களுக்கு அதிக வெப்பம் தேவைப்படுவதால் பெண் பறவை அக்காலங்களில் அதிகமாக வெளியே செல்வதில்லை.

கலிபோர்னியாவிலுள்ள வீட்டு கிபிஞ்ச் பறவை போன்ற (House finches in california) பறவைகள் இரண்டு கூடுகளை

அமைத்து இரண்டையும் ஒரே சமயத்தில் ஆண், பெண் இரண்டும் அடைக்காக்கும், முதல் கூட்டில் மூட்டையிட்டு குஞ்சு பொரிக்குமுன் ஆனிடம் ஒப்படைத்துவிட்டு பெண் பறவை மறிஞ்சு கூட்டை அடைக்காத்து பராமரிக்கும் பழக்கமுள்ளவைகளாகும்.

பெற்றோர் பறவைவீரனும் சேர்ந்து உணவு தேடி குஞ்சுகளைப் பராமரித்தால்தான் எல்லா குஞ்சுகளும் சரிவர வளர்ந்து முதிர்ச்சி அடைவும்.

உணவுச் சேகரிப்பது கால நேரத்தைப் பொருத்து மாறுபடும் என்று கருதப்படுகின்றது. காலை வேளையில் அதிகமாகவும், பகல் மாலை நேரங்களில் குறைவாகவும் காணப்படும். வெளி வந்த முதல் நாள் அதிக உணவை அமைவுகளுக்கு தாம்ப்பறவை அளிப்பதில்லை. ஏனெனில் வயிற்றில் உள்ள மஞ்சள் கருப்பொருள் (Yolk) குஞ்சுக்கு உணவாக அமைகின்றது. ஒரே நாட்களுக்குப் பிறகு குஞ்சுகளுக்கு உணவு அதிகமாக தேவைப்படுகின்றது. உணவு அளிக்கும் நேரம் இடைத்திற்கு இடை மாறுபடுகின்றது. ஒவ்வொரு இனப் பறவையும் ஒரு மணி நேரத்திற்கு இத்தனை முறை என்று கணக்கிடப்பட்டு அளிக்கும் தன்மையுடையவைகளாக உள்ளன. உணவுத் தேடும் எல்லைகள் பரப்பு குறைந்த தூரமாகவுள்ள பறவைகள் மணிக்கு அதிக முறையும், வில்தூரணம் அதிக தூரமாக உள்ள பறவைகள் ஒரு சில முறைகள் மட்டுமே உணவைச் சேகரித்தனிகின்றன. மற்றும் அடிக்கடி உணவைவளிக்கும் பறவைகள் குறைவான அளவு உணவுடனும், மணிக்கு ஒரு சில முறையே உணவைக்கும் பறவைகள் அதிகமான அளவுடனும் வந்து செலுதின்றன என்று கூறப்படுகின்றது.

பெரிய பறவைகள் அடிக்கடி குஞ்சுகளுக்கு உணவு அளிப்பதில்லை. வேட்டையாடி உணவைச் சேகரிக்கும் பறவைகளுக்கு உணவு கிடைப்பது அவற்றின் வெற்றி தோல்வியைப் பொருத்ததாகும். அக்குஞ்சுகளும் கிடைத்த அளவு உணவை உட்கொண்டு கிடைக்காதப் பொழுது பட்டினி கிடக்கும்படியும் தேடிடணாம் என்று கருதப்படுகின்றது. பகுத்து போன்ற பறவைகள் ஒரு மூழு இறந்த பிராணியின் உடலை கொண்டு வந்து கூட்டில் விட்டுவிடும். குஞ்சுகள் பித்த பொழுது அதை உண்ணும் பழக்கமுள்ளவைகளாகும். ஐரோப்பிய எலிகிப்பட் (European Swift) பறவை சாதகமில்லாத பருவக்காலங்களில் (அதாவது பறக்கும் பூச்சிகள் கிடைக்காத காலங்களில்) குஞ்சுகள் பல நாட்கள் (சுமார் 31 நாட்கள்) உணவில்லாமல் வாழும், செயலற்ற பருவதலையில் (Torpid) கொள்வின்ற நிலையை அடைகிறது. சாதகமான காலங்களில் பெற்றோர் பறவை பறக்கும் பூச்சிகளை பந்து

களாக வாயில் உருட்டி அடிக்கடி குஞ்சுகளுக்கு ஊட்டி வளர்க்கின்றது.

கடற் பறவைகள் மீனை ஒன்றாகவோ அல்லது பல மீன்களாகவோ விழுங்கி தொண்டையில் பதுக்கி பின்பு வெளி கொண்டு வந்து குஞ்சுகளுக்கு ஊட்டுகின்றது. சாதாரணமாக கடற்பறவைகள் அடிக்கடி குஞ்சுகளுக்கு உணவு கொடுப்பதில்லை.

ஆல்பெட்ராங்ஸ், பெட்ரஸ் போன்ற பறவைகள் ஒருவெ மாதங்கள் கூட குஞ்சுகளை நிராகரித்து சென்றுவிடும் பழக்கமுள்ளவைகளாகும். குஞ்சுகள் பசிதள முடியாமல் தானே கட்டலுக்குச்சென்று உணவைத் தேட பழகிக் கொள்ளும் தன்மை உள்ளவைகளாகும். சில சமயங்களில் தாய்ப்பறவை பல நாட்களுக்கு பின்பு ஒரேமூலையே இடையே வந்து குஞ்சுகளை பராமரிப்பதும் உண்டு. அநேகமாக எல்லா பறவைகளும் குஞ்சுகள் தன்மையை வளர்த்தபின் அடிக்கடி உணவு கொடுப்பதை நிறுத்திவிடுகின்றன.

குஞ்சுகளுக்கு உணவூட்டும் விதம்

அநேகமாக பறவைகள் அவற்றால் உணவை சேகரித்து குஞ்சுகளின் அடிதொண்டை வரை உணவை தள்ளி ஊட்டி விடும் பழக்கமுள்ளவைகளாகும். தொண்டையிலுள்ள தசையின் உதவியால் குஞ்சுகள் உணவை விழுங்குகின்றன. குஞ்சுகளின் வாய் மிகவும் அகலமாகவும், சிவந்த நிறமுடையதாகவும் இருக்கும் தன்மையுடையதாய் பெற்றோர் பறவை அவசரமாக உணவை ஊட்டி செல்வதற்கு வசதியாக அமைந்துள்ளது. குஞ்சுகள் தலைபை அசைத்தும், ஒருவித சப்தம் உண்டு பண்ணியும் தாய் பறவையின் புது விதமான குறிப்பான சப்தத்தாலும் உணவிற்கான உணர்ச்சியைக் காட்டுகின்றன. சில பெற்றோர்ப் பறவைகள் உணவை உணவுக்குழாயின் அடிப்பகுதியிலும், தொண்டைப் பகுதியிலும் சேகரித்து வந்து, பின்னர் அவற்றை திரும்பவும் வெளியில் கக்கி எடுத்து குஞ்சுகளுக்கு ஊட்டுகின்றன. இசைக்கும் பறவைகள் உணவை ஒரு சிறிது சீரணித்துப் பிறகு குஞ்சுகளுக்கு ஊட்டுகின்றன. தனது கூரிய அங்கை குஞ்சின் வயிற்றுப் பகுதியைக் கொண்டு சென்று அரைபட்ட உணவை ஊட்டுகின்றன. நாயாயின் குஞ்சுகளில் தாயின் அங்கை குஞ்சுப்பறவை அங்காய் பிடித்துக்கொண்டு அசைக்கும்போது உணவு தானாகவே வாய்க்குள் விழுந்துவிடுகின்றது. பெலிகன் தனது பெரிய வாயைப் பிறகு வைத்துக் கொள்ளும்பொழுது குஞ்சுகள் வாயிலுள்ள உணவைப் போட்டிசுட்டன் தேடி பிடித்து உண்ணுகின்றன. சில பறவைகளில் மிகவும் பசித்த குஞ்சுகள் பெரிய சத்தத்துடன் முதலில் உணவை உட்கொண்டு பின்பு ஒவ்வொரு இரப்பாறுகின்றன. பின்னர்

மற்ற குஞ்சுகள் பரி ஆற்றிக் கொள்ளும் பழக்கமுள்ளவைகளாகும். பரிக்காத குஞ்சின் வாயில் உணவை வைத்தாலும் வீழங்கரமாக அதை அடுத்த குஞ்சுக்கு ஊட்டினிடும் பழக்கமுள்ளவைகளாகும்.

பறவையின் இனத்தை அதன் உணவின் தன்மையினின்றும் கண்டுகொள்ள முடிகின்றது. ஆனால் எவ்வாறு பறவைகளின் குஞ்சுகளுக்கும் முதல் இரண்டொரு நாட்கள் வரை புழு பூச்சிகளே உணவாகின்றன. பின்னர் அந்தந்த இனத்திற்குரிய உணவை தாய்ப் பறவை குஞ்சுகளுக்கு அளிக்கின்றது. அமெரிக்கன் தங்கப்பிச்சு என்ற பறவை மாத்திரம் முதலிலிருந்தே குஞ்சுகளுக்கு சதைப்பற்றுள்ள மீன்தகையே அரைத்து உணவாக ஊட்டுகின்றன. ஆனால் புழுக்கள் குஞ்சுகளுக்காக புழுப்பாலை கொடுக்கின்றன.

கூடுகளை சுத்தம் செய்தல்

பறவைகள் தங்கள் கூடுகளைச் சுத்தமாக வைத்துக் கொள்ளுதல் மிகவும் அவசியமானதொன்றாகும். ஏனெனில் குஞ்சுகள் அதிகமாக உணவை உட்கொள்வதால் அடிக்கடி கழிவுப் பொருட்களை வெளியேற்றுகின்றன. ஆகவே ஒவ்வொரு முறை உணவளித்ததும் பெற்றோர் பறவைகள் கூட்டை சுத்தம் செய்கின்றன. ஒரு தனி வாயில் குஞ்சுகளின் மலம் வெளியேற்றப்பட்டு அதை பறவைகள் உடனே அப்புறப்படுத்தவும் தங்களைப் பழக்கிக்கொண்டுள்ளன. ஒரு சில பறவைகள், குஞ்சுகளின் மலத்தை தாங்களே உண்ணும் பழக்கத்தைப் மேற்கொள்ளுகின்றன. அதேமாதிரி எவ்வாறு பறவைகளும் மலத்தை சற்று தூரத்திற்கு அப்பால் கொண்டு சென்று அப்புறப்படுத்தும் பழக்கமுள்ளவைகளாகும். முதல் இரண்டு மூன்று நாட்கள் வரை வெளியேற்றப்படும் குஞ்சுகளின் மலத்தை கார்டினல் (Cardinal) போன்ற பறவைகள் உண்ணுகின்றன. அதன்பிறகு ஆண், பெண் இரண்டு பறவைகளும் மலத்தை அப்புறப்படுத்தி விடுகின்றன.

விலாயோ, தங்கப்பிச்சு போன்ற பறவைகளின் கூடுகளில் அசுத்தமே அதிகமாக காணப்படுகிறது. அவற்றிற்கு மலத்தை அப்புறப்படுத்தும் பழக்கமே இல்லை. கடற்பறவைகளிலும், நாரை போன்ற நீர்ப் பறவைகளிடமும் இப்பழக்கத்தை காணமுடியாது. இவ்வாறு சுத்தம் செய்யப்படாத பறவைகளின் கூடுகளில் கொடைக்கால் உஷ்ணத்தால் அவை உலர்ந்து போன உரம்போன்ற எச்சமாக (Excreta) அடுக்கடுக்காக படிந்திருப்பதைக் காணலாம். மீன்கொத்திகளும், மரக்கொத்திகளும் கூடுகளைச் சுத்தம் செய்வதே இல்லை. மண்டைக் குடைந்து மீன் கொத்தி கூடு அமைப்பதால் அசுத்தங்களை மண்டை உறிஞ்சி விடுகிறது. மற்றும் அசுத்தங் கலந்த நீர்க் கலவை

கட்டின் வெளியே வடிந்த வண்ணமிகுப்பதையும் காணலாம். எனவே அக்கூடுகளின் பாதைகளில் அமோலியா வாடி வரவி இருப்பதால் கூட்டைவிட்டு வெளியே வந்ததும் பெற்றோர் மீன் கொத்தி பறவைகள் அடிக்கடி தண்ணீரில் மூழ்கி குளீப்பதைக் காணலாம்.

கூட்டை விட்டுப் பிரிதல்

கூட்டைவிட்டுப் பிரியும் கடைசி நேரத்தில் சில புதுமையான நடவடிக்கைகளைப் பறவைகளிடம் காண நேரிடுகிறது. குஞ்சுகள் பிரத்தனியிருந்தே சில பயிற்சிகள் மேற்கொள்கின்றன. கூட்டை விட்டு பிரியும் நேரத்தில் அவை மிகச் சிறந்த முறைகளை உபயோகப் படுத்துகின்றன.

குஞ்சுகள் தன் உடலை மேலே எழுப்பியும், வளைத்தும், காக்களை மாற்றி மாற்றி இரண்டொரு அடி வைத்தும், அருகே செல்லும் பூச்சிகளைப் பிடிக்க முயன்றும் தங்களை பழக்கிக் கொள்வதைக் காணலாம். மேலும் இவ்வுகளை அடிக்கடி விரித்து படபட வென்று அடித்து ஒன்றின் மேலொன்றாக ஏறியும், இறங்கியும், சில சமயம் தவறி கீழே பறந்து விழுந்து ஒருவதையும் காணலாம். இதனால் ஒன்று பறவைக் குஞ்சுகள் சேதமடைவதும் உண்டு. அவைகளில் மிகவும் வலிமை வுள்ள குஞ்சுகள் பெற்றோர் பறவைகள் உணவுடன் வருவதை எதிர்த்துக் கொண்டு முதல் முறையாக பறந்து வெளியேறுவதுமுண்டு. இவை பயிற்சியில்லாமலேயே சிறந்த முறையில் பறக்கக்கூடியவை. பொத்துகளில் வளரும் குஞ்சுகள் நீண்ட நாட்கள் உள்ளேயே அடைந்து விடப்பதால் நன்றாக வளர்ந்து முதல் முறையிலேயே நன்றாக பறந்து செல்லப் பழகிக் கொண்டுள்ளன.

கூட்டைவிட்டு பிரிவது என்பது பறவைகளில் ஏற்படுகிறது. எதிரி பறவைகளால் குஞ்சுகள் தாக்கப்படும் போது அவைகள் வெளியேற நேரிடுகிறது. இவ்வாறு செல்லக்கூடிய குஞ்சுகள், சில சமயங்களில் நன்றாக பறக்கக் கூடிய நிலையில் இருப்பதில்லை. அவை பறந்து தரையில் தத்திச் செல்லக் கூடியவைவாகவும், சிறிது தூரம் பறந்து செல்லக்கூடியவைவாகவும் காணப்படுகிறது. அப்படி செல்லும் போது மற்ற எதிரிகளிடம் சிக்கி சேதம் அடைவதும் உண்டு.

குஞ்சுகள் கூட்டை விட்டு பிரியும் போது ஒவ்வொன்றாக பறந்து செல்லும். முதலில் ஒரு குஞ்சு வெளியேறியதும் மற்ற குஞ்சுகளும் ஒவ்வொன்றாக வெளியேறுகிறது. பகுத்துகளின் கூட்டில், வளர்ந்த குஞ்சுகள் மரத்தின் மற்ற இடங்களிலும், சிறிது வளர்ந்த குஞ்சுகள் கூட்டின் ஓரத்திலும், வளராத குஞ்சுகள் கூட்டிலேயே தவழ்ந்த.

வாறும் காணப்படுகின்றன. நாளரகளின் குஞ்சுகள் முதன் முதல் பறந்து செல்வதற்கு முன் கூட்டிலின்றும் வெளியேறி ஒரு மரக் கிளைக்கு தத்திச் சென்று அங்கிருந்து பறந்து வெளியேறும். சில பறவைகள் குஞ்சுகளை உணவு முதலியவற்றைக் கொண்டு கூட்டிற்கு வெளியே வரும்படி தூண்டி பறக்க வைக்கும் பழக்கத்தையும் மேற்கொள்கின்றன.

பொத்துகளில் வசிக்கும் குஞ்சுகள் வெகு நாட்களுக்கு கூட்டியேயே தங்கி வெளியேறுகின்றன. இம்முறையாக குஞ்சுகள் அதிக சேதமடைவாமல் வாழ ஏதுவாகிறது. மரத்திலும் நிவந்திலும் கூடு கட்டி வசிக்கும் பறவைகளைக் காட்டிலும், பொத்துகளில் கூடு கட்டி வசிக்கும் பறவை குஞ்சுகள் அதிக நாட்கள் கூட்டியேயே தங்கி வளர்ந்து வெளியேறுகின்றன.

கூட்டின் வெளியே குஞ்சுப் பறவையின் வாழ்க்கை முறை

குஞ்சுகள் கூட்டைவிட்டு வெளியேறியதும் பெற்றோர் பறவைகளும் கூடவே சென்று அவற்றை பாதுகாத்து உணவையும் தேடி தருகின்றன. குஞ்சுகள் தன்ளுக பறக்கவும், உணவைத் தானே தேடிக்கொள்ளவும் பழகும் வரை பெற்றோர் பறவை குஞ்சுகளுடனேயே தொடர்ந்து செல்லுகிறது. குருகின் 18-20 நாட்கள் வரை குஞ்சுகளை பாதுகாக்கிறது. ஒவ்வொரு பறவைக் குஞ்சுகள் 8 நாட்களில் கூட்டை விட்டு வெளியேறுகின்றன. மூன்று நாட்கள் தத்திச் செல்லுகிறது. 10 நாட்கள் பறக்க பழகுகிறது. பிறகு 11 நாட்கள் பெற்றோர் பறவையின் உதவியோடு வாழ்த்தும், பின்னர் தானே இரையைத் தேடி உண்ணும் பருவத்தை 30 நாட்களிலும் அடைகிறது. சில பறவைக் குஞ்சுகள் கூட்டை கற்றி விரிந்து தூரத்திலேயே விரிந்து நாட்கள் வசிக்கிறது. அதிக தூரம் செல்லுவதில்லை. சாதாரணமாக தாய்ப் பறவை குஞ்சுகளை கூட்டிற்கு வெளியேயும், அவை தன்ளுக வளர்த்து தனக்குத் தானே உணவு தேடிக் கொள்ளும் வரை பாதுகாக்கின்றது. வளர்த்துக் குஞ்சுகள், தாய் பறவையாகத் தன்னிக்குஞ்சு அழைத்து செல்லப்பட்டு நீந்தவும், நீரில் மூழ்கி மேலே எழும்பவும் நீரில் உள்ள பூச்சிகளைப் பிடித்து உண்ணவும் கற்றுக் கொள்கின்றன. காலினேஷியல் பறவைகளின் குஞ்சுகள் தங்கள் பெற்றோருடன் கூட்டைவிட்டு வெளியேறியவுடன் வலசைப்போதல் மேற்கொள்கின்றன.

தாய், குஞ்சுகளை கூட்டிலின்றும் வெளியே அழைத்து சென்று, உணவு எடுப்பது முதல், ஆபத்து தேரும் பொழுது எப்படி ஒளிய வேண்டும், தாள் கொடுக்கும் அபாய ருரனுக்கு உடனே பணிய வேண்டிய முறைகளையும் கற்றுக் கொடுக்கின்றது. சில குஞ்சுகள்

தாயின் எச்சரிக்கை குரலுக்குப் புறக்கணித்து நிலிவதால் ஆபத்தில் சிக்கிக் கொள்வதுமுண்டு. இவ்வாறு பெரும்பாலும் இரண்டு, மூன்று குஞ்சுகள் எப்படியும் இறந்துவிட நேரிடுகின்றது. நான்கு அல்லது ஐந்து குஞ்சுகளே கடைசியில் தாவுடல் மிஞ்சும். அவ்வப்போது போன்ற பறவைகள் தனது குடும்பத்தை குளிர்ப்பாதுதல் அடுத்த இனப்பெருக்க காலம் வரை மிகவும் கவனித்து பிரிவாங்கி காக்கிறது. சில பறவைகளின் குஞ்சுகள் தாய் பறவையுடன் வெகு நாட்கள் தங்கி ஒன்றாக உறங்கி, ஒன்றாக குடும்பத்தோடு வாழுகின்றன. சிவசமயம் பெற்றோர் பறவைகளுக்கு அடுத்த இனப்பெருக்கக் காலத்தில் கூடுகட்டுவதில் உதவி செய்வதுமுண்டு. பெரும்பாலும் குஞ்சுகள் தாய் பறவையுடன் சிறிது காலமே சேர்ந்து வாழ்ந்து பின்னர் பிரிந்து தனித்து வாழத் தொடங்குகிறது.

பறவைகள் சாதாரணமாகப் பாடுவதையும், இரை தேடும் வழக்கத்தையும், தேர்த்தெடுக்கும் இரையையும், குனிக்கும் முறைகளையும் பெற்றோர் பறவைகளிடமிருந்து பிறப்பியேயே அறிந்திருக்கின்றன. சாம்பல்திற கன்னப் பகுதியிலுடைய திரஷ் (Grey-cheeked thrush) என்னும் பறவைக் குஞ்சை பிறந்த ஏழாம் நாளே பிரித்து வளர்த்ததில், அது 15 ஆம் நாள் உண்ணை சரியாக எடுத்து உண்ண தொடங்கியிட்டது. முதலில் சிறிது தகுமாதிறதும் பிறகு சரியானபடி அழகாக அதன் இயக்கத்தைப் போன்றே பூச்சிகளைப் பிடித்து தின்ன ஆரம்பித்தது. அது 24 ஆம் நாள் பாடவும் தொடங்கியது. 25 ஆம் நாள் குடிக்கும் தண்ணீர் குவளையில் குளிக்கத் தொடங்கியிட்டது. பிறகு தினமும் குளிக்க ஆரம்பித்துவிட்டது. இவை சந்தி வழி வந்த பழக்க வழக்கங்களாகும்.

திருமதி நைஸ் (Mrs Nice) அம்மையார் மூன்று (Song sparrows) பாடும் குருவி குஞ்சுகளை வைத்து பராமரித்து வந்தார். அவை 13ஆம் நாள் முதல்பாட ஆரம்பித்தது. திருமதி லாஸ்கி (Mrs Lasky) என்ற அம்மையார் வளர்த்த இரண்டு கார்டினல் குஞ்சுகள் மூன்று நான்கு வாரங்களில் ஒரு விதச் சந்தத்தை உண்டாக்கி பாட ஆரம்பித்து இரண்டு மாதங்களில் பெற்றோர் பறவைகளைப் போன்று தன்னை பாடினது. எனவே உண்பது பாடுவது போன்ற பழக்கவழக்கங்கள் சந்தி வழியாக வரும் தன்மைகளாகும்.

பறவைக்குஞ்சுகள் வாயும் காலவரம்பு

பொரிக்கும் எல்லா குஞ்சுகளும் வளர்த்தே திரும் என்பது பறவையினத்தில் இயலாதுபடி இயற்கையில் பல ஆபத்துகள் இனப்பெருக்கக் காலத்திலேயே அன்று எல்லா காலங்களிலும் ஏற்படுகின்றன. பறவைகள் இடும் மூட்டைகள் யாவும் பொரிக்கப்படுவ

தங்கை, சில எதிரிகளால் தாக்கப்பட்டு அழிந்துவிடும். சில பொரிக்கப் படாமலே அழிக்கப்படும். காற்றும் மழையும் கூடுகையே நாயாக்கி விடுவதுமுண்டு. குளிரும் விபத்தும் ஸ்டட்டைகையே யன்றி பெரிப பறவைகளையும் அழித்துவிடுகிறது. வியாதியும் வெளிப்புற தேரால் உண்ணியும் பறவைகளை அழிக்கும் தன்மை வாய்ந்தவை. ஆனால் விடாமல் திரும்பத் திரும்ப கூடுகட்டுவது சில பறவைகளின் குணமாகும். பாசரைன் பறவைகளில் 50% கூடுகள் வெற்றிடமாக அமைகின்றன. ஒரே காலத்தில் அதிக சேதமும் விளைவதுண்டு. பிரகாஷியல் (Precocial) பறவைகள் அதிக சேதமில்லாமல் குஞ்சு பொரிக்கின்றது. கடற்பறவை, தீர்ப்பறவைகளுக்கு புயல் காற்றும், தீர்மட்டம் உயரவதும் மிகவும் சேதம் விளைவிக்கும் இயற்கைகளாகும். கூட்டைவிட்டு வெளியேறியதும் குஞ்சுகளுக்கு அதிக சேதங்கள் ஏற்பட காரணமுண்டு. குஞ்சுகளில் இனப்பெருக்கக் காலத்தின் இறுதியில் ஒன்று அல்லது இரண்டு தான் மிச்சுகின்றன.

வனஜுன்னியும் விலங்கினங்களும், காற்றும், குளிரும் பறவை மினத்தின் எதிரிகளாகும். மற்றும் குஞ்சுப் பறவைகள் மனிதனால் கடப்படுவதும், வியாதிக்களாகும், தண்ணீரிலுள்ள அனத்தத்தினாலும் சேதம் அடைவதுமுண்டு. பருவக்காலத்திற்கு தகுந்த முறையில் தங்களை மாற்றிக் கொள்ளும் திறமையிருத்தும் பறவைகள் அதிக சேதமடைகின்றன. பறவையினத்தில் 3/4ம், 2/3 பாகம், வளரும் குஞ்சுகள் முதல் 'வருஷத்திலேயேயும், இரண்டாம் வருஷத்தில் 2 பாகமும் சேதமடைதல் எனலாம். சேதம் அதிகமாக ஏற்படுவதால் பறவைகளின் ஆயுள் மிகவும் குறைவாகிறது. இயற்கையாக வாரும் தன்மை பறவைகளுக்கு அதிகமாகுதலும், மனிதனால் பிடித்து கூண்டில் வளர்க்கப்படும் போது ஆயுள் இன்னும் அதிகமாகிறது. சில பாசரைன் பறவைகள் 10 இவிருந்து 20 வருஷம் வரை வாழ்கின்றன. பறவைகளின் கூய்களில் விரையம் போடும் முறையில் அவற்றின் வாழ்க்கைக் காலத்தை தீர்ணயிக்கமுடிகிறது. உதாரணமாக பருந்து, கல், ஆந்தை போன்ற பறவைகள் வெகுகாலம் வாழக் கூடியவைகளாகும். மிளி, ஆன்னம், கழுஞ் போன்ற பறவைகளை கூட்டிவிட்டு வளர்த்தால் வெகுகாலம் வாழும் தன்மைபுடையவைகளாக உள்ளன.

கோடைக்கால இறுதியில் பறவைகளின் பண்புகள்

கோடைக்கால இறுதியில் பெற்றோர் பறவைகளில் ஒரு முறை இறகுகள் உதிர்ந்து புது இறகுகள் முளைக்கின்றன. குஞ்சு பறவைகளும் தங்கள் இறகுகளை புதுப்பித்துக் கொண்டு திரும்பும் பிரயாணத்திற்கு முன் தங்களை தயார் செய்து கொள்கின்றன. இந்த நேரத்தில் பறவைகள் அமைதியான இடத்தை நாடிச் சென்று ஓய்வு எடுத்துக்

கொள்கின்றன. வயசை போகும் பறவைகள் தங்களை முன்கூட்டியே வயசைப் போதனுக்கு இவ்வாறு தயார் படுத்திக் கொள்கின்றன. பிறகு கூட்டமாக சேர்ந்து வயசைப் போதலை ஆரம்பிக்கின்றன.

கோடைவீச இறுதியில் சில பறவைகள் இங்குமங்குமாக அங்கேயும் தன்மையுடையவை. எக்டெட், ஹெரான் போன்றவை வடக்கு திசைவாக பிரயாணம் செய்யும் வழக்கமுடையவை. இவற்றிற்கெல்லாம் இனப்பெருக்கக் காலங்களில் உடலில் ஏற்படும் ஹார்மோன்களின் தூண்டு தன்மையே காரணமாகும்.

நிரும்பும் பயணம்

வடக்கு நோக்கி வயசை சென்று தெற்கு நோக்கி நிரும்பி வருகிற நிரும்பும் பிரயாணம் என்பது பெயர். வடக்கு நோக்கி சென்ற பறவைகளுடன் புதிதாகப் பொரித்த குஞ்சுகளும் சென்று முதன் முறையாக தெற்கு நோக்கி பிரயாணத்தை தொடங்கி பெரிய பறவைகளின் உதவியில்லாமலே எப்பொழுது, எப்படி, எங்கே செல்வதென்பதை பிறப்பியேயே அறிந்து உட்கூட இடத்தை அடைகின்றன. பிளோவர் (Plover) என்னும் பறவை யினத்தில் குஞ்சுகள் பெற்றோரை பிசிந்து வேறு திசையில் சென்று குறித்த இடத்தை அடைகின்றன. மற்ற பறவைகள் கூட்டத்தோடு கூட்டமாகச் செல்லும் தன்மையுடையது. நிரும்பி வரும் பிரயாணத்தில் பறவைகள் வசத்தகால பிரயாணத்தைவிட மெதுவாக செல்லும் தன்மையை மேற்கொள்ளுகிறது. எனவே வசத்தகால பிரயாணத்தில் எடுக்கும் காலத்தைவிட நிரும்பும் பிரயாணத்தில் அதிக நாட்களாகின்றன. (அதாவது ஐரன் மாதம் முதல் டிசம்பர் மாதம் வரை ஆகும்.) எவ்வாலோ, பாபோவின்க், வார்ப்பவர் போன்ற பறவைகள் வடக்கு திசையிலின்றும் ஐரன் மாதத்தில் புறப்படுகின்றன. செப்டம்பர் தருவில் வடதிசையில் நிரும்பும் பிரயாணத்தின் உச்ச நிலை ஏற்படுகிறது. நிரும்பும் பிரயாணத்தில் பறவைக் கூட்டத்தில் குஞ்சுகளின் அதிக எண்ணிக்கை இருந்தபோதிலும், வசத்தகால பறவைக் கூட்டத்தின் அழகிய காட்சியைப் போலிடுப்படுகின்றன. ஏனெனில் புயல் காற்று மழை போன்ற பருவநிலை காரணமாக பறவைகள் வெகுவாக சேதமடைந்து சிதறி விடுகின்றன. ஒரு சில நீர்ப்பறவைகள், தாலியம் தின்னும் பறவைகள் இவற்றிற்கெல்லாம் தப்பிவிழைந்து இறுதியில் நவம்பர், டிசம்பர் குவிலில் உறைந்து விடுகின்றன.

வடக்கு நோக்கி செல்லும் பிரயாணத்தை போன்றே தெற்கு நோக்கி செல்வதும் பறவைகளின் உடலில் ஏற்படும் உட்குறிகள் மாற்றமேயாகும். மேலும் வசக்கும் இடத்தின் சூழ்நிலை, உணவு,

பருவநிலை ஆகியவற்றாலும் இப்பிரயாணம் அமைகின்றது. எனவே பிரயாணத்திற்கு முக்கிய காரணம் உடற் கூற்றிலேற்படும் மாறுதலின் தூண்டுதலேயாகும். வெகு தூரம் செல்லும் பறவைகள் இத் தூண்டுதலுக்கு உடனே உடன்படுகின்றன. மற்ற பறவைகள் பருவநிலை காரணமாகவும், கிடைக்கும் உணவின் தன்மையை பொருத்தும் பிரயாணத்தை தொடங்குகின்றன. இப்பிரயாணத்தில் அநேகமாக கவர்ச்சியில்லாமலும் பாடும் தன்மையற்றவையாகவும் வளர்ச்சியடையாமலுமுள்ள குஞ்சுகளே காணப்படும். நீர்க்கோழி, பருந்து போன்ற பறவைகளின் திரும்பும் பிரயாணம், வசந்தகாலப் பிரயாணத்தைவிட அதிக கவர்ச்சியுள்ள காட்சியாக அமைகின்றது.

குளர்காலத்தில் பறவைகளின் பண்புகள்

பறவைகளின் குளர்கால வாழ்க்கையோடு வருடாந்தர வாழ்க்கைச்சுழல் ஒருவாறு முடிவடைகிறது எனலாம். அநேகமாக குளர்காலத்தில் பறவைகள் தாங்கள் வசிக்க அதிக விஸ்தீரணமுள்ள இடத்தை பலவாறாக உணவின் காரணமாக தேர்ந்தெடுக்கின்றன. இனப்பெருக்க இடத்திலிருந்து வெகு தூரத்திற்கு அப்பாற்பட்ட இடத்தையே குளர்கால இடமாக தேர்ந்தெடுக்கின்றன. ஆர்க்டிக் பிரதேசத்தில் கூடுகட்டும் பறவைகள் குளர்காலத்தில் பூமத்திய ரேகையை கடந்து தெற்கு திசையின் எல்லா பாகங்களுக்கும் சென்று குடியேறுகின்றன. வலசை போகாத பறவைகள் இருந்த இடத்திலேயே தங்கிவிடுகின்றன. ஒவ்வொரு இனமும் பரந்த பிரதேசத்தைக் குளர்கால இடமாகக் கொண்டு ஒவ்வொரு வருடமும் அதே இடத்திற்கு வந்து சேருகின்றன. (உ-ம்) மரக்குருவிகள் (Tree sparrows) வட அமெரிக்காவின் வடபகுதியில் மரங்களடர்ந்த பகுதியில் கூடுகட்டும். இம் மரக்குருவிகள் குளர்காலத்தில் வட அமெரிக்கா முழுவதும்லாமல் மத்திய அமெரிக்காவிலும் வசிப்பதை காணலாம். டாக்டர் அலென் (Doctor Allen) என்பவர் மூன்று மரக்குருவிகளுக்கு 1921ஆம் ஆண்டு வளையங்கள் மாட்டி பரிசோதித்ததில், 1922, 1923, 1924ஆம் ஆண்டுகளில் முறையே அதே இடத்திற்கு குளர்காலத்தில் மறுமுறையும் திரும்ப வந்ததைக் கண்டறிந்துள்ளார். சில குருவிகள் எட்டு முறை வரிசையாக ஒரே இடத்திற்கு குளர்காலத்தில் வந்திருப்பதாகத் தெரிகிறது. அதாவது நவம்பரில் வந்து ஏப்ரல் மாதத்தில் சென்று விடுகின்றன என்று கண்டு பிடிக்கப்பட்டுள்ளது.

ஒரு சில பறவைகள் குளர்காலத்தில் கிடைக்கும் உணவுப் பொருள்களைக் கொண்டு எல்லையை நிர்ணயிக்கின்றன. உதாரணமாக பருந்துகள் மிதமான குளிராக இருக்குமிடத்தில் ஓரளவு உணவு கிடைக்குமானால் அவ்விடத்திலேயே வசிக்கின்றன. குளிரும் பனியும்

அதிகமாகி விட்டால் தெற்கு திசையை நோக்கி எலி போன்ற பிராணிகள் நிறைந்துள்ள பகுதியை சென்றடைகின்றன. நியத்தியி லினைக்களைத் திள்ளும் வழக்கமுள்ள பறவைகள் பலி அதிகமுள்ள காலத்தில் வேறு இடத்தைத் தேடி சென்று விடுகின்றன. குளிர் காலத்தில் பசர்பொழுது குறைந்ததால் உணவு தேடும் நேரமும் குறை விற்று, உஷ்ணம் மிகவும் குறைந்து விடுவதால் உஷ்ணத்தின் அளவை நிலைநிறுத்தும் உணவைத் தேடி பறவைகள் அங்கும்கூட நேரிடுகிறது. பசர்பொழுது உணவைத் தேடி அலைந்து பின்னர் இரவானபோது மரப்பொந்துகளிலும், புதர்களிலும், தலையை இறகுகளுக்குள் துழைத்த வண்ணம் வெப்பமாக்கி உறங்கும். சில பறவைகள் தங்கள் கூடு அமைக்கும் வழக்கப்படி ஒரே மாதிரியான இடத்தையே தேர்ந் தெடுத்து உறங்கச் செல்லும். மரப்பொந்துகளில் வசிக்கும் பறவைகள் பொந்துகளையே தேர்ந்தெடுத்து உறங்கும். உஷ்ணமான பகுதிகளில் வசிக்கும் பறவைகள் குளிர்காலத்திற்கென்று புதுவித மான கூட்டை அமைத்து அதில் வசிக்கின்றன. சில தனியாகவும், சில கூட்டமாகவும் குளிர்கால அறைகளில் வசிப்பதுண்டு. (உ-ம்) மரங்கொத்தி ஆணும் பெண்ணும் தனித்தனியாக குளிர்கால அறையில் வசிக்கும் தன்மையுடையவராம். மத்திய அமெரிக்க ரென் டர்னும் பறவைகள் உறங்கும் அறைகளைக் கட்டி அதில் தனி யாகவும், இரண்டாகவும், அல்லது கூட்டமாகவும் வசிப்பதுண்டு.

சில சமயம் குளிர்காலங்களில் வெவ்வேறு இனத்தைச் சேர்ந்த பல பறவையினங்கள் கூட்டமாக ஒரே இடத்தில் ஒன்று சேர்ந்து வசிப்பதுவுமுண்டு. இவ்வாறு ஒன்று சேர்ந்து கூட்டமாக வாழும் பழக்கத்தைக் குளிர்காலத்தில் ஒரு சில பறவைகளிடம் காணலாம். இக் குளிர்கால உறவு முறை அடுத்த இனப்பெருக்கக் காலத்தில் மூடி வடைகிறது. பிறகு பறவைகள் இனவாநியாகப் பிரிந்து தங்களது எல்லைப் நிலைநாட்டி, இன்னச் சேர்ந்து அடுத்த வருடாந்தர வாழ்க்கைச் சுழற்சி ஆரம்பிக்கின்றன.

20. நிலஇயல் அமைப்பிற்கொப்ப தற்கால பறவைகளின் பரவி வசிக்கும் முறைகள்

அல்லது

தற்கால பறவைகளின் நிலஉலகப் பரப்பெங்கும் சிதறி வசிக்கும் முறைகள்

(Geographical distribution of living birds)

சரித்திரக் குறிப்பு

பறவைகளைப் பற்றிய ஆழ்ந்த ஆராய்ச்சியினாலேயே, பறவை வியல் நூல் அறிஞர்களால் உயிரியல் நூலின் பெரும்பகுதிக்கு தங்கள் படைப்பினாலும், சேர்த்து அளிக்க முடிந்தது. விலங்குகளின் நில உலகப் பரப்பெங்கும் சிதறி வசிக்கும் முறையைப் பற்றி விளக்கிக் கூறியுள்ளதே அதன் பெரும்பகுதியாகும். தற்போது வசிக்கும் பறவைகளின் உலகெங்கும் சிதறி வசிக்கும் முறையை விளக்கிக் கூறு வதிலிருந்தே ஃபிலிப் டெல்லிஸ்க்லேட்டர் (Philip lutly sclater) என்பவர் 1853-ஆம் ஆண்டு உலகின் இயற்கையான பகுதிகளை வரையறுத்து கூறியுள்ளார். அப்பகுதிகள் தெனிலந்த நாட்டிய வாத ஆகார முடையதாக விருப்பினும் அவைகளையே விலங்குகளின் நிலஉலகப் பரப்பெங்கும் சிதறி வசிக்கும் முறையைக் கண்டுகொள்ள பலன் படுத்திக் கொள்ளல் வேண்டுவதும் இன்றியமையாத தொன்றாகும். ஸ்க்லேட்டரும், டார்வினும் (Sclater, Darwin) வாலேஸ் (Wallace) தங்கள் இயற்கைத் தேர்வு கோட்பாடு பற்றி பரிணாமத்தில் கூறுவ தற்கு முன்பே இயற்கை நிலப்பரப்புப் பகுதிகளைப் பற்றி கூறி யுள்ளனர். அவர்கள் படைநிலப்பரப்புப் பகுதிகளில் ஆய்காங்கே பிராணிகள் தோன்றியிருக்கக் கூடுமென்றும் அப்பகுதிகளுக்கு எல்லைக் கோடுகளாக அமைப்பைப் பெற்ற பகுதிகள் யாவை என்பதையும்

விளக்கிக் கூற முயற்சி செய்துள்ளனர். அதாவது இயற்கையான பழைமையுள்ள மெய்ப்பொருள் மூல ஆராய்ச்சிக்குரிய பூமியின் பகுதிகளை ஆராய்ச்சியின் மூலம் விளக்கிக் கூறியுள்ளனர்.

எக்ஸ்டென்ட்ரர் கூறியுள்ள இயற்கை நிலப்பரப்பின் வகைபாடு பின்வருமாறு :

1. தொல்லுறை வடமண்டலம் (Palaeoarctic regions)

இவை வட ஆசிய ஐரோப்பிய பரப்புகளையும் அட்லான்டிக் மலைப் பகுதியின் வடக்கிலுள்ள ஆப்பிரிக்க பரப்புகளையும் குறிக்கும் பகுதியாகும்.

2. ஆப்பிரிக்கக் கண்டத்திலுள்ள எதியோப்பிய மண்டலம் அல்லது உலகின் மேற்கு தொல்லுறை வெப்ப மண்டலம் (Ethiopian or Western Palaeotropical regions).

இவை மேலே குறிப்பிட்ட வட ஆப்பிரிக்கப் பகுதியைத் தவிர மற்ற ஆப்பிரிக்க பகுதியும், தெற்கு அரேபியா நாட்டுப் பரப்புகளை குறிக்கும் பகுதியாகும்.

3. இந்திய பரப்பு அல்லது பழைய உலகின் கிழக்கு வெப்ப மண்டலப் பகுதி சங்கீத இடங்கள் (Indian or Eastern palaeotropical regions).

இவை ஆசியாவின் தெற்குப் பகுதியும் அதன் சுற்றுப்புறங்களிலுள்ள தீவுகளையும் குறிக்கும்.

4. ஆஸ்திரேலியா காண்டல் சங்கீத பகுதி (Australian regions)

இவற்றில் நியூகினியா, நியூஜீலாந்து, பசிபிக் தீவுகள் முதலியவை அடங்கும்.

5. புது உலக வட மண்டலம் அல்லது வட அமெரிக்கப் பகுதி (Neo-arctic region or north American region).

6. புது உலக வெப்பமண்டலம் அல்லது தென் அமெரிக்கப் பகுதி (Neo-tropical or south American region).

இவ்வாறு ஆறு பிரிவுகளாகப் பிரிக்கப்பட்ட பகுதிகளை, பல ஆசிரியர்கள், மீண்டும், மீண்டும் ஆராய்ந்து பலவாறாக வரிசைப் படுத்தினார்கள். எக்ஸ்டென்ட்ரர் அவர்களும் மீண்டும் இப்பகுதிகளை தீவிரமாக ஆராய்ந்து அவற்றை இரு பிரிவுகளாக மட்டுமே பிரித்தார்.

அதாவது முதல் நான்கு பகுதிகளை பேலியோஜியா (Palaeogaea) என்றும், கடைசி இரண்டு பகுதிகளான அமெரிக்கப் பகுதிகளை நியோஜியா (Neogaea) என்றும் பாகுபடுத்தினார். ஆக்சிப்ரெடு ரஸெல் வாலஸ் (Alfred russel wallace) என்ற சிறந்த விவகிலிசம் பற்றிய தன் உரை பரப்பு அறிஞர் இந்தியப் பரப்பு என்ற வக்பேட்டின் வார்த்தையை ஓரியண்டல் (Oriental) என்று மாற்றி அமைத்தார். ஹெய்ஸ்ப்ரின் (Heilprin) என்பவர் வக்பேட்டின் வகைபாட்டி துள்ள முதல் பகுதியான பழைய உலகின் வடபகுதிப் பிரிவையும் (Palaeoarctic region) புது உலகின் வடபகுதிப் பிரிவையும் (Neo-arctic region) ஆக இவ்விரண்டு பகுதிகளையும் ஒன்று சேர்த்து முக்கோண வடபகுதி பரப்பு (Tri-arctic region) என்று பெயரிட்டார். அதுவும் மறைத்து ஆக்சிப்ரெடு நியூட்டன் (Alfred Newton) என்பவர் வகுத்த ஹால்கூர்ட்டிக் (Holarctic) என்ற வார்த்தைதான் அப் பகுதிக்கு பெரும்பாலும் உபயோகப்படுத்தப்பட்டது. நியூ நியூட்டன் (Newton) ப்ளேன் கிபோர்ட் (Blan ford) போன்ற அறிஞர்களால் மறுபடியும் திருத்தி, சீர்திருத்தி அமைக்கப்பெற்று கடைசியில் டார்லிங்டன் (Darlington) என்பவரால் 1957 ஆம் ஆண்டு நிலப்பரப்பு சீழ்க்கண்டவாறு முடிவாக பாகுபடுத்தப்பட்டது.

1. முதலில் பழைய உலக வெப்ப மண்டலப் பகுதி என்றும் (Palaeotropical region), 2. ஹால்கூர்ட்டிக் பகுதி அல்லது தருவ அண்மை மண்டலம் (Holarctic region) என்றும் இரண்டு பெரும் பகுதிகளாக பிரிக்கப்பட்டன.

முதல் பகுதியான பழைய உலக வெப்ப மண்டலப்பகுதி பின்னும் எதியோப்பியன் பகுதி என்றும் (Ethiopian region) ஓரியண்டல் பகுதி (Oriental region) என்றும் இரு பிரிவுகளாக பிரிக்கப் பட்டுள்ளது.

இரண்டாம் பகுதியான ஹால்கூர்ட்டிக் பகுதி பழைய உலக வடப் பகுதி (Palaeo-arctic region) புது உலக வடப் பகுதி (Neo-arctic region) புது உலக வெப்ப மண்டலப் பகுதி (Neo-tropical region) ஆஸ்திரேலியப் பகுதி (Australian region) என்று நான்கு பிரிவுகளாகப் பிரிக்கப்பட்டுள்ளது.

அதாவது சீழ்க்கண்டவாறு வரிசைப்படுத்தலாம்

I. பழைய உலக வெப்ப மண்டலப் பகுதி (Palaeotropical region)

(1) எதியோப்பியன் விலாப்பரப்பு: ஆப்பிரிக்காவின் வட பகுதியைத் தவிர மற்ற ஆப்பிரிக்க நாட்டு பரப்பும், அபிரேசியாவின் தெற்குப் பகுதியும் இதில் அடங்கும்.

(2) ஒளியண்டல் நிலப்பரப்பு : ஆசியாவும் அதனை அடுத்துள்ள திசைகளும் இதில் அடங்கும்.

II. ஹால் ஆர்க்டிக் நிலப்பரப்பு (Holarctic region)

(3) பழைய உலகின் வடப் பகுதி (Palearctic region)

வட ஆசிய ஐரோப்பியப் பகுதியும், ஆப்பிரிக்காவின் வட பகுதியும் இதில் அடங்கும்.

(4) புது உலக வெப்ப மண்டலப் பகுதி (Neo tropical region)

மெக்ஸிகோவின் வெப்ப மண்டலப் பகுதியும் தெற்கு மத்திய அமெரிக்கப் பகுதிகளும் இதில் அடங்கும்.

(5) ஆஸ்திரேலியா பகுதி (Australian region)

ஆஸ்திரேலியா, பாபுவேஷியா, நியூகினியா, நியூஜிலாந்து முதலிய பகுதிகளாகும்.

ஸ்கிமிட் (Schmidt) என்பவரும் டார்வினிடன் முறையையே பின் பற்றி சிறிது மாற்றி மற்றுமொரு யாருமாடு 1854ஆம் ஆண்டு கொடுத்ததுள்ளார்.

நிலப்பரப்பின் இயற்கையும் எல்லைக் குறியும்

(The nature and delimitation of regions)

ஒரு குறிப்பிட்ட நிலப்பரப்பில் பல்வேறு பிராணிகள் பல்வேறு பட்ட முறைகளில் பொதுவாக பரப்பப்பட்டு வசிப்பதை டார்வினிடன் விளக்கிக் கூறியுள்ளார். மற்றும் ஒவ்வொரு விவகளை வகையும் அதன் தேவைக்கேற்ப அமைந்துள்ள இடங்களில் பரவி வளிக்கின்றதே ஆயினாலும் ஒரே இடத்தில் கூட்டமாக வசிப்பதில்லை என்பதையும் கூறியுள்ளார். குறிப்பிட்டுச் சொல்லக்கூடிய விவகளைகள் தனி யாகப் பிரித்து வைக்கப்பட்டதாலேயே (Isolation) ஒரு குறிப்பிட்ட இடத்தில் வளிக்கப் பழகிக் கொள்கின்றன என்பதை வாவன் கூறியுள்ளார். விவகளைகள் நிலப் பரப்புகளின் தடைகளானோ விவகளைக்களை கூற்றியுள்ள மற்ற தடைகளாலோதான் பிரிக்கப்படுகின்றன. பறவையினம் நூல் அறிஞர்கள் (Ornithologist) ஒரு இடத்திலிருந்து மற்றொரு இடத்திற்கு செல்லும்பொழுது ஒரு குறிப்பிட்ட இடத்தில் குறிப்பிட்ட பறவைகள் வசித்திருப்பதையும், இயற்கையின் பலதரப்பட்ட தடைகளால் ஒரு இடத்திலுள்ள விவகளைகள் மற்றொரு இடத்திலுள்ள விவகளைத்தினிலும் வேறு

பட்டு இருத்தலையும் தன்ருக அறித்துள்ளார்கள். இவ்வாறு அமைந்துள்ள எல்லைத் தடைகளாலேயே நில உடைப் பரப்பெங்கும் விவங்கினம் சிதறி வசிக்கும் முறைமை கண்டுகொள்ளுதல் எளிதாரும். எல்லைத் தடைகளாக கருதப்படும் இவை ஒரே மாதிரியாக அமைவாமல், பல்வேறு வகைகளாகவிரும்பும் என்பதற்கு பல்வேறு விவங்கினம் பல்வேறு இடங்களில் சிதறி வசிக்கும் முறையே சான்று என்று டார்விண்டன் கூறுகின்றார்.

எல்லைத் தடைகளை இரண்டு பெரும் பிரிவுகளாகப் பிரிக்கலாம். கடல் நீர் நிலப்பரப்பின் பெரும் பகுதியைப் பிரிக்கின்றது. ஆண்டு ரேவியா நிலப் பரப்பை மற்ற நாடுகளிடமிருந்து கடல் பிரிக்கின்றது. மற்றும் வட அமெரிக்காவையும் தென் அமெரிக்காவையும் அய்வாரே கடத்தான் பிரிக்கின்றது. அதே போன்று ஆசிய, ஐரோப்பிய நாடுகளை வட அமெரிக்காவிலின்றும் கடல் பிரிக்கின்றது. மற்றும் உடைப் படத்தைக் காணும்பொழுது பாலைவனம் மலைத் தொடர்ச்சிகள் முதலியவைகளும் எல்லைத் தடைகளாக அமைந்திருப்பதைக் காணலாம். எதியோப்பியா, ஒரியண்டல் நிலப் பரப்பு களில் இத்தகைய எல்லைத் தடைகளைக் காணலாம்.

ஐரோப்பா, ஆசியா, ஆப்பிரிக்க நாடுகளின் நிலப்பரப்பு களிலுள்ள வேறுபாடுகளே விவங்கினங்களின்-மூக்கியமாக முறகுத்தன்மையுள்ளவைகளின் - பரிணாமத்தை அறிந்துகொள்ள ஏதுவாக விருத்தன என்பது புதை படிவ ஆராய்ச்சியின் மூலம் தெரிய வருகின்றது. பறவைகளைப் பற்றிய புதை படிவ ஆராய்ச்சி மிகவும் குறைவாகவிரும்பதால் இதை அறிதலும் அவ்வளவு எளிதல்ல.

சாதாரணமாக அனவிர்த்த தேவையான உணவுப் பொருள்களும் செப்ப நிலையும் உள்ள இடங்களாகிய மீத உண்ணப் பிரதேசங்களிலும், எதியோப்பியா, ஒரியண்டல் முதலிய நிலப்பரப்புகளிலும் பசுவகைப்பட்ட விவங்கினங்களைக் காணலாம். பறக்கும் நிறமை பெற்றுள்ள பறவைகள் எதிரிகளால் தாக்கப்படும்பொழுது ஓர் இடத்திலிருந்து மற்றொரு இடத்திற்கு எளிதாக பறந்து பரவுகின்றன. ஒரு கண்டத்திற்கும் மற்றொரு கண்டத்திற்குமிடையில் நிலப்பரப்பே விலவாமல் கடல்நீரால் சூழ்ந்திருப்பினும் பறவைகள் தங்கள் பறக்கும் நிறமும் கடலையும் தாண்டி ஒரு இடத்திலிருந்து மற்றொரு இடத்திற்கு பறவி வளிக்கத் தொடங்கின.

உலகில் தற்கால பறவைகளின் பரவலும் அதன் விலங்கின அறிக்கியும்

ஒரு குறிப்பிட்ட பறவையினம் தனது எல்லை விலங்கினத்தை மூன்று காரணங்களைக் கொண்டு அறிகரிக்கிறது. அவையாவன :

(1) வசிப்பதற்கு சாதகமான சூழ்நிலை மாற்றங்கள் ஏற்படுமாயின் அதற்கு தகுந்தார்போல் எவ்விதைய அடிக்வித்துக்கொண்டு புதிய சூழ்நிலைக்கு ஏற்ப வாழ்க்கையை அமைத்துக்கொள்கிறது.

(2) பறவை இனத் தொகையில் மரபுவழி மாற்றங்களால் சூழ்நிலைக்கு ஏற்ப வாழும் தன்மை உயர்வதாலும், உயர்ந்த நிலையில் வாழும் சகலவற்றோடு போட்டியிடுமளவிற்கு தகுதி ஏற்படுதல்.

(3) புயல், காற்று, மழை, நில மாற்றங்கள் முதலியவற்றால் ஏற்படும் புதிய வாழிடங்களாலும் பறவைகளுக்கு எவ்வித விலை தரிப்பு ஏற்படுகிறது என்பதும். முதலாவது நிறிது காலத்திற்கு முன் வடக்குக் கண்ட பகுதிகளில் ஏற்பட்ட பருவகால மாறுதல்களால் பெரு வாரியான பறவையினங்கள் வட திசையில் தங்கள் இனப்பெருக்க எல்லைகளின் விலைதரிப்பை ஐரோப்பாவரை அடிக்வித்தன. மீன் பிடிக்கும் தொழில் அபிவிருத்தி காரணமாகவும் பறவைகள் தங்கள் எல்லைகளை உணவும் பொருளின் நிரித்தம் விலைதரிக்கின்றன. இரண்டாவது காரணப்படி இனப்பெருக்கத் தன்மையின் மாறுதல் காரணமாகவும் எவ்வித விலைதரிப்பு, செரின் பின்சு (Serin finch) ரிங் டௌஸ் (Ring dove) போன்ற பறவைகளினத்தில் ஏற்பட்டிருக்கின்றன. மூன்றாவது காரணப்படி தீவுகளில் காற்று மூலமாக வந்தடைபும் பறவையினங்கள் தங்களுக்குச் சாதகமான இடங்களில் தாங்கள் வயிக்கும் எவ்வித விலைதரிக்கின்றன.

உதாரணம் :

சென்ற நூற்றாண்டின் மத்தியில், ஆஸ்திரேலிய 'சில்வர் ஐ' (Silver eye) என்னும் பறவையினத்தின் நியூஜிலாந்து ஆக்கிரமிப்பு இதற்கு சான்றாகும்.

பொதுவாகப் பறவைகளின் எல்லை விலைதரிப்பு மேற்கூறிய எந்த வகையைச் சேர்ந்தது என்பதை நினைவாக கூற முடியாது. உதாரணமாக கேட்டில் எக்ரெட் (Cattle egret) என்னும் பறவை மீளம் வட அமெரிக்கா முதற்கொண்டு எதியோப்பியா, ஓரியண்டல், தெற்கு பேலியார்க்டிக் பகுதி, புதிய ஊரான நியூசிலாந்தும் பின்னர் வட, தெற்கு அமெரிக்காவிலும் பரவியிருப்பதை எந்த காரணத்தைக் காட்டியும் கூற முடியாது. தற்போது தெற்கு ஆப்பிரிக்காவிலும், வட ஆஸ்திரேலியாவிலும் இப்பறவைகள் வெகுவாக பரவி விருக்கின்றன.

விலைதரிப்பும் மறைதலும்

பறவையினம் முதல் முதலாக பேலியோசூதானியக் பகுதியில் எதியோப்பியன், ஓரியண்டல் பீலிகளில் தொன்றி மறை கண்டல்

களுக்கு பரவியிருக்கவாமென்று கருதப்படுகிறது. உலகில் சூழ்நிலை சாதகமாகவும் உணவுப் பொருள்கள் அபரிமிதமாகவும் இருக்குமிடங்கள் எல்லாம் எப்பொழுதும் உயிரினத்தால் நிரம்பியே இருக்கும். புதிதாக வந்து சேரும் பறவைகள் அவ்விடத்தில் ஏற்கெனவே வசித்துவரும் பறவைகளை விரட்டிவிட்டு அவ்விடத்தை தங்களின் வாசஸ்தலமாக மாற்றிக்கொள்ளின்றன. எனவே எதிர்க்கும் சக்தியற்ற தொன்மையான (Archaeic) பறவைகள் மறைந்து சக்திவாய்ந்த 'தற்கால' பறவைகள் வெற்றிகரமாக வாழத் தலைப்பட்டன. போட்டியும், எதிர்ப்புமில்லாத ஒதுக்குப் புறமான இடங்களில் தொன்மையான பறவைகள் வெறுகாலம் தலைநெத்து வாழ்ந்து வந்தன. உதாரணம் : நீயூஜினாத்தில் இன்றும் வாழ்ந்துவரும் பறம்பெரும் ஸ்பீனாஸின்னத்தின் ஒரே வாரிசு - ஸ்பீனோடான் (Sphenodon) என்பதாகும். அதிக தூரத்தால் பிரிக்கப்படும் தீவுகளில் அநேக பிராணிகள் அந்த இடத்திற்கேற்ப தனது உடல்நிலையை மாற்றி அமைத்து வாழும் திறன் படைத்ததால் இன்றும் வாழ்கின்றன; உதாரணம்:மோரிஷியஸ் தீவில் வசிக்கும் 'டோடோ'. இது முற்றும் வளராத சூட்டியின் நிலைமையே முதுமை பெற்று இனப்பெருக்கம் செய்து வாழ்ந்து வந்தன.

தீவுகளில் வாழும் பிராணிகள் அனைத்தும் சந்ததியில் புதுவிதமான, மாறுதல் ஏதுமின்றி ஒரே மாதிரியான சூழ்நிலையிலேயே வாழ்ந்து 90% அழிந்துவிடுகின்றன. ஏனெனில் இவை மாறுபட்ட சூழ்நிலையில் வாலும் தகுதியற்றதாயிருப்பதாலும் மற்ற பிராணிகளின் வருகை காரணமாகவும் எதிர்க்கும் சக்தியின்றி அழிவின்றன.

சிறிய தீவுகளில் தலைநாக்கி வாலும் பிராணிகள் பெரிய கண்டங்களில் வாலும் பிராணிகளுடன் போட்டியிட்டு அழிந்துவிடுகின்றன. உதாரணமாக ஆஸ்திரேலியாவில் வாலும் "மார்குபியஸ்" என்னும் பிராணிகள் மற்ற பெரிய பாலூட்டிகளுடன் போட்டியிட்டாலுமாயும் மனறயத் துவங்கின. எனவே டார்வினிடன் (1957) என்னும் அறிஞரின் கூற்றுப்படி "நெத்த பிராணிகளும் அவற்றின் நெத்த இனமும் நிலப்பரப்பு அதிகமுள்ள விலங்கிரணமான கண்டங்களிலேயே உற்பத்தியாகின்றன. குறுகிய விலங்கிரணமுள்ள இடத்தில் உற்பத்தியாகும் உயிரினங்கள் அநேகமாக அழிந்துவிடுகின்றன. மேலும் பரந்த கண்டங்களில் தலைச் செந்து வாலும் பிராணிகள் அபரிமிதமாகப் பெருகி, சிறிய இடங்களையும் ஆக்ரமித்து ஆங்கு வாலும் பிராணிகளை அழித்துவிடுகின்றன. இவ்வாறு உலகில் எல்லா இடங்களிலும், பரந்த பாகங்களிலுள்ள சக்திவாய்ந்த பிராணிகள் சிறிய இடங்களையும் ஆக்ரமித்து வாழ்கின்றன" என்று தெரியவருகின்றது.

இவ்வளக்கத்தை ஏற்கெனவே டார்வின் 1859ஆம் ஆண்டுவேயே “தகுதியுள்ளவையே வாழத்தகுந்தவை” (Survival of the fittest) என்று குறிப்பிட்டுள்ளார். இவ்வளக்கத்தின்படி தியோர்ட்டிக், தியோடிராபிக், ஆஸ்திரேலியா போன்ற பகுதிகளிலுள்ள ஆடுகாழ் பிராணிகள் படிப்படியாக பழைய உலக செம்பமண்டலப்பகுதியில் வாழ்ந்த பிராணிகளால் ஆக்ரமிக்கப்பட்டுள்ளன. இதனால் வெகு காலமாக வாழ்ந்து வரும் பிராணிகள் போட்டியில் அழிக்கப்பட்டன. இவ்விதமான பரவும் முறை அந்தந்த பிராணிகளுக்கு சாதகமாக அமையதைப் பொருத்திருக்கின்றது. அவற்றுள் பறவைகள் மற்றப் பிராணிகளைவிட எளிதாகப் பறந்து உலகின் எல்லா பாகங்களிலும் சென்று பரவியுள்ளன.

தியோடிராபிக் பகுதியைச் சேர்ந்த பறவைகள் தியோர்ட்டிக் பகுதிக்கு சென்று ஆப்பிரேய குடியேறிவிட்டன. ஆனால் பேலி வார்ட்டிக் பகுதியை எந்த பறவையாலும் சென்று அடையமுடிய வில்லை. அதாவது மயர் (Myer) 1946இல் கூறியபடி தென்னமேரிக்காவிலுள்ள எந்த பறவையினமும் பழைய உலகப் பகுதியைச் சேர்ந்த டைபக்கடிய ஒரு இனத்தை உண்டாக்கவில்லை. ஆனால் பழைய உலகத்தைச் சேர்ந்த பறவையினங்களிலிருந்து தென்னமேரிக்காவிற்கும் பல இனங்கள் பிசிந்து சென்றன.

ஆஸ்திரேலியா, நியூஜிலாந்தில் வாழும் பறவைகள் யாவும் ஆஸ்திரேலியாண்டத்தில் தோன்றிய பறவைகளை மூதாதைப் பறவைகளாகக் கொண்டவை. இவை டெர்ஷியர் காலத்தில் தீவிற்குத் தீவு தாழ்ந்த இடங்களை என்றும் குறிப்பிடுவதுண்டு. நேரு ஆஸ்திரேலியாவில் வெப்பதட்ப நிலைக்கெற்ப பல ஸ்தலிகளில் பல மாறுதல்களை வடைந்து தனிச் சிறப்பை ஏற்படுத்திக் கொண்டன. இவ்வாறாக இரண்டாவது முறை மாறுபாட்டைத் தந்த பறவையினங்கள் மறுபடியும் ஓரியண்டல் பிரிவினுள்ளபடி பழைய நிலையை அடையவேயில்லை. ஆனால் மெகாபோடஸ் (Megapodys) போன்ற சில இனங்கள் இவ்விரண்டு பகுதிக்கும் இடையேயுள்ள பகுதி முதல் ‘காவல்’ கொட்டையும் கடந்து ஓரியண்டலின் வெளிச் சுற்றுப்புறம் வரை வெற்றிகரமாக பரவி வாழ்ந்தன.

இயற்கைப் பகுதிகள்

பொது விளக்கம்: பகுதிநாடியாக நோக்கும்பொழுது தியோடிராபிக் பகுதியிலுள்ள பறவையினங்கள் விதவிதமானவை. மேலும் மற்ற பகுதிகளைவிட அதிகமான இனங்களைக் கொண்டவையாகவும், புதுமையான சில வகைகளைக் கொண்டதாகவும் காணப்படுகின்றன. அடுத்ததாக ஆஸ்திரேலியா கண்டம் இத்தகைய நூதனமான

வகைகளை பெருமளவிற்கு கொண்டதாயுள்ளது. பொதுவாக எடுத்துக் கொள்ளலாமாயின் பழைய உலகப் பகுதியிலுள்ள பறவை மினங்களே எண்ணிக்கையில் பெருவாரியாகவும், இனத்தில் பலவித இனங்களையுடையதாகவும் கருதப்படுகிறது. ஆஸ்திரேலியா, தென் அமெரிக்கா போன்ற பகுதிகளில் தொடர்பிழந்ததாகும் (Isolation) தோன்றிய மாறுபட்ட இனங்களைக் காணலாம். சில பறவை மினங்கள் பழைய உலகில் தோன்றிப் பின்னர் தென் அமெரிக்காவிற்கு குடியேறியவையாகவும், தோன்றிய இடத்தில் போட்டியில் காரணமாக அழியப்பட்டதாகவும் தெரிகிறது. (உ.ம்.) கதார்பிடிடே என்னும் இனத்தைச் சேர்ந்த புது உலக கழுஞ் (New old vulture) களாகும்.

எதியோப்பியன், ஓரியண்டல் பகுதிகளை பேலியார்க்டிக், நியூ ஆர்க்டிக் பகுதிகளினின்றும் ஒரு கோடு மீத உஷ்ணப் பகுதிக்கும், குளிர்ந்த வடப் பகுதிக்கும் இடையே சென்று பிரிக்கின்றது. வடப் பகுதியில் சாதகமில்லாத பருவத்தின் காரணத்தால் வசிக்கும் உயிரினங்கள் குறைந்து கொண்டே வருகின்றன. ஒரே இனத்தைச் சேர்ந்த உயிரினங்களாலும் வடதிசையிலுள்ளவை அங்கீகரித்திரி சேறிப் மாறுபட்ட குணநிலைகளைக் கொண்டு அமைந்தவையளாவியிருக்கும். பேலியார்க்டிக், நியூயார்க்டிக் பகுதியிலுள்ள இனங்கள் குறைந்தவைகளாகியுப்பிலும் எண்ணிக்கையில் பேலியோஹார்பிக், நியோஹார்பிக் பகுதியிலுள்ளதைவிட அதிகமாகவே இருக்கின்றன. இனங்கள் குறைவதால் போட்டியை தவிர்க்க முடிகிறது. இதன் காரணமாக இவ்வினங்களின் எண்ணிக்கை அதிகரிக்க ஏதுவாகிறது.

உலகமெங்கும் பரவி வசிக்கும் இனம் பாசரைன் அல்லாத பறவைகள் (உ.ம்.) பாங்க்ஸ், ஆல்பிரே, வெள்ளை எக்ரெட் பாசரைன் பறவையினத்தில் பாரின் ஸ்வாலோ என்னும் ஒன்றே எங்கும் பரவி வசிக்கின்றன.

1. எதியோப்பியன் பகுதி என்பது சமூகாராவிற்கு தெற்கேயுள்ள ஆப்பிரிக்கக் கண்டமும் அதனைச் சேர்ந்த பகுதிகளுமாகும். அரேபியாவின் தென்மேற்கு பகுதி எதியோப்பியா பகுதியை சேர்ந்ததாக டார்விண்டன் கருதுகிறார்.

எதியோப்பியா வெப்ப மண்டல பகுதிவாதனால் பலதரப்பட்ட குழந்தைகளும், பழக்கவழக்கங்களும் அமைப்பெற்றிருக்கிறது. மலைக் காடுகளும், சவாளு காடுகளும், ரூசுமிக் காடுகளும், புல் சமவெளிகளும், பாசிலையன்களும் கூடிய பவவகையான குழந்தைகளையுடையது இப்பகுதி என்னாம். இப்பகுதியில் உள்ள பெரிய நதிகளும், ஏரிகளும், சதுப்பு நிலங்களும் நீர்ப்பறவைகளுக்கு சாதகமான குழ-

நிலைகளாக அமைவின்றன. இப்பகுதியை அதன் பருவகால நிலையைக் கொண்டும், தாவர இனங்களைக் கொண்டும் பல பிரிவுகளாகப் பிரிக்கலாம். சாப்பீஸ் (1923) மொரோய் (Mureau 1952) என்பவர்கள் எதிர்பார்ப்பிய பகுதியை ஐந்து பிரிவுகளாக அதன் இயற்கை நிலையைக் கொண்டு பிரித்துள்ளனர். அவை பின்வருமாறு : 1. தாவரவளர்ச்சி அற்ற வறட்சி பிரதேசம் (கடான், சோமாலி, தென்மேற்கு வறண்ட பிரதேசம்). 2. தாழ்வான பசுமையான பிரதேசம். 3. பசுமை வாய்ந்த மலைப்பிரதேசம். 4. சனாறு காட்டுப்பகுதி (கிறத்த சாகுபடி செய்யப்படாத நிலப்பகுதி). 5. கபாங்கபன் மூர்லாண்ட்.

குளர் எவன்தில் வடப்பகுதியில் உள்ள அப்பகுதி வாழ் பறவைகளின் எண்ணிக்கை பேலியார்ட்டிக் பகுதியிலிருந்து வந்து குடியேறும் பறவைகளால் அதிகமாகப்படுகின்றன. ஆப்பிரிக்காவின் எல்லா பகுதிகளும், பெருவாரியான பறவைகளுக்கு மீதப் பகுதிகளைக் காட்டிலும், இடமளித்து ஆதரவளிக்க வேண்டியிருக்கிறது. சுமார் 1750 இனப்பெருக்க வகையைச் சேர்ந்த பறவைகள் இப்பகுதியில் வகிப்பின்றன என்று என்டெரிஸ்மன் என்பவர் கணக்கிட்டுள்ளார். நான்கு பெரிய பறவையினங்கள் எதிர்பார்ப்பியானில் மட்டுமே காணப்படுகின்றன. அவை பின்வருமாறு : (1) கிவி கோழிகள் (நிபுரிடிடே). 7 வகைகள். (2) கோலிடே ஆறுவகைகள் (Moussierids). 3. டொரகாலட் (முய்சோபெலிடே) 18 வகைகள். (4) கட்டூரப்போஸ்ட் (Phoeniculiidae) 6 வகைகள். மேலும் 2 வகை சரிக்கரைப் பறவைகளும் (Sugar birds) தென்னாப்பிரிக்காவில் மாத்திரம் காணப்படுவையாலும், 13 வகை நெறம்மட் ஷூரர்ஸும், ஆப்பிரிக்காவைச் சேர்ந்தவைகளே தான். திக்கோழி போன்ற மிகப்பழமை வாய்ந்த பறக்கும் சக்திபற்ற பறவைகளும் இங்குதான் காணப்படுகின்றன. இன்னும் சாத்திரிடே, எர்கோபிடே, பெலினிலிப்டிடே, மால்கோனேடினே, புளாஸோர்வித்திரே, லிடுனே புபுளினே போன்ற இனங்களும் இங்கு மாத்திரமே காணப்படுகின்றன. ஆப்பிரேபெனோ என்ற வகையைச் சேர்ந்த பறவை ஆப்பிரிக்காவை மட்டுமே சேர்ந்த (Endemic) பறவையாகும்.

எதிர்பார்ப்பியானில் பறவையினங்கள் ஒரேவகைப் பகுதிகளிலும் காணப்படுகின்றன. கிவி வகைகள், புருக்கள், மீன்கொத்திகள், மரக்கொத்திகள் அடுத்த பகுதிகளிலுள்ளதை விட இங்கு குறைவாகவே இருக்கின்றன. இனத்தைப் பொருத்தவரை இரண்டு சதவிகிதம்தான் இவ்விரண்டு பகுதிகளுக்கும் ஒற்றுமையுள்ளது. டெர்ஷியரி காவத்தில் இவ்விரண்டு நில பாகங்களும் ஒன்றாக இருந்துபின்னர் கடல் நீரால் பிரிக்கப்பட்டபோது ஏற்பட்ட தனித்தன்மையே இதற்குக் காரணம்.

மடகாஸ்கர் முதலிய தீவுகள் பெயோடிராபிக் பகுதியில் ஒரு பாசனாக கருதப்படுகிறது. டெர்ஷியரி காவத்திற்கு முன்பு மடகாஸ்குக்கும் ஆப்பிரிக்காவிற்கும் இடையே நீர் புருத்து பிரித்துவிட்டதால் இங்குள்ள பறவைகள் மிகவும் குறைவாகவும், தனித்தன்மை வாய்ந்ததாகவும் காணப்படுகின்றன.

2. ஓரியண்டல் பகுதி என்பது ஆசியாவின் ஒரு பகுதியும் அதனை சேர்ந்த இலங்கை, மலேயா தீபகற்பம், போர்னியோ, பார்கோசா, பிலிப்பைன்ஸ் முதலிய தீவுகளுமாகும். வடபகுதியில் பேலியார்க்டிக்வும், மிழ்க்கில் தென் சீனாவின் ஒரு பகுதியும், இந்தோனே, பர்மா, தாய்லாந்து முதலிய நாடுகளுமாகும்.

மிகக்குப் பகுதியில் இரண்டு பிரிவுகள் உள்ளன. உயிரியாழ்ப் பகுதியில் அபரிமிதமாக காணப்படுகின்றன. வடப்பிரிவான தென் சீனா, இந்தோனே, பர்மா, தாய்லாந்து மிகக்கு பகுதியின் ஒரு பிரிவாகும். இரண்டாவது பிரிவான தென் பகுதியில் மலேயா, சுமத்ரா, ஜாவா, போர்னியோ, பிலிப்பைன்ஸ் போன்ற தீவுகளுள்ளன. மேற்கு பகுதியில் இந்தியாவும், தெற்கில் இலங்கையும் உள்ளன. ஸ்கீலேட்டர் எஃப்பல் சுமார் 1500 இனங்கள் ஓரியண்டல் பகுதியில் இருப்பதாக குறிப்பிட்டுள்ளனர். இவை நியோடிராபிகல் பகுதியை விட குறைவாகவே இருக்கின்றன. சுமார் 29 வகை பாசனரன் பறவைகளும், 54 வகை பாசனரன்ஸ்களான பறவைகளுமுள்ளதாக கணக்கிடப்பட்டுள்ளது. இங்லென்னிக்கை எதியோப்பியன், நியோடிராபிகல் பகுதிகளைவிட குறைவானதாகும். ஒரே மாதிரி வான ஹிரிண்டே இனத்தைச் சேர்ந்த பதினான்கு வகை பறவைகளே ஓரியண்டல் பகுதியில் இருக்கின்றன. மற்ற இனங்கள் அடுத்துள்ள பிரிவுகளுக்கும் சென்று ஆக்ரமித்துக் கொள்கின்றன. இவ்வாறு அடுத்த பிரிவுகளோடு பறவைகள் கலந்து வாழ்வதால் புவிமயிரியல் ஆபிரியர்கள் இவ்விரண்டு பகுதிகளையும் சேர்த்து “மிகக்கு பேலியோடிராபிகல் பகுதி” என்று அழைக்கின்றனர். இவ்வாறு கலந்து வாழும் பறவைகளின் எண்ணிக்கை ஓரியண்டல் பகுதியில் அதிகமாக காணப்படுகிறது. எனவே எண்ணிக்கையும், விதவிதமான புழு, கிளி, மரங்கொத்தி, குயில், மீன்கொத்தி, காசம் போன்ற பறவையினங்களும் இங்கு எதியோப்பியன் பகுதியைவிட அதிகமாகக் காணப்படுகின்றன.

தேனீக்களைத் தின்னும் (Bee eater) பார்பெட்ஸ், கைபற் பறவைகள், தேன் சிட்டுகள், ரோலர்ஸ், மஞ்சக்குருவி போன்றவை ஓரியண்டலில் மிகவும் குறைவு.

3. பேலியார்க்டிக் பகுதி என்பது ஐரோப்பா, வடக்கு ஆப்பிரிக்கா, பெரும்பகுதி ஆசியா, அரேபியா, சரசான், ஆப்கானிஸ்தான்

தானம், திபெத்து, வடசீனா, ஐப்பாள் தீவுகள் போன்ற நாடுகளைக் கொண்டதாகும். வாலன் இப்பகுதியை தாங்கு பிரிவுகளாகப் பிரித்துள்ளார். அவை: 1. ஸைபீரியா 2. ஐரோப்பா 3. மங்கோலியா 4. மத்திய தரைக்கடல் பகுதி என்பவைகளாகும்.

இப்பகுதி பலதரப்பட்ட பருவநிலைகளையுடையதாக உயிர் வாழ்வன அதிகமில்லை. மற்றும் இவை குறைவாக இருப்பதுடன் அவ்விடத்தை சேர்ந்தவைகளாகவும் இருப்பதில்லை. மீத உஷ்ணமும் அதிக குளிர், அதிக உஷ்ணம் போன்ற பருவ நிலைகளால் இப்பகுதி நிலையான வாசன்தவமாக அமைய வழியில்லை. அவ்வப்போது வந்து தங்கிப் போகும் பறவைகளை இங்கு அதிகம் காணலாம். சுமார் 1100 வகைகள் இப்பகுதியில் இருப்பதாக ஹார்டெர்ட் (1910-1922) என்பவர் குறிப்பிடுகின்றார். பேலியோஐரோபிகல் பகுதியிலிருந்து சில பறவைகள் தெற்கு பகுதி எல்லைச் சுற்றி வருகின்றன. ஒரு சில பறவைகள் வேறு பகுதிகளினின்றும் வரும் வழியில் இவ்விடத்தில் சற்று தங்கிச் செல்லுகின்றன. அவை கிரெப், ஜெகாரா, புப்புல், குயில் முதலியன. ஒரு சில பறவைகள் இவ்விடத்தினின்றும் வடக்கு நோக்கி செல்லுவதுண்டு. அவை ஐயிஸ், புரூக்கன், பெண்ட்ஸ், மங்கோத்திகள் முதலியன. பருவநிலை சாதகமாகியவாததால் பறவைகள் நிரந்தரமாக வளிக்க முடியுமில்லை. எனவே வலசை போதல் இவ்விடத்திலுள்ள பறவைகளின் முக்கிய செய்கையாகும். குளிர் காலத்தில் தெற்கு நோக்கிலும் அவ்வது பேலியோஐரோபிகல் பகுதிகளுக்கும் வலசை போதல் இங்கு வளிக்கும் பறவைகளின் வழக்கமாகும்.

பேலியார்க்டிகல் உயிர் வாழ் பறவைகள் மொத்தம் 53 வகையில் 20 பாசரைனும், 43 பாசரைனில்வாததுமாகும். ஒரே ஒரு இனம் (பிரெனெஸ்கிடே) என்னும் நெட்பு குருவியின் 12 வகை இவ்விடத்தைச் சேர்ந்ததாகும். அதாவது அவை நிரந்தர வானிகளாகும்.

இப்பகுதியின் வடநிலையில் நீர்ப் பறவைகளைத் தவிர மற்றப் பறவைகள் அதிகம் வசிப்பதில்லை. நீர்ப் பறவைகள் பின்வருமாறு:- 1. புகுத்து (Hawk) 2. ஹான். இவை நியூயார்க்டிக்வினும், பேலியார்க்டிக்வினமாக கலந்து வசிக்கும். சில பெனிகன்சனும், அப்பகுதியில் வசிப்பதுண்டு. தூந்நிரப் பிரதேசத்தில் வாலும் வலசைப் போகும் (சாராடி) இனத்தைச் சேர்ந்த சில பறவைகள் குளிர் காலங்களில் தென்சூப்பிரீக்காவிற்கும், ஒரீயண்டல் பகுதிக்கும் ஆஸ்திரேலியா பகுதிகளுக்கும் சென்று திரும்பி இங்கேயே வந்து இனப் பெருக்கம் செய்வதுண்டு.

4. நியோயார்க்டிக் பகுதிஜோனார்க்டிக் பகுதியைச் சேர்ந்ததாகும். இது பேலியார்க்டிக் பகுதியினின்றும் மாறுபட்டது. ஆனால் பேலியோடினார்பிகல் பகுதியின் எல்லைப் ஒட்டிய பகுதியும், தியோடினார்பிகல் பகுதிக்கும், பேலியார்க்டிக் பகுதிக்கும் இடையேயுள்ள தொடர் பகுதியாகும். நிலையல் ரீதியாக வட அமெரிக்காவை ஒத்தது. டார்வினிடன் என்பவர் தியோடினார்பிகல் பகுதியை நியோயார்க்டிக்விள் வட எல்லைகளாகக் குறிப்பிட்டுள்ளார். இந்த எல்லை நிலத்திலும், நீரிலும் வாரும் மூலகுத் தன்முள்ள பிராணிகளின் பரவலைக் கொண்டு நிர்ணயிக்கப்பட்டிருக்கிறது.

வட அமெரிக்க உயிர்வாழ்வுள்ள மூன்று தனி பிரிவுகளாகப் பிரிக்கப்பட்டிருக்கிறது. இங்கு வாழ்பவை அடிக்கடி தற்காலது பண்பில் மாறும் தன்மைவுடையவை யாதலால் எந்த அடிப்படையிலோக்கத்தைக்கொண்டு பிரிப்பது என்பதே கேள்வியாகும். மேற் கூறிய பிரிவுகளில் முதல் பிரிவு (1) ஜோனார்க்டிக்—வட பாகத்தில் பெயர்பெற்ற பறவைகளின் மூக்கியத்தையும் தெற்கில் குறைகிறது.

(2) தியோடினார்பிகல் பகுதியிலுள்ள பறவைகள் தெற்கில் மூக்கிய விதமானதை வகிக்கின்றன.

(3) வட அமெரிக்க தென் பகுதியிலுள்ள பறவைகள் - மாறுபட்ட நிலையில் மூக்கியமாகக் கருதப்படுகின்றன. இப்பிரிவின் பறவைகள் பல அறிஞர்களால் அவரவர் கருத்திற்கேற்ப பலவிதமாக அமைக்கப்படுகிறது.

சுட்டெரென்மன், வட அமெரிக்காவில் சுமார் 750 இனங்கள் இருப்பதாகக் கணக்கெடுத்துள்ளார். அவற்றில் மேலியாடிரிடே என்னும் வளங்கோழி அடங்கித்து நிரந்தரமாக வசிக்கும் பறவை யாகும். சில சமயங்களில் மத்திய பகுதிகளுக்கும் பரவும் தன்மை வுடையது.

நியோடினார்பிகல் பகுதி என்பது தென் அமெரிக்கா முதல் மத்திய அமெரிக்கா, மெக்ஸிகோ, மேற்கு இந்தியத் தீவுகள் (West Indies) டிரினிடாட் முதலிய நாடுகள் கொண்டது. கரப்போரல் தீவுகளும், டிரினிடாட் டாகுள்கா எல்லைகளுக்கு அப்பாற்பட்ட பகுதிகளாகும். இப்பகுதியின் சித்தாஷன் நிலை வெப்ப மண்டலமாகும். ஆனால் வெப்ப நிலை பாலியைனத்தின் நிலையிலிருந்து உறைபனி நிலைவரை மாறுபடக்கூடியது. இப்பகுதி மூன்று பிரிவுகளாக பிரிக்கப்பட்டிருக்கிறது.

1) அமெரிசன். 2) கிழக்கு பிரேஸிலும், சிலியும். 3) மத்திய அமெரிக்காவும், மேற்கு இந்தியத் தீவுகளும் (West Indies) சேர்ந்த கரீபியன் பகுதி என்னும் மூன்று பிரிவுகளாகப் பிரிக்கப்பட்டுள்ளது.

இப்பகுதியில் பறவைகள் நிறைந்ததும், வகை வகையாகவும், வேறு எந்தப் பகுதியையும்விட அதிகமாகவும் அமைந்துள்ளது. அதாவது 63 பாசனரணல்வாததும், 26 வகை பாசனரணல் ஆக மொத்தம் 89 விதமான இனத்தைவுடையது. இவற்றுள் 16 வகை பாசனரணல்வாததும் 9 வகை பாசனரன் பறவைகளும் இப்பகுதியின் நிரந்தரமாக வசிக்கக்கூடிய பறவைகள். இப்பகுதி அதிக பறவை வினத்தைவுடைய பகுதியாகக் கருதப்படுகிறது. ஆஸ்திரேலியா இனதப்போன்ற இன்னொரு பகுதியாகும். ஸ்டெர்ன்மன் (1931) கமார் 2500 இனங்களை தென்னமெரிக்காவில் மரத்திரம் கணக்கெடுத் திருக்கிறார். உலகியேயே சுக்குவேடர் என்ற இடம் கமார் 1200 இனப்பெருக்க பறவைகளைக் கொண்ட இடம் என்று குறிப்பிட் டிருக்கிறார்.

பாசனரணல்வாத பறவைகளில் லியா, டிஜுமன், புது உலக கலுரிகள் முதலிய பறவைகள் தென்னமெரிக்காவைச் சேர்ந்த நிரத் தரமாக வசிக்கும் பறவைகள். தியோடிராபிகல் பகுதியைச் சேர்ந்த மற்ற பறவைபிணங்கள் பின்வருமாறு:

ஒவன் பறவைகள் 370 வகை, ஏறும்பு பறவைகள் (Ant birds) 323 வகை, சுப்பிடிக்கும் பறவைகள் 373 வகை. இப்படி இன்னும் பவவகை பறவைகள் மிகவும் அதிகமாக இப்பகுதியில் இருப்பதைக் காணலாம். தியோடிராபிகல் பகுதியில் ஆசின் (Oscine) என்ற பறவைகள் பின்னர் இரண்டாம் வகையாக மாறுபட்டு தியூயார்க்டிக், பேலியார்க்டிக் பகுதிகளுக்கும் பரவியுள்ளது. இவ்வாறு வேறு 100 இனங்களைச் சேர்ந்த பறவைகளும் அடுத்த பகுதிகளுக்கு பரவி யுள்ளன.

உதாரணம்: த்ரஷ் (Thrush), விரோடு போன்றவை.

தியோடிராபிகல் பகுதியில் காணப்படாத பறவைகள் பின்வரு மாறு: பட்டன் குயில், தாரை, பன்டர்ட்டு, ஹார்ன்பீல், மீன்கொத்தி, கிளி போன்ற பறவைகள் ஒருசிலவே உள்ளன.

ஆஸ்திரேலியா பகுதி என்பது ஆஸ்திரேலியா தியூவிலி, தியூஜி லாந்து, தென்மேற்கு பசுபிக் தீவுகள் ஆகியவைவாகும். ஹவாய்தீவு, தாவரம், பூச்சி வகைகள், வண்டினம், ரிப்பிகள் முதலியவற்றில் ஆஸ்திரேலியாவை ஒத்திருக்கின்றது. ஆனால் பறவைவினத்தைப் பொருத்தவரை தியூயார்க்டிக் பகுதியைச் சேர்ந்ததாகும்.

ஆஸ்திரேலிய பகுதி பின்வருமாறு பிரிக்கப்பட்டுள்ளது: 1) ஆஸ்திரேலியா கண்டம், 2) நியூகினி, 3) நியூஜினாந்தும் மற்றும் பாலினீஷியனும்—தற்கால பறவைகள் தோன்றுவதற்கு முன்பே ஆஸ்திரேலியா கண்டம் மற்ற நில பகுதியிலிருந்து கடலால் பிரிக்கப் பட்டுவிட்டது.

மூக்கிய பகுதியான ஆஸ்திரேலியா நியூகினி வெப்ப மண்டல சீதோஷ்ணத்தைக் கொண்டது. அதாவது எப்போதும் வெப்பமாகவும் வரட்சியாகவும் இருக்கும். மொத்தம் சுமார் 83 வகைப் பறவைகள் காணப்படுகின்றன. அவற்றில் 6 வகை பாசரைன் அல்லாத பறவைகளும், 11 வகை பாசரைன்களும் புதுவிதமானவை. மேயர், சர்வன்டி (Mayr, (Serventy 1944) என்பவர்கள் 551 இனத்தை ஆஸ்திரேலியா கண்டத்திற்கும் அதே அளவு நியூகினிக்குமாக, பிரித்துள்ளனர். நியூஜினாந்து கணக்குப்படி 215 இனங்கள் (புதியதாக தருவித்த வகைகள் தவிர) அவற்றில் 70 நிலத்திலும் உட்காட்டு நீரிலும் இனப்பெருக்க வகையும், 45 கடலிலும் இனப்பெருக்கம் கொள்ளும் வகையுமாகும்.

ஆஸ்திரேலியாவின் பறவையினங்கள் யாவும், ஆடுகாலத் தொட்டே பிரிக்கப்பட்டு தனித்தனி தீவு தத்தி செல்லும் வகையினங்களும் கலப்படமில்லாமல் சுயமாகவே தோன்றி அந்த இடத்திற்கே நிரந்தரமானவைவாகத் தங்கிவிட்டன. பின்னர் வந்து சேர்ந்த பறவைகளும் சூழ்நிலைக்கேற்ப இரண்டாம் மூன்றாவது மூன்று அடைந்து மற்றும் புதுவிதமான அமைப்போடு அதிகமாக அபிவிருத்தி அடைந்தன. ஆனாலும் நியோயூரோபிகல் பகுதிக்கு அடுத்தப் படிதான் இவ்வகைகளையும் எண்ணிக்கையையும் கூறவேண்டி இருக்கிறது.

மேலும் மேலும் இப்பகுதியை வந்து அடைந்த பறவைகள் பேலியோரக்டிக், பேலியோயூரோபிகல் வகையைச் சேர்ந்ததாகக் காணப்படுகின்றன. மேன் மேலும் பறவைக் கூட்டங்கள் இப்பகுதிக்கு வந்து சேர்ந்த வண்ணமிருக்கின்றன. அவற்றில் ஒன்று எகிரெட் (Cattle egret), தீயிற்குத் தீவு தத்தி வருமுறையால் ஏற்படும் பறவைகளில் கூட்டுச் சேர்க்கை இந்தப் பகுதிக்குள்ளேயே ஏற்படுகின்றது, அதாவது ஆஸ்திரேலியாவின்மீதும், நியூகினிக்கும், நியூகினிஷியன்களும் பாலினீஷியனுக்கும் வந்தவைவாகவும் இருக்கின்றது.

ஆஸ்திரேலியாவிற்கு எளிதாக போகவும் வரவும் மார்க்கம் இருந்த போதிலும் உலகெங்கும் பரவிவுள்ள பெருவாரியான பறவைகள் இவ்விடத்திற்கு வருவதில்லை. ஆதலால் இங்கு காணப்படாத மற்ற பறவையினத்தை சிறப்பாக குறிப்பிட்டுக் காட்டுகிறது.

இப்பகுதியில் இன்னாத பறவைகள் பின்வருமாறு : ப்ளெயிங்கோ, பெசண்ட், கிபிஞ்சி, பழைய உடை கழுஞ்சள், பம்பும், மரங்கொத்தி போன்றவை. ஹார்ன் பீட், ஸ்பைரக் இரண்டும் 'நியூலி'யை வந்தடைந்திருக்கின்றன. திரஷ் என்ற பறவை ஆஸ்திரேலியாவை வந்திட்டு நியூலி, பிபிசிக் நியூலி வந்து அடைந்துள்ளன.

இப்பகுதிகே உரித்தானதும், மற்ற பகுதிகளை நோக்கிச் செல்வதற்குமான சில பறவைகள் இங்கே உள்ளன. அவை ஈழ, காஸோ வேரி, சீலி, காசல், நியூஜினாத்து மாக் பீட், பெனவர் பறவை போன்றவைகள்.

பழைய உடை பிடிக்கும் பறவை ராபின்ஸ்டாட், கொட்டை தின்னும் பறவை மரக் கிரீப்பர், ஒலி உண்டாக்கும் பறவை போன்ற பறவைகள் இப்பகுதிகே சொந்தமான ஒரு சிலப் பறவைகளாகும். மற்ற பகுதிகளைவிட இப்பகுதியில் பலவகை கிளிகளைக் காணலாம். நியோடிராபிகல் பகுதியில் சுமார் 140 வகை கிளிகள் இருக்கின்றன. புறக்கனும் மீன் கொத்திகளும் இப்பகுதியில் அதிகமாகக் காணப்படுகின்றன.

இன்றும் சில நூதனமான ஒரே வகையைச் சேர்ந்த செலியாப்ஸிஸ், ஆஸ்சரானஸ் மாவ கோரின்கஸ் போன்ற பறவைகளும், அட்ரிசார்னிட் (Atrichornis), மன்யூரா (Manura) போன்ற ஆதிபாஸ ஆனிட் (Oscine) பறவைகளும் இப்பகுதியில் வசிக்கின்றன. தற்போது அவற்றில் எண்ணிக்கை குறைந்து கொண்டிருக்கிறது.

ஒரு சில பறவைகள் ஒளியண்டல் பகுதியை ஒத்திருக்கின்றன. அவை பின்வருமாறு : பூதநைட்டூர், கொண்டையுடைய தூக்கனும் குருவி, மர ஸ்வாவோஸ் போன்றவைகளாகும்.

கடற்பறவைகள் (புலி இருந்தல் முறை)

கடலால் சிங்கப்பட்ட நிலப்பகுதிகளின் பறவை மீனத்திற்கும், கடற்பறவைகளுக்கும் எந்தவிதமான தொடர்பும் இடையாது. இரண்டு முக்கிய காரணங்களால் கடற் பறவைகள் பரவுகின்றன. (1) கிடைக்கும் உணவு (2) கடுகட்ட சாதகமான நிலப்பாகம். தருவப் பகுதிகளில் எல்லா நிலப்பறவைகளும் வசிக்க முடியாதானகையால் அதிக சத்துள்ள உணவு வேண்டுமளவிற்கு கடற் பறவைகளுக்கு கிடைக்கின்றன. குளிர் அதிகமாயிருக்கும் காரணத்தால் மற்ற பறவைகள் அங்கு வசதியாக வசிக்க முடியாது. அண்டார்ட்டிக் கடலின் துள்ள கடற் நீவுகளில் இப்பறவைகள் வசதியாக கடுகட்ட இனப் பெருக்கத்தை வடைகின்றன.

மேயர் (1946) என்ற பறவைவியல் நிபுணரின் கருத்திற்கேற்ப கடற்பறவைகளின் வசிக்கும்பிடத்தை மூன்று பாகமாக பிரிக்கலாம்.

அவை (1) தெற்குக் கடற் பகுதி (2) வெப்பக் கடற் பகுதி (3) வடக்குக் கடற் பகுதி எனப்பனவாகும்.

தெற்குக் கடற் பகுதி : எக்மென் (Ekman) என்ற நிபுணர் கடற் பிராணிகள் பெரும்பாலும் அன்டார்டிக் பகுதியில் தோன்றியவை என்று குறிப்பிடுகின்றார். மிரடேஷியல் காலத்திற்கும், டெர்ஷியரி காலத்திற்குமிடையேயுள்ள காலத்தில் அன்டார்டிக் பகுதியில் குளிர்தலை நீடித்திருந்ததால் எந்தவித இடைபூறுமின்றி உயிரினங்கள் உற்பத்தியாகி பெருகி வளர்த்தன.

மர்பி (Murphy) என்பவர் கடற் பறவைகளின் பரவுதலைப் பற்றி நிறந்த முறையில் எழுதி விடுகின்றார். "தென்வெடிகாக்காயின் கடற் பறவைகள்" என்ற தலைப்பின் கீழ் 1936 ஆம் ஆண்டு கடற் பறவைகளின் இனப்பெருக்க கூட்டத்தை கடலின் மேல் மட்டத்தில் பகுதி வாரியாக ஆராய்ச்சி செய்துள்ளார்.

கடலைப் பற்றிய ஆராய்ச்சியின் பயனாக தென் கடலை (Circum polar) வட்ட ரீதியாக இரண்டு மட்டமாக பிரிக்கப்பட்டிருக்கிறது. (1) அன்டார்டிக் மட்டம் (2) அன்டார்டிக் கீழ்மட்டம் (Sub antarctic) என்று வெப்பநிலைக் கேற்றவாறும் தண்ணீரின் உப்புத் தன்மையையும் பொருத்தும் பிரிக்கப்பட்டுள்ளது. இம்மட்டங்களின் எல்லைகளை 'அன்டார்டிக் கன்வர்துன்ஸ்' என்று கூறப்படுகிறது. இவ்வெல்லையைத் தாண்டினால் உயிரினத்தில் மாறுதல் ஏற்படுகிறது. அந்தந்த மட்டத்தில் பறவைவியனங்கள் ஒரே மாநிலி இருப்பதைக் காணலாம். ஒரு மட்டத்திலிருந்து இன்னொரு மட்டத்திற்கு 'அன்டார்டிக் கன்வர்துன்ஸ்' கோட்டை கடந்து சென்றால் பறவை விலத்தில் மாறுதலை நன்குக் காணலாம்.

1. அன்டார்டிக் மட்டம் : அன்டார்டிக் பகுதியை சுற்றி இருக்கும் நீர் மட்டம் அசையாமல் நிலவாக ஓரளவு தூரத்திற்கு இருப்பதாலும், நீரின் மேல்மட்ட வெப்பநிலை கோடையில் $3-5^{\circ}\text{C}$ ஆம் குளிர்காலத்தில் $0-5^{\circ}\text{C}$ இருப்பதாலும் நீரில் மிகவும் சத்துள்ள தாவரங்கள் கரும் மிதவை உயிரினமும் (Pienkton) நிறையக் காணப்படுகின்றன. இதனால் கோடையில் கூட்டம் கூட்டமாக நிமிங்கெங்கள் இவ் விடத்தை நோக்கி வருகின்றன. இவற்றின் வருகையால் இனப் பெருக்க நிலையில் இருக்கும் கடற்பறவைகள் கவரப்பட்டு இவ் விடத்தை நோக்கி வருகின்றன. இப்பறவைகள் பின்புறமுது 1 எம்பர் பெங்குவின், அடிவேபெங்குவின், மாக்ரோனி பெங்குவின்,

ஆல்பட்ரால், அன்டார்க்டிக் பெட்ரல், க்ரேடு பெட்ரல், மூக்குளிப்பு பெட்ரல் முதலியன.

2. அன்டார்க்டிக் கீழ்மட்டப் பகுதி: வடக்கு நோக்கில் செல்லச் செல்ல கடல் நீரின் வெப்பநிலை அதிகமாகிறது. கோடையில் 3°C -ஹி குத்து 5°C -ஹை அதிகமாகின்றது. குளிர்காலத்தில் 0°C — 3°C வரை ஏறுகின்றது. இத்தலைக்கு அன்டார்க்டிக் கன்வர்டுன்ஸ் என்று பெயர். இவ்விடத்தில் பவியாக உள்ள தென்பகுதி கடல்நீர் வெப்பம் அதிகமாக உள்ள கீழ்மட்ட அன்டார்க்டிக் நீரின் கீழ் ஓழுகின்றும். மேலும் வடக்கே சென்றால் வெப்பம் இன்னும் அதிகமாகிறது. (12°C — 16°C கோடையிலும் 8°C — 12°C குளிர்காலத்திலும்) இதற்கு 'சப்டிராபிகல் கன்வர்டுன்ஸ்' என்று பெயர். இது சப்அன்டார்க்டிக் மட்டத்தில் வடக்கு எல்லைப்பகுதியாகும். சத்துபொருள், உப்பு முதலியன இந்தப் பகுதி நீரில் இன்னும் அதிகமாகிறது. பிளாக்டானும் அதிகமாகிறது. இங்கு வசிக்கும் பறவைகள், அரச பென்சுவின், நெண்டு பென்சுவின், ஆல்பட்ரால், புரு-பெட்ரல், சாம்பல்நிற பெட்ரல், மூக்குளிப்பு பெட்ரல், கார்போரேன்ட் முதலியன.

வெப்பக் கடற் பகுதி: இந்த பாகம் சப்டிராபிகல் கன்வர்டுன்ஸ் கோட்டால் சூழப்பட்டிருக்கிறது. இந்த கோடு வடக்கு தெற்கு பாகமாக 35°C -க்கும் 40°C -க்கும் இடைவில் அமைந்திருக்கிறது.

இவ்விடத்தில் டிராபிகல்—சப்டிராபிகல் பகுதி அவ்வளவு சத்துள்ள உணவுப்பொருளை உண்டாக்குவதில்லை, எனவே பறவையினத்தின் எண்ணிக்கையும் அன்டார்க்டிக் சப்அன்டார்க்டிக் பகுதிகளைக் காட்டிலும் குறைவு. கடல் மட்டத்திலும் அதிகமான பறவைகள் காணப்படுவதில்லை. திடீர்தை அடுத்தாற்போல் சில சமயம் காணப்படும். அதனால் இந்த பகுதியை செழுமையிலாத பகுதி என்று கூறுவதுண்டு. இப்பகுதியில் கடற்கரைப்பகுதி மிகவும் செழிப்புள்ளதாகவும், உணவு அதிக அளவிற்கு மேல் கிடைக்குமிடமாகவும் அமைகின்றது. ஆனால் குளிர் பகுதியைப்போல் அவ்வளவு அதிகமாக மீதவை உயிரினம் இருப்பதில்லை. இப்பகுதியிலுள்ள உயிரினங்கள் அன்டார்க்டிக் உண்ணைப் போல் பழங்கால முறையில் ஒரே விதமான சூழ்நிலையில் உருவானதாக அமைகின்றது. எக்மன் (1953) கூறியபடி உயிரினங்கள் பழங்கால முறையில் தோன்றி ஒரு மாறுதலுமின்றி, இத்தோடமேயாவ பகுதியில் வாழ்கின்றது. இத்தகைய உயிரினங்கள் பரிபிக் கடல் தீவுகளிலும் பரவுகின்றது. மிகக்கு பரிபிக் கடலில் தீவுகளில்லாததால் கடலே ஒரு தடைபாக பறவைகளின் பரவுதலுக்கு அமைகின்றது. அட்லாண்டிக் கடலில் பருவக் கோளாறு காரணமாகவும், இயற்கை கோளாறின் காரணமாகவும் கடல்வாழ் உயிரினங்கள் பரவுதல் வெகுமளாகப் பாதிக்கப்படுகிறது.

இவ்ருள்ள கடற் பறவைகள் பல வகையைச் சேர்ந்தவை. பறவைகளை டெரின், பூபிஸ் (Booby), பிளிகேட் பறவைகள் முதலியன.

வடக்குக் கடற் பகுதி : அன்டார்க்டிக் பகுதியைப் போல் மாறுபட்ட கடற்மீட்டங்கள் இப்பகுதியில் அமைவனவாக. வடக்கு கடற் பகுதிகளில் 'அன்டார்க்டிக்' பகுதியிலுள்ளதைப் போன்ற 'ஆர்க்டிக் கன்வர்தூன்ஸ்' மேற்கு பகுதியில் காணப்படுகிறது. வடனட்கைக் கோபேட இப்பகுதியில் விடையாது. வட அட்லாண்டிக் கைவிட வட பசிபிக் பகுதியில் குளிர்ந்த கடலிலுள்ள உயிரினங்கள் அதிகமாக இருக்கின்றன. ஏனெனில் டெர்ஷியரி காலத்தில் வட பசிபிக் கடல் வட அட்லாண்டிக் கைவிட உயிரினங்கள் வளர வேறு சாதகமான சூழ்நிலையை உருவாக்கி கொடுத்தது. மேலும் குளிர்ச்சியான சூழ்நிலையில் தங்களை இடத்திற்கு தகுந்தவாறு மாற்றி அமைத்துக் கொள்ளவும் அவைகளால் முடிந்தன.

வடக்குக் கடற்பகுதிப் பறவைகளில் ஆகப் பறவைகள் மூக்கிய மானவை. பெருவாரியான இனங்கள் வட பசிபிக் பகுதியில் வளிக்கின்றன. அங்கிருந்து தெற்காக அமெரிக்கா வரையிலும் பரவி உள்ளன; பலமர் என்னும் பெட்ரல் அதிகம். லேரி (Lary), டெரின், கம், ஸ்கவான், காடெட் முதலியன இப்பகுதியில் வளிக்கின்றன.

கடற் பறவைகளைப் பற்றிய பொது கருத்து

இந்தோ பசிபிக் பகுதியிலுள்ள பறவையினங்கள் டெர்ஷியரி காலத்தில் தேவான் பகுதியில் வேறுவாக பரவியிருந்த மிகத் தொன்மையான பறவையினத்தின் வழிவந்தவை என்று சர்வெண்டி (1958) குறிப்பிடுகிறார். இதோடு கிளிர்ச்சியான தெற்கு வடக்கு பகுதிகளிலிருந்தும் பறவையினங்கள் கலந்துள்ளன. இதோடுள்ள நிலையின் மாறுபாட்டால் வடக்கிலும், தெற்கிலுமாக கடற்பரப்பின் வேறுபாடுகள் தோன்றின. இதனால் பறவையினங்களில் ஏற்றத்தாழ்வு என்னும் வேறுபாடுகள் ஏற்பட்டன. அவ்வப்போது டெர்ஷியரி காலத்தில் (அதாவது பிளியோசீன்) வெப்பநிலை மட்டும் மிகக்கு அட்லாண்டிக் பகுதியிலும் மிகக்கு பசிபிக் பகுதியிலும் குறைபத் தொடங்கியதால் குளிர்ச்சியான பகுதியிலுள்ள பறவையினம் வடக்கு நோக்கிலும் தெற்கு நோக்கிலும் சென்று வளிக்கவாயின. இவ் ஊறுக ஆக்பட்ரால் பறவையினம் தெற்குக் குளிர்ந்த பகுதியினின்ற வடக்கு பசிபிக் பகுதியில் ஊழத் தொடங்கின. பல்லூர் என்னும் பெட்ரலும் இவ்வாறே மாற்று இடத்தைத் தேடிக்கொண்டன.

(Continued on page 501)

பெரிய பறவைகள்

நூற்பெயர் கோவை (Bibliography)

1. Allen G. M. Birds and their attributes
2. Armstrong. Birds display and behaviour.
3. Arthur F. Park. Making friends with Birds.
4. Lt. Col. Baker & chas M. The Birds of South India.
5. Beebe : The Bird its form and function.
6. Collias, Nicholas E. The development of Social behaviour in Birds.
7. De Beer G. Vertebrate Zoology.
8. Evans A. H. Birds (C. N. H.) vol. IX.
9. George J. Wallace. Introduction to ornithology.
10. Heilmann Gerhard. The origin of Birds.
11. Hess, Gertrude, The Birds lifes & structure, Translated by Phyllis Barclay.
12. Hymann. L. H. Comparative vertebrate Anatomy.
13. Jean Dorst: Migration of Birds.
14. Marshall A. J. Biology of Comparative physiology of Birds.
15. Mathews G. V. T. Bird Navigation.
16. Newmann. Phylum Choralata.
17. Pitelka: A distribution of birds in relation to Major Biotic Communities.
18. Parker & Haswell. A Text Book Zoology vol. II.
19. Paul D. Sturkie. Avian Physiology.
20. Romer: Vertebrate Body.
21. Salim Ali: The Book of Indian Birds.
22. Scott John Paul: Animal Behaviour.
23. Sedgwick: A Text Book of Zoology.
24. Smith Stuart: How to study Birds.
25. Thilok Chandra Majumuria: Introduction to Clua.
26. Thorpe W. H. The learning ability of Birds, Ibis.
27. Turner, C. Donnell: General Endocrinology.
28. Vane Tyne Josselyn & Andrew J. Fundamentals of Ornithology.
29. Weltmore Alexander: A classification for the Birds of the world.
30. Young. J. Z. Life of Vertebrates.

கலைச்சொற்கள்

(ஆங்கிலம்—தமிழ்)

A

Abducent	— கண்ணீர் நீள் தசை தரம்பு
Aberrant	— இயல்புக்கு மாறுபடுகிற
Accidental visitors	— தற்செயலாய் வரும் விருந்தினர்
Acromion process	— தொன்பட்டை சிழ் முள்
Adaptations	— தகவமைப்புகள்
Aeroplankton	— காற்று மிதவை உயிரிகள்
Aggressiveness	— முன்னணு உயிர்களின் தொகுதி எதிர்புத் தன்மை
Agnostic behavior	— போட்டி நடத்தை பழக்க முறை
Annual cycle	— வருடாந்தர வாழ்க்கைச் சுழற்சி
Appetitive behavior	— ஏக்க இயக்க பழக்க முறை
Arboreal	— மரங்களின் வாழும் தன்மையுள்ள
Archaic	— தொன்மையான
Aviaries	— பறவைக்கண்டு அகலது பண்ணை

B

Banding	— வளையமிடுதல்
Behavior consummatory stimuli	— தீதைய இயக்க பழக்கமுறை
Behavior courtship	— தனியாட்ட பழக்கமுறை
Behavior imprinting	— திவ்வீழ் பதித்தல் பழக்கமுறை
Binocular vision	— இருகண்ணோக்குப் பார்வை
Breeding territorialism	— இனப் பெருக்க எல்லைக்காத்தல்
Brooding	— அடைகாத்தல்
Brood parasitism	— இரவயடை காக்க விடுதல்
Brood patch	— அடைகாக்கும் இட்டு

G

Cannibalism	- தன்வின் உயிரினனும் பழக்கம்
Carion eaters	- அழுக்கும் பிணம் தின்னும் பறவைகள்
Gasques	- தலைக்கவசம்
Castration	- ஆண் இனப்பெருக்க உறுப்பாற்றழிப்பு
Cere	- சியர்
Cheanal slit-	- சொவனல் பிளவு
Continental drift	- புவிசண்டிப்பெயர்ச்சி
Convergent evolution	- குவிவுப்பரிணாமம்
Cursorial birds	- ஓடும் செயலுக்கேற்ற உறுப் பமைப்புடையன்கள்

D

Deflected	- சிற்றோக்கி வளைதல்
Delimitation	- எல்லைக்குறி
Determinate layer	- நிர்ணயான அடுக்கு
Display	- தோற்ற பகட்டுமூறை
Distress calls	- அபாயக்குரல்
Distribution	- சிதறிப்பரவல்
Diurnal migrants	- பகல் காலத்தில் வலசைபோகும் பிராணிகள்
Diving	- நீர் மூழ்குதல்

E

Ear foot plate	- காதின் பாதத்தட்டு
Eclipse plumage	- மங்கலான இறகுத் தொகுப்பு
Egg tooth	- முட்டைடப்பல்
Elastic	- நெகிழும் தன்மை, மீள் தன்மை தொய்வு
Estuary	- சுழிமுகம்

F

Fall journey migration	- மேல்மட்டத்திலிருந்து சீழிறங்கும் பிரவான வலசை போதல்
Feather cloak	- இறகுப் போர்வை
Flocking behavior	- இணைந்துள்ளும் பறவைத்திரள் பழக்கமூறை

Follicle	- பை
Foraging habits	- குதறலாகும் பழக்கம்
forage	- குதறலாடு
Foramen triosseum	- டிரோசோசியம் துளை அல்லது முவ்வெலும்புத்துளை
Fovea	- கிப்போலியா
Frequency	- அதிர்வு எண்
Frigate birds	- வெப்ப மண்டல பெரும் பறவை வகை

G

Glacial epoch	- பனிக்கட்டி திரம்பிய ஊழி மூவழுதற்காலம்
Goblet cells	- கிண்ணச் செல்கள்
Gonadectomy	- இன உறுப்பு அகற்றப்படல்
Gregarious nous	- கூட்டமாக கூடினாலும் தன்மை
Grit	- சிறு கற்கள்
Grandry corpuscles	- கிராண்ட்ரீயின் கார்ப்பசுக்கள்
Guano	- எச்சம்
Gular pouch	- குளார்ப்பை

H

Habitat	- விலக்கின இருப்பிடம்
Heirarchy	- படிநிலை
Helmet	- தலைக்கவசம்
Hiberration	- செறிதூயிற் நிலை
Homiotherony	- வெப்பக்குருதியுடைய
Hovering	- நிறகு விசித்து வானில் பறத்தல்
Hyperthyroidism	- மிகு தைராய்டு வளர்ச்சி
Hypo-thyroidism	- குறை தைராய்டு வளர்ச்சி

I

Imprinting	- நிலைவிற் பதித்தல்
Indeterminate layer	- நிலையற்ற அடுக்கு
Integumentary system	- புறப்போர்வை மண்டலம்

J

Juvenal plumage	- இளங்குஞ்சுப் பறவை இறகுத் தொகுப்பு
-----------------	-------------------------------------

	K
Keel	— அடித்தட்டைக்கலம்
	L
Lamella	— தாள்படலம்
Lapwing	— நீண்ட காலைகளை யுடைய நீர்ப் பறவை வகை
	M
Metanephros	— சடை தெளிபிரான்
Migration altitudinal	— உயரமான இடங்களை நோக்கி வயசைப்போதல்
Migration cyclic	— சுழற்சி வயசை போதல்
Migration daily	— நாள் வாரி வயசை போதல்
Migration Lunar	— மதிநிலை வயசை போதல்
Mobbing character	— தாக்கும் தன்மை
Monogamy	— ஒருதராப் பழக்கம்
Moulting	— இறகுதிரிச் செயல்
Museum	— காட்சிக் கூடம்
Myosis	— கண் பார்வை இடுக்கம்
	N
Nasopharyngeal area	— மூக்குத் தொண்டைப் பகுதி
Nephron	— சிறு நீரக நுன்குழாய்
	O
Orientation	— திசையமைவு
Origin of birds	— பறவைகளின் மரபு மூலம்
	P
Parachute	— வான்குடை மிதவை
Peck order	— கொத்து ஆணை விதி
Permanent residents	— நிரந்தர வாகிகள்
Photo perisdam	— ஒளிப்பருவ நிலை
Phylogenetic relationship	— விவங்குகளின் இனப்பிரிவு உறவு மூறை
Plunging	— திடீரென நீர்நிலை நுழைதல்

Post natal molt	— முட்டையிலிருந்து குஞ்சு வெளிவந்தவுடன் ஏற்படும் இறகுதிரட்ச்செயல்
Precocial bird	— வயதிற்கு மீதிய அறிவாற்றல் காட்டும் பறவை
Precursor	— முன்னறிவிப்பாளர்
Predator	— குறைமயாடி உண்ணும் விவக்து
Preening	— இறகுகளை கோதி விடுதல்
Pro avis	— முற்பறவை இனம்

R

Refractory period	— ஒத்திசை வற்றக்காலம்
Renaisance age	— மறுமலர்ச்சி காலம்
Reptorial birds	— பற்றிப் பிடிக்கும்கொடும் பறவை
Rookery	— காக வகைப்பறவை வாழ்மிடம்
Roosting	— பறவைத் தூங்கும் நிலை

S

Sanctuary	— புசுலரன்
Satellite cells	— துணைச் செல்கள்
Savana	— வெப்பமண்டல புற்சமவெளி
Scansorial	— பற்றி ஏறுவதற்கான கால்களின் தகவமைப்புடைய
Screamer	— கிரீச்சிடுகிற பறவை
Sexual dimorphism	— பால்வழி இரு தோற்றமைப்பு
Soaring	— உயரத்தில் சிறைடிக்காமல் மிதந்து பறத்தல்
Social hierarchy	— கூடி வாழும்படிநிலைச் சமுதாய அமைப்பு
Spur	— குதி முள்
Stapideal complex	— ஸ்டெப் பீடியல் சிக்கலுறுப்பு
Stoop	— கழுதூப் பால்ச்சல்
Suet	— ஊன் கொழுப்பு
Survival of the fittest	— தகுதி உள் ளவை வாழ்த் தகுந்தவை
Syndactylous	— தோளிறைமத்தால் இணைத்த விரல்கள்
Syringeal muscle	— ஊறு குழல் தசை அங்னது ஒலிப் பெட்டித்தசை

T

Tactile sense organs	- தொடு உணர்வு உறுப்புகள்
Talon	- கொடும் பறவையின் கர் தகம்
Target organ	- உறு வட்ட உறுப்பு
Tardidity	- செயலற்ற பருவத் துவில்
Temperament	- உளப்பாங்கு
Territory	- எல்லை
Tetany	- தரம்பிடுவு
Trial and error	- முயற்சி தோல்விக்குப்பின் சுற்றல்
Trigger	- விசை விம்
Tympaniform membrane	- செவிப்பறைப் படலம்

U

Up hill planter birds	- குன்றின்மேல் செடி வளர்க்க உதவும் பறவை
Uropygium	- பூரோடைபெயம்

V

Vagrants	- அலைந்து திரியும் நாடோடி
Vibration receptors	- அதிர்வு உணர்ச்சி உறுப்புகள்

W

Wading birds	- நீரில்நடப்பதற்குரிய பாதத் தகவமைப்பினைவுடைய பறவைகள்
Whip poor will	- இராக் உவற் பறவை

Z

Zoogeography	- புவிவியல் விலங்கின பரப்பீடு
Zygodactylous	- எதிர் எதிர் இணையான விரல்கள் அமைந்த கால்கள்

