

சரவ்வுடி சங்கம் பிரசுரம்: 21

அனுபவ வைத்திய ரத்தினம்
(இரண்டாவது பாகம்)

சிகிச்சா முருதம்

நூலாசிரியர் :

சென்னை சரவ்வுடி சங்கம்

சுவாமிகள்.



சரவ்வுதி சங்கம்,

28, பிடாரியா: கோவில் தெருவு,

சென்னை.

T: 4:6

N 32

1932

[ஏண்] 8

85325

சரஸ்வதி சங்கம் பிரசுரம்: 21

அனுபவ வைத்திய ரத்தினம்
(இரண்டாவது பாகம்)

திகிச்சா முருதம்

நூலாசிரியர் :

சென்னை சரஸ்வதி சங்கம்

சுவாமிகள்.



சரஸ்வதி சங்கம்,
28, பிடாரியா:கோவில் தெருவு,
சென்னை.

1932

எலை]

[அலை 8

தன்னையறிந்தவனே தகுந்த வைத்தியன்.
தான் நோயற்றவன் என்னும்
என்னமே பரம ஒளடதம்.
இயற்கை வைத்தியமே சிறப்பான
சிகிச்சை.
பட்டினியே பினி நீக்குவதற்கு வழி.
பச்சை சைவ ஆகாரமே சிறந்த உணவு.
சுத்த ஜலமே சிறந்த பானகட்.



PRINTED AT THE
SARASWATHI SANGHAM PRESS
28, Pillaiar Kovil St., G. T.
MADRAS

அட்டவணை

விடையும்	பக்கம்
ஆரோக்கியமும் நோயும்	1
வியாதி	"
வியாதியின் நிதானம்	2
வியாதியின் பூர்வானம்	3
வியாதியின் சொரூபம்	4
வியாதியைக் குறிப்பிட்டதல்	9
வியாதியின் முழுவு	11
1. அரோசகம்	13
2. மலபந்தம்	14
3. வரங்தி	17
4. வயிற்றுவலி	18
5. பேத—சிதபேதி	19
6. சுரம்	21
7. தலைவலி	23
8. இருமல்	31
9. மூத்திரக் குறைவு	33
10. மதுமேகம்	35
11. தூக்கம் கெடுதல்	38
12. பலஹினம்	40
13. மயக்கம்—அபஸ்மாரம்—வலி முதனியன	42
14. இரத்தப் பிரவாகம்	43
15. சுவாசகாசம்	45

IV

16.	கஷயம்	...	47
17.	மேகம்	...	50
18.	வெள்ளை	...	53
19.	துஷ்டம்	...	54
20.	இருதல நோய்	...	57
21.	மனை விபாதிகள்	...	59
22.	ரீக்கம்	...	63
23.	சொற்—சிறங்கு—படை	...	65
24.	காயம்—கடி—இரண்கள்	...	66
	ஸ்திரீசளின் கெற்ப நோய்கள்		71
	கெற்பிணி சிகிச்சை	...	77
	ஏரசல சிகிச்சை	...	81
	சிசு பரிபாலனம்	...	87

புகவை

மக்கள் யாவரும் நோயைத் தடுத்து ஆரோக்யமடை மும்பிமித்தமாக எம்மால் ஏழுதப்பட்ட ஆரோக்கிய நூலை பக்கியோடு படித்திருந்தால் நுவர்கள் நோயின் விவாதிக்கூடிட. அந்தநூலில் நோயைத் தடுப்பதற்கு வேண்டிய விதி களை விதீசுவத்டாய்க் காணலாம். சில இடங்களில் நோயின் காரணங்களும் அதன் சிகிச்சையும் வெரு சூக்ஷ்மமாக கூறப்பட்டுள்ளன. நோய் வந்த காலத்தில் அதன் நிவாரணைக்காக வேண்டிய விதிகள் இந்தவைத்தியநூலில் காணலாம். ஒவ்வொரு நோயுக்கு காரணமும் அதன் லக்ஷணங்களும் அதற்கு வேண்டிய சிகிச்சை முறைகளும் இப்புத்தகச்தில் எழுதியுள்ளன. நோயின் காரணத்தை ஒரு வன் தெருந்து கொள்ளுவானேயாயின் அதன் பரிகாரத்தை அவன் தேடிக் கொள்ளக்கூடும். ஆகையினால் இந்தநூலில் நோயின்காரணம் விரிவாக எழுஷப்பட்டுள்ளது.

அரேகடாக நோயின் காரணத்தைத் தெரிந்து கொள்ளும் அங்க மாற்றிக்கொண்டால் வந்த நோய் விபரீதமாகாமல் பரிகரீக்கவும் இனிசீமல் வரும் நோயை வராமற்படியும் காப்பாற்றிக் கொள்ளலாம். இந்த காரணத்தினாலேலேயே உலகிலுள்ள பலவைத்திப்சாஸ்திரங்களுக்கால் மூலம் பலமான ஒளவத்தங்கள் அந்தந்த நோயின் சிகிச்சை பாகத்தில் காண்பதாகும். மனிதனுடைய ஆகாரம், வழக்கபழக்கபழுதலியலவகள் நாலேலேயே அநேக நோய்கள் தோன்றுகின்றன. ஆகையால் அவைகளை கவனிப்பதினாலேயே வந்த நோய்கள் தீரும். ஆனால் இவைகளை அதுசரித்து போக முடிபாதவர்களுக்கு ஆங்காங்கு சில ஒளவத்தங்களையும் சிகிச்சையாக காணலாம்.

இப்பற்றக்கூடிய விட்டு சேர்க்கை வழியில் நடப்பதே அனேக வியாதிகளுக்கு காரணமாக இருப்பதினாலேயே சேர்க்கை வழிக்கு வந்தவன் மறுபடியும் இயற்கைவழிக்கு திரும்பி அநேகமாக ஒரு வைத்தியன்உதவியின்றிட் தன க்கு வந்த நோயை தாடின் தீர்த்துக் கொள்ளும் விதிகளே இதில் விசேஷமாகக் காணலாம். ஆகார தோஷங்களினாலேயே அநேக நோய்கள் வரக்கூடு மாகையால் சிகிச்சா பகுதியில் ஆகார சியமங்கள் பலமாகத் தோன்றும்.

உலகிலும் நம் தேசத்திலும் ஆயர்வேத சாஸ்திரங்கள் பல இருக்க இந்த நவீன நூல் தோன்றுவதற்கு உத்தேசம் என்ன வென்னும் கேள்வி சுக்ஞாகப் பறக்கும். பலவித வைத்திய சாஸ்திரகளுக்களில் ஒவ்வொருவனும் தனது சாஸ்திரத்தை அநேகமாகப் புகழ்வுத்திடும் மற்ற சாஸ்திரங்களை கிந்திப்பதையும் நாம் பார்க்கிறோம். ஒவ்வொருவனும் நோயின் நிவாரணமில் தனது சிகிச்சா முறையே சிறந்த தென்னும் விபரீத புத்தி யுடையவனும் இருக்கிறுன். சாஸ்திர காத்தர்களாகிய பூர்வீகர்களிடத் தில் பூரண பகுதி வைத்து அதன்படி நடப்பது வைத்திடப் பெற்று நோயிலுக்கு அநுகூலமாயினால் அந்த வைத்திட யனிடத்தில் சுவானுபவம் வந்த பிறகு பகுதிய சாஸ்திரங்களில் இருக்கக்கூடிய குறைவுகளை சீர்ப்படுத்துவது இவ்வுடைய கடமையாகும்-

நோயின் வகுணங்களின் விஷயத்தில் யாரும் விவாதம் சொல்வதற்கில்லை. ஆனால் நோயின் காரண விஷயத்திலும் சிகிச்சை விஷயத்திலும் எவ்வளவோ விதத்தியாச முண்டு. காரணத்தைத் தெரிந்துக் கொண்டால் காரியத்தைத் தெரிந்துக் கொள்ளலாம். நோயின் காரண விஷயத்தில் அபிப்ராய பேதம் இருப்பின் சிகிச்சை விஷயத்தில் அபிப்ராய பேதம் வந்தே தீரும், காரண விஷயப்த

தில் பல சாஸ்திரங்கள் பலவிதமாகக் கூறினும் அந்த சாஸ்திரங்களி லுள்ள நமது அநுபவத்திற்கு வந்த உண்மையான தத்துவங்களை ஆதரித்து நமது சொந்த அநுபவத்தை இதில் கூறியுள்ளோம். பூச்சிகளே அநேக வியாதிகளுக்குக் காரணமானாலும் கேள் சாட்டார் கொள்கையை நாம் பூரணமாகக் கண்டித்து நமது ஆயுர்வேத அல்லது சித்த வைத்திபத்தின் கொள்கையை ஆதரிக்கிறோம். இதிலும் நமக்கு கொள்கை அபிப்ராய பேதமுண்டு. சிகிச்சை விஷயத்தில் நமக்கும் மேல் சாட்டார் அல்லது பாரதிய வைத்திய நால்களுக்கும் எவ்வளவே அபிப்ராய பேதங்களுண்டு. காரணத்தை சீர்ப்படுத்தி இயற்கை சிகிச்சையை அநுசரிப்பது இந்நுலின் முக்கிய சருத்தாகும். நமது ஆரோக்கிய நூலில் காணப்படும் சுத்த இடம் முதலிய ஒன்பது சாத்யங்களை ஒருவகை அநுசரித்து வந்தால் ஒன்றிதம் உபயோகப்படுத்தாமலே நோய் திரும் என்பது நமது சித்தாந்தம். ஆகார நிபந்தனைகளையும் சில மூலிகைகளையும் நாம் ஆதரித்தாலும் பாதான் திரவ்வியங்களை சிகிச்சையரக நாம் ஆதரிப்பதில்லை.

காரணம் ஏதாயினும் சரி, சரீரத்திலுள்ள தாதுக்கள் கெடுவதே நோய்க்கு காரணமாதலின் ஆக்காரணத்தை நிவரித்திசெய்துகொண்டால் தாதுக்கள் தமதுபூர்வ நிலைமைக்கு வந்து தெகரசுகட்டையக்கூடும். வைத்தியம் தெரிந்தவதே நூற்று தெரியாதவற்றை சிகிச்சை செய்யுங்கால் நோயைப் போக்கு ஆரோக்கியந்தரும் உபாயங்களைத் தேடுவேண்டுமெயாழிப் பிழைக்கடைய சிகிச்சையினால் வைத்திபம் நடத்துக்காலமாவது பிறகாவது பலவித நோய்களுக்கே தூவாயிருக்கக்கூடாது. சரீசதத்துவர், பதார்த்த குணஞ்சாலாம் இவைகளில் கண்ணாக பழக்கிடுவால் வைத்திய நிபுணர்வை பாதானங்களையும் கடினமான மூலிகைகளையும் கையாளவேண்டும். வைத்திய நிபுணர்

IV

கன்கட ஆசார விவகார நியமங்களும் சாதாரண மூல கைகளையும் உபயோகித்தால் போதும்.

சரீர பிரச்சுருதியின் ஞானமும் ஆரோக்கியமாயிருக்கும்போது சரீரத்தின் நிலையைப் பெறவிருக்கும் தொகை கண்டறிவதற்கும் அதற்குச் சாதாரணமாகும். ஆகவே நமது அனுபவவைத் தியரித்தினத்தின் முதற்பாகபாகிப் பரீரத்துவம் என்னும் நுலை படித்த பிறகே இதைப் படிக்கவேண்டும்.

ஒவ்வொத்தத்தினுடைய குணங்களும் அவைகளின் சுத்தியும் அவைகளை ஒன்றே பெடான்று சேர்க்கும் முறைகளும் நமது பதார்த்த குணபோதினியைப் படித்த செரிந்துகொள்ளவேண்டும். பக்தியோடு இந்நூலைப் படித்து நோய் தீர்ப்பதற்கு தனக்குத்தானே சகாயமாயிருக்கக் கூடுமாயிலும் அனுபவசாலிகளான வைத்தியர்களினைச்சாய்யும் பெற்று நடப்பது எலம். அவருடைய உபதேசம் இந்நூலின் கருத்துக்குச் சகாயமாயிருக்கவேண்டும். தபங்கு இதம் கோரும் அனுபவசாலிகளான வைத்தியர்களோடு பழக்கும், அவர்களின் மூலாக வைத்தியசாலைகளில் பலவித நோயாளிகளைப் பரிசீலனைத்துக் கொண்டு வந்தால் நாளைடவில் இந்நால் ஒருவளை வைத்திய பிபுணருக்கக்கூடும்.

நோய் இன்னதென்ற குறிப்பிட்ட பிறகே திகிச்சை செய்யவேண்டிய விதி இருப்பதற்குல் சரீர பர்சோதனை நன்றாக செய்து நோயின் நிலையைப் பெறவிருக்கும் கொண்டு சிகிச்சை செய்யவேண்டும். நமது சரீர பர்சோதனை என்னும் நூல் நோயைக் குறிப்பிடுவதற்கு அனுகூலமாகும்.

சென்னை: }
4-1-32 }

ஆசிரியர்.

அனுபவ வைத்திய ரத்தினம்.

(இரண்டாம் பாகம்)

சிகிச்சா முருதம்.

ஆரோக்கியமும் நோயும்

நமது ஆரோக்கிய நலையும் சீரை தத்துவம், மனை தத்துவம், ஆத்ம தத்துவம், இவைகளைப் பக்தியோடு வாசித்திருப்பவர்களுக்கு ஆரோக்கிய மெத்தன்றும் அதைக் காபாற்றிக் கொள்வதற்குச் சாதனைகள் எவ்வ யென்றும் வியாதிகளுக்குக் காரணம் என்ன வென்றும் தெரியும். ஸதூஸ்குஷம் சீரத்தீல் எவ்விதமான டிடை யின்றி அந்தந்தக் கருவிகள் தமது இபற்கபான கருமங்கள் செய்து கொண்டு வருகையில் ஒருவன் எந்தத் தக்கமு யின்றி ஆனந்தமாக இருக்கும் நிலையே ஆரோக்கிய மாகும். இதற்கு எதிர் முறை யானது நோய் எனப்படும்.

வியாதி

1. காரணம் அல்லது நிதானம். 2. பூர்வரூபம்
3. செரளுபம். 4. குறிப்பிடுதல். 5. சிகிச்சை.

6. முடிவு என்றாலூறு விதமாக ஒவ்வொரு வியாதி யின் பிரிவாகும்.

1. நிதானம்

வியாதிகளுக்கு காரணம் எவ்வளவோடு-இன்டு. எதனால் சரீரத்தின் இயற்கைத் தொழிலில் கெடுமோ அதுவே வியாதிக்குக் காரணமாகும். சரீரத்தில் அள்ள பஞ்ச பூதங்களும், சப்த தாதுக்களும், இவை களினு லுண்டான பல விதமான கருவிகள் தமது கார்யங்களைச் சரியாகச் செய்யும் வரையில் நோயில்லை. சரீரம் போன்றிக்கப்படும் காலத்தி லெல்லாம் மலம் கழிந்து கொண்டேவரும். போன்றையினுக்கிரித்து மலங்கள் அளவோடும் கிரமத்தோடும் வெளிப்படாது கொண்டிட வரும்வரையில் நோய் தோன்றுவதில்லை. தாதுகளின் வளர்ச்சி அதிகமானாலும் குறைந்தாலும் நோய்கானும். மலங்கள் அதிக மாகவாவது குறைந்தாவது வெளிப்பட்டால் வியாதி சம்பவிக்கும். வியாதிகளுக்குக் காரணமானவைகள் தோஷங்களானப்படும். இந்தத் தோஷங்கள் சரீரத்திலுள்ள தோஷங்களைன்றும் வெளியிலிருந்து சேரும் தோஷமென்றும் இரண்டு விதப்படிம். தோஷங்கள் பலவிருப்பினும் நமது ஆயுள்வேத நூலில் வாதம், பித்தம், கபம், என்னும் முவ்வகையான தோஷங்களையே தோஷங்களைன் பார்க்கல். திரி தோஷங்களைப்பன இவையேயாகும். மலம், முத்திரம், வியர்வை முதலிய மலங்கள் சரியாக வெளிப்படா விட்டாலும் தோஷங்கள் கானும். வெளிப்புறத்தி ஸிருந்து சரீரத்திற் குள்

வேளை பிரவேசிக்கும் ஆகார தோஷங்களும் பஞ்சடூத தோஷங்களும் தாது வர்க்கம், மர வர்க்கம், ஜெக் அவர்க்கம், இவைகளின் மூலமாகச் சேரும் தோஷங்களும் தோஷங்க எனப்படும்.

மேலும் சரீரத்திலுள்ளே உற்பத்தி யாகும் தோஷம் பெற்றேர்களின் மூலமாக வந்த தோஷங்க என்றும் சரீரத்தில் பிறகு ஏற்பட்டுள்ள தோஷங்க என்றும் இரண்டு விதப்படும்.

நித்தியா நித்தியவஸ்து விசாரணை செய்யாதவர்தமது சரீரத்திலும் உலகப் பொருளின் விஷயத்திலும் பற்றியையவ ராகையால் அவாது மனம் கவலைக்கு வசமாகும். பயம், சந்தேகம், கோபம், ஆஸக, பகை முதலிய குணங்களினால் பீடிக்கப்பட்டாராய் இருப்பார்கள். ஆராய்ச்சி செய்யாத அறிவுக்கு உட்படும் இத்தகைய மனத்தின் விகற் பங்களே அுனைக நோய்களுக்குக் காரணங்களாகும். பயம், சந்தேகம், கவலையைய மனத்தினால் இல்லாத நோய்கள் சம்பவிக்கின்றன. அற்ப நோயும் மனத்தினால்தான் விபரீதங்கில்லை யடைகிறது.

2. பூர்வரூபம்

ஒர் வியாதியின் வகுக்கணங்கள் பலமாகத் தோன்றுமல் அனுபவிக்கும் அற்ப பாகதைகள் பூர்வரூபமாகும். வியாதி காண்பதற்குச் சில நாட்களுக்கு அல்லது மாதங்களுக்கு முன்பாக பூர்வரூபம் கொஞ்சமாய்த் தோன்றும். அற்பசரம், இருமல், அரோசகம, மலபந்தம், பேதி, அஜீரணம்

தலைவரி. தூக்கம் கேடுதல் முதலியவைகள் பூர்வ ரூபமாகுப்.

3. சொருபம்

நோயின் வகுணங்களை சொருபமாகும். பூர்வ ரூபம் முற்றி சொருபமாக முடியும். நோயாளி யுணரும் வகுணங்க என்றும் வைத்தியனுக்குத் தோன்றும் வகுணங்க என்றும் சொருபம் இரண்டு விதப்படும்.

(அ) நோயாளி உணரும் வகுணங்கள்

1. ஆரோக்கம்—இதுவே ஆகாரதுபீவஷமாகும். ஆரோக்கியமாக இருக்குங்காலத்திலுள்ள நாக்குருசி கெடும். எந்த ஆகாரத்திலும் பிரிபமில்லை.

1. (அ) அதீக தாடம் அல்லது பசி.

2. தலைவலி.—ஒரு பக்கம் அல்லது இரு பக்கத்தில் தலைவரி இருக்குப்; வலி அல்லது குத்தல் இடைவிடாமல் விருக்குப்; அல்லது விட்டு விட்டிக்கானும்,

2. (ஆ) மற்ற இடத்தில் வலி அல்லது துத்தல்:— கை கால், சமுத்து, கண், காது முதலிய இந்திரியங்கள், சமுத்து, மார்பு, வயிறு முதலிய பாகங்களில் விட்டு விட்டு அல்லது விடாமல் வலி அல்லது குத்தல் இருக்கும்.

3. குமட்டல் அல்லது வாந்தி:— அதிகாலையிலாவது வேறு நேரத்திலாவது குபட்டல் அல்லது வாந்தி கானும். ஆகாரத்தையாவது, பானங்களை

சிச்சா முருதம்

5

யாவது, உட்கொண்டால் வாந்தி இன்னும் அதிகமாகும்.

4. சும்:—விட்டு விட்டு அல்லது விடாமற்காயும். குளிரோடு வரும்; குளிரில்லாமல் காடும்.

5. வழிப்புப்புஸம் அல்லது பாம்:—ஆகாரம் உட்கொண்ட காலக்குதிலும் பிறகும் உப்புஸ மிருக்கும். வயிரெல்லாம் மந்தமாகவே இருக்கும்.

6. மலபந்தம்:—மல விஸர்ஜன மில்லை. அல்லது கஷ்டமாக வெளிப்படும்.

7. பேதி:—ஆகாரம் தின்ற உடனே அல்லது வேறு நேரத்தில் அடுக்கடி குழப்பாகப் பேதியாகும். மஞ்சளாகவும், சிவப்பாகவும் இருக்கும். சிடீலஷ்மம் கலந்து அல்லது ரத்தப் கலந்து அல்லது இரண்டும் கலந்ததாக இருக்கும். மல விஸர்ஜனை காலத்தில் நோய் அல்லது குத்தல் இருக்கும்.

8. முத்திரபாதை:—முத்திர விஸர்ஜனை காலத்தில் ஏரிச்சல் அல்லது முத்திரக்குறைவு அல்லது அதிகமாக சீழு, ரத்தம் அல்லது மணல் கலந்த முத்திரம் இருக்கும்.

9. பிந்துஸ்கலிதம்:—அடிக்கடி பிந்து நஷ்டமாகும். வெளியாகும் பொழுது ஏரிச்சல் உண்டாகும்.

10. பேநுழச்சு:—எப்பொழுதும் விடவேண்டிய மூச்சுக்கு அதிகமாக மூச்சுவிடுதல் அல்லது, அற்பவேலை செய்தாலாவது, நடந்தாலாவது, பேசினாலாவது, சாப்பிட்ட உடனேயாவது மூச்ச அதிகமாகும்.

11. இடுல்:—உஷ்ணத்தினுடோ குளிர்மையினுடோ அடிக்கடி. இருமல் காணும் கபம் வெளிப்படும். அல்லது படாம் விருக்கும். கபம், நீராயும், நூரை நூரை மாகவும், கட்டியாசவுர், ரத்தம் அல்லது சீழ் கலங்கும் வர்சனை யுடையதுமாக இருக்குப்,

12. ஆபாஸமும் மயங்கமும்:—சம்மா யிருக்கும் பொருதாவது மற்றக் காலத்திலாவது ஆபாஸம் காணும்; வேலைசெய்தால், பேசினால், நடக்கால் இது அதிகமாகும்; இதோடு இருதயத்தின் துடுப்பு இருக்கும்; இல்லாமலும் இருக்கும்.

13. தூக்கம் கேடுதல்:—தூக்கம் கெடுப்; அல்லது கொஞ்சம்மாத்திரம் தூக்கம்வருப்பானம் அலையும்; அடிக்கடி கணவு கோன்றும்.

14. ரத்தம் விழுதல்:—முக்கு, தொண்டை, வரய மலத்துவாரம், மூத்திர துவாரம், கர்ப்ப துவாரம் மூலமாக ரத்தம் வெளிப்படுப். விட்டு விட்டு அல்லது விடாமல் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அல்லது அதிகமாக விழும்.

15. நூணேந்திரிய கர்மேந்திரியங்களின் சேயல்கள்:—பலவினமாக இருத்தல் அல்லது முழுவதும் சூன்யமாக இருத்தல்.

வைத்தியனுக்குடைான்றும் லக்ஷணங்கள்

1. நிறம்:—ஏதோ ஓர் பாகத்தில், அல்லது பாகங்களில் தேரிலின் நிறம் கறுப்பாகவோ, வெண்மையாகவோ, மஞ்சளாகவோ, சிகப்பாகவோ மாறுதல்.

2. மயிரி:—அதை குறைவு அல்லது ஆங்காங்கு விடுந்துவிடதல், சிறம் பாறுதல் முதலியன.

3. வீங்கமி:—ஏதோ ஒர்பாகம் அல்லது சிலபாகங்களில் அல்லது தேசமுழவதும் வீங்குதல், வீக்கம், சிறம் மாறியும், மாறுமலும், நோயுடனும், நோயில்லாமலும் இருக்கும். அழுத்தினால் பள்ளம் விடுவிடும்; விழாமலுமிருக்கும்,

4. நீத்தநாடிகளின் வீங்கம் அல்லது துடிப்பு:—கைகால்கள், மார்பு, கழுத்து, வயிறு, இவ்விடங்களில் சிரைகள் பெருத்திருக்கும்; மார்பிலும் கழுத்திலும் தமனிகளின் துடிப்பும் சிரைகளின் வீங்கமும் காணும். இருதயத்தின் துடிப்பு அதைமாகவும் மார்பின் மீல் விஸ்தாரமாகப் பரவிய மிருக்கும்.

5. சோரியும் பஸ்டயும்:—சிலபாகங்களில் அல்லது கைமுழுப்பதிலும் தோன்றுப்; நிறத்திலும் நோயின் உணர்ச்சியிலும் இவைகள் வேறு படிர்.

6. சதையின் வளர்ச்சி:—தலை, முகம், வாய், முக்கு, தொண்ணடை, காது, கழுத்து, கை கால்கள், மல, முத்திர கார்ப்ப துவாரங்கள், இவ்விடங்களில் காணும். சிறம், அளவு, வடவம், இவைகளில் வேறுபடும்.

7. நினோரீ நோளங்களின் வீங்கம்:—கழுந்து, அக்குள், தொடை, சந்து, வயிறு, முழங்கை, முழங்கால்களி விருக்கும் கோளங்கள் வீங்கும். இவைகள் நோவாடும் நோயில்லாமலுமிருக்கும்.

8. வேப்பு, எணம்:—ஷக சால்க்கீல் விசேஷ
மாக தோன்றும். மற்றவிடங்களிலும் காணலாம்.
அளவு, நிறம், ஏழவத்தில் வேறுபடும். நீர், சீழ்,
அல்லது ரத்தம் தனி பே அல்லது கலந்துகரக்கும்.
நோய் இருக்கும்; இல்லாம விருக்கும்.

9. அங்கவீனம்:—ஷககால், தொண்டை, வாக்கு
காத, நாக்கு, ஐனைனந் தீயிரங்கள் முதலிபவைகள்
பிறப்பிலோ பிறதோ காலமாக இருந்து தட்டு சார்
யங்களைச் செவ்வைன செப்பாமலும் அல்லது பூர்
னைம் செய்பாமலும் இருக்கல்.

10. நாடி:—சரம். பலவிளம், வாதப், பித்தம்
கபர், தனிப்பை துவந்தவம் அல்லது சண்னி நாடி
யாக இருக்கும்.

11. நாக்கு:—மாவு, வெட்டப்பு, உலர்வு, சரம்,
அதிக மான ரணம் உடையதாய் இருக்கலாம்.

12. தோண்டையில்வார்ச்சி:—கோளங்கள் அல்
லது சிறு நாக்கு வளர்ந்து இருக்கும்.

13. ஒருதயம்:—இதன் ஸ்கானம் மாறியிருக்கும், அதன் தூடிப்பும் பலவிதக்கில் மிகுதியாகப்
படும்.

14. நுரையீரல்லை:—உச்சவாசம், நிச்சவாசம்
மாறும். நுரையீரல் வீங்கெயி நக்கும் வஷணங்களிருக்கும். அதை களுக்குள்ளே சபப், கட்டிரணங்கள்,
முதலிபவைகள் இருக்கும் குறிகளைப் பார்க்கலாம்.

15. வழிந்தை:—ஷாட்டால் அல்லது தட்டி
ஞல் அதன் இயற்கை சப்தம் மாறி இருக்கும்.

கல்லீரல், மண்ணீரல், சூடல் முதலியவைகளின் வீக்கங்களின் குறிகளைக் காணலாம்; மற்ற வீக்கங்களைப் பார்க்கலாம்.

16. மலம், மூத்தீம், கபம்:—இவைகளின் பாகையில் வியாதிகளின் குறிகளைக் காணலாம்.

4. வியாதியைக் குறிப்பிடுதல்

அந்தந்த நோயின் சிதானம், பூர்வரூபம், சொரூபம், இவைகளின் சகாயத்தினால் ஒவ்வொரு நோயையும் குறிப்பிட வேண்டும். வைத்தியன் து வெகுஞ் அனுபவமே பெருத்த சகாயமாகும். நோய்கள் பலவகை பெற்று ஓர் சித்தாந்தம்; சிலேசன்று மற்றொரு சித்தாந்தம். ஒவ்வொரு வியாதிக்கும் ஒவ்வொரு காரண முண்டென்றும் இதனேலையே விபாதிகளுட் அனைக் கிருக்கவேண்டுமென்பார்சிலர். ஒவ்வொரு விபாதிக்கும் ஓர் பூச்சி காரணமென்ற தெரிவன் பெறப்பவரது கொள்கை இது. வெவ்வேறு கத் தோன்றும் விபாதிகளின் லக்ஷணங்களை கொல்லாம் ஒன்று அல்லது சில காரணங்களினால் உற்பத்தியாகின்றன வென்று பார்ப்பவர்களுக்கு விபாதிகள் சிலேதயாகும். இதுவே நமது சித்தாந்தம். அந்தந்த விபாதியின் லக்ஷணங்களை அனுசரித்து விபாதிகள் பலவகையாகத் தோன்றினாலும் இவைகளை கொல்லாமல்வாசம், பித்தம், கபம், இவைகளின் தொந்துவம், சங்கிபாதபென்று ஏழும், அடி, விழும், முதலீப் அடங்கிக் கொண்டு எடுத்துக் கொடுக்கப் பிரித்துக்

கொள்ளலாம். இந்த எட்டு விதங்களில் எதேனும் ஒன்றில் எங்க வியாதியும் சேருப். வியாதியின் ஒவ்வொரு ஈஷணமும் ஒவ்வொரு வியாதிபாகா தென்று நாம் உறுதிபாகச் சொல்லுவோம்.

வைத்தியன் தனது அனுபவத்தினால் நோய் இன்ன தென்று குறிப்பிட்டுக் கொண்டே நோய்ச் சூச் சிகிச்சை செய்தல் வேண்டும். இது வைத்தி யனின் முதல் கடமையாகும்.

அஞ்ஞானத்தினைலும், சந்தேக விபரீதப் படிப் பின்னும் அசைபும் மன முடையவர்கள் சரீர விஷ யத்தில் அதிகப்பற்றுடைய வர்களாக இருப்பதினு லும், சில நோய்கள் விபரீதமாக முடிய யென்று கவலைப் படிபவர்களாகிய சில வியாதியஸ்தர்களிட த்தில் வைத்தியன் நோய் இன்னதென்று குறிப் பிட்டுச் சொல்லா திருத்தல் அந்த நோயாளிகளுக்குக் கோயம் தரும்.

5. சிகிச்சை

ஒர் வியாதியின் விசாரணைக்காகச் செய்யப்படும் கார்யங்களை எல்லாம் சிகிச்சையாதும். விபாதி க்கு ஏதுவான காரணங்களைத் தடிப்பதும், ஆசார விவகார நிபாரங்களும், ஒளாடதங்களும் சிகிச்சை வகுப்புக்குச் சேர்ந்தவைகள். இவைகளுக்குள்ளே ஒளாடகம் மாத்திரம் பிரதானம் என்றும் மற்றவைகள் சிகிச்சைக்குச் சேர்ந்தன வஸ்லவென்றும் சாதாரண ஜனங்களும் அனுபவமில்லாத வைத்தியர்களும் எண்ணுகிறார்கள். இது ஒரு பெரிய தவறாகும்.

மற்றவைகளைச் சரிபாகச் கவனிந்தால் ஒளடக்கத் திற்கு இடமில்லை. சில சங்கர்ப்பங்களில் ஒளடதம் மற்றச் சிகிச்சை முறை கஞக்துக் கொஞ்சம் மாத்திரம் சுகாயமாவதும் உண்டு. வியாதியை நீக்குவதற்கு ஒளடதங்கள்தான் முதன்மையாக உள்ளது என்றும் மற்ற விஷபங்களைச் கவனிக்க வேண்டிய தில்லை பென்று முள்ள தப்பான அபிப்பிராயக்கு னூல் ஜனங்களின் நோய் தீராம விருக்கிறது; அல்லது தாமதமாக சௌக்கிய மாகிறது. அல்லது வந்த நோய் மறுபடியும் மறுபடியும் தோன்றுகிறது.

சுரம், தலைவளி, வயிற்றுவளி, வாங்கி, பேதி, முதவிய அனைக் கோய்கள் ஆகார தோஷங்களினாலேயே சம்பவிக்கின்றன. வியாதிக்கு சாரணத்தைத் தெரிந்துகொண்ட ஆகாரத்தைச் சரிப்படுத்திக் கொண்டால் நோய் போகும்.காப்பி, தேயிலை புகையிலை, கள், சாராபாம், அபினி, கஞ்சா, இவைகளின் உபயோகத்தினால் கணக்கற்ற வியாதிகள் உண்டாகின்றன. இவைகளை நிறுத்தினால் விபாகதானாகவே தீரும். மிதமிஞ்சின ஸ்திரீ புருஷபோக மும் வேளைக்குத் தகுந்த போஷணை யில்லாமலும் வீணை கவலையும், கஷயம் முதலிப் நோய்களுக்குக் காரண மாகையால் இவைகளைத் தடுத்தால் வந்த நோய்கள் தானாகவே சௌக்கிய மாகும்.

6. முடிவு

ஒவ்வொரு வியாதியைப் பாத்திப்பம், சஷ்டசாத்தியம், அசாத்தியம் என்று மூன்று விதமாகப் பிரி

க்கலாம். பலாட்களின் அனுபவத்தி னலேயே விபாதியின் முடிவு இன்னதென்று சொல்லக்கூடும். அனுபவமின்றி ஓர் வியாதியின் சரியான ஞானமின்றி அதின் முடிவு சொல்லலாகா து. தெரியாததை தெரியாக்கன்று சொல்லுவதே வைத்தியலுக்கு அழகு. தனது அணுவத்தின் சகாபங் கொண்டு நீண்ட யோசனையுடனே முடிவை சொல்ல வேண்டும்.

தமக்கு அனுபவமில்லாத வியாகிகளின் முடிவை விபரிதமாக சொன்ன காரணத்தினால் அநேக வைத்தியர்கள் தமது கொரவத்தை இழந்துக் கொண்டுளர். ஆகையால் எந்த வைத்தியலும் அவசரபட்டு சொல்லக் கூடாது.

வியாதிகளும் சிகிச்சையும்

1. அரோசகம்.

அன்ன துவேஷம், அரோசகம், அல்லது உண் வில் இச்சையில்லாமெயென்றாலும் ஒன்றிரால்லா கோய்களுக்கு இது பூர்வானுபாகுப்.

நிதானம்.—அளவுக்கு மஞ்சின ஆகாரம் ஓர்ண் மாகாததே அரோசகத்திற்கு முக்கிய காரணம் மலர் முத்திரம், வியர்வை, கபம், வாடு என்னுடைய கையரன் மலவு எவ்வளிபாகாமையும் இதற்கு சகாயமாகும்.

சொந்தம்:—சாப்பாட்டில் இச்சையில்லை. ஏறக் குறைப எல்லாவிதமான விபாதிகளின் பூர்வானுபங்கள் இதோடு கலந்திருக்கும். ஜவகை மலங்கள் வெளிபாகரம் விருக்கும்; உப்பு, காரம், முதலிபநாக்கு ருசி கெடும். குமட்டல், அல்லது வாந்தி இருக்கும்.

சிகிச்சை:—ால்லா வியாதிகளின் சிகிச்சையிலும் காரணங்களை தீக்கிக் கொண்டாலே போதும். தனிபீய மருந்து வேண்டார். ஆகார தோழக்கினு

லும் ஏதேனும் ஒன்று அல்லது ஐவகை மலங்களின் பந்தக்கிணறும் இந்த கோய் காணுமாகையால் இவைகளை நிவர்த்தி செய்துக் கொண்டாலே போதும். மெபந்தத்தை நிக்கிக்கொண்டு ஒர் நாள் முழுவதும் பூர்ணம் உபவாசமாக இருந்தால் இரண்டாவது நாள் வேண்டிய பசி காணும். உபவாச நாளில் ஜஸம் மாத்திரம் குடிக்க வேண்டும். எந்த உணவையும் திண்ணக்கூடாது. இரண்டாவது நாளில் பசிதொன்று விட்டால் அந்த நாளும் உபவாசமிருக்க வேண்டும். அல்லது பசி தோன்றுபவரையில் இருந்தல் வேண்டும். உபவாசம் முடிந்த பிறகும் லேசாடும் ஜீர்ணத்திற்கு சுலபமாயுள்ள மோர், கஞ்சித்தண்ணீர் அல்லது கஞ்சி, பழச்சார் குடிக்க வேண்டும். கிரமகிரமமாகச்சாதாரண உணவுகளை உபயோகித்துக் கொண்டு வரலாம். தீக்கத்திற்கு வேண்டிய பயற்சி இருந்தல் வேண்டும். மலங்கள் சரியாக கழியும்படி பார்த்துக் கொள்ள வேண்டும். பசி வந்தாலோழிப் பந்த ஆகாரத்தையும் திண்ணக்கூடாது.

2. மலபந்தம்.

நிதானம்:— தீகப்பயிற்சி யில்லாத சோமபலன் வாழ்க்கை, சூடான, துவர்ப்பான், காபமான உணவுகளின் உபயோகம், உணவில் கொழுப்பும் பச்சைக்காய்கறி களில்லாமை, முழுதான்யங்களை தோலுடன் தின்பதற்கு பதிலாக மாபாகதின்பது, அதிகமாக வேகவைத்த உணவுகளை தின்பது முதலியன்.

ஸோநுபம்:—ஸோநுபல், தலைவலி, தூக்கம் கெடுதல், அரோசகம், குயட்டல், அல்லது வாங்தி, வாரிற்றுவலி அல்லது உப்புசப், சரம் முதலியன.

சிகிச்சை:—காரணங்களைச் சிர்ப்படுத்திக் கொள்ள வும். இதற்காக விழீசனமாகும் ஒளடதங்களைச் சாப்பிடுவதும் வஸ்திகர். சிகிச்சைசெய்வதும் உலகில் எங்கும் பார்க்கலாம். இந்த இரண்டு பழக்கமும் சரியான சிகிச்சையன்று ஆனால்மற்ற உபரயங்களைத் தேடியும் பயன்படாமல் அவசரமான அபாயகாலத்தில் ஒளஷத்திகளையாவது *வஸ்திகரமத்தையாவது செய்யலாம்.

*நூது வீடுகளில் கிண்டக்கும் மூக்குசெம்பின் குழாய்க்கு ஓர் ரப்பர் குழாய் சோடித்து அதன் மற்ற மூனைக்கு ஓர் மரத்தின் குழாயை சோடிக்க வும். இந்த மரத்தின் மேற்பாகம் சியமாகவும் அதன் இருமூனைகள் ரப்பர் குழாயிலும் ஆஸன துவாரத்திலும் சோடிக்கத் தகுதிபாகவும் இருக்கவேண்டும். அல்லது வஸ்திகரமத்திற் கென்றே தயார்செய்து வள்ளி கர்மத்தில் ஜலம், கஞ்சித்தண்ணீர், கஷ்டாயம், ஸதலம் முதலிப்பவைகள் உபயோகப்படுகின்றன. சுயார் கால் படியிலிருந்து அரைப்பட்ட வரையில் ஜலத்தையாவது மற்ற ஜல பகார்த்தங்களையாவது உபயோகிக்கலாம். ஜலம் கொஞ்சம் வெதுவெதுப்பாகவும் அதிக சூல்ஸாமது மிருக்க வேண்டும். நோயாளிபை இடது பக்கத்தில் பாக்கவைத்து வாயும் ஆஸன துவாரமும் திறந்திருக்க

கொழுப்புடைய கொட்டகளையும், தோல் எடுக்காத முழுதான்பங்களையும், அதிக வேவகவைக்காத பச்சைகாய் சறிகளையும் கீரகளும் பழங்களையும் அதிகாரக சாப்பிட்டுச் சொன்னு வந்தால் மலச்சிக்கல் திரும்.

அதிகாலையில் எழுந்தகீத சால்படி ஐஸ் குடச்சலாம். இந்த அளவையே அடிக்கடி உபயோகிக்குக் கொள்ளலாம். சேஷப் பயிற்சியை கிரமமாக செய்தல் வேண்டும்.

வேண்டுமானால் அரை அல்லது ஒர் பலம் ஆம் ஸ்கிசன்னையை தனியே அல்லது சுக்கு சஷாயத்தில் சாப்பிடலாம். அல்லது கஞ்சகாய் சஷாயத்தையாவது அதனால் செய்துள்ள லேகிபத்தையாவது சாப்பிடலாம்.

வேண்டுப் புட்டமும் வலதுதடையும் தூக்கி இருக்கவேண்டும். தூண்தாராத்தில் வைக்கவேண்டிய குழாய்க்கு கொஞ்சம் விளக்கெண்ணை பூசிக்கொண்டு அதை சிதாலமாக ஆசன்துவாரத்தில் சேர்க்கவேண்டும். முக்கேப பாத்திரத்தில் போட்டு வைத்துள்ள ஜலம் மலப்பைக்குள்ளே தடையன்றிப் போகின்றதானேற்க வனித்துக் கொண்டே வரவேண்டும். தடையாக இருந்தால் சிறவிரலுக்கு விளக்கெண்ணை பூசிக்கொண்டு ஆசன்துவாரத்தில் நுழைத்து கட்டியானாலும் தவராத்தில் தடையாக விருந்தால் அதை கீக்கவேண்டும். சிறகுழங்கைகளுக்கு விளக்கெண்ணை மாத்திரம் உபயோகிக்கலாம். குழங்கைகளுக்கு வண்டிகர்மத்திற்காகவே டர் கண்ணுடி குழாய் உண்டு. அதை உபயோகிக்கவாம்.

துறிப்பு:—மலபந்தத்திற்காக சீருட்டு பிடிப்பதாவது காப்பி சூடிப்பதாவது நல்லபழக்கமன்று. மலபந்தத்தைக் காட்டினால் இந்த பழக்கம் இன்னும் அதிகமான ஒர் நோய் என்று எண்ண வேண்டும்.

3. வாந்தி

நிதானம்:—அரோசகத்தின் காரணங்களே வாந்திக்கு காரணங்களாகும். ஆகார தோஷத்திலே பித்த பிரகோப மானுல் வாந்தி காணும். சில விஷதாதுக்களின் உபயோகம், கிருமிதோஷம், இவைகளினுலும் வாந்தி காணும்.

சோநுபம்:—அரோசக மலபந்தங்களின் லக்ஞங்களையும் இங்கு பார்க்கலாம். பித்த பிரகோபத்தின் மற்ற லக்ஞங்களும் முண்டு. கர்ப்பிளிக்கஞ்சு க்கு கர்ப்பம் நின்ற லக்ஞங்களைக் காணலாம்.

சிகிச்சை:—அரோசக மலபந்தங்களில் சொல்லியுள்ள விதிகளை இங்கும் கவனிக்க வேண்டும். மலபந்தத்தை நீக்கிக்கொண்டு ஒன்று, இரண்டு, அல்லது மூன்று நாள் வரையில் எந்த ஆகாரமும் தின்மைல் வெறும்ஜலம் குடித்துக் கொண்டும் உபவாசவிரதத்தை கைக்கொள்ள வேண்டும். பொருக்கமுடியாத பசி தோன்றினால் புளி ப்பான மேர்தண்ணீர்களுமிச்சப்பழாசம், தனியே அல்லது வெல்லம் சேர்த்து, கிச்சிலி, சாத்துக்கொடி, மாதுளம், திராங்கு, இந்த பழங்களின், ரசத்தை மாத்திரம் அடிக்கடி உபயோகிக்கலாம்.

கால் பலம் இஞ்சி ரசத்தில் சூமபாகம் எலு மிச்சப்பழத்தின் ரசத்தை அதிகாணியிலுட் வேண்டு மானால் இதையோனாகுக்கு முன் றுஅல்லது நான்கு முறை உபயோகிக்கலாம். இதை எல்லாவிதமான வாந்தியிலும் உபயோகிக்கலாம். வாந்திபேதியில் கானும் வாந்திக்கும் கர்ப்பிணிகளின் வாந்திக்கும் இதை உபயோகிக்கலாம். ஆகாரத்தில் இஞ்சியை யும் எலுமிச்சப் பழத்தையும் தராராளமாக உபயோகிக்க வேண்டும். பித்தசாந்தமான ஆகாரத்தையே தின்னவேண்டும். ஐவ்வகை மலங்கள் நன்றாய் கழிக்கவேண்டும்.

4. வயிற்றுவலி

தோனம்:— அரோசகம், மலபந்தம், வாந்திக்குள்ள காரணங்களையேஇங்கும் கவனிக்கவேண்டும். ஆகாரதோஷமே வயிற்றுவலிக்கு காரணம்.

சோநுபம்:— அரோசகம், மலபந்தம், வாந்தியிலுள்ள ஸங்கணங்களை இதிலும் கவனிக்க வேண்டும். ஆரம்பத்தில் ஆகாரம் ஓரணமாகும் காலத்தில் வயிற்றில் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக நோய்கர ஆம். காலக்கிரமத்தில் இது பொருக்க முடிபாத நிலைமைக்கு வந்துவிடும். ஏதேனும் சாப்பிட்ட உடனே அல்லது கொஞ்சநேரத்தில் வயிற்றில், ஏரிச்சல் அல்லது உப்புசம் கானும்.

சிகிச்சை:— வாந்தி, மலபந்தம், அரோசகத்தில் சொல்லியுள்ள சிகிச்சைவிதிகளை இதிலும் கவனிக்கவேண்டும். மலபந்தத்தை நிச்கிக்கொண்டு உண்ணு

விரதமே வயிற்று வலிக்கு சரிபான் சிகிச்சையாகும். அரோசகம், அக்கினி மாந்தம், வாந்தி, இவைகள் முழுவதும் நிங்க உண்ண யாரானபசி தோன்றும் வரையில் உபவாசமிருக்க வேண்டும். அதிகமானபசி தோன்றினால் வாந்தியில் செரல்விபுள்ள ஆசாரத்தையும் பழச்சாரையும் உபமோகிக்கலாம். அல்லது கோதுமை, அரிசி, எவை, இவைகளின் கஞ்சிததண்ணீரைக் குடிக்கலாம். உபவாசம் முடிந்த திறகும் சுலபமாக ஜீர்ணமாகக் கூடிய லகுவான பதார்த்தங்களையெடுப்போ கிக்கவேண்டும். வயிற்றுவலி முழுவதும் நிங்க சரிபான பசி வந்தபிறகே தான்யங்கள், பருப்புகள் முதலியவைகளை வெகாஞ்சம் கொஞ்சமாக உபமோகிக்கலாம்.

வயிற்றுவலிக் கென்றேதனியே ஒளஷதம் வேண்டாம். அவசரமா யிருந்தால் தினங்கீதாறும். சுக்கு கஷ்டயத்தில் அரைபஸம் ஆபணக் கெண்ணீண்யை ஒருஷேவளை அல்லது இரண்டு ஷேவளை சாப்பிடலாம். கடுக்கா யெண்ணீண்யை நாளுக்கு இரண்டொரு முறை சாப்பிடலாம்.

5. பேதி - சீதபேதி

நிதானம்:—பேதிக்கும் சீதபேதிக்கும் ஆசாரமீதாஷமே. காரணம், ஜீர்ணம் கெட்டகாலத்தில் சாதாரண உணவுப் பொருள்களை அளவுக்கு மின்சொப்பிட்டாலும், ஜீர்ணசக்தி இருந்தும் அழுகன உணவு பதார்த்தங்களை யாவது விஷதாதுகள் உல்குந்துள்ளன. உணவுப் பொருள்களை யாவது உட்கொ

ண்டால் பேதி அல்லது சீதபேதி கானும். வேறு நோய்களின் விவரத்திக்காக உபயோகப் படுத்தும் உஷ்ணமான மருந்துகளினுலும் இந்த நோய்கள் கானும்.

சோநுபம்—அரோசகம், வாந்தி, வயிற்றுவலி, இவைகளின் எழுணங்களும் இங்கு பார்க்கலாம். வயிறு நொந்தோ நோகாமலோ அடிக்கடி பேதியாகும். வயிற்றுப்புச் மிருக்தும்; இல்லாமலு மிருக்கும். வாந்தி இருக்கும் இல்லாமலு மிருக்கும். இரண்டொரு நாளுக்குள்ளாக மலத்தில் சீதம் காணலாப்.

சீதபேதியில் சாதாரண பேதியி னுடைய லக்ஷணங்களைச் சொல்ல பொருக்கமுடியாத நோய்கண்டு சீதம் அல்லது ரத்தம் கலந்த மலம் வெளியாகும். ஆரம்பத்தில் வெறுபலமும், பிறகு சீதப் மாத்திரம் கலந்தமலமும். பிறகு சீதமும் ரத்தமும் கலந்த வெறும் மலம் மாத்திரம் வெளியாகும், அற்ப சரம் இருந்தாலும் இருக்கலாம்.

சிகிச்சை:—வியாதியின் காரணத்தை முதலில் நீக்கவேண்டும். வியாதி நீங்கும் வரையில் உண்ணு சிரத்ததைக் கைக்கொள்ள வேண்டும். வேண்டியளவு ஜலத்தை குடித்துக் கொண்டே தீருக்க வேண்டும். அல்லது புளிப்பு மேரத்தண்ணீர், ஏஞ்சித்தண்ணீர் எலுமிச்சப்பழும், திராகைஷப்பழும், சிக்கிலி ப்பழும், மாதுளம்பழும், இவைகளின் ரசத்தை தாராளமாக உபயோகிக்கலாம். சாதாரண பேதி யில் இந்தச்சிகிச்சை போதும். வாந்தி பேதியில்

காணும் பேதிக்கு ஜின்து அரிசியடை மஞ்சளோடு
சமங்டை மிளகாயைசீர்த்து ஒர்மணிக்கு ஒருத்த
வை கொடுத்தால் போதும். சமங்டை மஞ்சள்,
மிளகாய் கஷாயம் செப்து கொடுத் தாலும்
போதும்.

சிதபேதியில் காணும் நோயைப் பாருக்க
முடிபாதவர்கள் ஆராபுச்தில்கடுக்காயெண்ணையை
நாளுக்கு இரண்டாரு முறை சாப்பிடலாம், பொ
ருமை மாதசீரம் இருப்பின் சகலவிதமான சிதபே
தியிலும் இந்த சிகிச்சையைப் போதும். வேறெந்த
ஒளாடகிக்கும் இயில்லை.

6 சுரம்ம்*

நிதானம்:— சுரத்திற்கு காரணங்கள் பலவிருப்பு
பிலும் ஆராரதோஸ்தே முக்கிய மன கரமணமா

* சுரமென்பது சீரித்திலிருக்கும் சுதாரண குடு
க்கு அதிகப்பட்ட குாகும், சுதாரண குடு 98.4°F.
இக்கிளன்ற கணக் கெடுக்கப்பட்டிருந்தது. இதற்கு அதிகப்
பட்டது சுராகும். சிலவேளையில் இந்த கணக்குக்க
அரை அல்லது ஒரு மிக்கிற ஏறத்துறைவானால் அதை
சுரமாகவாவது தீள்ளாகவாவது என்னக் கூடாது.
இப்பற்றை யிலோயே ஜனங்களின் குடுவேறுபடுகிறதுன்று.

சுரம் கண்டறிவதற்காகவே தெர்மாமீடர் (Thermo-
meter) எண்ணும் ஓர் கருவிலுண்டு. ஆரம்பத்தில் நாடி
பரிகைத் தூலபாக சுரத்தை கண்டறிய முடியாதவர்கள்
இந்த ஆயத்தை உபயோகிக்கலாம். ஒன்று கண்டாகி

கும். ஜீர்ணசக்தி கெட்டகாலத்தில் அளவுக்கு மின்சின உணவுகளை உபயோகிப்பதினாலேயே சுரம் கானும்.ஆகார தோஷத்தினால் மலங்கள் வெளியா காததினாலும் திரிதோஷங்களில் ஏஃதனும்லுன்று, இரண்டு அல்லது மூன்றினாலும் இது கானும். ஆகவே சுரம்,வாதம், பித்தம், கபம் என்று தனியே சுரங்களாகவும், இரண்டு தோஷங்கள் கலந்துள்ள தொந்துவசரங்களாகவும் அல்லதுமூன்றுதோஷங்களும் சேர்ந்துள்ள சன்னி சுரமாகவும் காணலாம். மனக்கவலையினுலாவது. அடிபட்டாலாவது. ஏதாவதோரிடத்தில் எரிச்சல், கட்டகள் வரும் காலத்திலாவது சுரம் கானும்.

தறிப்பு:—ஒவ்வொரு சுரத்திற்கும் தனித்தனியே ஓர் பூச்சிகாரண மென்னும் மேஸ்நாட்டார் கை த்தியத்தின் கொள்கையை நாம் ஒத்துக்கொள்வதில்லை. எந்தக்காரணத்தி னுலாவது சரீரத்தில் திரிதோஷங்களின் கோளாருகள் உண்டானால் அதுவே சுரத்திற்கு ஹேதுவென்றறிய வேண்டும். ஆகவே இந்த விதியை அனுசரித்து சுரத்தை யாவது மற்ற வியாதிகளையாவது நூற்றுக்கணக்கான வகைசளில் பிரிப்பதற்கு இடமில்லை. எல்லா வியாதிகளையும் தனியே வாத பித்த கபமென்றும் தொந்துவ மென்றும், சன்னிபாத மென்றும், ஏழு

வரையிலும் இதனுடைய சகாயமே விரும்பாமல் நாடி பரீகைகள் ஆலமாகவே சுரத்தின் நிலைமையை தெரிய வேண்டும்.

விதமாய் பிரித்துக் கொள்ளலாம். மற்ற பிரி வு கொல்லாம் இவைகளுக்கு உட்பட்டனவை என்று அறிய வேண்டும்.

சோநுபம்:—அரோசகம், மலபந்தம், அல்லது பேதி, வாந்தி, வயிற்றுவலி, தலைவலி, இடுப்பு கை கால் முதலியவைகளில் வலி. கைகால் ஏரிச்சல், தாகம், முத்திரக் குறைவு, தூக்கம் கெடுதல், இரு மல், அளவுக்கு மிஞ்சின சூடு, இந்த வகைணங்கள் அநேகமாக எல்லா சாங்களிலும் காணலாம். இவை களில் சிலவை அதிகமாயும் குறைத்தும் இல்லாமலும் இருக்கலாம். அந்தந்த தோஷத்தை அனுசரித்து வகைணங்கள் காணும். மற்ற சில விசேஷ சுரங்களில் குளிருப், வியர்வையுர், மயக் கழும் விசேஷமான சூடும், பைத்தியத்தின் குறிகளும் ரத்த பிரவாஹமும் காணலாம்.

***துறிப்பிடுதல்:**—நாடினானமேசாத்தைக்குறிப் பிடுவதற்கு நமக்கு சல்லாயமாக விருக்கிறது. இதோடு ஏற்ற அங்கப்பரிசோதன ஞானமும் இருத்தல்

* நமது தேச பரிசோதனை என்னும் நூலை நன்றாக கவனித்து படிக்க வேண்டும். அதிலுள்ள பல அங்கங்களின் பரிசோதனை, நாடிபரீக்ஷை, முத்திரபரீக்ஷை இவைகளின் சகாயத்தினுலேயே சுரத்தையாவது, மற்ற வியாதிகளையாவது குறிப்பிட வேண்டும்.

துறிப்பு:—மேல்காட்டு வைத்தியத்தை யனுசரித்து நமது தேசத்திலும் சில வகைணங்களை மாத்திரம் கவனித்து அவைகளை யனுசரித்து சுரங்களை பல பெயரு

வேண்டும். திரிதொடுத்தில் சனிலக்ஷணங்களும்தோ
ந்தவல்கூணங்களும், சன்னிலக்ஷணங்களும், சுரத்தை
ச்சுறிப் பிடுவதற்கு சுறையயாகும். ஆகவே சுரத்தை
வாதசுரம், பித்தசுரப், கபசுரம், வாதபித்த சுரம்,
கபபித்த சுரம், வாதகபசுரம், சன்னிசுரம் என்று
ஏழுவிதமான சுரங்களாகப் பிரிக்கலாம். சுரத்தின்
லக்ஷணங்களோடு ஆந்தந்த *தோடுத்தின் பிரகோ
பலகூணங்களும் உண்டு.

சிகிச்சை:— காரணத்தை தெரிந்து கொண்டு
அதை நிக்கவேண்டும். மஸபந்தம் அத்யாயத்தில்
சொல்லியுள்ள விதிகளை அனுசரித்து மஸபந்தத்தை

டைய தொத்து சுரக்களாகவும், வேறுவிதமான சுரங்க
ளர்கவும், சூரம் பல விதமாகப் பிரிக்கப் படுத்தி. ஆகாரத்
தையும், திரிதொடுத்தங்களையும் மாத்திரம் கவனித்து கிடை
சை செய்வதனால் இந்த சுரங்கள் நிவர்த்தி யாகுமானா
யால் இந்த கணக்கில்லாதப் பிரிவுகள் வேண்டாம்.

* தலைவலி, இடுப்புவலி, சந்துவலி, சர்வாங்கவலி,
ஆயர்சம் அல்லது மயக்கம், வயிற்றுப்புசம், சந்து வீக்கம்,
தூக்கம் கெடுதல் முதலீயவைகள் | வரதாரகோப லக்ஷ
ணங்கள்.

எரிச்சல், குடு, அரோசதம் அதிகப்படி, அதிகதாகம்,
முத்திரபந்தம், வலி, வாந்தி, இருமல், மயக்கம், ரத்தபிர
வாஹும், தூக்கம் கெடுகல், பைத்தியம், முதலீயவைகள்
பித்தபிரகோப எண்ணங்களாகும்.

அக்னிமாந்தம், சீதளம், இருமல், வலி, வீக்கம், தூக்கம்
கெடுதல், மாந்தம் முதலீயவைகள் கபபிரகோப லக்ஷ
ணங்கள்.

நிவர்த்தக்க வேண்டும். ஆதாரதோஷமே அநேக விதமான நோய்களுக்குத் தும் ஜவரங்களுக்கும் காரணமாக பால் ஒன்று, இரண்டு, மூன்று அல்லது சூரம் நின்று, ஒவ்வொட்டிய பசிதொன்றும் வரையில் எது ஆகாரத்தையும் உட்கொள்ளாமல் வெறும் ஜலத்தைபீய சாப்பிட்டுக் கொண்டு வரவேண்டும். மத்தியில் பொருக்க முடியாத பசிகண்டால் அரிசி, கோதுமை அல்லது ஏவையின் கஞ்சி ஜலத்தை மாத்திரம் குடுக்க வேண்டும். அநேகருக்கு இந்த உபவாச சிகிச்சையே போதும். இப்படி செய்தும் சூரம் இறங்காவிட்டால் கீழ்கண்ட விதிப்படி ஆவி ஸ்நானம் செய்தல் வேண்டும்.

இஒரு சொட்டித் தண்ணீர் ஜலத்தை (கமார் எட்டுபடி ஜலம்) கொதிக்க வைக்கவேண்டும். அடிப்பிள் மூன்ற ரெங்கற்களை சுட்டுவேண்டும். சுமார் இரண்டிடுமிழுள்ள பீடத்தில் கோயாளி உட்கார வேண்டும். ஆவிநுழையும் படியான த்வாரங்களுடைய பீடமா யிருக்க வேண்டும்; கோயாளியை அதின்மேல் உட்காரவைத்து அவனையும் பீடமுழுவதையும் கனமான கம்பளித் துணியினால் மூடுவேண்டும். ஆவிவெளி தீய போகாதபடி இருக்கவேண்டும். மூச்சவிவெதர்க்கு முங்குதுவாரம் மாத்திரம் திறந்திருக்க வேண்டும். இந்தக் கம்பளித் துணி தவிற வேறெந்ததுணி யினுலும்வியாதியஸ்தனைமூடி வைக்கலாகாது. அகலமான ஒர் பாத்திரத்தில் கொடிக்கிர தண்ணீயை போட்டு ஒர் செங்கல்லை அதில் போட்டு பீடத்தின் கீழேவைக்க வேண்டும்; கல்லை போடும்பொருத்தாமுது கொடி தண்ணீர் வியர்தியஸ்தன் மேல் கொட்டாதபடி கவனிக்க வேண்டும். முதற்கல்லை போட்டு அதனால் கிளம்பும் ஆவியினால் வேண்டிய வியர்வைவிட்டு ஆபாசம் தோன்றினால் முதற்கல்

ஆவிஸ்நானம் செய்தித்தும் சரம் இறங்காமல் அதிகமாகவும் விடாமலும் காய்ந்துகொண்டே வந்தால் சுத்தமான தண்ணீரில் ஒர் சிறுகுட்டையை துவைத்து துவைத்து நெற்றியில் வைத்துக்கொண்டே வரவேண்டும். சரம் ஆறினதே அங்குட்டையை எடுத்து மறுபடியும் தண்ணீரில் துவைத்து உபயோகிக்க வேண்டும். அப்படியே மற்றூர்குட்டையை துவைத்து வயிற்றின் மேல் வைக்கவேண்டும்.

இப்படிச் செய்தும் சரம் இறங்கா விட்டால் தண்ணீரில் ஒர் கைகுட்டையை துவைத்து சரீர முழுவதையும் தடவிக் கொண்டே வரவேண்டும். இதனால் நோயாளிக்கு ஆபாச மில்லாமல் தடவ வேண்டும். சரம் விசீசநா யிருக்கும் சந்தர்ப்பத்

லோடே சிறுத்தவேண்டும். வேண்டுமானால் இரண்டா ஆது அல்லது மூன்றாவது கல்லையும் உபயோகிக்கலாம். முன்போட்ட கல்லினால் உண்டான சப்தம் சின்றவிறகே மற்றகல்லை போடவேண்டும்.

நோயாளிக்கு ஆயாசம் வந்தடையோவது, மூன்று கற்களையும் உபயோகித்து வியர்வை கண்டவுடனே யாவது, நோயாளியை பீடத்திலிருந்து இறக்கி தயாராயுள்ள ஒர் படுக்கையில் படுக்கவைத்து, தேகத்தின்மேல் குளிர்காற்று படாதபடிக்கு அந்த கம்பளியையாவதுமற்ற போர்வையையாவது போர்த்துவைக்க வேண்டும். சுமார் 15 சிமிசீம் ஆனபிறகு ஒர் சுத்தமான குட்டையால் வியர்வையை துடைத்தெடுக்க வேண்டும்; மத்தியில் ஆயாசம் அல்லது தாஸம் கண்டால் வெங்கிரையாவது சூடான கஞ்சித் தண்ணீரையாவது கொடுக்கலாம்.

தில் இதை 15 நிமிஷம் வராயில் செப்பலாம். மற்றவர்களுக்கு 5 அல்லது 10 நிமிஷம் இந்தமாதிரி யான ஜலஸ்நானம் செய்தாலும் போதும். இது முடிந்ததே சுத்தமான சரமில்லாத ஒர் குட்டையால் தேகத்தி விருக்கும் சரமெல்லா ஏடுத்து ஒர் கம்பளியினால் சரீரமுழுவதும் மூடவேண்டும்.

சரீரத்தின் மேல் குளிர்காற்று படாதபடி கவனிக்க வேண்டும். சுரத்தையுடுத்தே நிறுத்தவேண்டுமென்னும் அவாவுடன் குளிமை வரும்வராயில் இந்த ஜலஸ்நானம் செய்யலாகாது.

சுரத்தைத் தடுத்துவதற்காகத் தனிப்பே ஒன்றாடதங்கள்வேண்டியதில்லை. தனி பேபேதாகத்தினுலுண்டாகும் சுரத்தினாலாவது, தொந்துவத்தி னலாவது வந்த சுரத்தில் சுக்கு கஷாயத்தை சூடாகக் கொடுக்கலாம். அல்லது துரிசடு கஷாயத்தையாவது கொடுக்கலாம். மலபந்த மிருப்பின் இந்தத்திரிசடு கஷாயத்தில் கடுக்காய் சேர்த்துக் கொடுக்கலாம்.

மார்புகூண்டு, நுரையீரல்கள், இருகயம், வயற்றுக்கூண்டு முதலிய இடங்களில் வலி, வீக்கப், எரிச்சல் விருக்கும் குறிகள் தோன்றினால் அவ்விடங்களில் வெங்கிரி, தவிடு, சாம்பல், இவைகளால் ஒத்தலைய்.

உலகில் சுரத்திற்கும் மற்ற நோய்களுக்கு கணக்கற்ற ஒன்றாடங்க ஸிருந்தும் மேலே விவரித்துள்ள உபவாசம், பத்தியம், ஜலவைத்தியம் முதலீபவைகளுக்குச் சுமாகாதன்றறியவேண்டும்.

விசேஷாகக் காடும் சுரத்திற்கு ஒள்ளதங்கள் யாதொரு பயன் தாாதக் காரணத்தினால் சுரத்தில் விசேஷமான ஒள்ளதங்கள் வேண்டியதில்லை. மேலும் சுரத்தை இறக்கும் ஒள்டகங்க ஸௌலாம் சரிசுத்தின் கதனத்துக் குறைக்கும் குணமுட்டயதனால்ஆக்குத்தகைய ஒள்ளதங்களை கொடுக்கலாகாது.

சுரத்திற்கு ஒள்ளதங்க ஸௌலாவை விருந்தும் ஆபத்தான சுரங்களாகிப் ஜனனிகரம் முதலியலை களில் இவைகள் யானதொரு பயன்தருவதில்லை. ஆபத்தான ஜனனிசுரப், கபசுரப், கூயசுரப், அப்பம் சுரப், இவைசுள்ளாம் பல்யான ஒள்ளதங்கள் கொடுக்காமலே உபவாசம், ஆகாயிபந்தனை, ஜவகிக்சை, அங்ஞசிகிச்சை இவைகளை நீலமேயே விவரத்தியாகின்றன வென்றால் சாதாரண மற்ற சுரங்களுக்கு விசேஷமான ஒள்ளத்துக்களை பிரயோகமே வேண்டியதில்லை.

சரீர தச்துவத்தையும், மனேதத்துவத்தையும், விபாதிகளின் நிலைமையையும் சரிபாகதெரியாமலே அடைக்கர்கள் பரிதாரிக்கின்றனர். அவர்களுடைய பரிதாபம் அநேகங்களாக விடாமற்காடும் சுரத்தில் விசேஷமாகக்காணலாம். அவர்களிடத்தில் பொறுப்பில்லாத காரணத்தினாலும் வைத்தியர்களும் அவர்களுடைய வேண்டுகோளுக்கு வசமாவதனும் அநேகநோய்கள் தோராய்களும் ஆபத்தாகவும் முழுகின்றன. டலபான ஒள்ளதங்களின்பிரயோகமே இதற்கு சாரணமென்ற அறியவுட். நாம் சொல்லும் உபவாச முசலிய முறைகளை நியாதியஸ்

தர்க்கரும் வைத்தியர்களும் பக்கீயாடு அனுசரித்து வந்தால் ஒளஷத்தின் பிரயோகத்திற்கு இடமில்லை.

சுரங்கிவர்த்திக்கு ஆசாரானிபந்தனையைக் கவனிப்பது அவ்விஷயமானதுபோல் சுரம் நின்று பழைய ஆரோக்யத்தையடையும் வரையிலும் இந்த நிபந்தனையை நன்றாக கவனித்தல் வேண்டும். இந்த நிபந்தனையை நன்றாக கவனிக்காமல் நாக்கு ருகிக்குட்பட்டு ஆசாரத்தை கண்டபடி தின்பதினுலையே நின்று விட்ட சுரம் திரும்பதிருப்ப காண்கின்றது. அல்லது மற்ற நோய்களையும் காட்டிவதற்கு இடம் தருகின்றது. சுரம் நின்றபிறகும் இலது ஆசாரத்தையே உபயோகித்துக் கொண்டுவந்து காலக்கிரமத்தில் ஜீரணசக்திக் கேற்றவாறு பழைப் ஆசாரத்தை கொஞ்ச கொஞ்சமாக உபயோகிக்க வேண்டும். அநேகநாளாக சுரம்வந்து பலஹினமாயிருப்பவர்கள் விபாதி நிவர்த்தியானவுடனே தமது பலச்சை இன்னும் சுற்றுக்கூடிய விருத்திக்கு சேர்வாகாது. இவர்கள் அநேகநாளாக தம து பிரம்மச்சரிய விரதத்தைக் காப்பாற்றிக் கொள்ள வேண்டும்.

7. தலைவலி

நிதானம்:—தனியே வாத, பித்த, கப தோஷத்தினுலாவது, தொந்துவதோஷத்தி னலாவது, ஐன்னியிலாவது தலைவலி காணும். ஆகார முதலிய கோளாறு களினுலும் மலங்கள் அந்தந்த வேளைக்குச் சரிபாய் தள்ளாவிட்டாலும் இது தனியாகவா

வது வேறு வியாதியின் ஈச்சினாக வாவது கானும். காப்பி, டை, கஞ்சா, அபினி, சாராயம் முதலியவைகளை உபயோகப்படுத்தும் பழக்கத்தினாலும் இடைவிடாமல் ஆயாசம் தரும் வேலைகளை செய்து வருவதனாலும் தலைவளி உண்டாகும்.

சோநுபமி:—இருபுச்கம் அல்லது இருபக்கத்தில் விட்டுவிட்ட அல்லது விடாமல் வளி கானும். அபோசகம், அக்னி மாந்தம், வயிற்றுயலி, வாந்தி, மலமுத்திர பந்தங்களின் சுறிகளிருக்கும். மேகம், கூயம், குஷ்டம் இந்த நோய்களின் குறிகளும் இருக்கக்கூடும். தூக்கம் கெடும் கண், காது, மூளை, இவைகளின் பாதைகளும் இருக்கலாம்.

சிகிச்சை:—அந்தந்த தோஷத்தின் நிவர்த்தியினாலேயே தலைவளிதீரும். மலங்கள் சரிபாக காலக்கிரமத்தில் அளவொடு வெளியாக தும்படியான உபாயங்களைத் தேடவேண்டும். இதோடு ஆசாரானியமும் உபவாசமும் தேகப் பயிர்ச்சியும் ஆவிஸ்நானமும் செய்தால் தலைவளி போகும். தலைவளிக் கென்றே தனி யே ஒளடதங்கள் கோண்டாட. தலைவளிக்காக உள்ளுக்கு உபயோகப் படுத்தும் ஒளடதங்களை ஸ்லாவற்றிலும் அபினி அல்லது அபினி போன்ற சரீரத்தின் சத்தைக் குறைத்து நோயைக்காட்டிலும் கெட்டபழக்கமென்னும் வியாதிகளை உண்டாக்கக் கூடிய ஒளாஷதங்களை உபயோகப் படுத்துவதனால் சரீரம் கேடுமே யொழிய அதனால் சுகமில்லை. மேல் பூசுக்கு உபயோகப்படுத்தும் எல்லா விதமான அஞ்சனங்களும் லேபனங்களும் மற்ற

ஓளாஷதங்களும் சில சமயத்தில் கூண்டிநாத்திற்கு சாந்தி கொடுக்குமே பொழிய வியாதியை விவரத்திற்கு செய்பாது. ஆகவே தலைவலிக் கென்றே உள்ளுக்கு ஓளாஷதமாவது மேலே பூசுவதற்காவது தனியே ஓளாஷதம் வேண்டாம். தோஷங்களை விவரத்திற்கு செய்து கொண்டால் பிரதமும்.

8. இருமல்

நிதானம்—தனி தோஷத்திலாவது, தொந்துவத்திலாவது, ஐஞ்சியிலாவது இருமல் காணும். கருப்பு கோபம் முக்கிபமான காரணமாகும். காரணம் எதானுலுசரி, மூக்கு, ஏதாண்ணடி, சீரங்கிரிபப், ஸ்வாஸ்நாளம், நுரையீரல்கள், இவைகளில் எரிச்சல் கண்டால் இருமல் காணும். எந்த விதத்திலாவது சுவாசத்திற்கு தடைபானால் இருமல் தோன்றும். ஆகவே இருதயம், ரத்த நாடிகளின் பாகைகளினுலும், மார்புகண்டல் காணும் எரிச்சல், விக்கம், கட்டி, சீழ், இவைகளினுலும், வயிற்றுக்கண்டுக்கு சம்பந்தப்பட்ட பலவித அங்கங்களின் நோய்களினுலும் இருமல் காணும். இது சாதாரணமாக, கூடியம், ஸ்வாசம், கபஜ்வரம், இருதபேளாம் முகவிய வியாதிகளின் லக்ஷணமா யிருக்கும்.

ஸ்வநுபம்:—விட்டுவிட்டு அல்லது விடாமல் இருமல் காணும். கபம் விழும்; அல்லது விழாமல் இருக்கும். கபம் சாதாரண மாகவும் டெயாகவும் நுரைநுரையாகவும், ரத்தம் அல்லது சீழ் கலந்ததாகவும் இருக்கலாம். சிலவேளையில் தூர்வாசனை

யுடையதாக யிருக்கும். அந்தந்த வியாதிக்கு சம் பந்தப்பட்ட லக்ஷணங்களோடு கூடி யிருக்கும். அரோசகம், மைபந்தம், ஜவரம், தூக்கம் செடுகல், ஸ்வாஸபந்தம், இவைகள். இருமலோடு கூடிய லக்ஷணங்களாகும்.

சிகிச்சை:—இருமலின்காரணத்தைத்தெரிந்து கொண்டு அதை நிக்கிக்கொண்டாலே இருபல் நிவரத்தியாகும். இருமலுக்காகவே தனியே பருந்து வேண்டாப். ஆகாரதோஷத்தையும் மலதோஷத்தை யும் நிவர்த்தி செய்துவந்தாலே போதும். இருமலைத்தனிக்கக்கூடிய ஒளஷத்தீக வௌல்லாம் சரீரத்தின் சத்தைக்கூடிக்கக்கூடியதாகைபால் இருமலுக்காக மருந்தின் உட்போகப் கூடாது. இருமலமருந்துகளில் அனினி அல்லது அபினி போன்ற கெட்டபழக்கத்தை செய்கின்ற ஒளஷதங்களை கலந்துள்ளதாகையால் இவ்வளஷத்தீகளை எவனும் எவ்விதத்திலும் உபயோகிக்கக்கூடாது. மற்றவித்தீகளை அனுசரித்து ஒருவன் இஞ்சிரசத்தை மாத்திரம் சாப்பிட்டால் இருமல் நின்தும். அல்லது சுக்கு கஷாயத்தைச் சாப்பிடலாம். அல்லது தனியே மினகு கஷாயத்தை மாத்திரம் சாப்பிட்டால் போதும். அல்லது தனியே திப்பிலி கஷாயத்தை மிராத் திரம் சாப்பிடலாம். அல்லது திரிகடுகஷாயத்தை உபயோகிக்கலாம். மைபந்தம் அல்லது பிரத்தகுடுவதைக்கமா யிருந்தால் தனியே சுக்கு மினகு திப்பிலிகளோடாது திரிகடுகஷாடாவது கடுக்காபைச் சேசர்த்து ஏதாய்பாக உபயோகிக்கலாம். கஷயம் முதலிய

வீபாதிகளில் காணும் இருமலுக்கு அந்தந்தவியா தியின் சிகிச்சைகளை செய்யவேண்டும்.

9. முத்திரக்குறைவு

நொனம்:-முன்று தோஷங்களினாலும் இது வரக்கூடிய தானுலும் பித்தபிரகோபமே இதற்கு முக்கியமான காரணமாகும். பித்தம் அதிகமாகக் கூடிய உப்பு, காரம், புளி, முதலியவைகளும், உஷ் ணமான ஆகாங்களும், கள், சாராய், அபினி, சஞ்சா, முதலிப் ளகிரிபதார்த்தங்களின்உபயோகமும். சீர்த்திற்கு வேண்டிய அளவு ஐ ல பானமில் லாததும் மூக்கிரக்குறைவுக்கு காரணங்களாகும்.

கோநுபம்:-சகஜமாக தினந்தோறும் தள்ள வேண்டிய முத்திரம் குறைந்து கொண்டே வரும். சிலவீளையில் நாளொன்றுக்கு ஒரு பல்லமுத்திரம் கூட வெளிபாகாமலுமிருக்கும். முத்திர நிறமும் மற்ற குணங்களும் மாறும். அல்புமின் அங்கமா யிருக்கும்; இல்லாமலுமிருக்கும். ரத்தம், சிழ், சளி, சில உப்பு சததுக்கள், மணல், சதைகள், இவைகளில் ஒன்று அல்லது எல்லாம் கலந்திருக்கும். அரோசகம், மலபந்தம், அக்னிமாந்தம், தாகம், இருமல், வாந்தி, தணியே முகத்திலாவது, பாதங்கள் அல்லது கால்களிலாவது, சர்வாங்கத்திலாவது வீக்கம் காணும். ஆரம்பத்தில் இந்த வீக்கத்தை அழுத்தினால் பள்ளம் விழாம் விருக்கும். பிறது விழும். வீக்கம் முற்றினபிறது மார்புகளை கூடும் வயிற்றுக்கண்டிலும் ஜலம் தங்கினாகுறிகளைக்

காட்டும். இந்த அவஸ்தையில் ஆயாசமும் முச்ச விழுவதற்கு கஷ்டமும் உண்டாகும்.

சிகிச்சை:—சாரணத்தை நிவர்த்திசெய்து கொள்ளவும். உப்பு, காரம், புளி, காப்பிடை, முதலியவை களின் உபயோகத்தை நிறுத்தவும். மலபங்கத்தை நிவர்த்தி செய்து கொள்ளவும். எல்லா விதமான உணவு பதார்த்தங்களை நிறுத்தி தண்ணீரை அடிக்கடி குடிக்கவேண்டும். சரசிகிச்சையில் சொல்லியுள்ள ஆவிஸ்நானத்தை நாளுக்கு ஒன்று, இரண்டு அல்லது மூன்று தடவை செய்ய வேண்டும். பொறுக்க முடியாத பசி தோன்றினால் எலுமிச்சம் பழம், திராங்கூசம் பழம், கிச்சிலி பழம், வாழைப்பழம், இவைகளையாவது இளாங்கி, பசம் பால், வெள்ளாரியின் ரசமாவது உபயோகிக்கலாம். இந்த விதிகளையனுசரித்தாலே போதும். அல்லது வெங்காரம், வெடியுப்பு, பேதியுப்பென் னும் இவைகளின் மிஸ்டத்தையாவது நெறிஞ்சல், முக்கரட்டை, சோம்பு, வெடியுப்பு, வெங்காரம், இவைகளின் சூரணத்தையாவது உபயோகித்தால் முத்திரம் தாராளமாக விசர்ஜனியாகும்.

இது நிவர்த்தியான பிறகும் முத்திர பக்தத்திற்கு ஏதுவான உப்பு, காரம், புளி, முதலியவை களை உபயோகிக்காமல், மல முத்திரங்கள், சுலபமாக விசர்ஜனையாகக்கூடிய பித்த சாந்தமான ஆகாரங்களையே உபயோகிக்க வேண்டும். காபி, டை, சாராயம், முதலிய பழக்கங்களிருந்தால் அவை

களைத் திரும்பவும் ஆரம்பம் செய்பலாகாது
வேண்டிய அளவு ஜலபானம் செய்ய வேண்டும்.

முத்திரத்தில் கானும் அஸ்மரி, சீழ், ஏத்தம்
அல்புமிள், இவைகளில் எல்லாவற்றிலும் முக்திரக்
குறைவுக்கு சொல்லியுள்ள சிகிச்சை செய்தால்
நிவாரத்தியாகும்.

10. மதுமேகம்

நிதானம்:—ஆகார தோஷமீம் இதற்கு முக்ய
மான காரணம், ஜீணசக்தி கெட்டு சோம்பலான
வாழ்க்கையில் இருப்பவர்கள் அளவுக்கு மிஞ்சின
ஆகாரம் தின்னுவதால் மதுமேகம் கானும்.

சோநுபக்ஃ—சகஜமாக பெளிப்பட வேண்டிய
அளவுக்கு அதிகமாக மூக்திரம் அடிக்கடி
வெளிப்படும். நிறத்திலும் குணத்திலும்
முத்திரம் மாறியிருக்கும். அதில் சக்கரை இருக்கும். அல்புமின் இருக்கும்; இல்லாமலும் இருக்கும். ஆரம்பத்தில் இதனால்பாதொரு பாதையும் தோன்றுவிட்டாலும் காலக்கிரமத்தில் அடிக்கடி முத்திரவிசர்ஜனையின் தொந்திரவும், அதிகமானதாகழும்
பசியும், இடுப்பு சந்துகளில் நோயும், கைகால்களில் வரிச்சலும் கானும். நாள்டையில் இந்த வகைணக்கள் பலமாகும். அடிக்கடி ஆபாசம் பீதான்றும். மயக்கம் வந்தாலும் வரும். சீராத்தில் ஆங்காங்கு சொற்களைபாவது, பற்றைளைபாவது பார்க்கலாம். கட்டுகள் கொம்பும் இந்தக்கட்டுகளை விசீசஷி மாக

கழுத்து, புஜம், முதுகு இந்த பாகங்களில் பார்க்கலாம்.

சிகிச்சை:—ஆகார தொழில்தன்மை இந்த நோயை ஆகாரநிபந்களை யினுடையே நிவர்த்தியாக்க வேண்டும். சோம்பலான வாழ்ச்சையை தேசப்பயிற்சியினால் மாற்றிக்கொள்ள வேண்டும். ஜின்ன சக்தி குறைந்தவர்கள் சரீரத்தில் அளவுக்கு மின்சின் சர்க்கரை உற்பத்தியாகும் உணவுப் பொருள்களையே உபயோகப்படுத்துவதனால் இந்நோய் காலூமானக்கயால் இத்தனையடதார்த்தங்களை உண்ண வீகாரது. எல்லாவிதமான பழவர்க்கங்கள், வெல்லப், சர்க்கரை முதலியமதாருசியுடைய பொருள்களை ஆகாரத்திலிருந்து நீக்கவேண்டும். அப்படியே பாலும் அதுபோன்ற வஸ்துக்களும் கூடாது. அப்படியே புளிப்பான வஸ்துக்களும் முத்திரக்கை அதிகப் படுத்துப் பொருட்களும், தள்ளவேண்டும். துவர்ப்பு, சைப்பு, உப்பு, காரம், இந்தருசியுள்ள பொருட்கள் இந்த நோயின் நிவர்த்தக்கரு சகாயமானவை. அரிசி சப்பங்கமான உணவுகளை உபயோகிக்காமல் கோதுமை அல்லது கேழ்வரகை சாப்பிட வேண்டும். இவைகளையும் தனிப்படுக காபல்தின்ன வேண்டும். அரிசியை தின்றே ஆகவேண்டுமென்பவர்கள் கொஞ்சப்கூட தவிடெடுக்காமலும் அதிகம் வேகவைக் காமலும் கேழ்வரகு அல்லது கோதுமையோடு கலந்து கொஞ்சமாக சாப்பிடலாம். சமையலிலும் தின்பண்டங்களிலும் சோற்றுப்பை தாரானமாக தின்ன வேண்டும். பின்க

வாழைக்காய், வாழைப்பூ, பிஞ்ச அத்திக்காய், பாவக்காய், எள், முற்றின் தேங்காய் இவைகளைத் தின்னாம். பால் பதிலூகு கொஞ்சம் மோர் உபயோகிக்கலாம்.

ஆம்பத்தில் மூன்று முதல் ஏழு நாள் வரை யில் பூரண உபவாசமிருக்கவேண்டும். மத்தியில் அதிகமான பசி வந்தால் தீகழ்வரகு அல்லது கோதுமை கஞ்சி மாத்திரம் சாப்பிடலாம். கஞ்சிக்கு பாலையாவது அல்லது சர்க்கரை வெல்லத்தையாவது சேர்க்கக்கூடாது. உப்பை தாராளமாக சேர்க்கவேண்டும்.

இந்த விதிகளை அநுசரித்தாலே போதும், வேறெந்த ஒளாஷதிகளும் வேண்டியகில்லை. இந்த விதிகளை சமீயாக கவனிக்க முடியாதவர்கள் வேப்பிலை அல்லது வேப்பம் பட்டை கஷாயமாவது, நாக கொழுங்கு அல்லது பட்டை இவைகளின் கஷாயமாவது, பாவக்காய் அல்லது பாவதிலை ரசத்தையாவது ஒரு மண்டலம் வரையில் சாப்பிட்டுக் கொண்டே வந்தால் இந்த நோய் தீரும்.

இந்த நோயில் சானும் ராஜிசட்டிகளுக்கு சாதாரண கட்டிகளுக்கு செய்யும் சிகிச்சையே போதும். இதுவரையில் சொல்லியுள்ள உபவாசம், பத்தியம் முதலிப்பவைகளை நன்றாககவனிக்கவேண்டும். மதுமேகத்தில் கானும் கட்டிகளுக்காவது ரணங்களுக்காவது சல்திரவைத்தியம் செய்தால் அநேக

மாச ஆபத்தில் முடியுமாகையால் மதுபீயகத்தில் எந்த ஆயுதப்ரயோகத்தையும் செய்யக்கூடாது.

இந்த வியாதியிலிருந்து பூர்ணம் விவரத்தையடைந்த பிறகும், மேலே சொல்லினால் ஆகாரனிய மத்தை நன்றாக கவனித்து வரவேண்டும். மெல்ல மெல்லமாகவே பழப ஆகாரத்தை சொஞ்சங் கொஞ்சமாக உபயோகிக்க வேண்டும்.

11. தூக்கம் கெடுதல்

நிதானம்—தூக்கம் கெடுவதற்கு காரணங்கள் எவ்வளவோ உண்டு. அன்னபானுதி தோஷங்களும் மனக்கவலையும், காப்பி, தேயிலை, கள், சாராயம், அதிகமான உப்பு, காரம், புளிமுதலிய பித்தபதார்த்தங்களின் உபயோகம், வாயு அல்லது பித்தப்ரகோபம், மலபந்தம், இவைகள் தூக்கம் கெடுவதற்கு முக்கியமான காரணங்களாகும். அதிகமான சுரம், கூபம், காஸ், ஸ்வாஸம், இருதயனோய், இந்த நோய்களில் தூக்கம் கெடும். அநேகமாக இது விபரிதமான வேறு நோய்களின் கூநாமாகும்.

சிகிச்சை—இதற்கு தனியே சிகிச்சை வேண்டியதில்லை. அந்தந்த நோய்க்கு வேண்டிய சிகிச்சை செய்தாலுமே இந்தபாதை தீரும். காரணத்தை தெரிந்து கொண்டு அதை நீக்கினுவே போதும்.

ஜூவகைமலங்கள் சரிவரகழிக்க வேண்டும். சலபமாக ஜீர்ணமாகக் கூடிய லகுவான ஆகாரத்தையே கொள்ளவேண்டும். இதற்கு முன்பாகவே ஒன்று

இரண்டு அல்லது மூன்று நாள் உண்ணு விரதத்துடன் வேண்டியபளவு தண்ணீரை குட்டத்துக்கொண்டு வரவேண்டும். அல்லது ஐவர்ப். அரோசகம் முதலிய அத்பாயங்களில் சோல்லியுள்ள ஆகாரவிதிகளை கவனிக்க வேண்டும். வாத சித்த சாந்தமான உணவுகளைப் பொதுக்கி வேண்டும். தோப்பு, பகை, மனக்கவலை, இலவசன் அதிகரிக்கும் விவகாரங்களிலின்று நிவர்த்திபாக வேண்டும். சரிசரத்தின் ஆரோக்கிய நிலைமை இடங்களுமாயின் காலையிலும் மாலையிலும் தண்ணீரிலையே ஸ்நானம் செய்தல் வேண்டும். ஸ்நானத்திற்கு முன்பும் பின்பும் எலுமிச்சம் பழுத்தின் ரசத்தை தலைக்கு நன்றாக தேப்க்க வேண்டும். இதையே உள்ளுக்கும் கொடுக்க வேண்டும். இந்தத் தண்ணீர் ஸ்நானத்தையும் எலுமிச்சம் பழுத்தையும் உபயோகித்து வேண்டிய பயன்கிடைக்க, விட்டால், தனங்கூதாறும் மாலையில் ஆவிஸ்நானம் செய்ய வேண்டும். மிதமிஞ்சின ஆகாரத்தை தின்று ஜீர்ணசக்திகெட்டு சோம்பலாக வாழ்பவர்கள் தமது ஆகாரத்தை குறைத்துக்கொண்டு வேண்டியதேகப் பயிற்சி செய்ய வேண்டும்.

துறிப்பு:—தலைநோய் முதலிய பாகை களின் நிவர்த்திக்காக உலகில் கணக்கில்லாத ஒளாஷ்திகள் இருப்பது போல் தூக்கம் கெட்ட வர்களுக்கும் அளவில்லாத ஒளாஷ்திகள் உண்டு. தலைநோயுக்காவது தூங்கப்பக்கத்திற்காகவாவது உபயோகிக்கும் ஒளாஷ்திகளை வொல்லாம் சரிசரத்தினுடைப் பழைப்பலக்

தையும் தேகபலத்தையும் குறைத்து, சிலசபயத் தில் பிரானைபத்துக்கும் இடம் தருவதனால் இந்த ஒளஷதிகளின் உபயோகம் கூடாது. அநேகமாக இதில் அபினி அல்லது அதுபோன்ற விஷபதார்த்தங்கள் கலந்திருப்பதனாலும் இவைகளின் உபயோகம் பண்டங்கு வியாதமையக் காட்டிலும் தீயைப்பவரவழைக்கக் கூடியபழக் கத்திற்கு இடம்தருவதனாலும் இரத ஒளஷத்தை உபயோகிக்கலாகாது. பேல்நாட்டு அல்லது சிழ்ணாட்டியின் சிலஒளஷதிகளும் ஆபத்துக்கே இடம் தருமானங்கால் வைத்தியர்களும் வியாதையஸ்தர்களும் இவைகளை உபயோகிக்காமலிருத்தல் வேண்டும்.

12. பலஹீனம்

நிதானம்:—மலங்களின் பந்தம், ரத்தபிரவாகம், நீடித்துவந்த கரம், வாந்தி, ரீதி, அஜீரணம், மனக்கவலை, காப்பி, ம, சாராயம் பூதலியவைகளின் உபயோகம், வெளிக்குத் தகுந்த போஷணையில் வாழும், மிதமிஞ்சின ஸ்தரி புருஷ போகம் இவைகள் முக்கீயமான காரணங்கள்.

கோநுபம்:—எதேனும் ஓர் பாகம் அல்லது ஒரு அங்கம் பலஹீனாகத் தோன்றும். இபற்றையான கார்யங்களாகிய நடத்தல், பேசுதல் முதலிப் சாதாரண கார்யங்களில் ஆயாசம்தோன்றும். இந்த காரியங்களை பலப்படுத்தினால் பலஹீனம் இன்னும் அதிகபாக தோன்றும். பலஹீனம் முற்றி

மபக்கத்திற்கு இடங் கொடுக்கும், மலமுத்திரபங்களின் துறிகள், ரத்தக்குறையின் துறிகளாகப் பரண்டிரும், கைகால் முதலிபவைகளில் விக்கம் முதலிபவைகள் காணும்.

சிகிச்சை:—ஆகார தோஷங்கள் அஜீரணம் முதலிப மேலெசால்லிபுள்ள காரணங்களை விவரத்திலேசுப்பது கொண்டால் பலவினம் தானுநவீவிவரத்திபாசும். மலமுத்திரங்களின் தடபை சீர்ப்படுத்திக் கொண்டு சாராபர், காப்பி, ம, முதலிபவைகளின் பழக்கங்களை விறுத்திக்கொண்டு ஜீரணசக்திபை விருத்திபாக்கும் வழிபைத் தேடலேவண்டும். மீனுபலத்திற்குத்தகுட்கால் தேடங்களிருத்தல் வேண்டும். அந்தந்த தேடங்களிற் கனுசரித்தவாறு ஆகார விபாத்திடன் பிராணுபாம் முதலிபதேகப் பயிற்சிகளை செய்தல் வேண்டும். தேடபலம் மீனுபலங்களை குறைக்கக் கூடிய வழங்க பழக்கங்களை விறுத்தல் வேண்டும்.

பலத்திற் காகவே தனிதேய ஒளாஷதங்கள் வேண்டியதில்லை. இதற்கென்றே மருந்துகளையாவது சாராயங்கலந்த வஸ்துக்களையாவது, மாமிச சத்துக்களையாவது, பாரும் உபயோகிக்க வேண்டாம். இவைகளின் உபயோகத்தினால் பலம் இன்னும் குறைவுத்தன்று அறியவேண்டும்.

13. மயக்கம், அபஸ்மாரம், வளி முதலியன்.

நிதானம்:—தீர்தோஷங்களில் ஏதேனும் ஒன்று, இரண்டு அல்லது மூன்று இதற்கு காரணமாகும். அநேகமாக பெற்றீருங்களின் மூலமாக இது உண்டாகி மலபங்தங்களினாலும் வழக்க பழக்கத்தினுடையும், மற்ற கோஷங்களினாலும் இது பலப்படுகிறது. இதற்கு ஏதோ ஒரு பேய் காரணமென்று அறியாதவர்களின் எண்ணம். உலகில் பேய் என்பதேயிஸ்லை. பேய் என்பது மனதின் விருப்பமாகும்.

சோநுபம்:—பலஹரினத்தில் சொல்லியுள்ள லக்ஷ்ணங்களை இங்கும் கவனிக்கவும். ஏதாவது வேலை செய்தால் அல்லது சரீரத்திற்கு ஆயாசம் உண்டாகும் ஒரு விருத்திகளில் இறங்கினால் மயக்கம் தோன்றும். இந்த மயக்கம் விபரீதமாய் கொஞ்ச நேரம் அல்லது சில நாட்கள் வரையில் பிரக்ஞஞ்சத்துவருதலுண்டு. இதோடு வளி இருக்கும். இல்லாமலும் இருக்கும். சிலிடத்தில் பெருத்த சூச்சேஷாக இது ஆரம்பமாகும். திடைரென்று விழுந்து வாயில் நுரைத் தன்றைவது முண்டு. சில நேரம் வரையில் சிலருக்கு கைகால்கள் அசைவதைப் பார்க்கலாம். மலபங்தங்களின் குறிகளும் தீரிதோஷங்களில் ஏதேனும் ஒன்று, இரண்டு அல்லது மூன்றின் குறிகளையும் காணலாம்.

சிகிச்சை:—பலவீனத்தில் சொல்லியுள்ள சிகிச்சா முறையை இங்கும் கவனிக்க வேண்டும். மலங்களின் பந்தத்தை நிவர்த்திக்க வேண்டும். அந்தந்த தோஷத்தை பரிகாரம் செய்யும் படியான ஆகாரத்தை உபயோகிக்க வேண்டும். மனைபலத்திற்கு வேண்டிய உபதீசங்களைச் செய்யவேண்டும். இதற்கென்றே தனியே ஒன்றைத் தம் வேண்டாம். அல்லது எலுமிச்சம்பழம், நெல்லிக்காய், திரிபலம், பிருங்காமலக தைலம், இவைகளை உபயோகிக்கலாம். பச்சஜலஸ்நானம், பிரான்யாமம் முதலிய தேகப்பயிர்ச்சி இவைகளுக்கு அனுகூலமாகும்.

14. இரத்த பிரவாகம்.

நொனம்:—இதற்கு காரணங்கள் பலவிருப்பினும் பித்தமிரகோபமே இதற்கு காரணமாகும். பிரகோபமான வாயுவும் பித்த பிரகோபத்திற்கு சாயம். பித்த பிரகோபத்திற்கு அனுகூலமான ஆஶாரங்களும், காப்பி, ஹ, கள், சாராயம் முதலிய வஸ்துக்களின் பழக்கங்களும், மலபந்தங் களினால் உண்டாகும் தோஷங்களும், ரத்தப் பிரவாகத்திற்கு காரணங்களாகும். அடிப்பட்டாலும் காயமானாலும் ரத்தம் விழும். மேகவியாதி, கூபவியாதி, மூலவியாதி மீறுதப்போகம், இவைகளிலும் ரத்தமிரவாகச் சைதைப் பார்க்கலாம்.

சேநுபம்:—பித்த பிரகோபத்தின் லக்ஞங்களை மிருக்கும். மலமுத்திர பந்தங்களின் குறிப்பு.

களுண்டு. முக்குதுவாரம், தொண்டை, ஈறு, மலத் துவாரம், முத்திரத் துவாரம், யோனித் துவாரம் இவைகளின் மூலமாக ரத்தம் விழும். மூனை, அல்லது மற்ற அங்கங்களின் நாடிகள் உடைந்து உள்ளன ரத்தம் விழுவது முன்டுதனியே பித்த சுரத்தி லாவது, வாதசித்த சுரத்திலாவது, ஐன்னிசுரத்தி லாவது, சூடுஅதிகப்பட்ட மேலே சொல்லியுள்ள இடங்களிலிருந்து ரத்தம் விழும் அந்தந்த அரங்க வின் லக்ஷணங்களுமுண்டு. மேகம், கஷ்யம், உஷைம், வெள்ளை ஹிருதய ரோகம், மூல வியாதி இவைகளில் ஏதேனும் ஒன்று அல்லது அநேக வியாதிகளில் லக்ஷணங்களைப் பார்க்கலாம். இந்த வியாதிகளில் ரத்தப் பிரவாகம் அடிக்கடி காணக் கூடியாயினும், ஆகார தோஷத்தினாலும், மலபந்த ங்களினாலும் இதுபலமாய் காட்டும். ரத்தபிரவாகம் இரண்டொரு துளியிலிருந்து பிரான்பத்திற்கு இடங் தரக்கடிய அளவு வரையில் காணலாம். அடி, கடி காயங்களில் அந்தந்த குறிகளைக் காணலாம்.

சிகிச்சை:—மல பந்தங்களின் நிவர்த்தியும், பித்த தஹரமான ஆகாரங்களும், கோபம், தாபம் சுறுசுறுப்பு இல்லாத சாந்தமான வாழ்க்கையும், மிதமான விவகாரங்களும், மனைபுத்தி சீரத்திற்கு சரியான ஒய்வும், சரியான சிகிச்சையாகும். இதற்கென்று தனியே ஒளஷதங்கள் வேண்டாம். மேலே சொன்ன விதிகளுக்கு தண்ணீர் ஸ்னானம் சகாயமாகும். ரத்தம் விழும் இடங்களில் இடைவிடாமல்

தண்ணீரில் தோய்க்க குட்டையை வைத்துக் கொண்டே வரவேண்டு. பெருத்த காயத்தில் சரியான ரத்தநாடியைக் கண்டு பிடித்து அதைக்கட்டி அதற்குச்சரியான சல்தா வைத்தியம் செய்பவேண்டும். பித்தசாந்தமான ஆக்ராங்களோடு துவர்ப்புடைய பதார்த்தங்களாகிய மாதுளம் பிஞ்சு, கொய்யாப் பிஞ்சு, வாழூப்பு, வரழூசுக் கச்சல், பிஞ்சு அத்திக்காய், இவைகளை உபயோகிக்கலாம். தனியே கடீக்காயாவது, திரிபலத்தையாவது, கடுக்காயெண்ணென்றாலும் உபயோகிக்கலாம். கூடியப், மின்ஸம், முளை, ஹிருதபக்காய், சிதபேதி, மூலப், முத்திரகோஷம், கர்ப்பகோஷம், இவைகளில் காணும் ரத்தபிரவர்க்கமும் ஸ்தான பேதத்தினும் வியாக்களின் பேர்களின் பேதத்தினும், வெவ்வேறுக தோன்றினும் இவைகளை வள்ளாய் ஒரேவித்யான சிகிச்சைக்குப், பத்தியத்திற்கும், ஆகாரத்திற்கும் உட்படுவதனால் இவைகள் வெவ்வேறுவான். இவைகளுக்குத் தனித்தனியே சிகிச்சை வேண்டார். பொதுவான சிகிச்சையே போதும்.

15. சுவாச காசம்

நிதானம்:—இருபவில் சொல்லியுள்ள மீஷயங்களை இங்கும் கவனிக்க வேண்டுப். தனியே வாத, பித்தம் அல்லது தொந்துங்களினுல் இது காணும். அநேகருக்கு இது பெற்றீர்களின் மூலமாக வரும் நோய். பிறப்பினால் வந்து இந்த நோய்

ஆகார தோஷங்களினுலும், மலபந்தங்களினுலும், பல செட்டபழக்கங்களினுலும் விருத்தியாகும்.

சோநுபமி:—காசம் அல்லது இருமலில் கானும் எக்ஷனங்களைல்லாம் இதிலும் பார்க்கலாம் திரிதொஷங்களில் ஏதேனும் ஒன்று அல்லது இரண்டு கோஷங்களின் பிரேகாபத்தைப் பார்க்கலாம். மலபந்தம், அரோசகம், வயிற்றுப்புஸம், இருமல், பெருமுச்ச இவைகள் முக்கியமான எக்ஷனங்கள். சரம் இருக்கும். இல்லாமலும் மிருக்கும். சாதாரண மூச்சைக் காட்டிலும் அது அதிகமாக வும், வேகமாகவும் மிருக்கும். அதோடு சில சமயத்தில் “கூ” என்ற சப்தம் கேட்கும். மூச்ச விடும் பொழுது மார்பின் சதைகள் விசேஷமாக விரிவதையும் சுருங்குவதையும் பார்க்கலாம். சில வேளையில் மூச்ச விடுவதற்கு கஷ்டமாய், ஓர் ஆபத்தான நிலைமைக்கு வருவதுமுண்டு. நுரையீரல்களைப் பரிசுவித்தால் கபம் தங்கியிருக்கும் குறிகளும் ஓர் விதமான ‘கூ’ என்ற குறிகளும் காணலாம்.

சிக்ச்சை:—இருமலின் சிக்ச்சையில் சொல்லியுள்ள விதிகளை இதிலும் கவனிக்க வேண்டும். மலபந்தங்களை நிவர்த்தி செய்து கொண்டு அந்தந்த தோஷஹரமான ஆகாரத்தை கொள்ள வேண்டும். இது கண்டகாலத்தில் மலபந்தத்தை நீக்கிக் கொண்டு 3 நாள் வெறும் ஜலம் அல்லது கஞ்சிதண்ணீரை குடித்துக் கொண்டே வரவேண்டும். சாதாரணமாய் இச்சிக்சையே போதும். இஞ்சி அல்லது துளசி ரசத்தை நாளுக்கு இரண்டு அல்லது

மூன்று முறை சாப்பிடலாம். அல்லது திரிகடு கவாயத்தையாவது, திரிகடு கடுக்காய் கலந்த கவாயத்தையாவது உபயோகிக்கலாம்.

இந்த சுவாசகாஸ பாதை சிவர்த்தியான பிறகும் அண்ணபானுதிகளின் சிபங்தனைகள் இருத்தல் வேண்டும். மலபங்தம் வராமல் பார்க்க வேண்டும். அந்தந்த தோஷமறைமான ஆகாரங்களையே கொள்ள வேண்டும். இதோடு நமது ஆரோக்கிய நாலில் விவரித்துள்ள பிராண்யாம பழிற்சியை செய்ய வேண்டும்.

தறிப்பு:— அநேகரிடத்தில் இங்னோய் அடிக்கடி தோன்றுவதையும், இதுதீராத நோயாகவும் பரச்சின்தீரும். ஆனால் மேலே சொல்லிபுள்ள விதிகளை ஒருவன் அனுசரித்து வந்தால் வந்த நோய் தீரும். இனிதீவுல் வராதபடியும் தடுக்கலாம். ஆகாரங்களையுடன் பிராண்யாமத்தைப் பக்தபோடு செய்து கொண்டே வந்தால் வியாதியை சிவர்த்திக்கலாம்.

16. கூதயம்

நிதானம்:— திரிதோஷத்தில் ஏதேனும் ஒன்று காரணமாக இருக்கலாம். இதுவும் பெற்றவர்களின் மூலமாக வரச்சூடியது. ஆகார தோஷங்களும் தேகத்தின் சங்கிலைபக்குறைக்கும் கெட்டபழக்கங்களும், வேலைகளும், சிபரீதல்ஸ்தீரி பூருஷ போகமும் முக்கிய காரணங்களாகும். பிடி, சுருட்டி, காப்பி, தேயிலை, கஞ்சா, அபினி, சாராயம், முதலிபவைக

வின் உபயோகமும் காரணமாதும். வேலைக்கு கருந்த ஆகாரம் கொள்ளாத தம், பீவறு நோய்களினால் ஏத்தம் கெட்டு சரீரத்தின் பலம் குறைவதனாலும் கஷயம் தோன்றும்.

மேல்நாட்டு வைத்தியத்தை யனுசரித்து ஒரு விசேஷமான பூச்சி இகற்கு காரணமென்றும், இது ஒரு தொத்து வியாதி யென்றும் சொல்லுவார்கள். ஆனால் இதற்கு மேலே சொல்லப்பட்டவைகளே காரணங்கள். பூச்சி காரணமல்ல, இது தொத்து வியாதியுமல்ல.

சோநுபம்:—பெற்றேர்களின் மூலமாக இது வந்திருப்பின் பிறப்பிலேயே சரீரம் கூடிணித்திருக்கும். பிறகும் அது புஷ்டி-த்திராமல் கூடிணத்தைச் செய்யடைந்து கொண்டே வரும். பால்பத்திலிருந்தே அன்னத்துவேஷமும், அஜிரணமுமிருக்கும். அடிக்கடி உட்சரம் பாதித்துக் கொண்டே வரும். சில வேளைகளில் விடாமலும் காடும். கொஞ்சம் கொஞ்சம் இருமல் காணும். ஆங்காங்கு விண்டீர் கோளங்களின் வீக்கங்களைப் பார்க்கலாம். இதையே கழுத்தில் விசேஷமாய்க் காணலாம். இந்த வியாதி விருத்தி ஆகதூக இந்த கைஷணங்களைல்லாம் விருத்தியாகிக் கொண்டே போகும். சரமும் இருமலும் விடாமல் பிருக்கும். இந்த சரம் சில சமயத்தில் ஜீர்ணசக்தி கெடுக்கும். குளிரோடு ஆரம்பமாய் அநேகமாக ராத்திரி வேளையில் வியர்வை விட்டு குறைந்துவிடும். அதிகமாகப் பாண்டு ரோகத்தின் கைஷணங்களைக் காணலாம்.

சீரம் விசேஷமாய் கூடிணித்துக் கொண்டே வரும். சுதையும் கொழுப்பும் கரைந்து எலும்புகள் தோன்றும். நுரையீரல்களைப் பரிகாலித்தால் அவைகள் இயற்கை குணம் மாறியிருக்கும். ஒரு பக்கத்தில் அல்லது இருபக்கத்தில் அநேகமாக மேம்புறத்தில் நுரையீரல் மெதுவான சப்தம் மாறி கெட்டியான சப்தம் கேட்கும். கபம் சேர்ந்துள்ள அடையானம் இருக்கும்.

உஸ்சவாச நிஸ்சவாச சப்தங்கள் மாறும். காளனடவில் செட்டி சப்தம் மாறி போல் சப்தம் கேட்கும். கபம் கெட்டியாயும். தூர்வாசனை யிடையதாயு மிருக்கும். இதில் ஒர் விதமான மணல் போன்ற பொருள் தோன்றும். சில வேளையில் கபத் தோடு ரத்தம் கலந்திருக்கும். சிலர் ரததம் மாத்திரம் அடிக்கடி வெளிப் படுத்துவது முன்னுடைய வியாதி முற்றினால் இந்த லக்ஷணங்கள் விருத்தியாவதுடன் ரத்தபலம் அதிகமாக குறைந்து கைகால்களில் வீக்கங்களை காணும். பேதியும் மஹோதரமும் இருக்கலாம்.

சிகிச்சை:—இருமல் சாங்கவின் சிகிச்சைகளில் சொல்லியுள்ள விதிகளை இங்கும் வெனிக்க வேண்டும். இந்த வியாதி நிவர்த்திக்காக உலகில் கணக்கில்லாத ஒளாதைங்களிருந்தும் இந்த வியாதிக்கு நிவாரணையேயில்லை. முற்றிப்போன நோயும், அதுவும் சிறுவபதில் வங்கால் இது சிகிச்சைக்கு அசாத்தியம். இதன் ஆரம்பத்தில் காணும் சரமுத

விப ஸ்னங்களை உபவாசத்தின் மூலமாக நிறுத்திக் கொண்டு ஜீர்ணசக்தி நிருத்தியாகும் வழியைத் தேடவேண்டும். ஜீர்ணசக்திக் கேற்ற வாறு கொழுப் புடைபதும் புஷ்டியைத் தரக்கூடியது மூன்றாவது அளவோடு கொடுத்தல் வேண்டும். சுரம் முதலிப் பாதைகள் குறைந்து கொள்ளம் புஷ்டியானதே கிரமமாகவும் மெல்ல மெல்லமாகவும் நமது ஆரோக்யத்துவில் சொல்லியுள்ளபடி பிரான்யாமத்தைப்பக்தியோடுசெய்தல்வேண்டும். ஆரோக்யத்திற்கு இடையூறுள்ள நகர வாசத்தை விட்டு சுத்த காற்றுடைய வெட்டவெளி பிரதேசமாகிய கிராமங்களில் வசிக்கு நோய்க்கு ஏதுவரன் காரணங்களை நீக்கி, சரித்திற்கு ஹீனம் வரக்கூடிய எல்லாவிதமான விவகாரங்களை நிறுத்தி புஷ்டிகரமான ஆகாரத்தை உட்கொண்டு, கிரமமாக மூச்சிடிக்கும் பழக்கத்தைப் பலப்படுத்திக் கொண்டே வர வேண்டும். இந்தச் சாதனைகளைக் கவனித்தால் மாத்திரம் போதும். உயர்ந்த மருந்துகளாகிப் பவழம், முத்து, தங்கம்முதலிப்பதை நீர் பயனற்றவை.

17. மேகம்.

நிதானம்.—இது அநீசமாகப் பெற்றீருக்களின் மூலமாக வரக்கூடிய நோய். ஆணைது பெண்ணை வது வயதுக்கு வந்தபிறகு சரிம் அகிக பலவீனமான காலத்தில் பரஸ்பரம் போகம் செய்தாலாவது, பலஹீனம் இருக்குங்காலத்தில் ஒரு பகுத்தாருக்கு இந்த நோய் இருந்தால் மற்றொரு பகுத்

தாருக்கு ஒட்டிக் கொள்ளும். இதுவே முக்கிய காரணம். இதற்கு ஓர் விசேஷ பூச்சி என்று தல்லை.

சோநுபம்:—ஆரம்பத்தில் ஆனுக்காவது பெண்ணுக்காவது மர்மஸ்தானத்தில் வீக்கமும் ஏரிச்சலும் கண்டு பிறகு மூத்திர துவாரத்திலாவது, அதன் சமீபத்திலாவது, பொனிதுவாரத்திலாவது, கொப்பளம் தோன்றி அது காலக் கிரமத்தில் ரணமாகும். மூத்திரம் ஏரிச்சலிருக்கும். அற்பசரம் இருந்தாலும் இருக்கும். நாளடைவில் ரணம் பெருகி ரத்தம் அல்லது சீழ் விழுங்கு கொண்டே இருக்கும். இதை அல்க்யம் செய்தால் சிலாட்களுக்குள்ளே இந்த ரணத்தினால் ஜனைன்தீரியத்திற்குச் சம்பந்தப்பட்ட சதை நாசமாய் அதன்கார யம்கெடும். இந்த ரணம் இருக்கும் பொழுதாவது இது ஆறினபிறகாவது அறையில் ஒருபக்கம் அல்லது இருபக்கங்களில் கட்டிகள் தோன்றும். பிறகு தொண்டை கர்மல், கரம், அதன் பல குறிகளைக் கரீரமுழுதும் அல்லது ஏதோ சில பாகங்களில் மாத்திரம் சொரி அல்லது கொந்திகள் காணும். காலக் கிரமத்தில் இவைகள் பழுத்து இரண்டாவது முன்னு. கை கால் பிடிப்பு, சந்துகளில் வலி, வீக்கம், எலும்புகள் வீக்கம், கண் தோய், கண், நாக்கு, தொண்டை, இவைகளில் ரணம் ஆங்காங்கு கோளங்களின் வீக்கம், மேகக் கட்டிகள் முகவீய எக்னாங்கள், கிரந்திகள் கிளம்பும்போது அல்லது பிறகு காணும். மேக தோஷத்தினால் எல்லா வீகங்களை தாதுக்களும் அங்கங்களும் பாதிக்கப்படும்.

சிகிச்சை:—மல பந்தங்களை விவரத்திலெய்து கொண்டு சுறைந்தது மூன்றாள் பூர்ண உபவாச மிருக்கவேண்டும். கூடியஅளவு தண்ணீரையே குடுக்க வேண்டும். அல்லது குளிர்ச்சியான பாவங்களையே குடுக்க வேண்டும். ஸ்திரி புருஷ போகம் பூர்ணம் விறுத்தவேண்டும். ரணத்தை வெறும் ஜலத்தினால் கழுவி ஓர் ஈராமான துணியால் கட்டவேண்டும். ஈரம் ஆறின போதெல்லாம் துணியைச்சுத்த ஜலத்தில் நளைத்து நளைத்துக் கட்டவேண்டும், இதற்கு முன்பாக ஓர் தொட்டியில் தண்ணீர் வைத்து அதில் இரணம் இருக்கும் பாகம் முழுங்கும்படி $1/2$ மணி நேரம் உட்கார வேண்டும். உட்காரும் காலத்தில் நோயாளியே அந்த ரணத்தை அதில் கழுவிக் கொண்டே ஶிருக்க வேண்டும்.

இப்படிச் செய்தும் ரணம் ஆறுவிட்டால் வெறும் மஞ்சள் கியாழும், அல்லது வேப்பிலை மஞ்சள் கியாழுத்தில் ரணத்தைச்சுத்தப்படுத்தி அந்தக்கியாழத்தில் தோய்த்தச் சுத்தமான பெதுவான துணியை அந்த ரணத்திற்குக்கட்டவேண்டும். இதை ஒரு தினத்திற்குப்பலமுறை செய்ய வேண்டும், கழிவின பிறகு கியாழுத்திற்குப் பகில் வேப்பிலை மஞ்சளை அறைத்து ரணத்திற்குப் பூசிக் கொள்ளலாம். இந்த வேப்பிலை மஞ்சள் கியாழுத்தையே ஒரு நாளுக்கு இரண்டு அல்லது மூன்று முறைச் சாப்பிடலாம். அல்லது வேப்பிலை மாத்திரம் நாளொன்றுக்கு 5 வீதம் 7 தினம் வரையில் சாப்பிடலாம்.

முற்றிப்போன மேக கிரந்திகளுக்கும், கட்டி களுக்கும், ஈச, கால, பிழப்பு, சந்து வீக்கங்களுக்கும் இந்த சிகிச்சையே நீட்டது பலமாகச் செய்ய வேண்டும் பத்தியம் கடினமாயிருக்க வேண்டும். இதோடு நாளுக்கு ஒன்று, அல்லது இரண்டு முறை ஆவி ஸ்நானம் செய்தல் வேண்டும். இந்த வேப்பிலையையே । மண்டலம் வரையில் சாப்பிடலாம்.

18. வெள்ளை

நிதானம்:—மேகத்தில் சொல்லியுள்ள நிதான மூம் இதிலும் பொருந்தும். இது பெற்றோர்களின் மூலமாக வருவதுண்டு. அநேகமாக ஸ்தீர புருஷாள் போகத்தினால் ஒருவருடைய நோய் மற்ற ஒருவருக்கு ஒட்டிக் கொள்ளும்.

சோநுபம்:—மூத்திர துவாரத்திலாவது யோனித்துவாரத்திலாவது எரிச்சலோடு வெள்ளை கானும். அந்த பாகம் கொஞ்சம் வீங்கி யிருக்கும். மூத்திர விசர்ஜனங்க் செய்யும் பொழுது எரிச்சல் இன்னும் அதிகமிருக்கும். இந்த வெள்ளை இருக்கும் பொழுதாவது பிறகாவது அறைக்கட்டிகள், பிஜத்தின் வீக்கம், சந்துகளில் வளி, குடைச்சல், வீக்கம், கண், நோய் முதலியவைகள் கானும். முற்றினால் மூத்திர துவாரத்தைப் பாதித்து மூத்திர விசர்ஜனத் தடையாய் மூத்திர பந்தத்திற்கு இடம் கொடுக்கும். அநேக நாட்களாக கணுக்க

ஞக்ஞ சம்பந்தப்பட்ட எலும்புகள் வீங்கி அவைகள் தமது வேலையை செய்யாமல் போகும்.

சிகிச்சை:—முத்திரக் குறைவில் சொல்லியுள்ள சிகிச்சையின் விதிகளை இங்கு கவனிக்க வேண்டும். ஸ்தீர் புருஷ போகம் பூர்ணம் நிறுத்த வேண்டும். குறைந்தது 3 நாள் பூர்ண உபவாச மிருந்து எவ்வளவு ஜலம் குடிக்கக்கூடுமோ அவ்வளவு குடிக்க வேண்டும். பித்த சாந்தமான ஆகாரங்களையும் பானகங்களையும் உபயோகிக்க வேண்டும். வெண்டைக்காய், வெள்ளி, தற்போஸ், இளாநீர், மோர், இவைகளை தாராளமாய் உபயோகிக்க வேண்டும். அப்படியே எலுமிச்சம், கிச்சிலி, வாழைப் பழங்களையும் உபயோகிக்கலாம். உப்பு, காரம், புளிப்பு, மாமிசம், காப்பி, இ, சாராயம், மசாலைகளைப் பூர்ணம் நிறுத்த வேண்டும். குறைந்தது 2 தடவை தண்ணீரில் ஸ்நானம் செய்யவேண்டும். மர்மஸ்தானத்தை அடிக்கடிக்கு சுத்த ஜலத்தினால் கழுவிக் கொண்டே வாவேண்டும். இந்த விதிகளை கவனித்தால் போதும். வேறு சிகிச்சை வேண்டியதில்லை.

19. குஷ்டம்

நிதானம்:—இது அநேகமாக பெற்றேர் மூலமாக வரக்கூடிய நோய். சில சமயத்தில் முற்றின மேகம் குஷ்டமாக முடிவுத்தமுண்டு. இதற்கு ஓர் விசேஷமான பூச்சி காரணமென்று சொல்லப்படி நும் இது முக்கியமாக ஒர் கர்ம வியாதி. அவன் வன் செய்த வினையின் பயனை அவனுவது அவன்

சந்ததிகளாவது அனுபவித்தே தீர வேண்டுமென்னும் நியாயம் இந்த வியாதியில் நன்றாக கவனிக்கலாம். இது தொத்து வியாதி என்று சொல்லுவார்கள். ஆனால் இது தொத்து விபாதியுமல்ல. இது விசேஷ பூச்சியினாலுமுண்டாவது மில்லை.

சோநுபம்:—இங்கோயின் சொருபம் பல விதத்தில் காணலாம். தோவின் வீக்கம், ஏரிச்சல், திமிர், உணர்ச்சி குறைவு, வெடிப்பு, நிறம் மாறுதல், படை-விவைகளில் ஒன்று அடைகம் அல்லது எல்லாம் ஆரம்பத்தில் பார்க்கலாம். விவைகளை எங்கும் பார்க்கக்கூடுமாயினும் காது, கை, கால், விரல்கள், கைகள், பாதங்கள், கால்கள், முக்கியமான ஸ்தானங்கள் மற்ற பாகத்திலும் காணலாம். மற்ற வர்களுக்கு ஆங்காங்கு தோவின் தடிப்பு அல்லது சர்வாங்கத்தின் வீக்கம், அல்லது கிராந்திகள் மாத்திரம் காணுவதுண்டு. ஆரம்பத்திலிருந்தே திமிர் உண்டு. உணர்ச்சி கெடும். காலக்கிரமத்தில் கைகளிலும் பாதங்களிலும் வெடிப்பும் வீக்கமும் அதை கமாய்ச்சனம் தோன்றும். கால் விரல்களின் சந்துகளிலும் குதிக்கால்களிலும் இந்த ரணங்கள் விசேஷமாய் காணும். இவைகள் வட்டாகார மாயும் ஆழமாயுமிருக்கும். இந்த விபாதி இன்னும் முற்றினால் கை, கால், விரல்களின் சந்துகள் வீங்கி ரணமாய் விரல்களின் நுணி பாகம் விழுஞ்துவிடும். விரல்கள் மாத்தீர மல்லாயல் முழு கையாவது பாதமாவது விழுஞ்து விடுவது முன்னுடை.

சிகிச்சை:—தீயச் செயல்களினாலே வந்த இந்த நோய் நல்லினையினாலே போக வேண்டும். இடை விடாத ஈஸ்வர விருத்தியும், தானஞ் செய்தல் முதலிய உபகார வேலைகளும் மனோசித்திக்கும், சரீரசத்திக்கும், அனுகூலமான சாதனைகளும் இவ் விபாதிக்குத்தகுந்த சிகிச்சையாகும். தினங்தோறும் ஆவி ஸ்நானம், தண்ணீர் ஸ்நானம், கூடியவரையில் உபவாசம், பித்த சாந்தமான குளிமையான காய்களிகளையும், பழங்களையும், மிதமாகவும் பச்சையாகவும் தன்னுதல், மாமசம், சாப்பி, உ, சாராயம் முதலிய பழக்கமிருப்பின் அவைகளைத் தள்ளுதல், பிரம்மச்சரிய விருதம், பிராண்யாமம் முதலியவைகளைச் செய்தல், ஏழைகளை ஆதரித்தாலும் வந்த நோய் போகும். வராமல் தடுக்கலாம். அல்லது வந்ததும் விருத்தியாகாமல் தடுக்கலாம். குஷ்ட வியாதிக் கெண்றே மருந்துகள் பல விருந்தும் மேலே சொல்லியுள்ள விதிகளை கவனியாது அவைகளை ஸலாம் பயனற்றவைகளாய்ப் போகின்றன. மருந்துதன்று ஆகவேண்டுமென்ற அவாவுடையவர் 2மண்டலம் வரையில் பச்சை வேப்பிலையை தின்னவேண்டும். முதல் நாள் ஓர் இலையில் ஆரம்பஞ் செய்து ஓர் மண்டலம் வரையில் தினம் ஒவ்வொன்றுக் எற்றிக் கொண்டு ஒரு மண்டலமானதே தினங்தோறும் ஓர் இலை. குறைத்துக் கொண்டு, கடைசியில் ஓர் இலையில் முடிக்க வேண்டும். வீக்கம், வெடிப்பு, ரணம், படை இவைகளுக்கும் தனியே வேப்பிலையாவது, கொஞ்சம் பஞ்சனீ சேர்த்தாவது அறை

த்து பூசவேண்டும். இந்த வேப்பிலையின் மரபோகத்தினால் உண்ணம் அதிகரித்து சீதபேதி முதலையோகாளாறுகள் கண்டால் அதை சிறு த்தி மறுபடியும் ஆரம்பம் செய்யவேண்டும். வேப்பிலைக்கு பதில் பிரேரம், அல்லது பெருமரத்தின் இலையை இது பேரவே உபயோகிக்கலாம் அல்லது அதன் பட்டையை சூர்ணம் செய்து தினம் 5, அரிசியிடை வீத மாகச் சாப்பிட்டுக் கொண்டுவரலாம். பிரமதண்டின் ரசமாவது, பிரமதண்டி தெலுத்தை யாவது உபயோகித்தாலும் இந்த நோய் தீரும்.

20. இருதய நோய்.

நிதானம்.—தனிதோஷத்தினாலும் தொங்குவது வகுக்குவது வகுக்குவது அரேகம் வாத பித்தத்தினாலும் ஆகார தோஷத்தினாலும் மலபந்தங்களினாலும் கள், சாராயம், காப்பிடில, புகையிலை, கஞ்சா, அபினி இவைகளின் உபயோகத்தினாலும் நீஷத்து வந்த சுரம், மேகம், கஷயம், இந்த நோய்களினாலும் அபஸிமிதமான ஸ்திரி புருஷ போகத்தினாலும் ஹிருதய நோய் காணும். அரேகருக்கு சிறு பிராயத்தி ஷருந்து பெற்றேர்களின் மூலமாக வருவது முண்டு எந்த காரணத்தி னலாவது, ரத்தபலம் குறைந்து ஹிருதயம் பலவீனமாய் இருக்கும் காலத்தில், ஜீரணசக்திக்கு அதிகமான பலமான ஆகாரத்தை உட்கொள்ளுவதற்காலும், மல மூத்திரங்கள் சேர்ந்திருப்பதினாலும் இந்த நோய் காணும்.

கோநுபம்:—ஆநேகநான் வரையில் இதனால்யா தொரு கொந்தாவு கேரிடமலிருக்கும். அல்லது சில வேளையில் யார்டில், வசி, தோப், அல்லது சூலை கானும். மூச்ச விழுவதற்கு கஷ்டமாகும். அதிகமான ஆகாரம் திண்ணிலும் மலமுத்திரங்களில் பந்த மிருங்காலும் இவைகள் அதிகமாய் காட்டும்.நாளை நடைவில் இந்த ஸ்கஷனங்கள் அடிக்கடி காணும். பாண்டு போகத்தின் ஸ்கஷனங்கள் யிருங்காலும் இருக்கலாம். முகம், பாதங்கள், கைகள், இவைகளில் கொஞ்சம் கொஞ்சம் வீக்கங்காட்டும்.அது வும் விசேஷமாக, இரண்டுபாதங்களில் காணும். முற்றினால் இந்த வீக்கம் கால், துடை, வயிறுவரைக்கும், பிறகு சர்வாங்கமும் பரவும். ஹிருதபம் வீங்கி பெருத்த ஸ்கஷனங்களைப் பார்க்கலாம்.அதன் இயற்கையான சப்தங்கள் மாறின குறிகளுண்டு. இந்த சந்தர்ப்பத்தில் கல்லீரல் மண்ணீரல்கள் பெருகி மலோதரத்தின் குறிகளைப் பார்க்கலாம். மூச்ச விழுதல் இன்னும் கஷ்டமாகும். மலமுத்திர பந்தமும் விசேஷமாக இருக்கும். சிலருக்கு ஆம்பத்திலிருந்தே சொற்ப இருமல் கண்டு ரத்தம் விழுவதுண்டு.

சிகிச்சை:—மலபந்தங்களை விவரத்தி யாக்கிக் கொண்டு, ஆகார விபந்தனையை கவனித்தால் போதும். இவைகளை கவனியாது வெறும் ஒளநீதப் பிரயோகத்தினால் இது செனக்கியமாகாமல், இது தீராகோய் என்று எண்ணப் படுகிறது.ஆகாரதோ வித்தினும் மலபந்தங்களி னும் மற்ற பழக்

சங்களினுலும் இது விபீத விலைமையை யடைவத் தலை இவைகளை விவர்த்தி செய்து கொண்டாலே போதும். கண்ட நோய்கள் திரும்வரையில் உபவாசம் இருக்க வேண்டும். கஞ்சித தண்ணீர், பழச்சாறு அல்லது எது ஆகாரத்தைபே தின்ன வேண்டும். மலபந்தத்தை விவர்த்தி யாக்கின பிறகும், திரும்பத் திருப்ப அந்த பாதை யில்லாத படிக்கு கவனிக்க வேண்டும். உபவாசம் முடிந்த பிறகும் சுலபமாக ஜீர்ணமாகக் கூடிய பதார்த்தங் களையே மிதமாக தின்ன வேண்டும். இவைகளும் வாத, சித்தஹாகுண முடைப்பவைகளா யிருக்க வேண்டும். காப்பி, மை, சாராயம், புகையிலை முதலிப் பழக்கமிருந்தால் மூர்ணம் நிறுத்தவேண்டும். வேண்டிய அளவு, ஸ்தூல சூல்ம சரீரத்திற்கு ஒய்வு இருக்க வேண்டும். மனத் திற்கும் சரீரத்திற்கும் ஆயாசம் தரக்கூடிய விவகாரங்கள் ஒன்றும் இருக்கலாமாது. ஆரம்பத்தில் காணும் இந்தோயின் குறிகள் விவர்த்தி யானதும் கிரமமாக மூச்ச பிடிக்கும் பழக்கத்தை மெல்ல மெல்ல செய்து கொண்டே வந்தால் வந்த நோய் விவர்த்தியாகும். இனிமேல் விருத்தியாகாத படியும் பார்த்துக் கொள்ளலாம்.

21. மாரு வியாதிகள்.

நிதானம்:—சகல காரியங்களுப் பீதுவும் சூக்ஷ்ம சரீரங்களின் சம்பந்தத்தி னைலையே நடக்க வேண்டும். ஸ்தூல சரீரத்திலுடைய சுகாதுக்கங்கள் சூக்ஷ்ம சரீரத்திற்கும், சூக்ஷ்ம சரீரத்தினது ஸ்தூலத்திற்

கும், பாதிக்கிற தென்று அறியப் பேண்டும். மனை வியாதிகளுக்கு காரணங்கள் எவ்வளவிலோ உண்டு. ஸ்தால் சரீரத்திற்கு நேரிடும் கஷ்டங்களினாலே யோ, மற்ற எந்த காரணத்திலுமில்லேயோ, மனக்க வலை ஏற்பட்டு இது அடிக்கடிக்கு பிடித் துக் கொண்டே வந்தால் மனைவியாதி வருகிறது. ஆசை, பாசம், விஷயப்பற்ற, பயய், வருத்தம், கோபம், சந்தேகப், விபரீத புத்தி முதலியவைகள் மனைவியாதிக்கு காரணங்கள். எதோ ஒர் விஷயத் தில் ஒருவன் அனவிலாத பற்றுவைத்தும், அதனின்று திடீரேன்று பிரியுங்காலத்தில் இந்த மனை வியாதியை விசேஷமாக பார்க்கலாம். ஆகார தோஷத்தினாலும், மலபந்தங்களினாலும், காப்பி, ம. சாராயம், புகையிலை முதலியவைகளை விபரீதமாக உபயோகப் படுத்துவதனாலும், நீநி த்த சுர முதலிய வியாதிகளினாலும், விஷ ஒளாகத்தின் பிரயோகங்களினாலும், தலைக்காவது, முனுக்காவது விசேஷ அடிப்பட்டாலும், மனைவியாதி காணும்.

துறிப்பு:—மனைவியாதிக்கு சரியான காரணங்கள் தெரியாதவர்கள் இந் நோய் பூதபிசாசகளினால் உண்டாகின்றன வென்று கூறுவார்கள். பாமர ஐனங்களுமன்றி, வைத்திகர்களும், சிலவைத்தியர்களும், மந்திர வாதிகளும், ஜோட்டர்களும், இந்த அபிப்பிராயத்தை இன்னும் பலப்படுத்துவார்கள். மேலே சொல்லியுள்ள காரணங்களை மனை வியாதிக்கு ஏதுவின்றி மனைவியாதிக்காவது மற்ற எந்த வியாதிக்காவது எந்த பேடும் காபணயன்று

என்றும், பேய் பிசா சென்றும் எண்ணம் நமது விபரீதமான புத்தி பென்றும் உலகில் பேய் என்ப தேவில்லை யென்றும், நம்ப வேண்டும்.

சோநுபம்:—மனே வியாதியின் லக்ஷணங்களை அந்தந்த வியாதிக்கும் அதனதன் அவஸ்தைக் கும் தகுந்தவாறு அநேக விதமாக பார்க்கலாம். அற்ப விஷயத்திலும், அடிக்கடிக்கு வரும் கோபத் தின் குறியிலிருந்து விபரீதமான பயித்தியம் வரையிலுள்ள லக்ஷணங்களைப் பார்க்கலாம். எதிலும் மனமும், புத்தியும், தமது சாதாரண நிலைமையில் இல்லாமல் விபரீதமாகவே யிருக்கும். மனம், புத்தி இவைகளின் காரிபங்கள் கெட்டிருக்கும், இந்திரியங்களின் அடக்கமில்லை. கை, கால்களின் ஒட்டார், அதிகபேச்சு, கூச்சலிடுதல், கண்டவர்களைத் திட்டிதல், சிரித்தல், அல்லது அழுதல், பல வேடிக்கைகளைக் காட்டுதல், தகாத காரியங்களைச் செய்தல், பசி, தாகம், தூக்கம், அதிகம், அல்லது, அதிக சூறைவாயிருத்தல், பேசாமலுமிருத்தல், கண்டபிடத்தில் மல முத்திர விசர்ஜனஞ் செய்தல், உண்ண மலிருத்தல், ஞாபகசக்திக் குறைவு, ஒன்றுக்கொன்று சம்மந்த மில்லாத பேச்சு, இவைகள் பலவிதமான மனே வியாதிகளின் லக்ஷணங்களாகும்.

சிகிச்சை:—அந்தந்த நோயின் காரணங்களைத் தெரிந்துக் கொண்டு அவைகளை நிவர்த்தி செய்தாலே கோய்தீரும். அநேகமாக பித்த பிரகோபமே இதற்கு காரணமாகையால் பித்தசாந்தமான அனு

பானங்களையும், ஆகாரத்தையும், பத்தியத்தையும் அனுசரிக்கவேண்டும். மனக்கவலைக்கு ஏதுவான வையங்களினின்று தள்ளியிருக்க வேண்டும். மனக்கவலையினால் வந்த இந்தனோய் விசாரணையினாலேயே நியர்த்தியாக வேண்டும். கை கால்கள், வாக்கு இவைகளடக்க மில்லாதவர்களுக்கு காலையில் தண்ணீர் தாரை ஸ்நானம் செய்தல்வேண்டும். இதை சுமார் அரைமணிநேரம் வரையில் அல்லது நேராளி அடங்கி குளிரென்று சொல்லும் வரையில் செய்ய வேண்டும். இதற்கு முன்பே எலுமிச்சம் சுத்தை தலைக்கு நன்றாகத் தேய்த்துக் கொண்டே வாவேண்டும். ஸ்நானம் முடிந்த பிறகும், இந்த பழச்சாரையே தலைக்கு பூசவேண்டும். அதிகாலையில் பற்றில்லை பழங்களின் சுத்தை உள்ளுக்கு கொடுக்க வேண்டும். இதை நானுக்கு இரண்டு மூன்று முறையும் கொடுக்கலாம். கஸ்ரமாக ஜீர்ணமாகக் கூடிய இல்லை ஆகாரத்தையே கொள்ள வேண்டும். கோயாளிகளை பலாத்காரமாக அடக்கக்கூடாது. அவர்களிடத்தில் அடிக்கடி பேசவும் அவர் சொல்லும் பேச்சுக்கு பதில் சொல்லவும் கூடாது. இந்த ஜலஸ்நானம், எலுமிச்சம் முதலிய பித்தசாந்தான ஆகாரங்களைத்தவிற் நோயாளியின் கேஷ்டைகளைக் குறைப்பதற்காகத் தனியே ஒளாஷதங்களை உபயோகிக்கலாகாது. உபயோகிப்பதனால் கெடுதியே உண்டாகும். பேய் என்னும் எண்ணாக கொண்டு அதற்கு வேண்டிய மந்திராதந்திர கிரியைகளை செய்வதும் நோயாளிகளின் நன்மைக் கண்று.

22. வீக்கம்.

இந்த வீக்கம் ஏதோ சில பாகத்தில் அல்லது பாகங்களில் காணலாம். சர்வாங்கமும் காணலாம்,

நிதானம்:—தீரி தோஷங்களில் ஒன்று அல்லது இரண்டு, அல்லது மூன்று காரணமாகும். ஆகார தோஷத்தினாலும், மலபந்தங்களின் தோஷத்தினாலும், அடியினாலும், ஐந்துக்களின் கடியினாலும் வரக்கூடும். மேகம், கஷம், குஷ்டம், வெள்ளை, வாத பாதை, பாண்டுரோகம், இருதய நோய், முச்திரக்குறைவு இவைகளில் விசேஷமாய்ப் பார்க்கலாம்.

சோநுபம்:—அந்தந்த தோஷத்தையும், ஸ்தானத்தையும் அனுசரித்து லக்ஷணங்கள் வேறுபடும். குத்தல், ஏரிச்சல் சில வேளையில் சூலை, சரம், அநோசகம், மலபந்தங்களின் குறிகள் அந்தந்த நோய்களுக்கு சம்மந்தப்பட்ட லக்ஷணங்கள் இவைகளைக் காணலாம். நுரையீரல்கள், இருதயப், மார்புக்கூண்டு இவைகளில் வீக்கமிருந்தால், மார்புக்கூண்டில் விசேஷமான வளியும், முச்ச விசேஷதற்கு கஷ்டமும் அதிக சரமும் இருக்கும். அப்படியே வளிற்றுக்கூண்டில் இரைப்பை, குடல், கல்லீரல், மண்ணீரல், குண்டிக்காப் இவைகள் வீங்கின்றால் பொருக்க முடியாத வளியும் அன்ன பானுதிகளின் ஜீர்ணத்தின் தடையும், அதிக சரமும். கானும். கானுக்களில் அல்லது சங்குக்களில் வீக்க மிருந்தால் அந்தந்த சங்குக்களில் அதிக வளியும், குடுச்சலும், அந்த பாகத்தை நீட்டவும் முடக்கவும் முடியாமலும் மிரு

க்குப். அநேகமாக மேசம் அல்லது வாத தோஷங்களின் குறிகளைக் காணலாம். சரம் இருக்கும். இல்லாமலும் மிருக்குப். சரத்தோடு ஏதிய மற்ற குறிகளும் மிருக்கலாம். இரு பாதங்கள் அல்லது இரு பாதங்களும் கால்களும் வீங்கியிருந்தால் அல்லது இவைகளோடு முகத்திலும் வீக்கம் தோன்றினால் முத்திரக் ருறைவினுடைய எஃன்னங்களும் இருக்கும். வீக்கப், சீழ் கட்டியின் பூர்வ ரூபமாயிருந்தால் அதன் நோடுங் குடைச்சலுங் சண்டு அபார்ட் தினத்திற் குள்ளாகவே வீக்கம் அதிகமாய் சீழ் பிடித்த எஃன்னங்களைக் காட்டுப். பழுத்து சீழ் பிடித்த காலத்தில் குத்தல், சுர முற வீபவைசள் குறையும். நாளைடுவில் சிகிச்சை செய்தோ செய்யாமலோ கட்டியடைந்து சீழ் வெளியாகும்.

சிகிச்சை:—வீக்கத்திற்கு சரிபான காரணத்தைத் தெரிந்துக் கொண்டு, காரணத்தை நீக்கிக் கொண்டால் வீக்கம் நிவர்த்தியாகும். மலர்ந்தங்களின் நிவர்த்தியும், உபவாசமும், இலகுவான ஆகாரமும், தண்ணீர் ஸ்நானமும், ஆவி ஸ்நானமுப், கிரமமாக பக்தியோடு செய்தால் போதும். இந்த வீதிகளையனுசரித்தால் அநேக வீக்கங்கள் நிவர்த்தியாகும். உபவாசம், ஆவி ஸ்நானம், தண்ணீர் ஸ்நானம், மல பந்தங்களின் நிவர்த்திகளுடன் வீக்கமிருக்கும் பாசத்திற்கு அடிக்கடிக்கு வென்னீர் முதலிய ஒத்தணங் களினாலும், பலவித

மான பத்துகளினாலும் வீக்கங்களும் கட்டிகளும் கரைபும்.

துறிப்பு:—வீக்கங்களுக்கும் கட்டிகளுக்கும் சஸ்திர வைத்தியமே சரியான சிகிச்சை யென்றெண்ணி மேல் நாட்டு வைத்தியர்கள் அறியாமல் அவசரபட்டு ஆயுகப் பிரயோகம் செய்துக் கொண்டு வருகிறார்கள். மேலே சொல்லியுள்ள விதகளைப் பக்கி போடு கல்வித்துக் கொண்டு வந்தால் எந்த கட்டி களுக்காவது வீக்கத்திற்காவது சஸ்திர பிரயோகமே வேண்டாம். அல்லது சில சமயங்களில் சில சீழ்ச்சிட்டிகளில் சீழ்ப்பிடித்தும் கட்டி உடைபாமல் நோயாளி கஷ்டப்படுங் காலத்தில் மாத்திரம் சஸ்திரத்திற்கு உபயோகமுண்டு. எந்தவிதத்திலும்மது மேகத்தில் காணும் கட்டிகளுக்கு சஸ்திர பிரயோகம் செய்யாமலே வேறு சிகிச்சை செய்தல் வேண்டும். அப்படியே மார்பு கூண்டு, வயிற்றுக் கூண்டு களில் காணும் வீக்கங்களிலும், கட்டிகளிலும், சஸ்திரபிரயோகம் செப்பாமலிருக்க வேண்டும். பல சாதனங்களைச் செய்தும் பயன்படாத சந்தர்ப்பங்களில் மாத்திரம் சஸ்திர சிகிச்சை செப்பவேண்டும். எந்த விதத்திலும் ஆரம்பத்தில் ஜின்தப் பிரயோகம் கூடாது.

23. சொறி, சிரங்கு, படை.

தீஶானம்.—திரிதோஷங்களில் ஒதேனும்ல்லை அல்லது இரண்டு காரணங்களாகும். வாத விதத்திலே

சாதாரணமான காரணம், சூஷ்டம், மேகம், மது மேகம், அம்மை சுரங்களிலும் கிருமிதோஷங்களிலும்! இவைகளைக் காணலாம்.

சிகிச்சை:— அந்தந்த தோஷத்தின் விவரத்து யினாலேயே இவைகள் தீரும். மலபந்தங்களின் விவரத்து செய்துக் கொண்டு வாதபித்த ஹரமான ஆகாரங்களையும் பானகங்களையும் உபயோகிக்கவேண்டும். மூன்று நாட்களுக்கு அதிகமாக உண்ணு விரத மிருக்க வேண்டும். வெறும் தண்ணீரை யாவது பழச் சாரையாவது குடிக்கலாம். உப்பு, காரம், புளி, இவைகளையும், காப்பி, ம, சாராயம் முதலிய பழக்கங்களையும் விறுத்த வேண்டும். ஆவிஸ்நானம், தண்ணீர்ஸ்நானம் தினந்தோறும் செய்யவேண்டுப்.

அவைகளை அனுஷ்டித்தும், இவைகள் விவரத்திபாகாவிட்டால் வேப்பிலை அல்லது வேப்பிலை மஞ்சள் கஷாயத்தில் இவைகளை நன்றாக சுத்திசெய்துக் கொண்டே வரவேண்டும். அல்லது இந்த கஷாயத்தில் சுத்தி செய்தபிறகு வேப்பிலை மஞ்சள் நன்றாக அறைத்து இந்த பாகங்களுக்குப் பூசவேண்டும்.

24, காயம், கடி, இரணங்கள்.

நிதானம்:— விழுங்தோ, மற்றெந்தக் காரணத்தினாலேயோ அடிப்பிதல், நெருப்பு, திராவகம் முதலியவைகள் படுதல், கத்தி, ஈட்டி, துப்பாக்கி முதலிய ஆயுதங்களின் உபயோகம், நாய், பூஜை, எலி, தேள்

பாம்பு முதலிப் பிராணிகளின் கடிகள், இவைகளின் மூலமாக காயமும், இரணங்களும் முன்டாகும்.

சிகிச்சை:—அந்தந்த பாகத்தை சுத்தமான ஜலத்தில் கழுவிக் கொள்ள வேண்டும். சுத்தமான ஜலத்திலே துவைத்து ஓர் மெதுவாயுள்ள துணியினால் மூடவேண்டும். இரத்தம் விழுந்துக் கொண் டிருந்தால் இந்த சரமான துணியை இரத்தம் நிற்கும் வரையில் வைத்துக் கொண்டே வரவேண்டும். இப்படிச்செய்தும் ரத்தப்பிற்கானிட்டால் உடைந்த ரத்த நாடியை கட்டவேண்டும். காயம் பெரியதாக இருப்பின் அதைத்தைத்த சுத்தமான துணியினால் மூடவேண்டும்.

இந்த ரணவைத்திய சிகிச்சையின் ரகசியத்தை இதில் பலாளாக பழகின அனுபவ வைத்தியர் கனோடு பழகி கற்றுக் கொள்ள வேண்டும். எல்லாக் சரயங்களிலும், ரணங்களிலும் ரத்தப், சீழுமுதலிய அழுக்கு சேராமல் இருக்க வேண்டும். காயத்தில் அழுக்குச் சேர்ந்திருந்தால் காயம் ஆறுமல் சீழ்ப் பிடிக்கும். சீழ்ப் பிடிக்காதபடி காயங்களையும் ரணங்களையும் சுத்தமான கொதிக்க வைத்த ஆறின சுத்த ஜலத்தில் கழுவ வேண்டும். அல்லது 1 படி ஜலத்தில் 1 பலம் மஞ்சள் 1 பலம் வேப்பிலே ஸேர்த்து கியாழும் வைத்து அந்த கியாழுத்தில் காயங்களையாலது ரணங்களையாவது சுத்தி செய்துக் கொண்டு, வேறு சிகிச்சைச் செய்யலாம். சீழ்ப்பிடித்த காயங்களிலும் ரணங்களிலும் இந்த

கியாழ்த்திலேயே சுத்தம் செய்துக் கொண்டு இந்த கியாழ்த்திலே சுத்தமாயும் மெதுவாவு மூள்ள ஓர் குட்டைபை தோய்த்து தோய்த்துக் கட்டவேண்டும். எல்லாவிதமாவு ரணங்களிலும் காயங்களி லும் இந்த கியாழ்மீமே போதும். சதையைத் தின்று சரிரத்திற்கு விஷம் சேர்த்து தேகத்தைக் கெடுக்கக் கூடிய மேல்ளாட்டு திராவக முதலியவைகளை உபயோகிக்காம் விருப்பது நலம்.

காயங்களையும் இரணங்களையும் சுத்தன்செப்த பிறகு வெறும் தேங்கா யெண்ணெயில் ஓர் சுத்தமான மெதுவான துணியை தோய்த்து ரணத்தை மூடியிருக்கு ஓர் மெதுவான இலை வைத்து ஓர் துணியைக் கட்டலாம். இரணம் சிறிபதாயிருங்கால் அடிக்கடி எண்ணெயை மாத்திரம் பூசினால் போதும். அல்லது 5 பலம் வேப்பிபண்ணெயில் 1 துலம் மஞ்சளும் 1 துலம் வெள்ளோப் பூண்டும் கலந்து காய்த்து இரணத்திற்கும் பூசலாம். சீழ் அநிகமானால் இந்த தைலத்திலே ஊராவக்கலாம். எல்லா காயங்களுக்கும் இரணங்களுக்கும் சூர்பண் வெப்பமும் வெளிச்சமும் சுத்தகாற்றும்பட்டால் அவைசள் சீக்கிரத்தில் தீரும். ஆகையால் இரணங்களை துணிகளால் மூடாமலிருப்பது நலம். ஆனால் இரணங்களை இப்படி மூடாமலிருக்குங்கால் அவைகளில் வெளியிலிருந்து அழுக்கு சோதபடி ஜாக்கிரதை டட்டிருக்க வேண்டும்.

காயத்தினாலாவது மற்ற எந்தக் காரணங்களினாலாவது கானும் இரணங்கள்சீக்கிரம்ஆறுவதற்கு சரிரத்தின் ஆப்ராக்கியமும் நன்றாக இருக்க வேண்டும். இரணங்களுக்கு ஏதுவான வியாதிகளுக்குத் தகுந்த சிகிச்சை செய்தல் வேண்டும். எல்லா இரணங்களிலும் ஆகார நிபந்தனைகள் அவசியம் இருத்தல் வேண்டும். சீழ் பிடிக்கும் நஞ்ச புதார்த்தங்களை உபயோகிக்காமல் இலதுவான கைவழுகாரமே உசிதம். சில வியாதிகளில் கானும் இரணங்களில் அந்தந்த வியாதிக்குத் தகுந்தவாறு பத்தியம் வைக்க வேண்டும்.

நெருப்பு அல்லது திராவகம் பட்ட எரிச்சலில் உடனே தேங்காயெண்ணையைப் பூசலாம். அல்லது சோடாமாவை ஜலத்தில் கரைத்துப் பூசலாம். அல்லது தெளிவான சண்னும்பு ஜலத்தை தேங்காயெண்ணையொடு நன்றாகக் கலங்து (கலப்பு வென்னெண்ப்பேரால் இருக்க வேண்டும்) பூசலாம். இரணம் ஆறும் வரையில் இந்த சிகிச்சையே போதும். நாய், எலி, பூனை, தேன், பாம்பு முதலிப் கடிகளிலும் சாதாரண இரணசிகிச்சை செய்பவேண்டும்.

இந்த விஷகடியினால் நேரிடும் மயக்கம் அல்லது பிரக்ஞா தவறும்பொழுது சண்னும்பும் கவாச்சாரமும் கலப்பதனால் கிளம்பும் புகையை நோயாளி மோந்துக் கொண்டே இருக்க வேண்டும்.

கடித்த இடத்தில் ரத்தம் விழுமாயின் அதை நிறுத்தாமல் ரத்திரவாசத்தை இன்னும் அதிகப்

படுத்த வேண்டும். சஸ்திர சாஸ்திரத்தில் கொள்சம் அனுபவ மிருப்பவர்கள் கடித்த பாகத்தை இன்னும் காயப்படுத்தி ரத்தம் எடுக்க வேண்டும். கடித்த ஆரம்பத்திலே விஷம் ஏறுதபடி கட்டுப்போட வேண்டும்.

விபரீதமான பயமே அநேக நோய்களை ஆபத்தான நிலைமைக்குக்கொண்டுவருகிறதென்றால் இந்த விஷகடிகளிலும் ஐங்களுக்கு தேன், பாம்பு முதலிய விஷஜுங்குகளிலிருக்கும் பயமே இக்கடிகளில் ஆபத்தான நிலைமைக்கு கொண்டுவருகிறதென்று சொல்லாம். தெரியமே முதன்மையான ஒளடத்தாகும்.

சாதாரண கடிகளில் கடித்த பாகத்திற்கு சன்னும்புப் பூசினபிறகு அவ்விடத்தில் நவாச்சார சூரண்த்தை தேய்க்கலாம்.

பிறகு கருந்துளசி இலையை நன்றாக அறைத்து கடித்த பாகத்திற்கு பூசி கட்டவேண்டும். இந்த துளசிரசத்தில் 1/2—1பலம் குடிக்கவேண்டும். எந்த ஆகாரமும் கொடுக்காமல் நோயாளி பிரக்ஞங்க்கு வரும் வரையில் இந்த சிகிச்சையே செய்தால் போதும். கருந்துளசி கிடைக்காத காலத்தில் வெள்ளைத் துளசியையும் உபயோகிக்கலாம். மல் முத்திர விசர் ஜனத்திற்கு அனுகூலமான சிகிச்சை செய்தல் வேண்டும். இந்த விஷகடிகளி லிருந்து பூர்ணம் நிவர்த்தி யடையும் வர்யில் உபவாசம் முதலிய ஆகார நிபமங்கள் அவசியம் இருத்தல் வேண்டும்.

ஸ்தீகளின் கெற்ப நோய்கள்

ஸ்தீபுருஷர்களுக்கு வியாதிகள் ஒரேமாதிரி பிடிக்குமாயினும் ஸ்தீகளில் அநேகர்கெற்பத்திற்கு சம்பந்தப்பட்ட நோய்களால்வருந்துகின்றனர். கெற்பநோய்களிலும் மாதவிடாய் கஷ்டங்கள் அவர்களை மிகவும் பாதிக்கின்றன.

அந்தந்தப் பருவத்தில் மாதவிடாயாகாம விருத்தல், பருவத்தில் ஆனாலும் சரியாக ஆகாம விருத்தல், அல்லது அதிகமாக இருத்தல் அல்லது, சூலியோடு கூடியதாய் இருத்தல் இவைகளே முக்கியமான பாதைகளை விடுவதாக விரும்புகின்றன.

1. காலந்தோறும் மாதவிடாயாகாமை அல்லது குறைந்து ஆதுதல்

தொனம்:— அந்தந்தப் பருவத்தில் மாதவிடாயாக தது கெற்பம் நின்ற குறியாயினும் அநேகமாக வேறு காரணங்களினாலும் ஆகலாம். திரிதோஷத்தினால் ஏதாவது ஒன்றி னலாவது இரண்டு னலாவது வரக்கூடும். ஆயினும் எந்த விதத்திலாவது சீரத்தில் ரத்தபலம் கெட்டு அதிகமான அசக்கி ஏற்பட்டால் அந்தந்த பர்வத்தில் அழுக்கு சரியாக படாமலிருக்கும்; அல்லது கொஞ்சமாகப் படும்.

கோநுபம்:—அந்தந்த காலத்தில் அழுக்கு சரியாக வெளியாவதில்லை. சரீரத்தில் பாண்டு ரோகம், கஷயரோகம், இருதயனோம், கல்லீரல், மண்ணீரல் இவைகளின் வீக்கம், விசேஷமான கொழுப்பு, இவைகளின் வகுணங்கள் எல்லாம் அல்லது சிலவை இருக்கும்.

சிகிச்சை:—அந்தந்த நோயின் சிகிச்சைசெய்து இரத்த பலத்தை விருத்திசெய்துகொண்டாலே போதும். ஜிர்னசக்திக்கு ஏற்ற புஷ்டியான ஆகாரங்களை உபயோகித்தல் வேண்டும். கொழுப்பு அதிகமாயுள்ளவர்கள் தொழுப்பான ஆகாரம் குறைக்கவேண்டும். வேண்டிய தேவையிற்கி இருத்தல் வேண்டும்.

இந்த நோயின் காரணம் தெரியாமலே மாதவிடாயாகக் கூடிய ஒளாஷதிகளைக் கொடுக்கலாகாது. ஒளாஷதிகளினாலேயே அநேகர் துன்பப்படுகிறார்கள். கொழுப்பு அதிகமாயிருக்கும் சிலருக்கு மாத்திரம் அற்ப ஒளாஷதிகளை உபயோகிக்கலாம். இவர்கள் ஆகார நியமத்துடனும் தேவையிற்கியுடனும் ஓர் காலனை எடை எள்ளுடன் சமபாகம் கருஞ்சிரகத்தையும் மூன்று குன்றுயணி வெங்காரத்தையும் வெல்லத்தில் கலந்து சாப்பிடலாம். இதை விட்டு விட்டு அல்லது தொடர்ந்து ஓர் மண்டலம் வரை சாப்பிடலாம். ரத்தக் குறைவினால் ஏற்பட்ட பாதைக்கு மாதவிடாய்க்காக கடுமையான ஒளாஷதங்களை உபயோகிக்கலாகாது.

2. பெருப்பாடு.

நிதானம்.—இதற்கு காரணங்கள் பலவிருப்பு
அம் பித்த பிரகோபமே முக்கிபமான காரணம்
கும். பெருப்பாடுக்கும் மற்ற ரத்தபிரவாஹக்திம்
கும் ரத்தபித்தபேகாரணம் ஏற்கனவே பித்தமாதி
கமாயுள் எவர்களுக்கு ஆசார தொஷத்தினாலாவது,
பலபழுச்சங்களினாலாவது உஷ்ணம் அதிகமானால்
மாதவிடை காலத்தில் ரத்தம் அதிகமாய் விழும்.
அல்லது அதிக நாட்களாக படிய சிலருக்கு இந்த
காரணத்தினாலேயே மாதத்தில் இருஞ்சி முறை
விழுவது முண்டு.

ரோநுபம்:—காலந்தவறி அளவுக்கு மிஞ்சின
ரத்தம் விழும். ஆரம்பத்தில் அநேகருக்கு யாதொரு
கெடுதிகளும் துன்பங்களும் நேரிடாவிட்ட எலும்
காலக்கிரமத்தில் பலவறினம், கைகால்களில் வீசுகிம்,
பாண்டு ரோகத்தில் காணும் லக்ஷணங்கள் முறைப்
வைகள் தோன்றுப்.

சிகிச்சை:—பித்த பிரகோபத்தைத் தணிச்சுக்
கூடிய உபாயங்களைல்லா வற்றையும் அதுமிகுங்
வேண்டும். நோயாளிக்கு வேண்டிய ஒப்பு இருந்த
தல் வேண்டும். தேகம் அசைபாமல் நோயாளிப்படுச்
கைவிருக்க வேண்டும். பித்தசாந்தமான இதுவாய்
ஜீரண மாகக்கூடிய உணவுகளையே கொடுத்தல் வே
ண்டும். மல முத்திரங்களின் தடையிருப்பின் அதை
நிவர்த்திக்க வேண்டும். குளிர்ந்த தண்ணீரில் ஓர்

துணியை துவைத்து துவைத்து அடிவயிற்றில் வைத்துக் கொண்டே ரவேண்டும்.

ஆகாரத்தில் உப்பு, காரம், புளி முதலிய பித் தத்தை அதிகரிக்கும் பொருட்களை நிறுத்த வேண்டும். எலுமிச்சம் பழத்தை விசேஷமாக உபயோகிக்கலாம். இதோடு திரிபலகுரணம் வேளைக்கு அவரதுலம் விதம் நாளுக்கு இரண்டு வேளை சாப்பிடலாம். இதையே விடாமல் ஓர் மண்டலம் வரையில் உபயோகிக்கலாம்.

இந்த பாதையி விருந்து நிவர்த்தி யடைய விரும்பும் பெண்கள் தமது போகத்தி விருந்து அவசியம் நிவர்த்தி யடைய வேண்டும்.

குறிப்பு:—மிதமிஞ்சின ஸ்திரீ புருஷ போகமே அநேக நோய்களுக்குக் காரணமாகையால் நோயைத்தடுக்கவிருப்புகிறவர்கள் தமது போகத்தைக் குறைக்கவேண்டும்.

3. மாத விடாயில் சூலை.

நீதானம்:—திரிதோஷத்தில் ஏதேனும்ஒன்றுயிருக்கலாம். ஆயினும் வாயுதோஷமே முச்சிய காரணமென்னலாம். வெகு நாளாக வந்த மலமுத்திர விசர் ஜினியின் தடையினால் இது விருத்தியாகும்.

அநேகருக்கு பிறப்பிலே கெற்ப கோஷத்தின் குறைவு இருந்தால் மாதவிடாய் காலத்தில் சூலை கானும். கெற்பகோஷத்தின் வாய்ச்சுருங்கியிருக்கக் கூடும். இந்த கோஷம் முன்புறம், அல்லது பின்புறம் வளைந்து இருக்கலாம். நாதாசயத்தினாலும் அதற்

கும் கெற்பைபக்கு சம்பந்தப்பட்டுள்ள நாளம் சரு ங்கியிருக்கலாம். அல்லது இது வீளாந்திருக்கலாம். விபரிதமான போகத்தினுலோ, பிரசவத்தினுலோ, சஸ்திரப்ரயோகத்தி னுலோ, அடிவயிற்றில் கெற்ப கோஷத்திற்கு சற்றிலகட்டு முதலியலைகளினுலோ கெற்ப கோஷத்தின் ஸ்தானம் தவறுவதனுலும் இந்த சூலை வரக்கூடியும்.

சோநுபம்:—மாதவிடாய் ஆகுவதற்கு இரண் டொருளட்கங்கு முன்பாவது அந்த நாளாவது பொறுக்க முடியாத சூலை தொன்றும். இது விடா மல் மூன்று நாட்களிலிருந்து ஓர் வாரம் வரையில் இருக்கும் சிலருக்கு கொஞ்சமோம் மாதத்திரு இருப்பதுண்டு. வயிற்று சூலையில் காணும் குறிக் களைல்லாம் இதிலும் காணலாம்.

சிகிச்சை:—மல் மூத்திரங்களின் தடையிருந்தால் அதை சிவர்த்திக்க வேண்டும். உபவாசம் முதலிய ஆகார நிபந்தனைகள் வேண்டும்.

மாதவிடாய் ஆகுவதற்கு மூன்று நாளுக்கு முன்பாகவே சுக்கு சீரகம் கஷாயத்தில் சித்தா மணக் கெண்ணையை காருக்கு ஒரு முறை காலையில் 7நாள் வரையில் சாப்பிட்டுக் கொண்டே வரவேண்டும். ஆகார நியமத்துடன் தேகப்பயிற்சி இருத்தல் வேண்டும். பொறுக்க முடியாத வேதனை காணும் பொழுது அடிவயிற்றுக்கு வெங்கிர் வத்தணம் செய்யலாம். சமளடை சுக்கு, சீரகம், கருஞ்சீரகப், வாயு விளங்கம், இவைகளின் கஷாயத்தில் சித்தா மணக் கெண்ணைய உபயோகிக்கலாம்.

குதச வாயு தோஷத்தினுலவண்டாகும் குலீஸ் களில் இந்த சிகிச்சையே பக்தியோடு செய்தால் போதும். ஏற்கனவே கெற்ப கோஷத்தில் வளைவு முதலீய குறைவுகள் இருப்பின் அவைகளை கெற்ப கோய் சிகிச்சையில் அனுபவமிருப்ப வர்களிடத் தில் சிகிச்சை செய்தன் வேண்டும்.

குறிப்பு:—மாதவிடாய் முதலிப் கெற்ப கோஷத்திற்கு சம்பந்தப்பட்ட வியாதிகள் சல்திரகவ ததியத்தினுலேயே நிவர்த்தி யாகுமென்று அநேக மேல்நாட்டு வைத்தியரின் கொள்கை. அநேக சந்தர் பங்களில் சல்திர உபயோக மில்லாமலே வியாதி நிவர்த்தி யாகக்கூடும். அன்ன பானுதிகளின் வியாதி முதலீய உபாயங்களைத் தேடாமல் ஆரம்பத்தி விருந்தே ஆயுசங்களை உபயோகிப்பதனால் அநேகர் கஷ்டப்படுகின்றனர். இத்தகைய கஷ்டங்களை தடுப்பதற்காகவே சல்திர வைத்தியத்தின் உபயோகம் கூடாது.

கெற்பிணி சிகிச்சை.

ஏறக்குறைய 14 வயதில் ஓர் பெண் புஷ்பவதி யாகிறான். ஆனால் ஆரோக்கியம், புஷ்டி, காலப், தேசப், குடுப்பம், பெற்றோர்கள், இவைகளையனுசரித்து இந்த காலம் மாறும். புஷ்பவதியாய் சம்போகத்தினால் கெற்பம் நிற்கக்கூடுமாயினும் அநேகமாய் விவாகமான ஓர் பெண் புஷ்பவதியாய் சுமார் 3—4 வருடங்களுக்குப் பிறகே கெற்பம் தரிக்கிறான்.

புஷ்பவதியாய், குறைந்தது ஐந்து வருடங்கள் பிறகே விவாகமாய் அதனாலுண்டாகும் சந்ததியே பலமாயும், புஷ்டியாயுமிருக்கும். இதற்கு முன்புண்டான விவாகத்தை விருந்து உற்பத்தியாகும், சிசு ஆரோக்கியத்திலும் பலத்திலும் குறைவாக இருப்பதுடன் கெற்பிணி பிரசவகாலத்தில் கஷ்டப்படுவாள். ஸ்திரி புருஷர்கள் பலவிதமான நோய்களுக்குப், கஷ்ட பிரசவத்திற்கும், பலவீனமான சிசகளுண்டாவதற்கும் சிறு வயதிலுண்டாகும் விவாகமே முக்கியமான காரணமைவேண்டும். மிதமிஞ்சின சம்போகமும் காரணமாகும்.

கெற்பிணியின் வகைணங்கள்

1. அந்தந்த பருவத்தில் கிரமயாக ஆகவேண்டிய மாதவிடை நின்று விடும். கூடியம், ரத்தபிரவா

கம், பாண்டு, மூலம், முதலிய வியாதியஸ்தர்களில் மாதவிடை நின்றுவிட்டாலும் அதை கெற்பிணி வசூல்ளை மென்ஸாகாது.

2. முத்த பிரகோபத்தில் காணும் வாங்தி, மயக்கம் முதலியவைகள் இருக்கும்.

3. சரீரம் பெருத்து முகத்தில் ஓர் விதமான கலீத் தோன்றும்.

4. தனம் பெருத்து கெட்டியாய் ஆசன் காம் பின் சுற்றும் ஓர் விதமான கறுப்பு நிறம் காணும். சிறுசிறு பருகள் தோன்றும். ஏழாம் மாதத்தின் பிறகு தனங்கள் அதிகமாகப் பெருத்து பால் சூரக்கும்.

5. சிரமமாக வயிறு கீழ்ப்புறத்திலிருந்து உப்பிக் கொண்டே வரும். சுமார் 3 மாதங்களில் கெற்பகோஷம் பெருத்து அடிவயிற்றில் கைக்க்குப் படும். 4 வது மாதத்தில் இது அடிவயிற்றின் முன் வென்றும்புக்கு இரண்டுவீரல் மேற்புறமாகக்காணும். 5 வது மாதத்தில் தொப்புஞுக்கும் அடிவயிற்றின் முன்வென்றும்புக்கு மத்தியில் இருக்கும். ஆறுவது மாதத்தில் தொப்புள் மட்டத்திலிருக்கும். 7 வது மாதத்தில் தொப்புஞுக்கு இரண்டுவீரல் மேற்புறமும், 8 வது மாதத்தில் தொப்புஞுக்கும் மார்பு கூண்டின் கீழ்ப்புறத்திலுள்ள பள்ளத்திற்கு மத்தியி அம், 9 வது மாதத்தில் இந்த பள்ளத்தின் மட்டத்திலுமிருக்கும். 10 வது மாதத்தில் இந்த மட்டத்திற்கு கீழே இறங்கும். சுமார் ஏழாவது மாதத்திற்கு பிறகு கெற்பைபக்குள் விருக்குப் சிசுவின்

தலை முதலிய அங்கங்கள் கைக் கூப்படும். சிக அங்கு மின்கும் அசைவதை கெற்பிணி அறிவான்.

கெற்பிணியின் நோய்கள்

ஓர் கெற்பிணிக்கு ஏறக்குறைய எல்லாவித மான நோய்களும் வரக்கூடும். கெற்பம் தரிக்காத காலத்தில் நோய் காணும்போது எந்த சிகிச்சை செய்யலாமோ அதைபே இங்கும் செய்யலாம். ஆனால் கடுமையான ஒளடதங்களின் உபயோகம் கூடாது. மலமுத்திர விசர்ஜனக்காக உபயோகிக் கப்படும் பல மான ஒளடதங்களால்லாம் பிண்டக் கைக் கரைக்கக்கூடிமாகையால் அத்தசையமருந்து களை உற்போகிக்கலாகாது. இவ்விதமை 7ம் மாதம் வரையில் நன்றாகக் காணிக்கவேண்டும். சரம் முத விப பிணிகளிலும் இந்த விபாயம் நன்றாகக் கவனி க்கவேண்டும். அதேக்காலம் ஆகார நியமங்களை கவனித்து வந்தாலே போதும். இந்த நியமத்தினால் மல முத்திர முகவிப் பைவகை மலங்கள் அந்தந்த வேளைக்கு சரியாக வெளியானால் கெற்பிணியாவது மற்றவர்களாவது நோயின் ரி சுகமாக வாழலாம். ஆகார நியமத்தை கவனித்தும் சில நோய்கள் சொக்கியமாகாத சந்தர்ப்பத்தில் நமது பதார்த்த குண போதினியில் சொல்லியுள்ள சாதாரண ஒளாதங்களையே உபயோகித்தால் போதும். பல மான ஒளடதம் கெற்பிணிக்கும் சிகவுக்கும் கெடுதியே செய்து மென்று நன்கு அறியவேண்டும்.

குறிப்பு:—மணம் புரிந்து இல்லற வாழ்க்கை யிலிருக்கும் ஒவ்வொரு ஆனுக்கும் பெண்ணுக்கும் சந்ததியாய் அதனால் சுகமடையலாமென்றும் அவா எல்லோருக்கும் சகஜமாக இருப்பதாக காண்கின்றோம். ஆனால் பிள்ளைகள் பிறந்தம் ஜனங்களில் அநேகர் நோயுடையவர்களாயும் தூர்மார்க்கத் தில் நடப்பவர்களாயுமின்னள் பிள்ளைகளினால்துண்பப்படுவதையும் பார்க்கின்றோம். ஆரோக்கியமுடைய புஷ்டியுடைய, தர்மிஷ்டர்களான பிள்ளைகளினாலேயே பெற்றேர்களுக்கு சுகம் கிடைக்கக்கூடுமென்று இவர்கள் எண்ணினால் இவர்களும் தர்மிஷ்டர்களாயும் ஆரோக்கிய முள்ளவர்களாயும் வாழ வேண்டும். பெற்றேர்களின் ஸ்தால சூக்ஷ்ம சரீர குணங்களைபே பிள்ளைகள் கட்டாயம் அடைவதனால் இவர்கள் இதை நன்றாக கவனிக்க வேண்டும். கெற பினியின் மனம் நோவாமல் ஆனந்தமாக இருத்தல் வேண்டும். இந்துக்களுள் நடக்கும் சீமந்தத்தின் கருத்து இதுவேயாகும். கஷைம், குஷ்டம் மேகம் முதலியநோயுடையவர்களுக்கு சந்ததியில்லாவிடின் பெற்றேர்களுக்கும் உலகத்திற்கும் சுகமுண் டென்றெண்ண வேண்டும். இந்த நோயுடையவர்கள் விவாகம் செய்துகொள்ளக்கூடாதென்பதும் சர்வதீர்ச்சித்தரந்தம்.

பிரசவ சிகிச்சை

பிரசவ காலம்

கெற்பம் விண்று ஏறக்குறைய 280 நாட்களின் பிறகே குழங்கை பிரசவமாகும். இந்த காலம் எல்லோருக்கும் ஒரே கணக்கிலில்லாததுமுன்று. சில நாட்களில் வித்தியாசப்படும். அல்லாமல் அகால பிரசவமென்றும் தனியே உண்டு. இதில் அநேகமாய் பிண்டம் வளர்வதற்கு முன்பாகவோ 7-8 மாதங்களுக்கு முன்பு பிண்டம் கழியம் நிலைமையாகும். இவ்விதமான பிண்ட நஷ்டம் சரியான பிரசவமெனப்படமாட்டாது.

பிரசவத்தின் குறிகள்:

1. ஏறக்குறைய பீ 80 நாட்கள் விறைந்ததேதே கெற்பிணிக்கு இடிப்பிலும் அடிவயிற்றிலும் பொறுக்கமுடியாத வேதனை தோன்றும். இதற்கு சில நாட்களுக்கு முன்பாகவே கொஞ்சம் கொஞ்சமாக வயிற்றின் கீழ்ப்புறம் சுருங்கி இருக்கும்.

2. கெற்பப்பொயின் வாய் திறந்து சொன்னடே வரும். முடிவில் ஓர்க்கை பிரவேசமாகக்கூடியவளவு அகண்றும்.

3. கெற்பம் கீழ்ப்புறம் இறங்கி இதுவரையில் அதைந்து விகரண்திருந்த சிசு அசையாமல்ருந்தும்

4. பணிக்குடம் உடைந்து கெற்பத்திலிருந்து நீர் வெளியாகும்.

பிரசவம்

பிரசவத்தின் குறிகள் தோண்றியின் குழந்தை வெளியாகும். பிரசவத்தை கஷ்டபிரசவமென்றும் சுகபிரசவமென்றும் பிரிக்கலாம். அதேகமாக தலையின் உச்சிபாகம் போனித் துவாரத்தில் பிரசன்னமாயிருந்தாலாவது புட்டம் பிரசன்னமானாலாவது அது சுகபிரசவமாகும்.

கஷ்ட பிரசவம்

தலை அல்லது புட்டம் பிரசன்னமாயினும் சில காரணங்களால் அது கஷ்ட பிரசவமாக இருக்கக் கூடும். முகம், மார்பு, ஈக, கால பிரசன்னமானால் கஷ்ட பிரசவமென்று சொல்லவேண்டும். ஏதோ சில காரணங்களினால் கெந்பத்தின் வாய் சரியாகத் திறக்காமல் எலுப்புசளின் தோட்டத்தி னால் போனித்துவாரம் சுருங்கி குழந்தை வெளியாகத் தடையானாலும் அதை கஷ்ட பிரசவமென்றே சொல்லவேண்டும்.

சுக பிரசவம்

தலையாவது புட்டமாவது யாதொரு முயற்சி யின்றி வெளியாய் உடனே குழந்தை முழுவதும் வெளியாகும். சில வேளையில் தொப்புள் கொடி குழந்தையில் கழுத்தில் சுற்றிக்கொண்டிருந்தால் தலை வெளியே வந்து முண்டமும் ஈக கால்களும் வெளியாவதற்குத் தடைபாகக்கூடும். குழந்தை

பிறந்த சில சிமிஷங்களுக்குள்ளாகவே மாபைவளி யாகும். முசற் பிசவத்தில் சில வீளையில் சுபார் ஒரு மணி வரையிலும் இது வெளிபாகாமலிருக்கலாம். சிலருக்கு மாபை குழந்தையுடனே வெளியா வது முண்டு.

சுக பிரசவ சிகிச்சை.

முதற் பிசவத்திலாவது பிறகாவது சுகபிரசவத்தில் முருத்து விச்சிக்கு விசீசஷமான சிக்ச்சை வேலையில்லை. ஆரம்பத்தில் மல முத்திரங்களின் தடையிருப்பின் அகத உவர்த்திக்க வேண்டும். பிரசவ வேதனை கண்டும் சீக்கிரதி தில பிரசவமாகாத தறகாக கண்ட டிடி ஒளாஷ்தியின் பிரயோகமசெய்ய வாகாது.

குழந்தை பிறந்து சுவாசம் எடுக்கிறதா வென்று கவனிச்கவண்டிம். இல்லாவிட்டால் சிர வின் இருங்கக்கூடிய பிழ சுதா கலை கீழ்ப்பும் தொங்குபடி வைக்குக்கொண்டு மார்புக் கூண்டு அதை யும்படி கைகளை ஆட்டவேண்டும்.

தொப்புள் கொடியில் ரத்தவோட்டம் விழ்ம வுடனே தொப்புளிலிருந்து சுபார் + அங்கு வைத்தில் இரண்டு கட்டிகள் கட்டி தொப்புள் கொடுப்பைக் கத்தரித்து சுத்தமான மெதுவான துணியால் அறுக்கத் திடக்கைச் சுற்றுக் கட்டவேண்டும். பிறகு சுத்தமான வெதுவைதுப்பூன் ஜலத்தில் கண்ண, வாய், முகம், ஆசனத்துவாரம் முதலிப்பு களைச் சுத்தங்கெய்து சுத்தக்காற்று வீசுவிடத்திற

படுக்கவைக்கவேண்டும். குளிர் காற்று படுயாயின் ஓர் தணியால் போர்த்தி வைக்கவேண்டும்.

மாயை விழுந்த கொஞ்ச நோத்திற்குள்ளாக வே கெற்பற்பை சுருங்கிவிடும். இது செட்டியாய் உருண்டையாய் சுருங்காவிடுன் மருத்துவிச்சி அடி வழிற்றின் மேற்புறத்தில் கையால் தடவிக்கொண்டு வரவேண்டும். கெற்பற்பை செட்டியாய் சுருங்கும் வரையில் இப்படி செய்பவேண்டும். இந்த நிலை மையைப் பார்த்தே இடுப்புக்குக் கட்டு கட்டவேண்டும். கெற்பற்பை கல்போல நன்றாக சுருங்கின பிறகுதான் அது கட்டுக்குள் அடங்கியிருக்கும்படி அழுத்திக் கட்டவேண்டும்.

மாயை விழுந்து கெற்பற்பை நன்றாக சுருங்கின பிறகு யோனித் தவாரத்தை சுத்தமான வெங்நீரில் அழுக்கு நிங்கும் வரையில் நன்றாக கழுவவேண்டும். கொஞ்சம் கொஞ்சம் ரத்தப் விழுமாயின் அதை நிறுத்துவதற்காக ஒளைத்தங்களை உபயோகிக்கலா காது அநேகமாக பிரசவித்தவர்களுக்கு ஆரம் பத்தலிருந்து எந்த ஒளைத்தமும் வேண்டாம். கெற்பற்பை சுருங்காமல் அழுக்கு சரியாகப் படாமல் அது தூர்வாசனையடையதாய் அடி வயிற்றில் வேதனையும், சுரமும் இருந்தால் சமனடைகருஞ்சிரகம், காட்டுசிரகம், வெங்காரப், பெருங்காயம் சூரணித்து வெங்கலத்தில் கலந்து வேலைக்கு ஓர் கெஜ்ஜக்காய் பிரமரணம் நாளாக்கு இரண்டு அல்லது மூன்று முறை கொடுக்கலாம். இத்துடன் அடிவழிற்றுக்கு

அடிக்கடி ஒத்தனைம் பொடுச்சுக்கொண்டே வரவாய். பிரசவ காலத்திலிருந்து அரிசி அல்லது கோதுமை கஞ்சியைப் பெட்டுக்கவேண்டும்.

கஷ்ட பிரசவ சிகிச்சை

சரியான சாலத்தில் பிரசவ வேதனை தோன்றி யும் சிலநாளாக பிரசவத்தின் ரேறு குறிகள் காணுமல் பிரசவம் தாமதப்படுவதுப், புட்டம் அல்லது தலை பிரசன்னமாயும் வெளியாகச் சுத்தம், மானை வெளிப்படாததும், முகம், மார்பு, ஈச, கால் இவை களில் ஏதேகனும் ஒன்று பிரசன்னமாவதும் கஷ்ட சிகிச்சையாகும். இதன் சிகிச்சை அனுபவமிருக்கும் வைத்தியர்களே செய்தலவேண்டும். கைகளின் கிரியைகளினுலூப், சில ஆயுதங்களின் மூலமாகவும் இந்த சிகிச்சை செய்தல் வேண்டும். யோனித்துவாரத்தின் மூலமாக சரியான சேர்தனைசெய்து செற்பப்பையும் சிகிச்சையும் இவைகளின் கிளைமாயைத் தெரிந்துகொள்ளாமல் கண்டபடி ஒனடதம் உபயோகிக்கலாகாது.

பிரசவ சன்னிபித்தும் மற்ற சன்னிபில் செய்ய வேண்டிய சிகிச்சைப்பை செய்தால் போதும். ஆகார நியமமும் அடிவாயிற்றுக்கு ஒத்தனைமும் யோனித்துவாரத்தின் ஈந்தமும் முக்கியமான சிகிச்சையாகும்.

குறிப்பு: — கஷ்ட பிரசவமும், பிரசவ ஜன்னியும் அனுபவமுள்ள வைத்தியர்களின் சகாயங்கெட்டனடே செய்தல் வேண்டும்.

அகால பிரசவ சிகிச்சை

மேகம், கூயம், ரத்தக்குறைவு, கெற்பப்பையின் பலயினம், கெற்பம் சின்ற காலத்தில் சம்போகம், கடுமையான ஒளங்களுக்களின் உபயோகப், உஷ்ணமான ஆகாரங்கள், நீடித்த பலமான வியாதிகள் முதலியவைகள் அகாலபிரசவத்திற்கு ஏதுகளாகும்.

அடிவயிற்றிலும் இடப்பிலும் வலியும், விடாமல் ரத்தபிரவாகமும் இதில் முக்கியமான குறிச்சாகும். பிண்டம் சேதாப் அது விழாமலும் அது விழுந்தும் மாயை விழாமலும் அல்லது அதனைதேனும் ஓர் பாகம் கெற்பப்பைக்கு ஒட்டிக்கொண்டிருப்பதும் ரத்தப்பிரவாகத்திற்கு முக்கிய காரணமாகும்.

பிண்டமும் மாயையும் கூர்ணம் விழுந்ததென்று தீர்மானம் செய்துகொண்டபிறகே ரத்தப் பிரவாகத்திற்கு சிகிச்சை செய்பவேண்டும். அங்கமாக மாயை சுத்தமாக விழுந்ததே ரத்தம் தானுகவே நின்றுவிடும். நிற்காவிடின் அடிவயிற்றிலும் யோனித்துவாரத்திலும் துணிபை தண்ணீரில் துவைத்து துவைத்து வைத்தால் போதும். தேகம் அசையாமல் படுக்கையில் இருத்தல் வேண்டும். மற்ற சிகிச்சை விஷயத்தில் சுகபிரசவத்தில் செய்ய வேண்டிய விதிகளையே அனுசரித்தால் போதும்.

சிசு பரிபாலனம்

ஒவ்வொரு சிசுவுக் குடும்பத்தை கெற்பத்திலிருந்தே வளர்ந்து ஆரோக்கியமாய் வாழும் தன்மையுண்டு. மிருகம் பகவி முதலிய பிராணிகள் மருங்தல்லாமலே தமது இயற்கை வழியில் நடந்து காண்டு சுகமாக வாழ்வது போல்லானித வர்க்கத்திலும் சிசுக்கள் தமது இயற்கை வழியிலே நடந்து சொண்டால் நோயில்லை. பெற்றேர்களின் வடிவமே பிள்ளைகள். அவர்களுடைய சுக தூக்கங்களையும் குழந்தைகளையும் அடைகின்றன. பெற்றேர்கள் மூம் தாயின் எண்ணத்தையும் சீராத்தின் நிலைமையையலுசரித்தும் குழந்தை இருக்கும். பெற்றேர்கள் நோயாளிகளாயின் பிள்ளைகளும் நோயாளிகளாவார்கள். நல்வழியில் ஆரோக்கியமாக பிள்ளைகள் வாழுவேண்டுமென்று கோரும் பெற்றேர்கள் தாழும் நல்வழியில் நடக்கவேண்டும். தபது ஆரோக்கியத்தைக் காப்பாற்றவேண்டும்.

தாய் தந்தை இவர்களில் ஒருவர் அல்லது இருவர்களின் துரிதோஷத்தின் காரணமாய் குழந்தைகளுக்கு அந்தோய் காரணம். மேகம், குஷ்டம் கந்தம் முதலிய அநேக நோய்கள் பெற்றேர்களின் மூலமாகவே பிள்ளைகள் அநுபவவிக்கின்றனர். பெரியவர்களுக்கு வரக்கூடிய நோய்களைல்லாம் குடும்பத்தைச் சூழ்க்கும் வரும். மஸ்பந்தங்களின் தடையும்,

தாய்ப்பால், மற்ற பால் முதலிப் ஆகார தோஷங்களினுலும் குழந்தைகளுக்கு நோயுண்டாகும். சரம் வயிற்றுப்புப், இருமல், வலி, பேதி, மலபந்தம், சிதபேதி இவைகள் குழந்தைகளுக்கு சாதாரணமாய் வரக்கூடிய நோய்களாகும்.

சிகிச்சை;—தாய்ப்பால், பசம்பால், புட்டிப்பால், மாவு மற்ற உணவுப்பொருட்கள் இவைகளினுலே சரம் முதலியவைகள் குழந்தைகளுக்குக் தோன்றுமாகையால் இவைகளை நிறுத்தவேண்டும். தாய்க்கு மலபந்தம் முதலியவைகளிருந்தால் அதற்குத் தருந்த சிகிச்சை செய்யவேண்டும். வேண்டிய பத்தியத்திலிருந்ததல் வேண்டும். முதல் நாளைல் ஸாம் பால் நிறுத்தி வெறும் ஜலம் கொடுக்கவேண்டும். அல்லது லேசான சுக்கு கஷாயத்தில் கொஞ்சம் வெல்லம் சேர்த்து கொடுக்கலாம். மலபந்தமிருந்தால் இஞ்சி ரசத்தில் சித்தரமணக்கெண்ணை கொடுக்கலாப. சாம், மாந்தப், இருமல், வாநதி, வலி, இவைகளில் எல்லாவற்றிலும் இஞ்சி ரசமும் துளசி ரசமும் கலந்து கொஞ்சம் வெல்லம் சேர்த்துக்கொடுக்கலாப.

குறிப்பு;—குழந்தைகளின் சிகிச்சையில் கடி னோயான ஒந்தநங்களை உபயோகிக்காமல் விருத்தல் வேண்டும், அல்லது நோய்களிலும் பெரிபவர்களுக்கு செய்யப்படும் சிகிச்சையை லேசாகசெய்யவேண்டும் ஆகார நங்குப்பும் தாய்ப்பால் விஷயத்தையும் நன்றாகக்களனிக்க வேண்டும்.

முற்றிற்று

ஸ்ரவண்டி சங்கப் பிரசாங்கம்

கவனித்துப் படியுங்கள் !

23A

2-67 வைத்தயர்கள் அவசியம் படிக்க
வேண்டிய நூல்கள் !!

நோயைத் தடுப்பதற்கும் வந்த நோயை
சளக்கியப்படுத்தவும் இந்த அருமை
யான புத்தகங்களைப் படியுங்கள்!

நோயின்றி சுகமாகவாழுங்கள் !

1. ஆரோக்கிய நூல்	...	0 3 0
2. சுகவாழ்க்கை	...	0 0 6
3. பதார்த்தகுண போதனி	...	0 5 0
4. சரீர தத்தவும்	...	0 2 0
5. சரீர பரிசோதனை	...	0 6 0
6. சிகிச்சை மருங்கம்	...	0 8 0
7. Thy Self Thy Doctor	...	0 6 0
(ஆங்கிலத்தில்)		

ஆன்ம சுகம் தேடுகிறீர்களா?

தொ சதவிலோகியைப் படியுங்கள் விலை 0 6 0
திருக்குறள் தூரம் ... 0 3 0

Please read if you are interested in Social Reform

1 Our Duties to Hindu Widows 0 1 0

2. Varnashrama Dharmas 0 0 9

The Indian National Service (in the press

ஸ்ரவண்டி சங்கம், ஐ. டி. சென்ட்.

Saraswathi Sangham Printing Works, Madras.