

தமிழ்

மெட்டரியா மெடிக்கா

என் து.ம்

இங்கிலீஷ் வைத்தியத்தை தமிழில் எழுதப்பட்டிருக்கிற

இப்புத்தகம் திருசெல்வேலி டவுன்,

மேஸர்ஸ் பி. எஸ். சுந்தரம் அன் கோ.

இங்கிலீஷ் மருந்து விற்பனையுள்ள

பி. எஸ். ஈஸ்வரம்பிள்ளை யவர்களால்

எழுதப்பட்டு

பாலையங்கோட்டை ரிட்டைர்ட் ஸப் அலிஸ்ட்ரேன்ட் ஸர்ஜன்

மீ-எ-எ-பூரீ, கனம் வி. பெருமாள் நாயுடுகாரு

அவர்களால் பரிசோதிக்கப்பட்டது.

முன்றில் பதிப்பு.

சென்னை:

“ ஆனந்தபோதினி ” பத்திராதிபர்

நா. முனிசாமி முதலியாரவர்களால்

வெளியிடப்பெற்றது.

1936

காப்பினாட்-ரிஜிஸ்டரீட்]

[விலை ரூபா 3-0-0.]

PRINTED AT THE "ANANDA BODHINI" PRESS,
6, LAWYER CHINNATHAMBI MUDALI STREET,
SOWCARPET, MADRAS.

மு க வு ரை.

354

“தமிழ் மெட்டிரியா மெடிக்கா” என்னும் “இங்கிலீஷ் வைத்தியத்தை” தமிழில் எழுதப்பட்டிருக்கிற இப்புத்தகம், இங்கிலீஷ் வைத்தியத்தைக் கையாடுகிறவர்களுக்கும், இங்கிலீஷ் வைத்தியம் கற்கும் கம்பவுண்டர்களுக்கும், இங்கிலீஷ் மருந்து வர்ப்புகளுக்கும் உபயோகிக்கப்படுமென்ற நோக்கத்தைக் கொண்டும், இங்கிலீஷ் வைத்தியத்தை இங்கிலீஷ் பாஷையில் மிகவும் விரிவாய் எழுதியிருந்தபோதிலும், தமிழில் சுருக்கமாய் எழுதியிருந்தால், இங்கிலீஷ் மருந்துகளைப் பற்றியும், அவைகளின் குணங்கள், அளவுகள், விபாதிகளுக்குத் தகுந்தபடி உபயோகப்படுத்தவேண்டிய விபரங்களைப் பற்றியும், கடினமின்றித் தெரிந்துக்கொள்ளக் கூடுமென்ற எண்ணத்தைக் கொண்டும் எழுதப்பட்டிருக்கிறது.

பாளையங்கோட்டையில், ரிட்டைர்ட் ஸப் அஸிஸ்ட். டென்ட் ஸர்ஜன் ம-ா-ா-பூரீ, வி. பெருமாள் நாயுடு அவர்களுக்கும்,

மெஸர்ஸ். சண்முகம் அன் கோ, பாளையங்கோட்டை, மெஸர்ஸ். பி. எஸ். சுந்தரம் அன் கோ, திருநெல்வேலி டவுன், புரொப்பரட்டர் அவர்களுமாகிய ம-ா-ா-பூரீ, சண்முகம் பிள்ளை அவர்களுக்கும் என் நன்றி யறிதலைச் செலுத்தக் கடமைப்பட்டவனாய் யிருக்கிறேன்.

பி. எஸ். ஈஸ்வரம் பிள்ளை.

திருநெல்வேலி டவுன் மெஸ்ர்ஸ். பி. எஸ். சுந்தரம் அன் கோ, இங்கிலீஷ் மருந்து விற்பனையாளர் பி. எஸ். ஈஸ் வரம் பிள்ளையால் எழுதப்பட்டிருக்கிற இந்த “தமிழ் மெட்ரிசியா மெடிக்கா” என்னும் புஸ்தகத்தை நான் சரி பார்த்ததில் தமிழ் பாஷை எழுதப்பட்டிருக்கத் தெரிகிறவர்க ளெல்லாம் எளிதில் இங்கிலீஷ் மருந்துகளையும் அவைகளின் குணங்களையும், அளவுகளையும், வியாதிகளில் உபயோகப்படுத்த வேண்டிய அதுபோக முறைகளையும் நன்றாய் அறிந்து கொள்ளலாம்.

மேலும் இந்தப் புஸ்தகத்தின் மூன்றாவது பாகத்தில் குறிப்பிட்ட முக்கியமான வியாதிகளுக்கு சிகிச்சை செய்ய வேண்டிய விதத்தை மிகவும் தெளிவாய், அதுபோக முறைகளையும் தற்காலம் உபயோகத்திலிருக்கிற பேட்டென்ட் மருந்துகளைப்பற்றியும் எடுத்துக்காட்டி எழுதி யிருப்பதால் தமிழ் எழுதப் படிக்கத் தெரிகிறவர்களெல்லாம் நன்றாய் அறிந்தும் அனுபோகத்துக்குக் கொண்டுவரவும் உதவியாய் இருக்கிறது. இந்தப் புஸ்தகத்தை எழுதி யிருக்கிற நூலாசிரியர் அவசியமான இங்கிலீஷ் வைத்திய புஸ்தகங்களைக் கற்றறிந்தவராயும் அதுபோக அறிவுடையவராயும் இருக்கிறார். சுருக்கிச் சொல்லில் இந்தப் புஸ்தகம் இங்கிலீஷ் மருந்துகளைப்பற்றி தெரிந்து கொள்ள வேண்டுமென்ற விருப்பமுடையவர்களுக்கும் அவைகளை அனுபோகத்துக்குக் கொண்டுவர வேண்டுமென்ற எண்ணமுடையவர்களுக் கெல்லாம் போதுமான உதவியாய் இருக்கிறதென்று நான் உறுதியாய்ச் சொல்லக் கூடும்.

(கையொப்பம்)

வி. பெருமாள் நாயுடு,

ரிட்டைர்ட் ஸப் அலிஸ்டென்ட் ஸர்ஜன்.

**இப்புஸ்தகம் நான்கு பாகங்களாகப்
பிரிக்கப்பட்டிருக்கிறது.**

- (1) முதல் பாகம்:—இது இரண்டு உட்பிரிவுகளாகப் பிரிக்கப்பட்டிருக்கிறது.

முதல் உட்பிரிவு:—மருந்துகளின் நிறைக் கணக்கு.

இரண்டாம் உட்பிரிவு:—மருந்துகளின் தனிக் குணங்களைக் காட்டக்கூடிய இங்கிலீஷ் பெயர்களின் பொருளை தமிழில் விளக்கிக் காட்டல்.

- (2) இரண்டாம் பாகம்:—இங்கிலீஷ் மருந்துகள், அவைகளின் குணங்கள், அவைகளைப் பிரயோகிக்கும் அளவுகள், வியாதிகளில் உபயோகப்படுத்த வேண்டிய விதங்கள்.

- (3) மூன்றாம் பாகம்:—இது இரண்டு உட்பிரிவுகளாகப் பிரிக்கப்பட்டிருக்கிறது.

முதல் உட்பிரிவு:—தற்காலத்தில் வழக்கத்தில் இருக்கிற மிக்சர்களின் பெயர்கள், அவைகளைச் செய்யவேண்டிய முறைகள், அவைகள் ஒவ்வொன்றையும் இன்னின்ன வியாதிக்கு இவ்வளவு இவ்வளவு கொடுக்கலாம் என்பது.

இரண்டாம் உட்பிரிவு:—முக்கியமான வியாதிகளின் பெயர்கள், அவைகளுக்கு மருந்துகள் சேர்த்து வைத்தியம் செய்ய வேண்டிய அது போக முறைகள், தற்காலம் வழக்கத்தி

லிருக்கிற பேட்டென்ற மருந்துகளை உப
யோகப்படுத்தும் விதங்கள் வியாதிகளின்
தன்மைக்குத் தகுந்தபடி கொடுக்கவேண்
டிய ஆகாரங்கள்.

(5) நான்காவது பாகம்:—பாய்ஸன் மருந்துகள். அவை
களில் முக்கியமான சிலவற்றை அதிக அள
வில் சாப்பிட்டு விட்டால், அந்த மருந்துகளை
முறிக்க வேண்டிய முறைகள்.

குறிப்பு:—இங்கிலீஷ் சப்தத்திற்குத் தகுந்த தமிழ் எழுத்து
கள் இல்லாததால் அவ்வித தமிழ் எழுத்துக்களின் கீழ் இங்கிலீஷ்
எழுத்துக்களைப் போட்டிருக்கிறோம். அதன்படி உச்சரிக்கவும்.

மு த ல் ப ா க ம்

முதல் பீவு

மருந்துகளின் நிறைகள்

60 கிரான்	=	1 டிராம்
(g)		(d)
8 டிராம்	=	1 அவுன்ஸ்
16 அவுன்ஸ்	=	1 பவுண்டு
20 அவுன்ஸ்	=	1 பயின்று
8 பயின்று	=	1 கிபாலன்
20 கிரான்	=	1 ஸ்குருப்பிள்

குறிப்பு:—1 கிரான் உத்தேசம் 1 உருந்து எடை, அல்லது 2 அரிசி எடை.

1 மினிம்	=	உத்தேசம் 1 துளி
60 மினிம்	=	1 டிராம்
8 டிராம்	=	1 அவுன்ஸ்
குறிப்பு:— $1/32$ என்றால்		(அரை மாகாணி)
$1/16$ என்றால்		(மாகாணி)
$1/8$ என்றால்		(அரைக்கால்)
$3/16$ என்றால்		(முண்டாணி)
$1/4$ என்றால்		(கால்)
$3/8$ என்றால்		(காலே அரைக்கால்)
$1/2$ என்றால்		(அரை)
$5/8$ என்றால்		(அரையே அரைக்கால்)
$3/4$ என்றால்		(முக்கால்)
$7/8$ என்றால்		(முக்காலே அரைக்கால்)

பெரியவர்களுக்குக் கொடுக்கிற மருந்துகளின் அளவி லிருந்து குழந்தைகளுக்குக் கொடுக்கவேண்டிய அளவுக்கு முறையாவது:—

குழந்தையின் வயசு நம்பரையும் அதோடு 12 ஐயுஞ் சேர்த்து வந்த தொகையால் குழந்தையின் வயசு நம்பண் வகுத்து அதோடு பெரியவர்களுக்கு ஏற்பட்ட அளவுகளைப் பெருக்கிக் கொள்ளவும்.

உதாரணமாக:— பெரியவர்களுக்குக் கொடுக்க வேண்டிய ஒரு மருந்தின் அளவு 5 முதல் 15 கிரான் இருந்தால்,

3

$$3+12=3/15=1/5, 1/5 \times 5 \text{ கிரான்} = 1 \text{ கிரான்}$$

$$1/5 \times 15 \text{ கிரான்} = 3 \text{ கிரான்}$$

ஆகையால் 1 முதல் 3 கிரான் கொடுக்க வேண்டும். இப்படியே வயசுக்குத் தகுந்தபடி மேல் காட்டிய வழியை அனுசரித்துக் கொடுக்கவும்.

$$1 \text{ டீஸ்பூன் அல்லது } 1 \text{ தேக்காண்டி} = 1 \text{ டிராம்}$$

$$1 \text{ டெஸர்ட் ஸ்பூன்} = 2 \text{ டிராம்}$$

(d)

$$1 \text{ டேபிள் ஸ்பூன்} = 4 \text{ டிராம்}$$

(b)

$$8 \text{ டிராம்} = 1 \text{ அவுன்ஸ்}$$

$$1 \text{ ஒயின் கிரான்} = 2\frac{1}{2} \text{ அவுன்ஸ்}$$

(g)

வியாதியைக் கண்டு பிடித்து இன்னவிதமான வியாதி என்று தீர்மானம் பண்ணி வியாதியின் நிலைமையைத் தெரிந்துகொண்ட பின்பு, மருந்துகளின் குணங்களும், அவைகளின் அளவுகளும், உபயோகங்களும் தெரிந்திருந்தால் அந்த வியாதிக்கு இங்கிலீஷ் மருந்துகள் சேர்த்து எழுதும் (அதாவது பிரிஸ்கிரிப்டஷன் ஸரற்றிங்) வழியாவது.

வியாதிக்காரர் பெயர்.

(1) எடுத்துக்கொள்

- (1) வியாதிக்குத் தகுந்தபடி குணம் செய்யவேண்டிய முக்கியமான மருந்து, இது பவுடராகவும் இருக்கலாம், அல்லது திராவக ரூபமாகவும் இருக்கலாம்.
- (2) மேல்படி மருந்துக்கு அதே குணமுள்ள துணை மருந்து. இதுவும் எந்த ரூபமாகவாவது இருக்கலாம்.
- (3) மேல்படி மருந்துகளின் கசப்படி, அல்லது அருவருப்புக்களை மாற்றும் படியான முதல் மருந்தின் குணமுள்ள மருந்து சேர்ந்த சிரப். இல்லாவிட்டால் மட்டும் 'சிம்பிள் சிரப்'
- (4) முதலாவது எடுத்துக் கொண்ட மருந்தின் குணமுள்ள இன்சிபுஷன்; இல்லாவிட்டால் மட்டும் "ஆக்குவா."

(3) ஒன்று சேர்

(4) மிக்சர் செய்

டைரக்ட்ஷன் (அதாவது மிக்சர் கொடுக்கும் விதம்)

(d)

வைத்தியர் கையெழுத்து

தெய்தி.

உதாரணமாக:—ஒரு நோயாளிக்கு தொண்டைப் புகைச்சல் இருக்கிறதென்று தெரிந்துகொண்டு, கபத்தை இளக்க வெளியாக்க வேண்டுமென்று தீர்மானம் பண்ணின பின்பு அதற்காக, “எக்ஸ் பெக்டோரேன்ஸ்,” குணமுள்ள மருந்துகள் சேர்த்து “எக்ஸ் பெக்டோரேன்ஸ் மிக்சர்” அதாவது கபத்தை இளக்கி வெளியாக்கித் தொண்டைப் புகைச்சலைத் தணிக்கக்கூடிய மிக்சர் செய்து கொடுப்பதற்கு

வியாதிக்காரர் பெயர்.

(1) எடுத்துக்கொள்	
வியாதிக்குத் தகுந்த முக்கிய	(1) அமோனியா. கார்போ
மான மருந்து =	னஸ் கிரைன் 10 (b)
மேல்படி மருந்துக்கு துணை	(2) வைனம். இப்பிக்காக்
மருந்து =	. துளி 30
(2)	(3) ஸிரப். டூலு . டிராம் 1½
முதல் மருந்தின் குணமுள்ள	(4) இன்பியூஷன். ஸெனிகா
மருந்து சேர்ந்த ஷர்பத்	சேர்ந்து, (f) (g)
முதல் மருந்தின் குணமுள்ள	அவுன்ஸ். 1½
கஷாயம் =	(3) ஒன்று சேர்.

(4) மிக்சர் செய்

தடவை 1 க்கு ½ அவுன்ஸ் வீதம்

4 மணிக்கொரு தடவல் கொடுக்கவும்.

வைத்தியர் கை எழுத்து
தெய்தி.

இந்த வழிப்படி வந்த வியாதிக்கும் லெகுவாய் இங்கி லீஷ் மருந்துகள் சேர்த்துப் பிரிஸ்கிரிப்டஷன் எழுதிவிடலாம்.

- குறிப்பு:— (1) சிரப் என்றால் சர்பத்
 (2) சிரப்சிம்பிள் என்றால் தனிச் சீனிப்பாகு
 (3) இன்பியூஷன் என்றால் கஷாயம்
 (f)

- (4) ஆக்குவா என்றால் தண்ணீர்
 பொதுவாக கிணற்றுத் தண்ணீர்

குறிப்பு:—மருந்துகள் சேர்ந்து மிக்சர் செய்த பிறகு அதை சுத்தமான சீசாவில் ஊற்றி காற்றுப் போகாமல் கார்க்கு நன்றாய் மூடி, ஒரு காகிதத்தில் வியாதிக்காரர் பெயரை எழுதி, மருந்து சாப்பிடவேண்டிய விதத்தையும் தெளிவாய் எழுதி சீசாவில் ஒட்ட வேண்டும்.

விஷமான மேல்பூச்சுத் தைலமாய் இருந்தால் “விஷம்” என்று பெரிய எழுத்தில் எழுதி, வெளிப் பிரயோகத்திற்கு மட்டும் என்று எழுதி ஒட்டவேண்டும்.



மு த ல் பாகம்

இரண்டாம் பிரிவு.

மருந்துகளின் தனிக்குணங்களின் இங்கிலீஷ் பெயர்களை தமிழில் நன்றாய் விளக்கிக் காட்டும்.

குறிப்பு:—இதற்கு அடுத்த பாகத்தில் எழுதி இருக்கிற ஒவ்வொரு மருந்துக்கும் ஏற்படுகிற தனிக்குணத்தைக் காட்ட இதனடியில் எழுதியிருக்கிற வார்த்தைகளையே பிரயோகப்படுத்தி இருப்பதால் இந்தப் பாகம் நன்றாய் மனதில் பதிந்திருக்க வேண்டும்.

எந்த இங்கிலீஷ் வார்த்தையை தமிழில் திருத்தமாய் உச்சரிக்க முடியவில்லையோ அந்த வார்த்தையை மட்டும் பூராவும் இங்கிலீஷிலேயே எழுதியிருக்கும். அல்லது ஏதாவது ஒரு வார்த்தையின் எழுத்துக்குக் கீழ் இங்கிலீஷ் எழுத்து எழுதியிருந்தால் அந்த எழுத்தின் உச்சரிப்பைக் கொண்டு உச்சரிக்க வேண்டும். இங்கிலீஷ் எழுத்துக்கள் தெரியாதவர்கள் வார்த்தைகளை தமிழ் எழுத்துக்களைக் கொண்டே திருத்த மில்லாமல் உச்சரித்ததினாலும் குற்றமில்லை.

(1) ஆன்டிசிபிலிடிக்க:—என்றால் ரத்தத்தில் விஷத்தன்மை (Antisymphilitic) கலந்து ரத்தம் அசுத்தமாகி அதன் மூலமாய் உண்டாகிற மேகப்புண், சூலை, கண்ட மாலை முதலான துர்நீர் வியாதிகளைக் குணமாக்குகிற மருந்து.

(2) அனல்ஜேஸிக் } என்றால் மூளையிலும் ஸ்பரிசு நரம்பு
அல்லது } களிலும் தாக்கி நோவையும், வேத
அனேடைன் } னையையும் தீர்க்கிற மருந்து.
(d)

(3) அனா பிரோடிஸியாக்;—என்றால் தாதுவைக் குறைக்
(f) (d) கும் மருந்து

(4) ஆல்டரேட்டிவ்:—என்றால் மருந்து கொடுக்கும்போது, அம்மருந்து இன்னவிதமாய்த்தான் வியாதியைக் குணமாக்கினது என்று விவரிக்கவாவது, அல்லது எடுத்துத் தெளிவாய்ச் சொல்லவாவது முடியாத விதமாய், ரத்தத்தில் விஷத்தன்மை கலந்து மாறுபாடடைந்து உடம்பில் ஏற்பட்டிருந்த வியாதியை குண

மாக்கி இருக்கிறது என்று மட்டும் சொல்லக் கூடிய மருந்து.

(5) அன்னீடிரோடிக்:—என்றால், அதிகமாக உண்டாகிற (Anhidrotic) வேர்வையைத் தணிக்கிற மருந்து.

(6) அனிஸ்தேட்டிக்:—இது இரண்டு வகைப்படும்.

முதலாவது முகர்ந்து பார்ப்பதினால் ரத்தத்தில் கலந்து மூளைக்குப்போய் அறிவை மயக்கக் கூடியது. ஆப்பரேஷன் செய்யும் காலத்தில் முகாவைத்து மயக்கத்தை உண்டு பண்ணுகிற குளோரோபோரம் இந்த இனத்தைச் சேர்ந்தது. (f)

குறிப்பு:—ஆப்பரேஷன் என்றால் பிளவை, கட்டி முதலானவைகளை கத்தியால் அறுத்தல்.

இரண்டாவது மேல் தடவினால் மேல் தோலைத் தின்று விடாமல் தடவின பாகத்தை மட்டும் சுரணை இல்லாமல் மதமதப்பை உண்டாக்கி வலி, வேதனை தெரிய வொட்டாமல் செய்கிற மருந்து.

(7) ஆந்தல்மின்டிக்:—என்றால் கிருமிகளை நாசஞ் செய்தும், வெளிப்படுத்துகிற துமான மருந்து.

(8) ஆன்டிடோட்:—என்றால் விஷத்தை முறிக்கும் மருந்து.

(d) இவைப்பற்றி இப் புஸ்தகத்தின் கடைசிப் பாகத்தில் எழுதப்பட்டிருக்கிறது.

(9) ஆன்டி பீரியாடிக்:—என்றால் முறைசாரம்போல் குறிப்

(d) பிட்ட காலங்களில் வந்து தேகத்தை வருத்தப்படுத்துகிற வியாதிகளைக் குணமாக்குகிற மருந்து.

(10) ஆன்டி ஸெப்டிக்:—என்றால் விஷப்பூச்சிகள் உற்பத்தி யாகிறதையும், வளருகிறதையும், தடுத்தும் அவைகளை நாசம் செய்தும் அதன் மூலமாய் அவைகளால் ஏற்படும் கெடுதியை உண்டாகவொட்டாமல் தடுக்கிற மருந்து.

(11) ஆன்டி பைரேட்டிக்:— என்றால் காய்ச்சல்களிலும், இன்னும் வேறு விபாதிகளினாலும் உண்டாகிற கதகதப்பையும், தேகத்திலுள்ள அதிகச் சூட்டையும் தணிக்கிற மருந்து.

(12) ஆன்டி ஸ்பாஸ்மோடிக்:—என்றால் நரம்பு நாடிகளின் (d)

படபடப்பைத் தணிக்கிறதும், ஜீரணக்குடல், வயிறு இவைகளிலுள்ள புளிப்பை அடித்து வாயுவை வெளிக்கிளப்பி, வயிற்று வலியைத் தணிக்கிறதும், சுவாஸக் குழலில் உள்ள அடைப்பை நிவர்த்தி செய்கிறது மான மருந்து.

(13) அப்ரோ டிஸியாக்:—என்றால் தாதுபலத்தை அதிகப் (f) (d) படுத்துகிற மருந்து.

(14) ஆஸ்டிரிஞ்சென்ட்:—என்றால் ரத்தக் குழல்களையும் (Astringent) ஜீரணக் குடல்களையும் சுருங்கச் செய்து, அதன்மூலமாய் ரத்தப் பெருக்கையும், வயிற்றோட்டத்தையும் நிறுத்துகிற மருந்து.

(15) கார்மினெட்டிவ்:—என்றால் வயிற்றுப் பொறுமல், புளிப்பு இவைகளைக் கண்டித்து, வயிற்று வலி, அஜீரணம் இவைகளைக் குணமாக்குகிற மருந்து.

(16) கோலகாக்:—பித்தத்தை வெளியாக்கியும், சமப்படுத்தி (Cholagogue) துகிறதுமான மருந்து.

(17) கதார்ட்டிக்:—என்றால் மலத்தை வெளியாக்குகிற மருந்து. இது பின் எழுதி இருக்கிற விதங்க ளாகப் பிரிக்கப்பட்டிருக்கின்றது.

(1) லாக்ஸாட்டிவ்:—என்றால் வழக்கமாய்ப் போகிற மலத்தைக் காட்டிலும் கொஞ்சம் நெகிழ்த்தி யாய் மலத்தை வெளியாக்குகிற மருந்து.

(2) பர்கட்டிவ்:—என்றால் கொஞ்சம் தண்ணீராய் மலத் (g) தை வெளியாக்குகிற மருந்து.

(3) டிராஸ்டிக்:—என்றால் அநேகமாய் மலத்தை தண்ணீ (d) ராகப் போகச் செய்கிற மருந்து.

(4) ஐடிராகாக்:—என்றால் பூராவும் தண்ணீராகவே மலத் (Hydragogue) தை வெளியாக்குகிற மருந்து.

(5) கோலகாக் பர்கட்டிவ்:—என்றால் மலத்தோடு பித்தக் (Cholagogue purgative) தையும் வெளியாக்குகிற மருந்து.

(18) டேமியூல் ஸென்ற்:—என்றால் வழுவழுப்பினாலும் (d) எண்ணெய்ப் பசையாலும் எரிச்சல் ரணம் முதலியவைகளைச் சாந்தப்படுத்துகிற மருந்து.

(19) டயாபோ ரேட்டிக்:—என்றால் வேர்வையை உண் (d) (f) டாக்கிக் காய்ச்சலைத் தணிக்கிற மருந்து.

(20) டைஜேஸ்டிவ்:—என்றால் ஜீரணத்தை உண்டு பண்ணு (d) கிற செய்கைக்கு, வயிற்றுக்கும் குடல்களுக் கும் உதவியாக இருக்கிற மருந்து.

(21) டியோடரென்ற்:—என்றால் கெட்ட ஃச்சத்தை மாற்று (d) (d) கிற மருந்து.

- (22) டயூரேட்டிக்:—என்றால் நீரைப் பிரிக்கும் மருந்து.
(a)
- (23) எக்பாலிக்:—என்றால் கருப்பைபைச் சுருங்கவைக்கிற
(b) மருந்து.
- (24) எமட்டிக்:—என்றால் வாந்தியை உண்டு பண்ணுகிற
மருந்து.
- (25) எம்மனகாக்:—என்றால் ஒழுங்கீனமான சூதகத்தை
(g) ஒழுங்கு படுத்துகிறதும், எந்தக் காரணத்
தால் சூதகம் வெளிபாகாமல் இருந்ததோ
அந்தக் காரணத்தை நிவர்த்திசெய்து சூத
கத்தைத் திரும்பவும் படும்படியாகவும் செய்
கிற மருந்து.
- (26) எஸ்கா { என்றால் பட்ட இடத்தைப் பெர்க்க
ரோட்டிக் அல் { வைத்துச் சதையைத் தின்று விடுகிற
ல்து காஸ்டிக். { மருந்து.
- (27) எக்ஸ் பெக்டோரேன்ட்:—என்றால் சுவாஸக் குழல்
நெஞ்ச இவைகளில் கட்டி யிருக்கும் கபத்
தை இளக்கி வெளித்தள்ளுகிறதும் தொண்
டைப் புகைச்சல் கரகாப்பு இவைகளைச் சாந்
தப்படுத்துகிறதமான மருந்து.
- (28) காலக்ட். காக்:—என்றால் குழந்தைகளுக்குப் பால்
(g) (g) கொடுக்கும் பெண்களுக்குப் பால் சுரக்
கும்படி செய்கிற மருந்து
- (29) எமாடினிக்:—என்றால் ரத்தத்தை அதிகப்படுத்துகிற
(Haematinic) தும், ரத்தத்திற்கு நல்ல சிவந்த நிறத்தை
யும் கொடுக்கிற மருந்து.

(30) இப்னாடிக்:—என்றால் மூலையைத் தாக்காமல் தூக்கத்
(h) தை உண்டு பண்ணுகிற மருந்து.

(31) நாரக்கோட்டிக்:—என்றால் மூலையைத் தாக்க அறிவை
மயக்கித் தூக்கத்தை உண்டுபண்ணுகிற
மருந்து.

(32) ரேபிரிஜேரென்ற்:—என்றால் தாகத்தைத் தணிக்கிற
(f) தும், தேகத்தில் காய்ச்சலினால் உண்டாகிற
உஷ்ணத்தையும் சாந்தம் செய்கிறதுமான
மருந்து.

(33) ரிஸால்வேன்ற்:—என்றால் வீக்கம், ரத்தக்கட்டிகள்,
தூர்நீர்க் கட்டிகள் இவைகளைக் கரைக்கிற
மருந்து.

(34) ரேஸ்டோரேட்டிவ்:—என்றால் வியாதி யாதொன்றும்
இல்லாத காலத்தில் ரத்தத்தில் உள்ள சத்
தானது வியாதி ஏற்படும் காலத்தில் குறை
யும்போது அப்படிக் குறைய வொட்டாமல்
ரத்தத்தில் சத்து உண்டாக ஈடுபண்ணக்
கொடுக்கிற மருந்து.

(35) ஸ்டர்நியூட்டட்டோரிஸ்:—என்றால் தும்மலை உண்
டாக்குகிற மருந்து.

(36) ஸ்டேட்டிவ்:—என்றால் நாடி நரம்புகளின் படபடப்
(d) பையும் இருதய ஓட்டத்தையும் சமப்படுத்து
கிறதுமான மருந்து.

(37) ஸ்டமக்கிக்:—என்றால் வயிற்றின் ஜீரண சக்தியை அதிக
கப்படுத்தி பசிபை உண்டாக்குகிற மருந்து.

(38) ஸடிமிபூலென்ற்:—என்றால் தாது நரம்புகளுக்குப்
பலத்தைக் கொடுக்கிறதும், பித்தாசயத்தின்

செய்கையை அதிகப்படுத்துகிறதும், இரு தயத்தைப் பலப்படுத்துகிறதும், வயிற்றின் ஜீரண சக்தியை அதிகப்படுத்துகிறதுமான் மருந்து.

(39) ஸ்டிப்டிக்:—என்றால் காயம்பட்டதினால் ரத்தம் வடிகிறதை, மேல்பிரயோகம் செய்வதால் ரத்தம் வடியவொட்டாமல் நிறுத்துகிற மருந்து.

(40) டானிக்:—என்றால் வயிறு, தாது நரம்பு, இருதயம், நாடிகள், தசைகள் இவைகளுக்கு எல்லாம் பலத்தைக் கொடுக்கிற மருந்து.

(41) வேர்மியூஜ்:—என்றால் கிருமிகளைக் கொல்லாமல் உயிர் (f) ரோடு வெளித்தள்ளுகிற மருந்து.

(42) வேர்மிசைட்:—என்றால் கிருமிகளைக் கொல்லுகிற (d) மருந்து.

இரண்டாம் பாகம்

இங்கிலீஷ் மருந்துகளின் பெயர்களும் அவைகளின் குணங்களும், அளவுகளும் தெளிவாய் எழுதப்பட்டிருக்கின்றன.

(1) ஆவலிட்டானிலிடம்

(a)

இதற்கு ஆன்டி பேப்ரின் என்றும் பெயர்.

(f)(b)

இது வெண்மையான மினுமினுப்புள்ள தகடு தகடானது.

குணம்:—1. அனல்ஜேஸிக். 2. ஆன்டிபைரேட்டிக்.

இவைகள் என்னவென்று தெளிவாய்த் தெரிய முதல் பாகத்தின் இரண்டாம் பிரிவில் எழுதி இருக்கிறதைக் கவனித்துத் தெரிந்து கொள்ளவும். இப்படியே ஒவ்வொரு மருந்துக்கும் சுருக்கமாய் ஒரே வார்த்தையில் எழுதி இருக்கிற குணங்களுக் கெல்லாம் முதல் பாகத்தின் இரண்டாம் பிரிவில் பார்த்துத் தெரிந்து கொள்ளவும்.

அளவு:—1 முதல் 3. கிரான்.

உபயோகம்:—அற்பக் காய்ச்சலில் சூடுதணிய 4-மணி நோத்திற்கு ஒரு தடவல், தடவல் 1-க்கு 3 கிரான் வீதம், 3 கிரான் காபின் ஸிட்ரஸ் என்னும்

(f)

மருந்தோடு சேர்த்துக் கொடுக்கலாம். ஆனால் இது பெனாஸிட்டின் ஆன்டிஃபரின்.

(f)

என்ற மருந்துகளைப்போல் அவ்வளவு நல்ல மருந்தல்ல. ஆகையால் இதற்குப் பதிலாக பெனாஸிட்டின் ஒன்றையே விசேஷமாக உபயோகப்படுத்தி வருவது உத்தமம்.

(2) அக்கேஷியா கம்மி.

(g)

அல்லது கம் அக்கேஷியா. இது பிசின் தூள்.

(g)

குணம்:—டெமியூல் ஸென்ற்

(d)

உபயோகம்:—தண்ணீரில் கரைந்து மிக்சரோடு சேராத,
 பிஸ்மத்ஸப் நைட்ரஸ் காஸ்டர் ஆயில்,
 (b)
 ஓலியம் கோப்பைபா, டிஞ்சர் கனாபிஸ்
 (b) (t) (b)
 இன்டிக்கா முதலிய மருந்துகளைத் தண்ணீர்
 (d)
 ரோடு சேரும்படி செய்ய உத்தேசமாய்ப்
 போதுமான அளவில் சேர்த்துக் கொள்ள
 லாம்.

(1) மியூஸிலேஜ் அக்கேஷியா:—இது கோந்துப்பசை
 செய்யும் விதம்:— ஒருபாகம், கம் அக்கேஷியாவுக்கு, 1½
 பாகம் தண்ணீர் சேர்த்து, மார்ட்டரில்,
 பெஸில் கொண்டு பசைபோல் அரைத்துக்
 கொள்ளவும். மருந்துகளோடு சேர்த்து
 அரைக்கும்போது அப்போதைக்கப்போது
 புதிதாய்ச் செய்துகொள்ள வேண்டும்.

குறிப்பு:—மார்ட்டர் என்றால் மருந்து அரைக்கும் உரல்,
 பெஸில் என்றால் மருந்து அரைக்கும்
 உலக்கை.

(3) ஆஸிடிக் ஆஸிட்.

(d)

இது தெளிவான, புளிப்பு வாயையுள்ள, தண்ணீர்
 போன்ற மருந்து.

(1) ஆஸிடிக் ஆஸிட் டைலியூட்

(d) (d)

செய்யும் விதம்:—1 பாகம் ஆஸ்ட்டிக் ஆஸ்ட்டும், 7 பாகம்
டிஸ்ட்டில் வாட்டரும் ஒன்று சேர்த்தது.

(d) (d)

குறிப்பு:—டிஸ்ட்டில் வாட்டர் என்றால் ஆலித்தண்ணீர்.

குணம்:—1. ரெபிரஜேரேன்ற் 2. டயூரேட்டிக்.

(f)

(d)

அளவு:— $\frac{1}{2}$ முதல் 2 டிராம்.

உபயோகம்:—1. இதைத் தனிமையாகவாவது அல்லது சரீ
பாகம் டிஞ்சர் ஆர்னிக்கா வோடாவது
சேர்த்துப் பத்துக்கு மேல் தடவலாம்.

2. கால்ரா கண்டவுடன் 1 அவுன்ஸ் தண்
னீரில் 30 துளிபோட்டுக் கொடுக்கலாம்
அல்லது பின் எழுதுகிறவிதமாய் மற்ற
மருந்துகளோடு மிக்சராகச் செய்தும்
கொடுக்கலாம்.

கால்ராவுக்கு மிக்சர்

» எடுத்துக்கொள்

ஆஸ்ட்டி ஆஸ்ட்டிக் டைலியூட் டிராம் 1

(d)

(d)

ஸ்பிரிட் ஈதர் டைட்ரோஸி துளி 60

ஸ்பிரிட் காம்பர் துளி 15

ஆக்குவா. சேர்ந்து அவுன்ஸ் 3

ஒன்று சேர்

மிக்சர் செய்

தடவல் 1-க்கு 1 அவுன்ஸ் வீதம், அல்
லது, 3 மணிக்கொரு தடவல் அவசரத்துக்
குத் தகுந்தபடி கொடுக்கவும்.

(4) ஆர்ஸனிக்

இது வேள்ளைப் பாஷாணம்.

குணம்:—ஆல்டரேட்டிவ் 2. டர்னிக்.

அளவு:—1/60 கிரைன் முதல் 1/15 கிரைன் அதாவது 1 கிரைனில் 60-ல் 1-பாகம் முதல் 1 கிரைனில் 15-ல் 1 பாகம் வரை கொடுக்கலாம். இதைத் தனிமையாக இப்படிச் குறைந்த அளவில் ஜாக்கிரதையாய்க் கொடுக்கவேண்டியிருப்பதால் இதற்குப் பதிலாக இது சேர்ந்திருக்கிற,

(I) லைக்கர் ஆர்ஸனிக்காலிஸ்:—இதை உபயோகப்படுத்தி வரலாம். இதற்கு பவ்லர்ஸ் சொலியூஷன் (f)

என்றும் பெயர். இது லவண்டர் வாடையுள்ள திராவகம் 110 துளி மருந்தில் 1 கிரைன் வேள்ளைப் பாஷாணம் சேர்ந்திருக்கிறது.

அளவு:—2 முதல் 8 துளி.

உபயோகம்:—1. இதை ரத்த அசுத்தத்தால் உண்டாகிற நாள்பட்ட புண், பத்து இவைகளுக்கு 10 நாளைக்கு தடவல் 1-க்கு 2 துளி வீதம் 1 அவுன்ஸ் தண்ணீரில் சேர்த்து நாள் 1-க்கு 3 தடவல் ஆகாரத்துக்குப் பின் கொடுத்து பிறகு 5 நாள் மருந்து நிறுத்தி மறுபடியும் தடவல் 1-க்கு 3 துளி வீதம் மேல்படி விதமாய்க் கொடுத்து மறுபடியும் இடை இடையே மருந்து நிறுத்தி தடவல் 1-க்கு துளி

துளியாய்க் கூட்டிக்கொண்டேபோய் தடவல் 1-க்கு 8 துளி வரும்வரை சாப்பிட்டு நிறுத்திக் கொள்ளவும்.

2. ஆகாரம் சாப்பிட்ட வுடனே உண்டாகிற வயிற்றோட்டத்தையும் அன்னத் துவேஷத்தில் ஏற்படுகிற வாந்தியையும், வயிற்று வலியையும் நிறுத்த

எடுத்துக்கொள்,

லைக்கர். ஆர்ஸனிக்காலிஸ். துளி. 3

ஆக்குவா. சேர்ந்து. அவுன்ஸ். 3

ஒன்று சேர்

மிக்சர் செய்

தடவல் 1-க்கு 1 அவுன்ஸ் வீதம் நாள் 1-க்கு 3 தடவல் ஒவ்வொரு ஆகாரத்துக்கு முன் கொடுக்கவும்.

3. கோயினு கொடுத்தும் குணமாகாத நாள் பட்ட மலைக் காய்ச்சல், குளிர் காய்ச்சல் களுக்கு

எடுத்துக்கொள்

லைக்கர். ஆர்ஸனிக்காலிஸ். துளி 24

ஆக்குவா. சேர்ந்து. அவுன்ஸ். 3

ஒன்று சேர்

மிக்சர் செய்

தடவல் 1-க்கு 1 அவுன்ஸ் வீதம் நாள் 1-க்கு 3 தடவல் ஆகாரத்துக்குப் பின் கொடுக்கவும்.

இப்படி இரண்டு மூன்று நாள் கொடுத்த பிறகு “லைக்கர் ஆர்ஸனிக்காலிஸின்” அளவை தடவல் 1-க்கு 4 துளி

ஃதம் நாள் 1-க்கு 3 தடவல் மறுபடியும் 10-நாள் கொடுத்து
வரவும்.

2. கைக்கர் ஆர்ஸனியை. எற். ஐட்ரார்ஜிரி அயோடைட்.

(h)(d)

(d)(d)

இதற்கு டோனோவான்ஸ் சொலியூஷன்

(d)

என்றும் பெயர்.

குணம்:—1. ஆன்டிஸிபிலிட்டிக் 2. ஆல்டரேட்டிவ்.

(f)

அளவு:—5 முதல் 20 துளி.

உபயோகம்:—1. இறையும், புண், பத்து முதலியவைக
ளுக்கு தடவல் 1 க்கு 1 அவுன்ஸ் தண்ணீ
ரில் 5 துளி ஃதம் நாள் 1 க்கு 3 தடவல்
ஆகாரத்துக்குப் பின் கொடுக்கவும். இறையு
ம் இடை யிடையே நிறுத்தி நிறுத்திக்
கொடுக்கவும். ஆனால் நீடித்துச் சாப்பிட
வேண்டும்.

(5) ஆலிட் பென்ஸாயிக்

(Acid Benzoic.)

சாம்பிராணிப் பதங்கம்.

இது வெண்மையான வாசனையுள்ள தகடு தகடான
பதங்கம்.

குணம்:—1. ஆன்டிஸெப்டிக் 2. எக்ஸ்பெக்டோரேன்ற்

3. டயுரேட்டிக்

(d)

அளவு:—5 முதல் 15 கிரான்.

- உபயோகம்:—1. இதை நீர்ச்சுருக்கு விபாதிக்கு தடவல் 1-க்கு 1 அவுன்ஸ் தண்ணீரில் 10 கிரான் வீதம் கரைத்து நாள் 1-க்கு 3 தடவல் கொடுக்கவும்.
பார்லி அரிசிக் கஞ்சித் தண்ணீரில் பாலும் சீனியும் சேர்த்துக் கொடுக்கவும்.
2. கால்ராவில் உண்டாகிற வாந்தியை நிறுத்தவும், நீர் பிரியவும் தடவல் 1-க்கு 5 கிரான் தேனில் கலந்து கொடுக்கவும்.

(6) ஆவலிட் போரிக்

(d) (b)

போரிக் ஆஸிட்.

b) (d)

இது வெண்காரத்தில் இருந்து எடுக்கப்படுகிற வெண்மையான மிருதுவான தூள்.

குணம்:—1. ஆண்டி ஸெப்டிக். 2. டயுரேட்டிக்.

(d)

அளவு:—5 முதல் 15 கிரான் 2 அவுன்ஸ் தண்ணீரில் கரைத்துக் கொடுக்கவும்.

- உபயோகம்:—1. மேகத்திற்கும், வெள்ளைப் பிரமேகத்திற்கும் 1 அவுன்ஸ் தண்ணீரில் 10 கிரான் வீதம் கரைத்து சிரிஞ்சு பண்ணலாம்.
2. காதில் சீழ் வடிகுறதற்கும் மேல்காட்டிய அளவில் இளஞ் சூடான வெந்நீரில் கரைத்

துக் காதுக்குள் நாள் 1-க்கு 1 தடவல் சிரிஞ்சு பண்ணவும்.

3. 1 அவுன்ஸ் மழைத் தண்ணீரில் 10 கிரைன் வீதம் கரைத்து மேகரீர், கண்ணிகட்டி இவைகளுக்கு அப்ஸார்பென்ற் காட்டன் கொ
(b) (b)

ண்டு முக்கிக் கண்ணில் பிழிந்து கண்ணைச் சுத்தம் செய்யலாம்.

குறிப்பு:—அப்ஸார்பென்ற் காட்டன் என்றால் தண்ணீரை
(b) (b)

இழுத்துக் கொள்ளக்கூடிய பஞ்சு.

4. எவ்விதமான புண்களுக்கும், வெட்டுக் காயங்களுக்கும் போராக்ஸ் சோப் கொண்டு
(b)

முதலில் புண்ணை சுத்தம் செய்துவிட்டு அதன்மேல் போராக்ஸ் ஆஸிட் போட்டு மேல் லின்ற், காட்டன் இவைகள் வைத்து வெள்ளைத் துணியால் கட்டி வைக்கலாம்.

- 5 நீர்ப்பையில் வியாதி ஏற்பட்டு துர்வீச்சு முள்ளதும், கலங்கலான நீர் வரும்போது வீச்சத்தை மாற்றி நீர்ப்பையைச் சரியான நிலைமையில் வைக்க.

எடுத்துக்கொள்

	போரிக். ஆஸிட்.	கிரைன். 30
(1)	(b) (d)	
	அக்குவா. சேர்ந்து.	அவுன்ஸ். 6
		ஒன்று சேர்

மிக்சர் செய்

தடவல் 1-க்கு 2 அவுன்ஸ் வீதம் நாள்
1-க்கு 3 தடவல் கொடுக்கவும்.

அல்லது

எடுத்துக்கொள்

- (2) போரிக். ஆஸிட். கிரான், 15
(b) (d)
யுரோ. டிரோபைன். கிரான். 15
இன்பியூஷன். பக்கு. சேர்ந்து. அவுன்ஸ். 3
(f) (b)

ஒன்று சேர்

மிக்சர் செய்

தடவல் 1-க்கு 1 அவுன்ஸ் வீதம் நாள்
1 க்கு 3 தடவல் கொடுக்கவும்.
கொஞ்ச நாளைக்குள் தெளிவான வீச்சமில்
லாத நீர் இறங்கும்.

1. கிளிஸரின் ஆஸிட்போரிக்

(g) (d)(b)

செய்யும் விதம்:—1 பங்கு போரிக் ஆஸிட்டும் 2½ பங்கு கிளி
ஸரினும் ஒன்று சேர்த்துக் கலக்கிக் கொ
திக்க வைத்து போரிக் ஆஸிட்டைக் கரைத்து
வைத்துக் கொள்ளவும்.

உபயோகம்:—இதை வாய்ப்புண், உதடு வெடிப்பு, பால்
காம்பு வெடிப்பு, ரணம் முதலியவைகளுக்கு
நாள் 1-க்குப் பல தடவல் மேல் தடவலாம்.
பால் குடிக்கும் குழந்தையின் வாயில் பட்டா
லும் ஒன்றும் செய்யாது.

2. காது சவ்வுக்குள் ரணம் உண்டாக்கி எத்தமா
வது, சலமாவது வருகிறதாய் இருந்தால்

காதுக்குள் 20 துளி ஊற்றிப் பஞ்சால் அடைத்து வைத்திருந்து பின் 1 அவுன்ஸ் இளஞ் சூடான வெந்நீரில் 10 கிரைன் போரிக் ஆஸிட் வீதம் கரைத்து போதுமான

(d)

லோஷன் கொண்டு காதை சிரிஞ்சு பண்ணி மறுபடியும் 20 துளி கிளிஸரின் ஆஸிட் போரிக் விட்டு அடைத்து வைக்கவும். இப் படி குணமாகும்வரை செய்யலாம். 2 பாகம் போரிக் ஆஸிட்டும் 1 பாகம் அயோடபார மும் கலந்து புண்கள், காயங்கள் இவை களுக்குப் போடலாம்.

(2) அங்குவன்டம். ஆஸிட்போரிக் அல்லது போரிக் ஆயின்று மென்ற் (போரிக் ஆஸிட் கழிம்பு)

செய்யும் விதம்:—1. பங்கு போரிக் ஆஸிட்டும் 9 பங்கு வாஸலைனும் ஒன்று சேர்த்துக் கழிம்பா கச் செய்து கொள்ளவும்.

உபயோகம்:—இதையும் எவ்விதமான புண்களுக்கும், காயங் களுக்கும் மேல் போடலாம்.

வேனல் கொப்பளங்களுக்கும் மேல் தடவி 6 மணி நேரம் கழித்து “சாலாட்டிஸ்” சோப்பு கொண்டு சுத்தம் செய்யவும்.

(7) ஆஸிட் கார்பாலிக்

(d) (b)

கார்பாலிக் ஆஸிட்.

இது உறைந்திருந்தால் கிராய் கிராயாயும், இளக்கிவைத் திருந்தால் தண்ணீர்போல் வெண்மையாகவாவது, அல்லது சிவந்த நிறமாகவாவது இருக்கும்.

குணம்:—(1) ஆன்டிஸெப்டிக். (2) காஸ்டிக்.

அளவு:—1 முதல் 3 கிரான் (கட்டியாய் இருந்தால்) 1 முதல் 3 துளி (தண்ணீராய் இருந்தால்) கம் அக் கேஷியா வோடு சேர்த்து அரைத்து 1 அவுன்ஸ் தண்ணீரில் டைபாய்ட் பீவர் என் (f) d) (f)

னும் விஷஜந்தி சுரத்துக்கு உள்ளுக்குக் கொடுக்கலாம். என்றாலும் தற்காலம் இதை அதிகமாய்க் கையாடி வருகிறதில்லை. இதற்குப் பதிலாக குளோரின் மிக்சரை உபயோகப்படுத்தி வருகிறார்கள். இதைச் செய்ய வேண்டிய விதம் பின்னால் எழுதப்பட்டிருக்கிறது.

உபயோகம்:—அழுகச்சிரங்கு ஒன்று அல்லது இரண்டு கண்டவுடன் அவைகளைக் கிள்ளி மேல் தோலைப் பிய்த்துவிட்டு ஒரு குச்சியில் கார்பாலிக் ஆஸிட் முக்கி அவைகளில் வைத்தால் சிரங்குகளை அதிகப்படுத்துகிற பூச்சிகளைக் கொன்றுவிடும்.

(1) கார்பாலிக் லோஷன்.

செய்யும் விதம்:—1 அவுன்ஸ் கார்பாலிக் ஆஸிட் 39 அவுன்ஸ் வெந்நீர் இரண்டையும் ஒன்று சேர்த்து நன்றாய்க் குலுக்கிக் கொள்ளவும்.

உபயோகம்:—இதை ஆரூத புண்கள், மேகாணங்கள், வெட்டுக் காயங்கள் முதலானவைகளுக்கு கழுவுவதற்காக உபயோகப் படுத்தலாம்.

இந்த லோஷனில் சிரங்குக் கைகளை 15 நிமிஷம் முக்கிவைத்திருந்து பின்பு கார்பாலிக் சோப் கொண்டு சுத்தம் செய்யவும்.

(2) கார்பாலிக் ஆயில் அல்லது துவரெண்ணெய்

செய்யும் விதம்:—1 அவுன்ஸ் கார்பாலிக் ஆஸிட். $\frac{1}{2}$ படி (பக்காவுக்கு) தேங்காய் எண்ணெய் இரண்டும் ஒன்று சேர்த்து நன்றாய் குலுக்கி வைத்துக் கொள்ளவும்.

உபயோகம்:—இதை ரணங்களுக்கும், தீப்பட்ட புண்களுக்கும் மேல் போடலாம்.

(3) கார்போலைஸ்ட் வாஸலைன்.

(b) (d)

செய்யும் விதம்:—1 துளி கார்பாலிக் ஆஸிட் 24 கிரைன் வாஸலைன் இரண்டையும் ஒன்று சேர்த்து கழிம்பாகச் செய்து கொள்ளவும்.

உபயோகம்:—இதை மேகாணங்களுக்கும், துர்நீர்ப் புண்களுக்கும் மேல் தடவி கார்பாலிக் சோப் கொண்டு சுத்தம் செய்யவும். :

(8) ஆஸிடம் ஸிற்றிக்கம்

(d)

ஸிற்றிக் ஆஸிட்.

(d)

இது எலுமிச்சம்பழ உப்பு இது அதிகப் புளிப்பாயும்,
கட்டி கட்டியாயும் இருக்கும்.

குணம்:—ரேபிரி ஜேரென்ற்

(f)

அளவு:—5 முதல் 20 கிரான்

உபயோகம்:—தாகம் தணிய 20 கிரான் ஸிற்றிக் ஆஸிட்டை
 $\frac{1}{2}$ அவுன்ஸ் தண்ணீரில் கரைத்து, 24
கிரான் சோடா உப்பை 1 அவுன்ஸ் தண்
ணீரில் கரைத்து, இதில் மேல்படி புளிப்பை
ஊற்றினால் பொங்கும். அப்போது சாப்
பிடவும்.

கோயினா மிக்சர் செய்யும்போது கோயினா
வைக் கரைக்கத் தடவல் 1 க்கு 5 கிரான்
ஸிற்றிக் ஆஸிட் சேர்த்துக் கொள்ளலாம்.

(9) ஆஸிட் காலிக்

(d) (g)

காலிக் ஆஸிட்

(g)

(d)

குணம்:—ஆஸ்டிரிஞ் சேன்ற்.

அளவு:—5 முதல் 15 கிரான்.

உபயோகம்:—உள் அவயவங்களில் உண்டாகிற ரத்தப் பெருக்குகளை நிறுத்த, தடவல் 1-க்கு 5 கிரான் தண்ணீரில் கரைத்தாவது, மாத்திரையாகச் செய்தாவது, அல்லது தனிப் பொடியாகவாவது நாள் 1-க்கு 3 தடவல் கொடுக்கலாம். இதை இரும்பு சேர்ந்த மருந்துடன் சேர்த்துக் கொடுக்கக் கூடாது.

இரத்தத்தோடு கடுப்பும் வயிற்றழைச்சும் இருந்தால் அதை நிறுத்த:—

எடுத்துக்கொள்

காலிக். ஆஸிட் கிரான் 15

(g) (d)

டோவார்ஸ். பவுடர் கிரான் 15

(d) (d)

ஒன்றுசேர்

3 பொட்டணமாக மடித்துக்கொண்டு நாள் 1-க்கு 3 தடவல், தடவல் 1-க்கு 1 பொட்டணம் தேனில் கலந்து கொடுக்கவும்.

பார்லிமாவு, அல்லது ஆரோருட் மாவு, கஞ்சியில் பால்சேர்த்துக் கொடுக்கவும்.

(10) ஆஸிட். ஐடரோ குளோரிக்.

(d) (h)(d)

மிராட்டிக் ஆஸிட்.

(d)

இதற்கு சங்குத் திராவகம் என்றும் பெயர் வழங்கி வருகிறது.

குணம்:—காஸ்டிக்

(1) ஆஸிட். ஐட்ரோகுளோரிக் டைலியூட்
(d) (h)(d) (d)

செய்யும் விதம்:— $2\frac{1}{2}$ அவுன்ஸ் தண்ணீரை கல்கார்க்கு குப்
பியில் அடைத்து அதில் 1 அவுன்ஸ் ஐட்
ரோகுளோரிக் ஆஸிட்டைக் கொஞ்சம்
கொஞ்சமாய் ஊற்றி நன்றாய் ஒன்று சேரும்
படி குலுக்கிக் கொள்ளவும்.

அளவு:—5 முதல் 20 துளி

உபயோகம்:—(1) கொயினுமிக்சர் செய்யும்போது கொயி
னுவைக் கரைக்க தடவல் 1-க்கு 5 துளி
சேர்த்துக் கொள்ளலாம்.

(2) வயிற்றில் காஸ்டிக் ஜியூஸ் என்னும் நீர்
(g)

காக்கிறதில் குறைவு ஏற்பட்டு அதனால்
அஜீரணம் வார்தி ஏற்பட்டால் அதற்கும்
கர்ப்ப ஸ்திரீகளுக்கு உண்டாகும் வார்தியை
நிறுத்தவும்.

எடுத்துக்கொள்

ஆஸிட் ஐட்ரோகுளோரிக் டைலியூட் துளி	10
டிஞ்சர். ஜென்ஷன்கோ. துளி	60
ஆக்குவா. சேர்ந்து அவுன்ஸ்	3
	ஒன்றுசேர்

மிக்சர் செய்

தடவல் 1 க்கு 1 அவுன்ஸ் வீதம் நாள் 1க்கு
3 தடவல் ஆகாரத்துக்குப் பின் கொடுக்கவும்.

(11) ஆஸிட். ஐட்ரோலியானிக்

(d) (h) d)

டைலியூட்.

(d)

டைலியூட் பிரஸிக் ஆஸிட் என்றும் பெயர். இது கொடிய

(d)

(d)

விஷம் ஆகையால் இதை உபயோகப் படுத்தும்போதெல்லாம் அதிக ஜாக்கிரதையாய் உபயோகப்படுத்த வேண்டும்.

குணம்:—ஸேடட்டிவ்

(d)

அளவு:—2 முதல் 6 துளி

உபயோகம்:—இதை அஜீரணத்தினாலும், முக்கியமாய் வயிற்று புண்படுவதினாலும், ஏற்படுகிற வயிற்றுவலி, வாந்தி இவைகளை நிறுத்த தடவல் 1-க்கு 1 அவுன்ஸ் தண்ணீரில் 2 துளி சேர்த்துக் கொடுக்கலாம். என்றாலும் தனிமையாக இப்படிக்குறைந்த அளவில் ஜாக்கிரதையாய் உபயோகப்படுத்த வேண்டிய திருப்பதால் மேல்படி விபாதிகளுக்கு இந்த மருந்தும் இன்னும் மற்ற மருந்துகளும் சேர்த்திருக்கிற “ஈலட்ஸ் பேப்ஸின் மிக்சர்” என்னும் மருந்தை

(h)

நன்றாய்க் குலுக்கிக்கொண்டு தடவல் 1 க்கு 30 துளி 1 அவுன்ஸ் தண்ணீரில் சேர்த்து நாள் 1 க்கு 3 தடவல் ஆகாத்துக்குப் பின் கொடுக்கவும்.

(12) ஆஸிட் நைட்ரிக்.

(d)

நயிற்றிக் காலிட்

(d)

இது வெடியுப்புத் திராவகம். இதை உள்ளுக்குக் கொடுக்கக் கூடாது.

குணம்:—கரோஸிவ் அதாவது மேல்புட்டால் சதையைத் தின்றுவிடக் கூடியது.

ஆஸிட்நைட்ரோ ஐட்ரோ குளோரிக். டில்

(d)

(h)(d)

(d)

செய்யும் விதம்:—12½ அவுன்ஸ் தண்ணீரை கல் கார்புக்குக் குப்பியில் அடைத்து அதில் 1½ அவுன்ஸ் நைட்ரிக் ஆஸிட்டையும் 2 அவுன்ஸ் ஐட்ரோ குளோரிக் ஆஸிட்டையும் முதலில் ஒன்று சேர்த்துக்கொண்டு மேல்படி தண்ணீரில் கொஞ்சம் கொஞ்சமாய் ஊற்றிக் குலுக்கிக்கொண்டு 14 நாள் வைத்திருந்து பின்பு உபயோகப்படுத்தவும்.

அளவு:—5 முதல் 20 துளி

உபயோகம்:—இது பித்தத்தைச் சாந்தம் செய்ய நல்ல மருந்து. ஜீரணக் கருவிகளாகிய வயிறு, குடல், லிவர் என்னும் பித்தாசயம் இவைகளுக்குப் பலத்தைக் கொடுத்துப் பசி உண்டாக்க.

எடுத்துக்கொள்

ஆஸிட். நைட்ரோ. ஐட்ரோகுளோரிக். டில் துளி 30

டிஞ்சர். நக்ஸ் வாமிக்கா

துளி 30

ஸிரப். ஸிம்பிள்

சாரம் 1½

இன்பியூஷன் குவாஷியா சேர்ந்து

அவுன்ஸ் 1½

(f)

ஒன்று சேர்

மிக்சர் செய்

தடவல் 1 க்கு ½ அவுன்ஸ் வீதம் நாள் 1 க்கு

3 தடவல் ஆகாத்துக்குப் பின் கொடுக்கவும்.

குறிப்பு:—இன்பியூஷன் குவாஷியாவுக்கும் பதிலாக தடவல்

1 க்கு 20 துளி டிஞ்சர் குவாஷியா சேர்த்துக் கொள்ளலாம்.

(2) இதையும் கொயினுவைக் கரைக்கத் தடவல்

1 க்கு 5 துளி உபயோகப்படுத்தலாம்.

(13) ஆஸ்ட், பாஸ்பாரிக். டைலியூட்.

(d) (f) (f) (d)

குணம்:—ரேபிரஜேரேன்

(f)

அளவு:—5 முதல் 20 துளி

உபயோகம்:—நீரழிவுக்காரர்களுக்குத் தாகத்தை நிறுத்த 10 அவுன்ஸ் தண்ணீரில் 10 துளி சேர்த்து ஒரே தடவலாகக் கொடுக்கலாம்.

(14) ஆஸிட். ஸாலி ஸிலிக்

(d)

ஸாலி. ஸிலிக். ஆஸிட்.

(d)

குணம்:—(1) ஆன்டிபைரேட்டிக் (2) ஆன்டிசுமேட்டிக்:

ஆன்டிசுமேட்டிக் என்றால் வாதத்தைக் குணமாக்குகிற மருந்து.

அளவு:—5 முதல் 20 கிரான்

உபயோகம்:—இதற்கு ஆன்டிஸெப்டிக் குணமும் உண்டு.
பத்துக்குமேல் தடவ.

எடுத்துக்கொள்

ஸாலி. ஸிலிக், ஆஸிட் டிராம்	1
குளோரோபார்ம்	1
(f)	

ஒன்று சேர்

கல்கார்க்குக் குப்பியில் வைத்துக்கொண்டு பத்தை முதலில் கார்பாலிக் சோப் அல்லது ரைட்ஸ் கோல்டார் சோப் கொண்டு சுத்தம் செய்துவிட்டு இதில் கொஞ்சம் நாள் 1-க்கு 1 தடவல் பத்தின்மேல் தடவலாம்.

எடுத்துக்கொள்

(2) ஸாலி. ஸிலிக், ஆஸிட், கிரான்	10
போரிக், ஆஸிட்	30
ரிஸார்ஸின்.	20
வாஸலைன்	1

ஒன்றுசேர்

கழிம்பாகச் செய்துகொண்டு இதில் கொஞ்சம் பத்தின் மேல் தடவி முன் சொல்லிய சோப்களில் யாதேனும் ஒன்று சுத்தம் செய்யவும்.

வாதத்திற்கு ஆஸிட் ஸாலி ஸிலிக்கை உபயோகப்படுத்துவதை விட இது சேர்ந்திருக்கிற “ஸோடா ஸாலிஸிலஸ்” என்னும் மருந்தை உபயோகப்படுத்தலாம். இதைப் பற்றி பின் எழுதப்பட்டிருக்கிறது.

(15) ஆஸிட் சல்பியூரிக்

(d) (f)

சல்பியூரிக் ஆஸிட்
(d)

இது கேந்தகத் திராவகம்.

குணம்:—கரோஸிவ்

(1) ஆஸிட் சல்பியூரிக் அரோமேட்டிக்

(d) (f)

செய்யும் விதம்:— $7\frac{3}{4}$ அவுன்ஸ் ரேக்டிபைட் ஸ்பிரிட். இதை
(f)(d)

16 அவுன்ஸ் பிடிக்கக்கூடிய கல்கார்க்குக் குப்பியில் விட்டு இதில் $\frac{3}{4}$ அவுன்ஸ் சல்பியூரிக் ஆசிட்டை கொஞ்சம் கொஞ்சமாய் ஊற்றிக் குலுக்கி ஒன்று சேர்த்துக்கொண்டு இதோடு 1 டிராம் ஸ்பிரிட் சின்னமனும், $2\frac{1}{2}$ அவுன்ஸ் டிஞ்சர் ஜிஞ்சி பெரிகம் சேர்த்துக் கொள்ளவும்.

குணம்:—ஆஸ்டிரிஞ்சென்ட்

அளவு:—5 முதல் 20 துளி

உபயோகம்:—வயிற்றோட்டத்தை மிதவாத

எடுத்துக்கொள்

ஆஸிட். சல்பியூரிக். அரோமேட்டிக் துளி 15

டிஞ்சர். ஒப்பியம்

துளி 15

ஆக்குவா. சேர்ந்து

அவுன்ஸ் 3

ஒன்றுசேர்

மிக்சர்செய்

தடவல் 1 க்கு 1 அவுன்ஸ் வீதம் நாள் 1-க்கு

3 தடவல் கொடுக்கவும்.

(2) ஆஸிட். ஸல்பியூரிக். டைலியூட்

(d) (f) (d)

செய்யும் விதம்:— $5\frac{1}{2}$ அவுன்ஸ் தண்ணீரை கல்கார்க்குக் குப் பியில் அடைத்து, $\frac{1}{2}$ அவுன்ஸ் ஸல்பியூரிக் ஆஸிட்டைக் கொஞ்சம் கொஞ்சமாய் ஊற் றிக் குலுக்கி ஒன்று சேர்த்துக் கொள்ளவும்.

குணம்:—ஆஸ்டிரிஞ்சென்ற

அளவு:—5 முதல் 20 துளி

உபயோகம்:—வயிற்றில் ஜீரணமாகாத ஆகாரம் இல்லாமலும் வயிற்றில் உப்பிசம் இல்லாமலும் இருந்து அதே சமயத்தில் மலம் தண்ணீராய்ப் போ கிறதாய் இருந்தால் மலத்தைக் கட்டி வயிற் றோட்டத்தை நிறுத்த:—

எடுத்துக்கொள்

ஆசிட். ஸல்பியூரிக். டில்	துளி 30
டிஞ்சர். ஒப்பியம்	துளி 15
ஸ்பிரிட். குளோரோபாரம்	துளி 30
ஆக்குவாமெந்தா. சேர்ந்து	அவுன்ஸ் 3
	ஒன்றுசேர்

மிக்சர்செய்

தடவல் 1-க்கு 1 அவுன்ஸ் வீதம் 2, அல்லது 3-மணிக்கொரு தடவல் அவசரத்துக்குத் தகுந்தபடி கொடுக்கவும். ஒரே தடவல் மருந் தில் மலம் போகாமல் நின்று விட்டால் அடுத்த தடவல் கொடுக்க வேண்டாம். இதையும் கொயினுவைக் கரைக்கத் தடவல் 1-க்கு 5 துளி சேர்த்துக் கொள்ளலாம்.

(16) ஆஸிட் டானிக்

(d)

டானிக் ஆஸிட்

(d)

இது துவர்ப்புள்ள தவிட்டு நிறமான தூள்
இது தண்ணீரில் கரையும்.

குணம்:—ஆஸ்டிரிஞ்சென்ட்

அளவு:—2 முதல் 5 கிராம்.

உபயோகம்:—இதை உள்ளுக்கு, உள் அவயவங்களில் உண்
டாகிற ரத்தப் பெருக்கை நிறுத்த காலிக்
ஆஸிட்டைப் போல் உபயோகப்படுத்தலா
மென்றாலும் விசேஷமாய் வெளிப் பிரயோ
கத்திற்கு மட்டும் உபயோகப்படுத்தப்பட்டு
வருகிறது.

(1) கிளிஸ்டின் ஆஸிட் டானிக்

(g)

(d)

செய்யும் விதம்:— $\frac{1}{4}$ அவுன்ஸ் டானிக்ஆஸிட் 1 அவுன்ஸ்
கிளிஸ்டின் இந்த இரண்டையும் மார்ட்டரில்
நன்றாய் டானிக் ஆஸிட் கிளிஸ்டினோடு
சேரும்படி அரைத்துக் கொள்ளவும்.

இதை உதடு வேடிப்பு, நாக்குப்புண், உள்நாக்கு வளர்தல்
முதலானவைகளுக்கு ஒவ்வொரு தடவலும்
மருந்தை நன்றாய்க் குலுக்கிக் கொண்டு
காலை, மாலை தடவி வரலாம்.

(17) ஆஸிட். டார்ட்டாரிக்

(d)

டார்ட்டாரிக் ஆஸிட்

(d)

இது புளிப்புள்ள வெண்மையான மருந்து

குணம்:—ரேபிரி ஜேரேன்ற்

(f)

அளவு:—5 முதல் 20 கிரைன்

உபயோகம்:—சோடா உப்பைப் பொங்க வைத்துச் சாப்பிட

உதவும்.

(18) அக்கோனைட். ரூட்

கலப்பக் கீழங்கு

இது விஷமான மருந்து.

(1) டிஞ்சர். அக்கோனைட்

குணம்:—ஸேட்டிவ்

(d)

அளவு:—6 முதல் 15 துளி.

2 முதல் 5 துளி (அடுத்தடுத்துக் கொடுக்க)

உபயோகம்:—காய்ச்சல் மும்மாமாய் 105, 106 டிகிரியில்

இருக்கையில் 1 அவுன்ஸ் தண்ணீரில் 2 துளி

வீதம் சேர்த்து 15 நிமிஷத்துக்கு ஒரு தட

வல், தர்மாமிட்டர் வைத்துப் பார்த்துக்

கொண்டு, 6 அல்லது 8 தடவல் இந்தப்படி

கொடுத்துப் பிறகு 2 அல்லது 3 மணிக்

கொரு தடவல் மேல்படி விதமாய் தடவல்

1-க்கு 2 துளி வீதம் கொடுத்து காய்ச்சல்

101 டிக்கிரிக்கு வந்தவுடன் நிறுத்திக் கொள்ளவும்.

குறிப்பு:—தர்மாமீட்டர் என்றால் உடம்பில் சூடு எவ்வளவு இருக்கிறதென்று காட்டும் கருவி.

(2) லினிமேன்ற் அக்கோனைட்

இது விஷமான தைலம். இதை வேளிப் பிரயோகத்திற்கு மட்டும் உபயோகப்படுத்த வேண்டும். வாத வலி, உழைச்சல், இடுப்பு வலி, சந்தவலி இவைகளுக்கு இந்தக் தைலத்தை வலி உழைச்சல் உள்ள இடங்களில் சூடு பிறக்க அழுத்தித் தேய்த்து வைத்திருந்து வெந்நீர் விடவும். தைலம் தேய்த்தவர்கள் கையை நன்றாய்ச் சுத்தம் செய்யவேண்டும்.

(19) ஈதர்

இதற்கு ஸல்பியூரிக் ஈதர் என்றும் பெயர். இது காற்றோடு (f)

காற்றாய்ப் போய்விடுகிறது, நெருப்புப் பற்றி எரியக் கூடியதும், மிகவும் காரமான வாசனை யுள்ளதுமான தண்ணீர் போன்ற மருந்து.

குணம்:—(1) ஸ்டிமியூலேன்ற் (2) அனிஸ்தேட்டிக்

அளவு:—10 முதல் 30 துளி (அடுத்தடுத்துக் கொடுக்க)

40 முதல் 60 துளி (ஒரே தடவல் கொடுக்க)

உபயோகம்:—இதை லிக்கலுக்கு தடவல் 1-க்கு 10 துளி ஒரு அவுன்ஸ் தண்ணீரில் போட்டுக் கொடுக்கலாம்.

(1) ஸ்பிரிட் ஈதர்

செய்யும் விதம்:—1 அவுன்ஸ் ஈதர். 2 அவுன்ஸ் ரெக்டிபைட் ஸ்பிரிட் இந்த இரண்டையும் ஒன்று சேர்த்துக் கல்கார்க்குக் குப்பியில் வைத்துக்கொள்ளவும்.

குணம்:—ஈதருக் குண்டானது

அளவு:—20 முதல் 40 துளி (அடுத்தடுத்துக் கொடுக்க)
60 முதல் 90 துளி (ஒரே தடவல் கொடுக்க)

உபயோகம்:—நாடியில் குடுண்டாக்கி, இருதயத்தையும் பலப்படுத்தி, தேகத்திலும் குடுண்டாக்க:—

எடுத்துக்கொள்

ஸ்பிரிட், ஈதர் துளி 30

ஸ்பிரிட். அமோனியா, அரோமேட்டிக் துளி 60

ஸ்பிரிட். குளோரோபாரம் துளி 30

ஆக்குவா. சேர்ந்து அவுன்ஸ் 3

ஒன்றுசேர்

மிக்சர் செய்

தடவல் 1-க்கு 1 அவுன்ஸ் வீதம், 2 அல்லது 3 மணிக்கொரு தடவல் அவசரத்துக்குத் தகுந்தபடி கொடுக்கவும்.

(2) ஸ்பிரிட். ஈதர். நைட்ரோஸ்

குணம்:—(1) டயாபோ ரெட்டிக் (2) டயூரெட்டிக்

(f)

(a)

அளவு:—20 முதல் 40 துளி (அடுத்தடுத்துக் கொடுக்க)
60 முதல் 90 துளி (ஒரே தடவல் கொடுக்க)

உபயோகம்:—(1) குழந்தைகளுக்கு குண்டாகிற ராக்காய்ச்சல், கணைச் சூட்டுக்கு.

எடுத்துக்கொள்

ஸ்பிரிட் ஈதர். நைட்ரோஸி துளி. 30
லைக்கர். அமோனியா. ஆஸிட்டேட்டிஸ்

டிபாம். 1.

ஸிரப் ஆரன்டி

துளி. 40

ஆக்குவா சேர்ந்து

அவுன்ஸ். 1

ஒன்றுசேர்

மிக்சர் செய்

தடவல் 1-க்கு 2 தேக்காண்டி வீதம் 3 மணிக்
கொரு தடவல் கொடுக்கவும்.

(2) பெரியவர்களுக்கு உண்டாகிற எவ்வித
மான காய்ச்சல்களிலும் சூடு தணிய:—

எடுத்துக்கொள்

ஸ்பிரிட். ஈதர். நைட்ரோஸி டிபாம். 1

லைக்கர். அமோனியா. ஆஸிட்டேட்டிஸ்

டிபாம் 6

ஆக்குவா. சேர்ந்து

அவுன்ஸ். 3

ஒன்றுசேர்

மிக்சர்செய்

தடவல் 1 க்கு 1 அவுன்ஸ் வீதம் 4 மணிக்
கொரு தடவல் கொடுக்கவும்.

(3) நீர்க்கடுப்புக்கு:—

எடுத்துக்கொள்

ஸ்பிரிட். ஈதர். நைட்ரோஸி துளி. 90

பொட்டாஸ் பைகார்ப் கிரைன். 30

டிஞ்சர். அயோஸியாமஸ் துளி. 30

இன்பியூஷன். பக்கு. சேர்ந்து அவுன்ஸ் 3

(f)

(b)

ஒன்றுசேர்

மிக்சர்செய்

தடவல் 1 க்கு 1 அவுன்ஸ் வீதம் நாள் 1 க்கு
3 தடவல் கொடுக்கவும்.

(20) ஆலோயின்

இது கற்றுழையிலிருந்து எடுக்கப்படுகிற வா
சனை யாதொன்று மில்லாத மஞ்சள் கிற
மான மருந்து:

குணம்:—கதார்ட்டிக்

அளவு:— $\frac{1}{2}$ முதல் 2 கிரைன் (மாத்திரையாகச் செய்து கொ
டுக்கவும்.)

உபயோகம்:—நாளப்பட்ட மலச்சிக்கலை நீக்க.

எடுத்துக்கொள்

ஆலோயின் கிரைன் 7
எக்ஸ்ட்ராக்ட். நக்ஸ். வாமிக்கா கிரைன் 6
எக்ஸ்ட்ராக்ட். கர்ஸ்காரஸாக்டா கிரைன் 30
(d)

ஒன்றுசேர்

12 மாத்திரைகளாகப் பிரித்துக் கொண்டு
1 மாத்திரை, ஒவ்வொருநாள் இரவிலும் சாப்
பாட்டுக்கு சற்றுமுன் சாப்பிடவும்.

(1) பில் ஆலோஸ் எற்றம்.

குணம்:—கதார்ட்டிக் (2) எம்மனகாக்

அளவு:—4 முதல் 8 கிரைன்

உபயோகம்:—சூதகக் கட்டுக்கு சூதகத்தை வெளியாக்க:—

எடுத்துக்கொள்

பில். ஆலோஸ். எற்றம்

கிரான் 48

பெர்ரை. ஸல்பஸ்

கிரான் 12

(f)

(f)

ஒன்றுசேர்

12 மாத்திரைகளாகப் பிரித்துக் கொண்டு
தடவல் 1-க்கு 1 மாத்திரைத் தம் நாள் 1-க்கு
2 அல்லது 3 தடவல் ஆகாரத்துக்குப் பின்
கொடுக்கவும்.

(3) டிஞ்சர் ஆலோஸ்.

குணம்:—கதார்ட்டிக் (2) எம்மனகாக்

அளவு:— $\frac{1}{2}$ முதல் 1 டிராம் (அடுத்தடுத்துக் கொடுக்க)

$1\frac{1}{2}$ முதல் 2 டிராம் (ஒரே தடவல் கொடுக்க)

உபயோகம்:—இதையும் சூதகக் கட்டுக்குக் கொடுக்கலாம்.

(21) அமோனியா. பென்சாஸ்.

(b) (z)

குணம்:—(1 டியூரெட்டிக்

(d)

அளவு:—5 முதல் 15 கிரான்

உபயோகம்:—இதை நீர் பிரியவும் தாராளமாய் நீர் இறங்க
வும் செய்ய

எடுத்துக்கொள்

அமோனியா. பென்சாஸ்

கிரான் 30

இன்பியூஷன். பக்கு சேர்ந்து

அவுன்ஸ் 3

(f)

(b)

ஒன்றுசேர்

மிக்சர்செய்

தடவல் 1 க்கு 1 அவுன்ஸ் வீதம் நாள் 1 க்கு
3 தடவல் கொடுக்கவும்

(1) அமோனியா. புரோமைட்
(b) (d)

குணம்:—ஸேட்டிவ்

(d)

அளவு:—5 முதல் 30 கிரான்

உபயோகம்:—இதை, தொண்டை கமருதலையும், புகைச்சலையும், வலியையும், குத்திருமலையும் குணமாகக் கொடுக்கலாம்.

1 வயசுக் குழந்தைக்குக் குத்திருமலை நிறுத்த:—
எடுத்துக்கொள்

அமோனியா. புரோமைட்.	கிரான் 8
வைனம். இப்பிக்காக்	துளி 8
டிஞ்சர். வில்லி	துளி 10
டிஞ்சர். ஸெனிகா	துளி 10

(g)

லிரப். லே	துளி 30
ஆக்குவா. சேர்ந்து	அவுன்ஸ் 1
	ஒன்றுசேர்

மிக்சர்செய்

தடவல் 1-க்கு 2 தேக்காண்டி வீதம் 3-மணிக்கு
கொரு தடவல் கொடுக்கவும்.

(2) எம்பிளாஸ்ட்ரம். அமோனியை. கம். ஐட்ரார்ஜி
(h)

குணம்:—ரிஸால்வேன்ட்

உபயோகம்:—இதில் கொஞ்சம் இளக்கித் தோலிலாவது,
முரடான துணியிலாவது தடவி அனல்

காட்டி அரையாப்புக் கட்டிகள், ரத்தக்கட்டிகள், கண்டமாலை இவைகளைக் கரைக்க மேல் போடலாம். கட்டிகள் கரையும் வரை, மாறிமாறிப் போடவேண்டும்.

(22) அமோனியா கார்போனஸ்.

(b)

இது மிகவும் காரமுள்ள கட்டியான மருந்து. நவாச்சாரமும் சுண்ணாம்பும் சேர்ந்தது.

குணம்:—(1) ஸ்டிமியூலென்ட் (2) எக்ஸ் பேக்டோரென்ட்

அளவு:—3 முதல் 10 கிரான்.

உபயோகம்:—(1) ஜலதோஷத்திற்கு இதை முகந்து பார்க்கலாம். அல்லது இது சேர்ந்திருக்கிற “ஸ்மெல்லிங் சால்ட் வித் லவண்டர்” என்ற மருந்தையும் ஜலதோஷத்திற்கு முகந்து பார்க்கலாம்.

பல் கிட்டி மூச்சுப் பேச்சில்லாமல் இருக்கும் காலத்தில் மூக்கில் பிடித்து முகா வைக்கலாம்.

(2) நியுமோனியா என்னும் கபசுரத்துக்கும் ஜலதோஷத்தால் உண்டாகிற தொண்டைப் புடைச்சல் அதோடு சம்பந்தப்பட்ட காய்ச்சல் இவைகளைக் குணமாக்க:—

எடுத்துக்கொள்

அமோனியாகார்ப்

கிரான் 10

டிஞ்சர். ஸெனிகா

துளி 40

(g)

டிஞ்சர். ஸின்கோனா. கோ	துளி 60
டிஞ்சர் ஸில்லி	துளி 15
வைனம். இப்பிக்காக்	துளி 30
ஸ்பிரிட். ஈதர். நைட்ரோஸி	துளி 60
ஆக்குவா. சேர்ந்து	அவுன்ஸ் 3
	ஒன்றுசேர்

மிக்சர் செய்

தடவல் 1 க்கு 1 அவுன்ஸ் வீதம் 4-மணிக்
கொரு தடவல் கொடுக்கவும்.
அல்லது

எடுத்துக்கொள்

அமோனியாகார்ப்	கிரான் 10
டிஞ்சர். செனிகா	துளி 30
வைனம். இப்பிக்காக்	துளி 30
ஸ்பிரிட். ஈதர். நைட்ரோஸி	துளி 60
ஆக்குவா கார்பர். சேர்ந்து	அவுன்ஸ் 3
(f)	
	ஒன்றுசேர்

மிக்சர் செய்

தடவல் 1 க்கு 1 அவுன்ஸ் வீதம் நாள்
1க்கு 3 தடவல் கொடுக்கவும்.

(1) லேக்கர் அமோனியா ஆஸிட்டேட்டிஸ்.

குணம்:—(1) டயூரெட்டிக் (2) டயாபா ரேட்டிக்

(d)

(d)

(f)

அளவு:—2 முதல் 6 டிராம்

உபயோகம்:—இதை எவ்விதமான காய்ச்சல்களிலும் குடு
தணிய

எடுத்துக்கொள்

லைக்கர். அமோனியா. ஆஸிட்டேட்டிஸ்	டிராம் 6
ஸ்பிரிட். ஈதர். நைட்ரோஸி	டிராம் 1
ஆக்குவா சேர்ந்து	அவுன்ஸ் 3
	ஒன்றுசேர்

மிக்சர் செய்

தடவல் 1-க்கு 1 அவுன்ஸ் வீதம் 3 மணிக் கொரு தடவல் கொடுக்கவும்.
காய்ச்சலோடு இருமலும் இருந்தால் மேல் படி மிக்சரில் தடவல் 1-க்கு 10-துளி வைனம் இப்பிக்காக் சேர்த்துக் கொள்ளவும்.

(2) ஸ்பிரிட் அமோனியா அரோமேட்டிக்.

குணம்:—ஸ்டிமியூலென்ட்

அளவு:—20 முதல் 40 துளி (அடுத்தடுத்துக் கொடுக்க)
60 முதல் 90 துளி ஒரே தடவல் கொடுக்க)

உபயோகம்:—இதை அஜீரணம், வயிற்றுப் பொதுமல் இவை களைக் கண்டிக்கவும் இருதய பலவீனத்தை மாற்றவும், நாடிகளில் குடுண்டாக்கவும், களைப்பை மாற்றவும் கொடுக்கலாம்.



(23) அனித்தி

சதகுப்பை

(1) ஒலியம் அனித்தி

குணம்:—(1) ஆன்டி ஸ்பாஸ்மோடிக் (2) கார்மினேட்டிவ்

(d)

அளவு:— $\frac{1}{2}$ முதல் 3 துளி

உபயோகம்:—குழந்தைகளுக்குண்டாகிற, புளிப்பு, மந்தம், வயிற்றுப் பொதுமல், வயிற்றுவலி இவைகளுக்குக் கொஞ்சம் சீனியில், ஒரு குச்சியில் முக்கிக் கலந்து கொடுக்கலாம்.

(2) ஆக்குவா அனித்தி

செய்யும் விதம்:—1 அவுன்ஸ் தண்ணீருக்கு $\frac{1}{2}$ துளி ஆயில் அனித்தி வீதம், முதலில் ஆயில் அனித்தியைப் பாட்டிலில் போட்டு பிறகு தண்ணீர் விட்டு நன்றாய்க் குலுக்கிக் கொள்ளவும்.

அளவு:— $\frac{1}{2}$ முதல் 2 அவுன்ஸ்

உபயோகம்:—1 வயசு குழந்தைக்கு, வயிற்று வலிக்கு 1 முதல் 2 தேக்காண்டி தடவல் 1 க்குக் கொடுக்கலாம்.

(24) அனிவி

பெருஞ் சீரகம்

(1) ஒலியம் அனிவி

குணம்:—(1) ஆன்டி ஸ்பாஸ்டமோடிக் (2) கார்மினேட்டிவ்
(d)

அளவு:— $\frac{1}{2}$ முதல் 3 துளி

உபயோகம்:—இதை சிறு குழந்தைகளுக்கு மந்தம், புளிப்பு, வார்தி, வயிற்றுப் பொதுமல் இவைகளைக் குணமாக்க.

எடுத்துக்கொள்

ஒலியம் அனிவி துளி 1

சோடா பை கார்ப் கிரான் 10

(d) (b)

பல்விஸ் ரீயை

கிரான் 5

ஒன்றுசேர்

4 பொட்டணமாக மடித்துக் கொண்டு 4 மணிக்கொரு தடவல் 1 பொட்டணம் தேனில் கலந்து கொடுக்கவும்.

(2) ஆக்குவா அனீலி

செய்யும் விதம்:—1 அவுன்ஸ் தண்ணீருக்கு $\frac{1}{2}$ துளி ஆயில் அனீலி வீதம் முதலில் பாட்டிலுக்குள் போட்டு பிறகு தண்ணீர் சேர்த்து நன்றாய்க் குலுக்கிக் கொள்ளவும்.

அளவு:— $\frac{1}{2}$ முதல் 2 அவுன்ஸ்

உபயோகம்:—இதையும் சிறு குழந்தைகளுக்கு ஆக்குவா அனித்தியைப் போல் உபயோகப்படுத்தலாம்.

(3) ஸ்பிரிட் அனீலி

செய்யும் விதம்:—1 அவுன்ஸ் ஆயில் அனீலி, 9 அவுன்ஸ் ரேக்டிபைட் ஸ்பிரிட் இந்த இரண்டும் ஒன்று சேர்த்துக் கொள்ளவும்.

குணம்:—ஆயில் அனீலிக்குள்ளது

அளவு:—5 முதல் 20 துளி



(25) ஆன்டிமோனியல். பவுடர்.

(d)

பல்விஸ் ஆன்டிமோனியாலிஸ்

இலை “ஜேம்ஸஸ்” பவுடருக்குப் பதிலாக உபயோகப்படுத்தலாம்.

குணம்:—(1) டயாபோ ரேட்டிக் (2) எம்ட்டிக்

(d) (f)

அளவு:—3 முதல் 6 கிரான்

உபயோகம்:— இதைக் குழந்தைகளுக்குக் காய்ச்சலைத் தணிக்க 1 வயசு குழந்தைக்கு $\frac{1}{4}$ முதல் $\frac{1}{2}$ கிரான் கொஞ்சம் சீனியில் கலந்து 4 மணி நேரத்துக்கொரு தடவல் கொடுக்கலாம். அல்லது தேனில் கலந்து கொடுக்கலாம்.

(1) ஆன்டி மோனியம் டார்ட்டரேட்டம்

இதற்கு டார்ட்டார் எம்ட்டிக் என்றும் பெயர்.

குணம்:—(1) எம்ட்டிக் (2) டயாபோரேட்டிக் (3) எக்ஸ்

(d) (f)

பெக்டோ ரென்ட்

அளவு:—1 முதல் 2 கிரான் (வாந்தி உண்டுபண்ண)

$\frac{1}{24}$ முதல் $\frac{1}{8}$ கிரான் (காய்ச்சலைத் தணிக்க)

$\frac{1}{8}$ முதல் $\frac{1}{4}$ கிரான் (தொண்டைப்

புகைச்சலைத் தணிக்க)

உபயோகம்:—1 வயசு குழந்தைக்கு ஈளை இருமலுக்கு அதாவது இழுப்போடு கஷ்ட சுவாசமு முள்ள இருமலுக்கு வாந்தி உண்டுபண்ணி கபத்தை வெளியாக்கி இருமலையும் குணப்படுத்த.

எடுத்துக்கொள்

டார்ட்டார். எம்ட்டிக்

கிரான் 1

வைனம் இப்பிக்காக்

டிராம் 4

ஸிம்பிள் ஸிரப்

அவுன்ஸ் 1

ஆக்குவா. சேர்ந்து

அவுன்ஸ் 6

ஒன்றுசேர்

மிக்சர் செய்

15 நிமிஷத்துக்கு ஒரு தடவல் வாந்தி உண்டாகும் மட்டும் தடவல் 1 க்கு 2 தேக்காண்டி வீதம் கொடுத்து வாந்தி ஆன பிறகு ஒன்று, இரண்டு அல்லது மூன்று மணிக் கோரு தடவல் வியாதியின் மும்மரத்துக்குத் தகுந்தபடி தடவல் 1 க்கு 1 தேக்காண்டி வீதம் கொடுக்கவும்.

(2) வைனம். ஆன்டி. மோனியாலிஸ்

செய்யும் விதம்:— $\frac{1}{2}$ அவுன்ஸ் தண்ணீரை நன்றாய்க் கொதிக்க வைத்து அதில் 20 கிரான் டார்ட்டார் எம்ட்டிக்கைக் கரைத்து மொத்தம் 10 அவுன்ஸ் ஆகும்படி முந்திரிப்பழ ஓயின் சேர்த்துக்கொள்ளவும்.

அளவு:—10 முதல் 30 துளி (தொண்டைப் புகைச்சலைத் தணிக்க); 2 முதல் 4 டிராம் (வாந்தி உண்டாக்க)

குறிப்பு:—(1) 1 வயசுக் குழந்தைக்கு தொண்டைப் புகைச்சலைத் தணிக்க தடவல் 1 க்கு 3 துளி.

(2) வாந்தி உண்டுபண்ண தடவல் 1 க்கு 15 துளி.

(26) அரோபா

(b)

கிரைஸரோபின்

(b)

இதற்கு கோவா பவுடர் என்றும் பெயர்

(g)

(d)

உபயோகம்:—இதில் கொஞ்சம் எடுத்து எலுமிச்சம்பழச் சாற்றில் கலந்தாவது அல்லது 1 அவுன்ஸ் வாஸிலேனோடு 30 கிரான் கோவாபவுடர் சேர்த்துக் கழிம்பாகச் செய்தாவது பத்துக்கு மேல் தடவலாம். பின்பு கார்பாலீக் சோப், அல்லது ரைட்ஸ் கோல்டார் சோப் கொண்டு சுத்தம் செய்யவும்.

(27) அர்ஜென்டம் நைட்ரஸ்

லூனர்காஸ்ட்டிக்

இதற்கு வெள்ளிக் காடிக்காரம் என்று பெயர்.

உபயோகம்:—(1) கண் ரொப்பைகள் வீங்கி கண் இமைக்குள் பூவளர்ந்திருப்பதைக் கரைக்க 1 அவுன்ஸ் மழைத் தண்ணீரில் 4 அல்லது 5 கிரான் வீதம் கரைத்து நீல நிறமான சீசாவில் கார்க்கு நன்றாய் மூடி வைத்துக்கொண்டு காமல் ஏர் பிரஷ் இதிலாவது, அல்லது (c) (b) (b)

குச்சியில் “அப்ஸார் பென்ற் காட்டன்”

(b) (b)

சுற்றியாவது முதலில் 1 அவுன்ஸ் தண்ணீருக்கு 10 கிரான் போரிக் ஆஸிட் கரைத்து போதுமான லோஷன் செய்து கொண்டு அப்ஸார் பென்ற் காட்டனால் முக்கிக் கண் களுக்குள் பிழிந்து கண்களைச் சுத்தம் செய்து, பிறகு கண் இமையை மடக்கி வைத்துக்கொண்டு காஸ்டிக் சோலியூஷனில் முக்கி இமையில் தடவி கண்ணை மூடி விடவும்.

(2) புண்ணின் கோழைச் சதையைக் கரைக்க
மேல் தடவ உதவும்.

(3) 1 அவுன்ஸ் தண்ணீரில் 1 கிரான் கரை
த்து மேகத்துக்கு நீர்த்தாரைக்குள் சிரிஞ்சு
பண்ணலாம்.

(28) ஆர்னிக்கா

(1) டிஞ்சர் ஆர்னிக்கா.

உபயோகம்:—இதை வெளிப்பிரயோகத்திற்கு மாத்திரம்,
சுளுக்கு, ஊமை அடி முதலியவைகளுக்கு
மேல் தடவி வைத்திருந்து பின்பு வெந்நீர்
விடவும். ரத்தம் கண்டால் உபயோகிக்கக்
கூடாது.

(3) சமபாகம் இந்த மருந்தும் ஆஸிட்டிக்
ஆஸிட்டும் ஒன்று சேர்ந்து பத்துக்கு மேல்
தடவலாம்.

(29) அஸ்பீட்டிடா

(f) (b)

பெருங்காயம்.

குணம்:—(1) ஸ்டிமியூலென்ட் (2) ஆன்டி ஸ்பாஸ்மோடிக்.
(d)

அளவு:—5 முதல் 15 கிரான்

(1) டிஞ்சர் அஸ்பீட்டிடா

(f) (d)

குணம்:—ஸ்டிமியூலென்ட் (2) ஆன்டிஸ்பாஸ்மோடிக்

அளவு:— $\frac{1}{2}$ முதல் 1 டிராம் (d)

உபயோகம்:—வயிற்றுப்பொதுமல், வாய்வு, வயிற்றுவலி,
சூதகஜன்னி, சூதக வயிற்றுவலி, இவை
களுக்கெல்லாம் கொடுக்கலாம்.

(30) ஆரன்டி கார்ட்டெக்ஸ்

கசப்பு ஆரஞ்சுப் பழத்தின்தோல்

(1) ஸீரப் ஆரன்டி

செய்யும் விதம்:—1 அவுன்ஸ் டிஞ்சர் ஆரன்டி 7-அவுன்ஸ்
ஸிம்பிள்ஸீரப் ஒன்று சேர்த்துக்கொள்ள
வும்.

அளவு:— $\frac{1}{2}$ முதல் 1 டிராம்

உபயோகம்:—மற்ற மருந்துகளோடு வாசனையையும், தித்திப்
பையும் உண்டு பண்ணச் சேர்க்கப்படுகிறது.

(2) டிஞ்சர் ஆரன்டி

அளவு:— $\frac{1}{2}$ முதல் 1 டிராம்

உபயோகம்:—இது ஜீரணசக்தியை உண்டுபண்ணும். வாந்தி
யையும் குமட்டலையும் நிறுத்தும்.

(31) ஆஸிட் பிக்ரிக்

(d)

இது மஞ்சள் நிறமான மருந்து

உபயோகம்:—ஆஸிட் பிக்ரிக் $11\frac{1}{2}$ கிரான் இதை 3 டிராம்
ரேக்டிபைட் ஸ்பிரிட்டில் கரைத்து,

(f)(d)

5 அவுன்ஸ் டிஸ்டில்ட் வாட்டர் சேர்த்துக்

(d) (d)

கொண்டு, (இதற்கு பிக்ரிக்லோஷன் என்று பெயர்) இந்த லோஷனைத் தீப்பட்ட புண்ணுக்கு லின்னுத் துணியில் நனைத்து வைத்துக் கட்டவும்.

(32) அனாகார்டியம்

(d)

உபயோகம்:— இந்த எண்ணெயை வெளிப்பிரயோகமாக, குஷ்டரோகத்தின் ரணம் ஆரவும், பத்துக்கும் மேல் தடவலாம்.

(33) அப்பியால்

உபயோகம்:—இதை சூதக வயிற்றுவலிக்கும், சூதகக் கட்டுக்கும், மாதவிடாய் வருகிறதற்கு 2 அல்லது 3 நாட்களுக்கு முன் 3 முதல் 5 துளி வரையும் தடவல் 1-க்குக் கொடுக்கலாம்.

(34) அரிஸ்டால்

இது வீச்சம் மீடதொன்றும் இல்லாததும், தவிட்டு நிறமான தூள்.

உபயோகம்:—இதைத் தனிமையாகவாவது அல்லது சமபாகம் சிங் ஆக்ஸைட் என்னும் மருந்தோடு

(d)

சேர்த்தாவது அயோடபாரத்தை எதற்கெல்லாம் உபயோகப்படுத்தலாமோ அதற்கெல்லாம் உபயோகிக்கலாம்.

(35) ஆஸ்பைரின்

உபயோகம்:—இதைத் தடவல் 1-க்கு 5 முதல் 15 கிரான் வரை மும்மரான வாதத்திற்கும், அதோடு இருக்கிற சூத்துக்கும் கொடுக்கலாம். “சோடாஸாலிஸிலஸ்,” “ஸாலி ஸிலிக் ஆசிட்,” இவைகளுக்கும் பதிலாக உபயோகப் படுத்தலாம்.

(36) பால்ஸம் டீலு

(b)

குணம்:—எக்ஸ் பெக்டோரேன்ற்

அளவு:—5 முதல் 15 கிரான் (கம் அக்கேஷியாவோடு சேர்த்து அரைத்துக் கொடுக்கவும்)

(1) ஸிரப் டீலு

குணம்:—எக்ஸ்பெக்டோரேன்ற்

அளவு:— $\frac{1}{2}$ முதல் 1 டிராம்

உபயோகம்:—இதை விசேஷமாய் சிறு குழந்தைகளுக்கு தெரண்டைப் புகைச்சலை நிறுத்தச் செய்து கொடுக்கிற மிக்சரில் சேர்த்துக் கொடுக்கலாம்.

(1) டிஞ்சர் டீலு

குணம்:—எக்ஸ்பெக்டோரேன்ற்

அளவு:— $\frac{1}{2}$ முதல் 1 டிராம்

(37) பெல்லடோனா போவியா

(d) (f)

(1) எக்ஸ்ட்ராக்டம்: பெல்லடோனா. விர்டி.

(d) (d)

குணம்:—(1) அனோடைன் (2) ஸ்டேட்டிவ்

(d) (d)

அளவு:— $\frac{1}{4}$ முதல் 1 கிரான் (மாத்திரையாகச் செய்து கொடுக்கவும்)

உபயோகம்:—(1) க்ஷயரோகிகளுக்கு இரவில் உண்டாகிற வேர்வையைத் தணிக்க:—

எடுத்துக்கொள்

எக்ஸ்ட்ராக்ட் பெல்லடோனாவிர்டி. கிரான் 6

சிங் ஆக்ஸஸ்ட்

கிரான் 36

(z)

(d)

எக்ஸ்ட்ராக்ட் ஜென்ஷன்

கிரான் 18

ஒன்றுசேர்

12 மாத்திரைகளாகப் பிரித்துக்கொண்டு ஒவ்வொருநாள் இரவிலும் 1 மாத்திரை கொடுத்து வாழும்.

(2) வீக்கம், வலி, வேதனை முதலியவைகளைத் தணிக்கவும், இரத்தக் கட்டிகள், அம்மைக் கட்டு, பிளவை, இவைகளை வற்றவைக்கவும்.

பெல்லடோனா பிக்மேன்ட்

(d)

செய்யும் விதம்:—

எடுத்துக்கொள்.

(1) எக்ஸ்ட்ராக்ட். பெல்லடோனா அவுன்ஸ்

1 மேல்படி மருந்து கட்டியாய் இருந்

தால் நெகிழ்த்தியாக்க போதுமான தண்ணீர் கிளிஸரின் போதுமான அளவு இந்த (g)

இந்த மூன்றையும் ஒன்று சேர்த்து அதிக நெகிழ்த்தியாய் இல்லாமலும், அதிகக்கட்டியாய் இல்லாமலும் ஸிலாப்பில், போலஸ் கத்தியால் நன்றாய்த் தேய்த்துக் கொள்ளவும்.

அல்லது

எடுத்துக்கொள்

(2) எக்ஸ்ராக்ட் பெல்லடோனா அவுன்ஸ் 1
கிளிஸரின் போதுமான அளவு

இக்தியால்

டிராம் 2

ஒன்று சேர்

பிக்மென்றாகச் செய்து, கட்டி, வீக்கங்கனில் மேஸ்தடவி, பஞ்சுவைத்துக் கட்டவும்.

(2) எம்பிளாஸ்ட்ரம். பெல்லடோனா

(b) (d)

உபயோகம்:—இதை இருதயப்பக்கம், நெஞ்சு, இடுப்பு இவைகளிலுள்ள வலி, நோவுக்கு, நோவுள்ள பாகத்தின் அளவுக்குத் தக்கபடி தோலாவது, முரடான துணியாவது வெட்டி, பிளாஸ்திரியை இளக்கித் தடவி, மறுபடியும் அனல்காட்டி வெது வெதுப்பாய் இருக்கையில் போட்டு மேல் பஞ்சுவைத்துக் கட்டி வைக்கவும். இரண்டு மூன்று நாள் வரைக்கும் வலி தணிகிறவரை எடுக்கக்

கூடாது. அவசரமானால் மறுபடியும் இம் படிப் போடவும்.

(3) லீன்மேன்ற. பெல்லடோனா.

(d)

இது விஷமான தைலம். இதை வேளிப் பிரயோகத்திற்கு மட்டும் உபயோகப்படுத்த வேண்டும்.

உபயோகம்:—வாதம், உழைச்சல்களுக்கும், மற்றும் வனி வேதனைகளுக்கும், சூடு உண்டாகும்படி இந்தத் தைலத்தை காலை, மாலை, தேய்த்து வைத்திருந்து பிளானல் பாளமாவது, அல்லது உல்லன்பட்டியாவது சுற்றிவைத்திருந்து பின்பு சுடச்சுட வெந்நீர் விடவும். தைலம் தேய்த்தவர்கள் கைகளை நன்றாய்ச் சுத்தம் செய்யவேண்டும்.

(4) டிஞ்சர். பெல்லடோனா.

(b)

குணம்:—(1) அனோடைன் (2) ஸேட்டிவ்

அளவு:—5 முதல் 15 துளி

உபயோகம்:—(1) ஒருவயசுக் குழந்தைக்கு குத்திருமலுக்குக் கொடுக்க.

எடுத்துக்கொள்

டிஞ்சர். பெல்லடோனா.

துளி 3

வைனம் இப்பிக்காக்.

துளி 6

ஸிப். டோ

துளி 15

ஆக்குவா. சேர்ந்து

டிபாம் 3

ஒன்று சேர்

மிக்கர் செய்

தடவல் 1-க்கு 1 தேக் காண்டி வீதம் 4 மணிக்கொரு தடவல் கொடுக்கவும்.

(2) சிறு குழந்தைகளுக்கு உண்டாகிற கடுப் போடு சொட்டுச் சொட்டாய் இறங்குகிற நீருக்கு.

எடுத்துக்கொள்

டிஞ்சர். பெல்லடோனா.

துளி. 4

சிரப். ஆரன்டி.

துளி. 15

ஆக்குவா, சேர்ந்து

டிராம். 6

ஒன்று சேர்

மிக்சர் செய்

தடவல் 1 க்கு 2 தேக்காண்டி வீதம் 4 மணிக்கொரு தடவல் கொடுக்கவும்.

(38) பென்சாயின்

(b) (z)

சாம்பிராணி.

குணம்:—(I) டயூரேட்டிக் (2) எக்ஸ்பெக்டோரேன்ட்

ஆனால் மேல்படி குணங்களுக்கு இதை இந் தப்படி உள்ளுக்கு உபயோகப்படுத்துகிற வழக்கமில்லை.

(1) டிஞ்சர். பென்சாயின். கோ.

(b) (z)

குணம்:—எக்ஸ்பெக்டோரேன்ட்

அளவு:— $\frac{1}{2}$ முதல் 1 டிராம்.

உபயோகம்:—(1) இதை, உள்ளுக்கு, தொண்டைப் புகைச் சலை நிறுத்த தடவல் 1 க்கு 20 துளி கொஞ்சம். 'கம் அக்கேஷியா' வோடு சேர்த்து

அரைத்து 1 அவுன்ஸ் தண்ணீரில் நாள்

1 க்கு இப்படி 3 தடவல் கொடுக்கலாம்.

(2) வெளிப்பிரயோகமாக வெட்டுக் காயங்க
ளுக்கு மேல் போடலாம்.

(39) பிஸ்மத். கார்போனஸ்.

(b)

(b)

நிமினை.

குணம்:—(1) அண்டாஸிட் என்றால் வயிற்றின் புளிப்பை
(d)

அடிக்கக் கூடியது.

(2) காஸ்ட்ரிக். ஸேட்டிவ். என்றால் வயிற்றின்
(Gastric Sedative)

நோவைச் சாந்தம் செய்பக்கூடியது.

அளவு:—5 முதல் 20 கிரான்

(1) லைக்கர். பிஸ்மத். எற். அமோனியா. ஸிட்ரஸ்.

(b)

குணம்:—(1) அண்டாஸிட் (2) காஸ்ட்ரிக். ஸேட்டிவ்.

அளவு:—½ முதல் 1 டிராம்.

உபயோகம்:—வயிற்றோட்டம், கிராணி, வயிற்றுவலி, புளித்
தேப்பம், வாந்தி, பசியின்மை, குன்மம்
இவைகளுக்குக் கொடுக்க:—

எடுத்துக்கொள்.

லைக்கர். பிஸ்மத். எற். அமோனியா ஸிட்ரஸ்.

டிராம் 2

ஸோடா. பைகார்ப்

கிரான் 30

(d) (b) (b)

டிஞ்சர். கலம்பா.	டிராம் 1
ஸ்பிரிட். குளோரோபாரம்.	துளி 30
ஆக்குவா. சேர்ந்து.	அவுன்ஸ் 3
	ஒன்றுசேர்

மிக்சர் செய்

தடவல் 1 க்கு 1 அவுன்ஸ் வீதம் நாள் 1 க்கு
3 நடவல் ஆகாரத்துக்கு 1 மணி நேரத்துக்கு
முன் கொடுக்கவும்.

குறிப்பு:—மேல்படி ஒவ்வொரு தடவல் மருந்துடன் 5 துளி
“டிஞ்சர் நக்ஸ்வாமிக்கா” சேர்த்தும் கொடுக்
கலாம்.

(2) பிஸ்மத் ஸாலிஸிலஸ்.

(b)

குணம்:—(1) அன்டாஸிட் (2) காஸ்ட்ரிக் ஸ்டெட்டிவ்
(d) (g) (d)

அளவு:—5 முதல் 20 கிரான்.

உபயோகம்:—இதை “டைபாய்ட் பீவர்.” என்னும் விஷ
(f) (d) (f)

ஜந்தி சாத்தில் உண்டாகிற வயிற்றோட்டத்
தை நிறுத்தவும் வயிற்றுப்புண்ணை ஆற்ற
வும் கொடுக்க நல்ல மருந்து.

(3) பிஸ்மத். ஸப்நைட்ரஸ்.

(b)

(b)

இது வெண்மையான கனமுள்ள தூள்.

குணம்:—(1) அன்டாஸிட் (2) காஸ்ட்ரிக் ஸ்டெட்டிவ்.
(d) (g) (d)

அளவு:—5 முதல் 20 கிரான்.

உபயோகம்:—வயிற்றுவளி, வயிற்றோட்டம், வயிற்றுப்புண்,
வாந்தி இவைகளை நிறுத்த:—

எடுத்துக்கொள்

(1) பிஸ்மத். ஸப் ரைட்ரஸ் கிரைன் 15

(b)

ஸோடா. பை கார்ப் கிரைன் 30

(d) (b) (b)

கம். அக்கேஷியா. போதுமான அளவு

(g)

டிஞ்சர். ஜென்ஷன். கோ துளி 45

ஆக்குவர். சேர்ந்து. அவுன்ஸ் 3

ஒன்றுசேர்

மிக்சர் செய்

தடவல் 1 க்கு 1 அவுன்ஸ் வீதம் நாள் 1 க்கு
3 தடவல் ஆகாரத்துக்குப் பின் சாப்பிடவும்.
அல்லது இந்த மருந்தும் இன்னும் மற்ற
மருந்துகளும் சேர்ந்திருக்கிற (2) ஈலட்ஸ்

(h)

பெப்ஸின் மிக்சர். என்னும் மருந்தை ஒவ்
வொரு தடவலும் நன்றாய்க் குலுக்கிக் கொ
ண்டு தடவல் 1 க்கு 30 துளி 1 அவுன்ஸ்
தண்ணீரில் சேர்த்து நாள் 1 க்கு 3 தடவல்
ஆகாரத்துக்குப் பின் கொடுக்கவும்.

குறிப்பு:—அதிகமான வயிற்றோட்டமும், வயிற்று வலியும்

இருந்தால் முதல் மிக்சரில் ஒவ்வொரு தட
வல் மருந்துடன் 10 துளி “லைக்கர். மாஃ
பைன். ஐட்ரோ குளோரைட்” என்னும்

(f) (h)(d)

மருந்தைச் சேர்த்தாவது, அல்லது இரண்

டாவது எழுதியிருக்கிற “ஈலட்ஸ். பெப்

(h)

ஸின் மிக்சரில்” ஒப்பியம் சேர்ந்ததை உப
யோகப்படுத்தவும். ஒப்பியம் என்றால்
அபின்.

(40) போராக்ஸ்.

(Borax)

வேண்காரம்.

இதற்கு “டைபோரேட். ஆவ். ஸோடியம்”

(b)(b)

(f)

(d)

என்றும் பெயர்.

குணம்:—(1) ஆன்டிஸெப்டிக் (2) எம்னாகாக் (3) டயூ
ரேட்டிக் (g) (d)

செய்யும் விதம்:—6 அவுன்ஸ் கீளிஸரினோடு 1 அவுன்ஸ் போ
ராக்ஸைக் கரைத்துக் கொள்ளவும்.

உபயோகம்:—இதை வாய்ப்புண், உதடுவெடிப்பு பால்காம்பு
வெடிப்பு, ரணம் இவைகளுக்கு மேல் தடவ
லாம். பால் குடிக்கும் குழந்தையின் வாயிற்
பட்டாலும் ஒன்றும் செய்யபரது.

(41) பக்கு. போலியா.

(b)

(f)

பக்கு இலைகள்.

குணம்:— டயூரேட்டிக்

(d)

(1) இன்பியூஷன். பக்கு.

(f) b)

பக்கு இலைக் கஷாயம்

(b)

செய்யும்விதம்:— $\frac{1}{2}$ அவுன்ஸ். பக்கு இலையை ஒரு பாதத்திரத்தில் போட்டு 10 அவுன்ஸ் கொதிக்கிற தண்ணீரை அதின்மேல் ஊற்றி $\frac{1}{2}$ மணி நேரம் மூடிவைத்திருந்து பின்பு வடிகட்டிக் கொள்ளவும்.

குணம்:—டயூரெட்டிக்

அளவு:—1 முதல் 2 அவுன்ஸ்.

உபயோகம்:—நீர்க்கடுப்புக்கு நீர் இறங்க:—

எடுத்துக்கொள்

பொட்டாஸ். பை கார்ப்.

கிரான் 10

(b) (b)

டிஞ்சர். அயோஸியாமஸ்.

துளி 15

ஸ்பிரிட். ஈதர். நைட்ரோஸி.

துளி 30

இன்பியூஷன். பக்கு. சேர்ந்து.

அவுன்ஸ் 2

(f)

ஒன்றுசேர்

மிக்சர் செய்

(2) டிஞ்சர் பக்கு.

குணம்:—டயூரெட்டிக்

அளவு:— $\frac{1}{2}$ முதல் 1 டிராம்

உபயோகம்:—இன்பியூஷன்பக்கு வுக்குப் பதிலாக உபயோகப்படுத்தலாம்.

(42) பியூட்டல் குளோரல் ஐட்ரஸ்.

(b)

(h)(d)

குணம்:—(1) அனோடைன் (2)இப்னூட்டிக்

(d)

(h)

அளவு:—5 முதல் 20 கிரான்

உபயோகம்:—இதை, கழுத்து நரம்புவலி, தலைவலி, ஒருத்தலை
இடி முதலிய நரம்பு வேதனைகளுக்கு:—

(1) எடுத்துக்கொள்

பியூட்டல். குளோரல். ஐட்ரஸ். கிரான் 60

(b)

(h)(d)

மியூஸிலேஜ். அக்கேஷியா. போதுமான

அளவு

ஒன்றுசேர்

12 மாத்திரைகளாகப் பிரித்துக்கொண்டு முதலில் 2 மாத்திரைகள் ஒன்றின்பின் ஒன்றாய் விழுங்கி, பிறகு 2 மணி நேரத்துக் கொரு தடவல் 1 மாத்திரை வீதம் 3 தடவல் கொடுக்கவும். மூன்றாறும் வலிவேதனை இருந்தால் மட்டும் தடவல் 1 க்கு 1 மாத்திரை வீதம் நாள் 1 க்கு 3 மாத்திரை, 4 மணிக் கொரு தடவல் கொடுக்கவும்.

குறிப்பு:—மாத்திரைகளை அப்போதைக்கப்போது புதிதாய்ச் செய்து கொள்ளவேண்டும்.

அல்லது

(2) எடுத்துக்கொள்

பியூட்டல் குளோரல். ஐட்ரஸ். கிரான் 40

(b)

(h)(d)

டிஞ்சர். ஜெல்லெமி.

துளி 40

கிளிஸெரின்

டிபரம் 3

(g)

ஆக்குவா. சேர்ந்து.

அவுன்ஸ் 4

ஒன்றுசேர்

மிக்சர் செய்

முதல் தடவலில் 1 அவுன்ஸ் கொடுத்து பிறகு 2 மணி நேரம் கழித்து தடவல் 1 க்கு $\frac{1}{2}$ அவுன்ஸ் வீதம் 2 மணிக்கொரு தடவல் மறுபடியும் 3 தடவல் கொடுக்கவும். மறு நாளும் வலி வேதனை இருந்தால் மட்டும் தடவல் 1 க்கு $\frac{1}{2}$ அவுன்ஸ் வீதம் 4 மணி நேரத் துக் கொரு தடவல் கொடுக்கவும்.

(43) காபீன் லிட்ரஸ்.

(f)

இது வாசனை யாதொன்றும் இல்லாத வெண் மையான தூள். இது தண்ணீரில் கரையும்.

குணம்:—(1) கார்டியக் டானிக் = (அதாவது இருதயத்

(d) தைப் பலப்படுத்தக் கூடியது)

(2) டயூரேட்டிக்

(d)

அளவு:—2 முதல் 10 கிரான்

உபயோகம்:—(1) இருதய வியாதியால் உண்டாகிற வீக்கத்தில், நீரைப் பிரித்து வீக்கத்தைக் குறைக்க, “டிஞ்சர். டிஜிடாலிஸ்” கொடுத்தும் நீர் பிரி

யாத சந்தர்ப்பத்தில் தடவல் 1 க்கு 8 கிரான் வீதம் கொடுக்கவாம்.

(2) ஆன்டிபெரின், ஆன்டிபைரின், பெல (f)(b) (f)

ஸெட்டின், இவைகள் இருதயத்தைப் பல யீனப்படுத்தாமல் இருக்க மேல்படி மருந்துகளில் யாதேனும் ஒன்றை மண்டை இடியை நிறுத்தவும், காய்ச்சல்களில் குடு தணியவும் கொடுக்கும்படி நேரிடுகிற சந்தர்ப்பத்தில் தடவல் 1 க்கு 3 கிரான் “காபீன். (f)

ஸிட்ரஸ்” சேர்த்துக் கொடுக்கவும்.

(3) ஒருத்தலை இடியை நிறுத்த:—

எடுத்துக்கொள்

காபீன். ஸிட்ரஸ் கிரான். 6

(f)

ஆன்டி. பைரின் கிரான். 8

ஒன்றுசேர்

இதை ஒரே தடவலில் வாயில் போட்டு உமிழ் நீருடன் சேர்த்து விழுங்கி கொஞ்சம் வெந்நீர் குடிக்கவும் 2 மணி நேரம் கழித்து சுடச் சுட காப்பி சாப்பிடவும்.

(44) கஜபுட். ஒலியம்.

ஆயில் கஜபுட்

இது பச்சை நிறமுள்ளது. கர்ப்பூவாடையுள்ள எண்ணெய் இதற்கு ஏலக்காய்த் திரா

வகம் எனப்பெயர் வழங்கி வருகிறது. ஆனால்
ஏலக்காயிலிருந்து எடுக்கப்பட்டதல்ல.

குணம்:—(1) ஆன்டி. ஸ்பாஸ்டோடிக் (2) ஸ்டிமியூலென்ட்
(d)

அளவு:—½ முதல் 3 துளி

உபயோகம்:—(1) இதை வெளிப்பிரயோகமாக மண்டை
இடிக்குமேல் தடவலாம் சரிபாகம் “லினி”
மேன்ற. காம்ப்ரீகோ” என்ற தைலத்தை
(f)

யும் சேர்த்து ஒன்றாய்க் குலுக்கிக் கொண்டு
வாதம், உளைச்சல், இடுப்பு வலி, பக்கவாதம்,
திமீர், பிடரி நரம்புவலி, முதலானவைகளுக்கு
சூடு பிறக்க அழுத்தித் தேய்க்கலாம்.

(2) உள்ளுக்குக் கொஞ்சம் சீனியில் 3 துளி
கலந்து அஜீரணத்தால் உண்டாகிற வயிற்று
வலியை நிறுத்தக் கொடுக்கலாம்.

(1) ஸ்பிரிட். கஜபுட்

செய்யும் விதம்:—1 அவுன்ஸ் ஆயில் கஜபுட், 9 அவுன்ஸ்
ரெக்டிபைட். ஸ்பிரிட்

(f)(d)

இந்த இரண்டையும் ஒன்று சேர்த்துக் குலுக்
கிக் கொள்ளவும்.

குணம்:—கஜபுட் ஆயிலுக்குள்ளது

அளவு:—5 முதல் 20 துளி (1 அவுன்ஸ் தண்ணீரில் கலந்து
கொடுக்கலாம்.)

(45) கால்வியம் ஜட்ரஸ்.

இது நீற்றின சுண்ணாம்பு

(1) லேக்கர் கால்ஸிஸ் அல்லது

(லேம் வாட்டர். சுண்ணாம்புத் தண்ணீர்)

செய்யும் விதம்:—10 கிரான், நீற்றின சுண்ணாம்புத்துளை
20 அவுன்ஸ் மழைத்தண்ணீரில் கரைத்துக்
கலக்கி, 12 மணிநேரம் முடிவைத்திருந்து
பிறகு சுண்ணாம்பு கலங்காமல் தெளிவாய்
இறுத்து சீசாவில் அடைத்து வைத்துக்
கொள்ளவும்.

அளவு:—1 முதல் 4 அவுன்ஸ் (பெரியவர்களுக்கு) (1 வயசு
குழந்தைக்கு) 30 முதல் 60 துளி.

உபயோகம்:—இதைப் பொதுவாக குழந்தைகளுக்குப் பால்
செமிக்க, பால்கொடுக்கும் போதெல்லாம்,
அதில் 30 துளி சேர்த்துக் கொடுக்கலாம்.
(பால் என்றால் தாய்ப்பால் அல்லாமல் மற்றப்பால்)

(2) லினிமென்ற். கால்ஸிஸ் அல்லது

காரோன். ஆய்ல்

செய்யும் விதம்:—சரிபங்கு சுண்ணாம்புத் தண்ணீரையும்,
தேங்காய் எண்ணெயையும் ஒன்றுசேர்த்து
நன்றாய்க் குலுக்கினால் பால்போலாகும்.

உபயோகம்:—இதை தீப்பட்ட புண்ணுக்கும் கொப்பளத்
துக்கும் மேல் போடலாம்.

(46) கலம்பா. ருட்

இது கசப்புள்ளவேர். இது ஜீரணசக்தியை
உண்டு பண்ணும்.

அளவு:—5 முதல் 20 கிரான் (தூள் பண்ணிக்கொடுக்கவும்)

(1) இன்பியூஷன் கலம்பா
(f)

கலம்பா கஷாயம்

செய்யும் விதம்:—10 அவுன்ஸ் குளிரந்த தண்ணீரில், $\frac{1}{2}$ -அவுன்ஸ் கலம்பா ருட்டை $\frac{1}{2}$ -மணிநேரம் போட்டு வைத்திருந்து வடிகட்டிக்கொள்ளவும்.

இது கசப்பான கஷாயம்

அளவு:— $\frac{1}{2}$ முதல் 1 அவுன்ஸ்

உபயோகம்:—வயிறு முதலிய ஜீரணக்கருவிகளுக்குப் பலத்தைக் கொடுக்கக் கூடியது.

குறிப்பு:—கலம்பா ருட்டையும், குவாஷியா பட்டையையும் கஷாயம் செய்ய குளிரந்த தண்ணீரையே உபயோகப்படுத்தவேண்டும்.

ஜீரணக்கருவிகளுக்குப் பலத்தைக்கொடுத்து பசி உண்டாக்க:—

எடுத்துக்கொள்

ஆஸிட். நைட்ரோ. ஐட்ரோகுளோரிக்டில்
(d) (h)(d) (d)

துளி 30

டிஞ்சர். நக்ஸ் வாமிக்கா

துளி 30

ஸிரப். ஸிம்பிள்

டி.ராம் $1\frac{1}{2}$

இன்பியூஷன். கலம்பாசேர்ந்து அவுன்ஸ் $1\frac{1}{2}$

(f)

மிச்சர் செய்

தடவல் 1 க்கு $\frac{1}{2}$ அவுன்ஸ் வீதம் நாள் 1க்கு
3 தடவல் ஆகாரத்துக்குப்பின் கொடுக்கவும்.

(2) டிஞ்சர் கலம்பா

குணம்:—ஜீரணசக்தியை உண்டுபண்ணக் கூடியது.

அளவு:— $\frac{1}{2}$ முதல் 1 டிராம்

உபயோகம்:—இன்பியூஷன். கலம்பாவுக்குப் பதிலாக, ஜீர
(f)

ணக்கருவிகளுக்குப் பலத்தைக் கொடுக்கத்
தடவல் 1 க்கு 30 துளி சேர்த்துக் கொள்ள
லாம்.

குறிப்பு:—“இன்பியூஷன் கலம்பாவையும்,” “டிஞ்சர்கலம்
பாவையும்” இரும்புசேர்ந்த மருந்துகளோடு
சேர்த்துக்கொடுக்கலாம்.

(47) காம்பர்.

(f)

சூடன்.

குணம்:—(1) ஆண்டிஸ்பாஸ்டீமோடிக் (2) ஸ்டிமியூலேன்ட்

அளவு:—2 முதல் 5 கிரான் (d)

(1) ஆக்குவா. காம்பர்—(சூடன் கலந்த தண்ணீர்)

(f)

செய்யும் விதம்:—10 கிரான் காம்பரை (சூடனை) 30 துளி

“ரேக்டிபைட் ஸ்பிரிட்டில்” கரைத்து
இதைக் கொஞ்சம் கொஞ்சமாய் 20 அவு
ன்ஸ் தண்ணீரில் விட்டு நன்றாய்க் குலுக்கிக்
கொள்ளவும்.

குணம்:—காம்பருக்குள்ளது

அளவு:— $\frac{1}{2}$ முதல் 1 அவுன்ஸ்

(2) லினிமென்ட் காம்பர். கோ.

(f)

சூடன் தைலம்

செய்யும் விதம்:— $\frac{5}{8}$ அவுன்ஸ் “காம்பரையும் 15 துளி

(f)

ஆயில் லவண்டரையும்”³ அவுன்ஸ் “ரேக்டிபைட் ஸ்பிரிட்டில்” கரைத்து அதோடு $1\frac{1}{2}$

(f)(d)

அவுன்ஸ் “லைக்கர். “அமோனியா போர்ட்”

(f)

சேர்த்துக்குலுக்கி எல்லாம் சேர்ந்து 5 அவுன்ஸ் ஆகும்வரை, “ரேக்டிபைட் ஸ்பிரிட்”

(f)(d)

சேர்த்துக்கொள்ளவும்.

உபயோகம்:—இதை வெளிப்பிரயோகமாக, (1) கால்றாவில் உண்டாகிற கைகால் குளிர்ச்சி, இழுப்பு இவைகளுக்குத்தேய்த்து சூடுண்டாக்காவும். (2) நெஞ்சில் கபம்கட்டி இருப்பதை இளக்கி, கபத்தை வெளிபாக்க நெஞ்சில் தேய்க்கவும்.

ச்சல் வலி, வாதம் முதலியவைகளுக்கு வலியுள்ள இடங்களில் தனிமையாகவாவது, அல்வது சரிபாகம் “கஜபுட் ஆயிலோடு” சேர்த்து ஒன்றாய்க்குலுக்கிக் கொண்டாவது சூடுபெறக்கத் தேய்க்கலாம். தைலம் தேய்த்தவர்கள் கையை நன்றாய்ச் சுத்தம் செய்யவேண்டும்.

(3) டிஞ்சர். காம்பர். கோ

(f)

1 அவுன்ஸ் மருந்தில் 2 கிரான் “அபின்”
சேர்ந்திருக்கிறது.

குணம்:—(1) எக்ஸ்பெக்டோரேன்ஸ் (2) நார்க்கோட்டிக்

அளவு:—30 முதல் 60 துளி

உபயோகம்:—இதை தொண்டைப் புகைச்சலைத் தணிக்கச்
செய்து கொடுக்கிற மிக்சரில் சேர்க்கப்பட்டு
வருகிறது.

தொண்டைப்புகைச்சலை நிறுத்த:—

எடுத்துக்கொள்

டிஞ்சர். காம்பர். கோ

துளி 70

(f)

ஸோடா. பை கார்ப்

கிரான் 30

(d) (b) (b)

வைனம். இப்பிகாக்.

துளி 30

ஆக்குவா. சேர்ந்து

அவுன்ஸ் 3

ஒன்றுசேர்

மிக்சர்செய்

தடவல் 1 க்கு 1 அவுன்ஸ் வீதம் 4 மணி

நோத்துக் கொருதடவல் கொடுக்கவும்.

(4) ஸ்பிரிட். காம்பர்.

செய்யும் விதம்:—1 அவுன்ஸ் “காம்பர்” இதை 9 அவுன்ஸ்
“ரெக்டிபைட் ஸ்பிரிட்”-இல் சேர்த்துக்

(d)

கரைத்துக்கொள்ளவும்.

குணம்:—காம்பருக்குள்ளது

அளவு:—5 முதல் 20 துளி.

(48) கனூபிஸ். இன்டிக்கா

(b) (d)

கஞ்சா

குணம்:—நரர்க்கோட்டிக் (2) அனோடைன்

(1) எக்ஸ்ட்ராக்ட். கனூபிஸ். இன்டிக்கா

(Extract) (b) (d)

அளவு:— $\frac{1}{4}$ முதல் 1 கிரான்

உபயோகம்:—நாளப்பட்டதும் விடாத ஒருத்தலை இடியை
நிறுத்த:—

எடுத்துக்கொள்

எக்ஸ்ட்ராக்ட். கனூபிஸ். இன்டிக்கா கிரான்

(b) (d) ன் 8

பியூட்டல். குளோபல் ஐட்ரஸ். கிரான் 48

(b) (b)(d)

மியூஸிலேஜ். அக்கேஷியா. போதுமான

அளவு

ஒன்றுசேர்

12 மாத்திரைகளாகப்பிரித்துக்கொண்டு, திரா

ன் 1-க்கு 3 தடவல், தடவல் 1-க்கு 1-மாத்

ரை வீதம், ஆகாரத்துக்குப்பின் கொடுக்கவும்.

(2) டிஞ்சர். கனூபிஸ். இன்டிக்கா

(b) (d)

கஞ்சாதிராவகம்

அளவு:—5 முதல் 15 துளி ("கம். அக்கேஷியா" வோடு

சேர்த்து அரைத்துக் கொடுக்கவும்)

உபயோகம்:—ஒருத்தலைஇடி, நரம்புவேதனை, தூக்கமின்

மை, இளைப்பு, சூதகப் பெருக்கு இவைக

ஞாக்குக கொடுக்கலாம். சூதகப்பெருக்கு அஸ்
லது பெரும்பாட்டில் கருக்குழியின் எரிச்சல்
நோவு இவைகளைச் சாந்தப்படுத்த:—

எடுத்துக்கொள்

டிஞ்சர். கனாபிஸ். இன்டிக்கா. துளி 30

(b) (d)

கம். அக்கேஷியா. போதுமான அளவு

(g)

பொட்டாஸ். புரோமைட். கிரான் 30

ஸ்பிரிட். குளோரோபாரம் துளி 30

ஆக்குவா. சேர்ந்து அவுன்ஸ் 3

ஒன்றுசேர்

மிக்சர்செய்

தடவல் 1 க்கு 1 அவுன்ஸ் வீதம் நாள்

1 க்கு 3 தடவல் ஆகாரத்துக்குப் பின்

கொடுக்கவும்.

குறிப்பு:—சில பெண்களுக்கு கஞ்சா சேர்ந்த மருந்து ஏற்றுக்

கொள்கிறதில்லை. ஆகையால் மேல் எழுதி

யிருக்கிற மிக்சரில் முதல் பொழுது மருந்

திலேயே விகர்ப்பம் ஏற்பட்டால் உட

னே இந்த மருந்தை நிறுத்தி விடவேண்டும்.

இளைப்புக்கு = (மந்தாரகாசத்துக்கு) “கானு

பிஸ் இன்டிக்கா” சேர்ந்திருக்கிற “கிரி

(b) (d) (g)

மால்ட் அன்கோ ஸிகரேட்” இதை உப

(g)

யோகப்படுத்தலாம்.

(49) கந்தாரிடிஸ்

(d)

எரிவண்டு

(1) எம்பிளாஸ்ட்ரம். கந்தாரிடிஸ்

அல்லது (d)

எரிவண்டுப் பிளாஸ்திரி

உபயோகம்:—வாதம், சூலைக்கட்டுகளிலுள்ள நீரைப்பொக்க வைத்து வெளியாக்க உபயோகப் படுத்த லாம்.

(2) லைக்கர் எப்பிஸ் பாஸ்டிக்கஸ்

அல்லது

பொங்கவைக்கிற திராவகம்

உபயோகம்:—மொழிக்கு மொழி கட்டுகிற சூலை நீரையும் வாத நீரையும் பொக்கவைத்து நீரை வெளியாக்க.

வட்டமாய்க் கடுதாசித்துண்டு வெட்டி அதில் “எம்பிளாஸ்ட்ரம் கந்தாரிடிஸ்”

(d)

தடவி, அதின் மத்தியில் 5 துளி “லைக்கர் எப்பிஸ் பாஸ்டிக்கஸ்” விட்டு, ஊக்கமுள்ள இடத்தில் போட்டு அதின்மேல் பஞ்சுவைத் துக் கட்டி 9 மணி நேரம் கழித்து அவிழத் தால் பொக்களமிருக்கும்; பொக்களத்தி லுள்ள நீரை வெளியாக்கி பிறகு ‘போரிக் ஆயிள்’ மென்ற’ போட்டு புண்ணை ஆற்ற வும். ‘லைக்கர் எப்பிஸ் பாஸ்டிக்கஸ்’ இதைத்

தனிமையாகவும் தடவி சூலைக்கட்டு நீரைப்
பொக்க வைக்கலாம்.

கண்ணின் மேககீரைக் குணமாக்க:—கால்
ரூபாய் அகலம் கடுதாசி வெட்டி, அதில்
“எம்பிளாஸ்டர்ம் கந்தாரிடிஸ்” தடவி

(d)

அதின் மத்தியில் 5 துளி ‘லைக்கர் எப்பிஸ்
பாஸ்டிக்கஸ்’ விட்டு மேககீர் இறங்கி இருக்
கிற கண்ணின் பக்கத்திலுள்ள கன்னப்
பொருத்தில் போட்டு மேல் பஞ்சுவைத்துக்
கட்டவும். 6 மணி நேரம் கழித்து அவிழ்த்
தால் பொக்களம் இருக்கும். நீர் வெளியான
பின் ‘போரிக் ஆயின்ற் மென்ற’ போட்டுப்
புண்ணை ஆற்றவும்.

குறிப்பு:— எரிவண்டுப் பிளாஸ்திரி, மெதுவாகப் போட்டு
6 மணிமுதல் 9 மணி நேரத்துக்குள் பொக்க
வைக்கும்.

(3) டிஞ்சர் கந்தாரிடிஸ்

(d)

அல்லது

எரிவண்டுத் தீராவகம்

குணம்:—(1) அப்ரோடிஸியாக் (2) டயூரேட்டிக்

(f) (d)

(d)

அளவு:—5 முதல் 15 துளி

2 முதல் 5 துளி (அடுத்தடுத்துக் கொடுக்க)
ஆனால் மேல் எழுதி இருக்கிற குணத்தை
உத்தேசித்து இந்த மருந்தை உள்ளுக்குக்
கொடுப்பது அவ்வளவு உசிதமல்ல.

(50) காப்ஸிலி

மிளகாய்

(1) டிஞ்சர் காப்ஸிஸ்

குணம்:—ஸ்மிதியு லென்ற

அளவு:—5 முதல் 15 துளி

(51) கார்டம்

(d)

ஏலம்

(1) டிஞ்சர் கார்டம் கோ

ஏலத் திராவகம்

குணம்:—கார்ப்மினேட்டிவ்

அளவு:—½ முதல் 1 டிராம்

உபயோகம்:—அஜீரணம், வயிற்றுப் பொதுமல், புளித்தேப்
பம் இவைகளுக்கு:—

எடுத்துக்கொள்

டிஞ்சர். கார்டம். கோ துளி 60

(d)

டிஞ்சர். ஜென்ஷன். கோ துளி 60

ஸ்பிரிட். அமோனியா. அரோமேட்டிக்

துளி 30

ஸ்பிரிட் குளோரோ பார்ம்

துளி 30

(f)

ஆக்குவா. சேர்ந்து

அவுன்ஸ் 3

ஒன்று சேர்

மிக்சர்செய்

தடவல் 1 க்கு 1¹/₂ அவுன்ஸ் வீதம் நாள்
1 க்கு 3 தடவல் ஆகாரத்துக்கும் பின்
கொடுக்கவும்.

(52) கரியோபில்லம்

(f)

அல்லது

(கிளவ்ஸ்) கிராம்பு

(1) ஓலியம். கரியோபில்லம்=(ஆயில். கிளவ்ஸ்)

(f)

கிராம்பு எண்ணெய்

குணம்:—(1) ஸ்டிமியூலேன்ட் (2) கார்மினேட்டிவ்

அளவு:— $\frac{1}{2}$ முதல் 3 துளி (சீனியில் கலந்து கொடுக்கவும்)

உபயோகம்:—மண்டை இடிக்கு மேல் தடவலாம்.

(53) காஸ்காரா. ஸாக்ரடா

(g) (d)

(1) எக்ஸ்ட்ராக்ட் காஸ்காரா. ஸாக்ரடா

(g)(d)

குணம்:—கதார்டிக்

அளவு:— 2 முதல் 8 கிரான் (மாத்திரையாகச் செய்து
கொடுக்கவும்)

உபயோகம்:—இதை வழக்கமாய் ஏற்பட்டிருக்கிற மலச் சிக்
கலை நீக்கக் கொடுக்க நல்ல மருந்து.

மலச் சிக்கலை நீக்கி மலத்தைக் கிரமமாய்ப்
போகச்செய்ய:—

எடுத்துக்கொள்

எக்ஸ்ட்ராக்ட். கால்காரா. ஸாக்ரடா கிரைன்
(g)(d) 48

எக்ஸ்ட்ராக்ட். நக்ஸ்வாமிக்கா. கிரைன் 3
ஒன்றுசேர்

12 மாத்திரைகளாகப் பிரித்துக் கொண்டு
ஒவ்வொருநாள் இரவிலும் படுக்கைக்குப்
போகும் பொழுது 1 மாத்திரை சாப்பிட்டு
அதற்குமேல் பாலாவது, தண்ணீராவது
குடிக்கவும். 1 மாத்திரை சாப்பிட்டும் மலம்
வெளியாகாவிட்டால் தடவல் 1 க்கு 2 மாத்
திரைகள் ஒன்றின் பின் ஒன்றாய் விழுங்க
வும். ஆனால் தடவல் 1 க்கு 2 மாத்திரைக
ளுக்குமேல் வேண்டாம். நாள்தோறும் தட
வல் 1 க்கு 1 அல்லது 2 மாத்திரைகள் சாப்
பிடுகிறதை அவாவர்கள் தேக நிலைமைக்கும்,
குடலின் தன்மைக்கும் தகுந்தபடி நிதானப்
படுத்திக்கொள்ளவும்.

அல்லது

பாரோஸ். வெல்கம். கால்காரா. ஸாக்ரடா.
(b) (g)(d)

டேபீளாய்ட்ஸ்” இதில் 1 முதல் 4 மாத்திரை
(b)

ரைகள் தேக நிலைமைக்குத் தகுந்தபடி ஒவ்
வொரு நாள் இரவிலும் படுக்கைக்குப் போ
கும்போது சாப்பிட்டு அதன்மேல் பாலா

வது, தண்ணீராவது குடித்துவந்தால் காலை
யில் மலச் சிக்கலில்லாமல் வெளியாகும்.

(2) எக்ஸ்ட்ராக்ட். காஸ்காரா. ஸாக்ரடா. லிக்குவிட்

(g) (d) (d)

அளவு:— $\frac{1}{2}$ முதல் 1 டிராம்

உபயோகம்:—இதையும் மலற்சிக்கலை நீக்கவும் பித்தத்தைக்
கழிக்கவும், மூலவியாதிக்காரர்களுக்கு வழக்
கமாய் ஏற்படுகிற மலச்சிக்கலை நீக்கவும்
கொடுக்கலாம். நாள்பட்ட மலச்சிக்கலை
நீக்க:—

எடுத்துக்கொள்

எக்ஸ்ட்ராக்ட். காஸ்காரா. ஸாக்ரடா. லிக்கு

(g) (d)

விட். டிராம் 1

(d)

டிஞ்சர். நக்ஸ்வாமிக்கா.

துளி 5

கிளிஸரின்.

டிராம் 1

ஆக்குவா. சேர்ந்து

அவுன்ஸ் 3

ஒன்றுசேர்

மிக்சர் செய்

இதை ஒரே தடவலாக ஒவ்வொரு நாள்
சாயங்காலம் சாப்பிடவும். ஆனால் மேற்படி
மிக்சரில் எக்ஸ்ட்ராக்ட் காஸ்காரா. ஸாக்

(g)

ரடா லிக்குவிட்' இதை மாத்திரம் தடவல்
1-க்கு 30 துளி முதல் 60 துளிவரை இந்த
அளவுக்குள் நிதானப்படுத்திக்கொண்டு அவ
ரவர்கள் தேகநிலைமைக்குத் தகுந்தபடி, ஒவ்
்வொரு நாள் காலையில் மலம் தண்ணீராய்,

போகாமல் தன்மலமாய் முக்கலில்லாமல் சாதாரணமாய்ப் போகும்படி நிதானப்படுத்திக் கொள்ளவும். இப்படிப் பொருமையாய் நீடித்துச் சாப்பிட்டு வந்தால் நாள்பட்ட மலச்சிக்கல் நீங்கிவிடும்.

அல்லது

(1) பார்க். டேவிஸ். அன்கோ. “காஸ்காரா.

(d)

எவாக்குவன்ற” தன் மலமாய் கொஞ்சம் நெகிழ்த்தியாய்ப் போக இதில் தடவல் 1-க்கு 10 முதல் 15 துளிவரை $\frac{1}{2}$ -அவுன்ஸ் தண்ணீரில் கலந்து நாள் 1 க்கு 3 தடவல் சாப்பிடவும்.

மலம் தண்ணீராய்ப் போகவேண்டுமானால் தடவல் 1 க்கு 20 முதல் 30 துளிவரை $\frac{1}{2}$ அவுன்ஸ் தண்ணீரில் கலந்து காலைிலும் மாலைிலும் நாள் 1-க்கு 2-தடவல் சாப்பிடவும்

அல்லது

(2) பிரடரிக். ஸ்டேரன்ஸ். அன்கோ

(f) (d)

காஸ்காரா. அரோமேட்டிக்,” இதற்கு மற்றொரு பெயர் “காஸாக்ரா” மலம் கொஞ்

(g)

சம் நெகிழ்த்தியாய் முக்கலில்லாமல் வெளியாக இதில் தடவல் 1-க்கு 15 துளி $\frac{1}{2}$ அவுன்ஸ் தண்ணீரில் கன்றாய்க்கலந்து பகலில் 3 தடவல் ஒவ்வொரு ஆகாரத்துக்கும் $\frac{1}{2}$ மணி நேரத்துக்கு முன்பும், இரவில் படுக்கைக்

குப் போகும்போது 1 தடவலும் ஆக நாள் 1 க்கு 4 தடவல் சாப்பிடவும்.

மலம் தண்ணீராய்ப் போக வேண்டுமானால் இரவில் படுக்கைக்குப் போகும்போதும் 30 துளி முதல் 60 துளிவரை $\frac{1}{2}$ அவுன்ஸ் தண்ணீரில் நன்றாய்க்கலந்து சாப்பிட்டுப் பிறகு மறுநாள் காலைிலும் எழுந்தவுடன் மேல் காட்டிய அளவில் 1 பொழுது சாப்பிடவும்.

குறிப்பு:—இந்த இரண்டு மருந்துகளையும் அவைகளுக்கு ஏற்பட்டிருக்கிற அளவுகளை நிதானப்படுத்திக் கொண்டு மலச்சிக்கலுள்ளவர்கள் ஒவ்வொருநாளும் மலம் சிக்கலில்லாமல் வெளிப்போகும்படி கவனித்துப் பொருமையாய் கொஞ்சகாலம் நீடித்துச் சாப்பிட்டு மலம் வெளிப்போகுதல் கிரமப்பட்டவுடன் நிறுத்திக் கொள்ளலாம்.

(54) காட்டிக்து—(Catechu)

காசுக்கட்டி

(I) டிஞ்சர் காட்டிக்து

குணம்:—ஆஸ்டிரிஞ் சேன்ற் (Astringent)

அளவு:— $\frac{1}{2}$ முதல் 1 டிராம்

உபயோகம்:—இதை நாள்பட்ட வயிற் றோட்டத்தை நிறுத்திக் கொடுக்கலாம் 1-வயசு குழந்தைக்கு வயிற்றோட்டத்தை நிறுத்தி:—

எடுத்துக்கொள்

டிஞ்சர். காட்டிக்கு துளி 15
பல்விஸ். கிரிட்டா. அரோமேட்டிக்

கிரைன் 6

ஸ்பிரிட். குளோரோ பாரம் துளி 6

(f)

ஆக்குவா. சேர்ந்து டிராம் 3

(d)

ஒன்று சேர்

மிக்சர்செய்

தடவல் 1 க்கு 1 தேக்காண்டி (1 டிராம்.)

வீதம் 4 மணிக்கொரு தடவல் கொடுக்கவும்.

(55) ஸ்ரீரீயை ஆக்ஸாலஸ்

இது வெண்மையான தூள்

இதைப் பெண்களுக்கு, கருத்தரித்திருக்கும்
காலத்தில் உண்டாகிற மசக்கை வாந்தியை
நிறுத்தக் கொடுக்கிற மருந்தாய் இருந்த
போதிலும் அனேகரால் கையாடப் படுகிற
தில்லை.

அளவு:—2 முதல் 10 கிரைன் தனித்துளாகவாவது அல்லது

பின் எழுதுகிற விதமாய் மாத்திரைகளாகச்
செய்தாவது கொடுக்கலாம்.

கர்ப்ப ஸ்த்ரீகளுக்கு உண்டாகிற மசக்கை
வாந்தியை நிறுத்த:—

எடுத்துக்கொள்

ஸ்ரீரீயை ஆக்ஸாலஸ்

கிரைன் 30

எக்ஸ்ட்ராக்ட் ஜென்ஷன்

கிரைன் 30

ஒன்றுசேர்

12 மாத்திரைகளாகப் பிரித்துக்கொண்டு
தடவல் 1-க்கு 2 மாத்திரைகள் வீதம் 'நாள்
1 க்கு 2 தடவல் கொடுக்கவும்.

(56) சிரட்டா

நிலவேம்பு

(1) இன்பியூஷன் சிரட்டா

நிலவேம்புக் கஷாயம்

செய்யும் விதம்:— $\frac{1}{2}$ அவுன்ஸ் நிலவேம்பில் 10 அவுன்ஸ்
கொதிக்கிற தண்ணீரைவிட்டு 15 நிமிஷம்
மூடி வைத்திருந்து பின்பு வடிகட்டிக்கொள்
ளவும்.

அளவு:— $\frac{1}{2}$ முதல் 1 அவுன்ஸ்

உபயோகம்:—இதை 'போட்டாஸ் அயோடைட்' என்னும்

(d)(d)

'வாத உப்போடு' சேர்த்து வாதத்துக்குக்
கொடுக்கலாம்.

(2) டிஞ்சர் சிரட்டா

நிலவேம்புத் திராவகம்

அளவு:— $\frac{1}{2}$ முதல் 1 டிராம்

உபயோகம்:—இதையும் நிலவேம்புக் கஷாயத்துக்குப் பதி
லாக உபயோகப் படுத்தலாம்.

(57) குளோரல் ஐட்ரஸ்
(h)(d)

குணம்:—ஸ்டெட்டிவ் (2) இப்னுட்டிக்
(d) (h)

அளவு:—5 முதல் 20 கிரான்

உபயோகம்:—(1) தூக்கம் உண்டு பண்ண:—
எடுத்துக்கொள்

குளோரல் ஐட்ரஸ் கிரான் 20

(h)(d)

பொட்டாஸ் புரோமைட் கிரான் 20

(b) (d)

லிரப் ஆரன்டி டிராம் 1

ஆக்குவா சேர்ந்து அவுன்ஸ் 1

ஒன்று சேர்

மிக்சர்செய்

இதை ஒரே தடவலாகப் படுக்கைக்குப்
போகும்பொழுது கொடுக்கவும்.

குறிப்பு:—இருதயவியாதி உள்ளவர்களுக்கு மேல்படி மிக்சர்
கொடுக்கக் கூடாது.

இரண்டு வயசு குழந்தைக்குக் குத்திருமலை நிறுத்த:—
எடுத்துக்கொள்

குளோரல் ஐட்ரஸ் கிரான் 4

(h)(d)

அமோனியா புரோமைட் கிரான் 6

(b) (d)

லிரப் டீலு துளி 30

ஆக்குவா சேர்ந்து டிராம் 6

ஒன்றுசேர்

மிச்சர் செய்

தடவல் 1 க்கு 2 தேக்காண்டி (கால் அவுன்ஸ்) வீதம், 3 மணிக்கொரு தடவல் கொடுக்கவும்.

ஒருத்தலை இடி, நாம்புவேதனை, பல் அரண்கட்டி இருத்தல் இவைகளைக் குணமாக்க:—

எடுத்துக்கொள்

குளோரல் ஐட்ரஸ்

கிரான் 5

(h)(d)

காம்பர்

கிரான் 5

ஒன்றுசேர்

சிலாப்பில், போலஸ் கத்தியால் தேய்த்துப் பசைபோல் செய்து வலி, வேதனையுள்ள இடத்தில் அழுத்தித் தேய்க்கவும். பல் அரண்கட்டின இடத்தில் மேல்படி பசையைப் பஞ்சில் தேய்த்து வைக்கவும். அரண்கரைந்து வலி வேதனை நீங்கும்

(4) வாத, சூலைக்கட்டு நீர்களைப் பொக்க வைத்து நீரை வெளியாக்க:—

கொஞ்சம் பொடி செய்த 'குளோரல் ஐட்ரஸ்'

(h)(d)

இதை 'ஸ்டிக்கிங் பிளாஸ்டர்' தடவின துணியில் தூற்றி கொஞ்சம் அனல் காட்டிப் பொக்க வைக்க வேண்டிய இடத்தில் ஓட்டி மேல் பஞ்சுவைத்துக் கட்டிவைத்தால், சீக்கிரம் "எரிவண்டுப் பிளாஸ்திரி" க்கு மேலாகப் பொக்கவைக்கும் எனத் தீர்மானிக்கிறார்கள்.

(58) குளோரின் மிக்சர்

செய்யும் விதம்:—12 அவுன்ஸ் பிடிக்கக்கூடிய கல்கார்க்கு அல்லது கார்க்கு நன்றாய் மூடிய குப்பியில், 30 கிரான் “போட்டாஸ் குளோரஸ்” இதைத் தட்டி அதின்மேல் 1 டிராம் “ஸ்டிராங் ஐட்ரோ குளோரிக் ஆஸிட்” இதை (h)(d)

(d) ஊற்றிக் கார்க்கு நன்றாய் மூடி, சீசாவை அசைத்துக்கொண்டிருந்தால், அதற்குள் ஒரு விதமான வீச்சமுள்ள மஞ்சள் புகை நிறைந்திருக்கும். பிறகு 10 அவுன்ஸ் தண்ணீரைக் கொஞ்சம் கொஞ்சமாய்ப் பாட்டிலுக்குள் ஊற்றிக் கார்க்கு நன்றாய் மூடிப் பாட்டிலைக் குலுக்கினால் பாட்டிலுக்குள்ளிருந்த மஞ்சள் புகை பூராவும் தண்ணீரில் கலந்து விடும். பிறகு 30 கிரான் “கோய் னேன் ஸல்பஸ்” இதைப் பாட்டிலுக்குள் (f)

(f) தட்டிக் கரைத்து, அதோடு 1 அவுன்ஸ் “ஸ்ட்ரப் ஆரன்டி.” இதைச் சேர்த்து 12 அவுன்ஸ் மேல்படி பாட்டில் நிறையப் போதுமான தண்ணீர் சேர்த்துக் கொள்ளவும்.

அளவு:—தடவல் 1 க்கு 1 அவுன்ஸ் வீதம் 4 மணிக்கொரு தடவல் கொடுக்கவும்.

உபயோகம்:—இதை “டைபாய்ட். பீவர்.” என்னும் வயிற் (f) (d) (f)

ரோட்டத்தோடு கூடிய விஷஜந்நி சுரத்துக்கு உள்ளுக்குக் கொடுக்கலாம்.

(59) குளோரோ பார்ம்

(f)

குணம்:—(1) அனிஸ்தேட்டிக் (2) அனேஸ்தைன் (3) ஸ்டேட்டிவ் (d) (d)

அளவு:—1 முதல் 5 துளி

உபயோகம்:—மேல் தடவினால், லேசான எரிச்சலை உண்டாக்கி வலி வேதனையைத் தணிக்கும்.
ஆப்பரேஷன் செய்யும் காலத்தில், வலிவேதனை தெரிய வொட்டாமல் இருக்க முகரவைக்கிறார்கள். இப்படிச் செய்யும் காலத்தில் ஜாக்கிரதையாய் உபயோகப்படுத்த வேண்டும்.

(1) ஆக்குவா. குளோரோ பார்ம்

(f)

குளோரோ பார்ம் கலந்த தண்ணீர்

(f)

செய்யும் விதம்:—25 அவுன்ஸ் தண்ணீரில் 30 துளி குளோரோ பார்ம் ஒரு பாட்டிலில்போட்டு நன் (f)

றாய்க் குலுக்கிக்கொள்ளவும். இந்த அளவில் வேண்டிய 'ஆக்குவா. குளோரோபார்ம்' செய்து கொள்ளவும்.

அளவு:—½ முதல் 2 அவுன்ஸ்

உபயோகம்:—மிக்சர்களில் மற்ற மருந்துகளுக்கு இனிப்பை உண்டாக்கச் சேர்க்கப்படுகிறது.

(2) டிஞ்சர் குளோரோபார்ம். கம்போஸிட்டா

(f)

செய்யும் விதம்:—1 அவுன்ஸ் குளோரோபார்ம்

(f)

4 அவுன்ஸ். ரேக்டிபைட். ஸ்பிரிட்

(f) (d)

5 அவுன்ஸ். டிஞ்சர். கார்டம். கோ

(d)

இவைகளை வரிசைக் கிரமமாய் ஒன்று சேர்
த்து கல்கார்க்குக் குப்பியில் வைத்துக்கொள்
ளவும்.

அளவு:—5 முதல் 60 துளி

உபயோகம்:—மிக்சர்களில் மற்ற மருந்துகளுக்கு இனிப்பு
உண்டாக்கவும், “கார்மி னேட்டிவ்” குணம்
கொடுக்கவும் உபயோகப்படுத்தலாம்.

(3) ஸ்பிரிட். குளோரோ பார்ம்

(f)

செய்யும் விதம்:—குளோரோபார்ம். இதை 19 அவுன்ஸ்.ரேக்

(f)

டிபைட். ஸ்பிரிட்டில் கரைத்துக் கொள்ள

(f) (d)

வும்.

அளவு:—5 முதல் 20 துளி (அடுத்தடுத்துக் கொடுக்க)

30 முதல் 40 துளி(ஒரேதடவல் கொடுக்க)

உபயோகம்:—(1) இதை ஆக்குவா. “ குளோரோ பார்” த்

(f)

துக்குப் பதில் மிக்சரில் தடவல் 1 க்கு 10

துளி சேர்த்துப் பின்பு “ஆக்குவா” = (தண்

ணீர்) சேர்த்துக்கொள்ளவும். இதே பிரகாரம் “ஆக்குவா. (1) அனிஸி” (2) அனித்தி, (3) மெந்தாபிப். இவைகள் மிக்சர்களில் வரும்போது முதலில் “ஆயில் (1) அனிஸி (2) அனித்தி (3) மெந்தாபிப்” இவைகளை முறையே, 1 அவுன்ஸ் “ஆக்குவா” வுக்கு $\frac{1}{2}$ துளியீதம் “மினிம் மெஷர்”=(சொட்டு கிளாஸ்) இதில் போட்டு அதில் 10 துளி “ஸ்பிரிட் குளோரோபார்ம்” சேர்த்தால்

(f)

மேல்காட்டிய எண்ணெய் சம்பந்தமான மருந்துகள் கரைந்து தண்ணீரோடு ஒன்று சேரும்.

(2) பல் ஈருகட்டி, வேதனை இருந்தால் குச்சியில் பஞ்சு சுற்றி “ஸ்பிரிட் குளோரோபார்மத்தில்” முக்கி ஈருகட்டி வலி இருக்கிற இடத்தில் வைத்தால் ஈரு கரைந்து வலி நின்றுவிடும்.

(3) “ஆக்குவா குளோரோ பாரத்தை” ப் போல் இதையும் மிக்சர்களில் மற்ற மருந்துகளுக்குத் தித்திப்பை, உண்டாக்க தடவல் 1 க்கு 10 துளி உபயோகிக்கலாம்.

(4) டிஞ்சர் குளோரோ பார்ம். எற். மார்பைன்

(f)

(f)

கம்போஸிட்டா

இதில் சேர்த்திருக்கிற மருந்துகளாவன:—
குளோரோபார்ம் அவுன்ஸ் $\frac{1}{2}$

f)

மார்பைன். ஐட்ரோகுளோரைட் கிரைன்

(f) (h)(d) (d) 43½

டைலியூடெட். ஐட்ரோஸியானிக்.

(d) (d)(h)(d)

ஆஸிட். அவுன்ஸ் ½

டிஞ்சர். காப்ஸிஸி அவுன்ஸ் ½

டிஞ்சர். கறாபிஸ். இன்டிக்கா அவுன்ஸ் 1

(b) (d)

பெப்பர் மென்ற. ஆயில் துளி 7

கிளிஸரின் அவுன்ஸ் 2½

(g)

ரெக்டிபைட். ஸ்பிரிட். சேர்ந்து ஆக

அவுன்ஸ் 10

எல்லாம் ஒன்று சேர்த்துக் கல்கார்க்குக் குப்பியில் வைத்துக்கொள்ளவும்.

அளவு:—5 முதல் 15 துளி

உபயோகம்:—இதை “காம்பரோடைன்” “குளோரோ

(f) (d)

டைன்”, இவைகளுக்குப் பதிலாக ‘கால்ரா’

வயிற்றோட்டம் இவைகளுக்குக் கொடுக்க லாம்.



(60) கிரைஸரோ பைனம்

(b)

இது “கோவா பவுடர்” விருந்து எடுக்கப்

(g)

படுகிற மஞ்சள் சிறமான தூள்.

உபயோகம்:—இதை பத்து, சொறி, அரைகடி முதலியவை களுக்கு வெளிப்பிரயோகமாக, எலுமிச் சம்பழச்சாற்றில் கொஞ்சம் கலந்து, பத் தை முதலில் “ஊர்பாலிக் ஸோப்”, ரைட்ஸ் கோல்டார் ஸோப்”, “குட்டிக்கி யூராஸோட்,” “கிரிமால்ட் அன்கோ மெடி (g) (d)

ஸினல் ஸ்கின்சோப்” இவைகளில் யாதே னும் ஒன்றால் சுத்தம் செய்துவிட்டுப் பிறகு பத்தின்மேல் நாள் 1 க்கு 1 தடவல் நன் றாய் அழுத்தித் தேய்த்து வைக்கவும். அல் லது பின் எழுதியிருக்கிற விதமாய்க் கழிம் பாகச் செய்து மேல் சொல்லிய ஸோப்புக் களில் யாதேனும் ஒன்றால் பத்தை முத லில் சுத்தம் செய்துகொண்டு நாள் 1 க்கு 1 தடவல் பத்தின்மேல் கழிம்பைக் கொஞ் சம், அழுத்தித் தேய்த்து வைத்திருந்து மறுபடியும் சோப்பு கொண்டு சுத்தம் செய்து வரவும். பத்து நீங்குகிறவரையும் உபயோகப்படுத்தி வரவும். பின்பு ரத்தம் சுத்தியாகும் பொருட்டு “நேச்சர்ஸ் எல்த் (h)

ரேஸ்டோமர்” என்னும் ரத்தசுத்தி அமெரி க்கா மாத்திரையையாவது, பர்காயின்ஸ் (b)(g)

அயோடைஸ்ட் ஸார்ஸ் பாரில்லா”, “கிளா (d) (d)

ரீக்ஸ் பிளட்மிக்சர்”. கிரிமால்ட்ஸ் ஸார்ஸ் (b) (d) (g)

பாரில்லா", ஸர் ஆஸ்ட்லி கூப்பர்ஸ்
ஸார்ஸ பாரில்லா" இவைகளில் யாதேனும்
ஒன்றை உள்ளுக்குக் கொடுத்து வாலாம்.
ஆனால் கொஞ்சகாலம் நீடித்துச் சாப்பிட
வேண்டும்.

அல்லது

"லைக்கர் ஆர்ஸனிக் காலிஸ்" இதில் தட
வல் 1 க்கு 2 துளியில் ஆம்பித்து இடை
இடையே விட்டு விட்டு தடவல் 1 க்கு 8
துளி வரும்வரை நாள் ஒன்றுக்கு 3 தடவல்
1 அவுன்ஸ் தண்ணீரில் கலந்து ஆகாரத்
துக்குப் பின் சாப்பிடவும்.

அல்லது

"டோனோவான்ஸ் ஸொலியூஷன்" இதில்
(d)

தடவல் 1 க்கு 5 துளி 1 அவுன் தண்ணீரில்
சேர்த்து நாள் 1 க்கு 3 தடவல் ஆகாரத்துக்
குப் பின் சாப்பிடவும்.

ஆஸிட் ஸாஸிஸிலிக் கிரைன் 10

(d)

ஆஸிட் போரிக் கிரைன் 30

(d) (b)

ஆஸிட் ஆஸிட்டிக் துளி 10

(d)

ஆஸிட் கார்பானிக் துளி 10

(d) (b)

வாஸலைன் அவுன்ஸ் 1

ஒன்றுசேர்

கழிம்பாகச் செய்து கொள்ளவும்.

குறிப்பு:—இந்தக்கழிம்பை கண்டத்திற்கு மேலுள்ள பத்தில்

போடக்கூடாது.

முகத்திலுள்ள பத்துக்குப் போட:—

எடுத்துக்கொள்

கால்லனல், அல்லது காலால் அவுன்ஸ் $\frac{1}{2}$

(g)

(g)

வாஸலைன்

அவுன்ஸ் 1

ஒன்றுசேர்

கழிம்பாகச் செய்துகொண்டு முகத்திலுள்ள பத்தை முதலில் போராக்ஸ். ஸோப், 1

(b)

கொண்டு சுத்தம் செய்துவிட்டு கழிம்பில் கொஞ்சம் எடுத்து நாள் 1க்கு 1 தடவல் தடவிவரவும். இதற்கு எரிச்சல் கிடையாது. விஷமானதும் அல்ல வெனத் தீர்மானிக்கிறார்கள்.

(61) சின்கோனா. கார்ட்டெக்ஸ்

கோயினாப்பட்டை

இதிலிருந்துதான் “கோயினன்” எடுக்கப் படுகிறது.

குணம்:— (1) ஆன்டி. பைரேட்டிக் (2) ஆன்டி. பீரியாடிக்
(d)

(3) டானிக்

(1) டிஞ்சர். சின்கோனா. கோ

அளவு:—30 முதல் 60 துளி

உபயோகம்:— (1) தேகத்தில், காய்ச்சல் சூட்டைத் தணிக்க:—

எடுத்துக்கொள்

டிஞ்சர், சின் கோளு. கோ	துளி 60
ஸ்பிரிட். ஈதர். நைட்ரோஸி.	துளி 60
ஸிரப். ஆரன்டி.	டிபாம். 1½
ஆக்குவா. சேர்ந்து	அவுன்ஸ் 3
	ஒன்றுசேர்

மிக்சர் செய்

தடவல் 1 க்கு 1 அவுன்ஸ் வீதம் நாள் 1 க்கு 3 தடவல் கொடுக்கவும்.

(2) காய்ச்சல் குணமானபின், கதகதப்பையும், பசியின்மையையும், களைப்பையும் மாற்ற:—

எடுத்துக்கொள்

டிஞ்சர். சின் கோளு. கோ	துளி 40
ஆஸிட் நைட்ரோ ஐட்ரோ குளோரிக் டில்	
(d) (h)(d)	(a)
	துளி 15
டிஞ்சர். நக்ஸ்வாமிக்கா	துளி 15
ஸிரப். ஆரன்டி	டிபாம் 1½
	(d)
ஆக்குவா. சேர்ந்து.	அவுன்ஸ் 3
	ஒன்றுசேர்

மிக்சர் செய்

தடவல் 1 க்கு 1 அவுன்ஸ் வீதம் நாள் 1 க்கு 3 தடவல் ஆகாரத்துக்குப் பின் கொடுக்கவும்.

(62) சின்னமன் பார்க்

(b)

கருவாப்பட்டை

(1) ஓலியம் சின்னமன்.

சின்னமன் ஆயில்=(கருவாப்பட்டைத் தைலம்)

இது தண்ணீரைக் காட்டிலும் கனமுள்ளது.

குணம்:— (1) ஸ்டமக்கிக் (2) கார்மி னேட்டிவ்

அளவு:— $\frac{1}{2}$ முதல் 3 துளி கொஞ்சம் சீனியில் கலந்தாவது
அல்லது “கம் அக்கேஷியா” வுடன் தண்
(g)

னீர்விட்டு அரைத்தாவது கொடுக்கலாம்.

மண்டை இடிக்கு மேல் தடவலாம்.

(2) டிஞ்சர் சின்னமன்.

அளவு:— $\frac{1}{2}$ முதல் 1 டிராம்உபயோகம்:—சிறு குழந்தைகளுக்கு வயிற்று வலிக்கு தட
வல் 1 க்கு 5 துளி கொஞ்சம் சீனியில் கல
ந்து கொடுக்கவும்.

(63) கொடினா.

(d)

இது “அபினிலிருந்தாவது,” அல்லது “மார்
ஸ்பனி லிருந்தாவது,” எடுக்கப்படுகிற வெண்

(f)

மையான கட்டி

அளவு:— $\frac{1}{4}$ முதல் 2 கிரான்.

உபயோகம்:—இதை நீரழிவுக்காரர்களுக்கு மலத்தைக் கட்டாமல், நீரில் இருக்கிற சீனியின் அளவைக் குறைப்பதற்காக மாத்திரைகளாகச் செய்து கொடுக்கப்படுகிறது.

கோடினா மாத்திரை செய்யும் விதம்:—

எடுத்துக்கொள்

கோடினா	கிரான் 3
எக்ஸ்ட்ராக்ட் நக்ஸ்வாமிக்கா	கிரான் 3
எக்ஸ்ட்ராக்ட் ஜென்ஷன்	கிரான் 24
	ஒன்றுசேர்

முதலில் “கோடினாவை சிலாப்பில்போல (b)

ஸ்கத்தியால் நன்றாய்த் தூளாக்கிக்கொண்டு பிறகு மற்ற இரண்டு மருந்துகளோடும் நன்றாய் ஒன்று சேர்த்துக் கொண்டு 12 மாத்திரைகளாகப் பிரித்துக்கொண்டு நாள் 1 க்கு 3 மாத்திரைகள் ஆகாரத்துக்குப் பின் கொடுக்கவும்.

குறிப்பு:— “எக்ஸ்ட்ராக்ட் ஜென்ஷன்” இதற்குப் பதில் “எக்ஸ்ட்ராக்ட் கால்காரா ஸாக்ரடா” (g) (d)

இதை மேல்படி “கோடினா” மாத்திரை ஒவ் (d)

வொன்றிலும் 2 கிரான் சேர்த்துக் கொள்ளலாம்.

(64) கால்ச்சிஸி.

(1) வைனம் கால்ச்சிஸி

குணம்:—(1) டயூரெட்டிக் (2) பர்கட்டிவ்

(d)

(g)

அளவு:—10 முதல் 30 துளி

உபயோகம்:—இதை, பெருவிரல்கள் போன்ற சிறுகண்களில் உண்டாகிற 'கவுட்' என்னும் வாத

(g)

ரோகத்திற்கு உபயோகப்படுத்தலாம்.

மேல்படி வியாதிக்கு:—

எடுத்துக்கொள்

வைனம் கால்ச்சிஸி

துளி 30

ஸோடா ஸாலிஸில்ஸ்

ஈரைன் 30

(d)

டிஞ்சர் ஜென்ஷன் கோ

துளி 45

ஸ்பிரிட் குளோரோபார்ம்

துளி 30

(f)

ஆக்குவா சேர்ந்து அவுன்ஸ்

3

ஒன்றுசேர்

மிக்சர் செய்

தடவல் 1 க்கு 1 அவுன்ஸ் வீதம் நாள் 1 க்கு

3 தடவல் கொடுக்கவும்.

மேல்படி வியாதியஸ்தர்களுக்கு மலமும் வெ

ளியாக:—இரவில் படுக்கைக்குப் போகும்

போது 4 ஈரைன் "பளுபில்" கொடுத்து

(b)

மறுநாள் 3 தடவல் பின் எழுதுகிற மிக்சர்

ரைக் கொடுத்து மதுநாள் முதல் மிக்சர் மட்
டும் கொடுத்து வரவும் மலம் ஒழுங்காய்
வெளியாகாமல் இருந்தால் மட்டும் இடை
இடையே இரவில் 4 கிரான் 'புளூபில்'
(b)

கொடுத்து வரவும்.

கவுட் என்னும், பெருவிரல்கள் போன்ற
(g)

சிறு கணுக்களில் உண்டாகிற வாதரோகத்
தில் மலம் வெளியாகவும், மேல்படி வியாதி
பைக் கண்டிக்கவும்:—

எடுத்துக்கொள்.

வைனம். கால்ச்சிஸி துளி. 30

எப்ஸம். ஸால்ட் டிராம் 3

மெக் நீஷியா. கார்ப் கிரான். 30

(g) (b)

ஆக்குவா. அனிஸி. சேர்ந்து. அவுன்ஸ். 3

ஒன்றுசேர்

மிக்சர்செய்

தடவல் 1 க்கு 1 அவுன்ஸ் வீதம் நாள் 1 க்கு
3 தடவல் கொடுக்கவும்.

(65) கோக்கா போலியா.

(f)

(1) எக்ஸ்ட்ராக்ட். கோக்கா, லிக்குவிட்.

(d)

குணம்:—டானிக்

அளவு:— $\frac{1}{2}$ முதல் 1 டிராம்

உபயோகம்:—இதை தாது பலயினத்தை மாற்றி, பலத்
தைக் கொடுக்க:—

எடுத்துக்கொள்

எக்ஸ்ட்ராக்ட். கோக்கா லிக்குவிட் துளி 60
(a)

எக்ஸ்ட்ராக்ட். டாமியானா. லிக்குவிட்.
(d) (d)

துளி, 60
டிஞ்சர். நக்ஸ்வாமிக்கா. துளி. 15

ஸ்பிரிட். குளோரோ பார்ம் துளி 30
(f)

ஆக்குவா. சேர்ந்து. அவுன்ஸ் 3
ஒன்றுசேர்

மிக்சர் செய்

தடவல் 1 க்கு 1 அவுன்ஸ் வீதம் நாள் 1 க்கு
3 தடவல் ஆகாரத்துக்குப் பின் சாப்பிடவும்.

அல்லது

இந்த மருந்தும் இன்னும் மற்ற மருந்துக
ளும் சேர்ந்திருக்கிற (1) டாமியானாடைன்
(d) (d)

(2) டாமியானா எலக்ஷியர் (3) பொலிவி
(d) (b)

யன் கோக்கா ஒயின் (4) ஆல்ஸ். கோக்கா
(b)

ஒயின். இவைகளில் யாதேனும் ஒன்றை
தாது பலத்தைக் கொடுக்க உபயோகப் படுத்
தலாம்.

(66) காலோ ஸிந்து பல்பு.

குமட்டிக்காய்

(1) எக்ஸ்ட்ராக்ட். காலோஸிந்து. காம்ப்வுண்ட்.

(d)

குணம்:—பர்கட்டிவ்

(g)

அளவு:—2 முதல் 8 கிரான்.

(2) பில். காலோஸிந்து. காம்ப்வுண்ட்.

(d)

குணம்:—பர்கட்டிவ்

(g)

அளவு:—4 முதல் 8 கிரான்.

உபயோகம்:—மலச்சிக்கலை நீக்க:—

எடுத்துக்கொள்

பில். காலோஸிந்து. காம்ப்வுண்ட். கிரான்

(d)

48

காலோமல்

கிரான் 12

ஒன்றுசேர்

I2 மாத்திரைகளாகப் பிரித்துக் கொண்டு. இரவில் படுக்கைக்குப் போகுட்போது திரேக நிலைமைக்கும், குடலின் தன்மைக்கும் தகுந்தபடி 1 அல்லது 2 மாத்திரை விழுங்கி அதன்மேல் பாலாவது, தண்ணீராவது குடிக்கவும். காலையில் மலம் வெளியாகும். ஆனால் இந்த மாத்திரையையே வெளிக்குப் போக வழக்கமாய் ஏற்படுத்திக் கொள்ளக் கூடாது. மூலவியாதி யுள்ளவர்கள் சாப் பிடக் கூடாது.

(3) பில். காலோஸிந்து. எற். அயோஸியாமி.

இதற்கு, மலம் வெளிப் போகும்போது,
வயிற்று வலியையாவது, பிசைதலையாவது
உண்டுபண்ணுகிற தூர்க்குணம் இல்லை.

குணம்:—பார்கட்டிவ்

அளவு:—4 முதல் 8 கிரான்

உபயோகம்:—கடுமையான மலச்சிக்கலை நீக்க:—

எடுத்துக்கொள்

பில் காலோஸிந்து எற் அயோஸியாமி

கிரான் 48

எக்ஸ்ட்ராக்ட். பெல்லடோனா விரிடி கிரான்

(b) (d) (d) 3

போடோபில்லம் ரெஸினா கிரான் 3

(f)

ஒன்றுசேர்

12 மாத்திரைகளாகப் பிரித்துக் கொண்டு
இரவில் படுக்கைக்குப் போகும்போது 1 மாத்
திரை விழுங்கவும். இந்த மாத்திரையையும்
மலம் வெளிப்போக வழக்கமாய் ஏற்படுத்திக்
கொள்ளக் கூடாது. மூலவியாதிக்காரர்களும்
உபயோகப்படுத்தக் கூடாது.

(67) கொப்பை பா

(b)

குங்கிலியம்

(1) ஒலியம் கொப்பை பா

(b)

இது 'கோப்பை பா' விலிருந்து எடுக்கப் படுகிற வெளிரின் மஞ்சள் நிறமுள்ள குங்கிலிய வாடையுள்ள எண்ணெய்.

அளவு:—5 முதல் 20 துளி (கம் அக்கேஷியா. சேர்த்து (g)

அரைத்துக் கொடுக்கவும்.

உபயோகம்:—இதை, மேகம் கடுப்பு முதலியவைகளுக்கு கொடுக்கலாம்.

மேகம் கடுப்புக்குக் கொடுக்க:—
எடுத்துக்கொள்

கம் அக்கேஷியா கிரான் 30

ஒலியம். கொப்பைபா துளி 30

(b)

ஒலியம். கியூபெப் துளி 10

(b)(b)

லைக்கர். பொட்டாஸ் துளி 45

டிஞ்சர். அயோசியாமஸ் துளி 45

ஸ்பிரிட். ஈதர். ரைட்ரோஸி துளி 45

ஆக்குவா. சேர்ந்து அவுன்ஸ் 3

ஒன்றுசேர்

மிக்சர்செய்

தடவல் 1 க்கு 1 அவுன்ஸ் வீதம் நாள் 1க்கு
3 தடவல் கொடுக்கவும்.

குறிப்பு:— (1) மேல் காட்டிய. "கோப்பை பா. மிக்சர், ' (b)

செய்யும் விதத்தைப்பற்றி இப்புஸ்தகத்தின்
3 வது பாகத்தின் முதல் பிரிவில் எழுதி
யிருப்பதைக் கவனித்துக் கொள்ளவும்.

(2) “ஓலியம் கோப்பைபா” வுக்குப் பதிலாக

(b)

“பால்ஸம். கோப்பை பா” வை தடவல்

(b)

(b)

1 க்கு 10 துளி சேர்த்துக் கொள்ளலாம்.

(3) “கோப்பை பா. மிக்சரை” மேக வியா

(b)

தியின் ஆரம்பத்தில் கொடுக்கக்கூடாது. தட

வல் 1 க்கு ஓலியம் “கோப்பை பாவை”

30 துளிக்குமேல் கொடுக்கக்கூடாது. கோப்

பைபா. மிக்சர்” முதலில் மேகத்தை அதிகப்

(b)

படுத்தித்தான் பின்பு நிறுத்தும் என்றும்

தீர்மானிக்கிறார்கள்.

(68) கிரியா ஸோட்

இதற்கு “சிரட்டைத் தைலம்” என்று

பெயர் வழங்கி வருகிறது. இது வெளிரின

மஞ்சள் நிறமுள்ள எண்ணெய் போன்ற

திராவகம்.

குணம்:— (1) ஆன்டி. ஸெப்டிக், (2) ஸ்டெட்டிவ் (3) ஆஸ்.

டிரிஞ்சேன்ஸ் (உள்ளுக்குக் கொடுத்தால்)

ஸ்டிப்டிக் (வெளிப்பிரயோகத்தில்)

அளவு:—1 முதல் 5 துளி (ரொட்டிப்பசையோடு சேர்த்து

மாத்திரைகளாகச் செய்தாவது, அல்லது

பின் எழுதுகிறவிதமாய் மிக்சர் செய்தாவது

கொடுக்கலாம்).

உபயோகம்:—(1) வெளிப்பிரயோகமாக, பல் சொத்தையாகி பல்லில் குழி விழுந்து வேதனை, குடைச்சல் இருந்தால் ஒரு குச்சியில் கொஞ்சம் பஞ்சு சுற்றி முக்கி பல்குழிக்குள் 1 துளி விடவும்.

(2) ஒயர்மல் உண்டாகிற வார்தியை நிறுத்த:—

எடுத்துக்கொள்

கிரியா ஸோட்

துளி 6

(Bread Crumb) = ரொட்டிப்பசை போது

மான அளவு

ஒன்று சேர்

6 மாத்திரைகளாகச் செய்து கொண்டு 3, அல்லது 4 மணிக்கொரு தடவல் 1 மாத் திரை கொடுக்கவும்.

அல்லது.

(3) வயிற்றுவலி, குமட்டல், வார்தி, மசக் கை வார்தி, வயிற்றில் உண்டாகும் புளிப்பு இவைகளை நிறுத்த:—

எடுத்துக்கொள்.

கிரியா ஸோட்

துளி 3

ஸ்பிரிட். ஜூனிப்பர்

துளி 3

ஸிரப் ஸிம்பிள்

துளி 90

ஆக்குவா சேர்ந்து

அவுன்ஸ் 3

ஒன்றுசேர்

மிக்சர் செய்

தடவல் 1 க்கு 1 அவுன்ஸ் வீதம் நாள் 1 க்கு 3 தடவல் கொடுக்கவும்.

(4) நாள்பட்ட இருமல், சூயம், காசம் இவைகளுக்கு இந்த மருந்து சேர்ந்திருக்கிற

(1) “கிரியாஸோட் டேட் எமல்ஷன் காட்

(d)

(d)

லிவர் ஆயில்,”

(2) “கிரீம் ஆப் மால்ட் காட்லிவர் ஆயில்

(f)

(d)

லித் ஐப் போ பாஸ்பைட் ஆன்ட் கிரியா

(h)

(f)

(f)

(d)

ஸோட்.”

இவைகளில் யாதேனும் ஒன்றில் தடவல்

1 க்கு 1 தேக்காண்டி, 2 அவுன்ஸ் சுடுகிற

பசும்பாலில் கலக்கி நாள் 1 க்கு 2 அல்லது

3 தடவல் கொடுக்கலாம்.

(69) கிரீட்டா பிரிப்பரேட்டா

பிரிப்பர்ட் கூடாக்

(d)

சுத்திசெய்த சாக்கட்டித்தூள்.

குணம்:—(1) ஆஸ்டிரிஞ் சேன்ற் (2) அன்டாஸிட்

(d)

அளவு:—10 முதல் 60 கிரான்

உபயோகம்:—(1) இதை வெளிப் பிரயோகமாகப் பல் ஈரு

களிலிருந்து ரத்தம் வரும்போது பல் தேய்

க்க:—

எடுத்துக்கொள்

கிரீட்டா பிரிப்பரேட்டா

அவுன்ஸ் ½

பல்விஸ் கைநோ. கோ

டிராம் 1

ஒன்றுசேர்

இதில் கொஞ்சம் எடுத்துக் காலையில் பல்

தேய்த்து வாவும்.

(2) உள்ளுக்குக் கொடுத்து வயிற்றோட்
டத்தை நிறுத்த:—

எடுத்துக்கொள்

கம். அக்கேஷியா. கிரான் 30

(g)

கிரிட்டா பிரிப்பரேட்டா. கிரான் 45

(சுகர் என்றால் சீனி) சுகர் கிரான் 60

(sh)

ஒலியம் ஸின்னமன் துளி 3

ஆக்குவா சேர்ந்து அவுன்ஸ் 3

ஒன்றுசேர்

மிக்சர்செய்

தடவல் 1 க்கு 1 அவுன்ஸ் வீதம் ஒவ்வொரு
தடவலும் மருந்தை நன்றாய்க் குலுக்கிக்
கொண்டு 4 மணிக்கொரு தடவல் கொடுக்க
வும்.

(1) பல்விஸ் கிரிட்டா அரோமேட்டிக்

குணம்:—ஆஸ்டிரிஞ் சேன்ற்

அளவு:—10 முதல் 60 கிரான்

உபயோகம்:—இதை, சிறு குழந்தைகளுக்கு வயிற்றோட்டத்
தை நிறுத்தக் கொடுக்கலாம்.

(3) பல்விஸ் கிரிட்டா அரோமேட்டிக் கம் ஒப்பியம்.

40 கிரான் மருந்தில் 1 கிரான் “அபின்”
சேர்ந்திருக்கிறது.

குணம்:—ஆஸ்டிரிஞ்சேன்ற்

அளவு:—10 முதல் 40 கிரான்

உபயோகம்:—இந்தப் பொடியில், “அபின்” மிகவும் குறைந்த அளவில் சேர்க்கிறுப்பதால், வயிற்றழைச்சல், வயிற்றோட்டம் இவைகளை நிறுத்த 1 வயசுக்கு மேற்பட்ட குழந்தைகளுக்கு “அபின்” சேர்ந்த மருந்து கொடுக்க வேண்டிய சந்தர்ப்பத்தில் இதை உபயோகப்படுத்தலாம்.

(70) குரோட்டன் ஆயில்

நேர்வாள எண்ணெய்

குணம்:—ஐடரகாக்

(h)(d) (g)

அளவு:— $\frac{1}{2}$ முதல் 1 துளி (ரொட்டிப்பசையில் சேர்த்து மாத்திரையாகச் செய்தாவது, அல்லது கொஞ்சம் சீனியில் கலந்தாவது கொடுக்கவும்.)

உபயோகம்:—மருந்து கொடுத்து 1 அல்லது, 2 மணி நேரத்துக்குள்ளாக தண்ணீராய் மலத்தைப் போக்கக் கூடியது.

குறிப்பு:—மற்றப் பேதி மருந்து கொடுத்து மலம் வெளியாகாத சமயத்திலும், காலதாமசப்படாமல் அதிக அளவாமாய் மலம் வெளியாக வேண்டிய தருணத்திலும் இந்த மருந்தை உபயோகிக்க வேண்டும்.

(71) கியூபெப்

(b)(b)

வால்மிளகு

குணம்:—(1) டயூரேட்டிக் (2) எக்ஸ் பெக்டோ ரென்ற்.

அளவு:—30 முதல் 60 கிரான் (தூள் பண்ணிக் கொடுக்கவும்)

உபயோகம்:—இதை, மேக வியாதிக்குக் கொடுக்க:—
எடுத்துக்கொள்

பல்விஸ். கியூபெப் = (வால்மிளகுத் தூள்.

கிரான் 30

பொட்டாஸ். நைட்ரைஸ். கிரான் 10

ஓலியம். கொப்பைபா. துளி 15

ஒன்றுசேர்

குழம்புபோல் குழப்பி இதை ஒரே தடவலா
கச் சாப்பிடவும் இப்படி நாள் I க்கு 3 தட
வல் சாப்பிடவும்.

(1) ஓலியம். கியூபெப் = (வால்மிளகு எண்ணெய்).

(b)(b)

குணம்:—வால் மிளகுக்குள்ளது.

அளவு:—5 முதல் 20 துளி ("கம். அக்கோஷியா"வுடன்
சேர்த்து அரைத்துக் கொடுக்கவும்).

(72) காப்பர் ஸல்பேட்

(f)

மயில் துத்தம்

குணம்:—(1) எம்ட்டிக் (2) டானிக் (3) ஆஸ்டிரிஞ்சென்ற்
(4) காஸ்ட்டிக்.

அளவு:— $\frac{1}{2}$ முதல் 2 கிரான் (மாத்திரையாகச் செய்து கொடுக்கவும்) 5 முதல் 10 கிரான் (வாந்தி உண்டு பண்ண)

உபயோகம்:—(1) வாந்தி உண்டாக்கி, விஷமான மருந்துகளை அதிக அளவில் சாப்பிட்ட சமயத்தில் அந்த மருந்துகளை வெளியாக்க, 1 தமிழர் இளஞ் சூடான தண்ணீரில் 10 கிரான் கரைத்துக் கொடுக்கலாம்.

(2) நாள்பட்ட வயிற்றோட்டத்திற்கு $\frac{1}{2}$ கிரான் வீதம், மாத்திரையாகச் செய்து கொடுக்கலாம்.

(3) கோழைச் சதையின் மேலும், காண் வைத்திருக்கிற புண்ணின் மேலும், தண்ணீரில் முக்கித் தடவினால், கோழைச் சதை காண் கரையும்.

(4) 1 அவுன்ஸ் தண்ணீரில் 3 கிரான் வீதம் கரைத்து நாள்பட்ட மேகத்திற்கும், பெண்களுக்கு வெள்ளைப் பிரமேகத்திற்கும் சிரிஞ்சு பண்ணலாம்.

(5) கண் வலியில், கண் இமைகள் வீங்கியிருந்தால் “காஸ்டிக் ஸோலியூஷன்” “நம்பர் 4 அல்லது 5” இவைகளுக்குப் பதிலாக உபயோகப் படுத்தலாம்.

குறிப்பு:—“காஸ்டிக் ஸோலியூஷன்” நம்பர் 4 அல்லது 5” இவைகள் என்ன வென்று தெரிந்துகொள்ள இப்புஸ்தகத்தின் மூன்றாவது பாகத்தின் முதல் பிரிவில் கவனித்துக் கொள்ளவும்.

(73) கார்ல்ஸ் பேட். வால்ட்

(b)(d)

இதை பித்தாசயத்திலும் (Lever,) மூத்தி
ரக்காய்களிலும் (Kidneys) வியாதி கண்டி-
ருக்கும்போதும், வாதரோகத்திலும், “கவுட்”

(g)

என்னும் வாதரோகத்திலும் மலம் வெளி-
யாக, 1 தமிழர் தண்ணீரில் 2 தேக்கரண்டி.
கலக்கிக் கொடுக்கலாம்.

(74) டிஜிடாலிஸ். போலியா

(d)

(f)

டிஜிடாலிஸ். இலைகள்.

குணம்:—(1) கார்டியக். டானிக்=என்றால் இருதயத்தைப்
(d)

பலப்படுத்தி அதன் நடையையும் கிரமம்
படுத்துகிற மருந்து.

(2) டயுரேட்டிக்

(d)

அளவு:— $\frac{1}{2}$ முதல் 2 கிரான் (இலைகளைத் தூளாக்கிக் கொடுக்
கவும்)

(1) இன்பியூஷன். டிஜிடாலிஸ்

(f)

(d)

டிஜிடாலிஸ் இலைக்கஷாயம்

செய்யும் விதம்:—1 டிராம். டிஜிடாலிஸ். இலையில், 20 அவு-
ன்ஸ் கொதிக்கிற தண்ணீரை ஊற்றி $\frac{1}{2}$ மணி
நேரம் மூடிவைத்திருந்து பின்பு வடிகட்டிக்
கொள்ளவும்.

குணம்:—டிஜிடாலிஸ் இலைக்குள்ளது.

(d)

அளவு:— $\frac{1}{2}$ முதல் $\frac{1}{2}$ அவுன்ஸ்.

(2) டிஞ்சர். டிஜிடாலிஸ்.

(d)

குணம்:—டிஜிடாலிஸ் இலைக்குள்ளது.

அளவு:—5 முதல் 15 துளி

உபயோகம்:—(1) சம்பாகம் “டிஞ்சர். டிஜிடாலிஸ்,”

“டிஞ்சர். பெரை பெர்க்குளோரைட்.”

இந்த இரண்டும் ஒன்றுசேர்த்து கைகால் ஸிக்கம், சுரப்பு, ரத்தம் கன்னல் இவைகளுக்கு மேல் தடவலாம்.

(2) உள்ளுக்குக் கொடுத்தால் இருதயவியாதியைக் கண்டித்து, இருதயத்தின் நடையைக் கிரமப்படுத்தும். ரீரையும் பிரிக்கும்.

இருதயவியாதிக்குக் கொடுக்க.

எடுத்துக்கொள்

டிஞ்சர். டிஜிடாலிஸ்.

துளி 15

(d)

லைக்கர். பெரை. பெர்க்குளோரைட்.

(f)

(d)

துளி 15

ஆஸிட். பாஸ்பாரிக். டி.ல்.

துளி 15

(d) (f) (f) (d)

ஸிரப். ஸிம்பிள்.

டிசரம் $1\frac{1}{2}$.

இன்பியூஷன். குவாஷியா. சேர்ந்து

(f)

அவுன்ஸ் $1\frac{1}{2}$

ஒன்று சேர்

மிக்சர் செய்

தடவல் 1 க்கு $\frac{1}{2}$ அவுன்ஸ் வீதம் நாள்
1 க்கு 3 தடவல் ஆகாத்திற்குப் பின்
கொடுக்கவும்.

குறிப்பு:—“டிஞ்சர். டிஜிடாலிஸ்” கொடுத்து வரும்போது
(d)

இடை இடையே இருதயத்தைச் சோதித்
துக் கொண்டு கொடுத்து வரவும்.

(75) டயூரெட்டின்

(d)

இதை எவ்விதமான வீக்கத்திலும் நீர்ப்பிரிய
தடவல் 1-க்கு 15 கிரான் வீதம் நாள் 1-
க்கு 3 அல்லது 4 தடவல் 1 அவுன்ஸ் தண்
ணீரில் கரைத்துக் கொடுக்கவும். “டிஜிடா
(d)

லிஸ்” “காபின்ஸிட்ரஸ்,” இவைகள் கொ
(f)

டுத்தும் நீர்ப்பிரியாத சந்தர்ப்பத்தில் இதைக்
கொடுத்தால் நீர்ப்பிரியும்.

(76) டியோட்டால்

(d)

அல்லது

“குவாக்கல். கார்போனேட்”

(g)

(d)

இது தண்ணீரில் கரையக்கூடியதுள். இதை
முக்கியமாய் க்ஷயரோகிகளுக்கு உண்டாகிற
இருமல், வேர்வை, காய்ச்சல் இவைகளுக்
கும், கபசம்பந்தமான வியாதிகளைக் குண

மாக்கவும், தடவல் 1 க்கு 5 கிரான் வீதம்
நாள் 1 க்கு 3 அல்லது 4 தடவல் கொடுக்க
லாம்.

(77) டெர்மட்டால்

(d)

இது வீச்சமில்லாததும், விஷமில்லாததும்,
எரிச்சல் இல்லாததுமான, மஞ்சள் நிற
முள்ள தூள்.

இதை “அயோடபார்” த்துக்குப் பதிலாக
(d)

உபயோகப்படுத்தலாம்.

(78) எர்காட்

(g)

(1) எக்ஸ். ட்ராக்ட். எர்காட். லிக்குவிட்

(g)

(d)

குணம்:—எம்மனகாக்

(g)

அளவு:—10 முதல் 30 துளி (1-அவுன்ஸ் தண்ணீரில் சேர்த்
துக் கொடுக்கவும்)

உபயோகம்:—(1) சூதகம் கட்டுப்பட்டிருந்தாலும் சரியான
அளவில் பட்ராமலிருந்தாலும் சூதகத்தை
ஒழுங்கு பண்ண:—

எடுத்துக்கொள்

எக்ஸ்ட்ராக்ட் எர்காட் லிக்குவிட் துளி 60

(g)

(d)

லைக்கர். ஸ்டிரிக்னைன். ஐட்ரோ. குளோரைட்

(h)(d)

(d)

துளி. 8

ஸ்பிரிட் குளோரோ பார்ம்	துளி 30
(f)	
ஆக்குவா. சேர்ந்து	அவுன்ஸ் 3
	ஒன்றுசேர்

மிக்சர்செய்

தடவல் 1 க்கு 1 அவுன்ஸ் வீதம், நாள் 1 க்கு 3 தடவல் ஆகாரத்துக்கும் பின் கொடுக்கவும்.

(2) கரு அழிவு (Abortion) ஏற்பட்டால்

அந்தச் சமயம் கருக்குழியிலுள்ள கசடு நீங்க:—

எடுத்துக்கொள்

எக்ஸ். ட்ராக்ட். எர்காட் லிக்குவிட் டிராம் 2	
(g)	(d)
டிஞ்சர். ஜிஞ்சிபெரிஸ்	டிராம் 2
(b)	
ஸ்பிரிட். அமோனியா. அரோமேட்டிக்	
	டிராம் 1
ஸ்பிரிட். குளோரோ பார்ம்	துளி 30
(f)	
ஆக்குவா. சேர்ந்து	அவுன்ஸ் 4
	ஒன்று சேர்

மிக்சர்செய்

தடவல் 1-க்கு 1 அவுன்ஸ் வீதம் 2 அல்லது 3-மணி நேரத்துக்கொரு தடவல் கொடுக்கவும்.

பிறகு கருக்குழியின் வலி, வேதனை நிற்க:—

எடுத்துக்கொள்

லைக்கர். ஸெடான்ஸ்.

துளி 90

(d)

ஆக்குவா, சேர்ந்து

அவுன்ஸ் 3
ஒன்றுசேர்

மிக்கர் செய்

தடவல் 1 க்கு 1-அவுன்ஸ் வீதம் நாள் 1க்கு
3-தடவல் ஆகாரத்துக்குப்பின் கொடுக்கவும்.
இந்தமருந்தை 2 வாரம் கொடுத்து

பிறகு

“ அலெட்ரிஸ் கார்டியல் ” என்னும் மருந்

(d)

தில் தடவல் 1-க்கு 1 தேக்காண்டி $\frac{1}{2}$ -அவுன்ஸ் வெந்ரீரில் சேர்த்து நாள் 1-க்கு 3-தடவல் ஆகாரத்துக்குப்பின் கொடுக்கவும்.
இந்த மருந்தை 2, 3, மாதம் கொடுத்து
வாவும்.

(79) யுக்காலிப்டஸ் ஆயில்

இது வெளிநீர் மஞ்சள் நிறமான ஒருவித
காரமான வாசனையுள்ள எண்ணெய்.

குணம்:—ஆன்டி. ஸெப்டிக்

அளவு:— $\frac{1}{2}$ முதல் 3 துளி

உபயோகம்:—மண்டை இடிக்கு மேல் தடவலாம். ஜலதோஷத்திற்குக் கைக் குட்டையில் 10-துளி போட்டு முகர்ந்து பார்க்கலாம். கால்ராக் காலத்தில் கைக்குட்டை, உடுப்பு முதலியவைகளில் 10 துளி போட்டுக்கொள்ளலாம்.

நெஞ்சில் கபம் கட்டியிருந்தால், கபத்தை இளக்க சம்பாகம் “டர்ப்பன்டைன்” வோடு சேர்த்து குலுக்கிக் கொண்டு மார்பிலும், விலாவிலும், முதுகிலும் தேய்த்து, கோதுமைத்தவிடு வறுத்து ஒத்தடம் 4-மணிக் கொழு தடவல் கொடுக்கலாம்.

காலராக்காலங்களில், வீடுகளில் பல இடங்களிலும் தெளித்து வைத்தால் விஷக்காற்றுப் பரவாமல் தடுக்கும்.

(80) யூக்கொய்னைன்

இது கசப்பில்லாத “கோயினு.” இதை “கோயினுவை” உபயோகப்படுத்துகிற சந்தர்ப்பங்களில் அதற்குப்பதிலாக தடவல் 1-க்கு 4-கிரான் கொடுக்கவும்.

(a) இயோனியின்

இதற்கு “எக்ஸ்ட்ராக்ட்டம் இயோனியிஸிக்கம்” என்றும் பெயர்.

குணம்:—(1) கதார்ட்டிக் (2) கோலகாக்

(g)

அளவு:—1 முதல் 2 கிரான்.

உபயோகம்:—இதை நாஸ்பட்ட மலச்சிக்கலை நீக்கவும் பித்தத்தைக் கழிக்கவும் மாத்திரைகளாகச் செய்து கொடுக்கலாம்.



(81) பெர்ரம்—(அயர்ன்)

(f)

இரும்பு

(1) டேர்ரை. கார்போனஸ். ஸாக்ரடா

(f)

(b)

(g) (d)

இதற்கு 'அயச்சேந்தூரம்' எனப் பெயர் வழங்கிவருகிறது.

அளவு:—10 முதல் 30 கிரான்

உபயோகம்:—இதை ரத்தக்குறைவு, சோகை, காங்கை, தேகவாட்சி, பலயீனம் இவைகளைக் குணமாக்க உபயோகப் படுத்தலாம்.

(2) பெர்ரை. ஸெஸ்க்யூ. ஆக்ஸைட்

(f)

(d)

இதற்கு "அயகாந்த சேந்தூரம்" எனப் பெயர் வழங்கிவருகிறது.

உபயோகம்:—இதையும், சோகை, ரத்தக்குறைவு, ரூதகப் பாண்டு, கதகதப்பு பலயீனம், இவைகளுக்கு தடவல் 1-க்கு 5 கிரான் கொடுக்கலாம்.

குறிப்பு:—(1) பொதுவாக இரும்புசேர்ந்த மருந்துகளை எல்லாம் சாப்பாட்டுக்குப் பின் கொடுக்கவேண்டும்.

(2) இரும்புசேர்ந்த மருந்துகள் கொடுக்கும் போது மலத்தைக்கட்டும், மலமும் கரும்பாய்ப் போகும். அதிகமாய் மலத்தைக் கட்டினால் தடவல் 1 க்கு 1-டிபாம். "கிளி

ஸரின் " என்னும் மருந்தைச் சேர்த்துக் கொடுக்கவும்.

பெர்ரை. எற். அமோனியா. ஸிட்ரஸ்

(f)

இது சிகப்பு நிறமுள்ள சிறு தகடு தகடான மருந்து.

அளவு:—2 முதல் 10-கிரான்.

உபயோகம்:—ரத்தக் குறைவு, சோகை, பலயீனம், இவை களுக்குக் கொடுக்க:—

எடுத்துக்கொள்

பெர்ரை. எற். அமோனியா ஸிட்ரஸ்.

கிரான் 10

டிஞ்சர். நக்ஸ்வாமிக்கா

துளி 15

ஆஸிட். நைட்ரோ. ஐட்ரோகுளோரிக் டில்.

(d)

(h)(d)

(a)

துளி 15

ஸிரப் ஸிம்பிள்

டிராம் 1½

இன்பிபூஷன். குவாஷிபா. சேர்ந்து.

(f)

அவுன்ஸ் 1½

ஒன்றுசேர்

மிக்சர்செய்

தடவல் 1 க்கு ½-அவுன்ஸ் வீதம் நாள் 1க்கு

3-தடவல் ஆகாரத்துக்குப்பின் கொடுக்கவும்.

(4) பெர்ரை எற் கொய்னைன் ஸிட்ரஸ்

(f)

இது பச்சைகலந்த மஞ்சள் நிறமுள்ள சிறு தகடு தகடான மருந்து

குணம்:—(1) எமாட்டினிக் (2) ஆன்டி. பீரியாடிக்
(h) (d)

அளவு:—5 முதல் 10 கிரான்.

உபயோகம்:—பலவித வியாதியால் உண்டாகிற ரத்தக் குறைவுக்கும், தாதுநரம்பு பலவீனத்தை மாற்றவும் முறை சுரத்தால் தேகத்தில் உண்டாகிற கத கதப்பைத் தணிக்கவும், பசி உண்டாகவும்:—

எடுத்துக்கொள்

பெர்ரை. எற். கொய்னைன். லிட்ரஸ்.

(f) கிரான் 10

லைக்கர். ஸ்டிரிக்னைன். ஐட்ரோ குளோரைட்
(h) (d) (d)

துளி 6

டிஞ்சர். கலம்பா துளி 45

ஸிரப். ஆரன்டி டிராம். 1½

ஆக்குவா சேர்ந்து அவுன்ஸ் 3

ஒன்றுசேர்

மிக்சர் செய்

தடவல் 1 க்கு 1 அவுன்ஸ் வீதம் நாள் 1க்கு

3 தடவல் ஆகாரத்துக்குப்பின் கொடுக்கவும்.

(5) ஸிரப். பெர்ரை. அயோடைட்.

(f) (d)(d)

அளவு:—30 முதல் 60 துளி

உபயோகம்:—இதை மேக சம்பந்தமான புண், வாதம், கண்டமாலை முதலிய தூர் நீர் வியாதிகளைக் குணமாக்க, தனிமையாகவாவது அல்லது 1 தேக்கரண்டி “டீ ஜான்ஸ். காட்” லீவர்.

(d) (d)

ஆயில்,” என்னும் மீன் எண்ணெயோடு, தடவல் 1க்கு 30 துளி சேர்த்து, 2 அவுன்ஸ் சுடுகிற பசும்பாலில் கலக்கி நாள் 1 க்கு 2 அல்லது 3 தடவல் ஆகாரம் சாப்பிட்டு 1 மணி நேரம் கழித்து சாப்பிடவும். இப்படிக் கொஞ்சகாலம் நீடித்துச் சாப்பிடவும், அல்லது

கெப்ளாஸ்- ஸோலியூஷன், ஆப். காட்

(f) (d)

லீவர். ஆயில். இன், மால்ட். எக்ஸ்ட்ராக்ட். வித். அயர்ன். அயோடைட்,” என்ற மீன் எண்ணெய்யில் தடவல் 1 க்கு 1 தேக்காண்டி ஷீதம் நாள் 1 க்கு 2 அல்லது 3 தடவல் சுடுகிற பசும்பாலில் கலக்கிச் சாப்பிடவும்.

(6) டிஞ்சர். டெர்ரை. பெர்க்குளோரைட்

(f)

(d)

அயத்திராவகம்

அளவு:—5 முதல் 15 துளி

உபயோகம்:—(1) இதை வெளிப்பிரயோகமாக சமபாகம்

“டிஞ்சர் டிஜிடாலிஸ்” என்னும் மருத் துடன் சேர்த்து, கை கால் வீக்கம் காப்பு, ரத்தம் கன்னல் இவைகளுக்கு மேல் தடவலாம்.

(2) உள்ளுக்கு, ரத்தக்குறைவு, சோகை, காங்கை, இவைகளைக் குணமாக்கத் தடவல் 1க்கு 5 துளி 1 அவுன்ஸ் தண்ணீரில் கலந்து நாள் 1 க்கு 2 அல்லது 3 தடவல் ஆகாரத் துக்குப் பின் கொடுக்கலாம்.

(3) தேகத்தில் ரத்தக் குறைவு, பசியின்மை, களைப்பு, நரம்பு, தாது பலயினத்தைமாற்ற:- எடுத்துக்கொள்

டிஞ்சர். பெர்ரை. பெர்க்குளோரைட்

(d)

துளி 15

லைக்கர். ஸ்டிரிக்னைன், ஐட்ரோகுளோரைட்

(h)(d)

(d)

துளி 6

ஆஸிட். நைட்ரோ. ஐட்ரோ குளோரிக்டில்

(d)

(h)(d)

(d)

துளி 15

ஸிரப். ஆரன்டி

டிராம் 1½

ஆக்குவா. சேர்ந்து

அவுன்ஸ் 3

ஒன்றுசேர்

மிக்சர்செய்

தடவல் 1 க்கு 1 அவுன்ஸ் வீதம் நாள் 1க்கு

3 தடவல் ஆகாரத்துக்குப் பின் கொடுக்கவும்.

(7) ஸிரப். பெர்ரை. பாஸ்பஸ். கம். கோய்னைன்.

(f)

(f)

(f)

எற். ஸ்டிரிக்னைன்.

இதற்கு “ஈஸ்டன்ஸ். ஸிரப்” என்றும்

பெயர்.

அளவு:—30 முதல் 60 துளி

உபயோகம்:—நரம்பு, தாது பலத்திற்கும், சோகையை

மாற்றி ரத்தம் ஊறச் செய்யவும், பசி உண்

டாக்கவும், பெண்களுக்கு மாத விடாய் சரி

யானபடி ஒழுங்காய் காணும்படி செய்யவும்.
தடவல் 1 க்கு 30 துளி 1 அவுன்ஸ் தண்ணீ
ரில் கலந்து நாள் 1 க்கு 2 அல்லது 3 தடவல்
ஆகாரத்துக்குப் பின் கொடுக்கவும்.

அல்லது

‘ஆலன். ஆன்ட். ஆன்பரிஸ்’ கம்பெனியில்

(d) (h) (b)

செய்யப்படுகிற மேல் எழுதி இருக்கிற மருந்
துக்கு “பைனின். அமரா” என்று பெயர்

(b)

இந்த மருந்தில் தடவல் 1 க்கு 1 தேக்கர
ண்டி 1 அவுன்ஸ் தண்ணீரில் கலந்து நாள்
1 க்கு 3 தடவல் ஆகாரத்துக்குப் பின்
கொடுக்கலாம்.

(8) பெர்ரை. ஸல்பஸ்

(f)

(f)

அன்னவதி

குணம்:—(1) எம்மனகாக் (2) ஆஸ். டிரிஞ்சென்ற் (3) டா
னிக் g)

அளவு:—1 முதல் 5 கிரான்.

உபயோகம்:—ரத்தக் குறைவால், மாதவிடாய் காணாமல்
இருப்பதற்கும், சூதகக்கட்டுப் பாட்டை
நீக்கவும்.

எடுத்துக்கொள்

“பிளாட்ஸ். பில்”

(b)

செய்யும் விதம்:—

பெர்ரை. ஸல்பஸ். கிரைன் 30

(f) (f)

பொட்டாஸ். கார்ப். கிரைன் 30

(b)

முதலில் “பெர்ரை. ஸல்ப”வை நொறுக்கி

(f) (f)

நன்றாய்த் தூளாக்கிக்கொண்டு பிறகு ‘ஸிலாப்’-ல் ‘போலஸ்’ கத்தியால் ‘பொட்டாஸ்

(b)

கார்ப்’ பை ஒன்றாய்ச்சேர்த்து தேய்த்தால் தண்ணீர்போலாகும். நன்றாய் அழுத்தித் தேய்த்துக்கொண்டே இருந்தால் கழிம்பு போல் திரண்டு மாத்திரையாக உருட்டும் பக்குவத்துக்கு வந்தவுடன் 12 மாத்திரைகளாகப் பிரித்துக்கொள்ளவும். இதில் நாள் 1 க்கு 2 மாத்திரைகள் ஆகாரத்துக்குப் பின் கொடுக்கவும்.

அல்லது

“ஓப்பன். ஈமர்ஸ்,” பிளாட்ஸ். பில் பைபா

(b) (b)

(b)

லட்டிஞய்ட்ஸ்” என்ற மாத்திரைகளில்

(d)

தடவல் 1 க்கு 1 மாத்திரை கொடுத்து அதன் மேல் “வாலென்டைன்ஸ், மீட். ஜியூஸ்”, என்னும் மருந்தில், 1 தேக்காண்டி அளவு எடுத்து 1½ அவுன்ஸ் இளஞ்சூடான தண்ணீரில் கரைத்து நாள் 1 க்கு 2 தடவல்

கொடுத்தால் பெண்களுக்கு ரத்தக் குறைவால் தேகம் வெளுத்துப்போய் சோகைக் குணம்போல் இருப்பதைமாற்றி தேகத்துக்கும் பலத்தைக் கொடுக்கும்.

(9) பெர்ரை, பாஸ்பஸ்.

(f) (f) (f)

குணம்:—டானிக்

உபயோகம்:—ரத்த விருத்திக்கும், தாதுபலத்திற்கும் கொடுக்க, “பெர்ரை பாஸ்பஸ்” சேர்ந்திருக்கிற

(f) (f) (f)

மருந்துகளாவன:—

(1) “ஈஸ்டன்ஸ். ஸீரப்”

(2) “பைனின். அமரா”

(b)

(3) “பைனோ. ஐப்போ. பாஸ்பைட்ஸ்”

(b) (h) (f) (f) (f)

(4) “கெமிக்கல். பூட்”

(f)(d)

(5) “பெர்ரோக்கால்,”

(f)

(6) “அக்ஸிலீஸ். நெர்விகர். ஸீரப். வித்

(h)

(g)

பார் மேட்ஸ்”

(f)

இவைகளில் யாதேனும் ஒன்றை உபயோகம் படுத்தலாம்.

(82) பெர்ராட்டின்.

(f)

இது வெருவாய் ரத்தத்தோடு கலந்து தேகத்துக்குப் போஷிப்பைக் கொடுக்கக்கூடிய 'அயர்ன்' சேர்ந்த மருந்து. இதை தடவல் 1 க்கு 10 கிரான் வீதம் பவுடராக நாள் 1 க்கு ஒரே தடவல் ஆகாரத்துக்குப்பின் கொடுக்கவும் எனத் தீர்மானிக்கிறார்கள்

(83) பெர்ரை பைரன்.

(1) இதை வெளிப்பிரயோகமாக:— மூக்கு, காது மத்தியபாகம், தொண்டை இவைகளிலிருந்து வரும் ரத்தத்தை நிறுத்த, 1 அவுன்ஸ் தண்ணீரில் 85 கிரான் கரைத்து மேல் தடவலாம். எரிச்சல் இராது என்றும்,

(2) உள்ளுக்கு:—ரத்தக் குறைவால் மாத விடாய் காணாமல் இருப்பதற்கும், மேகத்திற்கும், ரத்தவாந்திக்கும், வயிற்றோட்டத்திற்கும், ஆகிய இவைகளைக் குணமாக்க, 1 அவுன்ஸ் தண்ணீரில் 5 கிரான் வீதம் கரைத்துக் கொடுக்கலாமென்றும் தீர்மானிக்கிறார்கள்.

(84) ஜெல்ஸெமி. ரூட்.

(1) டிஞ்சர். ஜெல்ஸெமி

குணம்:—ஸேட்டிடிவ்

(d)

அளவு:—5 முதல் 15 துளி

உபயோகம்:—நாம்பு வேதனை, ஒருத்தலை இடி,

இவைகளுக்கு உள்ளுக்குக் கொடுக்க:—

எடுத்துக்கொள்

டிஞ்சர். ஜெல்ஸெமி.

துளி 15

பொட்டாஸ். புரோமைட்.

கிரான் 15

(b) (d)

ஸ்பிரிட். குளோரோபார்ம்.

துளி 30

(f)

ஆக்குவா. சேர்ந்து

அவுன்ஸ் 3

ஒன்றுசேர்

மிக்சர்செய்

தடவல் 1 க்கு 1 அவுன்ஸ் வீதம் நாள் 1க்கு

3 தடவல் ஆகாரத்துக்குப்பின் கொடுக்கவும்.

(85) ஜென்ஷன் ரூட்.

குணம்:—இது, வயிறு, குடல், முதலிய ஜீரணக் கருவிகளுக்குப் பலத்தைக் கொடுக்கக்கூடிய கசப் புள்ள வேர்.

(1) எக்ஸ்ட்ராக்ட், ஜென்ஷன்

குணம்:—ஜென்ஷன் ரூட்டுக்குள்ளது

அளவு:—2 முதல் 8 கிளைன்

உபயோகம்:—மற்ற மருந்துகளோடு சேர்த்து மாத்திரை யாகச் செய்ய, இது துணை மருந்தாய் இருக் கிறது.

(2) டிஞ்சர். ஜென்ஷன். கோ.

குணம்:— ஜென்ஷன் ரூட்டுக் குள்ளது

அளவு:— $\frac{1}{2}$ முதல் 1 டிராம்

உபயோகம்:—(1) கர்ப்பஸ்திரீகளுக்குக் குண்டாகிற மசக்கை வார்த்தியை நிறுத்தக் கொடுக்க நல்ல மருந்து. மேல்படி விபாதிக்குக் கொடுக்க:—

எடுத்துக்கொள்

டிஞ்சர். ஜென்ஷன். கோ டிராம் 1

ஆஸிட். ஐட்ரோ குளோரிக் டில் துளி 15

(d) (b)(d) (d)

ஆக்குவா. சேர்ந்து. அவுன்ஸ் 3

ஒன்று சேர்

மிக்சர்செய்

தடவல் 1 க்கு 1 அவுன்ஸ் வீதம் நாள் 1 க்கு 3 தடவல் கொடுக்கவும்.

(2) வார்தி, பசியின்மை, புனித்தேப்பம் அன்னத்துவேஷம் இவைகளுக்குக் கொடுக்க:—

எடுத்துக்கொள்

டிஞ்சர். ஜென்ஷன். கோ துளி 60

ஸோடா. பை. கார்ப் கிளைன் 30

(d) (b) (b)

ஆக்குவா. சேர்ந்து அவுன்ஸ் 3

ஒன்றுசேர்

மிக்சர் செய்

தடவல் 1 க்கு 1 அவுன்ஸ் வீதம் நாள் 1 க்கு 3 தடவல் ஆகாத்துக்குப் பின் கொடுக்கவும்.

(86) கிளிஸெரின்.

(g)

இது எண்ணெய் போன்ற, தித்திப்புள்ள, தெளிவான மருந்து.

குணம்:—டெமியூல். ஸென்ற்

(d)

அளவு:—1 முதல் 2 டிராம்

உபயோகம்:—(1) வெளிப் பிரயோகமாக, 'வேண்காரம்,' அல்லது 'போரிக். ஆஸிட்' இவைகளில் யா

(b)

(d)

தேனும் ஒன்றோடு சேர்த்துக் குழப்பி, உதடு வெடிப்பு, வாய்ப்புண், முதலானவைகளுக்கு மேல் தடவலாம்.

(2) நாள்பட்ட மலச்சிக்கலை நீக்க, 1 டிராம் "கிளிஸெரின்" இதை "ஸிரிஞ்சு" மூலமாய் ஆஸைத்திற்குள் ஸிரிஞ்சுபண்ணினால், மலம் வெளியாகும். ஆனால் ஸிரிஞ்சு பண்ணின அந்த நேரம் தான் மலம் வெளியாகுமே தவிர திரும்பவும் மலச்சிக்கல் உண்டாகாமல் தடுக்காது.

(3) காதுச்சவ்வுக்குள், வெளிச்சியாவது, ரணமாவது உண்டாகி குத்துவ லி டீ ரூப்டர்

எடுத்துக்கொள்

கிளிஸெரின்	அவுன்ஸ் 1
(g)	
போரிக். ஆஸிட்.	கிரான் 10
(b) (d)	
ஸோடா. பைகார்ப்.	கிரான் 10
(d) (b) (b)	

ஒன்றுசேர்

இவைகளை எல்லாம் 'டேஸ்ட். டியூப்பில் நன்றாய்க் கொதிக்கவைத்து, ஆறின பிறகு காதாக்குள் காலை, மாலை, 20 துளி விட்டுப் பஞ்சால் அடைத்து வைக்கவும்.

உள்ளுக்குக் கொடுக்க:—

(1) மூலத்தால் ரத்தம் போகிறதை நிறுத்த, தடவல் 1 க்கு 1 தேக்காண்டி ஷீதம் நாள் 1 க்கு 3 அல்லது 4 தடவல் கொடுக்கலாம்.

(2) நீரழிவுக்காரர்களுக்கு மற்ற மருந்துக ளோடு இனிப்புச்சேர்க்க இதைத் தடவல் 1-க்கு 1 டிராம் சேர்த்துக்கொள்ளலாம்.

(3) இரும்பு சேர்ந்த மருந்துகள் கொடுக் கும்போது மலத்தைக்கட்டாமல் இருக்க தடவல் 1-க்கு 1 டிராம் சேர்த்துக் கொள்ள லாம். சம்பாகம்: "டிஞ்சர் பெரை. பெர்க் (f)

குளோரைட்" கிளிஸெரின்" இந்த இரண் (d) (g)

டையும் ஒன்று சேர்த்து குச்சியில் பஞ்சு சுற்றி முக்கி தொண்டைக்குள் உள் நாக்கு வளர்ந்திருப்பதால் உண்டாகிற ஓயாத இரு மலைக் குணமாக்கவும், தொண்டைக்குள் இருபக்கங்களில் கட்டியிருக்கும், கட்டிகளைக் கரைக்கவும் மேல் தடவலாம்.

(87) கிளிவிரிஸா. ரூட்

(g) (z)

லிக்குீஸ். ரூட்

அதி மதூர்.

குணம்:—கதார்ட்டிக் (2) டெமியூல் ஸென்ற்

(d)

உபயோகம்:— வெகுவாய் மலத்தைக் கழிக்கக் கூடியது. ஆனால் முக்கியமாய் மற்ற மருந்துகளுக்கு இனிப்பைக்கொடுக்க உபயோகப்படுகிறது

(1) பல்விஸ். கிளிவிரிஸா. கோ

(g) (z)

குணம்:—லாக். ஸாட்டிவ்

அளவு:—1 முதல் 2 டிராம்

உபயோகம்:—மூல முளைக்காரர்களுக்கு, மலச்சிக்கலை நீக்கி, மலத்தை வெளியாக்கக்கொடுக்க நல்ல மருந்து. படுக்கைக்குப் போகும்போது 1 அல்லது 2 டிராம். கொஞ்சம் காய்ச்சின பாலிலாவது, அல்லது தண்ணீரிலாவது கலக்கிச் சாப்பிடவும். காலையில் மலம் வெளியாகும்.

(88) எக்ஸ்ட்ராக்ட். கிரிண்டிலியா.

(g) (d)

லிக்குவிட்

(d)

இதை இலைப்பு, காசம் இவைகளுக்கு 1 அவுன்ஸ் தண்ணீரில் 20 துளி வீதம் கொடுக்கலாமெனத் தீர்மானிக்கிறார்கள்.

(89) ஆமா மெலிடிஸ். கார்ட்டெக்ஸ்

(h)

(d)

குணம்:—ஆஸ். டிரிஞ்சென்ட்

அளவு:— $\frac{1}{2}$ முதல் 1 டிராம்.

(1) எக்ஸ்ட்ராக்ட். ஆமா மெலிடிஸ். லிக்குவிட்

(h)

(d)

(d)

குணம்:—ஆஸ்டிரிஞ்சென்ட்

அளவு:—5 முதல் 15 துளி

உபயோகம்:— $\frac{1}{4}$ அவுன்ஸ் “எக்ஸ்ட்ராக்ட் ஆமா மெலிடிஸ்

(h)

(d)

லிக்குவிட்” $2\frac{1}{4}$ அவுன்ஸ் ‘ஸிம்பிள் ஆயின்ட்

(d)

மென்ட்” இந்த இரண்டையும் ஒன்று

சேர்த்துக் கழிம்பாகச் செய்து, எரிச்சலோடு,

வேதனையும் ரத்தமும் பட்டுக்கொண்டிருக்

கிற மூலமூலையில் தடவலாம்.

அதேகாலத்தில் உள்ளுக்கும் தடவல் 1-க்கு

5-துளி 1-அவுன்ஸ் தண்ணீரில் கலந்து நாள்

1-க்கு 3 அல்லது 4 தடவல் கொடுக்கலாம்.

(2) டிஞ்சர். ஆமா. மெலிடிஸ்

(h) (d)

குணம்:—ஆஸ். டிரிஞ்சேன்ற்

அளவு:— $\frac{1}{2}$ -முதல் 1 டிராம்

உபயோகம்:—(1) மூல முளைக்காரர்களுக்கு மூலத்தில் இருந்து வருகிற ரத்தத்தை நிறுத்த உள் ளுக்குக் கொடுக்க:—

எடுத்துக்கொள்

டிஞ்சர். ஆமா. மெலிடிஸ்

துளி 90

(h) (d)

ஆக்குவா. சேர்ந்து

அவுன்ஸ் 3

ஒன்றுசேர்

மிக்சர்செய்

தடவல் 1 க்கு 1 அவுன்ஸ் வீதம் நாள் 1க்கு 3-தடவல் கொடுக்கவும்.

(2) ரணமாயும், ரெத்தமும் வடிந்து வடிந்து கொண்டிருக்கிற மூலத்திற்கு:—

1-பங்கு “டிஞ்சர் ஆமா மெலிடிஸ் 10-பங்கு

(h) (d)

தண்ணீர் சேர்த்து இரி கேட்டர்” மூல

(g)

மாயாவது, அல்லது ‘ஸிரிஞ்சு’ மூலமாயா வது, ஆசனத்தில் ஸிரிஞ்சு பண்ணலாம்.

மேகம், வெள்ளைப்பிரமேகம் இவைகளுக் கும் மேல் காட்டிய அளவில் லோஷன் செய்து ஸிரிஞ்சு செய்யலாம்.

அதே தடவையில் மேல் சொல்லிய மூல விபாதிக்கு உள்ளுக்கும் தடவல் 1-க்கு

30 துளி 'டிஞ்சர் ஆமா. மெலிடிஸ்' 1 அவு

(h) (d)

ன்ஸ் தண்ணீரில் கலந்து நாள் 1-க்கு 3 அவு
லது 4-தடவல் கொடுக்கலாம்.

அல்லது

மூல முளைக்காரர்களுக்கு ஏற்படுகிற உபத்
திரவத்துக் கெல்லாம். 'ஏஸைலன்' என்

(h) (z)

னும் மருந்தை வெளிப் பிரயோகமாகவும்
உள்ளுக்கும் கொடுக்கலாம். இதை உபயோ
கப் படுத்தும் விதத்தை ஒவ்வொரு பாட்டி
லிலும் பார்த்துத் தெரிந்து கொள்ளலாம்.

(90) ஐட்ரார்ஜிரி = (மெர்குரி)

(h)(d) ரஸம்

ஐட்ரார் ஜிரி. கம். கிரீட்டா :

(h)(d)

இதற்கு, 'கிரே. பவுடர்.' என்றும் பெயர்

(g) (d)

செய்யும்விதம்:—2 அவுன்ஸ் 'பிரிப்பேர்ட். சுஷாக்' இதோடு

(d)

Prepared Chalk

1 அவுன்ஸ் 'ரஸம்' சேர்த்து அரைத்துக்
கொள்ளவும்.

குணம்:—ஆல்ட் ரேட்டிவ்

அளவு:—1 முதல் 5 கிரான்

உபயோகம்:—இதை, மேகநீர், மேகப்புண், குழந்தைகளுக் குண்டாகிற கரப்பநீர், ரத்தத்தில் கலந்திருக்கிற விஷத்தன்மையால் உண்டாகும் தூர்நீர் வியாதிகள் இவைகளுக்குக் கொடுக்கலாம்.

6 மாசத்துக் குழந்தைக்குத் தடவல் 1-க்கு $\frac{1}{2}$ -கிரான் வீதம், 3-நாளேக்கு நாள் 1-க்கு 3 தடவல் கொஞ்சம் தேனில்கலந்து கொடுத்து பிறகு ஒவ்வொரு நாள் இரவில் மட்டும் $\frac{1}{2}$ -கிரான் வீதம் இடை இடையே விட்டு விட்டு குழந்தை நன்றாய்ச்சவுக்கியும், அடையுமட்டும் கொடுக்கவும்.

பெரியவர்களுக்கு, மேகவியாதி சம்பந்தமாய் ரத்தத்தில் விஷத்தன்மை கலந்து, ரத்தம் அசுத்தமாகி, அதன்காரணமாய் ஏற்படுகிற மேகப்புண் முதலியவைகளைக் குணமாக்கி, ரத்தத்தைச் சுத்தம் செய்ய தடவல் 1-க்கு 1 கிரான் வீதம் நாள் 1-க்கு 3 தடவல், இடையே விட்டு விட்டு நீடித்த காலம் கொடுத்துவரவும்.

(2) எம்பிளாஸ்ட்ரம். ஐட்ரார்ஜி

(h)(d)

ரஸப் பிளாஸ்திரி

குணம்:—ரீஸால் வேன்ற

ஆனால் இந்தப் பிளாஸ்திரி, வியாதியஸ்தர் உடலுக்குப் பொருந்துகிற தில்லை. ஆகையால் இதற்குப்பதிலாக வீக்கம், கட்டிகளைக் கணக்க

எம்பிளாஸ்ட்ரம். அமோனியாக்கை.

கம். ஐட்ரார்ஜிரி

(h)(d)

இதை உபயோகப்படுத்தலாம்.

உபயோகப்படுத்தும் விதம்:—அரையாப்புக் கட்டிகள், கண்ட மாலைகள் முதலிய துர்நீர்க் கட்டிகளைக் கரைக்க, கட்டிகளுக்குத் தகுந்த அளவில், தோலாவது, முரடான துணியாவது கத்தி ரித்து, மேல்படி பிளாஸ்திரியில் கொஞ்சம் இளக்கித் தடவி, மறுபடியும் அனல் காட்டி இளஞ்சூடாய் இருக்கையில் கரைக்கவேண்டிய கட்டிகளின்பேரில் ஒட்டிவைத்து மேல் பஞ்சுவைத்துக் கட்டி வைக்கவும். இப்படி மாறி, மாறிக்கட்டி கரையும்வரை உபயோகப்படுத்தவும்.

(4) பில். ஐட்ரார்ஜிரி (புளு. பில்)

(h)(d)

(b)

சேய்யும் விதம்:—2 அவுன்ஸ் இடையுள்ள 'ரஸத்தை' 3 அவுன்ஸ் 'குல்கந்து' (confession of roses.) இதோடு சேர்த்து நன்றாய் அரைத்து, இதோடு நன்றாய்த் தூளாக்கின 'அதிமதுரம்' 1 அவுன்ஸ் சேர்த்து அரைத்துக்கொள்ளவும்.

அளவு:—4 முதல் 8 கிரான்

உபயோகம்:—துர்நீர் வியாதிகளால், அசுத்தமான ரத்தத் தைச் சுத்தமாக்கக் கொடுக்கலாம். மலம்

வெளியாகி துர்நீர் கழியும். ரத்தத்தை
அசுத்தமாக்குகிற விஷத்தன்மையும் நீங்கி
விடும்.

(5) அங்குவன்டம். ஜட்ரார்ஜிரி

(h)(d)

அல்லது

புளு. ஆயின்ற்மென்ற்=(ரஸக்கழிம்பு)

(b) இதை வெளிப் பிரயோகமாகக் கொஞ்சம்
“வாஸலைன்” என்னும் கழிம்போடுசேர்த்து,
மேகப்புண், துர்நீர்ப் புண்களுக்குப் போட
லாம்.

(6) அங்குவன்டம். ஜட்ரார்ஜிரி. நைட்ரேட்டிஸ்.

(h)(d)

அல்லது

ஸிட்ரின் ஆயின்ற்மென்ற்

வெளிரின எலுமிச்சம்பழம் நிறமாய் இருப்ப
தால்தான் இந்தக் கழிம்புக்கு “ஸிட்ரின்
ஆயின்ற்மென்ற்” என்று பெயராயிற்று.
இந்தக் கழிம்பு நாள்படக் கருப்புநிறமாய்
விடும்.

உபயோகம்:—இதை நகச்சற்றுக்கு, கனமாய்த் தடவி நகத்
தைப் பொதுந்து, ‘ஸ்டிக்கிங் பிளாஸ்டர்’
துண்டால் ஒட்டிவைக்கலாமெனத் தீர்மா
னிக்கிறார்கள்.

(7) அன்குவன்டம். ஐட்ரார்ஜிரி.

(h)(d)

டைலியூட்டிஸ். டைலியூட்

(d)

அல்லது

டைலியூட்டேட். ஸிட்ரின். ஆயின்ற்மென்ற்

(d)

(d)

செய்யும்விதம்:—ஸிட்ரின், ஆயின்ற்மென்ற் அவுன்ஸ் 1
வாஸலைன் அவுன்ஸ் 1
இந்த இரண்டையும் ஒன்று சேர்த்துக்
கொள்ளவும்.

உபயோகம்:—இதைப் பொடிப்புகள், அழுகச் சிரங்குகள்
காப்பரீர்கள் இவைகளுக்கு தடவ
லாம்.

சிரங்குக்குக் கழிம்புசெய்ய:—

எடுத்துக்கொள்

டைலியூட்டேட். ஸிட்ரின். ஆயின்ற் மென்ற்

(d)

(d)

அவுன்ஸ் 1

புளு. ஆயின்ற்மென்ற்

டிராம் 1/2

(b)

ஸிங். ஆக்ஸைட்

டிராம் 1

(z)

(d)

வாஸலைன்

அவுன்ஸ் 1

ஒன்றுசேர்

கழிம்பாகச் செய்து சிரங்கு, மேகப்புண்,
காப்பரீர் இவைகளின்மேல் தடவி வைத்

திருந்து பின்பு “கார்பாலிக் ஸோப்” அல்லது “ஸல்பர் வைனோலியா” ஸோப்.

(f)

கொண்டு சுத்தஞ் செய்யவும்.

(8) ஐட்ரார்ஜிரி. ஒலியஸ்

(h)(d)

குணம்:—ரிஸால்வேன்ற்

உபயோகம்:—இதைப் வெளிப் பிரயோகமாக அரையாப்புக் கட்டிகள், துர்கீர்க்கட்டிகள் கரைய நாள் 1-க்கு 3 அல்லது 4 தடவல் கட்டிகளின் மேல் தேய்க்கவும்.

(9) அங்குவன்ட்ம். ஐட்ரார்ஜிரி. ஆக்ஸைட். பிளேவா

(h)(d)

(d)

(f)

அல்லது

பிளாஸ்மா

செய்யும்விதம்:—

ஐட்ரார்ஜிரி. ஆக்ஸைட். பிளேவா.

கிரான் 1

வாஸலைன்

கிரான் 49

ஒன்றுசேர்

கழிம்பாகச்செய்து கண் இமைகளில் புளு வெட்டுதலுக்குத் தடவலாம்.

(10) ஐட்ரார்ஜிரி. பெர்க்குளோரைட்

(h)(d)

(d)

அல்லது

மெர்க்குரிக் குளோரைட்

(d)

சுவ்வீரம் = வீரம்

குணம்:—(1) ஆண்டி. ஸிபிலிட்டிக்

(2) ஆல்ட் ரேட்டிவ் (3) ஆண்டி. ஸெப்டிக்

அளவு:— $1/32$ முதல் $1/16$ கிரான்

(1) லைக்கர். ஐட்ரார்ஜிரி. பெர்க்குளோரைட்

(h)(d)

(d)

செய்யும் விதம்:—

எடுத்துக்கொள்

ஐட்ரார்ஜிரி. பெர்க்குளோரைட். கிரான் 5

(h)(d)

(d)

டிஸ்டிவ்ட் வாட்டர்.

அவுன்ஸ் 10

ஒன்றுசேர்

நன்றாய் 'மார்ட்டரி' அரைத்துக் கொண்டு

கல்கார்க்குக் குப்பியில் அடைத்து வைத்துக்

கொள்ளவும்.

அளவு:— $\frac{1}{2}$ முதல் 1 டிராம்

உபயோகம்:—வாதத்தையும் குணமாக்கி, அதோடு ரத்த

அசுத்தத்தையும் நீக்க:—

எடுத்துக்கொள்

பொட்டாஸ் அயோடைட்

கிரான் 15

(d)(d)

டிஞ்சர். ஜென்ஷன். கோ

துளி 60

ஸ்பிரிட். அமோனியா. அரோமேட்டிக்

துளி 50

லைக்கர். ஐட்ரார்ஜிரி. பெர்க்குளோரைட்

(h)(d)

(d)

துளி 90

ஆக்குவா. சேர்ந்து

அவுன்ஸ் 3
ஒன்றுசேர்

மிக்சர் செய்

தடவல் 1 க்கு 1-அவுன்ஸ் வீதம் நாள் 1 க்கு
3-தடவல் ஆகாரத்துக்குப்பின் கொடுக்கவும்.
தூர்நீர்ப் புண்கள், மேகாணங்கள், வெட்டுக்
காயங்கள் முதலிய புண்களை ஆற்ற

ஆன்டி. ஸெப்டிக். ஸோலியூஷன்”

அல்லது

“மேர்க்குரி லோஷன்”

செய்யும் விதம்:—

ஐட்ராஜீரி. பெர்க்குளோரைட்

(h)(d)

(d)

கிரான் 60

ஸோடியம். குளோரைட் (உப்பு)

(d)

(d)

கிரான் 60

கிளிஸெரின்

அவுன்ஸ் 1½

(g)

ரெக்டிபைட். ஸ்பிரிட்

அவுன்ஸ் 1

(f)(d)

எல்லாம் ஒன்றுசேர்த்து “மார்ட்டரில்”
அரைத்து கல்கார்க்குக் குப்பியில் ஊற்றி
வைத்துக்கொண்டு “பாய்ஸன்”=(விஷம்)
என்று லேபில் எழுதி ஒட்டிவைத்துக்
கொள்ளவும்.

“ஆன்டி ஸெப்டிக். லோஷன்” 1-அவுன்ஸ்
செய்ய இதில் 1-அவுன்ஸ் தண்ணீரில்

4 துளி சேர்த்துக்கொள்ளவும். இந்த அளவில் போதுமான லோஷன் செய்துக்கொள்ளலாம்.

இந்த லோஷனைக்கொண்டே, எவ்விதமான ரணங்களையும் கழுவி மேல்படி லோஷனில் முக்கிப்பிழிந்த லின்றுத் துணியால் ரணத்தைச் சுற்றிவைத்து இந்த லோஷனில் முக்கிப்பிழிந்த வெள்ளைத்துணியால் கட்டி வைத்தால், “அயோடபார்ம்” “போரிக் ஆஸிட்” என்ற மருந்துகளை உபயோகப்படுத்தாமலே, புண்களை ஆற்றிவிடலாம்.

அல்லது

“காரோஸிவ். ஸப்ளிமேட். டேபிளாய்ட்ஸ்”

(b)

(b)

(d)

என்ற “ஆன்டி ஸெப்டிக் லோஷன்” மாத்திரைகளில், 20 அவுன்ஸ் தண்ணீரில், 1 மாத்திரையைக் கரைத்துக்கொண்டு எவ்விதமான ரணங்களையும் ஆற்றக் கழுவுநீராக உபயோகப்படுத்தலாம்.

இந்த லோஷன் காட்டம் குறையவேண்டுமானால் 40 அவுன்ஸ் தண்ணீரில் 1 மாத்திரை கரைத்துக்கொண்டு உபயோகப்படுத்தவும்.

மேகப்புண்ணை ஆற்ற:—மேல் எழுதியிருக்கிற “ஆன்டி. ஸெப்டிக் லோஷன்” களில் யாதேனும் ஒன்றினால் புண்ணை நன்றாய்ச் சுத்தம்செய்துவிட்டு, புண்ணின்மேல் “கா

லோமல்," "ஸிங் ஆக்ஸைட்" இந்த

(z)

(d)

இரண்டும் சமபாகம் கலந்து கொஞ்சம் தூற்றி, லிந்துத்துணியை, மேல்படி லோஷனில் முக்கிப்பிழிந்து, சுற்றி அதன்மேல் காட்டன், வைத்துப் பொதிந்து, மேல்படி லோஷனில் முக்கிப்பிழிந்த வெள்ளைத்துணியால் கட்டிவைக்கவும். இப்படி நாள் 1-க்கு 1 தடவல் கட்டினால் போதும். மேகப்புண் குணமாகும்வரை இப்படியே செய்யவும்.

(2) ஐட்ரார்ஜரி. ஸப். குளோரைட்

(h)(d)

(b)

(d)

அல்லது

காலோமல் = (ரஸபஸ்பம்)

குணம்:—(1) ஆல்ட்டரேட்டிவ் (2) பர்கட்டிவ் (3) டயூ
(g) (d)

ரேட்டிக்

அளவு:— $\frac{1}{2}$ முதல் 5-கிரான்.

உபயோகம்:—(1) பித்தத்தைச் சமப்படுத்தி, 2 அல்லது 3 தடவல் மலம் வெளிப் போகச்செய்து, காய்ச்சலையும் தணிக்க:—

எடுத்துக்கொள்

காலோமல்

கிரான் 4

பெனா. ஸெட்டின்.

கிரான் 8

(f)

கரபின். ஸிட்ரஸ்.

கிரான் 4

(f)

லோடா. பைகார்ப்.

கிரான் 4

(d) (b) (b)

ஒன்றசேர்

இதை ஒரேதடவலாக வாயில்போட்டு உமிழ்
நீரோடு சேர்த்து விழுங்கிவிடவும்.

காலையில் மலம் வெளியாகிப் பித்தமும்
கழிந்து காய்ச்சலும் தணியும். இன்னமும்
மலம் வெளிப்போக வேண்டுமென்ற அவசி
யம் இருந்தால் மட்டும் சுக்குக் கஷாயத்தில்
இனிப்புச் சேர்த்து அதில் 4 முதல் 6 டிராம்
'எப்ஸம் ஸால்ட்' என்ற பேதி உப்பைக்
கரைத்துச் சாப்பிடவும்.

(2) மேகப்புண், மேகாணம், தூநீர்ப்
புண் இவைகளுக்குப் புண்ணின்மேல் "கா
லோமல்" கொஞ்சம் தூற்றி, "லின்னுத்
துணி"யால் சுற்றிக்கட்டி வைத்து "கார்பா
லிக்ஸோப்" கொண்டு சுத்தம் செய்யவும்.

(1) லோஷன் ஐட்ரார்ஜிரி நிக்ரா

(h)(d)

(g)

அல்லது

பிளாக் வாஷ்

(b)

செய்யும் விதம்:—கொஞ்சம் "கம். அக்கேஷியா" வோடு
(g)

தண்ணீர் விட்டுப் பசைபோல் அரைத்துக்
கொண்டு அதோடு 15-கிரான் "காலோ
மல்" சேர்த்து அரைத்து, அதோடு $\frac{1}{2}$ அவு

ன்ஸ் “கீளிஸின்” சேர்த்து, எல்லாம்
(g)

5-அவுன்ஸ் ஆகும்வரை “லைம்வாட்டர்”

(சுண்ணாம்புத் தண்ணீர்) சேர்த்துக்கொள்ளவும்.

உபயோகம்:—மேகப்புண் உண்டாகி, அதோடு வீக்கம் இருந்தால், 3 விரல் அகலம் ‘லின்றுத்துணி’ கிழித்து “பிளாக்வாஷ்” லோஷனில் முக்கி
(b)

வீக்கம் உள்ள பாகம் பூராவும் சுற்றி, ஈரம் உலர உலர, மேல்படி லோஷனை நன்றாய் ஒவ்வொரு தடவலும் குறுக்கிக்கொண்டு அதினால் நனைத்து வரவும். வீக்கம் வற்று கிற வரைக்கும் இப்படிச் செய்யவும். பிறகு புண்ணின்மேல் “காலோம”லைத் தனிமை யாகவாவது அல்லது சம்பாகம் “ஸிங். ஆக்
(g)

ஸைட்” சேர்த்தாவது மேல்போட்டுக், கார்
(d)

பாலிக். ஸோப் கொண்டு சுத்தம் செய்யவும்.

ஆனால் “காலம்” லோடு ‘வாஸலைன்’ சேர்த்துக் கழிம்பாகச் செய்து மேகப்புண், மேகாணம் இவைகளுக்குப் போடுவது அவ்வளவு பொருத்தமான முறை அல்ல.

(91) அயோஸ்யாமஸ். லீவ்ஸ்.

(h)

குணம்:—(1) ஸெட்டிவ் (2) அனோடைன்

(d)

(d)

(1) எக்ஸ்ட்ராக்ட். அயோஸ்யாமி. விரிடி.

(h)

(d)

அளவு:—2 முதல் 8 கிரான்.

உபயோகம்:—மலச்சிக்கலை நீக்கக் கொடுக்கிற மாத்திரைகளில் சேருகிற மருந்துகள் வயிற்று வலியையும் பிசைதலையும் உண்டு பண்ணும் விருக்க, ஒவ்வொரு மாத்திரையிலும் 2 கிரான் சேர்த்துக் கொள்ளலாம்.

(2) டிஞ்சர். அயோஸ்யாமஸ்.

அளவு:— $\frac{1}{2}$ முதல் 1 டிராம்

உபயோகம்:—(1) காய்ச்சல் இருக்கும்போது மேல்வலி, அலுப்பு இவைகளை நீக்க:—

“டயா. போ. ரேட்டிக். மிக்சரில்” தடவல்

(d) (f)

1-க்கு 10 துளி வீதம் சேர்க்கப்பட்டிருக்கிறது.

குறிப்பு:—“டயா. போ. ரேட்டிக் மிக்சர்” செய்யும் விதத்

(d)

(f)

தை இப்புஸ்தகத்தின் முன்னுவது பாகம். முதல் பிரிவில் பார்த்துக் கொள்ளவும்.

(2) வியாதியஸ்தர்களுக்கு இரவில் தூக்கம் உண்டு பண்ண. இருதய வியாதி இல்லாதவர்களுக்கு:—

எடுத்துக்கொள்.

டிஞ்சர். அயோஸியாமஸ்	துளி 20
பொட்டாஸ். புரோமைட்	கிரான் 30
(b) (d)	
ஸிரப். ஆரன்டி	துளி 30
ஆக்குவா. சேர்ந்து	அவுன்ஸ் 1
	ஒன்று சேர்

மிக்சர் செய்

இதை ஒரே தடவலாக இரவில் கொடுக்கவும்.

குழிப்பு:—ஆனால் இதையே, தூக்கம் வருகிறதற்கு வழக்க மாய் வைத்துக் கொள்ளக்கூடாது.

அவசாமான சமயங்களில் மட்டும் உபயோ கப்படுத்திக் கொள்ளவும்.

(3) பருவுக்கு—குச்சியில் பஞ்ச சுற்றி “டிஞ்சர் அயோஸியாமஸ்” இதில் முக்கி, நாள் 1-க்கு பலதடவல் பருவில் வைத்துக் கொண்டே வந்தால் பருவின் முகம் அழிந்து வீக்கம் வலி இருந்தாலும் குணமாகும்:—

(4) நீர்ப்பையில், எரிச்சல், ரணம் இருந்து நீரும் சரியானபடி இறங்காமல் சொட்டுச் சொட்டாய் இறங்கி, அடிக்கடி நீர் வருவது போல் இருக்கும்போது கொடுக்க:—

எடுத்துக்கொள்

டிஞ்சர். அயோஸியாமஸ்	துளி 60
கைக்கர். பொட்டாஸ்	துளி 30
டிஞ்சர். பக்கு	துளி 45

(b)

ஆக்குவா. சேர்ந்து

அவுன்ஸ் 3
ஒன்றுசேர்

மிக்சர்செய்

தடவல் 1-க்கு 1-அவுன்ஸ் வீதம் நாள் 1க்கு
3-தடவல் கொடுக்கவும்.“பார்லி. ரைஸ்” வாட்டரில் பாலும் சீனி
(b)யும் சேர்த்துக் கொடுக்கலாம். “பார்லி
மாவு” கஞ்சி காய்ச்சி பாலும் சீனியும்
சேர்த்துக்கொடுக்கலாம்.

குறிப்பு:—குழந்தைகளுக்கு ‘அயோஸியாமஸ்’ அதிகமான
அளவில் கொடுத்தாலும் ஏற்றுக்கொள்ளு
மென்றும், வயசு சென்றவர்களுக்கு, குறை
ந்த அளவில் கொடுத்தாலும் ஏற்றுக்கொள்
ளுகிறதில்லை பென்றும் தீர்மானிக்கிறார்கள்.

(92) டாக்டர். ஆமல்ஸ், எமாட்டோஜன்

(d) (h) (h)

இதைத் தேகத்தில் ரத்தம் உண்டாகிப் பலத்
தைக்கொடுக்க உபயோகப் படுத்தலாம்.

(93) அயோடம்

குணம்:—(1) அப்ஸார்பென்ட். (2) ஆல்ட்டரேட்டிவ்

(b) (b)

(1) லைக்கர். அயோடி. போர்டிஸ். அல்லது

(d) (f)

லீனிமென்ட் அயோடின்.

(d)

செய்யும்விதம்:—அயோடம் அவுன்ஸ் 1½
(d)

வாத உப்பு) = பொட்டாஸ். அயோடைட். அவுன்ஸ் ¾
(d)(d)

ஆக்குவா அவுன்ஸ் 1½
ரெக்டிபைட். ஸ்பிரிட் அவுன்ஸ் 9
(f)(d)

ஒன்றுசேர்

குறிப்பு:—‘ரெக்டிபைட். ஸ்பிரிட்’ கிடைக்கா விட்டால்
(f)(d)

“கூட்ச. ஸைன்ட். ஸ்பிரிட்” அதாவது
அடுப்பு எரிக்கிற ஸ்பிரிட் எண்ணெய்
சேர்த்துக்கொள்ளலாம்.

உபயோகம்:—இதை வெளிப் பிரயோகமாக, வீக்கங்கள்,
அரையாப்புக் கட்டிகள், ரத்தக்கட்டிகள்,
வாத சூலைக் கட்டுகள் இவைகளைக் கரைக்க
வும், வீக்கங்கள் வற்றவும், மேல் தடவலாம்.
உள்ளுக்குக் கொடுக்கக்கூடாது

(2) டிஞ்சர். அயோடின்
(d)

செய்யும்விதம்:—அயோடம் அவுன்ஸ் ½
(d)

பொட்டாஸ். அயோடைட், அவுன்ஸ் ½
(d)(d)

ஆக்குவா. சேர்ந்து அவுன்ஸ் ½
ரெக்டிபைட். ஸ்பிரிட். சேர்ந்து. அவுன்ஸ் 20
ஒன்றுசேர்

உபயோகம்:—இதை வெளிப்பிரயோகமாக, ரத்தக்கட்டிகள், வீக்கங்கள், அரையாப்புக் கட்டிகள், சூலைக் கட்டுகள், வாத உளைச்சல், இவைகளுக்கு மேல் தடவலாம்.

குறிப்பு:—வீக்கம், கட்டி முதலானவைகளுக்கு மேல் தடவும்பொழுதெல்லாம். சரிபாகம் “டிஞ்சர்” அயோடின், “லினிமென்ட். அயோடின்” (d)

இந்த இரண்டையும் ஒன்று சேர்த்துக் கொண்டு தடவுவது உத்தமம்.

(94) இப்பிக்காக். ரூட்

(1) பல்விஸ். இப்பிக்காக்.

குணம்:—(1) எக்ஸ்பெக்டோரென்ட் (2) எமட்டிக்.

(அளவு:— $\frac{1}{2}$ முதல் 2 கிரான் (தொண்டைப்புக்கைச்சல்நிற்க) 15 முதல் 30 கிரான் (வாந்தி உண்டுபண்ண)

(2) பல்விஸ். இப்பிக்காக். கோ இதற்கு “டோவர்ஸ் பவுடர்” என்றும் (d) (d)

பெயர்

10 கிரான் மருந்தில் 1 கிரான் ‘அபின்’ சேர்த்திருக்கிறது.

குணம்:—(1) அனேடைன் (2) டயா போ ரெட்டிக் (d) (d) (f)

அளவு:—5 முதல் 15 கிரான்.

உபயோகம்:—வயிற் றழைச்சலோடு, ரத்தமும் சீதமும், கடுப்பும் இருக்கும்போது கொடுக்க:—

எடுத்துக்கொள்

டோவர்ஸ். பவுடர் கிரான் 15

(d) (d) காலிக். ஆலிட் கிரான் 15

(g) (d)

பிஸ்மத். ஸ்பைட்டர்ஸ் கிரான் 15

(b) (b)

ஒன்றுசேர்

3-பொட்டணமாக மடித்துக்கொண்டு 4 மணி நேரத்திற்கு ஒருதடவல் பொட்டணம் தேனில் கலந்துகொடுக்கவும்.

குறிப்பு:—இந்த மருந்துகொடுத்து 1-மணி நேரம்வரை தண்ணீராவது, அல்லது தண்ணீர் போன்ற ஆகாரமாவது கொடுக்கக்கூடாது.

(3) வைனம் இப்பிக்காக்

குணம்:—(1) எக்ஸ்பெக்டோ ரேன்ற் (2) எமட்டிக்

அளவு:—10 முதல் 30 துளி (தொண்டைப் புகைச்சலை நிறுத்த) $\frac{1}{2}$ -முதல் $\frac{3}{4}$ -அவுன்ஸ் (வாந்தி உண்டு பண்ண)

உபயோகம்:—(1) 1-வயசுக்குமுந்தைக்கு வாந்தி உண்டு பண்ணி கபத்தை வெளியாக்கிப் புகைச்சலை யும் குணமாக்க, வாந்தி எடுக்கும்வரை 15 நிமிஷத்துக்கு ஒரு தடவல் 1 தேக்கரண்டி அளவு “வைனம். இப்பிக்காக்”

கொடுத்து, வார்தியான பின்பு, 2-மணிக் கொரு தடவல், தடவல் 1-க்கு 5 துளி வீதம், 2 அல்லது 3 தடவல் கொடுத்து நிறுத்திக் கொள்வதும்-

(2) பலவித விபாதிகளால் உண்டாகிற வார்தியை நிறுத்த வார்தி நிற்கிற வரைக்கும், 2 அல்லது 3 மணிக்கொரு தடவல், 1 அவுன்ஸ் தண்ணீரில் 1 துளி 'வைனம் இப்பிக்காக்' கொடுத்து வரவும்.

(3) தொண்டைப் புகைச்சலை நிறுத்த:—

எடுத்துக்கொள்

சோடா. பை கார்ப் கிரைன் 30

(d) (b) (b)

வைனம். இப்பிக்காக் துளி 30

டிஞ்சர். கார்பர் கோ. துளி 60

(f)

ஆக்குவா. சேர்ந்து அவுன்ஸ் 3

ஒன்றுசேர்

மிக்சர் செய்

தடவல் 1-க்கு 1 அவுன்ஸ் வீதம் 4 மணி

நோத்துக்கு ஒரு தடவல் கொடுக்கவும்.

குறிப்பு:— தொண்டைப் புகைச்சலோடு அற்ப காரமும், அலுப்பும் இருந்தால் மேல் எழுதி யிருக்கிற மிக்சரில் "ஸோடா பை கார்ப்" இதை

(d) (b) (b)

நீக்கிவிட்டு, தடவல் 1-க்கு 4-கிரைன் "கோய் னேன், ஸல்பஸ்" இதை 5 துளி "ஆஸிட்

(f)

(d)

ஸல்பியூரிக் டில்” சேர்த்துக்கரைத்து உப
(f) (d)

யோகப்படுத்திக் கொள்ளவும்.

(4) சிறு குழந்தைகளுக்கு தொண்டைப்
புகைச்சலை நிறுத்த:—

எடுத்துக்கொள்

வைனம், இப்பிக்காக். துளி 8

அமோனியா கார்ப் கிரைன் 4

(b)

டிஞ்சர். ஸெனிகா. துளி 15

(g)

டிஞ்சர். சில்லி. துளி 8

லிரப். டீலு. துளி 20

ஆக்குவா. சேர்ந்து அவுன்ஸ் 1

ஒன்றுசேர்

மிக்சர்செய்

தடவல் 1-க்கு 2 தேக்காண்டி வீதம் 4-ம
ணிக்கொரு தடவல் கொடுக்கவும்.

குறிப்பு:—குத்திருமலாய் இருந்தால் “அமோனியா கார்ப்”
(b)

இதை நீக்கிவிட்டு, மேல்காட்டிய மிக்சரில்
தடவல் 1 க்கு 2 கிரைன் “அமோனியா
புரோமைட்” 5-துளி “டிஞ்சர். அயோஸி

(b) (d)

யாமஸ்” இந்த இரண்டையும் சேர்த்துக்
கொள்ளவும்.

(95) அயோடோ பார்ம்

(d) (f)

குணம்:—(1) ஆன்டி ஸெப்டிக்

உபயோகம்:—இதை, எவ்விதமான புண், வெட்டுக்காயம், ஆராத்ரணம் இவைகளுக்கெல்லாம் தனிமை யாகவாவது அல்லது இரண்டு பங்கு “போ

ரிக் ஆஸிட்” உடன் கலந்தாவது, மேல் (b)

தூற்றி அதன்மேல், “லின்பர்” “காட்டன்” இவைகள் வைத்துப் பொதிந்து வெள்ளைத் துணியால் கட்டி வைக்கவும்.

(96) அயோடால்

(d)

இதற்கு “அயோட பாரத்தை”ப் போல் வீச் (d)(b)

சம் கிடையாது. ‘அயோட பாரத்தை’ உப (d) (b)

யோகப்படுத்துவதுபோல் இதையும் புண்க ளுக்கு உபயோகப்படுத்தலாம்.

(97) இக்தியால்.

இது தார் எண்ணெய் வீச்சமுள்ள, கருப்பு கிறமான தைலம்.

உபயோகம்:—இதை ரத்தக் கட்டிகள், அரையாப்புக் கட்டி கள், வீக்கங்கள் இவைகளை வற்றவைக்க:—

எடுத்துக்கொள்

இக்தியால் டிராம் 1
எக்ஸ்ட்ராக்ட். பெல்லடோனா அவுன்ஸ் ½

(b)

கிளிஸரின் டிராம் 1
(g)

ஒன்றுசேர்

மிக்மென்ருகச் செய்து கட்டிகளின்மேல்
(g)

தடவி பஞ்சுவைத்துக் கட்டவும்.

(18) ஜாலப்

(1) பல்விஸ். ஜாலப்

குணம்:—பார்கட்டிவ்

(g)

அளவு:—5 முதல் 20 கிரான்

உபயோகம்:—இதை, மலம் வெளியாகும்பொருட்டு தனி
மையாக உபயோகிப்பதால் மலம் வெளிப்
போகும்போது, வயிற்றிலும், குடலிலும்
வலி உண்டாகு மாகையால் இதற்குப் பதி
லாக.

(2) பல்விஸ். ஜாலப்கோ

இதை வயிற்றால் போக உபயோகப்படுத்
தலாம்.

அளவு:—20 முதல் 60 கிரான்

உபயோகம்:—சித்தமும் கழிந்து, 3-அல்லது 4 தடவல் மல
மும் வெளியாக வேண்டியதிருந்தால்

எடுத்துக்கொள்

காலோமல்

கிரைன் 3

ஸோடா. பை. கார்ப்

கிரைன் 4

(d) (b) (b)

ஒன்று சேர்

இதை ஒரே தடவலாக இரவில் வாயிற்
போட்டு உமிழ் நீரோடு கூட்டி இறக்கி
மறுநாள் காலை 2 அவுன்ஸ் தண்ணீரில்
1 டிராம் "பல்விஸ் ஜாலட். கோ" கலக்கிக்
கொடுக்கவும். பிறகு இடையே வெந்நீர்
சூடிக்கவும்.

(99) ஆயில் ஜூனிப்பர்.

இது ஒருவிதமான வாசனையுள்ள, லேசான
மஞ்சள் நிறமான எண்ணெய்.

குணம்:—டயுரேட்டிக்

(d)

அளவு:— $\frac{1}{2}$ முதல் 3 துளி (சீனியில் கலந்து கொடுக்கவும்)

(1) ஸ்பிரிட் ஜூனிப்பர்

செய்யும் விதம்:—

ஆயில். ஜூனிப்பர்

அவுன்ஸ் 1

ரெக்டிபைட். ஸ்பிரிட்.

அவுன்ஸ் 19

(f)(d)

ஒன்றுசேர்

இந்த இரண்டையும் ஒன்று சேர்த்துக் குலுக்
கிக் கொள்ளவும்.

குணம்:—டயூரேட்டிக்

(d)

அளவு:—20 முதல் 60 துளி

உபயோகம்:—நீர் பிரிய வேண்டியதற்காக இதை தனிமையாக உபயோகப் படுத்துவதவிட, நீரைப் பிரிக்கக்கூடிய மற்ற மருந்துகளோடு சேர்த்துக் கொடுப்பது நல்லது.

நீர் பிரிந்து வீக்கம், சுரப்பு வற்ற:—

எடுத்துக்கொள்

பொட்டாஸ். ஆஸிட்டஸ்.	கிரான் 30
பொட்டாஸ். ஸிட்ரஸ்.	கிரான் 30
ஸ்பிரிட். ஜூனிப்பர்.	துளி 60
ஸ்பிரிட். ஈதர். நைட்ரோஸி.	துளி 45
ஆக்குவா சேர்ந்து	அவுன்ஸ் 3
	ஒன்றசேர்

மிக்சர்செய்

தடவல் 1 க்கு 1 அவுன்ஸ் வீதம் நாள் 1-க்கு 3 தடவல் கொடுக்கவும்.

(100) ஜாம்பல்.

(b)

நவ்வல் பழம்.

இது நீரழிவுக்காரர்களுக்கு, அதிகமாய்ப் போய்க்கொண்டிருக்கிற, நீரின் அளவைக் குறைக்க உபயோகப்படுகிறது. தடவல் 1-க்கு 30 கிரான் தூள் கொடுக்கலாம்; ஆனால் இதற்கு மலத்தைக் கட்டக்கூடிய குணம் உண்டு.

(101) பல்விஸ் கைநோ

குணம்:—ஆஸ்டிரிஞ் சேன்ற்

அளவு:—5 முதல் 20 கிரான்.

குறிப்பு:—இரும்பு சேர்ந்த மருந்துகளோடு சேர்த்துக் கொடுக்கக் கூடாது.

(1) பல்விஸ். கைநோ. கோ

20 கிரான் பொடியில் 1 கிரான் 'அபின்' இருக்கிறது.

குணம்:—(1)ஆஸ்டிரிஞ் சேன்ற் (2) அனேடைன்

(d)

அளவு:—5 முதல் 20 கிரான்.

உபயோகம்:—(1) வயிற்றழைச்சல், மூலத்தால் ரத்தம் போகுதல், கடுப்பு இவைகளுக்குக் கொடுக்க:—

எடுத்துக்கொள்

பல்விஸ். கைநோ. கோ.

கிரான் 30

காலிக். ஆலிட்.

கிரான் 15

(g) (d)

பிஸ்மத். ஸ்பைரைட்.

(b) (b)

கிரான் 15

ஒன்றுசேர்

3-பொட்டணமாக மடித்துக்கொண்டு தடவல் 1-க்கு 1-பொட்டணம், 4-மணிக்கொரு தடவல் தேனில் கலந்து கொடுக்கவும்.

குறிப்பு:—உபத்திரவம், லேசாய் இருந்தால் “பல்விஸ். கைநோ. கோ” தடவல் 1-க்கு 5 கிரான் போதும்.

‘பார்லி மாவு’ கஞ்சியில் பால் சேர்த்துச் சாப்பிடவும்.

(2) 5 வயசுக் குழந்தைக்கு வயிற்றழைச் சலுக்குக் கொடுக்க:—

எடுத்துக்கொள்

பல்விஸ். கைநோ. கோ. கிரான் 6

பல்விஸ். கிரீட்டா. அரோமேட்டிக். கம்.

ஒப்பியம். கிரான் 9

பிஸ்மத் ஸப்ரைடாஸ் கிரான் 6

(b) (b)

ஒன்றுசேர்

3 பொட்டணமாக மடித்துக் கொண்டு

தடவல் 1-க்கு 1 பொட்டணம் வீதம் 4-

மணிக்கொரு தடவல் தேனில்கலந்து கொடுக்

கவும். “பார்லி மாவு” கஞ்சி கொடுக்கவும்.

(102) கிரவின்.

இது தெளிவான, தவிட்டு நிறமுள்ள திரா வகம்.

உபயோகம்:—இது “கார்பாலிக். ஆஸிட்” டை விட அதிக வேக முள்ளதும் ஆனால் அதைப்போல் அவ் வளவு விஷமுள்ளதும் அல்ல. புண், ரணம் இவைகளிலுள்ள விஷப்பூச்சிகள் சாக, லோஷனாகச் செய்து உபயோகப் படுத்த லாம்.

(103) லவண்டியூலே. ஒலியம்

(d)

அல்லது

ஆயில். லவண்டர்

(d)

இது நல்லவாசனையுள்ள எண்ணெய்

குணம்:—கார்மினேட்டிவ்

அளவு:— $\frac{1}{2}$ முதல் 3 துளிஉபயோகம்:—அஜீரணத்தால் உண்டாகிற, மும்மாமான
வயிற்றுவலியை நிறுத்த:—

எடுத்துக்கொள்

ஆயில். லவண்டர்

துளி 3

ஒலியம். கஜபுட்.

துளி 2

இந்த இரண்டையும் கொஞ்சம் சீனியில்
கலந்து கொடுக்கவும்

(1) ஸ்பிரிட். லவண்டர்

(d)

செய்யும் விதம்:—ஆயில். லவண்டர்

அவுன்ஸ் $\frac{1}{2}$

(d)

ரெக்டிபைட். ஸ்பிரிட்.

அவுன்ஸ் 4 $\frac{1}{2}$

(f)(d)

இந்த இரண்டையும் ஒன்று சேர்த்துக்
குலுக்கிக் கொள்ளவும்.

அளவு:—6 முதல் 20 துளி

(2) டிஞ்சர். லவண்டர் கோ

அளவு:—30 முதல் 60 துளி

உபயோகம்:—இதற்கு “கார்மினேட்டிவ்” குணம் இருந்த
போதிலும், பொதுவாக மிக்சர்களில், மற்ற
மருந்துகளுக்கு நிறத்தையும் வாசனையையும்
கொடுக்க உபயோகப்படுகிறது.

(104) ஒலியம். லிமோனில்ஸ்

அல்லது

ஆயில். லேமன்

எலுமிச்சம் பழத்தின் தோட்டிலிருந்து எடுக்கப் படுகிற
எண்ணெய்

அளவு:— $\frac{1}{2}$ முதல் 3 துளி

உபயோகம்:—பொதுவாக, “ஸோடா” உப்பைப் பொங்க
வைத்துச் சாப்பிடும்போது வாசனைக்காக
 $\frac{1}{2}$ துளி சேர்த்துகொள்ளத்தான் உபயோகப்
படுகிறது.

(105) லினம்—(லின் வீட்)

(d)

ஆளிவிதை

குணம்:—டேமியூல் சேன்ற

(d)

உபயோகம்:—இதை இடித்துத் தூளாக்கி, தனிமையாக
வாவது அல்லது அரிசி மாவோடு சேர்த்
துக் களியாகக் கிண்டி ‘போல்ட்டிஸ்’ போட
உபயோகப் படுகிறது

ஆனால் பொறுக்கும்படியான சூட்டோடு
வைத்துக் கட்டுவது நல்லது.

(106) விதியை. கார்போனஸ்

(b)

குணம்:—(1) டயூரேட்டிக் (2) அன்டாஸிட்.

(d)

(d)

அளவு:—2 முதல் 5 கிரான்

உபயோகம்:—இதை நீர் இறங்க உபயோகப்படுத்தலாம்.

(107) லொபிலியா

(b)

(1) டிஞ்சர். லொபிலியா. ஈதர்

(b)

அளவு:—5 முதல் 15 துளி

உபயோகம்:—இதை இளைப்புக்குக் கொடுக்கலாம். மேல்படி
வியாதிக்குக் கொடுக்க:—

எடுத்துக்கொள்

டிஞ்சர். லொபிலியா. ஈதர்.

துளி 30

(b)

பொட்டாஸ். அயோடைட்

கிரான் 15

(d)(d)

ஸ்டிரிட். குளோரோ பார்ம்

துளி. 30

(f)

ஆக்குவா. சேர்ந்து.

அவுன்ஸ் 3

ஒன்றுசேர்

மிக்சர்செய்

தடவல் 1 க்கு 1 அவுன்ஸ் வீதம் நாள்

1 க்கு 3 தடவல் கொடுக்கவும்.



(103) லேஸால்

இது தார் எண்ணெய் வீச்சுமுள்ள, கருப்பு நிறமான எண்ணெய் போன்ற மருந்து.

‘கார்பாலிக் ஆஸிட்’டை விட இது 5-பங்கு

(b)

(d)

அதிகக் காட்டமுள்ளதும், 8 பங்கு விஷத் தன்மையில் குறைவுள்ளதுமான மருந்தெனத் தீர்மானிக்கிறார்கள்.

உபயோகம்:—100 பங்கு தண்ணீருக்கு, $\frac{1}{2}$ முதல் 3 பங்கு சேர்த்து ‘லோஷன்’கச் செய்து உபயோகித்தால் புண், ஆராதணம் இவைகளிலுள்ள பூச்சி, விஷஜெந்துக்களை நாசஞ் செய்து அவைகளால் உண்டாகும் வியாதியை வரவொட்டாமல் தடுக்கும்.

பெண்களுக்கு, மேகசம்பந்தமான துர்நீர் வியாதிகளுக்கு, மேல் காட்டிய அளவில் ‘லோஷன்’ செய்து ‘ஸ்ட்ரிஞ்சு’ பண்ணலாம்.

(109) மெக்நீஷீயா. கார்ப்

(g)

(b)

இது வெண்மையான, லேசான் தூள்.

குணம்:—(1) அன்டாஸிட் (2) பர்கட்டிய

(d)

(g)

அளவு:—5 முதல் 30 கிரான்

உபயோகம்:—(1) மேல் காட்டிய குணங்களுக்கு இதை தனிமையாக உபயோகப்படுத்துவதைவிட

இது சேர்ந்திருக்கிற “கிரி கரிஸ் பவுடர்.”

(g) (g) (d)

இதையாவது, அல்லது பின் எழுதியிருக்கிற

“ஆல்பா. மிக்சர்” இதையாவது உபயோகப்

(b)

படுத்தலாம்.

1 வயசு குழந்தைக்கு தடவல் 1-க்கு 5 கி

ரைன் “கிரி கரிஸ் பவுடர்” இதை கொஞ்சம்

(g) (g) (d)

வெந்நீரில் கரைத்துக் கலக்கிக் கொடுத்தால்

மந்தம் அடிபட்டு 1 அல்லது 2 தடவல் மலம்

வெளியாகும்.

(2) சிறு குழந்தைகளுக்கு மந்தம் புளிப்பு

கீங்கி அதோடு சம்பந்தப்பட்ட அற்பக்

காய்ச்சலும் தணிய “ஆல்பா மிக்சர்” செய்

(b)

யும் விதம்

எடுத்துக்கொள்.

எப்ஸம், ஸால்ட்.

கிரைன் 40

மெக் லீஷியா. கார்ப்.

கிரைன் 5

(g)

(b)

ஆக்குவா அனிஸி. சேர்ந்து

அன்வுஸ் 1

ஒன்றுசேர்

மிக்சர்செய்

இதை ஒரே தடவலாகக் கொடுக்கவும். இது

கொடுத்து 4 மணி நேரம்வரை, மலம் கழியா

விட்டால் மறுபடியும் ஒருதடவல் கொடுக்க

லாம்.

(3) ஆகாரம் செமிக்குங் காலத்தில் புளித்
தேப்பம் வருகிறதாய் இருந்தால் அதை
நிறுத்திப் பசி உண்டாக்க:—

எடுத்துக்கொள்

மெக்நீஷியா. கார்ப். கிரைன் 10

(g) (b)

ஸோடா. பை. கார்ப் கிரைன் 10

(d) (b) (b)

டிஞ்சர். ரீயை. கோ துளி 30

ஸ்பிரிட். அமோனியா. அரோமேட்டிக்.

துளி 20

ஆக்குவா. அனிஸி. சேர்ந்து அவுன்ஸ் 1

ஒன்று சேர்

மிக்சர்செய்

இதை ஒரேதடவலாக புளித்தேப்பம் வரும்
போது சாப்பிடவும்.

(110) மெக்நீஷியா, ஸல்பஸ்

(g)

(f)

அல்லது

எப்ஸம். ஸால்ட்

பேதி உப்பு

குணம்:—பர்கட்டிவ்

(g)

அளவு:—½ முதல் 2-டிராம் (அடுத்தடுத்துக் கொடுக்க)

4-முதல் 8-டிராம் (ஒரேதடவல் கொடுக்க)

உபயோகம்:—(1) மலம்வெளியாக, சுக்குக் கஷாயம், இல் லாவிட்டால் நிலவாகைக் கஷாயம் இவை களில் யாதேனும் ஒன்றில் கரைத்துக் கொடுக்கவும்.

குறிப்பிட்ட வியாதிகளுக்காக மற்ற மருந்து கள் சேர்த்து மிக்சர்செய்து கொடுக்கும் போது அதேகாலத்தில் மலமும் வெளியாக வேண்டிய திருந்தால் அவைகளோடு கூட “எப்ஸம்ஸால்ட்” இதையும் வயசுக்குத் தகுந்த அளவில் சேர்த்துக் கொடுக்கலாம்.

(2) மலம் வெளியாக, ‘பிளாக் டிராப்ட்’

(b) (d) (f)

இதையும் உபயோகப்படுத்தலாம். இதைச் செய்வவேண்டிய விதத்தை இப்புஸ்தகத் தின் மூன்றாவது பாகத்தின் முதல் பிரிவில் பார்த்துத் தெரிந்துகொள்ளவும்

(111) மெல். டிபியூராட்டம்

(d)

அல்லது

கடவைத்து வடிகட்டின சுத்தமான தேன்

உபயோகம்:—(1) இது முக்கியமாய் குழந்தைகளுக்கு தூ ளான மருந்துகள் குழப்பிக் கொடுக்க உத வும்.

(2) ‘போராக்ஸ்’ அல்லது வெண்காரம்

(b)

1 பங்கும் ‘தேன்’ 8 பங்கும் நன்றாய்க்

குழப்பி ஒன்று சேர்த்துக்கொண்டு, வாய்ப்பு
புண், உதடுவெடிப்பு, பால் காம்பு ரணம்
இவைகளுக்கு நாள் 1-க்குப் பல தடவல்
மேல் தடவலாம். குழந்தைகள் வாயில் பட்
டாலும் குற்றமில்லை.

(3) சுடுகிற எண்ணெய், தண்ணீர், ஆவி,
நெருப்பு இவைகள் பட்டுவிட்டால், அந்த
நிமிஷமே கொப்பளம் ஆகவொட்டாமல்
தடுக்க தேனை மேல் தடவலாம் என்பது யா
வர்க்கும் தெரிந்த விஷயமே.

(1) ஆக்ளெமேல்.

செய்யும் விதம்:—

ஆஸிட்டிக். ஆஸிட். அவுன்ஸ் 1

(d)

மேல். டிபியூராட்டம். அவுன்ஸ் 8

(d)

ஆக்குவா. அவுன்ஸ் 3

இவைகளை ஒன்று சேர்த்து வைத்துக்கொள்
ளவும்.

குணம்:—எக்ஸ்பெக்டோரேன்ட்

அளவு:—1 முதல் 2 டிராம்

(2) ஆக்ஸிமேல் ஸில்லி.

குணம்:—எக்ஸ்பெக்டோரேன்ட்

அளவு:— $\frac{1}{2}$ முதல் 2 டிராம்

உபயோகம்:—இதை மட்டும் தனிமையாக உபயோகிப்பதை
விட, தொண்டைப் புகைச்சலை நிறுத்த
செய்து கொடுக்கப்படுகிற மிக்சரில் மற்ற
மருந்துகளோடு இதையும் சேர்த்துக்

கொடுப்பது நல்லது தொண்டைப் புதைச்
சலை நிறுத்த:—

எடுத்துக்கொள்

அமோனியா. கார்ப். கிரான் 10

(b)

டிஞ்சர். ஸெனிகா. துளி 45

(g)

வைனம். இப்பிக்காக் துளி 30

ஆக்ஸிமெல். வில்லி. துளி 90

ஆக்குவா சேர்ந்து அவுன்ஸ் 3

ஒன்றுசேர்

மிக்சர்செய்

தடவல் 1-க்கு 1-அவுன்ஸ் ஊதம் நாள் 1-க்கு
3-தடவல் கொடுக்கவும்.

(112) மெந்தா. பிப்பரிட். ஒலியம்,

பெப்பர்மின்ட் ஆயில்.

குணம்:—(1) கார்மினேட்டிவ் (2) ஆன்டி. ஸ்பாஸ் மோடிக்

(d)

அளவு:—½ முதல் 3 துளி

உபயோகம்:—(1) வயிற்றுப் பொதுமல், வயிற்றுவலி, புளித்
தேப்பம், சத்திப்பு, அஜீரணத்தால் ஏற்படும்
வாய்வுக் குத்து இவைகளுக்கு 1 அல்லது
2 துளி கொஞ்சம் சீனியில் கலந்து கொடுக்க
வும். மறுபடியும் கொடுக்கவேண்டிய அவ
சிய மிருந்தால் 1-மணி நேரம் கழித்துக்
கொடுக்கவும்.

(2) மண்டை இடி, ஒருத்தலை இடி இவை
களுக்கு வலியுள்ள இடத்தில் அழுத்தி
மேல் தேய்க்கலாம்.

(1) ஆக்குவா. மெந்தா. பிப்.

அல்லது

பெப்பர் மின்ட் ஆயில் கலந்த தண்ணீர்

செய்யும்விதம்:—1 அவுன்ஸ் தண்ணீருக்கு $\frac{1}{2}$ துளி “பெப்பர்
மின்ட் ஆயில்” வீதம் முதலில் சீசாவில்
விட்டு பிறகு தண்ணீர் விட்டு நன்றாய்க்
குலுக்கி வைத்துக் கொள்ளவும்.

குணம்:—பெப்பர்மின்ட் ஆயிலுக்குள்ளது.

அளவு:—1 முதல் 2 அவுன்ஸ்

(2) ஸ்பிரிட். மெந்தா

செய்யும்விதம்:— $\frac{1}{2}$ அவுன்ஸ் “பெப்பர்மின்ட் ஆயில்” இதோடு
 $4\frac{1}{2}$ அவுன்ஸ் “ரேக்டிபைட் ஸ்பிரிட்” சேர்
த்து நன்றாய்க் குலுக்கிக் கொள்ளவும்.
இது தண்ணீரில் மிதக்காமல் நன்றாய் ஒன்று
சேர்ந்து கொள்ளும்.

குணமும் உபயோகமும்:— பெப்பர்மின்ட் ஆயிலுக் குள்ளது.
அளவு:—5 முதல் 20 துளி (1 அவுன்ஸ் தண்ணீரில் விட்டுக்
கொடுக்கவும்)

(3) எஸன்ஸ். பெப்பர்மின்ட்

செய்யும்விதம்:— $\frac{1}{2}$ அவுன்ஸ் “ஆயில் பெப்பர்மின்ட்”
இதோடு 2 அவுன்ஸ் “ரேக்டிபைட் ஸ்பி

(f)(d)

ரிட்" சேர்த்துக் குலுக்கிக் கொள்ளவும்.

இதுவும் தண்ணீரில் கலந்துகொள்ளும்.

பணமும் உட்யோகமும்:—பெப்பர்மின்ட் ஆயிலுக்குள்ளது.

அளவு:—2 முதல் 10 துளி 1 அவுன்ஸ் தண்ணீரில் சேர்த்துக் கொடுக்கவும். அஜீரணம், வயிற்றுப் பொதுமல், புளித்தேப்பம் இதோடு சம்பந்தப்பட்ட வயிற்றோட்டம் இவைகளுக்குக் கொடுக்க:—

10 கிரான், 'சோடா உப்பை' $\frac{1}{2}$ அவுன்ஸ்
(d)

தண்ணீரில் கரைத்து இதில் 1 துளி "பெப்பர்மின்ட் ஆயில்" 10 துளி "ஸ்பிரிட் குளோரோ பார்ம்" சேர்த்துக் கரைத்து

(f)

ஊற்றி அதோடு 20 துளி "டிஞ்சர் கார்டம்

(d)

கோ'வும் 20 துளி "ஸ்பிரிட் அமோனியா அரோமேட்டிக்" கும் சேர்த்து எல்லாம் சேர்ந்து 1 அவுன்ஸ் ஆகும்வரை போதுமான தண்ணீர் சேர்த்துக் கொள்ளவும்.

இப்படி நாள் 1 க்கு 3 தடவல் கொடுக்கவும்.

குறிப்பு:—இதற்கு "கார்மினேட்டிவ். மிக்சர்" என்ற பெயர்.

(113) மெந்தால்

பெப்பர்மின்ட் கிரீஸ்ட்டல்

பெப்பர்மின்ட் உப்பு.

இதற்கு "புகையிலைச் சத்து" என்றும் பெயர் வழங்கி வருகிறது.

அளவு:— $\frac{1}{2}$ முதல் 2 கிரான்

உபயோகம்:—(1) மண்டை இடிக்கு வலியுள்ள இடத்தில் அழுத்தித் தேய்க்கலாம்.

(2) பல்வலி, பல் அரண், ஈறுகட்டி வலி வேதனை இருத்தல் இவைகளுக்கு வலி உள்ள இடத்திலும் அரண், கட்டி இவைகள் இருக்கிற இடத்திலும் வைக்கலாம்.

(2) அஜீரணம், வயிற்றுப் பொதுமல், வயிற்றுவலி, புளித்தேப்பம் இவைகளுக்கு தடவல் 1 க்கு 1 கிரான் கொடுக்கலாம்.

குறிப்பு:—தற்காலம் இதை விசேஷமாய் வெற்றிலை போடும் போது தடவல் 1 க்கு 1 கிரான் சேர்த்து உபயோகப்படுத்தி வருகிறார்கள்.

(114) மார்பைன். ஐட்ரோ குளோரைட்

(f) (h) (d)

இது 'அபினில்' இருந்து எடுக்கப்படுகிறது.

குணம்:—(1) நாரக்கோட்டிக் (2) அனோடைன் (d)

அளவு:— $\frac{1}{8}$ முதல் $\frac{1}{2}$ கிரான்

(1) லைக்கர். மார்பைன். ஐட்ரோ குளோரைட் (f) (h)(d) (d)

செய்யும்விதம்:—2 அவுன்ஸ் 'மிடிக்கக்கடிய 'டெஸ்ட் டியூப்' இல் $\frac{1}{2}$ அவுன்ஸ், 'டிஸ்டில்ட். வாட்டரும்,' (d)

$\frac{1}{2}$ அவுன்ஸ் "ரேக்டிபைட் ஸ்பிரிட்மீம்" (f)(d)

ஒன்றுசேர்த்து அதில் 8½ கிரான் மார்பைன்
ஐட்ரோகுளோரைட் போட்டு 'ஸ்பிரிட்.

(h)(d) (d)

விளக்கில் ' நன்றாய்க் கொடுக்கவைத்து,
" மார்பைன். ஐட்ரோகுளோரைட். " பூர

(h)(d) (d)

வும் கரைந்தபிறகு அதோடு 19 துளி 'டைலி'
(d)

யூட். ஐட்ரோகுளோரிக். ஆஸிட் " சேர்த்து
(h)(d) (d)

எல்லாம் சேர்ந்து 2 அவுன்ஸ் ஆகும் வரை
" டிஸ்டில்ட். வாட்டர் " சேர்த்துக்கொள்ள
வும்.

குணம்:—(1) நார்க்கோட்டிக் (2) அனோடைன்
(d)

அளவு:—10 முதல் 60 துளி

உபயோகம்:—(1) இதை நோயாளிகளுக்கு இரவில் தூக்கம்
உண்டுபண்ண 1 அவுன்ஸ் தண்ணீரில் 30
துளி சேர்த்துக் கொடுக்கலாம்.

(2) அஜீரணத்தோடு, வயிற்றுவலியும், குன்
மமும் இருந்தால்:—

எடுத்துக்கொள்

பிஸ்மத் ஸப். ரைட்ரஸ்.

கிரான். 15

(b) (b)

ஸோடா. பை. கார்ப்.

கிரான். 30

(d) (b) (b)

கம். அக்கேஷியா.

கிரான். 45

(g)

டிஞ்சர். ஜென்ஷன். கோ.

துளி. 45

லைக்கர். மார்பைன். ஐட்ரோகுளோடைட்.

(f) (h)(d) (d)

துளி 30

ஆக்குவா. சேர்ந்து.

அவுன்ஸ். 3

ஒன்றுசேர்

மிக்சர் செய்

தடவல் 1 க்கு 1 அவுன்ஸ் வீதம் நாள் 1க்கு

3 தடவல் ஆகாரத்துக்குப்பின் கொடுக்கவும்.

குறிப்பு:—மருந்து கொடுக்கும்போது ஒவ்வொரு தடவலும் குலுக்கிக்கொண்டு கொடுக்கவும்.

(2) இன்ஜெக்ஷன். மார்பைன். ஐப்போ. டேர்மிக்கா

(f) (h) (d)

சேய்யும் விதம்:—நன்றாய் கொதிக்கவைத்து ஆரவைத்து,

110 துளி தண்ணீரில் 5 கிளைன் “மார்பைன்

(f)

டார்ட்ரேட்” இதைக் கரைத்துக்கொள்ளவும்.

உபயோகம்:—‘ஐப்போ. டேர்மிக். ஸீரிஞ்சு’ என்னும் கருவி

யின் ஊசியின் வழியாய் ரத்தக்குழலில்

குத்தி ரொத்தத்தில் பாவச்செய்யலாம்.

இப்படிச்செய்வதற்கு தடவல் 1 க்கு

அளவு:—2 முதல் 5 துளி

குறிப்பு:—தனி “மார்பியா” வை இவ்விதம் செய்வதால்

(f)

ஏற்படுகிற அபாயங்களை உண்டாக வொட்

டாமல் தடுக்க தற்காலம் “அட்ரோபைன்”

சேர்ந்திருக்கிற “இன்ஜெக்ஷன். மார்பைன்”

(f)

ஐபோடெர் மிக். டேப்ளாய்ட்ஸ்” இதை
(b) (d) (b) (d)

உபயோகப் படுத்தலாம்.

கால்ரா என்னும் விஷபேதி கண்டிருக்கையில் கால்ராவை உண்டாக்குகிற விஷப்பூச்சி கூளை முதலில் வெளிக்குப் போகக்கூடிய மருந்துகளைக் கொடுத்து வெளியாக்கின பின்பு, மேல் சொல்லிய “அட்ரோபைன்” சேர்ந்திருக்கிற “இன்ஜெக்ஷன். மார்பைன்.

(f)

ஐபோ. டேர்மிக். டேப்ளாய்ட்ஸ்” இதை
(b) (d) (b) (d)

தற்காலம் விசேஷமாய்த்தேர்ந்த இங்கிலீஷ் வைத்தியர்கள் கையாடி வருகிறார்கள்.

(115) மாஸ்க்கவ்ஸ்—(மவ்க்)

கஸ்தூரி

குணம்:—(1) ஆன்டி ஸ்பாஸ்மோடிக் (2) ஸ்டிமியூலேன்ட்

அளவு:—5 முதல் 10 கிரான்

(1) டிஞ்சர். மஸ்க்

கஸ்தூரி திராவகம்

உபயோகம்:—இதை ஜந்திராத்துக்கும், நாடிகளில் சூடுண்டாக்கவும் சுவாசம் சரியானபடி வாங்கவும், விடவும், சூதக ஜந்திக்கும், கபத்துக்கும் உபயோகப் படுத்தலாம். தடவல் 1 க்கு 20 துளி கொடுக்கலாம்.

(116) டர்

(1) டிஞ்சர் டர்

குணம்:—எம்மனகாக்

(ஜ)

அளவு:—30 முதல் 60 துளி 'கம் அக்கேஷியா'வோடு சேர்த்
தரைத்துக் கொடுக்கவும்.உபயோகம்:—மாதவிடாய்—(சூதகம்) சரியானபடி பட,
'ஆலோஸ்' சேர்த்திருக்கிற 'பில். ஆலோஸ்
எற்றம்' என்ற மாதத்திரையில் தடவல் 1-க்கு
4 கிரான் வீதம் நாள் 1 க்கு 2 தடவல்
ஆகாரத்துக்குப் பின் கொடுக்கலாம்.

அல்லது

எடுத்துக்கொள்

டிஞ்சர். ஆலோஸ். எற். மற். டிராம் 1

ஸைக்கர். ஸ்ட்ரிக்ளைன். ஐட்ரோ குளோரைட்

(h)(d)

(d)

துளி 6

ஸ்பிரிட். குளோரோபார்ம்.

துளி 30

(f)

ஆக்குவா. சேர்ந்து

அவுன்ஸ் 3

ஒன்றுசேர்

மிக்சர்செய்

தடவல் 1-க்கு 1 அவுன்ஸ் வீதம் நாள் 1-க்கு

3-தடவல் ஆகாரத்துக்குப்பின் கொடுக்கவும்.

குறிப்பு:—இதை வீட்டு விலக்கத்துக்கு 3 நாளைக்கு முன்

கொடுக்கவும்.

(117) மொர்ரே ஓலியம்

காட் லிவர் ஆயில்

(d)

மீன் எண்ணெய்

“காட்” என்னும் ஒருவகைமீனின் “லிவர்”

(d)

என்னும் பித்தாசயத்திலிருந்து எடுக்கப்படு

கிற “ஆயில்” எண்ணெய் ஆகையால் இதற்கு

“காட் லிவர் ஆயில்” என்று பெயராயிற்று.

(d)

குணம்:—டானிக்

அளவு:—1 முதல் 4 டிராம் சுடுகிறபாலில் கலக்கிக் கொடுக்க
வும்.

உபயோகம்:—தேகத்தில் ரத்தக்குறைவுக்கும், வாட்சிக்கும்,
குழந்தைகளுக்கு கண்ச்குட்டுக்கும், நரம்பு,
தாது பலயினத்துக்கும், ரத்த அசுத்தத்
தால் உண்டாகும் மேகப்புண்கள், கண்ட
மாலை முதலிய துர்நீர் வியாதிகளைக் குண
மாக்கவும், தேகபுஷ்டி உண்டாகவும் கொ
டுக்கலாம்.

“காட் லிவர் ஆயில்” கொடுக்கும்போது

(d)

கவனிக்கவேண்டிய முக்கியமான விஷயங்க
ளாவன:—

- (1) ஜீரணக் கருவிகளாகிய வயிறு, குடல்
முதலியவைகள் சரியான நிலைமையில் ஜீரண
சக்தியில் யாதொரு குறைவும் இல்லாமல்

இருக்கவேண்டும். வயிற்றோட்ட முள்ளவர் களுக்குக் கொடுக்கக்கூடாது.

- (2) குறைந்த அளவில் அதாவது தடவல் 1-க்கு 1-தேக்காண்டி அளவு கொடுத்து இந்த அளவு தேகத்துக்குப் பிடித்துக்கொண்டால் மட்டும், கொஞ்சம் கொஞ்சமாய் 1 மாதத்துக்கொரு தடவல் 1 தேக்காண்டி அதிகமாய்ச்சேர்த்து, தடவல் 1-க்கு 4-தேக்காண்டி அளவு சாப்பிடுகிற வரைக்கும் கொடுத்து நிறுத்திக்கொள்ளவும்.

இடை இடையே, அஜீரணமாவது வயிற்றோட்டமாவது ஏற்பட்டால் உடனே நிறுத்திக்கொள்ளவும். குணமான பின்பு திரும்பக் கொடுக்கவும்.

- (3) தேகத்துக்குப் பிடித்துக் கொள்ளவும், அருவருப்பை நீக்கவும் 15-நாள்கு இரவில் மட்டும் தூக்கத்திலேயே தெரியாமல் போகும்படி கொடுத்து, பிறகு 1 மாசம்வரை மத்தியானமும், இரவுமாக நாள் 1-க்கு 2 தடவல் கொடுத்து இது தேகத்துக்குப் பிடித்துக் கொண்டால் மட்டும் நாள் 1-க்கு 3 தடவல் இரண்டாம் மாதத்தில் கொடுக்கவும்.

- (4) சிலர் கொடுக்கிறதுபோல, ஆகாரம் சாப்பிட்டவுடனே “மீன் எண்ணை” யைக் கொடுக்கக்கூடாது. ஆகாரம் சாப்பிட்டு 1 மணி நேரம் கழித்துத்தான் கொடுக்கவேண்டும். ஏப்பம் வருங்காலத்தில் வீச்சத்தை மறைக்க எலுமிச்சம்பழவிலை, அல்லது

பெப்பர்மின்ட் வாயில் ஒதுக்கிக் கொள்ள
லாம்.

- (1) சிறு குழந்தைகளுக்கு கணைச்சூடு, தேக
வாட்சி, சோகை இவைகள் நீங்கிக்கொடுக்க
வேண்டிய காட் லிவர் ஆயில்கள் ஆவன:—

(d)

- (1) “கெப்ளர்ஸ். ஸொலியூஷன். காட்லிவர்.

(d)

ஆயில். இன், மால்ட். எக்ஸ்ட்ராக்ட்.”

- (2) “ஸ்காட்ச். எமல்ஷன். காட் லிவர். ஆயில்”

(d)

- (3) “மால்ட்டின். காட். லிவர். ஆயில்”

(d)

- (4) “பைனால். காட். லிவர். ஆயில்”

(b)

(d)

- (5) “கெப்ளர்ஸ். ஸொலியூஷன். காட்லிவர்.

(d)

ஆயில். இன். மால்ட். எக்ஸ்ட்ராக்ட். வித்.

ஐப்போ பாஸ்பைன்.”

(h)

(f)

(f)

- (6) “கிரீம். ஆப். மால்ட். காட். லிவர் ஆயில்.

(f)

(d)

வித். ஐப்போ. பாஸ் பைட்”

(h)

(f)

(f)

- (2) பெரியவர்களுக்கு சேகத்தில் வலுவைக்
கொடுத்து தாது பலயினத்தை மாற்றி தே
கத்துக்குப் பலத்தைக் கொடுக்க உபயோகப்
படுத்த வேண்டிய “காட். லிவர். ஆயில்”

(d)

களாவன:—

(1) “உஜான்ஸ் காட் விவர் ஆயில்”

(d) (d)

(2) “பர்காயின்ஸ் பியூர் காட்விவர்.

(b)(g) (d)

ஆயில்”.

(3) “கெப்ளர்ஸ் ஸொலியூஷன். பியூர் காட்.

(d)

விவர். ஆயில்”.

(4) “கெப்ளர்ஸ் ஸொலியூஷன். காட். விவர்

(d)

ஆயில். இன். மால்ட். எக்ஸ்ட்ராக்ட். வித்.
ஐப்போ பாஸ்பைட்”

(h) (f) (f)

(5) “கிரீம். ஆப். மால்ட். காட். விவர் ஆயில்.

(f) (d)

வித். ஐப்போ. பாஸ்பைட்ஸ்”.

(h) (f) (f)

(3) கண்டமாலை, குலை முதலிய துர்கீர் வியாதி

கள் குணமாகச் சாப்பிடவேண்டிய “காட்.

விவர். ஆயில்” களாவன:—

(1) “உஜான்ஸ் காட் விவர் ஆயில்” இதோடு

(d) (d)

தடவல் 1-க்கு 30 துளி “விவர் பெர்ன்சை

(f)

அயோடைட் சேர்த்துக் கொள்ளவும்.

(d)(d)

(2) “கெப்ளர்ஸ் ஸொலியூஷன் காட் விவர்

(d)

ஆயில் இன். மால்ட் எக்ஸ்ட்ராக்ட் வித்
அயர்ன் அயோடைட்.”

(d)(d)

(3) “ஸ்டெர்ன்ஸ். ஒயின் காட் லிவர் ஆயில்
(d)

(4) சுஷ்ரோகிகள் சாப்பிடவேண்டிய “காட்
(d)

லிவர் ஆயில்” களாவன:—

(1) “டீ ஜான்ஸ். காட் லிவர் ஆயில்
(d) (d)

(2) “கிரீம் ஆப். மால்ட். காட். லிவர் ஆயில்.
(f) (d)

வித். ஐபோ பாஸ்பைட். ஆன்ட் கிரியா
(h) (f) (f) (d)
லோட்”

(3) கிரியாலோட்டெட். எம்ஷன். காட்
(d) (d)
லிவர். ஆயில்”

(118) நாப்தால்

(f)

பீட்டா. நாப்தால்

(b) (f)

இது குடல்களுக்குள் உண்டாகும் விஷத்
தன்மையை நீக்கி அதன் மூலமாய் ஜீரண
சக்தியை உண்டு பண்ணி, கிராணி, நாள்
பட்ட வயிற்றோட்டம் இவைகளை நிறுத்தும்.

அளவு:—3 முதல் 10 கிரான். (மாத்திகைகளாகச் செய்து
கொடுக்கவும்) “நாப்தால் மாத்திரைகள்”

(f)

செய்யும் விதம்:—

எடுத்துக்கொள்

நாப்தால்

கிரான் 40

(f)

டிஸ்பென்ஸிங். ஸிரப். போதுமான அளவு
(d) ஒன்றுசேர்

12-மாத்திகைகளாகப் பிரித்துக்கொண்டு தடவல் 1-க்கு 1-மாத்திரை விதம் நாள் 1-க்கு 3-தடவல் ஆகாத்துக்கு $\frac{1}{2}$ மணி நோத்துக்கு முன் கொடுத்து கொஞ்சம் தண்ணீருடன் விழுங்க வேண்டும்.

இந்தச்சமயம் கொடுக்கிற ஆகாரம் லெகுவாய்ச் சீரணமாகக் கூடியதாய் இருக்க வேண்டும். பிறகு ஆகாத்துக்குப்பின் ‘ஈலட்ஸ்
(h)

பெப்ஸின். மிக்சர்’ ஒவ்வொரு தடவலும் நன்றாய்க் குலுக்கிக் கொண்டு இதில் தடவல் 1-க்கு 30-துளி, 1 அவுன்ஸ் தண்ணீரில் கலந்து கொடுக்கவும். இப்படிச் செய்து வந்தால் நாள்பட்ட வயிற்றோட்டம், கிராணி, அன்னத் துவேஷம் இவைகள் தீரும்.

குறிப்பு:—‘டிஸ்பென்ஸிங் ஸிரப்’ என்றால் சமபாகம், “மியூ
(d)

ஸிலேஜ் அக்கேஷியா” “கிளிஸெரின்”
(g)

“ஸிம்பிள் ஸிரப்” இந்த மூன்றாம் ஒன்
ராய்க் கலந்தது.

(119) நக்ஸ். வாமிக்கா

எட்டிக்கோட்டை

இது கசப்புள்ள, விஷமான கொட்டை

குணம்:—டானிக்

அளவு:—1 முதல் 4 கிரான் (பொடி பண்ணின் தூள்) ஆனால்
இவ்விதமாய் உபயோகப்படுத்தாமல் மாத்
திரை ரூபமாகவும், திராவக ரூபமாகவும்
விசேஷமாய் உபயோகப்படுத்தப்பட்டு வரு
கிறது.

(1) எக்ஸ்ட்ராக்ட். நக்ஸ்வாமிக்கா

அளவு:— $\frac{1}{4}$ முதல் 1 கிரான்

உபயோகம்:—(1) தாதுபலத்திற்கு:—

எடுத்துக்கொள்.

எக்ஸ்ட்ராக்ட். நக்ஸ், வாமிக்கா, கிரான் 3

எஸ்ட்ராக்ட். ஜென்ஷன். கிரான் 30

ஒன்று சேர்

12 மாத்திரைகளாகப் பிரித்துக்கொண்டு

தடவல் 1 க்கு 1 மாத்திரை வீதம் நாள் 1க்கு

3 தடவல் ஆகாரத்துக்குப்பின் கொடுக்கவும்

(2) மலச்சிக்கலை நீக்கக் கொடுக்கிற “எக்ஸ்ட்

ராக்ட். காஸ்காரா. ஸாக்ரடா” வேடு தட

(g)(d)

வல் 1-க்கு $\frac{1}{2}$ கிரான் வீதம் எக்ஸ்ட்ராக்ட்.
நக்ஸ். வாமிக்கா” வையும் சேர்த்து மாத்தி
நாயாகச் செய்து கொடுக்கலாம்.

(2) டிஞ்சர். நக்ஸ். வாமிக்கா
எட்டிக்கோட்டைத் திராவகம்

அளவு:—5 முதல் 15 துளி

உபயோகம்:—(1) இதையும் மலச்சிக்கலை நீக்கக்கொடுக்கிற
“எக்ஸ்ட்ராக்ட். காஸ்காரா. ஸாக்ரடா, லிக்கு
(g)(d)

விட்” என்னும் மருந்துடன் தடவல் 1-க்கு
(d)

10 துளி சேர்த்து இரவில் 1 பொழுது
கொடுக்கலாம்.

(2) தாது நரம்புகளுக்கும் பலம் கொடுக்க:—

எடுத்துக்கொள்

டிஞ்சர் நக்ஸ் வாமிக்கா துளி 15
எக்ஸ்ட்ராக்ட். டாமியானா, லிக்குவிட்
(d) (d)

துளி 90
விரப். ஸிம்பின் டிராம் 1½

இன்பியூஷன். குவாஷியா. சேர்ந்து
(f) அவுன்ஸ் 1½
ஒன்றுசேர்

மிக்சர்செய்

தடவல் 1 க்கு $\frac{1}{2}$ அவுன்ஸ் வீதம் நாள்
1-க்கு 3 தடவல் ஆகாரத்துக்குப் பின்
கொடுக்கவும்.

(120) நார்க்கோட்டைன்

இது “அபினி” விருந்து எடுக்கப்படுகிறது. ஆனால் “அபினி” ப்போல் மயக்கத்தையாவது தூக்கத்தையாவது உண்டு பண்ணுகிற தில்லை

உபயோகம்:—‘கோய்ஞ’ “ஆர்ஸனிக்” கொடுத்தும் நிற்காத மலைக்காய்ச்சல், குளிர் காய்ச்சல்களுக்கும் “ஆன்டிபைரின்” கொடுத்தும் நிற்காத மண்டையிடியை நிறுத்தவும் தடவல் 1 க்கு 2 முதல் 4 கிரான் நாள் 1 க்கு 4 தடவல் கொடுக்கலாமெனத் தீர்மானிக்கிறார்கள்.

(121) ஒப்பியம்

அபின்

குணம்:—நார்க்கோட்டிக்

அளவு:— $\frac{1}{2}$ முதல் 2 கிரான்

(1) லினிமென்ற். ஒப்பியம்

செய்யும்விதம்:—சரிபாகம் “லினிமென்ற், ஸப்போனிஸ்” “டிஞ்சர் ஒப்பியம்” இந்த இரண்டும் ஒன் ருய்க்கலந்தது.

உபயோகம்:—இதை வெனிப்பிரயோகமாக, வாத உளைச்சல், இடுப்பு வலி, இவைகளுக்கு வலி உள்ள இடத்தில் நன்றாய் அழுத்தித் தேய்க்கவும். நாள் 1 க்கு 2 அல்லது 3 தடவல் தேய்க்க

ஸாம். தைலம் தேய்த்தவர்கள் கையை
நன்றாய்ச் சுத்தம் செய்யவேண்டும்.

(2) பல்விஸ். கிரிட்டா. அரோமேட்டிக் கம். ஒப்
பியம். 40 கிரான் மருந்தில் 1 கிரான்
“அபின்” இருக்கிறது.

குணம்:—(1) கார்மினேட்டிவ் (2) ஆன்டிரிஞ்சென்ற்

அளவு:—10 முதல் 40 கிரான்

உபயோகம்:—வயிற்றழைச்சல், கடுப்பு, இவைகளுக்குக்
கொடுக்க:—

எடுத்துக்கொள்

பல்விஸ். கிரிட்டா. அரோமேட்டிக். கம்
ஒப்பியம். கிரான் 45

பிஸ்மத் ஸப். கைட்ரஸ் கிரான் 15

(b) (b)

ஒன்றுசேர்

3 பொட்டணமாக மடித்துக்கொண்டு தட
வல் 1 க்கு 1 பொட்டணம் வீதம் நாள்
1 க்கு 3 தடவல் தேனில் கலந்து கொடுக்க
வும்

(3) பல்விஸ். இப்பிக்காக்கோ.

இதற்கு “டோவார்ஸ் பவுடர்” என்றும்
(d) (d)

பெயர்.

10 கிரான் மருந்தில் 1 கிரான் “அபின்”
இருக்கிறது.

அளவு:—5 முதல் 15 கிரான்

உபயோகம்:—இதையும் வயிற்றழைச்சலுக்குக் கொடுக்கலாம். வயிற்றழைச்சலுக்குக் கொடுக்க:—

எடுத்துக்கொள்

டோவார்ஸ். பவுடர். கிரான் 15

(d) (d)

காலிக். ஆஸிட், கிரான் 15

(g) (d)

ஒன்றுசேர்

3 பொட்டணமாக மடித்துக்கொண்டு தடவல் 1 க்கு 1 பொட்டணம் வீதம் நாள் 1 க்கு 3 தடவல் ஆகாரத்துக்குப்பின் கொடுக்கவும். “பார்லிமாவு” கஞ்சியில் பால் சேர்த்துக் கொடுக்கவும்.

(4) பல்விஸ். கைனோ. கோ

20 கிரான் மருந்தில் 1 கிரான் “அபின்” இருக்கிறது.

குணம்:—ஆஸ்டிரிஞ்சென்ட்

அளவு:—5 முதல் 20 கிரான்

உபயோகம்:—இதையும், வயிற்றழைச்சல் மூலத்தால் ரத்தம்போகுதல் இவைகளை நிறுத்தக் கொடுக்கலாம்.

(5) டிஞ்சர். காம்ப்ரர். கோ

(f)

1 அவுன்ஸ் மருந்தில் 2 கிரான் “அபின்”

இருக்கிறது,

குணம்:—(1) அனோடைன் (2) எக்ஸ்பெக்டோரென்ட்

அளவு:— $\frac{1}{2}$ முதல் 1 டிராம்

உபயோகம்:—தொண்டைப்புடைக்கலை நிறுத்த:—

எடுத்துக்கொள்

டிஞ்சர் காம்ப்ர. கோ. துளி 60

(f)

ஸோடா. பை கார்ப். கிரான் 30

(d) (b) (b)

வைனம். இப்பிக்காக். துளி 30

ஆக்குவா. சேர்ந்து அவுன்ஸ் 3

ஒன்றுசேர்

மிக்சர் செய்

தடவல் 1-க்கு 1 அவுன்ஸ் வீதம் நாள் 1க்கு

3 தடவல் கொடுக்கவும்.

(6) டிஞ்சர் ஒப்பியம்

அபின் திராவகம்

இதற்கு “லாடனம்” என்றும் பெயர். 15

(d)

துளி மருந்தில் 1 கிரான் “அபின்” இருக்கிறது.

குணம்:—(1) நாரக்கோடிக் (2) அனோடைன்

(d)

அளவு:— $\frac{5}{8}$ முதல் 15 துளி (அடுத்தடுத்துக் கொடுக்க) 20

முதல் 30 துளி (ஒரே தடவல் கொடுக்க)

உபயோகம்:—(1) இதை இரவில் தூக்கம் வராத வியாதி

யஸ்தர்களுக்குத் தூக்கம் உண்டுபண்ணக்

கொடுக்கலாம். ஆனால் இது மலத்தைக்

கட்டும்.

(2) காதுக்குத்து, வலி இவைகளுக்கு:—
எடுத்துக்கொள்

டிஞ்சர். ஒப்பியம். துளி 10

கிளிஸெரின். துளி 10

(g)

ஒன்றுசேர்

நன்றாய் இந்த இரண்டையும் ஒன்று
சேர்த்துக்கொண்டு குத்து, வலியுள்ள
காதுக்குள் ஊற்றிப் பஞ்சுவைத்து அடை
த்து வைக்கவும்.

(7) அங்குவன்டம். காலா. கம். ஒப்பியம்

(g)

செய்யும்விதம்:—மாயக்காய்த்துள் கிரான் 120

வாஸலைன் அவுன்ஸ் 1

ஒப்பியம் கிரான் 45

இந்த மூன்றையும் ஒன்று சேர்த்துக் கழிம்
பாகச் செய்து கொள்ளவும்.

உபயோகம்:—இதை வெளிப்பிரயோகமாக மூல முளையில்
பொத்தம்படுதலோடு வலி வேதனையும் இருந்
தால் உபயோகப்படுத்தலாம்.

குறிப்பு:—“அபின்” சேர்ந்த மருந்துகளை ஒரு வயசுக்
குன்பட்ட குழந்தைகளுக்குக் கொடுக்கக்
கூடாது.

(122) ஓடால்

(d)

இதில் கொஞ்சம் எடுத்து ஒரு தமிழர் தண்ணீரோடு, கலந்து சொத்தைப்பல், குழி விழுந்த பல் இவைகளில் உண்டாகிற புழுக்களைக் கொன்று அதன் மூலமாய் அவைகளால் உண்டாகிற பல் குடைச்சல், பல்வலி இவைகளைக் குணமாக்க வாய் கொப்பளிக்க உதவும்.

(123) பாராபினம். மோலி

(f)

அல்லது
வாஸலைன்

இது வெண்மையாகவாவது அல்லது மஞ்சள் நிறமாகவாவது இருக்கிற கழிம்பு.

உபயோகம்:—(1) இதைப் பருக்கள், வேனல் கொப்பளங்கள், தீப்பட்ட புண்கள், காப்பரீர், பொடிப்புகள் இவைகளுக்கு மேல் தடவலாம். அல்லது “பொம்மேட். வாஸலைன்” என்பதை

(d)

யாவது மேல் காட்டியவைகளுக்கு உபயோகப்படுத்தலாம்.

(2) மற்றக் கழிம்புகள் செய்வதற்கும் இது துணைக்கழிம்பாக இருக்கிறது.

(3) மேகப்புண்ணுக்கு 1 டிராம் “வாஸலைன்” இதோடு 2 துளி “கார்பாலிக் ஆஸிட்”

(d)

சேர்த்து நன்றாய் “போலஸ். கத்தியால்”
 “ஸிலாப்” பில் தேய்த்துக்கொண்டு இதில்
 கொஞ்சம் எடுத்து காலை மாலை தடவி வைத்
 திருந்து பின்பு “கார்பாலிக். ஸோப்”
 கொண்டு சுத்தம் செய்துவாவும்.

(124) பாராட்டி ஐடம்.

(d) (h)(d)

இது தெளிவானதும், அருவருப்பான வீச்சு
 முள்ளதும், தண்ணீர் போன்ற மருந்து.

குணம்:—இப்படிக்க

(h)

அளவு— $\frac{1}{2}$ முதல் 2 டிராம்

உபயோகம்:—இதைத் தூக்கம் வராதவர்க்குத் தூக்கம்
 உண்டுபண்ணக் கொடுக்கலாம்.)

இது இருதயத்தை ஒன்றும் சேட்டை
 செய்யாது.

இதை முக்கியமாய்ப் பயித்தியக்காரர்களுக்குத்
 தூக்கம் உண்டுபண்ணக் கொடுக்கலாம்.
 மற்றும் வேறு எந்தக்காரணத்தினாலும் தூக்
 கம் வராமல் இருந்தாலும் தூக்கம் உண்டு
 பண்ணக் கொடுக்கலாம்.

இதன் அருவருப்பான வீச்சுத்தையும், ருசி
 யில்லாம விருப்பத்தையும் மாற்ற, “ஆக்குவா.
 மெந்தா. பிப்” “ஸிரப். ஸிம்பிள்” இந்த
 இரண்டும் சேர்த்துக் கொடுக்க வேண்டும்.

தூக்கம் உண்டுபண்ண:—
எடுத்துக்கொள்

பாராட்டி. ஐடம்.

டிராம் 1

(d) (h)(d)

ஸிரப். ஸிம்பிள்

டிராம் 1

ஆக்குவா மெந்தா பிப். சேர்த்து அவுன்ஸ் 1

ஒன்றுசேர்

மிக்சர் செய்

இதை ஒரே தடவலாகப் படுக்கைக்குப்
போகும்போது கொடுக்கவும்.

(125) பெப்ஸின்.

பெப்ஸின்

இது மஞ்சள் நிறமும் தவிட்டு நிறமுமான
லேசான தூள்.

குணம்:—டைஜெஸ்டிவ்

(d)

அளவு:—5 முதல் 10 கிரான்

2 முதல் 5 கிரான் (பர்காய்ன்ஸ் - பெப்

(b)(g)

ஸின். போர்ஸி. ஆனால்)

உபயோகம்:—நாம் சாப்பிடுகிற ஆகாரத்திலுள்ள “புரோட்
டிட்” என்னும் பதார்த்தத்தை (அதாவது

(d)

கடலை, உளுந்து, பருப்பு, பால், முட்டை,
மாமிசம் முதலிய சத்துள்ள பதார்த்தத்தை
செமிக்கச்செய்ய வயிற்றிலுண்டாகிற ‘காஸ்

(g)

டிரிஜியூஸ்' இதன் உதவி வேண்டியதிருக்கிறது. இதில் கொஞ்சம் "ஐட்ரோ குளோரிக் ஆஸிட்"மும் "பெப்ஸின்", "நேன்னின்" என இவைகளும் இருக்கின்றன. இவைகளில் "பெப்ஸின்" உதவியால்தான் ஆகாரம் வயிற்றிலிருக்கும் நோம் வரை "புரோட்டிட்" என்னும் பதார்த்தத்தின் கொஞ்சம் (d)

பாகம் செமித்து 'பெப்ட்டோன்' என்ற பதார்த்தமாக மாறுகிறது.

வயிற்றில் ஏதேனும் குற்றம் ஏற்பட்டு 'காஸ்ட்டிரிக் ஜியூஸ்' உண்டாகத் தடைப்பட்டால் அந்தச் சமயம் அஜீரணம் உண்டாகும். அப்பொழுது "பெப்ஸின்" கொடுத்தால் ஜீரண சக்தியை உண்டுபண்ணும்.

குறிப்பு:—நாம் ஒரு தடவல் சாப்பிட்ட ஆகாரம் 1 முதல் 4-மணி நேம்வரை வயிற்றில் தங்கி இருந்து பின்பு 'கைம்' என்ற பெயரோடு "டிபோ (d)

டினம்" என்ற சிறு குடலுக்குள் அனுப்பப் படுகிறது.

ஜீரண சக்தியை உண்டுபண்ணி வயிற்றிலுண்டாகிற இரைச்சல் முதலிய துர்க்குணங்களை மாற்ற:—

எடுத்துக்கொள்

பர்காய்ன்ஸ். பெப்ஸின். போர்ஸி.

(b)(g)

கொன் 6

பிஸ்மத். ஸப். நைட்ரஸ் கிரான் 10

(b) (b)

ஸோடா. பைகார்ப் கிரான் 10

(d) (b) (b)

ஒன்றுசேர்

3. பொட்டணமாக மடித்துக்கொண்டு ஒவ்வொரு ஆகாரத்துக்கும் சற்றுமுன் ஒரு பொட்டணம் வாயில்போட்டு உமிழ்நீரோடு சேர்த்து விழுங்கிக் கொஞ்சம் தண்ணீர் குடிக்க வேண்டும். பிறகு ஒவ்வொரு ஆகாரத்துக்குப் பின்னும் கொடுக்க:—

எடுத்துக்கொள்

ஆஸிட். ஐட்ரோ குளோரிக். டிப் துளி 15

(a) (h) (d) (a)

டிஞ்சர். ஜென்ஷன். கோ துளி 30

ஆக்குவா. சேர்ந்து அவுன்ஸ் 6

ஒன்றுசேர்

மிக்சர்செய்

தடவல் 1-க்கு 1-அவுன்ஸ் வீதம் நாள்

1-க்கு 3 தடவல் ஆகாரம் சாப்பிட்டவுடன் சாப்பிடவும்.

அல்லது

எடுத்துக்கொள்

பெப்ஸின். போர்ஸி கிரான் 6

ஆஸிட். ஐட்ரோ குளோரிக். டிப் துளி 20

(d) (h) (d) (d)

டிடிஞ்சர். நக்ஸ்வாமிக்கா துளி 15

டிஞ்சர். ஜென்ஷன். கோ துளி 60
 ஆக்குவா. சேர்ந்து அவுன்ஸ் 3
 மிக்சர் செப்

ஒன்றுசேர்
 தடவல் 1 க்கு 1 அவுன்ஸ் வீதம் நாள்
 1 க்கு 3 தடவல் ஆகாரம் சாப்பிட்டவுடன்
 சாப்பிடவும்.

அல்லது
 எடுத்துக்கொள்
 ஈலட்ஸ். பெப்ஸின். மிக்சர் டிராம் 1½
 (h)
 ஆக்குவா சேர்ந்து அவுன்ஸ் 3
 ஒன்றுசேர்

மிக்சர்செப்
 தடவல் 1 க்கு 1-அவுன்ஸ் வீதம் நாள் 1க்கு
 3-தடவல் ஆகாரத்துக்குப்பின் கொடுக்கவும்.
 அல்லது

எடுத்துக்கொள்
 (4) “பேப்ஸின் ஒயின்” இதில் தடவல் 1 க்கு
 ½ அவுன்ஸ் வீதம் நாள் 1 க்கு 3 தடவல்
 ஆகாரம் சாப்பிடுகிறதற்கு சற்றுமுன் சாப்
 பிடவும்.

(126) பெனாஸெட்டின்

(f)

இது வெண்மையானதும், ருசி யாதொன்
 றும் இல்லாத மினுமினுப்பான துள்.

“பெரு ஸேட்டின்” “ஆன்டிபைரின்,”

(b)

“ஆன்டிபெய்ரின்” ஆகிய இவைகள் மூன்

(f)(b)

றும் ஒரே குணங்கள் உள்ளவைகளா யிருந்த
போதிலும் “பெருஸேட்டின்” ஒன்றையே

(f)

விசேஷமாய் உபயோகப்படுத்தி வருவது
நலம். ஏனெனில் இவைகள் மூன்றில்

“பெரு ஸேட்டின்” க்கு மற்ற இரண்டை

(f)

யும் போல் இருதயத்தைப் பலயீனப்படுத்து
கிற செய்கை அவ்வளவு அதிகமில்லை. ஆகை
யால் இவைகள் மூன்றில் யாதேனும்
ஒன்றை அதற்கு ஏற்பட்டிருக்கிற அளவில்
உபயோகப் படுத்தும்போதெல்லாம் தட
வல் 1 க்கு 3 கிரான் “காபின் ஸிட்ரஸ்”

(f)

சேர்த்துக் கொடுக்கவும்.

குணம்:—(1) அனல் ஜேனிக் (2) ஆன்டிபை ரேட்டிக்

அளவு:—5 முதல் 10 கிரான்

உபயோகம்:—(1) மண்டை இடியை நிறுத்த:—

எடுத்துக்கொள்

பெரு ஸேட்டின்

கிரான் 8

(f)

காபின். ஸிட்ரஸ்

கிரான் 3

(f)

ஸோடா. பை கார்ப்

கிரான் 3

(d) (b) (b)

ஒன் தசேர்

ஒரே தடவலாக வாயில் போட்டு உமிழ்நீரோடு சேர்த்து விழுங்கி கொஞ்சம் வெந்நீர் குடிக்கவும். 1-மணிநேரம் கழித்து சுடச்சுட காப்பி சாப்பிடலாம்.

மறுபடியும் “பேனா ஸ்டேட்டின்” கொடுக்க

(f)

வேண்டுமானால் 8 மணிநேரம் கழிக்க வேண்டும்.

(2) காய்ச்சலில் “டெம்பரேச்சர்” 102-டிகிரிக்குமேல் இருக்கையில் காய்ச்சல் குடி தனிய:—

எடுத்துக்கொள்

பேனா ஸ்டேட்டின்

கிரான் 8

(f)

காபின். ஸிட்ரஸ்

கிரான் 3

(f)

ஒன்றுசேர்

ஒரே தடவலாக வாயில்போட்டு 1 அவுன்ஸ் வெந்நீர் கொடுக்கவும்.

வோர்வை உண்டாகிக் காய்ச்சல் தணியும் ஆனால் தணிந்த காய்ச்சலை மறுபடியும் வராமல் இருக்கச்செய்கிற சக்தி இதற்கு இல்லை. ஒருதரம் தணித்த காய்ச்சலை 4 மணி நேரம் வரைக்குந்தான் மேல்பேரக வெட்டாமல் நிறுத்தி வைத்திருக்கும். அந்தச் சமயம் பார்த்து “தர்மாமிட்டர்” வைத்துப்பார்த்துக் கொண்டு காய்ச்சல் “100 டிகிரிக்கும்” குறையாமல் இருந்தால் “டயா போ ரெட்டிக் மிக்

(d) (f)

சர்" கொடுக்கவும். காய்ச்சல் 99 டிகிரிக்கு இறங்கினவுடன் 'கோயினு மிக்சர்' கொடுக்கவும். இந்த மிக்சர்களைச் செய்யும் விதத்தை இப்புஸ்தகத்தின் மூன்றாவது பாகத்தின் முதல் பிரிவில் பார்த்துக்கொள்ளவும்.

(127) பாஸ்பரஸ்

(f) (f)

தீமுருகல் பாஷாணம்.

குணம்:—(1) டானிக் (2) ரேஸ்டோரேட்டிவ்

அளவு:—1/100 முதல் 1/20 கிரான்

உபயோகம்:—இதைத் தனிமையாக இவ்வளவு குறைந்த அளவில் மாத்திரைகளாகச் செய்து கொடுக்க வேண்டிய திருப்பதிலும், மாத்திரைகள் செய்யும்போது "பாஸ் பரஸ்" தீப்பிடித்து

(f) (f)

எரிந்து விடாமல் ஜாக்கிரதையாய் இருக்க வேண்டிய திருப்பதாலும், இதைத் தனிமையாக உபயோகப்படுத்துவதைவிட, தாது பலயினத்தை மாற்ற இதுவும் இன்னும் மற்ற மருந்துகளும் சேர்ந்திருக்கிற "நெர்வைன் டானிக்குகளாகிய:—

(1) டாக்டர் லாலார்ஸ். பாஸ் போடைன்"

(d)

(f)

(f)

(d)

(2) "பெல்லோஸ். கம்பவுண்ட். ஸிரப்"

(f)

(3) "அக்ஸிலீஸ். நெர்விகர். ஸிரப். வித் பார்

(h))

(g)

(f)

மேட்டன்”

(4) “டாமியானு டைன்”

(d) (d)

(5) “டாமியானு எலக்ஸியர்”

(d)

(6) “பைனின். அமரா”

(b)

(7) “பைனே. ஐப்போபாஸ்பைட்டஸ்”

(b) (h) (f) (f)

(8) ஈஸ்ட்டன்ஸ். விரப்”

இவைகளில் யாதேனும் ஒன்றை அந்தந்தப் பாட்டிலில் எழுதி யிருக்கும் பிரகாரம் உபயோகப்படுத்தவேண்டிய விதத்தைக் கவனித்து உபயோகப்படுத்தவும்.

(128) பெனா ஸோனம்.

(f) (z)

இது வெண்மையான, வாசனை யாதொன்று மில்லாத் கசப்பான தூள்.

இதற்கு “ஆன்டி பைரின்” என்றும் பெயர்.

குணம்:—பெனாஸெட்டினுக்குள்ளது

(f)

அளவு:—5 முதல் 20 கிராம்

உபயோகம்:—இதையும் “பெனாஸெட்டினை”ப் போலவே

சாதாரண மண்டை இடிக்கும், மலைக்காய்ச்

சலில் உண்டாகும் மண்டை இடியை நிறுத்

தவும், காய்ச்சல்களில் குடு தணியவும் தட

வல் 1 க்கு 3 கிரான் "காபின் ஸிட்ரஸ்"

(f)

என்னும் மருந்தோடு சேர்த்துக் கொடுக்க
வும்.

(129) பைஸிஸ். லிக்குவிட்.

(d)

தார் எண்ணெய்

(1) அங்குவன்டம். பைஸிஸ். லிக்குவிட்

(d)

தார் எண்ணெய்க் கழிம்பு

செய்யும் விதம்:—1 அவுன்ஸ் மஞ்சண மெழுகை உருக்கி
அதோடு $2\frac{1}{2}$ அவுன்ஸ் தார் எண்ணெயை
ஒன்று சேர்த்து இளக்கி குளிர்ந்தவுடன்
ஒன்று சேரும்படி கிண்டிக்கொள்ளவும்.

உபயோகம்:—காலிலுள்ள பித்த வெடிப்புக்குப் போட
லாம்.

(130) பிளம்பை. ஆஸிட்டஸ்

(b)

லெட் ஆஸிட்டேட்.

(d)

இதற்கு "சுகர். ஆப். லெட்" என்றும்

(Sugar)

(f)

(d)

பெயர்.

குணம்:—ஆஸ்டிரிஞ்சென்ட்

அளவு:—1 முதல் 5 கிரான் (மாத்திரையாகச் செய்து
கொடுக்கவும்.)

குறிப்பு:—இதை தனிமையாக மாத்திரையாகச் செய்து கொடுப்பதைவிட, ஒவ்வொரு மாத்திரையிலும் $\frac{1}{2}$ கிரான் “அபின்” சேர்த்துக் கொடுக்கலாம்.

உபயோகம்:—(1) 1 அவுன்ஸ் தண்ணீரில் 5 கிரான் “லேட். ஆஸிட்டேட்” கரைத்து மேகத்துக்கும், நாளப்பட்ட (d)

மேகத்துக்கும் “சிரிஞ்சு” பண்ணலாம்.

(1) லைக்கர். பிளம்பை. ஸப் ஆஸிட்டேட்டிஸ்

(b) (b)

டைலியூட்டஸ்

(d)

இதற்கு “கௌலார்ட்ஸ். லோஷன்” என்று

(g) (d)

பெயர்.

செய்யும் விதம்:—லைக்கர். பிளம்பை. ஸப் ஆஸிட்டேட்டிஸ்.

(b) (b)

போர்டிஸ்

டிசாம் 1

(f)

ஆல்கோஹால்

டிசாம் 1

டிஸ்டில்ட். வாட்டர்.

அவுன்ஸ் 9 $\frac{3}{4}$

(d) (d)

எல்லாம் ஒன்று சேர்த்துக் குலுக்கிக் கொள்ளவும்.

உபயோகம்:—கைகால் முதலிய இடங்களில் அடிபட்டு, அல்லது சுளுக்கினால் வீக்கமும், அகோடு வேதனையும் இருந்தால் மேல் எழுதி யிருக்கிற லோஷனில் 50 துளி “டிஞ்சர் ஓப்பியம்” சேர்த்துக் கொண்டு நன்றாய்க் குலுக்கி வீக்கமுள்ள இடம் பூராவும் “லின்ஸ்த் துணி

யால்" மேல்படி வேர்ஷனில் முக்கிச் சுற்றி வைத்து ஈரம் உலர, உலர நனைத்துக்கொண்டே இருக்கவும். வீக்கம் வலி குணமாகிற வரையும் இப்படியே செய்யவும்.

(131) போடோபில்லம். ரெவின்.

(d) (f)

அல்லது

போடோ பில்லின்.

இது பச்சையும் தவிட்டு நிறமுமான தூள்.

குணம்:—கதார்ட்டிக்

அளவு:— $\frac{1}{4}$ முதல் 1-கிரான் (மாத்திரையாகச் செய்து கொடுக்கவும்)

உபயோகம்:—தண்ணீராய் மலத்தை வெளியாக்கும். நாள் பட்ட கடுமையான மலச்சிக்கலை நீக்கக் கொடுக்க:—

எடுத்துக்கொள்

போடோ பில்லின்.

கிரான் 3

(d) (f)

காலோமல்.

கிரான் 18

பில். காலோஸிந்த். காம்பவுண்ட் கிரான் 20

(d)

எக்ஸ்ட்ராக்ட். அயோஸியாமல் கிரான் 18

ஒன்றுசேர்

12 மாத்திரைகளாகப் பிரித்துக் கொண்டு

இரவில் படுக்கைக்குப் போகும்போது 1 மாத்

திரை விழுங்கி அதற்குமேல் பாலாவது தண்

ணீராவது குடிக்கவும். அவசியமானால் மட்
டும் 2 மாத்திரைகள் ஒன்றன்பின் ஒன்றாய்
கிழுங்கலாம்.

(1) டிஞ்சர். போடோபில்லின்.

(d)(f)

குணமும், உபயோகமும்:—போடோ பில்லினுக்குள்ளது

(d) (f)

அளவு:—5 முதல் 15 துளி

(132) லைக்கர். பொட்டாஸ்.

குணம்: அன்டாஸிட்

(d)

அளவு:—10 முதல் 30 துளி

உபயோகம்:—நீர்ப்பையிலும், நீர்த்தாரையிலும் உண்டாகிற
எரிச்சலையும், வேதனையையும் தணிக்கிற
குணம் இதற்கு உண்டு. ஆகையால்தான்
மேகத்துக்குக் கொடுக்கிற “கொப்பைபா.

(b)

மிக்சரோடு” சேர்த்துக் கொடுக்கப்படுகிறது.

(133) பொட்டாஸ். ஆலிட்டஸ்.

காற்றுப்பட்டால் தண்ணீராய்ப் போய்கிடு
கிற மருந்து.

குணம்:—டயுரேட்டிக்

(d)

அளவு:—10 முதல் 60 கிராம்

10 முதல் 60 துளி (தண்ணீராய் இருந்தால்)

உபயோகம்:—இதை நீர்பிரியக் கொடுக்கலாம்.

(134) பொட்டாஸ். பைகார்ப்.

(b) (b)

குணம்:—(1) அன்டாஸிட் (2) ஸ்டெட்டிவ்
(d) (d)

அளவு:—5 முதல் 30 கிரான்

உபயோகம்:—நீர்க்கடுப்புக்குக் கொடுக்க:—

எடுத்துக்கொள்

பொட்டாஸ். பைகார்ப் கிரான் 30

(b) (b)

டிஞ்சர். அயோஸியாமஸ். துளி 30

ஸ்பிரிட். ஈதர். ரைட்ரோஸி. துளி 60

இன்பியூஷன், பக்கு சேர்ந்து அவுன்ஸ் 3

(f) (b) ஒன்றுசேர்

மிக்சர்செய்

தடவல் 1க்கு 1 அவுன்ஸ் வீதம் நாள் 1 க்கு
3 தடவல் கொடுக்கவும்.

(135) பொட்டாஸ். புரோமைட்

(b) (d)

குணம்:—ஸ்டெட்டிவ் (2) இப்ரூட்டிக்
(d) (h)

அளவு:—5 முதல் 30 கிரான்

உபயோகம்:—(1) இதை இழுப்பு, காக்கைவலிப்பு, குத்திரு
மல், இளைப்பு, பயித்தியம், தூக்கமின்மை,
மசக்கை வார்தி, இசிவு, ஜந்தி, குதகவளி
ஒருத்தலை இடி, நரம்புவேதனை, காய்ச்சலில்
உண்டாகும் மேல்வலி, அலுப்பு இவைகளுக்
கெல்லாம் தடவல் 1 க்கு 10 கிரான் வீதம்
கொடுக்கலாம்.

(2) காக்கை வலிப்புக்குக் கொடுக்க::—
எடுத்துக்கொள்

பொட்டாஸ் புரோமைட். கிரான் 30
(b) (d)

ஸோடியம் புரோமைட். கிரான் 30
(d) (b) (d)

லைக்கர். ஆர்ஸனிக்காலிஸ். துளி 6

டிஞ்சர். ஆரன்டி துளி 45

ஸ்டிரிட் குளோரோபார்ம் துளி 30
(f)

ஆக்குவா சேர்ந்து அவுன்ஸ் 3
ஒன்றுசேர்

மிக்சர்செய்

தடவல் 1-க்கு 1-அவுன்ஸ் வீதம் நாள் 1க்கு
3 தடவல் ஆகாரத்துக்குப் பின் கொடுக்க
வும்.

(3) இரவில் தூக்கம் வராதவர்களுக்கு ஒரே
தடவல் மட்டும் கொடுத்து தூக்கம் உண்டு
பண்ண::—

எடுத்துக்கொள்

பொட்டாஸ். புரோமைட். கிரான் 30
(b) (d)

டிஞ்சர். அயோஸியாமஸ் துளி 20

ஸ்டிரிட். ஆரன்டி துளி 30

ஆக்குவா. சேர்ந்து அவுன்ஸ் 1

ஒன்றுசேர்

மிக்சர்செய்

ஒரேதடவல் படுக்கைக்குப் போகும்
போது கொடுக்கவும்.

குறிப்பு:—(1) “பொட்டாஸ். புரோமைட்” நீடித்த காலம்
கொடுக்கும்படி நேரிட்டால் தேகத்தில்
கொப்பளம் உண்டாகாமல் இருக்க தடவல்
1 க்கு 2 துளி “லைக்கர். ஆர்ஸனிக்காலிஸ்
சேர்த்துக் கொடுத்துவாவும்.

(2) தேகத்தில் ரத்தப்பசை இல்லாத சோகைக்
குணம் உள்ளவர்களுக்கு “பொட்டாஸ்
புரோமைட்” அடுத்தடுத்துக் கொடுக்கக்
(b) (d)
கூடாது.

(136) பொட்டாஸ். கார்போனஸ்
(b)

குணம்:—(1) அன்டாஸிட் (2) ஸ்டெட்டிவ் (3) டயூரேட்
(d) (d) (d)
டிக்

அளவு:—5 முதல் 20 கிரான்

(137) பொட்டாஸ். குளோரஸ்

குணம்:—டயூரேட்டிக்

அளவு:—5 முதல் 20 கிரான்

உபயோகம்:—வாய்ப்புண்ணுக்கு வாய் உறசிக் கொப்
பளிக்க:—

எடுத்துக்கொள்

பொட்டாஸ். குளோரஸ் கிரான் 30
கம். அக்கேஷியா. போதுமான அளவு
(g)

டிஞ்சர். மர். டிராம் 1
ஆலம். கிரான் 15
டிஞ்சர். லவண்டர். கோ துளி 60
ஆக்குவா சேர்ந்து அவுன்ஸ் 6
ஒன்றுசேர்

இதை இரண்டு தடவலாகக் கொஞ்சம்
கொஞ்சமாய் வாயில் ஊற்றி நன்றாய் உறசி,
உறசிக் கொப்பளிக்கவும்.

(13f) பொட்டாஸ். லிட்டர்ஸ்.

காற்றுப்பட்டால் தண்ணீராய்ப் போகக்
கூடிய வெண்மையான தூள்.

குணம்:—(1) டயாபோரேட்டிக் (2) ரெபிரிஜேரேன்ட்
(d) (f) (f)

அளவு:—10 முதல் 40 கிரான்

உபயோகம்:—இதற்கு மலத்தைக் கொஞ்சம் நெகிழ்த்தி
யாய்ப் போக்கக்கூடிய குணமும் உண்டு
இதை “பொட்டாஸ். ஆஸிட்டஸ்” உடன்
சேர்த்து நீரைப் பிரிக்கவேண்டிய சந்தர்ப்
பத்தில் கொடுக்கலாம்.

(139) பொட்டாஸ். அயோடைட்.

(d)(d)

வாத உப்பு

குணம்:—ஆல்ட்ட ரேட்டிவ்

அளவ:—5 முதல் 20 கிரான்

உபயோகம்:—(1) 1 கிரான் கூடப்பிடிக்காதவர்களுக்கு அளவை அதிகப்படுத்தி தடவல் 1 க்கு 5 அல்லது 6 கிரான் கொடுத்தால் ஏற்றுக் கொள்ளுகிறது.

(2) பொட்டாஸ். அயோடைட் சாப்பிடும்

(d)(d)

போது ஜலதோஷம் கொள்ளும். இதை நிறுத்த தடவல் 1 க்கு 10 துளி “ஸ்பிரிட். அமோனியா அரோமேட்டிக்” சேர்த்துச் சாப்பிடவும். இப்படிச் சேர்த்துக் கொடுத்தும் ஜலதோஷம் மும்மாமாய் இருந்தால் உடனே “பொட்டாஸ் அயோடைட். மிக்

(d)(d)

சரை நிறுத்திவிட வேண்டும். ஜலதோஷம் குணமானபின் மறுபடியும் ஆரம்பிக்கவும். ஏற்றுக்கொள்கிற வரைக்கும் இடை இடையே நிறுத்தி, நிறுத்திச் சாப்பிடவும்.

(3) இதற்குத் தரதுவைக் குறைக்கும் குணம் இருப்பதால் “பொட்டாஸ் அயோடைட்.

(d)(d)

மிக்சர்” நீடித்துச் சாப்பிட வேண்டிய காலத்தில் தடவல் 1-க்கு 5 துளி “டிஞ்சர் நக்ஸ்வாமிக்கா” வாவது அல்லது 2 துளி

“லைக்கர். ஸ்ட்ரிக்னைன். ஐட்ரோ குளோ

(h)(d)

ரைட்” ஆவது சேர்த்துக் கொள்ளவும்

(d)

4-வாரத்துக்குக் கொடுக்க:—

எடுத்துக்கொள்

பொட்டாஸ். அயோடைட் கிரான் 15

(d)(d)

(1) டிஞ்சர். ஜென்ஷன். கோ. துளி 60

ஸ்பிரிட். அமோனியா. அரோமேட்டிக்

துளி 30

ஆக்குவா. சேர்ந்து

அவுன்ஸ் 3

ஷன் ஹசேர்

மிக்சர்செய்

தடவல் 1-க்கு 1 அவுன்ஸ் ஊதம் நாள் 1க்கு

3 தடவல் ஆகாரத்துக்குப் பின் கொடுக்க

வும்.

குறிப்பு:—மேல்படி மிக்சரில் “டிஞ்சர்.ஜென்ஷன்.கோ” வுக்

கும் “ஆக்குவா” வுக்கும் பதிலாக 3 அவுன்ஸ்

“இன்பியூஷன். சிரட்டா” = (நிலவேம்புக்

(f)

கஷாயம்) சேர்த்துக் கொள்ளலாம்

வாதத்தோடு மேகப்புண்கள், துர்நீர்க் கட்டி

கள், கண்டமாலை முதலிய வியாதிகளும்,

ரத்தமும் அசுத்தமாய் இருந்தால், மேலே

சொல்லிய 3 அவுன்ஸ் “பொட்டாஸ். அயோ

டைட் மிக்சரில் “90 துளி “லைக்கர் ஐட்ரார்

(d)(d)

ஜி.பெர்க்குளோரைட் சேர்த்துக்கொள்ள

(d)

வும். ரத்தம் சுத்தமாகும்வரை நீடித்துச் சாப்பிடவும்.

அல்லது

எடுத்துக்கொள்

பர்காயன்ஸ். அயோடைஸ்ட். ஸார்ஸபா

(b)(g)

(d) (d)

ரில்லா

டிராம் 3

(2) ஆக்குவா. சேர்ந்து

அவுன்ஸ் 3

ஒன்றுசேர்

தடவல் 1-க்கு 1 அவுன்ஸ் வீதம் நாள்

1 - க்கு 3 தடவல் ஆகாரத்துக்குப் பின்

கொடுக்கவும்,

அல்லது

எடுத்துக்கொள்

லிரப். டிரைபோலியம். காம்ப்வுண்ட்.

(f)

(d)

டிராம் 3

(3) ஆக்குவா. சேர்ந்து.

அவுன்ஸ் 3

ஒன்று சேர்

மிக்சர்செய்

தடவல் 1-க்கு 1அவுன்ஸ் வீதம் நாள் 1க்கு

3 தடவல் கொடுக்கவும்.

(5) குழந்தைகளுக்குப் பால் கொடுக்கிற பெண் களுக்கு "போட்டாஸ். அயோடைட்"

(d)(d)

கொடுத்து வந்தால் பாலை வற்ற வைக்கும்.

ஆனால் "போட்டாஸ் குளோரைஸ்". கொடுத்

தால் பாலை அதிகப்படுத்தும்.

(140) பொட்டாஸ். நைட்ரஸ்.

வேடியுப்பு.

குணம்:—(1) டயூரேட்டிக் (2) டயாபோரேட்டிக்

(d)

(d) (f)

அளவு:—5 முதல் 20 கிரான்

உபயோகம்:—இதைக் காய்ச்சலுக்கு “ டயாபோ ரேட்டிக்.

(d) (f)

மிக்சர்” செய்கிறதில் சேர்க்கப்படுகிறது.

இதற்கு நீரைப் பிரிக்கிற குணமும் இருக்கிறது.

எடுத்துக்கொள்

நீர் பிரிய:—

பொட்டாஸ். நைட்ரஸ் கிரான் 30

ஸ்பிரிட். ஈதர். நைட்ரோஸி துளி 60

ஸ்பிரிட். ஜூனிப்பர் துளி 45

டிஞ்சர். டிஜிடாஸிஸ் துளி 15

(d)

இன்பியூஷன். பக்கு சேர்ந்து அவன்ஸ் 3

(f)

(b)

ஒன்றுசேர்

மிக்சர்செய்

தடவல் 1 க்கு 1 அவன்ஸ் வீதம் நாள் 1க்கு 3 தடவல் ஆகாரத்துக்குப்பின் கொடுக்கவும்.

(141) பொட்டாஸ் பெர்மாங்கனஸ்

குணம்:—(1) ஆன்டிஸெப்டிக் (2) எம்மனாகாக்
(g)

அளவு:—1 முதல் 3 கிரான்

உபயோகம்:—(1) வாய்க்குள்ளும், பல் ஈருகளிலும், புண், ரணம் இவைகள் உண்டாகி அதன் மூல மாய் விச்சம் ஏற்பட்டிருக்கையில் வாய் கொப்பளிக்க:—

எடுத்துக்கொள்

பொட்டாஸ் பெர்மாங்கனஸ் கிரான் 1
டிஸ்டில்ட். வாட்டர். அவுன்ஸ் 5
(d) (d)

ஒன்றுசேர் வாய் உறசிக் கொப்பளிக்கவும். நாள் 1-க்கு 2 தடவல் இப்படிச் செய்யவும்.

(2) அழுகப்புண் ரணம் இவைகளை 1 அவுன்ஸ் “டிஸ்டில்ட். வாட்டர்” ருக்கு 1/8 கிரான்
(d) (d)

வீதம் கரைத்து போதுமான “லோஷன்” செய்து கொண்டு கழுவி சுத்தம் செய்ய லாம்.

(3) கிணற்றுத் தண்ணீரிலுள்ள விஷப் பூச்சி களைக் கொன்று தண்ணீரைச் சுத்தமாக்க ஒரு கிணறுக்கு $\frac{1}{4}$ அவுன்ஸ் “பொட்டாஸ் பெர்மாங்கனஸ்” இதை 2 அவுன்ஸ் “டிஸ்டில்ட் வாட்டரில்” கரைத்து கிணற்றுக்குள் ஊற்றவும்.

(4) மேகவியாதியின் ஆரம்பத்தில் 1 அவுன்ஸ்
“டிஸ்டில்ட். வாட்டருக்கு” $\frac{1}{2}$ கிரான்

(d) (d)

வீதம் கரைத்து நீர்த்தாரைக்குள் விரிஞ்சு
பண்ணலாம்.

(5) நாள்பட்ட மேகத்திற்கு 1 அவுன்ஸ்
“டிஸ்டில்ட். வாட்டருக்கு” 1 கிரான் வீதம்

(d) (d)

கரைத்து விரிஞ்சுபண்ணலாம்.

(6) பாம்புக்கடியின் விஷத்தை முறிக்கக்
கடிவாயில் “போட்டாஸ். பெர்மாங்கனஸ்”

பொடிபண்ணித் தேய்க்கலாம். முதலில் கடி
வாயிலிருந்து கொஞ்சம் மேல்தள்ளி அவ்வி
டத்தில் ஒரு கயிற்றால் அல்லது துணியால்
கடியுண்டவுடன் இறுக்கிக்கட்டி, பிறகு
கடிவாயைக் கொஞ்சம் கீழ் ரத்தத்தை வெ
ளி யாக்கிக்கொள்ளவும்.

(7) சூதகக் கட்டுப்பாட்டை நீக்கவும் சொற்ப
மாய்ப்படுகிற சூதகத்தை சரியான அளவில்
படும்படியாகவும் செய்ய, 2 கிரான் அளவில்
மாத்திரையாகச் செய்து கொடுக்கலாம்.
என்றாலும் இது அவ்வளவு பிரயோஜன
முள்ளதென்று பூராகவும் நம்பக்கூடவில்லை.

குறிப்பு:—“போட்டாஸ். பெர்மாங்கனஸ். லோஷன்”
செய்யும்போதெல்லாம். “டிஸ்டில்ட் வாட்டர்

(d) (d)

ரில்” செய்து கல் கார்க்குக் குப்பியில், காற்
றுப் போகாதபடி நன்றாய் அடைத்து வைத்
துருக்கவேண்டும்.

(142) பொட்டாஸ். டார்ட்ரஸ்.

ஆஸிடஸ்

(d)

அல்லது

கிரீம். ஆப். டார்ட்டார்

(f)

இதற்கு “முந்திரிப்பழ உப்பு” என்றும்
சொல்வதுண்டு. இதிலிருந்துதான் “டார்ட்
டாரிக். ஆஸிட்” என்னும் புளிப்பு செய்யப்

(d)

படுகிறது.

குணம்:—(1) கதார்ட்டிக் (2) டயூரேட்டிக்

(d)

அளவு:—20 முதல் 60 கிரைன்

2 முதல் 4 டிராம் (மலம் தண்ணீராய்ப்
போக)

(143) குவாஷியா. லிக்னம்

(g)

இது கசப்புள்ள பட்டை. இது இரும்பு
சேர்ந்த மருந்தோடு சேர்த்துக் கொடுக்க
லாம்.

(1) இன்பியூஷன். குவாஷியா

(f)

குவாஷியா பட்டைக் கஷாயம்

செய்யும் விதம்:—10-அவுன்ஸ் “குளிரந்த தண்ணீரில் 44-
கிரைன் “குவாஷியாபட்டை” யைப்போட்டு

$\frac{1}{4}$ -மணி நேரம் வைத்திருந்து பின்பு வடிகட்-
டிக்கொள்ளவும்.

குணம்:—டானிக்

அளவு:— $\frac{1}{2}$ முதல் 1 அவுன்ஸ்

உபயோகம்:—(1) அன்னத் துவேஷத்தில் ஜீரணக் கருவி
களுக்குப் பலத்தைக்கொடுத்து ஜீரண சக்தி
யை உண்டு பண்ணக் கொடுக்கலாம்.

(2) ஆசனத்துக்குள் சிரிஞ்ச மூலமாய் செலுத்
தினால் பொடிக்கீரைப் பூச்சிகளைக் கொன்று
விடும்.

(2) டிஞ்சர். குவாஷியா.

அளவு:— $\frac{1}{2}$ முதல் 1 டிராம்

இதை “இன்பியூஷன் குவாஷியா” வுக்குப்
(f)

பதிலாக உபயோகப் படுத்தலாம்.

(144) கொய்னைன். ஸல்பஸ்.

(f)

இது கசப்புள்ள, வெண்மையான, லேசான
துள்.

குணம்:—(1) டானிக் (2) ஆன்டிபீரியாடிக்
(d)

(3) ஆன்டிநியூரால்ஜிக்

அளவு:—1 முதல் 10 கிரான்

உபயோகம்:—(1) கொய்னாவைக் குறைந்த அளவில் அதா
வது தடவல் 1-க்கு $\frac{1}{2}$ கிரான் வீதம், “அயம்,”

“எட்டிக்கோட்டை” இவைகள் சேர்த்த மருந்துகளோடு சேர்த்துக் கொடுத்து வந்தால் ஜீரண சக்தியை உண்டுபண்ணியும், தாது பலத்தையும் கொடுக்கும்.

“ஈஸ்டன்ஸ். ஸிரப்பிலும்” “பைனின். அமராலிலும்” இப்படிக் குறைந்த அளவில் “கோய்னா” சேர்த்திருப்பதினாலேயே பசியை உண்டுபண்ணவும், தாது பலத்தைக் கொடுக்கவும் மேல் சொன்ன மருந்துகளில் யாதேனும் ஒன்றை உபயோகப்படுத்தலாம்.

- (2) குளிர்சரம், முறைசரம் இவைகளுக்கு சரம் விட்டிருக்கும் போது தடவல் 1-க்கு 4 ஈரைன் “கோய்னா”வை 5 துளி “ஆஸிட்”
(d)

ஸல்பியூரிக். டில்” சேர்த்துக் கரைத்து
(f) (d)

அதோடு 1 அவுன்ஸ் தண்ணீர் சேர்த்து நாள் 1-க்கு 3 தடவல் இப்படி கொடுக்கவும்.

- (3) மற்றக் காய்ச்சல் அதிகமான டிகிரியில் இருந்து இறங்கி 99 டிகிரிக்கு வந்திருக்கும் போது திரும்பவும் காய்ச்சல் வராமல் தடுக்க “கோய்னா மிக்சர்” கொடுக்கலாம்.

- (4) கோய்னாவுக்கு “எம்மனகாக்” குணமும்
(g)

உண்டு.

(1) பில். கோய்னென்.

கோய்னெ மாத்திரை

நாம் 'கோய்னெ' துணை மாத்திரைகளாகச் செய்து கொடுப்பதைவிட இங்கிலீஷ் மருந்து ஷாப்புகளில் கோய்னெ மாத்திரை' களாகவே வைத்திருக்கிறவைகளை உபயோகப்படுத்துவது நல்லது.

(145) எம்பிளாஸ்டர்ம். ரெவின்னி

இதற்கு "ஸ்டிக்கிங்: பிளாஸ்டர்" என்று பெயர்.

அதை வெட்டுப்பட்ட காயங்கள், புண்கள் இவைகளுக்கு, கொஞ்சம் எடுத்து இளக்கி துணியில் தடவி மேல் ஒட்டிவைக்கலாம்.

(1) அங்குவன்டம். ரெவின்னி

ரெவின். ஆயின்ற் மேன்ற்

இதை புண்களுக்கும், பித்த வெடிப்புக்கும் தடவலாம். மற்ற மருந்துகள் சேர்த்துக் கழிம்பு செய்யும்போது இது துணைக்கழிம்பாக உபயோகப்படுகிறது.

(146) ரீயை ராடிக்கஸ்

(d)

சூபார்ப். சூட்

(b) (b)

(1) பல்விஸ். ரீயை

இது மஞ்சள் நிறமான தூள்.

குணம்:—(1) ஸ்டமக்கீக் (2) கதார்ட்டிக்

அளவு:—3 முதல் 10 கிரான்

15 முதல் 30 கிரான் (ஒரே தடவலாகக் கொடுக்க)

உபயோகம்:—1 வயசுக்கு உள்பட்ட சிறுகுழந்தைகளுக்கு பால் செமிக்காமல் புளிப்பு, மந்தம், வயிற்றுப்பொதுமல் அதோடு காய்ச்சலு மிருந்தால் முதலில் மலத்தை வெளியாக்க:—

எடுத்துக்கொள்

பல்விஸ்.ரீயை

கிரான் 3

காலோமல்

கிரான் 1

ஸோடா. பைகார்ப்.

கிரான் 3

(d) (b) (b)

ஒன்றுசேர்

ஒரு குச்சியில் “ஆயில். அனிஸி” முக்கி இதோடு கலந்து, இதை ஒரே தடவலாகக் கொஞ்சம் தேனில் கலந்து கொடுக்கவும். ஒன்று, அல்லது 2 தடவல் மலம் வெளியாகி வயிறு உப்பிசம் தணியும்.

பிறகு

எடுத்துக்கொள்

பல்விஸ்.ரீயை

கிரான் 2

ஸோடா. பைகார்ப்

கிரான் 6

(d) (b) (b)

ஆயில். அனிஸி

துளி 1

ஒன்றுசேர்

4 பொட்டணமாக மடித்துக்கொண்டு தடவல் 1 க்கு 1 பொட்டணம் வீதம் 3 மணிக் கொரு தடவல் தேனில் கலந்து கொடுக்கவும்.

இதிலிருந்து பூராவும் குணமாகும் வரை 4 மணிக்கொரு தடவல் மேல்படி பொடியைக் கொடுத்து வரவும்.

(1) பல்விஸ். ரீயை. கோ

இதற்கு “கிரீகோரீஸ். பவுடர்” என்றும்
(g) (g) (d)
பெயர்.

செய்யும் விதம்:—3 அவுன்ஸ் “மெக்ரீஷியா கார்ப்” இதை
(g) (b)

முதலில் நன்றாய்த் தூளாக்கிக்கொண்டு, இதோடு 1 அவுன்ஸ் “பல்விஸ். ரீயை” சேர்த்து இவர்களோடு $\frac{1}{2}$ அவுன்ஸ் “பல்விஸ். ஜிஞ்ஜர்” அதாவது (சுக்குத்தாள்) சேர்த்து இவைகள் மூன்றும் நன்றாய் ஒன்றுசேரும்படி கலந்துகொள்ளவும்.

குணம்:—“பல்விஸ். ரீயை” க்குள்ளது

அளவு:—20 முதல் 60 கிரான்

உபயோகம்:—இது, சிறு குழந்தைகளுக்கு மலத்தை வெளிப்பாக்கக் கொடுக்க நல்ல மருந்து.

1 வயசுக் குழந்தைக்கு தடவல் 1 க்கு 5 கிரான், பாலிலாவது, வெந்நீரிலாவது கலக்கிக்கொடுக்கலாம். இந்தப்படி வாரத்தில் 2 தடவல் கொடுத்துவரலாம்.

(2) டிஞ்சர். ரீயை. கோ

குணம்:—“பல்விஸ். ரீயை” க்குள்ளது

அளவு:— $\frac{1}{2}$ முதல் 1 டிராம்

உபயோகம்:—சிறு குழந்தைகளுக்கு வெண்மையாய் மலம்
போய்க்கொண்டு பால் முதலியவைகள்
வாந்தி பண்ணினால் அப்பொழுது கொடுக்க
எடுத்துக்கொள்

டிஞ்சர். ரீயை. கோ.

துளி 20

அமோனியா. குளோரைட்

கிரான் 8

(d)

ஸோடா, ஸாலிஸில்ஸ்.

கிரான் 6

(d)

ஸிரப். ஸிம்பிள்,

துளி 20

ஆக்குவா. அனிஸி. சேர்ந்து

அவுன்ஸ் 1

ஒன்றுசேர்

மிக்சர்செய்

தடவல் 1 க்கு 2 தேக்காண்டி வீதம்
4 மணிக்கொரு தடவல் கொடுக்கவும்.

(147) ரிவினி ஒலியம்.

காஸ்ட்டர். ஆயில்.

விளக்கெண்ணெய்

குணம்:—கதார்ட்டிக்

அளவு:—1 முதல் 8 டிராம்

உபயோகம்:—குழந்தைகளுக்கு மலத்தை வெளியாக்க
விசேஷமாய் உபயோகப் படுத்தப்பட்டு
வருகிறது.

சுகபேதிக்காகப் பெரியவர்களும் சாப்பிட
லாம். மூல உபத்திரவமுள்ளவர்கள் மலச்சிக்
கல் ஏற்படும்பொழுது இரவில் 1 அல்லது
2 தேக்கராண்டி அளவு பாலுடன் கலந்து
சாப்பிடலாம்.

இரவில் கீருமிப்போடி கொடுத்திருந்தால்
காலையில் இந்த எண்ணெயை உபயோகிக்க
வேண்டும் “டைபாய்ட். பீவர்” என்னும்

(f) (d) (f)

விஷஜந்ரி சூத்துக்குப் பின்பும், கொடுமை
யான வைசுரிக்குப் பின்பும் ஜீரணக்குடல்
களில் ரணம் உண்டாகி அனைச்சல் போல்
மூலத்தில் ரத்தம் வந்து கொண்டிருந்தால்
“காஸ்டர். ஆயில். மிக்சர்” கொடுக்கலாம்.
குடலிலுள்ள எரிச்சல், புண், வயிற்றழைச்
சல் இதோடு கடுப்பும் வேதனையும் இருந்
தால் 1 அவுன்ஸ் “காஸ்டர். ஆயில். மிக்ச
ரோடு” 5 துளி “டிஞ்சர் ஓப்பியம்” சேர்த்
துக்கொள்ளவும். சிறு குழைந்தைகளுக்குக்
கொடுக்கிறதானால் “டிஞ்சர். ஓப்பியம்
சோமல் தனி “காஸ்டர். ஆயில். மிக்சரில்”
பெரியவர்களுக்குக் கொடுக்கிற அளவில்
ஒரு பாகம் கொடுக்கவும்.

குறிப்பு:—“காஸ்டர். ஆயில். மிக்சர்” செய்யும் விதத்தை
இப்புத்தகத்தின் மூன்றாவது பாகத்தின்
முதல் பிரிவில் பார்த்துத் தெரிந்து கொள்ள
வும்.

(148) ஸாலால்

இது வெண்மையான, தண்ணீரில் கரையாத மருந்து. இதை குடலுக்குள் விஷித்தன்மை உண்டாகாமல் இருக்கக் கொடுக்கலாம்.

அளவு:—5 முதல் 15 கிரான்

உபயோகம்:—(1) இதை கிராணி, அஜீரணம், வயிற்றோட்டம் இவைகளுக்கு ஆகாரம் கொடுக்கிறதற்கு முன் கொடுக்க:—

எடுத்துக்கொள்

ஸாலால்

கிரான் 5

பிஸ்மத். ஸ்பைட்டர்ஸ்

கிரான் 5

(b)

(b)

ஒன்றுசேர்

இதை ஒரே தடவலாக வாயில் போட்டு கொஞ்சம் தண்ணீர் குடிக்கவும்.

ஆகாரத்துக்குப்பின் கொடுக்க —

எடுத்துக்கொள்

ஈலட்ஸ். பெப்ஸின். மிக்சர்.

துளி 30

(h)

ஆக்குவா. டிஸ்டில்லேட்டா.

அவுன்ஸ் 1

(d)

ஒன்றுசேர்

மிக்சர்செய்

இதை ஒரே தடவலாக ஆகாரத்துக்குப் பின் கொடுக்கவும்.

(2) வயிற்றறைச்சல் குடலின் விஷத்தன்மை இவைகள் நீங்கக் கொடுக்க:—

எடுத்துக்கொள்

“கம். அக்கேஷியா.” போதுமான அளவு
(g)

இதைக் கொஞ்சம் தண்ணீர்விட்டுப் பசை
போல் “மார்ட்டரில்” அரைத்துக் கொண்டு

இதோடு “ஸாலால்” கிரான் 5

“பிஸ்மத் ஸ்பைரைட்ஸ்” கிரான் 5

சேர்த்து அரைத்து, இதோடு 30 துளி

“ஸிம்பிள். ஸிரப்” சேர்த்து எல்லாம்

ஒன்றுசேர்ந்து 1 அவுன்ஸ் ஆகும் வரை

போதுமான சுத்த ஜலம் சேர்த்துக்கொள்ள

வும். இந்த மருந்தை எப்படி அரைத்துச்

சேர்த்தாலும் தண்ணீரில் கரையாமல் அடி

யில் படியும். ஆகையால் மிக்சர் கொடுக்கும்

போது நன்றாய்க் குலுக்கிக்கொண்டு இப்படி

நாள் 1 க்கு 3 தடவல் ஆகாரத்துக்குப் பின்

கொடுக்கவும்.

“ஸ்பீட்டஸ். ஆரோசூட்.” “பார்லிமாவு”

(d)

இவைகளில் யாதேனும் ஒன்றைக் கஞ்சி

காய்ச்சிப் பால் சேர்த்துக் கொடுக்கலாம்.

(3) எவ்விதமான காய்ச்சல்களிலும் அதிக

மாயிருக்கிற : “டெம்பரேச்சர்” இறங்க

10 கிரான் “ஸாலால்,” 5 கிரான் “பிஸ்

(b)

மத். ஸ்பைரைட்ஸ்” இந்த இரண்டும்

(b)

ஒன்று சேர்த்துக் காய்ச்சல் குடி தணிகிற

தைக் கவனித்துக்கொண்டு 4 மணிக்கொரு

தடவல் கொடுத்து வரலாம்.

குறிப்பு:—“ஸரலால்” கொடுக்கும்போதெல்லாம் தனிமை
யாய்க் கொடுக்காமல் “பிஸ்மத். ஸப்
(b) (b)
நைட்ரஸ்” சேர்த்துக் கொடுக்கவும்.

(149) கோய்னெட்டம்

இதைக் “கோய்னெ” வுக்குப் பதிலாகக் குளிர்
காய்ச்சல், மலைக்காய்ச்சல், முறைக்காய்ச்சல்
சல் இவைகளுக்கு “கோய்னெ” கொடுக்கிற
அளவில் மாத்திரைகளாகச் செய்து கொடுக்
கலாம்.

“கோய்னெட்டம்” மாத்திரைகள் செய்யும் விதம்:—

எடுத்துக்கொள்

கோய்னெட்டம்.	கிரான் 40
கம். அக்கேஷியா.	கிரான் 10
(g)	
ஸிற்றிக் ஆஸிட்	கிரான் 10

(d)

முதலில் “ஸிற்றிக் ஆஸிட்” டை நன்றாய்த்

(d)

துளாக்கிக்கொண்டு, “கம். அக்கேஷியா”

(g)

வோடு சேர்த்துக் கொஞ்சம் தண்ணீர்
விட்டுப் பசை போலாக்கிக் கொண்டு
“போலஸ்கத்தி” யால் இந்த பசையைக்
கொஞ்சம் கொஞ்சமாய் “கோய்னெட்டத்
தோடு சேர்த்து “ஸிலாப்” பில் நன்றாய்த்
தேய்த்து ஒன்றுசேர்த்து உருட்டி, 12 மாத்

திரைகளாகப் பிரித்துக்கொள்ளவும். தடவல்
1 க்கு 1 மாத்திரை வீதம் நாள் 1 க்கு
3 தடவல் ஆகாரத்துக்குப்பின் கொடுக்கவும்.

(150) ரிஸார்ஸின்

இதை வெளிப்பிரயோகமாக, சிரங்குகள்
ஆராத புண்கள், பத்துகள் இவைகளுக்கு
1 அவுன்ஸ் “வாஸலைன்” என்னும் கழிம்
போடு “15 கிரைன். ரிஸார்ஸின்” சேர்த்து
நன்றாய்க்கலந்து கழிம்பாகச்செய்து முத
லில் “கார்பாலிக் ஸோப்,” “ஸாலூட்டிஸ்
ஸோப்,” ரைட்ஸ். கோல்ட்டார்ஸோப்,”
“கிரிமால்ட். அன் கோ. மெடிஸினல்ஸ்கி.

(g)

(d)

ன். ஸோப்” இவைகளில் யாதேனும் ஒன்
றால் சுத்தம் செய்து, பிறகு கழிம்பை நாள்
1 க்கு 1 தடவல் போட்டு வரவும்.

(151) ஸான்றல். ஒலியம்

ஸான்றல். வுட். ஆயில்

(d)

வேண் சந்தணக்கட்டை எண்ணெய்

குணம்:—டயூரேட்டிக்

அளவு:—5 முதல் 30 துளி

உபயோகம்:—இதை மேகவியாதி ஆரம்பத்திலும் நாள்பட்ட
மேகவியாதிக்கும் தடவல் 1 க்கு 20 துளி

கொஞ்சம் “கம் அக்கேஷியா” பசையோடு

(g)

சேர்த்து அரைத்து 1 அவுன்ஸ் தண்ணீர்
சேர்த்து நாள் 1 க்கு 3 தடவல் கொடுத்து
வந்து, மேகம் நின்ற பிறகு அதிலிருந்து
1 வாரத்துக்கு தடவல் 1-க்கு 10 துளி
வீதம் மேல்படி விதமாய்ப் பக்குவப்படுத்தி
நாள் 1 க்கு 3 தடவல் கொடுத்துவரவும்.

அல்லது

“ஸான்றல். மிடி” என்ற மாத்திரைகளில்

(d)

1 மணி நேரத்துக்கு 1 மாத்திரை வீதம்
நாள் 1 க்கு 12 மாத்திரைகள் சாப்பிட்டு
மறுநாளிலும் அதேபிரகாரம் செய்து பிறகு
மேகம் மட்டுப்பட்டபின் 3-மணிக்கொரு
தடவல் 1 மாத்திரை வீதம் சாப்பிட்டு வா
வும்.

அல்லது

“ஈலட்ஸ். லைக்கர். ஸான்றல். பிளேவா

(h)

(f)

கம். பக்கு எற். கியூபேப்.” என்ற மருந்

(b)

(b)(b)

தில் தடவல் 1 க்கு 60 துளி 1 அவுன்ஸ்
சுத்த ஜலத்தில் (டிஸ்டிலட். வாட்டரில்)

(d)

(d)

சேர்த்து நாள் 1 க்கு 3 தடவல் ஆகாரத்துக்
குப்பின் 1வாரம் சாப்பிட்டு, பிறகு இரண்டாம்
வாரம் தடவல் 1க்கு 30 துளி வீதம் நாள்
1க்கு 3 தடவல் மேகம் குணமாகும் வரை

சாப்பிட்டு, மேகம் நின்ற பிறகு “பர்காய்ன்ஸ்.

(b)g)

ஆயோடைஸ்ட். ஸார்ஸ்பாரில்லா,” என்

(d) (d)

னும் மருந்தில் தடவல் 1 க்கு 60 துளி 1
அவுன்ஸ் தண்ணீரில் கலந்து நாள் 1 க்கு
3 தடவல் ஆகாரத்துக்குப்பின் கொடுத்து
வந்தால் ரத்தத்தைச் சுத்திசெய்து மேகத்
துக்குப்பின் உண்டாகிற வாதம், மேகரீர்,
கண்ணில் சிகப்பு இறங்குதல், மேகப்புண்
முதலிய துர் ரீர் வியாதிகள் வரவொட்டா
மல் தடுக்கும்.

(152) வான்டோனைன்

கிருமிப்பொடி

இதை கீரைப்பூச்சி, இறைப்பூச்சி என்று
சொல்லப்படுகிற கிருமியை வெளிப்படுத்தி
அதன் மூலமாய் ஏற்படுகிற வயிற்றுவலி,
பசியின்மை, தேகவாட்சி இன்னும் இதா
வியாதிகளைக் கண்டிப்பதற்காகக் கொடுக்கப்
பட்டு வருகிறது.

அளவு:—2 முதல் 5 கிரான் (பெரியவர்களுக்கு)

$\frac{1}{2}$ முதல் $\frac{3}{4}$ கிரான் (1 வயசுக் குழந்தைக்கு)

2 கிரான் (2 அல்லது 3 வயசுக் குழந்
தைக்கு)

உபயோகம்—இதை ஒவ்வொருவரும் ஒவ்வொரு விதமாய்,
சீனியோடு கலந்தும், “ஸோடா. பைகார்ப்”

(d) (b) (b)

வோடு கலந்தும் அல்லது “காலோமல்”
 “ஸோடா. பைகார்ப்” இவைகளோடு கலந்
 தும் இரவில் படுக்கைக்குப் போகும்போது
 கொடுத்து வந்தபோதிலும், பின் எழுதி
 யிருக்கிற விதமாய் “ஸான்டோனைன்” கொ
 ட்ப்பது நலமென அபிப்பிராயப்படுகிறார்கள்.

அதாவது:—பெரியவர்களுக்கு, படுக்கைக்குப் போகும்போது

“ஸான்டோனைன்” கிரான் 3

“ஸோடா. பைகார்ப்” கிரான் 3

(d) (b) (b)

இந்த இரண்டையும் ஒன்று சேர்த்து
 $\frac{1}{4}$ அவுன்ஸ் “காஸ்டர் ஆயில்” = (விளக்
 கேண்ணையில்) கலக்கிக் கொடுக்கவும். மறு
 நாள் காலை:—

“ஸான்டோனைன்” கிரான் 2

“ஸோடா. பைகார்ப்” கிரான் 2

(d) (b) (b)

இவைகளை ஒன்று சேர்த்து $1\frac{1}{2}$ அவுன்ஸ்
 உத்தேசம் (பக்காவுக்கு அரை வீசம்படி)
 “காஸ்டர் ஆயிலில்” கலக்கிக் கொடுத்து
 விடவும். காஸ்டர் ஆயிலுக்கு, “ஸான்
 டோனைன்,” சரியானபடி வேலை செய்ய
 வும், அதனால் ஏற்படும் தூக்குணங்களைத்
 தடுக்கும் சக்தியும் இருப்பதால், “ஸான்
 டோனைன்” கொடுக்கும்போது தெல்லாம்
 மேல் எழுதியிருக்கிற விதமாய் “விளக்
 கேண்ணையிலேயே” சேர்த்துக் கொடுக்க
 வேண்டும்.

சிலர்கள் எண்ணெய் சாப்பிட அருவரும்
பாய் இருக்கிறதென்று மலம் வெளியாக
“ஸான்டோனைன்” இதோடு 4 கிரான்
“காலோமல்” சேர்த்து இரவில் சாப்பிட்டும்,
சிலர்கள் மலம் வெளியாக மறுநாள் காலை
யில் “எப்ஸம் ஸால்ட்” முதலிய பேதி
உட்புகளைச் சாப்பிட்டும் வருகிறார்கள். இப்ப
டிப்பட்ட வழக்கங்களெல்லாம் அவ்வளவு
பொருத்தமானதல்ல.

(153) லினிமென்டம். ஸப்போனரிஸ்

ஸோப். லினிமென்ற்

உபயோகம்:—இதை வெளிப் பிரயோகத்திற்கு மட்டும் வாத
உளைச்சல் வலி இவைகளுக்கு வலியுள்ள
இடங்களில் காலை மாலை நன்றாய் அழுத்
தித் தேய்த்து வைத்திருந்து வெந்நீர் சுடச்
சுட விட்டுவர வேண்டியது.

(154) ஸார்ஸா. ராடிக்ஸ்

(d)

ஸார்ஸபாரில்லா

நன்னூர்வேர்

குணம்:—ஆல்ட்டரேட்டிவ்

உபயோகம்:—இதைக் கஷாயம் செய்து “போட்டாஸ்
அயோடைட்” என்னும் “வாத உப்பு” டன்

(d) (d)

சேர்த்து மேகவாதம், வாதம், தூர்நீர்ப் புண்கள், அசுத்தமான ரத்தம் சுத்தமாக இவைகளுக்குக் கொடுக்கலாம்.

(1) எக்ஸ்ட்ராக்டம். ஸார்ஸா லிக்குவிடம் (d)

அளவு:— $\frac{1}{4}$ முதல் $\frac{1}{2}$ அவுன்ஸ்

உபயோகம்:—இதை நன்னூரிவேர்க் கஷாயத்திற்குப் பதில் மேல்காட்டிய தூர்நீர் சம்பந்தமான வியாதி களைக் கண்டிச்சுக் கொடுக்கலாம்.

(155) வில்லா

ஸ்துவில்

நரிவேங்காயம்

(1) ஆக்ஸி மேல். ஸில்லி

குணம்:—எக்ஸ்பெக்டோரேன்ற்

அளவு:— $\frac{1}{2}$ முதல் 1 டிராம்

உபயோகம்:—இதை இருமல் கபம் இவைகளுக்கு தனி மையாகக் கொடுப்பதை விட இருமலைத் தணிக்கச் செய்து கொடுக்கப்படுகிற மிக்சர் களில் மற்ற மருந்துகளோடு இதையும் சேர்த்துக் கொடுப்பது நலம்.

(2) டிஞ்சர். ஸில்லி

குணம்:—எக்ஸ் பெக்டோரேன்ற்

அளவு:—5 முதல் 15 துளி

உபயோகம்:—இதையும் இருமலுக்குச் செய்து கொடுக்கிற மற்ற மருந்துகளோடு சேர்த்துக் கொடுக்கப் படுகிறது.

(156) வெணிகா. ரூட்

(g)

(1) டிஞ்சர். ஸெனிகா

குணம்:—எக்ஸ் பெக்டோரோன்

அளவு:—30 முதல் 60 துளி

உபயோகம்:—இதை நாஸ்பட்ட இருமல் கபம் இவைகளுக்
குக் கொடுக்கலாம். இந்த மருந்தின் குணத்
தை “அமோனியா கார்ப்” அதிகப்படுத்தி

(b)

வியாதியைக் கண்டிக்கும்படி செய்வதால்
“டிஞ்சர். ஸெனிகா” வை நாஸ்பட்ட தொண்

(g)

டைப் புகைச்சலை நிறுத்தக் கொடுக்கும்போ
தெல்லாம் “அமோனியா. கார்ப்” சேர்த்தே

(b)

கொடுத்துவாவேண்டும்.

நாஸ்பட்ட இருமலை நிறுத்த:—

எடுத்துக்கொள்

அமோனியா. கார்ப் கிரைன் 9

(b)

டிஞ்சர். ஸெனிகா துளி 60

(g)

டிஞ்சர். காம்பர். கோ. துளி 60

(f)

வைனம். இப்பிக்காக். துளி 30

ஸ்பிரிட். குளோரோபார்ம். துளி 30

(f)

ஆக்குவா. சேர்ந்து. அவுன்ஸ் 3

ஒன்று சேர்

மிக்சர்செய்

தடவல் 1-க்கு 1 அவுன்ஸ் வீதம் நாள் 1க்கு
3 தடவல் ஆகாரத்துக்குப்பின் கொடுக்கவும்.

(157) வென்னு

நிலவாகை

குணம்:—கதார்ட்டிக்

(1) இன்பியூஷன். ஸென்னு

நிலவாகைக் கஷாயம்

செய்யும் விதம்:—10 அவுன்ஸ் கொதிக்கிற தண்ணீரில்
1 அவுன்ஸ் நில வாகையையும் 27½ கிரான்
சுக்குத்தூளையும் போட்டு ¼ மணி நேரம்
மூடிவைத்திருந்து வடிகட்டிக்கொள்ளவும்.

அளவு:—½ முதல் 1 அவுன்ஸ்

2 அவுன்ஸ் (ஒரே தடவலாகக்கொடுக்கவும்)

உபயோகம்:—இதை 1 அவுன்ஸ் “காஸ்டர் ஆயிலில்”
கலக்கி சாப்பிட்டால் மலசுத்தியாகும்.

அல்லது

¾ அவுன்ஸ் “எப்ஸம். ஸால்ட்” டை,

2 அவுன்ஸ் “நிலவாகைக்கஷாயத்தில்”
கரைத்துக் கொடுத்தாலும் மல சுத்தியாகும்.

(2) டிஞ்சர். ஸென்னு. கோ

அளவு:—½ முதல் 1 டிராம் (அடுத்தடுத்துக்கொடுக்க)

¼ முதல் ½ அவுன்ஸ் (ஒரே தடவல் கொ
டுக்க)

உபயோகம்:—இதை “எப்ஸம். ஸால்ட்” டிப் சேர்த்துக் கொடுத்தால் மலசுத்தியாகும்.

மலசுத்தியாக “பிளாக். டிராப்ட்” செய்
(b) (d) (f)

யும் விதம்:—

எடுத்துக்கொள்

எப்ஸம். ஸால்ட். டிராம் 6

(இதை “மார்ட்டரில்” 1 அவுன்ஸ் தண்ணீரில் அரைத்துக் கரைத்து வடிகட்டிக் கொண்டு இதோடு

டிஞ்சர். ஸென்னை. கோ. டிராம் 1

டிஞ்சர். ஜிஞ்சிபெரிஸ். துளி 30
(z) (b)

ஆக்குவா. சேர்ந்து. ஆக அவுன்ஸ் 2
ஒன்றுசேர்

மிக்சர்செய்

இதை ஒரேதடவலாக காலையில் கொடுக்கவும்



(158) வலிநாப்பிஸ்

மஸ்ட்டர்ட்

(d)

கடுகு

குணம்:—(1) எமட்டிக் (2) ஸ்டிமியூலென்ட்.

உபயோகம்:—(1) விஷம் சாப்பிட்டவர்களுக்கு வாந்திஎடுக்க, மற்றமருந்துகள் கைவசமில்லாமல் இருக்கையில் 4 தேக்காண்டி அளவு தூளாக்கின கடுகை 1 தமிழர் வெந்நீரில் கலக்கிக் கொடுக்கலாம்

(2) “கால்ராசில் உண்டாகும் வாந்தியை நிறுத்த வயிற்றின் நடுப்பாகத்தில் போல்டிஸாகப்” போடலாம்.

15 முதல் 30 நிமிஷம் வரை இருக்க வேண்டும். குழந்தைகளுக்குப் போடுகிறதானால் 1 முதல் 4 பங்கு கார்ன். பிளவர், சேர்த் துப் போடவேண்டும். (f)

(1) ஒலியம். ஸினுப்பிஸ்

மஸ்ட்டர்ட். ஆயில்.

(d)

கடுகு எண்ணெய்

இது தண்ணீரைக்காட்டிலும் கனமுள்ளது.

உபயோகம்:—1 பங்கு “கடுகு எண்ணெயும்,” 2 பங்கு “டர்ப்பெண்டைனும்” சேர்த்து ஒன்றாய்க் குலுக்கி நெஞ்சில் கட்டியிருக்கும் கபத்தை இளக்க, நெஞ்சில் தேய்த்துக் கோதுமைத் தவிடு வருத்தாவது அல்லது பிளானல் துணியை கொதிக்கிற தண்ணீரில் முக்கிப் பிழிந்தாவது ஒத்தடம் கொடுக்கலாம்.

(159) லோடா. டார்ட்டரேட்டா.

(d)

குணம்:—கதார்ட்டிக்

அளவு—2 முதல் 4 டிராம்.

உபயோகம்:—சுகமாய் 3 அல்லது 4 தடவல் மலம் வெளி யாக “ஸெட்லிட்ஸ். பவுடர்”

(d)

(d)

“ஸிங்கிள் டோஸ்” கொடுக்கவும்.

(g) (d)

செய்யும் விதம்:—

எடுத்துக்கொள்

ஸோடா. டார்ட்டரேட்டா கிரைன் 120

(d)

ஸோடா. பைகார்ப். கிரைன் 40

(b) (b)

ஒன்றுசேர்

இந்த இரண்டையும் நன்றாய்த் தூளாக்கி ஒன்று சேர்த்து 10 அவுன்ஸ் குளிரந்த தண்ணீரிலாவது வெந்நீரிலாவது கரைத்து 38 கிரைன் “டார்ட்டாரிக் காஸிட்” டோடு சேர்த்துப் பொங்குகிறபோது சாப்பிடவும். 3 அல்லது 4 தடவல் மலசுத்தியாகும். கடுமையான மலச்சிக்க லுள்ளவர்களுக்குக் கொடுக்க ‘ஸ்டெல்லிடஸ். பவுடர்’ டபிள்

(d)

(d) (d),b)

டோஸ்” ஆனால்

(d)

“ஸோடா டார்ட்டரேட்”

(d)

“ஸோடா. பைகார்ப்”

(d) (b) (b)

இந்த இரண்டையும் மேல்காட்டிய “ஸிங்கிள் டோஸ்” அளவைப்போல் கூட ஒரு

(d)

பங்கு அதிகமாய்ச் சேர்த்துக் கொள்ளவும்.

ஆனால் “டார்ட்டாரிக் ஆஸிட்” டை மட்
(d)

மும் ஸிங்கிள் டோஸில் உபயோகப்படுத்தி
(d)

யதுபோல் 38 கிரான் தான் சேர்த்துக்
கொள்ளவும்.

(160) லோடியை. பென்ஸால்.

(d)

(z)

குணம்:—டயூரேட்டிக்

அளவு:—5 முதல் 30 கிரான்

உபயோகம்:—இதை நீரைப் பிரிக்கிறதற்காகவும், மூத்திரப்
பைக்குள் உண்டாகும் விஷத்தன்மையை
நீக்கவும் தடவல் 1 க்கு 10 கிரான் வீதம்
1 அவுன்ஸ் “இன்பியூஷன் பக்கு” வோடு
(f) (b)

சேர்த்து நாள் 1 க்கு 3 தடவல் கொடுக்க
லாம்.

“பார்லி அரிசி”. கஞ்சியில் பாலும் சீனியும்
(b)

சேர்த்துக் கொடுக்கலாம்.

(161) லோடா பைகார்ப்.

(d) (b) (b)

லோடா. உப்பு.

(d)

குணம்:—அன்டாஸிட்

(d)

அளவு:—5 முதல் 30 கிரான்

உபயோகம்:—(1) கொதிக்கிற தண்ணீராவது, தீயாவது
காய்ந்த எண்ணெயாவது மேல் பட்டவுடன்
அந்த நிமிஷமே “ஸோடா” உப்பை” தண்
(d)

ணீர் விட்டு கட்டியாய் கரைத்துக்கொண்டு
மேல் பூசினால் எரிச்சல், காந்தல் தணிந்து
கொப்பளமும் உண்டாக வொட்டாமல்
தடுக்கு மெனத் தீர்மானிக்கிறார்கள்.

(2) வயிற்றுவலி, அஜீரணம், புளித் தேப்பம்
இவைகளுக்கு உள்ளுக்கும் கொடுக்கலாம்.

(162) ஷோடிசை. புரோமிடம்

(d) (b) (d)

குணம்:—ஆன்டிஸ்பாஸ்மோடிக்

(d)

அளவு:— 5 முதல் 30 கிரான்

உபயோகம்:— இது “போட்டாஸ். புரோமைட்” குளோ
(b) (d)

ரல். ஐட்ரஸ்” இவைகளைப்போல் அதிகமாய்
(h)

இருதயத்தைச் சேட்டை செய்யாது. இதை
காக்கை வலிப்புக்கு தடவல் 1 க்கு 5
கிரான் “போட்டாஸ். புரோமைட்” டோ
டும் 2 துளி லைக்கர். ஆர்ஸெனக்கரலி
ஸோடும்” சேர்த்து நாள் 1-க்கு 3 தடவல்
ஆகாரத்துக்குப் பின் கொடுக்கலாம்.

(163) ஸோடா. ஸாலிஸிலஸ்

(d)

இது தகடு தகடான வெண்மையான தூள்.

குணம்:—(1) ஆன்டி. ருமேட்டிக் = (வாதத்தைக் குணமாக்குகிற மருந்து.)

(2) ஆன்டிபைரேட்டிக்

அளவு:—10 முதல் 30 கிரான்

உபயோகம்:—(1) இந்த மருந்தை காய்ச்சல் சூட்டைத் தணிக்க “கோயினு” வோடு சேர்த்துக் கொடுக்க வேண்டுமானால் தண்ணீரில் கலந்து மிக்சராகக் கொடுக்கக்கூடாது.

இரண்டையும் தூளாகவே கலந்து கொடுக்க வேண்டும்.

(2) மும்மாமான வாதத்தோடு ஏற்படுகிற காய்ச்சல் சூட்டைத் தணிக்கவும் வாதத்தைக் குணமாக்கவும், 20 கிரான் “ஸோடா (d)

ஸாலிஸில” லை $\frac{1}{2}$ அவுன்ஸ் தண்ணீரிலாவது, நிலவேம்புக்கஷாயத்திலாவது கரைத்து 2 மணிக்கொரு தடவல், 3, 4 அல்லது 6 தடவல் கொடுக்கலாம். ஆனால் ஒருநாள் பூராவும் 120 கிரானுக்குமேல் கொடுக்கக் கூடாது.

3 தடவல் கொடுத்து நாலாம் தடவல் கொடுக்கும்போது “தர்மாமிட்டர்” வைத்தும் பார்த்துக்கொண்டு, காய்ச்சல்கூடு இன்னம் தணிய வேண்டியதிருந்தால் மட்டும் கொடுக்க

கவும். ஆனால் தடவல் 1 க்கு 20 கிரான் வீதம் நாள் 1 க்கு 6 தடவலுக்குமேல் கொடுக்க வேண்டாம்.

(3) இதற்கு கட்டுப்பட்டிருந்த சூதகத்தை திரும்பவும் படுப்படி செய்கிற குணமும் உண்டு.

(164) ஸோடா. வல்பஸ்

(d) (f)

குணம்:—கதார்ட்டிக்

அளவு:— $\frac{1}{2}$ முதல் 2 டிராம் = (அடுத்தடுத்துக் கொடுக்க)

2 முதல் 4 டிராம் = (ஒரே தடவலாகக் கொடுக்க)

உபயோகம்:—இதைக் காய்ச்சலில், மலமும் வெளியாகி அதோடு பித்தமும் கழிய உபயோகப்படுத்தலாம்.

(165) ஸோடா. வல்பிஸ்

(d) (f)

குணம்:—ஆன்டி ஸெப்டிக்

அளவு:—5 முதல் 20 கிரான்

உபயோகம்:—இதை விசேஷமாக வெளிப் பிரயோகமாக ஆராத புண்கள் சிங்குகளிலுள்ள விஷப் பூச்சிகளைக்கொன்று அதன் மூலமாய்க் குணத்தைக் கொடுக்க தண்ணீரில் கரைத்து உபயோகிக்கலாம்.

(166) ஸ்பிரிட். ரெக்ட்டிபிகேட்டஸ்

(f)

ரெக்ட்டிபைட். ஸ்பிரிட்

(f)(d)

இது டிஞ்சர்களெல்லாம் செய்யவும். மற்ற
மருந்துகள் கலந்த ஸ்பிரிட்டாக லெல்லாம்
செய்யவும் உபயோகப்படுகிறது.



(167) மிக்சர் ஸ்பிரிட் வைனி காலிக்சி.

(g)

அல்லது

எக். பிளிப்

(g) (f)

எக் பிளிப்:—

(g) (f)

செய்யும் விதம்:—

$\frac{1}{2}$ படி சுடுகிற பாலில் 1 முட்டையின் மஞ்
சன் கருவை வாய் அகன்ற ஒரு கோப்பை
யில் ஊற்றி “எக்பீட்டர்” என்னும் கடை
(g)(b)

கிற கருவியால் கடைந்து நன்றாய் முட்டை
யின் மஞ்சன் கருவையும் பாலைபும் ஒன்று
சேர்த்துக் கலக்கிக்கொண்டு இதில் கொஞ்
சம் சீனியும் 1 அவுன்ஸ் பிராந்தியும், அவ
சியமானால் லவங்கப்பட்டைத் தூளாவது
அல்லது கிராம்புத் தூளாவது சேர்த்துக்
கொண்டு சாப்பிடவும். இந்த அளவுப்படி
சாப்பிட்டு ஜீரண சக்தியில் குறைவில்லாம

இருந்தால் அவரவர்கள் தேகநிலைமைக்கும் ஜீரணக் கருவிகளின் பலத்துக்கும் தகுந்த படி முட்டையையும் பாலையும் அதிகப்படுத்திக் கொள்ளலாம்.

உபயோகம்:—இது தேகத்திற்கு சத்தைக்கொடுத்து களைப் பைமாற்றி உற்சாகத்தைக் கொடுக்கும்.

(168) ஸ்டிராமோனியா. போலியா

(f)

ஸ்டிராமோனியா இலைகள்

உபயோகம்:—இதை இளைப்புக்காரர்களுக்குத் தனிமையாக வாவது, புகையிலையோடு சேர்த்தாவது சுருட்டி, சுருட்டுக் குடிப்பதுபோல் புகை குடித்தால் இளைப்பு நிற்கும்.

(1) டிஞ்சர். ஸ்டிராமோனியம்.

குணம்:—ஆன்டி ஸ்பாஸ்மோடிக்

(d)

அளவு:—5 முதல் 15 துளி

உபயோகம்:—இதையும் இலைகளுக்குப் பதிலாக உள்ளுக்கு இளைப்பை நிறுத்தத் தண்ணீரில் கலந்து கொடுக்கலாம்.

(2) எக்ஸ்ட்ராக்ட்டம். ஸ்டிராமோனியம்

இதையும் இளைப்பு வருகிறதற்கு 1 அல்லது 2 மணி நேரத்திற்கு முன் $\frac{1}{2}$ முதல் 1 கிரான் மாத்திரையாகக் கொடுத்தால் இளைப்பை வரவொட்டாமல் தடுக்கும்.

(169) ஸ்ட்ரோ பாந்தஸ். ஸ்ட்ரோ

(f) (d)

(Strophanthus)

(1) டிஞ்சர். ஸ்ட்ரோபாந்தஸ்

(f)

குணம்:—கார்டியக். டானிக்

(d)

அளவு:—5 முதல் 15 துளி

உபயோகம்:—இதை இருதய வியாதியைக் கண்டிக்கவும், இருதய நலையை ஒழுங்குபண்ணி சரியான நிலமையில் வைக்கவும் உபயோகப்படுத்தலாம். இதற்கு “டிஜிடாலிஸ்”ப் போல் இருதய நலையை ஒழுங்கு பண்ணுகிற குணம் உண்டு; ஆனால் நீரைப் பிரிக்கிற குணம் அவ்வளவு அதிகமில்லை.

இருதய வியாதிக்கு முதலில் தடவல் 1க்கு 5 துளி “டிஞ்சர். டிஜிடாலிஸ்” இதை

(d)

1 அவுன்ஸ் தண்ணீரில் சேர்த்து நாள் 1 க்கு 3 தடவல் ஆகாரத்துக்குப் பின் கொடுக்கவும். இப்படி “டிஞ்சர். டிஜிடாலிஸ்” 2

(d)

மாசம் கொடுத்து பிறகு 1 மாசம் “டிஞ்சர். ஸ்ட்ரோபாந்தஸ்” இதை தடவல் 1 க்கு 5

(f)

துளி வீதம், 20 துளி “ஈஸ்டன்ஸ் விரப்” போடு சேர்த்து இந்த இரண்டையும் 1 அவுன்ஸ் தண்ணீரில் கலந்து நாள் 1 க்கு 3 தடவல் ஆகாரத்துக்குப் பின் கொடுக்கவும்

ஆனால் இடை இடையே இருதயத்தைச் சோதித்துக்கொண்டு கொடுத்து வரவும்.

(170) ஸ்ட்ரிக்னைன்

இது “எட்டிக்கொட்டை” யிலிருந்து எடுக்கப்படுகிற தண்ணீரில் கரையாத வெண்மையான கசப்புள்ள உப்பு.

குணம்:—தாது நரம்புகளுக்குப் பலத்தைக் கொடுக்கக் கூடியது.

அளவு:—1/60 முதல் 1/15 கிரான் அதாவது (1 கிரானில் 60 ல் 1 பங்கு முதல் 1 கிரானில் 15 ல் 1 பங்கு)

(1) லைக்கர். ஸ்ட்ரிக்னைன். ஐட்ரோகுளோரைட்

(h d)

(d)

செய்யும்விதம்:— $\frac{1}{2}$ அவுன்ஸ் “ரெக்ட்டிபைட். ஸ்பிரிட்”

(f) (d)

டை 2 அவுன்ஸ் பிடிக்கக்கூடிய “டெஸ்ட். டியூப்” பில் விட்டு அதில் 8 $\frac{1}{2}$ கிரான் “ஸ்ட்ரிக்னைன். ஐட்ரோ குளோரைட்” டைப்

(h d)

போட்டு “ஸ்பிரிட் ஷிளக்கில்” நன்றாய்க் கொதிக்க வைத்துக் கரைத்து இதோடு 19 துளி ஆஸிட் ஐட்ரோ “குளோரிக். டில்”

(d) (h d)

(d)

சேர்த்து எல்லாம் சேர்ந்து 2 அவுன்ஸ் அளவுக்குப் போதுமான “டிஸ்டில்ட். வாட்டர்”

(d)

(d)

சேர்த்துக்கொள்ளவும்.

குணம்:—தாது நரம்புகளுக்குப் பலத்தையும் உற்சாகத்தையும் கொடுக்கக் கூடியது.

அளவு:—2 முதல் 8 துளி

உபயோகம்:—இது விஷமான மருந்தாகையால் வெகு ஜாக்கிரதையாய் மேல்காட்டிய குறைவான அளவில் உபயோகிப்பதோடு கூட, மற்ற மருந்துகளோடு மிக்சரில் சேர்ந்து வரும் போது எல்லா மருந்துகளும் சேர்த்தபிறகு கடைசியாக இதைச் சேர்க்க வேண்டியது. ஏனென்றால் முதலிலாவது நடுவிலாவது போட்டால் சிலவேளைகளில் இதைச் சேர்த்தோமோ இல்லையோ என்ற சந்தேகமுண்டாகி இரட்டிப்பாக மறுபடியும் சேர்த்து விடாம விருக்கத்தான். இந்த மருந்தை தடவல் 1 க்கு 8 துளிக்குமேல் கொடுக்கக் கூடாது.

(1) தாதுபலயினத்தை மாற்ற “ஸ்ட்ரிக்ளைன்”
(எட்டி உப்பு) சேர்த்திருக்கிற:—

(1) “எஸ்டன்ஸ். ஸிரப்”

(2) “பைனோ. ஐப்போபாஸ் பைட்ஸ்”

(b) (h) (f) (f)

(3) பைனின். அமரா”

(b)

(4) “அக்ஸிலிஸ். நெர்விகர். ஸிரப்”

(h)

(g)

வித் பார்மேட்ஸ்”

(f)

(5) “பெல்லோஸ். காம்ப்வுண்ட். ஸிரப்”

(f)

என்ற “பேட்டென்ற மருந்துகளி” ல் யாதேனும் ஒன்றை அதற்கு ஏற்பட்டுருக்கிற அளவில் நாள் 1 க்கு 3 தடவல் ஆகாரத்துக்குப் பின் சாப்பிடவும்.

(2) இதற்கு சூதகத்தை வெளிப்படுத்துகிற குணம் இருப்பதால் இதை மாதவிடாய்க்கு 1 வாரத்துக்கு முன் கொடுக்க:—

எடுத்துக்கொள்

கொய்னைன். ஸல்பஸ்

கிரைன் 2.

(i)

ஆஸிட் ஐட்ரோகுளோரிக். டில் துளி 4:

(d) (h d)

(d)

லைக்கர். ஸ்ட்ரிக்னைன். ஐட்ரோகுளோரைட்.

(h d)

(d)

துளி 2:

ஆக்குவா. சேர்ந்து.

அவுன்ஸ் 1

ஒன்றுசேர்

மிக்சர் செய்

இப்படி நாள் 1 க்கு 3 தடவல் ஆகாரத்துக்குப்பின் 2 வாரம் கொடுத்துவாவும்.

அல்லது

எடுத்துக்கொள்

பர்காய்ன்ஸ். ஈஸ்டன்ஸ் ஸிரப். டிராம் 1½

(b) (g)

ஆக்குவா. சேர்ந்து

அவுன்ஸ் 3

ஒன்றுசேர்

மிக்சர்செய்

தடவல் 1 க்கு 1 அவுன்ஸ்வீதம் நாள் 1 க்கு 3 தடவல் ஆகாரத்துக்குப்பின் கொடுக்கவும்.

சூதகம் சரியானபடி படும்வரை இதையே
உபயோகப்படுத்தி வரலாம்.

அல்லது

எடுத்துக்கொள்

“பைனின். அமரா”

(b)

இதில் தடவல் 1 க்கு $\frac{1}{4}$ அவுன்ஸ் வீதம்
1 அவுன்ஸ் தண்ணீரில் கலந்து நாள் 1 க்கு
3 தடவல் ஆகாரத்துக்குப்பின் கொடுக்கவும்.
இதையும் சூதகக்கட்டு நீங்குகிற வரைக்கும்
கொடுக்கவும்.

(3) இதை பக்க வாதத்துக்குக் கொடுக்கலாம்.
ஆனால் அசைவாவது, ஸ்மரணையாவது
கொஞ்சமேனும் இல்லையானால் இந்த மரு
ந்து பிரயோசனப்படாது.

“பக்கவாதத்துக்கு” க் கொடுக்க:—

எடுத்துக்கொள்

லைக்கர். ஸ்ட்ரிக்னைன். ஐட்ரோகுளோரைட்

(h d)

(d)

துளி 10

ஆலிட். நைட்ரோ. ஐட்ரோகுளோரிக் டில்

(d)

(h d)

(d)

துளி 15

டிஞ்சர். ஜென்ஷன். கோ.

துளி 45

ஆக்குவா சோந்து

அவுன்ஸ் 3

ஒன்றுசேர்

மிக்சர்செய்

தடவல் 1 க்கு 1 அவுன்ஸ் வீதம் நாள் 1க்கு
3 தடவல் ஆகாரத்துக்குப்பின் கொடுக்கவும்.
குறிப்பு:—இந்த மிக்சரை “அன்னத் துவேஷத்திற்கும்”
கொடுக்கலாம்.

“லைக்கர். ஸ்ட்ரிக்ளைன். ஐட்ரோகுளோ
(h d)

ரைட்” இதற்குப்பதிலாகத் தடவல் 1க்கு
(d)

10 துளி “டிஞ்சர். நக்ஸ்வாமிக்கா” வை
மேல்படி மிக்சரில் சேர்த்துக்கொள்ளலாம்.

(171) ஸல்போனல்

f)

இது வெண்மையானதும், வாசனை யாதொ
ன்றுமில்லாததும், ருசியில்லாததும், தண்
ணீரில் கரையாததுமான மருந்து.

குணம்:—இப்ளாட்டிக்
(h)

அளவு:—10 முதல் 30 கிரான்

உபயோகம்:—எவ்வித வியாதியிலாவது தூக்கம் வாராம
விரந்தால் தூக்கம் உண்டுபண்ண 20
கிரான் “ஸல்போனல்” பொடி செய்து
(f)

வாயில்போட்டு உமிழ் நீரோடு சேர்த்து
இறக்கி 1 அவுன்ஸ் தண்ணீர் குடிக்கவும்.
தூக்கம் உடனே வராது. சில வேளைகளில்
மருந்து கொடுத்து தூக்கம் வா மூன்று
மணிநேரம் செல்லும். இதற்கு “குளோரல்.

ஐட்ரஸ்” க்குண்டான தூர்க்குணம் கிடை
(h)

யாது.

(172) ஸல்பர், ஸப்ளிமேட்

(f) (b)

கெந்தகம்

குணம்:—(1) லாக்ஸாட்டிவ்

(2) ஆன்டிபாராஸிட்டிக்

அளவு:—20 முதல் 60 கிரான்

உபயோகம்:—தூர்நீர் கழியவும், ரத்தம் சுத்தமாகவும் தடவல் 1 க்கு 20 கிரான் வீதம் நாள் 1-க்கு 3 தடவல் கொடுத்துவந்தால் மலம் வெளி யாகி தூர்நீர் கழியும்

(1) கண்பேக்ஷன் ஸல்பர்

(f) (f)

செய்யும் விதம்:—

ஸல்பர், ஸப்ளிமேட்

அவுன்ஸ் 1

(f) (b)

கிரீம் ஆப் டார்ட்டர்

அவுன்ஸ் ½

(f)

டிராககந்த் (Tragacanth)

கிரான் 4½

(g)

ஸிரப். ஸிம்பிள்

அவுன்ஸ் ½

டிஞ்சர். ஆரண்டி.

டிராம் 1

கிளிஸெரின்

டிராம் 3

(g)

இவைகளை எல்லாம் ஒன்று சேர்த்துக் கொள்ளவும்.

அளவு:—1 முதல் 2 டிராம்

உபயோகம்:—இதை மூல உபத்திரவக்காரர்களுக்கு மூலத் தால் ரத்தம் போவதை நிறுத்தவும், மலச் சிக்கலை நீக்கவும் தடவல் 1-க்கு 60 கிரான் வீதம் நாள் 1-க்கு 3 தடவல் கொடுக்கவும்.

(2) அங்குவன்டம். ஸல்பர்

(f)

கெந்தகக்கழிம்பு

செய்யும் விதம்:—ஸல்பர். ஸப்ளிமேட்.

டிராம் 1

(f) (b)

வாஸலைன்

டிராம் 9

ஒன்றுசேர்

கழிம்பாகச் செய்துகொண்டு சிரங்குக்கு இதை மேல் தடவி வைத்திருந்து, பின்பு “ஸல்பர். வைனோலியா. ஸோப்” கொண்டு

(f)

சுத்தம் செய்யவும்.

(173) ஸனாட்டோஜன்

இதை, பலவித வியாதியினால் ஏற்படுகிற பெலஹீனத்தை மாற்றவும், லெகுவாய் ஜீரணமாகி உடம்புக்குச் சக்தியைக் கொடுக்கவும் தடவல் 1-க்கு 1 தேக்காண்டி வீதம் கொஞ்சம் பாலில் கலக்கி நாள் 1-க்கு 2 அல்லது 4 தடவல் கொடுக்கலாம்.

(174) ஸாங்குவினல்

இதை சோகைக்கும், ரத்தக் குறைவால் ஏற்படும் சூதகக் கட்டுப்பாட்டை நீக்கவும், ரத்தத்தை உடம்பில் பாவச் செய்து அதன் மூலமாய் சோகையையும் நீக்கி, பெண்களுக்கு சூதகத்தையும் வெளிப்படுத்துமெனத் தீர்மானிக்கிறார்கள்.

(175) மஞ்சர். வெணிக்கியோ.

ஜாக்கோபியா

(b)

உபயோகம்:—ரத்தப் புஷ்டியுள்ள பெண்களா யிருந்தும், சூதகம் கட்டுப்பட்டு மாதவிடாய் காலம் விருந்தால் ஒழுங்காயும், கிரமமாயும் வெளியாக தடவல் 1-க்கு 1 முதல் 2 டிராம் 1 அவுன்ஸ் தண்ணீரில் கலந்து நாள் 1-க்கு 4 தடவல் கொடுக்கலாம். சூதகம் கிரமமாய் படுகிறவரைக்கும் ஒவ்வொரு மாசத்திலும் 1 வாரம் மருந்து கொடுத்து வரவும்.

(176) ஸோமாதோஸ்

இது மஞ்சள் நிறமான, வாசனையும் ருசியமில்லாத, தண்ணீரில் கரையக்கூடிய தூள். இது லேசாய் செமித்து தேகத்துக்குச் சத்தைக் கொடுக்கக்கூடிய ஆகாரமாய் யிருக்கிறது. இதை வயிற்றுப் புண்ணுக்கும், உடம்

பை மெலிய வைத்துக் கொண்டே போகிற
 வியாதிகளுக்கும், உடம்புக்கு சத்தை
 கொடுக்க உபயோகிக்கலாம். குழந்தைக்குப்
 பால்கொடுக்கிற பெண்களுக்கு கொடுத்தால்
 அதிகமாய் சுரக்கும். இதை பசுவின் பாலில்
 நாள் ஒன்றுக்கு ஒரு அவுன்ஸ் வீதம் சேர்
 த்து சாப்பிடவும். கருதரித்திருக்கிற காலத்
 தில் உண்டாகிற வார்த்தியைநிறுத்த உயர்ந்த
 மருந்தெனத் தீர்மானிக்கிறார்கள்.

(177) ஸான்மெட்டோ

இதை முத்திரக்காய்கள், முத்திரப்பை நீர்த்
 தாரை இவைகளிலுண்டாகிற எரிச்சல் வேத
 னையைத் தணிக்கவும் முத்திரம் தாராள
 மாய் இறங்காமல் செறுத்திருப்பதை நீக்க
 வும், முத்திரம் தங்கி நின்று அடிக்கடி ஜல
 பாதைக்கு அதிக நோவோடு போகிறதைக்
 குணமாக்கவும், ஜனனேந்திரியங்களுக்குப்
 பலத்தைக் கொடுக்கவும், சொட்டு முத்திரத்
 தை குணமாக்கவும், பெண்களுக்கு முத்
 திரக் கருவிகளின் ஒழுங்கீனங்களை சரிப்ப
 டுத்தவும் பொதுவாக முத்திரக்காய்கள், முத்
 திரப்பை, நீர்த்தாரை இவைகளின் ஒழுங்கீ
 னங்களை சரிப்படுத்தவும், அவைகளில் ஏற்
 படும் வியாதிகளை குணமாக்கவும் கொடுக்
 கலாம்.

(178) எக்ஸ்ட்ராக்ட் டாராக்ஸ்ஸெஸி.

குணம்:—(1) டயூரேட்டிக் (2) லாக்ஸாட்டிவ் (3) கோலாகக்
(d) (g)

அளவு:—5 முதல் 15 கிரான் (மாத்திரைகளாகச் செய்தா
வது அல்லது தண்ணீரில் கரைத்தாவது
கொடுக்கலாம்.)

உபயோகம்—இதை பித்தத்தை வெளியாக்கவும், சமப்படுத்
தவும், மலச்சிக்கலை நீக்கவும், நீரைப் பிரிக்
கவும், மேல்காட்டிய அளவில் மாத்திரைக
ளாகவாவது தண்ணீரில் கரைத்தாவது
கொடுக்கலாம்.

மாத்திரைகளாகச் செய்து கொடுக்கும்போது
ஒவ்வொரு மாத்திரையிலும் $\frac{1}{2}$ கிரான் “எக்
ஸ்ட்ராக்ட். நக்ஸ்வாமிக்கா”வும், 2 கிரான்
“எக்ஸ்ட்ராக்ட். ஜென்ஷனு”ம் சேர்த்துக்
கொள்ளவும்,

தண்ணீரில் கரைத்துக் கொடுக்கும்போது
தடவல் ஒன்றுக்கு 5 துளி “டிஞ்சர். நக்ஸ்
வாமிக்கா”வும் 20 துளி டிஞ்சர் “ஜென்
ஷன்கோ”வும் சேர்த்துக் கொள்ளவும்.

(179) டிரபினம் = (டிரபின்)

(b)

(b)

இது வாசனையுள்ள, வெண்மையான. தண்
னீர் போன்ற மருந்து.

குணம்:—(1) ஆன்டிஸெப்டிக் (2) எக்ஸ்பெக்டோ ரென்ற்

அளவு:—5 முதல் 15 துளி

உபயோகம்:—(1) இதை விஷப்பூச்சிகளைக் கொல்லவும், கெட்ட விஷக்காற்றைப் போக்கவும், கெட்ட வீச்சத்தை மாற்றவும் உபயோகப் படுத்தலாம்.

(2) சுஷ்மரோகத்திற்கு:—

20 அவுன்ஸ் கொடுக்கிற தண்ணீரில் 10 துளி “டிரபினம்,” 10 கிரான் “தைமால்”
(b)

10 துளி “கார்பாலிக் ஆஸிட்” இந்த மூன்
(b) (d)

றையும் போட்டு “இன்யேலர்,” என்னும்
(b)

கருவியின் மூலமாகவாவது அல்லது வாயைத் திறந்துகொண்டு ஆவியை உள்ளுக்குச் சுவாசம் செய்யவும்.

(3) நரன்பட்ட தொண்டைப் புகைச்சலுக்கு:—
திக்காய் காய்ச்சின சீனிப்பாகில் தடவல் ஒன்றுக்கு 10 துளி “டிரபினம்” சேர்த்து
(b)

நாள் ஒன்றுக்கு மூன்று பொழுது கொடுக்கலாம்

(4) படுக்கையிலேயே மல ஜலம் போய்க் கொண்டிருக்கிற நோயாளிகளின் அறையில் நாற்றத்தைப்போக்க தெளித்து வைக்கலாம்.

(5) கால்ரா காலத்தில் கைக் குட்டையில் கொஞ்சம் “டிரபினம்” தெளித்துக்கொண்டு அடிக்கடி முகார்த்து பார்க்கலாம்.

(180) டிரபிந்தினி ஒலியம்.

(b)

ஆயில் ஆப். டர்ப்பென்டைன்

(f)

இதற்கு “கர்ப்பூரத்தைலம்” எனப் பெயர் வழங்கி வருகிறது. இதை உள்ளுக்குக் கொடுக்கலா மென்றாலும் அநேகமாய் வெளிப்பிரயோகமாகவே உபயோகப்படுத்தி வருகிறார்கள். இதை கைகால் உளைச்சல், குத்து, வலி, வாதவலி இவைகளுக்கு வலி யுள்ள இடங்களில் காலை மாலை நன்றாய் குடுண்டாகும்படி அழுத்தித் தேய்த்து வைத்திருந்து வெந்நீர் சுடச்சுட விடவும். அஜீரணத்தினாலாவது மற்று வேறு எந்தக் காரணத்தினாலாவது வயிற்றில் வலியிருந் தால் கொதிக்கிறதண்ணீரில் கொஞ்சம் “கர்ப்பூரத்தைலம்” ஊற்றி அதில் “பிளானல்

(f)

துணி” முக்கி இறுக்கி பிழிந்து விட்டு வயிற் றின்மேல் போட்டு வைக்கலாம். நெஞ்சில் கபம் கட்டியிருந்தால் “கர்ப்பூரத்தைலம்” நெஞ்சில் தேய்த்து பிளானல் துணியை

(f)

கொதிக்கிற தண்ணீரில் முக்கி இறுக்கி பிழி ந்துவிட்டு நெஞ்சில் ஒத்தடம் கொடுக்கலாம். அல்லது கோதுமைத்தவிடு வறுத்து ஒத் தடம் கொடுத்து திரும்பவும் “கர்ப்பூரத் தைலம்” தடவி வைக்கலாம். இப்படி நாள் ஒன்றுக்கு 3 அல்லது 4 தடவல் செய்யவும்.

கால் கை இவைகளில் சூழில்லாமல் குளிர்ந்
துபோன காலத்தில் சூடுண்டாக்க “கர்ப்பு
ரத்தைலம்” தேய்த்து கருந்தவிடாவது,
கோதுமைத் தவிடாவது, மணலாவது
வறுத்து சுடச்சுட ஒத்தடம் கொடுக்கலாம்.

(1) லீனிமேன்ற். டர்ப்பேன்டைன்

இதில் சேர்ந்திருக்கும் மருந்துகளாவன:—

6½ அவுன்ஸ் ஆயில் ஆப் டர்ப்பேன்டை

(f)

ன்.” ½ அவுன்ஸ் “காம்பர்”

(f)

¾ அவுன்ஸ் “சோப் மிக்சர்”

1 அவுன்ஸ் “டிஸ்டில்ட் வாட்டர்.”

(d)

(d)

ஆகிய இந்த நான்கும் ஒன்று சேர்ந்தது.
எல்லாம் ஒன்று சேர்த்து 10 அவுன்ஸ்
ஆகும் வரை போதுமான தண்ணீர் சேர்
த்துக்குலுக்கினால் மஞ்சள்கலந்த வெண்மை
யாயிருக்கும்.

உபயோகம்:—இதை வெளிப் பிரயோகமாக, வாதம், உளைச்
சல், வீக்கம், வலி, இவைகளுக்கு காலை மாலை
வலிவேதனையுள்ள இடங்களில் நன்றாய்
சூடுபிறக்க அழுத்தி தேய்த்து வைத்
துருந்து வெந்நீர் விட்டு வரவும்.

(181) தைமால்

இதற்கு “ஓம் உப்பு” என்று பெயர்

குணம்:—(1) ஆன்டிஸெப்டிக் (2) டியோடோரேன்ட்

(d) (d)

அளவு:— $\frac{1}{2}$ முதல் 2 கிரான்

உபயோகம்:—(1) தோலின் பேரில் உண்டாகிற சொரி, சிரங்கு, புண், இவைகளுக்கு $\frac{1}{2}$ டிராம் “தைமால்” இதை 4 டிராம் “வாஸலைனோடு” சேர்த்துக் கழிம்பாகச் செய்து மேல்தடவி வைத்திருந்து பிறகு “குட்டிக் கியூரா சோப்பு” கொண்டு சுத்தம் செய்யவும்.

(2) தலையிலும், முகத்தில் தாடிப்பக்கத்திலும் உண்டாகும் பத்துக்கு:— $\frac{1}{2}$ டிராம் “தைமால்” $7\frac{1}{2}$ டிராம் “ஈதரில்” கரைத்து மேல் போட்டால் பத்து உதிர்ந்து விடும்.

(3) தொண்டைப் புகைச்சல், இருமல், சூஷயம், இவைகளுக்கு “தைமால்” 10 கிரான். ஸ்பிரிட் $1\frac{1}{2}$ டிராம். மெக்ஸீஷியா. கார்ப் (g) (b)

5 கிரான். தண்ணீர் சேர்ந்து $1\frac{1}{2}$ அவுன்ஸ். இவ்வளவும் ஒன்று சேர்த்து 20 அவுன்ஸ் கொதிக்கிற தண்ணீரில், 1 டிராம் ஊற்றி ஆனியை சுவாசம் செய்யவும்.



(182) டிராககந்த்

(g)

இதை “கம். அக்கேஷியா” வுக்குப்பதிலாக

(g)

உபயோகப்படுத்தலாம்.

மாத்திரைகள் செய்யவும் துணைமருந்தாக
யிருக்கிறது. இது “கம். அக்கேஷியா” வை

(g)

ப்போல் வழுவழுப்புள்ள செய்கையால்
குடல் வயிறு இவைகளில் ஏற்படுகிற எரிச்
சலைத்தணிக்கும்.

(183) டாக்கா. டயாஸ்டேஸ்

(d)

இது வெளிரின மஞ்சள் நிறமானதுள்.
ஆகாரத்திலுள்ள “ஸ்டார்ச்” என்னும் பதார்
த்தத்தை (அதாவது பலவிதமான மாவு
கள் அரிசி, உருளைக்கிழங்கு இவைகளை) செ
மிக்க வைக்கும் சக்தி அதிகமாய் இதற்கு
உண்டு. ஆகையால் “ஸ்டார்ச்” என்னும்
பதார்த்தம் ஜீரணமாகாமல் ஏற்படும் அன்
னத்துவேஷத்திற்கு தடவல் ஒன்றுக்கு 2
முதல் 5 கிரான் வரை, 5 கிரான் “ஸோடா.

(d)

பைகார்ப்” போடு சேர்த்துக் கொடுக்கவும்.

(b) (b)

(184) டான்னூல்பின்

(b)

இது தனிநிறமான, ருசியில்லாத தண்ணீரில் கரையாதது. இது வயிற்றில் போய் பாதொன்றும் செய்யாமல் சும்மாயிருந்து விட்டு, குடலில் போய் வேலைசெய்து தண்ணீரையும், நெகிழ்த்தியாயும் போகிற மலத்தைக் கட்டியாக்குகிற குணம் உண்டு. ஆகையால் இதை எவ்விதமான வயிற்றோட்டத்திற்கும் தடவல் ஒன்றுக்கு 30 கிரான் வரை ஆகாரத்தோடே கொடுக்கவும். சிறு குழந்தைகளுக்கு 5 கிரான் அளவில் கொடுக்கலாம், எனத்தீர்மானிக்கிறார்கள்.

(185) வெலிரியன். ரிலோமா.

(1) டிஞ்சர். வெலிரியன். அமோனியேட்டா

குணம்:—ஸ்டிமியூலென்ட்

அளவு:—30 முதல் 60 துளி

உபயோகம்:—சூதக ஜங்கிக்குக் கொடுக்க

எடுத்துக்கொள்:—டிஞ்சர். வெலிரியன். அமோனியேட்டா

துளி 90

பொட்டாஸ். புரோமைட்

கிரான் 30

(b) (d)

ஸ்பிரிட். குளோரோபார்ம்

துளி 30

(f)

ஆக்குவா. சேர்ந்து

அவுன்ஸ் 3

ஒன்றுசேர்

மிக்கச்செய்

தடவல் 1 க்கு 1 அவுன்ஸ் வீதம் நாள் 1க்கு
3 தடவல் கொடுக்கலாம்.

(186) யுரோட்ரோபைன்

இது வெண்மையான, தண்ணீரில் கரையக்கூடிய மருந்து.

இதை மூத்திரப்பையின் வியாதிக்கு 15 முதல் 20 கிரான் அளவில் 1 அவுன்ஸ் தண்ணீரிலாவது, அல்லது 2 அவுன்ஸ் “இன்பியூஷன் பக்கு” விலாவது கரைத்துக்

(f) (b)

கொடுக்கலாம்.

(187) வைபர்னம் புருநிபோலியம்

(b)

(f)

(1) எக்ஸ்ட்ராக்ட்டம். வைபர்னம். புருநிபோலியம்.

(b)

(f)

லிக்குவிடம்

(d)

இதை சூதக வயிற்றுவலிக்கு, கருக்குழியிலிருந்து வருகிற ரத்தப்பெருக்கை நிறுத்தவும், மசக்கை வார்த்தியை நிறுத்தவும், கருத்தரித்திருக்கையில் பூண கர்ப்பம் ஆகிறதற்கு முன் கருப்பை சுருங்காமல் இருக்கவும் செய்ய, தடவல் 1 க்கு 60 துளி வீதம் கொடுக்கலாம்.

(188) வையோபாரம்

(f)

இதை “அயோடபாரத்துக்குப்” பதிலாக
புண்கள், வெட்டுக்காயங்கள், ரணங்கள்
இவைகள் ஆற உபயோகப்படுத்தலாம்.

(189) வார்பர்க்ஸ். டிஞ்சர்

(b)

இதற்கு “டிஞ்சரா. ஆன்டி பீரியாடிக்கா”

(d)

என்றும் பெயர்.

அளவு:—1 முதல் 4 டிராம்.

உபயோகம்:—இதை மலேக்காய்ச்சல் மற்றும் வேறுவிதமான
காய்ச்சல்களுக்கும் கொடுக்கலாம்.

மருந்து கொடுத்தவுடன் தண்ணீராவது
அல்லது தண்ணீர்போன்ற ஆகாரமாவது
கொடுக்கக் கூடாது. மறுபடியும் 3 மணி
நேரம் கழித்து மருந்து கொடுக்கவேண்டும்.
இரண்டாவது தடவல் மருந்து கொடுத்த
பின் வேர்வை உண்டாகிக் காய்ச்சல் தணி
யும்.

(190) வைரால்

இதை குழந்தைகளுக்கு தேகம் கண்டிக்க,
“காட்.லிவர் ஆயிலு”க்குப் பதிலாக தடவல்

(d)

ஒன்றுக்கு ½ முதல் 1 தேக்காண்டி சுடுநிற
பசுவிற்பாலில் கலக்கிக் கொடுக்கலாம்.

(191) சிங். ஆக்ஸைட்.

(z)

(d)

இது மிருதுவான, வெண்மையான, தண்ணீரில் கரையாதது. இதை உள்ளுக்கு தடவல் ஒன்றுக்கு 3 முதல் 10 கிரான், $\frac{1}{4}$ கிரான் “எக்ஸ்ட்ராக்ட் பேல்லடோஸ்”

(b) (d)

விரிடி” வோடு சேர்த்து மாத்திரையாகச்
(d)

செய்து காக்கை வலிப்புக்கும் கூடியரோகிகளுக்கு இரவில் உண்டாகும் வேர்வையைத் தணிக்கவும் கொடுக்கலாம்.

வெளிப் பிரயோகமாக 1 டிராம் சிங் ஆக்.
(z)

ஸைட், 1 டிராம் போரிக் ஆசிட், 6 டிராம்
(d) (b) (d)

வாஸலைன், இந்த மூன்றையும் ஒன்றுசேர்த்துக் கழிம்பாகச் செய்து சிரங்கு, பித்த வெடிப்பு இவைகளுக்குப் போடலாம்.

(192) சிங். ஸல்பஸ்.

(z)

(f)

இதற்கு “ஒயிற். வீட்ரியல்” என்று பெயர். உபயோகம்:—உள்ளுக்கு பலத்திற்காக 1 முதல் 3 கிரானும், வாந்தி உண்டுபண்ண 10-முதல் 30 கிரானும், மேகத்திற்கு நீர்த்தாரைக்குள் ஸிரிஞ்சுபண்ண ஒரு அவுன்ஸ் தண்ணீருக்கு 2 கிரான் வீதம் கரைத்தும், கண்ணில் சிவப்பு, கண்வலிக்கு 1 அவுன்ஸ் மழைத் தண்ணீரில்

அல்லது பன்னீரில் 1 கிரான் வீதம் கரைத்
தும் உபயோகப்படுத்தலாம்.
கண்வலி கண்சிவப்புக்கு ஐடிராப்ஸ்”

(d)

செய்யும் விதம்:—

சிங். ஸல்பஸ்.	கிரான் 1
(z) (f)	
ஆஸிட். போரிக.	கிரான் 10
(d) (b)	
கிளிஸெரின்	துளி 40
(g)	
டிஸ்டில்ட். வாட்டர்	அவுன்ஸ் 1
(d) (d)	
எல்லாம் ஒன்று சேர்த்து ஐ. டிராப்ஸ்	(d)
பாட்டிலில் வைத்துக்கொண்டு கண்ணில்	
காலை மாலை 5 துளி விடவும்.	

(193) சிங். வெலிரியன்.

(z)

இது வீச்சமுள்ள, வெண்மையான மருந்து.
அளவு:—1 முதல் 3 கிரான் (மாத்திரையாகச் செய்து கொ
டுக்கவும்.)

உபயோகம்:—இதை சூதக ஜன்னிகமும், சூதக வயிற்று
வலிக்கும் கொடுக்க.

எடுத்துக்கொள்

சிங். வெலிரியன்

கிரான் 6

(z)

பிங். ஆலோஸ். எற். மற். கிரைன் 36
 பொட்டாஸ். பெர்மாங்கனஸ். கிரைன் 3
 எக்ஸ்ட்ராக்ட். அயோஸியாமஸ் கிரைன் 3
 பெர்ரை. ஸல்பஸ் கிரைன் 12
 (f) (f)

ஒன்றுசேர்

இந்த மாத்திரையை ஜாக்கிரையாய்ச் செய்
 யவேண்டும், முதலில் “ஸிலாப்” பையும்,
 ‘போலஸ்கத்தி’யையும் நன்றாய்த்துடைத்து
 (b)

விட்டு “பொட்டாஸ். பெர்மாங்கனஸை”
 நன்றாய் தூள்செய்து கொண்டு கொஞ்சம்
 “வாஸலைன்” சேர்த்து நன்றாய் ஒன்று
 சேர்த்துக்கொண்டு அதோடு ‘பில்ஆலோஸ்.
 எற். மர்” ரையும், “எக்ஸ்ட்ராக்ட். அயோ
 ஸியாமஸை” யும் ஒன்று சேர்த்து பிறகு,
 “பெர்ரை ஸல்பஸை”யும், “சிங். வெலிரி
 (f) (f) (z)

யனை” யும் நன்றாய்த் தூளாக்கி எல்லாம்
 ஒன்றுசேர்த்து உருட்டி 12 மாத்திரைகளா
 கப் பிரித்துக் கொள்ளவும்.

தடவல் ஒன்றுக்கு 1 மாத்திரை வீதம் நாள்
 ஒன்றுக்கு மூன்று தடவல் ஆகாத்திற்குப்
 பின் கொடுக்கவும்.

(194) சிஞ்சிபெர்

(z) (b)

ஜிஞ்சர்

இஞ்சி

குணம்:—கார்மினேட்டிவ்

(1) ஸீரப் ஜிஞ்சர்.

குணம்:—கார்மினேட்டிவ்

அளவு:— $\frac{1}{2}$ முதல் 1 டிராம்

(2) டிஞ்சர். ஜிஞ்சிபெரிஸ்

(z) (f)

“இஞ்சி அல்லது சுக்குத்திராவகம்

அளவு:—30 முதல் 60 துளி

உபயோகம்:—இதை வயிற்றுப் பொதுமல், புளித்தேப்பம், அஜீரணம், இவைகளுக்குக் கொடுக்கலாம்.

முன்னுரை பாகம்

முதல் பிரிவு

தற்காலம் வழக்கத்திலிருக்கிற மிக்சர்களின் பெயர்களையும், அவைகளைச் செய்யவேண்டிய விதங்களைப்பற்றியும். அவைகளை இன்னின்ன வியாதிகளுக்கு எவ்விதமாய்க் கொடுக்கலாம் என்பதைப்பற்றியும் தெளிவாய் எழுதப்பட்டிருக்கிறது.

(1) பொட்டாஸ். அயோடைட். மிக்சர்.

(d)(d)

நம்பர். 1.

செய்யும் விதம்:—

எடுத்துக்கொள்

பொட்டாஸ். அயோடைட். கிரான் 15

(d)(d)

ஸ்பிரிட். அமோனியா. அரோமேட்டிக்

துளி 15

டிஞ்சர். ஜென்ஷன். கோ

துளி 60

ஆக்குவா. சேர்ந்து.

அவுன்ஸ் 3

ஒன்றுசேர்

மிக்சர் செய்

இதை “வாதத்திற்கு” தடவல் 1 க்கு 1 அவுன்ஸ் வீதம் நாள் 1 க்கு 3 தடவல் ஆகாததுக்குப்பின் கொடுக்கவும்.

வாதம் குணமாகும் வரை நீடித்துச் சாப்பி
டவும். இந்த மிக்சர் கொடுக்கும்போது, சிலர்
களுக்குப்பிடியாமல் ஜலதோஷம்கொள்ளும்.
ஜலதோஷம் பொறுக்க முடியாமல் அதிக
கஷ்டப்படுத்துகிறதாய் இருந்தால் மிக்சரை
உடனே நிறுத்தி விட்டு ஜலதோஷம் நீங்
கினபின் திரும்பவும் ஆரம்பித்து, ஏற்றுக்
கொள்ளும் வரை இடை இடையே விட்டுக்
கொடுத்து வாவும்.

மற்றொருமுறை:—

எடுத்துக்கொள்

பொட்டாஸ். அயோடைட். கிரான் 15

(d)(d)

ஸ்பிரிட். அமோனியா, அரோமேட்டிக்.

துளி 15

இன்பியூஷன், கிரட்டா — (நிலவேம்புக்

(f)

கஷாயம்) சேர்ந்து.

அவுன்ஸ் 3

ஒன்றுசேர்

மிக்சர்செய்

இதையும் “வாதத்திற்கு” தடவல் 1 க்கு
1 அவுன்ஸ் வீதம் நாள் 1 க்கு 3 தடவல்
ஆகாரத்துக்குப்பின் கொடுக்கவும்.

மற்றொருமுறை:—

எடுத்துக்கொள்

பொட்டாஸ். அயோடைட்

கிரான் 15

(d)(d)

ஸ்பிரிட். அமோனியா. அரோமேட்டிக்.

	துளி 15
டிஞ்சர். ஜென்ஷன். கோ	துளி 60
டிஞ்சர். நக்ஸ்வாமிக்கா.	துளி 15
ஸ்பிரிட். குளோரோபார்ம்.	துளி 30

(f)

ஆக்குவா. சேர்ந்து	அவுன்ஸ் 3
	ஒன்றுசேர்

மிக்சர்செய்

இதையும் “வாதத்திற்கு” தடவல் 1 க்கு 1 அவுன்ஸ் வீதம் நாள் 1க்கு 3 தடவல் ஆகா ரத்துக்குப் பின் கொடுக்கவும்.

போட்டாஸ். அயோடைட். மிக்சர் நம்பர். 2

(d)(d)

இதை “போட்டாஸ். அயோடைட்” அதிக (d)(d)

மாய்க் கொடுக்கவேண்டிய சந்தர்ப்பத்தில் உபயோகப்படுத்தவும்.

செய்யும் விதம்:—

முன் எழுதியிருக்கிற “போட்டாஸ். அயோடைட். மிக்சர். நம்பர் 1 க்கு எடுத்துக் (d)(d)

கொண்ட மருந்துகளில், “போட்டாஸ். அயோடைட்” “ஸ்பிரிட். அமோனியா. (d)(d)

அரோமேட்டிக்” இந்த இரண்டை மட்டும் இரட்டிப்பாகச் சேர்த்துக் கொள்ளவும்.

(2) கொய்னைன் மிக்சர்

செய்யும்விதம்:—

எடுத்துக்கொள்

ஸல்பேட். ஆப். கொய்னைன். கிரைன் 12

(f) (f)

இதை 15 துளி “ஆஸிட். ஸல்பியூரிக் டில்

(f) (d)

சேர்த்துக் கரைத்து, இதோடு 1 டிராம் தண்ணீர் சேர்த்துக்கொண்டு, பிறகு 1½ டிராம். ஸிம்பிள். ஸிரப். சேர்த்து, இதோடு எல்லாம் ஒன்றுசேர்ந்து 3 அவுன்ஸ் ஆகும்வரை போதுமான தண்ணீர் சேர்த்துக் கொள்ளவும்.

இதைக் “குளிர்காய்ச்சல்,” “மலைக்காய்ச்சல்,” “முறைக் காய்ச்சல்” இவைகளுக்கு காய்ச்சல் வருமுன் கொடுக்கலாம். மற்றக் காய்ச்சல்களும் அதிகமான “டெம்பரேச்சரி” வீருந்து இறங்கி 99 டிகிரிக்கு வந்திருக்கும்போது கொடுக்கலாம்.

தடவல் 1 க்கு 1 அவுன்ஸ் வீதம் நாள் 1க்கு 3 தடவல் கொடுக்கவும்.

(3) சின்கோனா மிக்சர்

செய்யும்விதம்:—

எடுத்துக்கொள்

சின்கோனா பார்க்.

டிராம் 1½

(b)

இதை ஒரிடிப்பாய் இடித்துத் தூளாக்கி
 1½ அவுன்ஸ் தண்ணீரில் 10 நிமிஷம் கொதி
 க்கவைத்து வடிகட்டிக்கொண்டு, 18 துளி
 ஆஸிட் ஐட்ரோ குளோரிக். டி. இதோடு
 (d) (h) (d)

1½ அவுன்ஸ் தண்ணீர் சேர்த்து, இதைக்
 கொஞ்சம் கொஞ்சமாய் மேலே வடிகட்டி
 வைத்திருப்பதோடு சேர்த்து, எல்லாம்
 ஒன்றுசேர்ந்து 3 அவுன்ஸ் ஆகும் வரை
 போதுமான தண்ணீர் சேர்த்துக் கொள்ள
 வும்.

இதைக் “காய்ச்சலுக்கும், கதகதப்பைத்
 தணிக்கவும்,” கொடுக்கலாம்.

தடவல் 1 க்கு 1 அவுன்ஸ் வீதம் நாள் 1 க்கு
 3 தடவல் கொடுக்கவும்.

(4) மிக்சர். ஆஸிட். ஸல்பியூரிக்.

(d) (f)

கம். ஒப்பியம்.

செய்யும் விதம்:—

எடுத்துக்கொள்

ஆஸிட். ஸல்பியூரிக். டி.

துளி 30

(d) (f) (d)

டிஞ்சர். ஒப்பியம்.

துளி 30

ஸ்பிரிட். சின்னமன்.

துளி 15

ஆக்குவா. சேர்ந்து.

அவுன்ஸ் 3

ஒன்றுசேர்

மிக்சர்செய்.

இதை “ஜீரணமாகாத ஆகாரம் வயிற்றிலி
லாமலும், வயிற்று உப்பிச மில்லாமலும்,
அதே காலத்தில் மலம் தண்ணீராய்ப்போய்க்
கொண் டிருந்தால் அந்தச் சமயம் மலத்
தைக்கட்ட”க் கொடுக்கலாம். தடவல் 1 க்கு
1 அவுன்ஸ் வீதம் 3-மணி நேரத்துக்கொரு
தடவல் கொடுக்கவும்.

(5) மிக்சர். கிரீட்டா. கம். காட்டிக்கியூ.

செய்யும் விதம்:—
எடுத்துக்கொள்

கம். அக்கேஷியா. கிரான் 30

(g)

பிரிப்பேர்ட். கூடாக். கிரான் 45

(d)

முதலில் “கம் அக்கேஷியா”வை “மார்ட்ட
ரில்” கொஞ்சம் தண்ணீர்விட்டு பசைபோல்
அரைத்துக் கொண்டு “பிரிப்பேர்ட். கூடாக்

(d)

கையும் சேர்த்ததைத்து 2 அவுன்ஸ் தண்ணீர்
சேர்த்துக் கலக்கி, இதோடு 1 டிராம் “டிஞ்
சர். காட்டக்கியூ”வும். 30 துளி “ஸ்பிரிட்.
குளோரோபார்”மும் 30 துளி “வைனம்.

(f)

இப்பிக்காக்’கும் சேர்த்து எல்லாம் ஒன்று
சேர்த்து 3 அவுன்ஸ் ஆகும் வரை போது
மான தண்ணீர் சேர்த்துக் கொள்ளவும்.

இதை “வயிற்றோட்டத்திற்கு”க் கொடுக்கலாம்.

தடவல் 1-க்கு 1-அவுன்ஸ் வீதம் நாள் 1-க்கு 3 தடவல் கொடுக்கவும்.

(6) கார்மினேட்டிவ். மிக்சர்

லோடா. பைகார்ப்

கிரான் 30

(d) (b) (b)

இதை 1 அவுன்ஸ் தண்ணீரில் கரைத்து, இதோடு 2 துளி “ஆயில். பெப்பர்மின்ட்” இதை “மினிம். மெஷரில்” 30 துளி “ஸ்பிரிட் குளோரோபாரம்” சேர்த்துக் கரைத்து, கலந்து இதில் 1 டிராம் “டிஞ்சர். கார்டம்.

(d)

கோ’வும், 30 துளி “ஸ்பிரிட். அமோனியா அரோமேட்டிக்” கும் சேர்த்து எல்லாம் ஒன்று சேர்ந்து 3 அவுன்ஸ் ஆகும் வரை போதுமான தண்ணீர் சேர்த்துக் கொள்ளவும்.

இதை “அஜீரணம், புளித்தேப்பம், வயிற்று வலி, வயிற்றோட்டம்” இவைகளுக்குக் கொடுக்கலாம்.

தடவல் 1 க்கு 1 அவுன்ஸ் வீதம் நாள் 1க்கு 3 தடவல் கொடுக்கவும்.

(7) எக்ஸ்பெக்டோரென்ஸ். மிக்சர்

செய்யும் விதம்:—

எடுத்துக்கொள்

ஸோடா. பைகார்ப்.	கிரான் 30
(d) (b) (b)	
வைனம், இப்பிக்காக்	துளி 30
டிஞ்சர் காம்ப்ர். கோ.	துளி 60
(f)	
ஸ்பிரிட். குளோரோ பார்ம்,	துளி 30
(f)	
ஆக்குவா. சேர்ந்து.	அவுன்ஸ் 3
	ஒன்றுசேர்

மிக்சர் செய்

இதை “தொண்டைப் புகைச்சலை நிறுத்தக்”
கொடுக்கலாம்.

தடவல் 1 க்கு 1 அவுன்ஸ் வீதம் நாள் 1 க்கு
3 தடவல் ஆகாரத்துக்குப் பின் கொடுக்கவும்.

(8) ஸெனிகா மிக்சர்

(g)

செய்யும் விதம்:—

எடுத்துக்கொள்

அமோனியா. கார்ப்.	கிரான் 15
(b)	
டிஞ்சர். ஸெனிகா.	துளி 90
(g)	
ஆக்குவா. சேர்ந்து.	அவுன்ஸ் 3
	ஒன்றுசேர்

மிக்சர்செய்

இதை “நாள்பட்ட இருமலுக்கு”க் கொடுக்கலாம்.

தடவல் 1 க்கு 1 அவுன்ஸ் வீதம் நாள் 1க்கு 3 தடவல் ஆகாரத்துக்குப் பின் கொடுக்கவும்.

(9) டயாபோரெட்டிக். மிக்சர்.

(d) (f)

செய்யும்விதம்:—

எடுத்துக்கொள்

பொட்டாஸ். நைட்ரஸ்.	கிரான் 15
லைக்கர். அமோனியா. ஆஸிட்.	
டேட்டிஸ்.	டிராம் 6
டிஞ்சர். அயோஸியாமஸ்.	துளி 30
ஸ்பிரிட். ஈதர். நைட்ரோஸி	துளி 60
ஆக்குவா. சேர்ந்து.	அவுன்ஸ் 3
	ஒன்றுசேர்

மிக்சர்செய்

இதை “வேர்வை உண்டாக்கி காய்ச்சல் களில் டெம்பரேச்சர் இறங்க”க் கொடுக்கலாம்.

தடவல் 1 க்கு 1 அவுன்ஸ் வீதம் 3, அல்லது 4 மணிக்கொரு தடவல் கொடுக்கவும்.

(10) டயூரெட்டிக். மிக்சர்.

(d)

செய்யும் விதம்:—

எடுத்துக்கொள்

பொட்டாஸ். ஆஸிட்டஸ்.	கிரான் 60
பொட்டாஸ். நைட்ரஸ்.	கிரான் 30
ஸ்பிரிட். ஈதர். நைட்ரோஸி.	துளி 60
ஸ்பிரிட். ஜூனிப்பர்.	துளி 45
இன்பியூஷன். பக்கு. சேர்ந்து. அவுன்ஸ்	3

(f)

(b)

ஒன்றுசேர்

மிக்சர்செய்

இதை “நீர் பிரியவும், நீர்சுருக்கு, நீர்க்கடுப்
புக்கும். மூத்திரம் தாராளமாய் இறங்கவும்”
கொடுக்கலாம்.

தடவல் 1 க்கு 1 அவுன்ஸ் வீதம் நாள் 1 க்கு
3 தடவல் கொடுக்கவும்.

(11) கொப்பைபா. மிக்சர்.

(b)

செய்யும் விதம்:—

எடுத்துக்கொள்

கம். அக்கேவியா கிரான் 30

(g)

இதை “மார்ட்டரில்” கொஞ்சம் தண்ணீர்
சேர்த்துப் பசைபோல் அரைத்துக்கொண்டு

இதில் 45 துளி “ஒலியம். கோப்பைபா”
(b)

இதை துளி துளியாய் விட்டபைத்துப்
பிறகு இதில் 3 துளி “ஒலியம். சின்னமன்”
சேர்த்து அரைத்து 2 அவுன்ஸ் தண்ணீர்
சேர்த்துக் கலக்கக்கொண்டு, இதோடு 45
துளி “லைக்கர். பொட்டாஸ்” 45 துளி
“ஸ்பிரிட் ஈதர். நைட்ரோஸி” 30 துளி
“டிஞ்சர், அயோஸியாமஸ்” ஆகிய இந்த
மூன்றும் சேர்த்து, எல்லாம் ஒன்று
சேர்ந்த 3 அவுன்ஸ் ஆகும்வரை போது
மான தண்ணீர் சேர்த்துக் கொள்ளவும்.

இதை “மேகம், கடுப்புக்கு”க் கொடுக்க
லாம். ஆனால் மேக வியாதியின் ஆரம்பத்தில்
கொடுக்கக் கூடாது. இந்த “மிக்கர் கொடுத்த
வுடன் முதலில் மேகத்தை அதிகப்படுத்தித்
தான் பின்பு நிறுத்தும்.

தடவல் 1 க்கு 1 அவுன்ஸ் வீதம் நாள் 1 க்கு
3 தடவல் கொடுக்கவும்.



(12) மிக்கர். பெர்ரை. டயூரெட்டிக்.

(f) (d)

செய்யும் விதம்:—

எடுத்துக்கொள்

டிஞ்சர். பெர்ரை. பெர்க்குளோரைட்.

(f)

(d)

துளி 15

ஆஸிட். நைட்ரோ ஐட்ரோகுளோரிக்

(d)

(h)(d)

டி. துளி 15

(d)

ஸ்பிரிட். ஜூனிப்பர்

துளி 30

ஸ்பிரிட். குளோரோபார்ம்

துளி 30

(f)

இன்பியூஷன். குவாஷிபா. சேர்ந்து

(f)

அவுன்ஸ் 3

ஒன்றுசேர்

மிக்சர்செய்

இதை “ரத்தக் குறைவால், சோகைக்குணத் தோடு, வீக்கம், நீர்ச்சுரப்பு” இருந்தால் அந்தச் சமயம் கொடுக்கலாம்.

தடவல் 1-க்கு 1-அவுன்ஸ் வீதம் நாள் 1-க்கு தடவல் ஆகாரத்துக்குப் பின் கொடுக்கவும்.

(13) மிக்சர். வென்னா. கோ

அல்லது

பிளாக் டிராப்ட்

(b)

(d) (f)

செய்யும் விதம்:—

எடுத்துக்கொள்

எப்ஸம். ஸால்ட்

டிசாம் 6

இதை “மார்ட்டரில்” 1 அவுன்ஸ் தண்ணீர்

சேர்த்து அரைத்து வடிகட்டிக் கொண்டு

இதோடு 30 துளி “டிஞ்சர். ஜிஞ்சிபெரிஸ்”

(z) (b)

60 துளி “டிஞ்சர். ஸென்னு. கோ” இந்த இரண்டையும் சேர்த்து, எல்லாம் ஒன்று சேர்ந்து 2 அவுன்ஸ் ஆகும்வரை போதுமான தண்ணீர் சேர்த்துக் கொள்ளவும்.

குறிப்பு:—“டிஞ்சர். ஸென்னு. கோ” வுக்குப் பதிலாக, “இன்பியூஷன் ஸென்னு.” — (நிலவாகைக்

(f)

கஷாயம்) 2 அவுன்ஸ் சேர்த்துக் கொள்ளலாம்.

இதை “மலம் வெளியாக” 2 அவுன்ஸ் மிக்சையும் ஒரே தடவலாகக் கொடுக்கலாம். 4, 5 தடவல் மலம் தண்ணீராய்ப் போகும்.

(14) ஆல்பா. மிக்சர்

(b)

செய்யும்விதம்:—

எடுத்துக்கொள்

எப்ஸம். ஸால்ட்

டிபாம் 3

இதை “மார்ட்டரில்” 3 அவுன்ஸ் “பெப்பர் மின்ட். வாட்டர்” சேர்த்ததைத்து இதோடு 30 கிரான் “மெக்ஸீஷியா. கார்ப்” சேர்த்து

(g)

(b)

அரைத்து ஒன்று சேர்த்துக் கலக்கிக்கொள்ளவும்,

இதையும் “வெளிக்குப்போக” க் கொடுக்கலாம். விசேஷமாய் குழந்தைகளுக்கு புளிப்பு

மந்தம் இவைகளைக் கண்டித்து, மலத்
தையும் வெளியாக்கத் தடவல் 1 க்கு ½
அவுன்ஸ் வீதம் கொடுக்கலாம்.
பெரியவர்களுக்குத் தடவல் 1 க்கு 1 அவு
ன்ஸ் வீதம் கொடுக்கவும்.

(15) மிக்சர். பிஸ்மத். ஸெட்டிங்

(b)

(d)

செய்யும்விதம்:—

எடுத்துக்கொள்

பிஸ்மத். ஸப் ரைட்ரஸ் கிரான் 21

(b) (b)

ஸோடா பைகார்ப் கிரான் 21

(d) (b) (b)

இந்த இரண்டையும் முதலில் “ஸிலாப்பில்
போலஸ் கத்தி” யால் ஒன்று சேர்த்து,
30 கிரான் “கம். அக்கேஷியா” இதை

(g)

“மார்ட்டரில்” கொஞ்சம் தண்ணீர்சேர்த்து
பசைபோல் அரைத்துக்கொண்டு, இதில்
முன்னமே ஒன்று சேர்த்து வைத்திருக்கிற
“பிஸ்மத். ஸப் ரைட்ரஸ்” “ஸோடா.

(b) (b)

(d)

பைகார்ப்” இந்த இரண்டையும் சேர்த்

(b) (b)

தரைத்து எல்லாம் ஒன்று சேர்ந்து 3 அவு
ன்ஸ் ஆகும் வரை தண்ணீர் கொஞ்சம்
கொஞ்சமாய் ஊற்றிக் கலக்கிக் கடைசியில்

30 துளி “லைக்கர், மார்பைன் ஜட்ரோ

(f) (h d)

குளோரைட்” சேர்த்து ஒன்று சேரும்படி

(d)

குலுக்கிக் கொள்ளவும்.

இதை “வயிற்றுவலி, அஜீரணம், புளித் தேப்பம், அன்னத்துவேஷம்” இவைகளுக்குக் கொடுக்கலாம்.

ஒவ்வொரு தடவலும் மருந்தை நன்றாய்க் குலுக்கிக்கொண்டு தடவல் 1க்கு 1 அவுன்ஸ் வீதம் நாள் 1-க்கு 3 தடவல் ஆகாரத்துக்குப் பின் கொடுக்கவும்.

(16) ஸ்டிமியூலென்ட். மிக்சர்

செய்யும் விதம்:—

எடுத்துக்கொள்

ஸ்பிரிட். அமோனியா. அரோமேட்டிக்.

துளி 60

ஸ்பிரிட். ஈதர்

துளி 30

ஸ்பிரிட். குளோரோபார்ம்.

துளி 30

(f)

ஆக்குவா சேர்ந்து

அவுன்ஸ் 3

ஒன்றுசேர்

மிக்சர்செய்

இதை “இருதயம் பலயீனப்பட்டு, நாடிகள் சரியான நிலமையில் இல்லாமல் இருக்கும்

போது, இருதயநடையை ஒழுங்கு பண்ணவும், தேகத்திற்கு உற்சாகத்தைக் கொடுத்துக் கோப்பை மாற்றவும், குடுண்டாக்கவும் கொடுக்கலாம்.

தடவல் 1-க்கு 1 அவுன்ஸ் வீதம் 2 அல்லது 3 மணிக்கொரு தடவல் கொடுக்கவும்.

(17) மிக்சர். ஸ்ட்ரிக்னைன். எற். பெர்ரை

(f)

செய்யும் விதம்,—

எடுத்துக்கொள்

லைக்கர். ஸ்ட்ரிக்னைன். ஐட்ரோகுளோரைட்.
(h d) (d)

துளி 12

ஆஸிட். நைட்ரோ. ஐட்ரோகுளோரிக் டில்
(d) (h d) (d)

துளி 15

டிஞ்சர். பெர்ரை. பெர்க்குளோரைட்துளி 15
(f) (d)

லிரப். ஆன்டி துளி 90

ஆக்குவா. சேர்ந்து அவுன்ஸ் 3

ஒன்றுசேர்

மிக்சர்செய்

இதை “தாது நரம்புகளுக்குப் பலத்தைக் கொடுக்கவும், ரத்தவிர்த்திக்கும், பசி உண்டாக்கவும்” கொடுக்கலாம்.

தடவல் 1-க்கு 1 அவுன்ஸ் வீதம் நாள் 1க்கு 3 தடவல் ஆகரத்துக்குப்பின் கொடுக்கவும்.

(18) மிக்சர். அமோனியா. குளோரைட்

(d)

செய்யும் விதம்:—

எடுத்துக்கொள்

அமோனியா. குளோரைட். கிரான் 45

(d)

எக்ஸ்ட்ராக்ட். லிக்கரீஸ் கிரான் 3

இன்பியூஷன். சாட்டா—நிலவேம்

(f)

புக்கஷாயம்) சேர்ந்து. அவுன்ஸ் 3

ஒன்றுசேர்

மிக்சர்செய்

குறிப்பு:—“எக்ஸ்ட்ராக்ட் லிக்கரீஸ்” இதற்குப்பதில் ‘கிரி

(g)

ஸேரின்” தடவல் 1க்கு 30 துளி சேர்த்துக் கொள்ளலாம்.

இதை ‘தொண்டைப்புகைச்சலையும், கர்ப்பையும், தணிக்கக்’ கொடுக்கலாம்.

தடவல் 1க்கு 1 அவுன்ஸ் வீதம் 4 மணிக் கொரு தடவல் கொடுக்கவும்.

—

(19) மிக்சர். ஸல்பேட்டிஸ். டிரிப்ளிவலிஸ்

(f)

செய்யும் விதம்:—

எடுத்துக்கொள்

ஸல்பேட். ஆப். கொய்னைன்.

கிரான் 6

(f)

(i)

இதை 30 துளி “ஆஸிட். ஸல்பியூரிக். டிஸ்”

(d) (f) (d)

சேர்த்துக் கரைத்து இதோடு 1 அவுன்ஸ் தண்ணீர் சேர்த்துக் கொள்ளவும்.

பிறகு 6 கிரான். “பெர்ரை. ஸல்பஸ்”

(f) (f)

இதை “மார்ட்டரில் கொஞ்சம் தண்ணீர் விட்டு அரைத்துக் கலக்கி மேல்படி 1

அவுன்ஸ் மிக்சரோடு சேர்த்துப் பிறகு,

4 டிராம் “எப்ஸிம். ஸால்ட்” இதை 1

அவுன்ஸ் தண்ணீர் சேர்த்து “மார்ட்டரில்”

அரைத்து வடிகட்டிக் கொண்டு, மேல்படி

மிக்சரோடு சேர்த்து இதோடு 15 துளி

“ஸ்பீரிட். மெந்தா. லிப்” சேர்த்து எல்

லாம் ஒன்றுசேர்ந்து 3 அவுன்ஸ் ஆகும்வரை

போதுமான தண்ணீர் சேர்த்துக் கொள்ள

வும்.

இதை பெண்களுக்கு “டானிக்காகவும், சூத

கம் சரியானபடி படவும்” கொடுக்கலாம்.

தடவல் 1 க்கு 1 அவுன்ஸ் வீதம் நாள் 1க்கு

3 தடவல் ஆகாத்துக்குப்பின் கொடுக்கவும்.

(20) மிக்சர். பெர்ரை. பெர்க் குளோரைட்

(f)

(d)

செய்யும்விதம்:—

எடுத்துக்கொள்.

டிஞ்சர். பெர்ரை, பெர்க்குளோரைட்.

(f)

(d)

துளி 30

இன்பியூஷன். குவாஷியா. சேர்ந்து
(f)

அவுன்ஸ் 3
ஒன்றுசேர்

மிக்சர்செய்

இதை “ரத்தவிருத்திக்காகவும், டானிக்
காகவும்,” உபயோகப்படுத்தலாம்.

தடவல் 1 க்கு 1 அவுன்ஸ் வீதம் நாள் 1க்கு
2 தடவல் ஆகாரத்துக்குப் பின் கொடுக்கவும்.
இந்த மிக்சர் கொடுக்கும்போது மலத்தைக்
கட்டினால், தடவல் 1 க்கு 1 டிராம் “கிளிஸெ
(g)

ரின்” சேர்த்துக்கொள்ளவும்.

(21) ஓவின்னிங்க்ஸ். மிக்சர்

செய்யும்விதம்—

எடுத்துக்கொள்

பல்விஸ். ஜாலப் கிரான் 9

பல்விஸ். ரீயை. ராடிக்ஸ். கிரான் 9

(d)

பல்விஸ். கலம்பா கிரான் 9

கிரீம். ஆப். டார்ட்டார். கிரான் 4½

(f)

பல்விஸ். ஜிஞ்சர். கிரான் 4½

பெர்ரை. ஸல்பஸ் கிரான் ½

(f)

(f)

டிஞ்சர். ஸென்னை. கோ துளி 18

பெப்பர் மின்ற வாட்டர் சேர்ந்து

அவுன்ஸ் 3
ஒன்றுசேர்

மிக்சர்செய்

இதை “காய்ச்சல் கட்டிக்கு” கொடுக்க
லாம். தடவல் 1 க்கு 1 அவுன்ஸ் வீதம்
நாள் 1 க்கு 3 தடவல் கொடுக்கவும்.

(22) ஆஸ்ட்மா மிக்சர்

செய்யும்விதம்:—

எடுத்துக்கொள்

பொட்டாஸ். அயோடைட்	கிரான் 15
(d)(d)	
பொட்டாஸ். புரோமைட்	கிரான் 60
(b) (d)	
அமோனியா. கார்ப்	கிரான் 15
டிஞ்சர். பெல்லடோனா	துளி 15
(b) (d)	
டிஞ்சர். லொபிலியா ஈதர்	துளி 45
(b)	
ஸ்பிரிட். குளோரோபார்ம்	துளி 30
(f)	
ஸ்பிரிட். காம்ப்ர்	துளி 35
ஆக்குவா. சேர்ந்து	அவுன்ஸ் 3
	ஒன்றுசேர்

மிக்சர்செய்

இதை “இளைப்புக்கு” = (மந்தராகாசத்துக்
கு) க் கொடுக்கலாம்.

தடவல் 1-க்கு 1-அவுன்ஸ் வீதம் நாள்
1 க்கு 3 தடவல் ஆகாத்துக்குப் பின்
கொடுக்கவும்.

(23) காஸ்ட்டிக், ஸோலியூஷன்
நம்பர். 1, 2, 3, 4, முதலியவை

செய்யும்விதம்:—

“காஸ்ட்டிக், ஸோலியூஷன்” நம்பர் 1

ஆனால்

1 அவுன்ஸ் “மழைத் தண்ணீரிலாவது” அல்லது “டிஸ்டில்ட் வாட்டரிலாவது” 1 கிரான்

(d) (d)

“அர்ஜென்டி. நைட்ரஸ்” = (வெள்ளிக் காடிக்காரம்) கரைத்து நீலநிறமான கல்கார்க்கு சீசாவில் அடைத்து வைத்துக் கொள்ளவும். அல்லது வெள்ளைச் சீசாவானால் நீலநிறமான காகிதத்தால் சுற்றிப் பொதிந்து கொள்ளவும்.

மேல்படி ஸோலியூஷன். நம்பர் 2

ஆனால்

2 கிரான் “வெள்ளிக்காடிக்காரம்” மேல் சொல்லிய விதமாய்ச் சேர்த்துக் கொள்ளவும்.

“கண்வலி, அமரம்” இவைகளுக்கு இதில் “காமல். ஹேர். பிரஷ்” கொண்டு முக்கி

(b)

கண் இமைகளை மடக்கி வைத்துக்கொண்டு அவைகளில் தடவலாம்.

குழந்தைகளுக்கு

24. பல்விஸ். டோவரி, கம். கிரீட்டா.

(d)

அரோமேட்டிக்கா

செய்யும் விதம்:—

எடுத்துக்கொள்

டோவார்ஸ். பவுடர் கிரான் 1½

(d) (d)

பல்விஸ். இப்பிக்காக், கிரான் 3

பல்விஸ். கிரீட்டா அரோமேட்டிக் கிரான் 9

ஒன்றுசேர்

3 பொட்டணமாக மடித்துக்கொண்டு இதை

1 வயசுக்கு மேல்பட்ட குழந்தைகளுக்கு

“கொடுமான வயிற்றழைச்சலைக் குண

மாக்க’க் கொடுக்கலாம். தடவல் 1-க்கு

1 பொட்டணம் தேனில் கலந்து 4-மணிக்

கொரு தடவல் கொடுக்கவும்.

(25) பல்விஸ். மெக் நீஷியா, எற். பிஸ்மத்

(g)

(b)

செய்யும் விதம்:—

எடுத்துக்கொள்

மெக் நீஷியா. கார்ப். கிரான் 3

(b)

பிஸ்மத். ஸப் நைட்ரஸ். கிரான் 4½

(b) (b)

பல்விஸ். ரூபார்ப். ரூட் கிரான் 3

(b) (b)

ஒன்றுசேர்

3 பொட்டணமாக மடித்துக்கொண்டு இதை
 “குழந்தைகளுக்கு மயக்கத்தால் ஏற்படும்
 வயிற்றோட்டத்தை நிறுத்தக் கொடுக்கலாம்.
 தடவல் 1 க்கு 1 பொட்டணம் தேனில் கல
 ந்து 4-மணிக்கொரு தடவல் கொடுக்கவும்.

(26) பல்விவ். ரீயை. ஏற். ஸோடியை

(d)

செய்யும் விதம்:—

ரூபார்ப். இன். பவுடர். கிரான் 4
 (b) (b) (d)

ஸோடியை கார்போனஸ்
 (d) (b)

அல்லது
 வாஷிக். ஸோடா } கிரான் 3
 (d)

சுக்குத்துள் கிரான் 1
ஒன்றுசேர்

இதை ஒரே பொட்டணமாக மடித்துக்கொ
 ண்டு “குழந்தைகளுக்கு ஏற்படும் மலச்சிக்
 கலை நீக்கி மலத்தை வெளியாக்கக் கொஞ்
 சம் வெந்நீரில் கரைத்து, தித்திப்புச் சேர்
 த்துக் கொடுக்கலாம்.

(27) பல்விஸ். டோவாரி. எற். அமோனியை
(d)

செய்யும் விதம்:—

எடுத்துக்கொள்

டோவார்ஸ். பவுடர். கிரான் 1½

(d) (d)

பல்விஸ். இப்பிக்காக். கிரான் 1½

அமோனியா. கார்ப் (நன்றாய்

(b)

தூளாக்கினது) கிரான் 1½

கருவாப்பட்டைத்துள்

அல்லது

சின்னமன்- இன். பவுடர்

(d)

கிரான் 6

ஒன்றுசேர்

3 பொட்டணமாக மடித்துக்கொண்டு, இதை

1 வயசுக்கு மேல்பட்ட குழந்தைகளுக்கு

“தொண்டைப் புகைச்சலை நிறுத்தக்” கொ

டுக்கலாம். தடவல் 1 க்கு 1 பொட்டணம்

தேனில் கலந்து நாள் 1 க்கு 3 தடவல் கொ

டுக்கவும்.

(28) மிக்சர். இப்பிக்காக்.

சேய்யும் விதம்:—

எடுத்துக்கொள்

வைனம். இப்பிக்காக். துளி 9

அமோனியா. கார்ப். கிரைன் 1½

(b)

மியூஸிலேஜ். அக்கேஷியா. துளி 30

ஆக்குவா. சேர்ந்து. டிராம் 3

ஒன்றுசேர்

மிக்சர்செய்

இதை “குழந்தைகளுக்கு தொண்டைப்

புகைச்சலை நிறுத்தத்” தடவல் 1 க்கு 1 தேக்

காண்டி வீதம் நாள் 1 க்கு 3 தடவல் கொடு

க்கவும்.

முன்றாவது பாகம்.

இரண்டாம் பிரிவு.

மூக்கியமான வியாதிகளின் பெயர்களையும், அவைகளுக்கு மருந்துகள் சேர்த்து சிகிச்சை செய்யும் விதங்களையும், தற்காலம் உபயோகத்திலிருக்கிற “பேட்டென்ற் மருந்துகளை” வியாதிகளுக்குத் தகுந்தபடி உபயோகப்படுத்தும் விதங்களையும், வியாதிகளுக்குத் தகுந்தபடி கொடுக்க வேண்டிய ஆகாரங்களைப் பற்றியும் தெளிவாய் எழுதப் பட்டிருக்கிறது.

இதில் ஒரு வியாதிக்கு பல முறைகள் எழுதி யிருந்தாலும், அவைகளில் யாதேனும் ஒன்றை சமயோசிதம்போல் உபயோகப்படுத்திக் கொள்ளவும்.

குறிப்பு:—இதனடியில் வரும் முறைகளில் விஷமான மருந்துகள் யாதேனும் வந்தால் அவைகளைச் சுட்டிக்காட்ட *இவ்விதமான அடையாளம் போட்டிருக்கும். இதைக் கவனித்து அந்தந்த விஷமான மருந்துகளுக்கு நேரே குறிப்பிட்டிருக்கிற அளவை நன்றாய்க் கவனித்து மிக்சர்களில் சேர்த்துக்கொள்ள வேண்டும். குறைந்ததினால் குற்றமில்லை. குறிப்பிட்டிருக்கிற அளவிலிருந்து கூடிவிடக் கூடாது.

அஜீரணம், வயிற்றுவலி, புளித்தேப்பம், வயிற்றோட்டம், பசியின்மை இவைகளுக்கு:—

குழந்தைகளுக்கு மலம் கட்டுப்பட்டு வயிறு உப்பியிருந்தால், முதலில் மலத்தை வெளி யாக்கவேண்டும்.

அதற்கு

எடுத்துக்கொள்

காலோமல் கிரான் 2

ஸோடா. பைகார்ப். கிரான் 3

(d) (b) (b)

பல்விஸ். ரீபை. ராடிக்ஸ், கிரான் 3

(d)

ஒன்றுசேர்

ஒரு குச்சியில் “ஆயில். அனிஸி” முக்கி

மேல்படி பொடியோடு கலந்து, ஒன்று சேர்

த்து ஒரே தடவலாக தேனில் கலந்து

கொடுக்கவும். மலம் வெளியான பிறகு

கொடுக்க

எடுத்துக்கொள்

பல்விஸ். ரீபை. ராடிக்ஸ். கிரான் 3

(d)

ஸோடா. பைகார்ப். கிரான் 6

(d) (b) (b)

ஆயில். அனிஸி.

துளி 1

ஒன்றுசேர்

6 பொட்டணமாக மடித்துக்கொண்டு 3-

மணிக்கொரு தடவல் ஒவ்வொரு பொட்ட

ணம் தேனில் கலந்து கொடுக்கவும்.

அவசியமானால் இன்னம், 2 அல்லது 3 நாள்

இந்தப் பிரகாரம் கொடுத்து வரலாம்.

“குழந்தைகளுக்கு ஒபாமல் வாந்தியும் வயிற்
ரோட்டமும்” இருந்தால்,

எடுத்துக்கொள்

காலோமல்

கிரான் 1

ஸோடா. பைகார்ப்.

கிரான் 4

(d) (b) (b)

ஒன்றுசேர்

10 பொட்டணமாக மடித்துக்கொண்டு 1-
மணிக்கொரு தடவல் தவராமல் ஒவ்வொரு
பொட்டணம் தேனில் கலந்து கொடுக்கவும்.

குழந்தைகளுக்கு மந்தத்தை அடித்து மலத்
தை வெளியாக்க:—

எடுத்துக்கொள்

கிரிகரிஸ். பவுடர்

கிரான் 5

(g)(g) (d)

இதைக் கொஞ்சம் வெந்நீரில் கரைத்துக்
கொடுக்கவும். மருந்து கொடுத்து 4 மணிநே-
ரம் கழித்தும் மலம் வெளியாகா விட்டால்
மறுபடியும் இதே பிரகாரம் கொடுக்கலாம்.

அல்லது

மலம் வெளியாகாமல் மந்தத்தைக் கண்-
டிக்க:—

எடுத்துக்கொள்

ஸோடா. பைகார்ப்.

கிரான் 8

(d) (b) (b)

ஸ்பிரிட். அமோனியா அரோமேட்டிக்.

துளி 15

விரப் லிம்பிள்.

துளி 40

ஆக்குவா. அனிஸி. சேர்ந்து அவுன்ஸ் 1

ஒன்றுசேர்

மிக்சர்செம்

தடவல் 1-க்கு 2 தேக்காண்டி = (கால் அவு-
ன்ஸ்) வீதம் 3-மணிக்கொரு தடவல் கொடுக்-
கவும்.

குழந்தைகளுக்கு மும்மரமான மந்தத்தினு
லும், புளிப்பினாலும், கைகால் இழுப்பு
ஏற்பட்டிருக்கும்போது கொடுக்க:—

எடுத்துக்கொள்

காலோமல்.	கிரான் 2
ஸோடா. பைகார்ப்	கிரான் 3
(d) (b) (b)	
பல்விஸ். ரீபை ராடிக்ஸ்.	கிரான் 3
(d)	

ஒன்றுசேர்

இதை ஒரே தடவலாக தேனில் கலந்து
கொடுத்து மலம் வெளியான பிறகு
கொடுக்க.

எடுத்துக்கொள்

டிஞ்சர். ஜிஞ்சிபெரிஸ்.	துளி 30
(b)	
டிஞ்சர். அஸ்பீட்டிடா.	துளி 20
(f) (d)	
ஸ்பிரிட். அமோனியா அரோமேட்டிக்	துளி 20
ஸ்பிரிட். குளோரோபார்ம்.	துளி 10
(f)	
ஆக்குவா சேர்ந்து	அவுன்ஸ் 1

ஒன்றுசேர்

தடவல் 1க்கு 2 தேக்காண்டி வீதம் மீமணிக்
கொடு தடவல் கொடுக்கவும்.

இந்தச்சமயம் குழந்தைகளுக்குத் தாய்ப்பால்
அல்லாமல் மற்றப்பால் கொடுக்கும்படி
ஏற்பட்டால் தண்ணீர் சேர்த்துக்காய்ச்சின

பசுவின் பாலில் தடவல் 1 க்கு 30 துளி
 “லைம் வாட்டர்”—(சண்ணும்புத் தண்ணீர்)
 சேர்த்துக்கொடுக்கவும்.

அல்லது

(1) “ஆர்லிக்ஸ் மால்ட்டெட். மில்க்”

(h)

(d)

(2) “நெஸல்ஸ். மில்க். பூட்” இவைகளில்

(f) (d)

யாதேனும் ஒன்றை நாள் 1 க்கு 3, அல்லது
 4 தடவல் கஞ்சி காய்ச்சிக் கொடுக்கலாம்.

பெரியவர்களுக்கு குண்டாகிற “அஜீரணம்
 முதலியவைகளுக்கு:—

குறிப்பு:—பெண்களுக்கானால் ஆண்பிள்ளைகளுக்கு எடுத்துக்
 கொள்கிற ஒவ்வொரு மருந்திலும் முக்கால்
 பாகம் சேர்த்துக்கொள்ளவும்.

(1)

எடுத்துக்கொள்

ஸோடா. பைகார்ப்.

கிரான் 30

(d) (b) (b)

டிஞ்சர். கார்டர். கோ.

துளி 60

(d)

ஸ்பிரிட். அமோனியா.

அரோமேட்டிக்

துளி 30

பெப்பர்மின்ற். ஆயில்

துளி 2

ஸ்பிரிட். குளோரோபார்ம்

துளி 30

(f)

ஆக்குவா. சோந்து.

அவுன்ஸ் 3

ஒன்றுசேர்

மிக்சர் செய்

தடவல் 1 க்கு 1 அவுன்ஸ் வீதம் நாள் 1 க்கு
3 தடவல் ஆகாரத்துக்குப்பின் கொடுக்கவும்
(2)

எடுத்துக்கொள்

பிஸ்மத். ஸப். நைட்ரஸ். கிரான் 15

(b) (b)

ஸோடா. பைகார்ப் கிரான் 15

(d) (b) (b)

கம். அக்சேஷியா பேரதுமான அளவு

(g)

டிஞ்சர். ஜென்ஷன். கோ. துளி 45

ஆக்குவா. குளோரோபார்ம். சேர்ந்து

(f)

அவுன்ஸ் 3

ஒன் மசேர்

மிக்சர்செய்

தடவல் 1 க்கு 1 அவுன்ஸ் வீதம் நாள் 1 க்கு
3 தடவல், ஒவ்வொரு தடவலும் மருந்தை
நன்றாய்க் குலுக்கிக்கொண்டு, ஆகாரத்துக்
குப்பின் சாப்பிடவும்.

(3)

எடுத்துக்கொள்

ஸோடா. பைகார்ப். கிரான் 30

(d) (b) (b)

டிஞ்சர். ரீயை. கோ. டிராம் 1½

மெக்ஸீஷியா. கார்ப் கிரான் 15

(g) (b)

ஸ்பிரிட். அமோனியா. அரோமே

ட்டிக் துளி 45

ஆக்குவா. அணிஸி. சேர்ந்து அவுன்ஸ் 3
ஒன்றுசேர்

மிக்சர்செய்

தடவல் 1 க்கு 1 அவுன்ஸ் வீதம் நாள் 1க்கு
3 தடவல் ஆகாரத்துக்குப்பின் கொடுக்கவும்.

(4)

எடுத்துக்கொள்

லைக்கர். பிஸ்மத். எற். அமோனியா.

(b)

ஸிட்ராஸ். டிராம் 2

ஸோடா. பைகார்ப். கிரான் 30

(d) (b) (b)

டிஞ்சர். கலம்பா. துளி 60

ஸ்பிரிட். குளோரோபார்ம். துளி 30

(f)

ஆக்குவா. டிஸ்டில்லேட்டாசேர்ந்து.

(d)

அவுன்ஸ் 3

ஒன்றுசேர்

மிக்சர்செய்

தடவல் 1 க்கு 1 அவுன்ஸ் வீதம் நாள் 1க்கு
3 தடவல் ஆகாரத்துக்கு ஒருமணி நேரத்
துக்கு முன் சாப்பிடவும்.

(5)

எடுத்துக்கொள்

லைக்கர். பிஸ்மத். எற். அமோனியா.

ஸிட்ராஸ் டிராம். 2

டிஞ்சர். ஆரன்டி. டிராம் 1

* லைக்கர். மார்பைன். ஐட்ரோ

(f) (h)(d)

குளோரைட் துளி 30

ஸ்பிரிட். குளோரோபார்ம். துளி 30

(f)

ஆக்குவா. சேர்ந்து. அவுன்ஸ் 3

ஒன்றுசேர்

மிக்சர்செய்

ஆகாரத்துக்கு $\frac{1}{2}$ மணி நேரத்துக்கு முன்

1 அவுன்சும், வயிற்றில் வலி உண்டாகிற

நேரத்தில் 1 அவுன்சும் சாப்பிடவும்.

(6)

எடுத்துக்கொள்

டிஞ்சர், கார்டம். கோ. டிராம் 1 $\frac{1}{2}$

(d)

டிஞ்சர். ஜென்ஷன். கோ. டிராம் 1 $\frac{1}{2}$

ஸ்பிரிட். அமோனியா, அரோமேட்டிக்.

துளி 30

* டிஞ்சர். நக்ஸ்வாமிக்கா. துளி 15

ஸ்பிரிட். குளோரோபார்ம். துளி 30

(f)

ஆக்குவா. சேர்ந்து. அவுன்ஸ் 3

ஒன்றுசேர்

மிக்சர்செய்

தடவல் 1 க்கு 1 அவுன்ஸ் வீதம் ஆகாரத்

துக்கு $\frac{1}{4}$ மணி நேரத்துக்கு முன் சாப்பிடவும்

(7)

எடுத்துக்கொள்

ஸ்பிரிட். அமோனியா. அரோமேட்டிக்

துளி 45

டிஞ்சர். ஜென்ஷன். கோ. துளி 60

டிஞ்சர். ஜிஞ்சிபெரிஸ். துளி 45

(z) (b)

ஸ்பிரிட். குளோரோபார்ம். துளி 30

(f)

ஆக்குவா. சேர்ந்து அவுன்ஸ் 3

ஒன்றுசேர்

மிக்சர்செய்

தடவல் 1 க்கு 1 அவுன்ஸ் வீதம் நாள் 1க்கு
3 தடவல் ஆகாரத்துக்கு கால் மணிநேரத்
துக்கு முன் சாப்பிடவும்.

(8)

எடுத்துக்கொள்

ஆஸிட். ஐட்ரோகுளோரிக் டி. துளி 30

(d)(h)(d) (d)

* டிஞ்சர். நக்ஸ்வாமிங்கா. துளி 15

டிஞ்சர். கலம்பா. துளி 45

ஆக்குவா. சேர்ந்து, அவுன்ஸ் 3

ஒன்றுசேர்

மிக்சர்செய்

தடவல் 1 க்கு 1 அவுன்ஸ் வீதம் நாள் 1க்கு
3 தடவல் ஆகாரத்துக்கு சற்றுமுன் சாப்
பிடவும்.

(9)

எடுத்துக்கொள்

பெப்ஷின். பேர்ஸி கிரான் 10

ஆஸிட். ஐட்ரோகுளோரிக், டி. துளி 15

(d)(h)(d) (d)

டிஞ்சர். ஜென்ஷன். கோ துளி 60

* டிஞ்சர். நக்ஸ்வாமிங்கா துளி 15

ஆக்குவா. சேர்ந்து.

அவுன்ஸ் 3
ஒன்றுசேர்

மிக்சர்செய்

தடவல் 1 க்கு 1 அவுன்ஸ் வீதம் நாள் 1க்கு
3 தடவல் ஆகாரம் சாப்பிட்டவுடன் கொடுக்கவும்

குறிப்பு:—மேல்படி மிக்சரில் “ டிஞ்சர். நக்ஸ்வாமிக்கர் ”
சேராமலும் கொடுக்கலாம்.

(10)

“ அஜீரணத்தால் வயிற்றோட்டமும் வயிற்று
வலியும் ” இருந்தால்:—

எடுத்துக்கொள்

{	* டிஞ்சர். குளோரோபாரம். எற். மார்பைன்	
	(f)	(f)
{	கம்போஸிட்டா	துளி 15
	டிஞ்சர். ஜிஞ்சிபெரிஸ்	துளி 45
	(z) (b)	
	ஆக்குவா. சேர்ந்து.	அவுன்ஸ் 3
		ஒன்றுசேர்

மிக்சர்செய்

தடவல் 1 க்கு 1 அவுன்ஸ் வீதம் 4 மணிக்
கொரு தடவல் கொடுக்கவும்.

(11)

எடுத்துக்கொள்

ஸாலால்	கிரான் 10
பிஸமத். ஸப்நைட்ரஸ்.	கிரான் 10
(b) (b)	
	ஒன்றுசேர்

3 பொட்டணமாக மடித்துக்கொண்டு ஆகாரத்துக்கு $\frac{1}{2}$ மணிநேரத்துக்குமுன் நாள் 1க்கு 3 தடவல் கொடுத்துப்பிறகு.

எடுத்துக்கொள்

* (நன்றாய்க் குலுக்கிக்கொண்டு) ஈலட்ஸ். பெப்ஸின் மிக்சர்.

(b)

வித் ஒப்பியம்.

துளி 90

ஆக்குவா, சேர்ந்து.

அவுன்ஸ் 3

ஒன்றுசேர்

மிக்சர்செய்

தடவல் 1 க்கு 1 அவுன்ஸ் வீதம் நாள் 1க்கு 3 தடவல் ஆகாரம் சாப்பிட்டவுடன் கொடுக்கவும்.

அஜீரணம், வயிற்றோட்டமுள்ள நோயாளிகள் நடமாடித்திரிந்தால் மத்தியானமட்டும் ஒருவேளை லேசாய் ஜீரணமாகக் கூடிய ஆகாரம் கொடுத்து, காலையிலும், இரவிலும், “பார்லிமாவு,” “ஆரோசூட்,” மெல்

(b)

லின்ஸ். பூட்” இவைகளில் யாதேனும் ஒன்

(f)(d)

றில் பால்சேர்த்துக் காய்ச்சி, ஜீரணக் கருவிகள் பலப்பட்டு அஜீரணம், வயிற்றோட்டம் புளித்தேப்பம் இவைகள் குணமாகிற வரையும் கொடுக்கவும்.

நோயாளி படுக்கையிலேயே படுத்திருக்கும் படியான அவ்வளவு பலயீனமாக ஜீரணக் கருவிகள் ஆகிவிட்டால், அப்பொழுது நாள்

1 க்கு 3 தடவல் “ஆர்லிக்ஸ். மால்ட்டேட்

(h) (d)

மில்க்” என்ற மாவைக் கஞ்சி காய்ச்சிக் கொடுக்கவும். 4 மணிக்கொரு தடவல் “லிக் குலிட். “பேப்டோனாய்ட்ஸ்”, “பானபேப்

(d) (d)

டோன்” என்ற செமித்த ஆகாரங்களில் யாதேனும் ஒன்றில் தடவல் 1 க்கு கால் அவுன்ஸ் கொடுத்துவரவும். ஜீரணக்கருவிகள் நன்றாய்ப் பலப்படுகிறவரையும் சாப்பாடுகொடுக்கக்கூடாது. தாகமிருந்தால் நல்ல “ஸோடா. வாட்டர்”, அல்லது “ஐஸ்கூட்டி”யில் சிறுதுண்டு கொடுக்கலாம்.

“முகப்பரு”

இது வாலிபபருவத்தில், வேர்வை சரியானபடி வெளியாகாமல் உள்ளடங்கியிருப்பதால் முகம், முதுகு, புஜங்கள் இவைகளிலுள்ள ரோமக்கால்களில் சிறு பருக்கள் போல் உண்டாகும். முக்கியமாய் முகத்தில் அதிகமாய் உண்டாவதால் இதற்கு முகப்பருவென்று பெயராயிற்று.

இதற்கு

இரவில் படுக்கையில், “செரிபிளாஸம் (b)

ஸோப்”, அல்லது “செரிரோஸ். ஸோப்” கொண்டு முகத்தை நன்றாய்க் கழுவிவிட்டு

“பப்” என்னும் பஞ்சால் “சேரிபிளாஸம்.

(f) (b)

பவுடர்”, “வைநோலியா. டாய்லட் பவு

(d)

டர்”, வைநோலியா. டால்க்கம். பவுடர்”

(d)

(d)

இவைகளில் யாதேனும் ஒன்றில் முக்கி
முகத்தில் ஒத்திக்கொண்டு படுக்கவும். காலை
யில் மறுபடியும் மேல்காட்டிய, ஸோப்புக்
களில் யாதேனும் ஒன்றால் முகம் கழுவவும்.

அல்லது

“போம்மேட் வாஸலைன்”, இதில் கொஞ்

(d)

சம் எடுத்துப் பருக்களில் தடவிவைத்திருந்து
பிறகு “ஸல்பர். வைநோலியா. ஸோப்”

(f)

“ஸாலாட்டிஸ். ஸோப்” இவைகளில் யாதே
னும் ஒன்றால் முகம் கழுவவும்.

உள்ளுக்குக் கொடுக்க:—

எடுத்துக்கொள்

* லைக்கர். ஆர்ஸனிக்காலிஸ்.

துளி 6.

ஆக்குவா. சேர்ந்து.

அவுன்ஸ் 3

ஒன்றுசேர்

மிக்சர்செய்

நாள் 1 க்கு 3 தடவல் ஆகாரத்துக்குப் பின்
கொடுக்கவும்.

நன்றாய்த் தேகப்பயிற்சி செய்து வேர்வை
யைத் தாராளமாய் வெளிப்படுத்தவேண்டும்.

“ குடிவெறி குடிமயக்கம் ”

இதற்கு

(1)

எடுத்துக்கொள்

மஸ்ட்டர்ட்— (கடுகுத்தூள்) தேக்காண்டி 4

(d)

ஆக்குவா

அவுன்ஸ் 4

ஒன்றுசேர்

நன்றாய்க்கலக்கி ஒரே தடவலில் உள்ளாக்
குக் கொடுத்து வாந்தி எடுக்கவைக்க வேண்
டும்.

எடுத்துக்கொள்

(2)

டிஞ்சர். காப்ஸிஸி.

துளி 6

* லைக்கர். ஆர்ஸனிக்காலிஸ்

துளி 6

ஆக்குவா. சேர்ந்து.

அவுன்ஸ் 6

ஒன்றுசேர்

மிக்சர்செய்

தடவல் 1 க்கு 1 அவுன்ஸ் வீதம் 1 மணிநேர
த்துக்கொரு தடவல் கொடுக்கவும்.

(3)

எடுத்துக்கொள்

பொட்டாஸ். புரோமைட்.

கிரான் 30

(b)

(d)

* குளோரல். ஐட்ரஸ்.

கிரான் 30

(h) (d)

டிஞ்சர். வெலிரியன். அமோனியேட்டா

துளி 40

ஆக்குவா. சேர்ந்து.

அவுன்ஸ் 3

ஒன்றுசேர்

மிக்சர்செய்

தடவல் 1 க்கு 1 அவுன்ஸ் வீதம் 3 மணிக்
கொரு தடவல் கொடுக்கவும்.

(4)

எடுத்துக்கொள்

பொட்டாஸ். புரோமைட். கிரைன் 30

(b) (d)

டிஞ்சர். காப்ஸிஸி. துளி 15

* டிஞ்சர். டிஜிடாஸிஸ். துளி 20

(d)

ஆக்குவா. சேர்ந்து. அவுன்ஸ் 3

ஒன்றுசேர்

மிக்சர்செய்

தடவல் 1 க்கு 1 அவுன்ஸ் வீதம் நாள் 1க்கு
3 தடவல் கொடுக்கவும்.

(5)

எடுத்துக்கொள்

டிஞ்சர். சின்கோனா. கோ. டிராம் 1½

டிஞ்சர். கார்டம், கோ. டிராம் 1

(d)

டிஞ்சர். காப்ஸிஸி. துளி 30

ஸ்பிரிட். அமோனியா. அரோமேட்டிக்.

துளி 90

ஸ்பிரிட். குளோரோபார்ம் துளி 30

(f)

ஆக்குவா. சேர்ந்து. அவுன்ஸ் 3

ஒன்றுசேர்

தடவல் 1 க்கு 1 அவுன்ஸ் வீதம் "குடிக்க

வேண்டுமென்ற எண்ண முண்டாகும்

போது" சாப்பிடவும்.

தலையில் வழக்கை, பொட்டல்.

உண்டாகிறதை நிறுத்தி ரோமம் முனைக்க:—

எடுத்துக்கொள்

ஒலியம். அமிக்டால். டல்ஸிஸ் (வாதன்
(g)(d) (d)

கொட்டை எண்ணெய் அவுன்ஸ் 1

ஒலியம். ரோஸ்மாரினி. அவுன்ஸ் ½

ஸ்பிரிட். காம்ப்ர் அவுன்ஸ் ½

(f)

* லைக்கர். எப்பிஸ்பாஸ்டிக்கஸ். துளி 60

கிளிஸெரின். ஆஸிட். போரிக். அவுன்ஸ் ½

(g) (d) (b)

டிஞ்சர். ஜாபோராண்டி. அவுன்ஸ் ½

(b)

ஒலியம். ரோஸ் துளி 4

ஒன்றுசேர்

நன்றாய்க் குலுக்கிக்கொண்டு ஒவ்வொரு

இரவிலும் ரோமக்கால்களுக்குள் நன்றாய்

இறங்கும்படி அழுத்தித் தேய்த்து வைக்க

வும்.

(2)

எடுத்துக்கொள்

* கார்பாலிக். ஆஸிட், டிராம் 1

(b) (d)

கிளிஸெரின். டிராம் 9

(g)

ஒன்றுசேர்

நன்றாய்க் குலுக்கிக்கொண்டு பொட்டல்,

வழக்கையுள்ள இடத்தில் கொஞ்சம் தேய்க்

கவும்.

“குதகக்கட்டுப்பாட்டை”

நீக்க:—

(1)

எடுத்துக்கொள்

டிஞ்சர். பெர்ரை. பெர்க்குளோரைட்

(f)

(d)

துளி 15

டிஞ்சர். ஆலோஸ்

டிபாம் 1½

* லைக்கர். ஸ்ட்ரிக்ளைன் ஐட்ரோ.

(h)(d)

குளோரைட். துளி 8

(d)

ஸ்பிரிட். குளோரோபார்ம்.

துளி 30

(f)

ஆக்குவா. சேர்ந்து

அவுன்ஸ். 3

ஒன்றுசேர்

மிக்சர்செய்

மாதவிடாய் வருகிறதற்கு 3-நாள்க்கு முன்
தடவல் 1-க்கு 1-அவுன்ஸ் வீதம் நாள் 1-க்கு
3 தடவல் ஆகாத்துக்குப் பின் கொடுக்கவும்,

(2)

எடுத்துக்கொள்

பீல். ஆலோஸ். எற். மர். கினைன் 40

இதை 12 மாத்திரைகளாகப் பிரித்துக்

கொண்டு நாள் 1-க்கு 3 மாத்திரைகள் ஆகா

த்துக்குப் பின் சாப்பிடவும்.

குறிப்பு:—இந்த மாத்திரை சாப்பிடும்போது வயிற்றால்
போகும்.

(3)

எடுத்துக்கொள்

“பிளாட்ஸ். பில்”

(b) (d)

இதில் நாள் 1-க்கு 3-மாத்திரைகள் ஆகாரத்
துக்குப் பின் சாப்பிடவும்.

(4)

எடுத்துக்கொள்

ஸோடா. ஸாலிஸில்ஸ்

கிரைன் 30

(d)

டிஞ்சர். ஜென்ஷன். கோ

துளி 45

டிஞ்சர். நக்ஸ்வாமிக்கா.

துளி 20

ஸ்பிரிட். குளோரோபார்ம்.

துளி 30

(f)

ஆக்குவா சேர்ந்து.

அவுன்ஸ் 3

ஒன் மசேர்

மிக்கர்செய்

தடவல் 1-க்கு 1-அவுன்ஸ் வீதம் நாள் 1-க்கு
3 தடவல் ஆகாரத்துக்குப் பின் கொடுக்கவும்.

(5)

எடுத்துக்கொள்

கொய்னைன். ஸல்பஸ்.

கிரைன் 9

(f)

டிஞ்சர். பெர்ரை. பெர்க்குளோரைட்.

(f)

(d)

துளி 15

* லைக்கர். ஸ்ட்ரிக்னைன். ஐட்ரோகுளோ

(h)(d)

ரைட் துளி 8

(d)

கிளிஸெரின்.

டிபாம் 3

(g)

ஆக்குவா. சேர்ந்து.

அவுன்ஸ் 3

ஒன்றுசேர்

பிக்சர்செய்

தடவல் 1 க்கு 1 அவுன்ஸ் வீதம் நாள் 1 க்கு
3 தடவல் ஆகாரத்துக்குப் பின் சாப்பிடவும்.

(6)

எடுத்துக்கொள்

“பர்காய்ன்ஸ். ஈஸ்ட்டன்ஸ் ஸிரப்” இதில்
(b)(g)

(நன்றாய்க் குலுக்கிக்கொண்டு) தடவல் 1-க்கு
30 துளி 1 அவுன்ஸ் தண்ணீரில் சேர்த்து
நாள் 1 க்கு 3 தடவல் ஆகாரத்துக்குப் பின்
சாப்பிடவும்.

(7)

எடுத்துக்கொள்

“பைரின் அமரா”

(b)

இதில் தடவல் 1 க்கு கால் அவுன்ஸ் வீதம்
1 அவுன்ஸ் தண்ணீரில் சேர்த்து நாள் 1 க்கு
3 தடவல் ஆகாரத்துக்குப் பின் கொடுக்கவும்.

(8)

எடுத்துக்கொள்

“அலெட்ரிஸ். கார்டியல்”

(d)

இதில் தடவல் 1 க்கு 1 டிராம் வீதம் $\frac{1}{2}$ அவுன்ஸ் வெந்நீரில் கலந்து நாள் 1 க்கு 3 தடவல் ஆகாரத்துக்குப்பின் கொடுக்கவும்.

(9)

எடுத்துக்கொள்

“டிஞ்சர். ஸெனிக்கியோ. ஐக்கோபியா.”

(b)

இதில் தடவல் 1 க்கு 1 டிராம் வீதம் 1 அவுன்ஸ் தண்ணீரில் சேர்த்து நாள் 1-க்கு 4 தடவல் கொடுக்கவும்.

சூதகம் சரியானபடி படுகிறவரைக்கும் ஒவ்வொரு மாசத்திலும் 1 வாரம் கொடுத்து வரவும்.

(10)

எடுத்துக்கொள்

கொய்னைன். ஸல்பஸ். கிரான் 6

(f)

ஆஸிட். ஸல்பியூரிக். டிஸ். துளி 15

(d) (f) (d)

பெர்ரை. ஸல்பஸ். கிரான் 6

(f) (f)

மெக்நீஷியா. ஸல்பஸ். டிராம் $1\frac{1}{2}$

(g) (f)

ஸ்பிரிட். குளோரோபார்ம். துளி 30

(f)

ஆக்குவா. மெந்தாபிப். சேர்ந்து அவுன்ஸ் 3
ஒன்றுசேர்

மிக்சர்செய்

தடவல் 1 க்கு 1 அவுன்ஸ் வீதம் நாள் 1க்கு
3 தடவல் ஆகாரம் சாப்பிட்டு $\frac{1}{2}$ மணி நேரம்
கழித்துக் கொடுக்கவும்.

“சோகை”

அல்லது

“ரத்தக் குறைவுக்கு”

(1)

எடுத்துக்கொள்

பெர்ரை. எற், அமோனியா. ஸிட்ரஸ்.

(f)

கிரான் 10

ஆஸிட். நைட்ரோ. ஐட்ரோகுளோரிக்

(d)

(h)(d)

டில் துளி 15

(d)

* டிஞ்சர், நக்ஸ்வாமிக்கா.

துளி 15

ஸிரப். ஸிம்பிள்.

டிபாம் 3

இன்பியூஷன். குவாஷியா. சேர்ந்து

(f)

அவுன்ஸ் 3

ஒன்றுசேர்

மிக்சர்செய்

தடவல் 1 க்கு 1 அவுன்ஸ் வீதம் நாள் 1க்கு
3 தடவல் ஆகாரத்துக்குப் பின் கொடுக்க
வும்.

(2)

எடுத்துக்கொள்

பெர்ரை. எற். கொய்னைன். விட்ரஸ்

(f)

கிரைன் 10

* லைக்கர் ஸ்ட்ரிக்னைன். ஐட்ரோகுளோ

(h)(d)

டைட் துளி 6

டிஞ்சர். கலம்பா

துளி 45

ஸ்பிரிட். குளோரோபார்ம்

துளி 30

(f)

ஆக்குவா. சேர்ந்து.

அவுன்ஸ். 3

ஒன்றுசேர்

மிக்கர் செய்

தடவல் 1 க்கு 1 அவுன்ஸ் வீதம் நாள் 1 க்கு

3 தடவல் ஆகாரத்துக்குப்பின் கொடுக்கவும்

(3)

எடுத்துக்கொள்

டிஞ்சர். பெர்ரை பெர்க்குளோரைட்

(f)

(d)

துளி 15

ஆலிட். நைட்ரோ. ஐட்ரோகுளோரிக். டில்

(d)

(h d)

(d)

துளி 15

* லைக்கர். ஸ்ட்ரிக்னைன். ஐட்ரோகுளோரைட்.

(h d)

(d)

துளி 6

ஸிரப். ஆண்டி
ஆக்குவா. சேர்ந்து.

டிராம் 1½
அவுன்ஸ் 3
ஒன்றுசேர்

மிக்சர்செய்

தடவல் 1 க்கு 1 அவுன்ஸ் வீதம் நாள் 1க்கு.
3 தடவல் ஆகாரத்துக்குப்பின் கொடுக்கவும்.

(4)

எடுத்துக்கொள்

டிஞ்சர். பெர்ரை. பெர்க்குளோரைட்.

(f)

(d)

டிஞ்சர். கலம்பா.

துளி 15

துளி 45

* டிஞ்சர். நக்ஸ்வாமிக்கா.

துளி 15

கீனிஸெரின்

டிராம் 2

(g)

ஆக்குவா. சேர்ந்து.

அவுன்ஸ் 3

ஒன்றுசேர்

மிக்சர்செய்

தடவல் 1 க்கு 1 அவுன்ஸ் வீதம் நாள் 1க்கு.
3 தடவல் ஆகாரத்துக்குப்பின் கொடுக்கவும்.

(5)

எடுத்துக்கொள்

* லைக்கர் ஆர்ஸெனிக்காவின்

துளி 6

டிஞ்சர். பெர்ரை. பெர்க்குளோரைட்.

(f)

(d)

துளி 15

ஸிரப். ஆரண்டி.,
ஆக்குவா. சேர்ந்து.

துளி 90
அவுன்ஸ். 3
ஒன்றுசேர்

மிக்கர்செய்

தடவல் 1 க்கு 1 அவுன்ஸ் வீதம் நாள் 1 க்கு
3 தடவல் ஆகாரத்துக்குப்பின் கொடுக்கவும்.

(6)

எடுத்துக்கொள்

“பர்காய்ன்ஸ். ஈஸ்டன்ஸ் ஸிரப்”

(b)(g)

இதில் தடவல் 1 க்கு 30 துளி 1 அவுன்ஸ்
தண்ணீரில் சேர்த்து நாள் 1 க்கு 3 தடவல்
ஆகாரத்துக்குப்பின் சாப்பிடவும்.

(7)

எடுத்துக்கொள்

“பை நின். அமரா”

(b)

இதில் தடவல் 1 க்கு கால் அவுன்ஸ் வீதம்
1 அவுன்ஸ் தண்ணீரில் சேர்த்து நாள் 1 க்கு
3 தடவல் ஆகாரத்துக்குப்பின் சாப்பிடவும்.

(8)

எடுத்துக்கொள்

“பீப். ஆன்ட். அயர்ன், ஓயின்”

(b)(f) (d)

இதில் தடவல் 1 க்கு கால் அவுன்ஸ் வீதம்
1 அவுன்ஸ் தண்ணீரில் சேர்த்து நாள் 1 க்கு
3 தடவல் ஆகாரத்துக்குப்பின் கொடுக்கவும்.

(9)

எடுத்துக்கொள்

“ஸ்டெர்ன்ஸ். ஓயின். காட். லிவர். ஆயில்”

(d)

இதில் தடவல் 1 க்கு கால் அவுன்ஸ். கொஞ்சம் சுடுகிற பசுவின்பாலில் கலந்தாவது அல்லது 1 அவுன்ஸ் தண்ணீர் சேர்த்தாவது ஆகாரத்துக்குப்பின் சாப்பிடவும்.

(10)

எடுத்துக்கொள்

“ஸெரவால்லோஸ். டானிக்”

இதில் தடவல் 1 க்கு கால் அவுன்ஸ் வீதம் கொஞ்சம் தண்ணீரில் கலந்து நாள் 1-க்கு 3 தடவல் ஆகாரத்துக்குப்பின் கொடுக்கவும்.

(11)

எடுத்துக்கொள்

(1) “டீஜான்ஸ். காட். லிவர் ஆயில்”

(d)

(d)

(2) “ஸ்காட்ச். எமல்ஷன். காட். லிவர். ஆயில்”

(d)

(3) “பர்காய்ன்ஸ். காட். லிவர், ஆயில்”

(b)(g)

(d)

(4) “கெப்ளர்ஸ். பியூர். காட். லிவர். ஆயில்”

(d)

(5) “கெப்ளர்ஸ். ஸொலியூஷன். காட் லிவர் ஆயில். இன். மால்ட். எக்ஸ்ட்ராக்ட்”

(6) “கெப்ளர்ஸ்” ஸொலியூஷன். காட்.

(d)

லிவர் ஆயில். இன். மால்ட். எக்ஸ்ட்ராக்ட்.

வித் ஐப்போ. பாஸ்பைட்ஸ்.

(h)

(f)

(f)

(7) “கெப்ளர்ஸ். ஸொலியூஷன். காட்.

(d)

லிவர் ஆயில். இன். மால்ட். எக்ஸ்ட்ராக்ட்.

வித் அயர்ன் அயோடைட்”

(d)(d)

(8) “கிரீம். ஆப். மால்ட். காட். லிவர்

(f)

(d)

ஆயில் வித். ஐப்போ பாஸ்பைட்ஸ்”

(h)

(f)

(f)

என்னும் மீன் எண்ணெய்களில் யாதேனும் ஒன்றை தடவல் 1 க்கு 1 தேக்கரண்டி கொஞ்சம் சுடுகிற பசுவின்பாலில் கலக்கி ஆகாரம் சாப்பிட்டு 1 மணிநேரம் கழித்து 2, அல்லது 3 தடவல் ஜீரண சக்திக்குத் தகுந்த படி கொடுக்கவும்.

மீன் எண்ணெய் கொடுக்குமுன் வயிற் றோட்டம் அஜீரணம் இவைகள் இருந்தால் முதலில் அவைகளுக்கு ஏற்பட்ட மருந்து களைக் கொடுத்துக் குணமாக்கியபின், “காட்

(d)

லிவர் ஆயில்” கொடுக்கவும்.

“மார் அடைப்பு. மூச்சடைப்பு.

திட்டு முட்டு அடித்தல்’

இதற்கு

எடுத்துக்கொள்

* அமில். நைட்ரிஸ்

துளி 1

கிளிஸெரின்

டிபாம் ½

(g)

வெந்தீர் சேர்ந்து

அவுன்ஸ் 2

ஒன்றுசேர்

மிக்சர்செய்

தடவல் 1 க்கு 1 அவுன்ஸ் வீதம் 1,2
அல்லது 3 மணிக்கொரு தடவல் வியாதி
இருக்கிற நிலமைக்குத் தகுந்தபடி கொடுக்
கவும்.

(2)

எடுத்துக்கொள்

லைக்கர். டிரினிடிரினி

துளி 1

சீனி

கொஞ்சம்

ஒன்றுசேர்

இதை ஒரே தடவலாக வாயில்போட்டு
கொஞ்சம் வெந்தீர் கொடுக்கவும்.

மறுபடி இந்த மருந்து கொடுக்க வேண்டு
மானால் நாலுமணி நேரம் கழித்து மேல்
சொல்லியபடி கொடுக்கவும்.

(3)

எடுத்துக்கொள்

மஸ்க் = (உயர்ந்த கஸ்தூரி) கிரான் 10
 வெந்ரீர். அவுன்ஸ் 1
 ஒன்றுசேர்

இதை ஒரேதடவலாகக் கொடுக்கலாம். இது
 அவசரத்துக்குக் கிடைக்காவிட்டால்.

(4)

எடுத்துக்கொள்

டிஞ்சர். மஸ்க். துளி 30
 வெந்ரீர் அவுன்ஸ் 1
 ஒன்றுசேர்

இதை ஒரேதடவலாகக் கொடுக்கவும்.
 இவைகளுக்குப் பதிலாக “புனுகை” வெந்
 ரீரில் கரைத்துக்கொடுப்பது நாட்டு வழக்
 கம்.

“ஆசனத்தில், நமைச்சல், தினவு

இருப்பதற்கு”

(1)

எடுத்துக்கொள்

காம்பர். கிரான் 30
 (f)

* கிரியோஸோட். துளி 20
 விம்பிள். ஆயின் ற்மென்ற் அவுன்ஸ் 1
 ஒன்றுசேர்

கழிம்பாகச் சேர்த்துக்கொண்டு, இதில் கொஞ்சம் எடுத்து நமைச்சல், தினவு உள்ள இடத்தில் காலை,மாலை அழுத்தித்தேய்க்கவும்.

(2)

எடுத்துக்கொள்

போரிக். ஆஸிட்.

டிபாம் 1

(b) (d)

வாஸலைன்.

அவுன்ஸ் 1

ஒன்றுசேர்

கழிம்பாகச் செய்துகொண்டு, இதில் கொஞ்சம் எடுத்து மேல் தடவிக்கொள்ளவும்.

“வாய்ப்புண்ணுக்கு”

(1)

எடுத்துக்கொள்

போரிக். ஆஸிட்.

கிரான் 30

(b) (d)

சுளர்ஸெரின்.

அவுன்ஸ் 1

(g)

ரோஸ் வாட்டர் = (பந்தீர்)

அவுன்ஸ் 1

ஒன்றுசேர்

புண்ணுள்ள இடத்தில் நாள் 1 க்கு, 5, 6 தடவல் தடவிக்கொள்ளவும்.

(2)

எடுத்துக்கொள்

* ஹ்னார். காஸ்ட்டிக்.

கிரான் 5

மழைத்தண்ணீர். அவுன்ஸ் 1-ல் கரைத்து

“காமல். ஹேர். பிரஷ்” கொண்டு முக்கி
(b)

நாக்கு, வாய், உதடு இவைகளிலுள்ள புண்களில் தடவவும்.

(3)

எடுத்துக்கொள்

ஆஸிட். டானிக்

டிபாம் 2

(d)

கிளிஸெரின்.

அவுன்ஸ் 1

(g)

ஒன்றுசேர்

பஞ்ச சுற்றிய குச்சியால் இதில் முக்கி நாக் குப்புண், வாய்ப்புண் இவைகளில் காலேமாலை தடவவும்.

(4)

எடுத்துக்கொள்

பொட்டாஸ். குளோரஸ்.

கிரான் 6

ஆலம் = (சினோக்காரம்)

கிரான் 30

கிளிஸெரின்.

அவுன்ஸ் 1

(g)

ஆக்குவா.

அவுன்ஸ் 6

ஒன்றுசேர்

கொஞ்சம், கொஞ்சமாய் வாயில் ஊற்றி நன்றாய் வாய் உறசிக் கொப்பளிக்கவும்.

(5)

உள்ளுக்குக் கொடுக்க:—

எடுத்துக்கொள்

காலோமல்.

கிரான் 3

ஸோடா, பைகார்ப்.

கிரான் 5

(d) (b) (b)

ஒன்றுசேர்

இதை இரவில், படுக்கையில் வாயில் போட்டு உமிழ் நீரோடு சேர்த்து விழுங்கி பிறகு மறுநாள் காலையில்.

எடுத்துக்கொள்

பல்விஸ். ஜாலப். கோ.

டிராம் 1

வெந்தீர்.

அவுன்ஸ் 4

ஒன்றுசேர்

இதை ஒரேதடவலாகச் சாப்பிடவும், 4, 5 தடவல் மலம் வெளியாகும். மறுநாள் முதல்

எடுத்துக்கொள்

பொட்டாஸ். குளோரஸ்

கிரான் 15

டிஞ்சர். சின்கோளு. கோ.

துளி 45

டிஞ்சர். ஆண்டி.

டிராம் 1

கிளிஸெரின்.

டிராம் 2

(g)

ஆக்குவா. சேர்ந்து.

அவுன்ஸ் 3

ஒன்றுசேர்

மிக்சர்செய்

தடவல் 1 க்கு 1 அவுன்ஸ் வீதம் நாள் 1 க்கு 3 தடவல் ஆகாத்துக்குப்பின் கொடுக்கவும். வாய்ப்புண் சமப்படுகிறவரையும், “ஸ்பீட்ஸ். ஆரோதுட்”, “பார்லிமாவு” இவைக

(b)

ளில், யாதேனும் ஒன்றோடு பாலும், சீனியும் சேர்த்துக் காய்ச்சிச் சாப்பிடவும்.

“கிருமிகளுக்கு”

(1)

1 வயசுக் குழந்தைக்கு:—

எடுத்துக்கொள்

ஸான்டோனைன்.

கிரான் 1

ஸோடா பைகார்ப்.

கிரான் 1

(d) (b) (b)

ஒன்றுசேர்

இதை இரண்டு பொட்டணங்களாக மடித்துக் கொண்டு இரவில் 1 பொட்டணம் கொஞ்சம் சீனியில் கலந்து கொடுத்த, காலை யில் கொஞ்சம் “கோட்டைமுத்து எண்ணெய்”யில் இன்னொரு பொட்டணத்தைக் கலக்கிக் கொடுக்கவும்.

2 வயசுமுதல் 3-வயசுவரைக்கும் 2 கிரான் 4 வயசுக்குமேல் 3 கிரான் “ஸான்டோனைன்” இரவில்கொடுத்துக் காலையில் “காஸ்ட்டர் ஆயில்” = (விளக்கெண்ணெய்) (கோட்டைமுத்து எண்ணெய்) கொடுக்கவும்.

(2)

பெரியவர்களுக்கு:—

எடுத்துக்கொள்

ஸான்டோனைன்.

கிரான் 5

ஸோடா. பைகார்ப்.

கிரான் 5

(d) (b) (b)

ஒன்றுசேர்

இதை இரண்டு பொட்டணமாக மடித்துக் கொண்டு இரவில் 1 பொட்டணம் கொஞ்சம் சீனியோடு சேர்த்துச் சாப்பிட்டு, மறுநாள் காலை மற்றொரு பொட்டணத்தை 1½ அல்லது 2 அவுன்ஸ் “காஸ்டர் ஆயிலில்” கலக்கிச் சாப்பிடவும்.

“இளைப்புக்கு”

(1)

எடுத்துக்கொள்

பொட்டாஸ். அயோடைட். கிரான் 15

(a)(d)

பொட்டாஸ். புரோமைட். கிரான் 60

(b) (d)

அமோனியா- கார்ப். கிரான் 15

(b)

* டிஞ்சர். பெல்லடோனா. துளி 15

(b) (d)

டிஞ்சர். லொபிலியா. ஈதர் துளி 45

(b)

ஸ்பிரிட். குளோரோபார்ம் துளி 30

(f)

ஆக்குவா. காம்ப்ர். சேர்ந்து அவுன்ஸ் 3

(f)

ஒன்றுசேர்

மீக்சர்செய்

தடவல் 1 க்கு 1 அவுன்ஸ் வீதம் நாள் 1-க்கு

3 தடவல் ஆகாரத்துக்குப்பின் கொடுக்கவும்.

(2)

எடுத்துக்கொள்

பொட்டாஸ். அயோடைட். கிரான் 15

(d)(d)

டிஞ்சர். லொபிலியா. ஈதர் துளி 45

(b)

ஸ்பிரிட். அமோனியா. அரோமேட்டிக் துளி 45

ஸ்பிரிட். குளோரோபார்ம் துளி 30

(f)

ஆக்குவா. சேர்ந்து அவுன்ஸ் 3
ஒன்றுசேர்

மிக்சர்செய்

தடவல் 1 க்கு 1 அவுன்ஸ் வீதம் நாள் 1-க்கு
3 தடவல் ஆகாரத்துக்குப் பின் கொடுக்கவும்.

(3)

எடுத்துக்கொள்

“கிரிமால்ட் அன்கோ. ஸிகரேட்”

(g)

(g)

இதில் ஒன்று எடுத்து ஒரு அறைக்குள் உட்
கார்ந்து கொண்டு புகை குடிக்கவும்.

(4)

எடுத்துக்கொள்

“ஹிம்ராட்ஸ். ஆஸ்ட்மா கியூர்”

இதில் கொஞ்சம் எடுத்து நெருப்பில் போட்டு
புகையை சுவாசஞ் செய்யவும்.

(5)

எடுத்துக்கொள்

“கிரிமால்ட் ஸிரப்”

(g)

இதில் தடவல் 1 க்கு $\frac{1}{2}$ அவுன்ஸ் வீதம் நாள்
1-க்கு 2 தடவல் கொடுக்கவும்.

(6)

எடுத்துக்கொள்

எக்ஸ்ட்ராக்ட்டம் கிரண்டிலியா. லிக்கு

(g) (d)

விடம் துளி 60

(d)

ஆக்குவா. சேர்ந்து.

அவுன்ஸ் 3

ஒன்றுசேர்

மிக்சர்செய்

தடவல் 1 க்கு 1 அவுன்ஸ் வீதம் நாள் 1 க்கு
3 தடவல் ஆகாரத்துக்குப் பின் கொடுக்கவும்.

“முத்திரப்பையில், ரணம், எரிச்சல்,

முத்திரம் சொட்டுச் சொட்டாய்

இறங்குதல்”

இவைகளுக்கு:—

(1)

எடுத்துக்கொள்

அமோனியா. பென்சாஸ்.

கிரான் 30

(b) (z)

இன் பியூஷன். பக்கு சேர்ந்து. அவுன்ஸ் 3
(f) (b)

ஒன்றுசேர்

மிக்சர்செய்

தடவல் 1 க்கு 1 அவுன்ஸ் வீதம் நாள் 1க்கு
3 தடவல் ஆகாரத்துக்குப்பின் கொடுக்கவும்.

(2)

எடுத்துக்கொள்

பொட்டாஸ் பைகார்ப்.

கிரான் 30

(b) (b)

டிஞ்சர். அயோஸியாமஸ்.

டிராம் 1

டிஞ்சர். பக்கு.

துளி 90

(b)

ஆக்குவா. சேர்ந்து.

அவுன்ஸ் 3

ஒன்றுசேர்

மிக்சர்செய்

தடவல் 1 க்கு 1 அவுன்ஸ் வீதம் நாள் 1க்கு
3 தடவல் கொடுக்கவும்.

(3)

எடுத்துக்கொள்

லைக்கர். பொட்டாஸ்.

துளி 30

டிஞ்சர். அயோஸியாமஸ்.

துளி 60

ஆக்குவா. சேர்ந்து.

அவுன்ஸ் 3

ஒன்றுசேர்

மிக்கர்செய்

தடவல் 1 க்கு 1 அவுன்ஸ் வீதம் நாள் 1க்கு
3 தடவல் கொடுக்கவும்.

மேல்படி விபாதிபோடு மூத்திரம் கலங்க
லாயும் வீச்சத்தோடும் வெளியாகிறதைக்
குணப்படுத்த:—

(1)

எடுத்துக்கொள்

பேரிக். ஆஸிட்

கிரான் 30

(b) (d)

ஆக்குவா சேர்ந்து

அவுன்ஸ் 6

ஒன்றுசேர்

மிக்கர்செய்

தடவல் 1க்கு 2 அவுன்ஸ் வீதம் நாள் 1க்கு
3 தடவல் கொடுக்கவும்.

(2)

எடுத்துக்கொள்

யுரோட்ரோபைன்

கிரான் 15

பேரிக் ஆஸிட்

கிரான் 15

(b) (d)

இன்டியூஷன் பக்கு சேர்ந்து

அவுன்ஸ் 3

(f) (b)

ஒன்றுசேர்

மிக்கர்செய்

தடவல் 1 க்கு 1 அவுன்ஸ் வீதம் நாள்
1-க்கு 3 தடவல் கொடுக்கவும்.

முத்திரப்பையில் எரிச்சல், ரணம் முதலிய
வைகள் குணமாகிறவரையும், “பார்லி,
அரிசிக் கஞ்சியில் பால், சீனி சேர்த்துச் சாப்
பிடவும். தேகத்துக்குப் பலம் கொடுக்கும்
படியான “பவ்ரில்”, “எஸென்ஸ் சிக்கன்.”

(b)

வாலென்டைன்ஸ் மீட்ஜியூஸ். இவைக
ளில் யாதேனும் ஒன்றைப் பக்குவப்படுத்
திச் சாப்பிடவும்.

“தொண்டைப்புக்கைச்சல் ஜலதோஷம்”

இவைகளுக்கு

(1)

எடுத்துக்கொள்

ஸோடா பைகார்ப்

கிரான் 30

(d) (b) (b)

டிஞ்சர். காம்பர். கோ

துளி 60

(f)

வைனம். இப்பிக்காக்

துளி 30

ஆக்குவா சேர்ந்து

அவுன்ஸ் 3

ஒன்றுசேர்

மிக்கச்செய்

தடவல் 1 க்கு 1 அவுன்ஸ் வீதம் நாள் 1க்கு

3 தடவல் ஆகாரத்துக்குப்பின் கொடுக்கவும்.

(2)

எடுத்துக்கொள்

அமோனியா கார்ப்	கிரான் 10
(b)	
டிஞ்சர். ஸெனிகா	துளி 45
(g)	
டிஞ்சர். சில்லி	துளி 10
வைனம். இப்பிக்காக்	துளி 30
ஆப். டீலு	துளி 90
ஆக்குவா. சேர்ந்து	அவுன்ஸ் 3
	ஒன்றுசேர்

மிக்சர்செய்

தடவல் 1 க்கு 1 அவுன்ஸ் வீதம் நாள் 1க்கு.
3 தடவல் கொடுக்கவும்.

(3)

“ஜலதோஷமும், அதோடு அற்பக்காய்ச்சலும், இருமலும்” இருந்தால்:—

எடுத்துக்கொள்

லைக்கர். அமோனியா. ஆஸிட்டேட்டிஸ்	டிபாம் 6
வைனம். இப்பிக்காக்.	துளி 30
டிஞ்சர். கார்பர். கோ.	துளி 60
(f)	
ஸ்பிரிட். ஈதர். நைட்ரோஸி.	துளி 60
ஆக்குவா. சேர்ந்து.	அவுன்ஸ் 3
	ஒன்றுசேர்

மிக்சர்செய்

தடவல் 1 க்கு 1 அவுன்ஸ் வீதம் நாள் 1-க்கு 3 தடவல் கொடுக்கவும். குழந்தைகளுக்கானால் தடவல் 1 க்கு 2 தேக்காண்டி வீதம் நாள் 1-க்கு 3 அல்லது 4 தடவல் கொடுக்கவும். மலம் வெளிப்பாக வேண்டுமானால் 1 தடவல் மருந்தோடு 6 டிராம் "எப்ஸம். ஸால்ட்" சேர்த்துக்கரைத்து வடிகட்டிக் கொடுக்கவும். பிறகு மருந்துமட்டும் கொடுத்துவரவும்.

குழந்தைகளுக்கு மலம் போக வேண்டுமானால் 2 தேக்காண்டி மருந்தோடு 1 டிராம் "எப்ஸம். ஸால்ட்" சேர்த்துக் கரைத்து வடிகட்டிக் கொடுக்கவும். பிறகு மருந்துமட்டும் கொடுக்கவும்.

(4)

எடுத்துக்கொள்

"சாம்பர்லெய்ன்ஸ். காப். ரெமிடி"

(f) (d)

இதில் தடவல் 1 க்கு 1 தேக்காண்டி வீதம் நாள் 1 க்கு 4 தடவல் கொடுத்துவந்தால் ஜல தோஷம், இருமல் குணப்படும்.

(5)

எடுத்துக்கொள்

"கீட்டிங்ஸ். காப். லாஸென்ஜஸ்"

(f) (z)

இதில் தடவல் 1 க்கு 1 வில்லை வாயில் ஒதுக்கிக்கொண்டு உமிழ் நீரைக் கொஞ்சம்

கொஞ்சமாய் இறக்கிக் கொண்டிருக்கவும்.
நாள் 1 க்கு 4 வில்லை உட்கொள்ளவும்.
தொண்டைப் புகைச்சல் சாந்தப்படும்.

(6)

எடுத்துக்கொள்

வைனம். ஆன்டிமோனியாலிஸ்	துளி 30
வைனம். இப்பிக்காக்	துளி 30
லைக்கர். அமோனியா. ஆஸிட்டேட்டிஸ்.	
	டிராம் 6
ஸிரப். ஆரன்டி	டிராம் 1½
ஆக்குவா. சேர்ந்து	அவுன்ஸ் 3
	ஒன்றுசேர்

மிக்சர்செய்

தடவல் 1 க்கு 1 அவுன்ஸ் வீதம் நாள்
1 க்கு 3 தடவல் ஆகாரத்துக்குப் பின் கொ
டுக்கவும். காய்ச்சலும் இதோடு இருக்கிற
தொண்டைப் புகைச்சலும் குணமாகும்.
குழந்தைகளுக்கானால் தடவல் 1 க்கு 2 தேக்
கரண்டி வீதம் கொடுக்கவும்.

(7)

எடுத்துக்கொள்

பொட்டாஸ். நைட்ரஸ்	கிரான் 30
வைனம். இப்பிக்காக்	துளி 30
ஸ்பிரிட். ஈதர். நைட்ரோஸி	துளி 60
ஸிரப். லே	டிராம் 1½
ஆக்குவா. சேர்ந்து.	அவுன்ஸ் 3
	ஒன்றுசேர்

மிக்சர்செய்

தடவல் 1 க்கு 1 அவுன்ஸ் வீதம் நாள் 1 க்கு
3 தடவல் கொடுக்கவும். காய்ச்சலும்,
தொண்டைப் புகைச்சலும் நிற்கும். குழந்
தைகளுக்கானால் தடவல் 1 க்கு 2 தேக்
காண்டி வீதம் கொடுக்கவும்.

‘நாள்பட்ட தொண்டைப் புகைச்சல்’

இதற்கு:—

(1)

எடுத்துக்கொள்

“கிரிமால்ட்ஸ். ஸிரப். ஆப். ஐப்போபாஸ்
(g) (f) (h) (f)

பைட்ஸ். ஆப். லைம்.”

(f) (f)

இதில் காலையில் $\frac{1}{2}$ அவுன்ஸ், மாலை $\frac{1}{2}$
அவுன்ஸ், அவசரமானால் இரவில் $\frac{1}{2}$ அவுன்ஸ்
சாப்பிடவும்.

(2)

எடுத்துக்கொள்

“கிரீம். ஆப். மால்ட். கரட் லிவர் ஆயில்.
(f) (d)

கித். ஐப்போபாஸ்பைட்ஸ். ஆன்ட். கிரிபோ
(h) (f) (f) (fd)

“ஸோட்-”

இதில் தடவல் 1 க்கு 1 தேக்காண்டி வீதம்
சுடுகிற கொஞ்சம் பசுவின் பாலில் கலக்கி

நாள் 1 க்கு 3 தடவல் ஆகாரத்துக்குப் பின்
சாப்பிடவும்.

“கால்ரா” அல்லது “விஷபேதி”

இதற்குக் குறிப்பிட்ட மருந்தாக எழுத
முடியாது. அந்தச் சமயங்களில் ஏற்படுகிற
குறிப்புகளை அறிந்து மருந்து கொடுக்க
வேண்டும். முதலில் நோயாளியின் படுக்
கையின் நான்கு மூலைகளிலும் கொஞ்சம்,
கொஞ்சம் “யூக்காலிப்டஸ். ஆயில்” தெளி
த்து வைக்கவேண்டும்.

சில சமயங்களில் அஜீரணத்தால் வயிற்
றோட்டம் ஏற்பட்டு, வயிறு உப்பி, வயிற்றி
லும் வலியுண்டாகி பிறகு வா வா “கால்ரா”
என்று சொல்லும்படியாகவே மாறிவிடும்.
இப்படி அஜீரணத்தால் ஏற்பட்டு ஜீரணமா
காத ஆகாரம் இருப்பதாய்த் தெரியவந்தால்
அதற்குக் கொடுக்க:—

(1)

எடுத்துக்கொள்

எப்ஸம். ஸால்ட்	டிபாம் 4
மெக்ரீஷியா. கார்ப்	கிரான் 10
(g) (b)	
டிஞ்சர். கார்டம். கோ	துளி 20

(d)

ஆக்குவா. அனிஸி. சேர்ந்து	அவுன்ஸ் 1
	ஒன்றுசேர்

மிக்கர்செய்

இதை ஒரே தடவலாகக் கொடுக்கவும். இந்த மருந்து கொடுத்தவுடன் ஏற்றுக்கொள்ளாமல் வாந்திபண்ணிவிட்டாலும் குற்றமில்லை. இந்தச் சமயம் வாந்தியாகி ஜீரணமாகாத ஆகாரம் வாந்திமூலமாய் வெளிவந்து விட்டால் நலம்தான். இப்படி வாந்தியாகாமல் கொடுத்த மருந்து ஏற்றுக் கொண்டால் 2 அல்லது 3 தடவல் மலம் வெளியாகி வயிறு உப்பிசம் தணிந்து வயிற்று வலியும் மட்டுப்படும். இன்னும் வயிற்றில் வலியிருந்தால் கொதிக்கிற வெந்நீரில் கொஞ்சம் “டர்ப் டேன்டைன்” ஊற்றி பிளானல் துணியை

(f)

முக்கிப் பிழிந்து வயிற்றின்மேல் போட்டு வைக்கவும். மாநி மாநி இப்படிச் செய்யவும்.

பிறகு கொடுக்க:—

(2)

எடுத்துக்கொள்

ஸோடா. பைகார்ப் கிரைன் 30

(a) (b)

டிஞ்சர். கார்டம். கோ துளி 60

(d)

ஸ்பிரிட் அமோனியா. அரோமேட்டிக்

துளி 45

ஸ்பிரிட். குளோரோபார்ம்.

துளி 30

(f)

ஆக்குவா. மெந்தா. பிப். சேர்ந்து.

அவுன்ஸ் 3

ஒன்றுசேர்

மிக்சர்செய்

2 அல்லது 3 மணிக்கொரு தடவல், தடவல்
1-க்கு 1 அவுன்ஸ் வீதம் கொடுக்கவும்.

(3)

எடுத்துக்கொள்

லைக்கர். பிஸ்மத். எற். அமோனியா.

ஸிட்ரஸ் டிராம் 2

ஸ்பிரிட். அமோனியா. அரோமேட்டிக்,

துளி 45

டிஞ்சர். கார்டம். கோ.

துளி 60

(d)

ஆயில். அனிஸி.

துளி 3

ஸ்பிரிட். குளோரோபார்ம்.

துளி 30

(f)

ஆக்குவா. சேர்ந்து.

அவுன்ஸ் 3

ஒன்றுசேர்

மிக்சர்செய்

தடவல் 1 க்கு 1 அவுன்ஸ் வீதம் 1, 2, அல்
லது 3 மணிக்கொரு தடவல் வியாதியின்
நிலமைக்குத் தகுந்தபடி கொடுக்கவும்.

இந்தப்படி வயிற்றின் புளிப்பு, அஜீரணம்
இவைகளை மேல் காட்டிய மிக்சர்களில்
யாதேனும் ஒன்றைக்கொடுத்து நீக்கிக்கொ
ண்ட பிறகும் வெளிக்குப்போய் நோயாளி

பைக் களைப்பு உண்டாக்கிறதாய் இருந்தால்
மட்டும் மலத்தைக்கட்ட “அபின்” சேர்ந்த
மருந்துகளை உபயோகிக்க வேண்டுமே தவிர,
ஆரம்பத்திலேயே, ஜீரணமாகாத ஆகாரம்
வயிற்றில் லிருக்கும்போது, அபின் சேர்ந்த
மருந்துகளை அவசரப்பட்டுக் கொடுத்து
மலத்தைக் கட்டிவிடக் கூடாது.

“வயிற்றில் உப்பிசம் இல்லாமலிருந்து
மலம் அடிக்கடி தண்ணீராய்ப் போய்க்கொண்டு,
களைப்பு உண்டாக்குகிறபோது
மலத்தைக் கட்ட”

(1)

எடுத்துக்கொள்

ஆஸிட். ஸல்பியூரிக். அரோமேட்டிக்.

(d) (f)

துளி 30

* டிஞ்சர். ஒப்பியம்.

துளி 30

ஸ்பிரிட். காம்பர்.

துளி 10

(f)

ஆக்குவா. சேர்ந்து.

அவுன்ஸ் 3

ஒன்றுசேர்

மிக்சர்செய்

வெளிக்குப் போகும் ஒவ்வொரு தடவலும் $\frac{1}{2}$
அவுன்ஸ் வீதம் கொடுக்கவும்.

அல்லது

தடவல் 1 க்கு 1 அவுன்ஸ் வீதம் 1 அல்லது
2, அல்லது 3 மணிக்கொரு தடவல் வியாதி

யின் மும்மாத்துக்குத் தகுந்தபடி கொடுக்க
வும்.

(2)

எடுத்துக்கொள்

ஆஸிட். ஸல்பியூரிக். டி.ல்.

துளி 30

(d) (f) (d)

* டிஞ்சர். ஒப்பியம்.

துளி 30

ஆக்குவா. சேர்ந்து.

அவுன்ஸ் 3

ஒன்றுசேர்

மிக்சர்செய்

வெளிக்கும் போகும் ஒவ்வொரு தடவலும்
 $\frac{1}{2}$ அவுன்ஸ் வீதம் கொடுக்கவும்.

அல்லது

தடவல் 1 க்கு 1 அவுன்ஸ் வீதம் 1, 2 அல்
லது 3 மணிக்கொரு தடவல் வியாதியின்
நிலமைக்குத் தகுந்தபடி கொடுக்கவும்.

(3)

எடுத்துக்கொள்

* டிஞ்சர். குளோரோபார்ம். எற். மார்பைன்

(f)

(t)

காம்பவுண்ட். துளி 30

ஆக்குவா. சேர்ந்து.

அவுன்ஸ் 3

ஒன்றுசேர்

மிக்சர்செய்

தடவல் 1 க்கு $\frac{1}{2}$ அவுன்ஸ் வீதம் 1 அல்
லது 2 மணிக்கொரு தடவல் கொடுக்கவும்.

(4)

எடுத்துக்கொள்

டிஞ்சர். காப்ஸிஸி

துளி 30

* டிஞ்சர். ஒப்பியம்

துளி 30

ஸ்பிரிட். காம்பர்

துளி 10

(f)

ஸ்பிரிட் குளோரோபார்ம்

துளி 30

ஆக்குவா. சேர்ந்து

அவுன்ஸ் 3

ஒன்றுசேர்

மிக்சர்செய்

தடவல் 1 க்கு $\frac{1}{2}$ அவுன்ஸ் வீதம் 1 அல்லது

2 மணிக்கொரு தடவல் கொடுக்கவும்.

(5)

எடுத்துக்கொள்

* காம்பரோடைன்

துளி 30

(f) (d)

ஆக்குவா. சேர்ந்து

அவுன்ஸ் 3

ஒன்றுசேர்

மிக்சர் செய்

தடவல் 1 க்கு $\frac{1}{2}$ அவுன்ஸ் வீதம் 1, 2 அல்

லது 3 மணிக்கொரு தடவல் கொடுக்கவும்.

(6)

எடுத்துக்கொள்

* குளோரோடைன்

துளி 30

(d)

ஆக்குவா. சேர்ந்து

அவுன்ஸ் 3

ஒன்றுசேர்

மிக்சர்செய்

தடவல் 1 க்கு $\frac{1}{2}$ அவுன்ஸ் வீதம் 1, 2 அல்லது 3 மணிக்கொரு தடவல் வியாதியின் தன்மைக்குத் தகுந்தபடி கொடுக்கவும்.

“ஆரம்பத்திலேயே அபின் சேர்ந்த மருந்துகளைக் கொடுத்து மலம் கட்டி வயிறு உப்பிரீரும் பிரியாமல் இருக்கும்போது கொடுக்க—

(1)

எடுத்துக்கொள்

காலோமல்	கிணான் 6
ஸோடா. பைகார்ப்	கிணான் 24
(d) (b) (b)	

ஒன்றுசேர்

12 பொட்டணமாக மடித்துக்கொண்டு $\frac{1}{2}$, 1, அல்லது 2 மணிக்கொரு தடவல் அவசரத்துக்குத் தகுந்தபடி ஒவ்வொரு பொட்டணம் தேனில் கலந்து கொடுக்கவும்.

இந்தச்சமயம் “வாந்தியும் இருந்தால்”

எடுத்துக்கொள்

ஆஸிட். பென் ஸாயிக்	டிபராம் 1
(d) (b) (z)	
பிஸ்மத். ஸப். நைட்ரஸ்	டிபராம் $1\frac{1}{2}$
(b) (b)	

ஸாலால்

டிராம் ½

ஸோடா பைகார்ப்

டிராம் ½

(d) (b) (b)

ஒன்றுசேர்

12 பொட்டணமாக மடித்துக்கொண்டு வாந்தி எடுக்கும் ஒவ்வொரு தடவலும் ஒவ்வொரு பொட்டணம் தேனில் கலந்து கொடுத்து வாந்தி நின்றவுடன் நிறுத்திக் கொள்ளவும்.

“தண்ணீர் தாகம் இருந்தால்”

எடுத்துக்கொள்

ஆஸிடம் ஆஸெட்டிக்கம். டைலியூட்டம்

(d)

(d)

துளி 60

காம்பர் (வெள்ளைத் துணியில் முடிந்தது)

(f)

கிரான் 3

சுத்தமான கிணற்றுத்தண்ணீர். அவுன்ஸ் 24

ஒரு பெரிய பாட்டிலில் அடைத்து வைத்துக்கொண்டு (காம்பர் பொட்டணம் பாட்டி

(f)

லுக்குள் கிடக்கவேண்டும்) தண்ணீர் கேட்

கும் பொழுதெல்லாம் தடவல் 1 க்கு 2 அவு

ன்ஸ் கொடுக்கலாம். வாந்தி அதிகமாய் இரு

ந்தால் சுற்று நிறுத்தி நிறுத்திக்கொடுக்க

வேண்டும். அல்லது குளிர்ப்பத தண்ணீரை

வாயில் வைத்திருந்து உள்ளுக்கு இறங்காமல்

வெளியே உறசிக் கொப்பளிக்கச் செய்ய

வேண்டும். இப்படிப் பல தடவல் செய்தால் வாயில் ஈரப்பசை உண்டாகித் தாகம் சமம் படும்.

அல்லது “பார்லி அரிசி” யை நன்றாய் வேக

(b)

வைத்து அந்தத் தண்ணீரில் தடவல் 1 க்ரு. 2 அவுன்ஸ் எடுத்துக் கொஞ்சம் உப்பிட்டுக் கொடுக்கலாம். அல்லது உயர்ந்த “ஹோடா வாட்டர்” கொடுக்கலாம். அல்லது “ஐஸ் கட்டி” யில் சிறு துண்டு கொடுக்கலாம்.

“கைகால் குளிர்ந்து, நாடி பம்மி,

இழுக்க ஆரம்பஞ் செய்தால்”

இந்தச் சமயம் ஜாக்கிரதையாய் இருக்க வேண்டும். நோயாளியை கருங்கம்பிளி, அல்லது பிளானல் போர்லையால் மூடிவைத்து, உள்ளங்கால், உள்ளங்கை, கால் பிடரிப் பக்கம், முதுகு இவைகளில் “லீனிமென்ட். காம்ப்ர கோ’ நன்றாய் சூடுபிறக்கத் தடவி

(f)

பிறகு கோதுமைத்தவிடு, கருந்தவிடு, மணல் இவைகளில் யாதேனும் ஒன்றை வறுத்து துணியில் பொட்டணம் கட்டி இரண்டு, மூன்றுபேர்கள் இருந்துகொண்டு மாறி மாறி ஒத்தடம் கொடுக்கவும். தைலம் மார்பிலும் தடவவும். ஆனால் இடது பக்கம் அழுத்தித் தேய்க்கக் கூடாது.

நோயாளிக்கு உள்ளுக்கு விழுங்கும் சக்தி
யிருக்கும்போது, மருந்து கொடுத்து தேகத்
தில் சூடுண்டாக்கக்—

எடுத்துக்கொள்

ஸ்பிரிட். அமோனியா. அரோமேட்டிக்.

துளி 60

ஸ்பிரிட். ஈதர்.

துளி 60

ஸ்பிரிட். குளோரோபார்ம்.

துளி 60

(f)

ஆக்குவா. சேர்ந்து.

அவுன்ஸ் 3

ஒன்றுசேர்

மிக்சர்செய்

தடவல் 1 க்கு $\frac{1}{2}$ அவுன்ஸ் வீதம் 1 மணிக்
கொரு தடவல் 2 அல்லது 3 பொழுது
மருந்து தேகத்தில் சூடுண்டாக்கக் கொடுக்க
வும்.

“அஜீரணத்தால் அல்லாமல் ஆரம்பத்திலேயே
வீஷபேதியாகவே இருந்தால்”

(1)

எடுத்துக்கொள்

ஆஸிடம். ஆஸெட்டிக்கம். டைலியூட்

(d)

(d)

டெம் துளி 60

ஆக்குவா. காம்பர். சேர்ந்து

அவுன்ஸ் 1

(f)

ஒன்றுசேர்

மிக்சர்செய்

இதை ஒரே தடவலாகக் கொடுக்கவும்.
பிறகு கொடுக்க:—

(2)

எடுத்துக்கொள்

ஆஸிடம். ஆஸெட்டிக்கம். டைலியூட்டெம்

(d)

(d)

துளி 60

ஸ்பிரிட் ஈதர் நைட்ரோலி

துளி 60

ஸ்பிரிட். காம்ப்ர்

துளி 15

(f)

ஆக்குவா. சேர்ந்து.

அவுன்ஸ் 3

ஒன்றுசேர்

மிக்சர்செய்

தடவல் 1 க்கு 1 அவுன்ஸ் வீதம் 2 அல்
லது 3 மணி நேரத்துக் கொரு தடவல்
கொடுக்கவும்.

(3)

எடுத்துக்கொள்

* லைக்கர். மார்பைன். ஐட்ரோகுளோரைட்

(f)

(h)(d)

(d)

துளி 60

ஸ்பிரிட். குளோரோபாரம்

துளி 20

(f)

ஆக்குவா. சேர்ந்து.

அவுன்ஸ். 2

ஒன்றுசேர்

மிக்சர்செய்

தடவல் 1 க்கு 1 அவுன்ஸ் வீதம், 2 அல்
லது 3 மணிக்கொரு தடவல் கொடுக்கவும்.

(4)

எடுத்துக்கொள்

* டிஞ்சர். ஒப்பியம் துளி 20

ஸ்பிரிட். குளோரோபார்ம் துளி 20

(f)

ஆக்குவா. சேர்ந்து அவுன்ஸ் 2

ஒன்றுசேர்

மிக்சர்செய்

தடவல் 1 க்கு 1 அவுன்ஸ் வீதம் 2 அல்

லது 3 மணிக்கொரு தடவல் கொடுக்கவும்.

(5)

எடுத்துக்கொள்

“அட்ரோபைன் சேர்ந்திருக்கிற, பாறோஸ்”

(b)

வேல்க்கம் ஐட்போடேர்மிக் இன்ஜெக்

(h)

(d)

ஷன். மார்பைன் டேப்ளாய்ட்ஸ்” இதை

(f)

(b)

(d)

இரத்தத்தில் கலக்கும்படி இரத்தக் குழலில்

“இன்ஜெக்ஷன். ஊசி” கொண்டு மேல்படி

மாத்திரையை உபயோகப்படுத்த வேண்டிய

அளவில் குத்தி இறக்கவும். பின்பு தேயிலைத்

தண்ணீரில் சீனி சேர்த்துக் கொஞ்சம்

கொஞ்சமாய்க் கொடுத்து வரவும். இந்த

முறையைத்தான், விசேஷமாய்க் கையாடி

வருகிறார்கள்.

இந்த “இன்ஜெக்ஷன்” செய்தபின் நோயா

ளிக்கு நித்திரை வந்தால் தூங்கவிடவேண்

டும். பக்கத்தில் 2 பேர்கள் மட்டும் சத்தம் போடாமல் கவனித்துக் கொண்டிருக்க வேண்டும். அதிகக் கூட்டம் உதவாது.

பேதியும், வாந்தியும் சம்பப்பட்டு நோயாளி அதிகக் களைப்படைகிறதாய்த் தெரிந்தால் கொஞ்சம் “ஆரோருட் மாவு” அல்லது “பார்லி மாவு” போட்டுக் கஞ்சி காய்ச்சிக் கொஞ்சம் உப்புப் போட்டுக் கொடுக்கலாம். இரண்டு மூன்றுநாள் கழித்து நீரும், மல மும் சரியானபடி ஒழுங்குபட்டபின், மத்தி யான மட்டும் ஒருவேளை ஆகாரம் கொடுத்து காலையிலும், இரவிலும் “ஆர்லிக்ஸ் மால்ட்

(h)

டெட். மில்க்” கஞ்சி காய்ச்சிக் கொடுக்க வும். இப்படி 2 வாரம் கொடுக்கவும்.

இப்படிக் கொடுத்து வரும் ஆகாரம் சரியானபடி ஜீரணமாகி, ஜீரணக் கருவிகள் பலப் பட்டபின், தேகத்தில் களைப்பை நீக்கப் பல த்தைக் கொடுக்க.

(1)

எடுத்துக்கொள்

“ ப வ் ரி ல் ”

(b)

இதில் தடவல் 1க்கு 1 தேக்கரண்டி எடுத்து 2 அவுன்ஸ் கொதிக்கிற தண்ணீரில் கரை த்து மிளகுப் பொடியும், உப்பும் சேர்த்துச் சாப்பிடவும்.

எடுத்துக்கொள்

“எஸென்ஸ். ஆப். சிக்கென்”

(f)

இதையும் “பவ்ரிஸை”ப் பக்குவம் செய்தபடி செய்து நாள் 1 க்கு 2, 3 தடவல் சாப்பிடலாம்.

அல்லது

நோயாளிக்குப் பிரியமான “சூப்புகள்” செய்தும் கொடுக்கலாம்.

“கண்வலி, அமரம், கண் சிவப்பு”

கண் இமைகள் வீங்காமல், கண்ணில் சிவப்பு மட்டும் இருந்தால்:—

எடுத்துக்கொள்

போரிக். ஆஸிட் கிரான் 60

(b) (d)

மழைத்தண்ணீர் இல்லாவிட்டால் கிணற்றுத் தண்ணீர் அவுன்ஸ் 12

“போரிக். ஆஸிட்டை” நன்றாய்க் கரைத்

(b)

துக்கொண்டு “அப்ஸார்பென்ட். காட்டன்”

(b) (b)

கொண்டு முக்கி, கண்ணில் பிழிந்து சுத்தம் செய்து

பிறகு

எடுத்துக்கொள்

ஸிங். ஸல்பஸ்.

கிரான் 1

(z)

(f)

போரிக். ஆஸிட். கிரான் 10

(b) (d)

கிளிஸெரின். துளி 40

(g)

மழைத்தண்ணீர். (அல்லது)

டிஸ்டில்ட். வாட்டர் அவுன்ஸ் 1

(d) (d)

ஒன்றுசேர்

இதை “டிராப். பாட்டிலில் வைத்துக்

(d) (b)

கொண்டு காலை, மாலை கண்ணுக்குள் 5 துளி விட்டுவரவும்.

“கண் வலியோடு, கண் இமைகளும்
வீங்கி இருந்தால்” :—

முன் சொல்லியபடி “போரிக் ஆஸிட்”
(d)

கரைத்த தண்ணீரால் கண்களைச் சுத்தம்
செய்துவிட்டு,

பிறகு

எடுத்துக்கொள்

* அர்ஜென்டம். ரைட்ரஸ். கிரான் 5

மழைத்தண்ணீர் (அல்லது)

டிஸ்டில்ட். வாட்டர் அவுன்ஸ் 1

(d) (d)

கிணற்றுத் தண்ணீர் உதவாது.

இதை “நீல நிறமான பாட்டிலில் வைத்துக்
(b)

கொண்டு, “காபல் ஏர் பிரஷ்” கொண்டு

(h) (b)

முக்கி கண் இமைகளே மடித்து வைத்துக் கொண்டு அவைகளில் தடவி மூடிவிடவும். இப்படி நாள் 1 க்கு 1 தடவல் செய்தால் போதும்.

சிறு குழந்தைகளுக்கும் “அமரத்துக்கு” இப்படியே செய்யவும்.

“மலச் சிக்கல்”

இதற்கு

(1)

எடுத்துக்கொள்

எக்ஸ்ட்ராக்ட். காஸ்மாரா. ஸாக்ரடா. லிக்கு.

(g)(d)

விட் துளி 60

(d)

* டிஞ்சர். நக்ஸ்வாமிக்கா

துளி 10

கிளிஸெரின்

துளி 60

(g)

ஆக்குவா. சேர்ந்து.

அவுன்ஸ் 1

ஒன்றுசேர்

மிக்சர்செய்

இதை ஒரே தடவலாக, இப்படி ஒவ்வொரு நாள் சாயந்திரம் சாப்பிடவும். மறுநாள் காலையில் ஒவ்வொருநாளும் மலம் போகிறதைக் கவனித்து, மலம் தன்மலமாய் சிம மில்லாதபடி போகவேண்டுமே தவிர தண்

ணீராய்ப் போகாதபடி இருக்கும்படியாக
 “எக்ஸ்ட்ராக்ட். காஸ்காரா, ஸாக்ரடா
 லிக்குலிட்” இதின் அளவை மட்டும் நிதா
 னப்படுத்திக் கொண்டு ஒவ்வொருநாளும்
 சாயந்திரம் விடாமல் இரண்டு மாசம் இப்ப
 டிப் பொருமைபாய்ச் சாப்பிட்டு வந்தால்
 மலச் சிக்கல் எடுபடுமெனத் தீர்மானிக்கிறார்
 கள். அவசரப்படக்கூடாது.

(2)

எடுத்துக்கொள்

(1) “காஸாகரா”

(g)

(2) “காஸ்க்காரா. எவாக்துவன்ற”

இவைகளில் யாதேனும் ஒன்றை உபயோகப்
 படுத்தலாம். ஆனால் இவைகளையும் மேல்
 சொல்லியபடி அளவுகளை நிதானப்படுத்தி
 நீடித்துச் சாப்பிடவேண்டும்.

(3)

எடுத்துக்கொள்

“காஸ்ட்டர் ஆயில்”

இதில் 1 அல்லது 2 தேக்காண்டி தேகஸ்தி
 திக்குத் தகுந்தபடி இரவில் சாப்பிட்டு வா
 லாம்.

(4)

எடுத்துக்கொள்

(1) “ஈனாஸ். புரூட். ஸால்ட்”

(f)

(2) “காவி போர்னியா. பிக்லிரப்”

(f)

(f)(g)

இவைகளில் யாதேனும் ஒன்றை உபயோகப்
படுத்தலாம்.

குழந்தைகளுக்கு, நெஞ்சில் கபங்கட்டி,
திட்டு முட்டடித்துக்கொண்டு, குறுகுறு என்ற
சப்தம் கேட்கும்போது கொடுக்க:—

(1)

எடுத்துக்கொள்

டார்ட்டார். எமட்டிக்

கிரான் 1

வைனம். இப்பிக்காக்

அவுன்ஸ் ½

ஸிம்பிள். ஸிரப்

அவுன்ஸ் 1

ஆக்குவா. சேர்த்து

அவுன்ஸ் 6

ஒன்றுசேர்

மிக்சர்செய்

தடவல் 1 க்கு 2 தேக்காண்டி வீதம், வாந்தி
உண்டாகுமட்டும் 15 நிமிஷத்திற்கு ஒரு
தடவல் கொடுத்து வாந்தியான பிறகு 1, 2
அல்லது 3 மணிக்கொரு தடவல் வியாதி
யின் நிலமைக்குத் தகுந்தபடி தடவல் 1 க்கு
1 தேக்காண்டி வீதம் கொடுக்கவும்.

(2)

எடுத்துக்கொள்

“சாம்பர்லேயின்ஸ். காப். ரேமிடி”

(f)

(d)

இதில் 15 நிமிஷத்திற்கு ஒரு தடவல் 2 தேக்காண்டி வீதம் வாந்தி உண்டாகும் வரை கொடுத்துப் பிறகு 1, 2 அல்லது 3 மணிக்கொரு தடவல் கியாதியின் தன்மைக்குத் தகுந்தபடி 1 தேக்காண்டி வீதம் கொடுத்து வரவும்.

தொண்டைகழுழி, நெஞ்சு, இவைகளில் சம்பாகம் “டர்ப்பென்டைனும்”, “யூக்காலிப்டஸ் ஆயிலும்” ஒன்று சேர்த்துக் குலுக்கிக்கொண்டு, தடவி, கொதிக்கிற வெந்நீரில் பிளானல் துணியை முக்கி இறுக்கிப் பிழி (f)

ந்து, மேல் ஒத்தடம் கொடுக்கவும். குழந்தையை முகம் நீங்கலாக மற்றப் பாகம் பூராவும் பிளானல் போர்வையால் மூடி வைக் (f)

கவும்.

“பலயீனத்திற்கு”

(1)

எடுத்துக்கொள்

ஜீரண சக்திக்குத் தகுந்தபடி 1 அல்லது 2 முட்டையின் மஞ்சள்கரு, $\frac{1}{8}$ அல்லது $\frac{1}{4}$ படி சுடுகிற பசுவிற்பால் இந்த இரண்டையும் ஒரு வாய் அகன்ற கோப்பையில் “எக். (g)

பீட்டர்” என்னும் முட்டை அடிக்கிற (b)

கருவியால் ஒன்று சேர்த்து அடித்து, இதோடு $\frac{1}{2}$ அவுன்ஸ் “பிராந்தியம்” கொஞ்சம் சீனியும் சேர்த்துக் காலையில் சாப்பிடவும்.

(2)

எடுத்துக்கொள்

ஆஸிட். நைட்ரோ. ஐட்ரோ குளோரிக் டிஸ்

(d)

(h)(d)

(a)

துளி 30

* டிஞ்சர். நக்ஸ்வாமிக்கா

துளி 30

ஸிரப். ஸிம்பிள்

டிராம் 3

இன்பியூஷன். குவாஷியா. சேர்ந்து

(f)

அவுன்ஸ் $1\frac{1}{2}$

ஒன்றுசேர்

மிக்சர்செய்

தடவல் 1 க்கு $\frac{1}{2}$ அவுன்ஸ் வீதம் நாள் 1க்கு 3 தடவல் ஆகாரத்துக்குப்பின் கொடுக்கவும்.

(3)

எடுத்துக்கொள்

பெர்ரை. எற். அமோனியா. ஸிட்ரஸ்

(f)

கிரான் 15

* டிஞ்சர். நக்ஸ்வாமிக்கா.

துளி 15

டிஞ்சர். கலம்பா.

துளி 60

ஸிரப். ஸிம்பிள்.

டிராம் 3

ஆக்குவா. சேர்ந்து.

அவுன்ஸ் 3

ஒன்றுசேர்

மிக்சர்செய்

தடவல் 1 க்கு 1 அவுன்ஸ் வீதம் நாள் 1க்கு
3 தடவல் ஆகாரத்துக்குப் பின் சாப்பிடவும்.

(4)

எடுத்துக்கொள்

பெர்ரை. எற். கொய்னைன்=ஸிட்ரஸ்

(f)

கிரான் 15

* லைக்கர். ஸ்ட்ரிக்னைன். ஐட்ரோ குளோரைட்

(h)(d)

(d)

துளி 6

கிளிஸெரின்.

டிபாம் 1½

(g)

இன்பியூஷன். குவாஷியா. சேர்ந்து

(f)

அவுன்ஸ் 1½

ஒன்றுசேர்

மிக்சர்செய்

தடவல் 1 க்கு ½ அவுன்ஸ் வீதம் நாள் 1 க்கு
3 தடவல் ஆகாரத்துக்குப்பின் கொடுக்கவும்.

(5)

எடுத்துக்கொள்

“பர்காய்ன்ஸ். ஈஸ்ட்டன்ஸ். ஸிரப்”

(b)(g)

இதை நன்றாய்க் குலுக்கிக்கொண்டு, தடவல்
1 க்கு துளி 30, 1 அவுன்ஸ் தண்ணீரில் சேர்

த்து நாள் 1 க்கு 3 தடவல் ஆகாரத்துக்குப்
பின் சாப்பிடவும்.

(6)

எடுத்துக்கொள்

டிஞ்சர். பெர்ரை. பெர்க்குளோரைட்.

(f)

(d)

துளி 15.

ஆஸிட். நைட்ரோ. ஐட்ரோகுளோரிக்.

(d)

(h)(d)

டி. துளி 15

* லைக்கர் ஸ்ட்ரிக்னைன். ஐட்ரோகுளோரைட்

(h)(d)

(d)

துளி 6

ஸிரப். ஆரண்டி

துளி 90

ஆக்குவா. சேர்ந்து

அவுன்ஸ் 3

ஒன்றுசேர்

மிக்சர்செய்

தடவல் 1 க்கு 1 அவுன்ஸ் வீதம் நாள் 1 க்கு
3 தடவல் ஆகாரத்துக்குப்பின் கொடுக்கவும்.

(7)

எடுத்துக்கொள்

(1) "பைனே. ஐப்போபாஸ்பைட்ஸ்"

(h)

(f)

(f)

(2) "பைநின். அமரா"

(b)

(3) "பெல்லோஸ். காம்பவுண்ட். ஸிரப்"

(f)

(d)

(4) “அக்ஸ்லீஸ். நெர்விகர் ஸிரப். வித்.

(h) (g)

பார்மேட்ஸ்”

(f)

(5) “மனோலா”

(6) “வின்கார்னிஸ்”

(7) “பீப். ஆன்ட். அயர்ன் ஒயின்”

(f) (d)

(8) “டாமியானா. டைன்”

(d) (d)

(9) “டாமியானா. எலக்ஸியர்”

(d)

(10) “காட்லிவர். ஆயில்” தினுசுகளில் யாதே

(d)

னும் ஒன்று.

(11) ஹெமோ. பெர்ரெம்

(f)

ஆகிய இவைகளில் யாதேனும் ஒன்றை
உபயோகப்படுத்தலாம்.

“பல்வலி அரண்கட்டினதால் வலி வீக்கம்”

இவைகளுக்கு:—

(1)

எடுத்துக்கொள்

“ஸ்பிரிட் குளோரோபார்ம்”

(f)

ஒரு குச்சியில் பஞ்சுகற்றி இதில் முக்கி,
அரண்கட்டி, ஈறுவளர்ந்து வலிவேதனை
இருக்கிற இடத்தில் வைத்துக் கொண்டிருந்
தால் கோழையாய் வடிந்து ஈறு, கட்டி,
கரைந்து வலிவேதனை நிற்கும். இப்படி
இரண்டு, மூன்று குச்சிகள் முக்கி வைக்க
வும்.

(2)

எடுத்துக்கொள்

“காம்பரோடைன்”

(f) (d)

இதையும் மேல் சொல்லியபடி உபயோகிக்க
வும்.

(3)

எடுத்துக்கொள்

“பெப்பர்மின்ட். கிரிஸ்ட்டல்”

இதில் கொஞ்சம் எடுத்து வலியுள்ள இடத்
தில் வைக்கலாம்.

(4)

எடுத்துக்கொள்

* குளோரல். ஐட்ரஸ்

கிரைன் 10

(h)(d)

காம்பர்

கிரைன் 5

(f)

ஒன்றுசேர்

இந்த இரண்டையும் “ஸிலாப்பில்”, “போ
லஸ்கத்தி” யால் நன்றாய்த் தேய்த்து பசை

போலாக்கி ஒரு குச்சியில் “அப்ஸார்பேன்ட்.

(b) (b)

காட்டன்” சுற்றி மேல்படி பசையில் தேய்த்து அரண்கட்டி, ஈறு வளர்ந்திருக்கிற இடத்தில் மட்டும் படும்படி வைக்கவும். இதற்குக் கொஞ்சம் எரிச்சலிருக்கும். இப்படி இவைகளில் யாதேனும் ஒன்றை உபயோகித்து ஈறுவளர்தல், அரண்கட்டி யிருத்தல் இவைகளைக் கரைத்தபின்,

எடுத்துக்கொள்

(1) “கால்வெர்ட்ஸ். கார்பாலிக் டீத் பவுடர்”

(b) (d)

(2) “யூதைமால் டீத்பேஸ்ட்”

இவைகளில் யாதேனும் ஒன்றால் பல் விளக்கி வரவும்.

பல் வேதனையால் வெளியில் வீக்கம் இருந்தால் வீக்கத்தை வற்றவைத்து வேதனையை யும் தணிக்க:—

எடுத்துக்கொள்

டிஞ்சர். பெர்ரை. பெர்க்குளோரைட்

(i)

(d)

துளி 30

* டிஞ்சர். டிஜிடாலிஸ்

துளி 30

(d)

ஒன்றுசேர்

ஒரு குச்சியில் பஞ்சுசுற்றி இதில் முக்கி வெளிப்பக்கத்திலுள்ள வீக்கத்தில் நாள் 1 க்கு 2, 3 தடவல் தடவவும்.

“வயிற்றோட்டம்”

இதற்கு:—

(1)

எடுத்துக்கொள்

பல்விஸ். கிரீட்டா. அரோமேட்டிக்.

கிரைன் 30

ஸாலரல்.

கிரைன் 15

பிஸ்மத். ஸ்பைரைட்.

கிரைன் 15

(b)

(b)

ஒன்றுசேர்

3 பொட்டணமாக மடித்துக்கொண்டு, தடவல் 1 க்கு 1 பொட்டணம் வீதம் நாள் 1க்கு 3 தடவல் கொடுக்கவும்.

குழந்தைகளுக்கானால் தடவல் 1 க்கு 1 பொட்டணத்தில் நான்கில் ஒரு பாகம் தேனில் கலந்து கொடுக்கவும்.

(2)

எடுத்துக்கொள்

பல்விஸ். கிரீட்டா. அரோமேட்டிக். கம்.

ஒப்பியம். கிரைன் 30

ஸோடா. பைகார்ப்.

கிரைன் 15

(d) (b) (b)

பிஸ்மத். ஸ்பைரைட்.

கிரைன் 15

(b)

(b)

ஒன்றுசேர்

3 பொட்டணமாக மடித்துக்கொண்டு தடவல் 1 க்கு 1 பொட்டணம் வீதம் நாள் 1க்கு 3 தடவல் கொடுக்கவும்.

(3)

எடுத்துக்கொள்

பல்விஸ். கிரீட்டா. அரோமேட்டிக்

கிரான் 30

டிஞ்சர். காட்டிக்கியூ

துளி 60

ஸ்பிரிட். குனோரோபார்ம்

துளி 30

(f)

ஆக்குவா. சேர்ந்து

அவுன்ஸ் 3

ஒன்றுசேர்

மிக்சர்செய்

தடவல் 1 க்கு 1 அவுன்ஸ் வீதம் நாள் 1 க்கு

3 தடவல் கொடுக்கவும். குழந்தைகளுக்கு

தடவல் 1 க்கு 2 தேக்காண்டி வீதம் நாள்

1 க்கு 3 தடவல் கொடுக்கவும்.

(4)

எடுத்துக்கொள்

ஸாலால்

கிரான் 15

பிஸ்மத் ஸப் கைட்ரஸ்

கிரான் 15

(b)

(b)

ஒன்றுசேர்

3 பொட்டணமாக மடித்துக்கொண்டு, ஆகா

ரத்திற்கு 15 நிமிஷத்திற்கு முன் தடவல்

1 க்கு 1 பொட்டணம் வாயிற் போட்டு 1

அவுன்ஸ் தண்ணீர் கொடுக்கவும்.

ஆகாரத்திற்குப் பின் கொடுக்க:—

எடுத்துக்கொள்

ஈலெட்ஸ். பெப்ஸின். மிக்சர். வித்.

(h)

ஒப்பியம்.

துளி 90

டிஸ்டில்ட் வாட்டர். சேர்ந்து அவுன்ஸ் 3

(d) (d)

ஒன்றுசேர்

தடவல் 1 க்கு 1 அவுன்ஸ் வீதம் நாள் 1க்கு

3 தடவல் கொடுக்கவும்.

(5)

எடுத்துக்கொள்

ஆஸிட். ஸல்பியூரிக். அரோமேட்டிக்.

(d) (f)

துளி 30

* டிஞ்சர் ஒப்பியம்

துளி 15

ஆக்குவா. சேர்ந்து

அவுன்ஸ் 3

ஒன்றுசேர்

மிக்சர் செய்

4 மணி நேரத்திற்கொரு தடவல் 1 அவுன்ஸ்

வீதம் கொடுக்கவும்.

(6)

எடுத்துக்கொள்

ஆஸிட். ஸல்பியூரிக். டில்

துளி 15

(d) (f) (d)

டிஞ்சர். ஜென்ஷன். கோ

துளி 60

* டிஞ்சர் ஒப்பியம்

துளி 15

ஆக்குவா சேர்ந்து

அவுன்ஸ் 3

ஒன்றுசேர்

மிக்சர்செய்

தடவல் 1 க்கு 1 அவுன்ஸ் வீதம் நாள்

1 க்கு 3 தடவல் கொடுக்கவும்.

வயிற்றோட்டம் குணமாகும்வரை மத்தியா
னம் ஒருவேளை ஆகாரம் கொடுத்து, காலையி
லும், இரவிலும் “பார்லிமாவு”, “ஸ்பிட்ஸ்

(b)

ஆரோசுட்” “பெங்கர்ஸ். பூட்”, “ஆர்

(b)

(f)(d)

(h)

லிக்ஸ் மால்ட்டெட் மில்க்” இவைகளில்

(d)

யாதேனும் ஒன்றை கஞ்சி காய்ச்சிக் கொடுக்
கவும். வயிற்றோட்டம் அதிகமாயிருந்தால்
கஞ்சிமட்டும் கொடுக்கவேண்டும்.



“வயிற் றழைச்சல்”

இதற்கு

(1)

எடுத்துக்கொள்

டோவர்ஸ். பவுடர்

கிரான் 15

(d)

(d)

காலிக். ஆஸிட்

கிரான் 15

(g)

(d)

ஒன்றுசேர்

3 பொட்டணமாக மடித்துக்கொண்டு தட
வல் 1-க்கு 1 பொட்டணம் வீதம் நான்
1 க்கு 3 பொட்டணம் தேனில் கலந்து
கொடுக்கவும்.

(2)

எடுத்துக்கொள்

பல்விஸ். ஈரீட்டா. அரோமேட்டிக். கம்.

ஒப்பியம். கிரான் 30

பல்விஸ். கைநோ. கோ கிரான் 15

பிஸ்மத். ஸப்நைட்ரஸ் கிரான் 15

(b)

ஒன்றுசேர்

3 பொட்டணமாக மடித்துக்கொண்டு தட

வல் 1 க்கு 1 பொட்டணம் வீதம் நாள்

1 க்கு 3 தடவல் கொடுக்கவும்.

(3)

எடுத்துக்கொள்

பல்விஸ். கைநோ. கோ கிரான் 15

காலிக். ஆஸிட் கிரான் 15

(g) (d)

ஸாலால் கிரான் 15

பிஸ்மத். ஸப்நைட்ரஸ். கிரான் 15

(b) (b)

ஒன்றுசேர்

3 பொட்டணமாக மடித்துக்கொண்டு தட

வல் 1 க்கு 1 பொட்டணம் வீதம் நாலுமணி

நோத்துக் கொடு தடவல் கொடுக்கவும்.

(4)

எடுத்துக்கொள்

காஸ்ட்டர். ஆயில் டிராம் 6

கம். அக்கேஷியா. போதுமான அளவு

(g)

ஒலியம். ஸின்னமன்.

துளி 2

ஆக்குவா. சேர்ந்து

அவுன்ஸ் 3

ஒன்றுசேர்

“எமல்ஷனாக”ச் செய்துக்கொண்டு தடவல் 1 க்கு 1 அவுன்ஸ் வீதம் நாள் 1 க்கு 3 தடவல் கொடுக்கவும்.

மேல்படி ஒவ்வொரு தடவல் மருந்தோடும் 4 துளி “டிஞ்சர். ஒப்பியம்” சேர்த்தும் கொடுக்கலாம்.

1 வயசுக்குள்பட்ட குழந்தைகளுக்கு தடவல் 1 க்கு 2 தேக்காண்டி வீதம் “எமல்ஷன்” மட்டும் கொடுக்கவும். ஆனால் “டிஞ்சர் ஒப்பியம்” சேர்த்துக் கொடுக்கக் கூடாது.

(5)

எடுத்துக்கொள்

“காலோமல்” இதைக் குறைந்த அளவில் உபயோகப்படுத்தி வருகிறார்கள்.

குறிப்பு:—1 வயசுக் குட்பட்ட குழந்தைகளுக்கு மேல் எழுதியிருக்கிற முறைகளில் “அபின்” சோத மருந்துகளை குழந்தைகளுக்கு ஏற்பட்டிருக்கிற அளவில் ஒன்று சேர்த்துக் கொடுக்கவும். 1 வயசுக்கு மேற்பட்ட குழந்தைகளுக்கு “அபின்” சேர்ந்த மருந்துகள் சேர்த்துக் கொடுக்கிறதானால் மிகவும் குறைந்த அளவில் கொடுக்க வேண்டும்.

வயிற்றழைச்சல் குணமாகும்வரை “பார்ல்
மாவு”, “ஸ்பீட்ஸ். ஆரோகுட்” இவைக
ளில் யாதேனும் ஒன்றில் பாலும் கொஞ்சம்
இனிப்பும் சேர்த்துக் கொடுக்கவும்.

“சூதக வலிக்கு”

(1)

எடுத்துக்கொள்

* டிஞ்சர். கனாபிஸ். இன்டிக்கா துளி 15

(b) (d)

கம். அக்கேஷியா. போதுமான அளவு

(g)

ஸ்பிரிட். ஈதர் துளி 45

ஸ்பிரிட் குளோரோபார்ம் துளி 30

(f)

ஆக்குவா. சேர்ந்து அவுன்ஸ் 3

ஒன்றுசேர்

மிக்சர்செய்

தடவல் 1 க்கு 1 அவுன்ஸ் வீதம் நாள் 1க்கு

3 தடவல் ஆகாத்துக்குப்பின் கொடுக்கவும்.

(2)

எடுத்துக்கொள்

பொட்டாஸ். புரோமைட் கிரான் 60

(b) (d)

டிஞ்சர். அயோஸியாமஸ் துளி 45

ஸிரப். ஆரன்டி
ஆக்குவா. சேர்ந்து

துளி 90
அவுன்ஸ் 3
ஒன்றுசேர்

மிக்கர்செய்

தடவல் 1 க்கு 1 அவுன்ஸ் வீதம் நாள் 1க்கு
3 தடவல் கொடுக்கவும்,

(3)

எடுத்துக்கொள்

கொய்னைன். ஸல்பஸ் கிரான் 10

(f)

ஆஸிட். ஸல்பியூரிக். டில். துளி 10

(d) (f) (d)

* டிஞ்சர். ஒப்பியம். துளி 15

ஆக்குவா. கார்பர். சேர்ந்து. அவுன்ஸ் 3

(f)

ஒன்றுசேர்

மிக்கர்செய்

தடவல் 1 க்கு 1 அவுன்ஸ் வீதம் நாள் 1க்கு
3 தடவல் ஆகாரத்துக்குப்பின் கொடுக்கவும்.

(4)

எடுத்துக்கொள்

“பார்க் டேலிஸ். அன்கோஸ். கைக்கர்.

(d)

ஸோடான்ஸ்

(d)

இதில் தடவல் 1 க்கு 60 துளி 1 அவுன்ஸ்
தண்ணீரில் கலந்து நாள் 1 க்கு 3 தடவல்
ஆகாரத்துக்குப் பின் கொடுக்கவும்.

(5)

எடுத்துக்கொள்

“அலெட்ரிஸ். கார்டியல்”

(d)

இதில் தடவல் 1 க்கு 60 துளி $\frac{1}{2}$ அவுன்ஸ் வெந்நீரில் கலந்து நாள் 1 க்கு 3 தடவல் ஆகாரத்துக்குப் பின் கொடுக்கவும். ஆனால் இதைக் கொஞ்சகாலம் நீடித்துக் கொடுக்க வேண்டும்.

“ஆன்னத் துவேஷம், அல்லது ஆகாரம் வெருப்பு, பசியின்மை”

இவைகளுக்கு:—

(1)

பெப்ஸின். போர்ஸி. கிரைன் 9

பிஸ்மத். ஸ்பைரைட்ஸ். கிரைன் 15

(b) (b)

ஸோடா பைகார்ப். கிரைன் 25

(d) (b) (b)

ஒன்றுசேர்

3 பொட்டணமாக மடித்துக்கொண்டு தடவல் 1 க்கு 1 பொட்டணம் வீதம் நாள் 1 க்கு 3 பொட்டணம், ஆகாரம் சாப்பிட்டவுடன் கொடுக்கவும்.

(2)

எடுத்துக்கொள்

ஸாலால்.

கிரைன் 15

பிஸ்மத் ஸப்ரைட்ரஸ்.

கிரைன் 15

(b) (b)

ஒன்றுசேர்

3 பொட்டணமாக மடித்துக்கொண்டு தடவல் 1 க்கு 1 பொட்டணம் வீதம் நாள் 1 க்கு 3 தடவல் ஆகாரத்திற்கு 10 நிமிஷத்திற்கு முன் கொடுத்துப்

பிறகு

எடுத்துக்கொள்

“ஈலேப்ஸ் பேப்ஸின் மிக்சர்”

(h)

இதை நன்றாய்க் குலுக்கிக்கொண்டு, இதில் தடவல் 1 க்கு 30 துளி, 1 அவுன்ஸ் “டிஸ் (d)

டிஸ்ட் வாட்டரில்” சேர்த்து நாள் 1 க்கு (d)

3 தடவல் ஆகாரம் சாப்பிட்டவுடன் கொடுக்கவும்.

(3)

எடுத்துக்கொள்

ஸோடா. பைகார்ப்.

கிரைன் 30

(d) (b) (b)

டிஞ்சர். ஜென்ஷன். கோ.

துளி 60

ஆக்குவா. சேர்ந்து

அவுன்ஸ் 3

ஒன்றுசேர்

மிக்சர்செய்

தடவல் 1 க்கு 1 அவுன்ஸ் வீதம் நாள் 1 க்கு

3 தடவல் ஆகாரத்துக்குப்பின் கொடுக்கவும்

(4)

எடுத்துக்கொள்

பெப்ஸின். போர்ஸி. கிரான் 9

ஆஸிட். ஐட்ரோகுளோரிக். டிஸ். துளி 15

(d) (h)(d) (d)

* டிஞ்சர். நக்ஸ்வாமிக்கா. துளி 15

ஆக்குவா. சேர்ந்து. அவுன்ஸ் 3

ஒன்றுசேர்

மிக்சர்செய்

தடவல் 1 க்கு 1 அவுன்ஸ் வீதம் நாள் 1 க்கு
3 தடவல் ஆகாரம் சாப்பிட்டவுடன் கொ
டுக்கவும்.

(5)

எடுத்துக்கொள்

ஸோடா. பைகார்ப். கிரான் 30

(d) (b) (b)

டிஞ்சர். கார்டம். கோ துளி 60

(d)

ஸ்பிரிட். அமோனியா அரோமேட்டிக்

துளி 30

ஸ்பிரிட். குளோரோபார்ம். துளி 30

(f)

ஆக்குவா. அனிஸி சேர்ந்து. அவுன்ஸ் 3

ஒன்றுசேர்

மிக்சர்செய்

தடவல் 1 க்கு 1 அவுன்ஸ் வீதம் நாள் 1-க்கு
3 தடவல் ஆகாரத்திற்குப் பின் கொடுக்
கவும்.

(6)

எடுத்துக்கொள்

டிஞ்சர். கார்டம். கோ. துளி 50

(d)

டிஞ்சர். ஜென்ஷன். கோ. துளி 45

ஸ்பிரிட். அமோனியா. அரோமேட்டிக்.

துளி 30

ஸ்பிரிட். குளோரோபார்ம். துளி 30

(f)

ஆக்குவா. சேர்ந்து. அவுன்ஸ் 3
ஒன்றுசேர்

மிக்சர்செய்

தடவல் 1 க்கு 1 அவுன்ஸ் வீதம் நாள் 1 க்கு
3 தடவல் ஆகாத்துக்குப்பின் கொடுக்கவும்.

(7)

எடுத்துக்கொள்

ஸோடா. பைகார்ப். கிரைன் 30

(d) (b) (b)

டிஞ்சர். ஜென்ஷன். கோ. துளி 45

* டிஞ்சர். நக்ஸ்வாமிக்கா. துளி 15

ஆக்குவா. குளோரோபார்ம். சேர்ந்து.

(f)

அவுன்ஸ் 3

ஒன்றுசேர்

மிக்சர்செய்

தடவல் 1 க்கு 1 அவுன்ஸ் வீதம் நாள்
1 க்கு 3 தடவல் ஆகாத்துக்குப் பின்
கொடுக்கவும்.

(8)

எடுத்துக்கொள்

ஆஸிட். நைட்ரோ. ஐட்ரோகுளோரிக். டில்
(d) (h)(d) fd)

துளி 30

* டிஞ்சர். நக்ஸ்வாமிக்கா துளி 15

ஸிரப். ஸிம்பிள் துளி 90

இன்பியூஷன். குவாஷியா. சேர்ந்து
(f)

அவுன்ஸ் 3

ஒன்றுசேர்

மிக்சர்செய்

தடவல் 1 க்கு 1 அவுன்ஸ் வீதம் நாள்
1 க்கு 3 தடவல் ஆகாரத்துக்குப் பின்
கொடுக்கவும்.

(9)

எடுத்துக்கொள்

பிஸ்மத். ஸப்நைட்ரஸ். கிரான் 15

(b) (b)

ஸோடா. பைகார்ப் கிரான் 15

(d) (b) (b)

கம். அக்கேஷியா. போதுமான அளவு
(g)

டிஞ்சர். ஜென்ஷன். கோ. துளி 45

ஆக்குவா. சேர்ந்து. அவுன்ஸ் 3
ஒன்றுசேர்

மிக்சர்செய்

ஒவ்வொரு தடவலும் நன்றாய்க் குலுக்கிக் கொண்டு தடவல் 1 க்கு 1 அவுன்ஸ் வீதம் நாள் 1 க்கு 3 தடவல் ஆகாரத்துக்குப் பின் கொடுக்கவும்.

குறிப்பு:—வயிற்றுவலி யிருந்தால் மேல்படி ஒவ்வொரு தடவல் மிக்சரோடும் 10 துளி

* லைக்கர். மார்பைன். ஐட்ரோ குளோ

(f) (h)(d)

ரைட்" சேர்த்துக் கொள்ளவும்.

(d)

(10)

எடுத்துக்கொள்

ஸோடா பைகார்ப் கிரான் 30

(d) (b) (b)

லைக்கர். பிஸ்மத். எற். அமோனியர். லிட்

(b)

ரஸ். துளி 90

டிஞ்சர். கலம்பா.

துளி 60

ஸ்பிரிட். குளோரோபார்ம்.

துளி 30

(f)

ஆக்குவா. சேர்ந்து.

அவுன்ஸ் 3

ஒன்றுசேர்

மிக்சர்செய்

தடவல் 1 க்கு 1 அவுன்ஸ் வீதம் நாள் 1க்கு 3 தடவல், ஆகாரத்துக்கு 1 மணி நேரத்துக் குமுன் கொடுக்கவும்.

(11)

எடுத்துக்கொள்

மெக்ரீஷியா. கார்ப்	கிரான் 15
(g) (b)	
டிஞ்சர். ரீயை. கோ.	துளி 45
டிஞ்சர். ஜிஞ்சிபெரிஸ்.	துளி 45
(z) (b)	
ஆயில். அனிஸி.	துளி 2
ஸ்பிரிட். குளோரோபார்ம்.	துளி 30
(f)	
ஆக்குவா. சேர்ந்து.	அவுன்ஸ் 3
	ஒன்றுசேர்

மிக்சர்செம்

தடவல் 1 க்கு 1 அவுன்ஸ் வீதம் நாள் 1க்கு
3 தடவல் ஆகாரத்துக்குப்பின் கொடுக்கவும்.

(12)

“ஜீரணக்கருவிகள் அதிகப்பலயீன்
மாகிவிட்டால்”

(1)

எடுத்துக்கொள்

“பெப்ஸின். ஓயின்”

இதில் தடவல் 1 க்கு $\frac{1}{2}$ அவுன்ஸ் வீதம் நாள்
1 க்கு 3 தடவல் ஆகாரத்திற்கு சற்று முன்
கொடுக்கவும்.

(2)

எடுத்துக்கொள்

“பேப்டோன். ஓயின்”

இதில் தடவல் 1 க்கு $\frac{1}{2}$ அவுன்ஸ் வீதம்
நாள் 1 க்கு 3 தடவல் கொடுக்கவும்.

(3)

எடுத்துக்கொள்

“மால்டின். வித் பேப்ஸின். ஆன்ட். பான்
(d)

கிரியாட்டின்”

இதில் தடவல் 1 க்கு 1 தேக்காண்டி வீதம்
1 அவுன்ஸ் தண்ணீரில் கலந்து நாள் 1 க்கு
3 தடவல் ஆகாரத்துக்குப்பின் கொடுக்க
வும்.

(4)

எடுத்துக்கொள்

“லிக்குவிட். பெப்ட்டோனாய்ட்ஸ்”

(d)

(d)

இதில் தடவல் 1 க்கு கால் அவுன்ஸ் வீதம்
நாள் 1 க்கு 4, 5 தடவல் கொடுக்கலாம்.

(5)

எடுத்துக்கொள்

“பாஹேபெப்ட்டோன்”

இதில் தடவல் 1 க்கு கால் அவுன்ஸ் வீதம்
நாள் 1 க்கு 4 தடவல் கொடுக்கவும்.

எடுத்துக்கொள்

“லாக்ட்டோ. பெப்ட்டைன். டேபிளாய்
(b)

ட்ஸ்”

(d)

அல்லது

“லாக்ட்டோ. பெப்ட்டைன். பவுடர்”
(d)

இவைகளில் யாதேனும் ஒன்றை உபயோ
கப்படுத்தலாம்.

(13)

ஆகாரம் சாப்பிட்டவுடன்

(1) வயிற்றால் போவதற்கும்

(2) வயிற்றில் வலி இருப்பதற்கும்”

கொடுக்க:—

(1)

எடுத்துக்கொள்

* லைக்கர். ஆர்ஸெனிக்காலிஸ்	துளி 3
ஆக்குவா. சேர்ந்து	அவுன்ஸ் 3
	ஒன்றுசேர்

மிக்சர்செய்

தடவல் 1 க்கு 1 அவுன்ஸ் வீதம் நாள் 1-க்கு
3 தடவல் ஆகாரத்திற்கு முன் கொடுக்கவும்.

(2)

எடுத்துக்கொள்

லைக்கர். பிஸ்மத். எற். அமோனியா. ஸிட்
(b)

ரஸ் துளி 90

லைக்கர். மார்பைன். ஐட்ரோகுளோரைட்
(f) (h)(d) (d)

துளி 30

ஸிரப். ஆரன்டி

துளி 90

ஆக்குவா. அனிஸி. சேர்ந்து அவுன்ஸ் 3

ஒன்றுசேர்

மிக்சர்செய்

தடவல் 1 க்கு 1 அவுன்ஸ் வீதம் ஆகாரத்
திற்கு $\frac{1}{2}$ மணி நோத்திற்கு முன்பும், பிறகு
வயிற்றில் வலியுண்டாகும்போது 1 அவுன்ஸ்
மருந்தும் கொடுக்கவும்.

அன்னத்துவேஷம் அதிகமா யிருந்தால்
சாதம் கொடுப்பதை நிறுத்தி “ஆர்லிக்ஸ்.
(h)

மால்ட்டேட். மில்க்”, “பெங்கர்ஸ். பூட்”,
(d) (b) (f)(d)

“பார்லி, மாவு,” மேல்லின்ஸ். பூட்”
(b) (f)(d)

இவைகளில் யாதேனும் ஒன்றைக் கஞ்சி
காய்ச்சிக் கொடுக்கவும். வியாதி மட்டுப்
பட்டால் மட்டும், மத்தியானம் ஒருவேளை
லேசாய் ஜீரணமாகக்கூடிய ஆகாரம் கொடு
த்து மற்ற இரண்டு வேளையும் மேல் சொல்

லீய மாவு கஞ்சிகளில் யாதேனும் ஒன்றை
உபயோகிக்க வேண்டும்.

“விதை வீக்கம், வலி வேதனை”

இவைகளுக்கு:—

வியாதியின் ஆரம்பத்தில் கொதிக்கிற வெந்
நீரில் பிளானல் துணி முக்கிப் பிழிந்து
மேல் ஒத்தடம் கொடுக்கவும்.

“லின் ஸீட். போல்ட்டிஸ்” சுடச்சுடக்

(d)

கட்டலாம். நன்றாய் மலசுத்தி யாகும்படி
“எப்ஸம். ஸால்ட்” கொடுத்துப் பின்பு ஒவ்
வொருநாளும் கிரமமாய் மலம் வெளியாகும்
படி செய்ய வேண்டும்.

வலி வேதனை அதிகமாய் இருந்தால் மட்
டும் தடவல் 1 க்கு 10 துளி “டிஞ்சர் ஓப்ரீ
யம்” 1 அவுன்ஸ் தண்ணீரில் கலந்து நாள்
1 க்கு 3 தடவல் கொடுக்கவும். இப்படிக்
கொடுப்பதில் மலம் கட்டு மாகையால்
தொடர்ந்து கொடுக்கக் கூடாது.

வீக்கத்தின்மேல் தடவ:—

எடுத்துக்கொள்

* எக்ஸ்ட்ராக்ட். பெல்லடோனா. டிராம் 4

(b) (d)

இச்ச்தியால்

டிராம் 1

கிளிஸெரின்.

டிபாம் 1

(g)

ஒன்றுசேர்

“பிக்மென்றாக”ச் செய்து வலி, வீக்கமுள்ள

(g)

பாகத்தில் தடவி மேல் பஞ்சுவைத்துக் கட்டவும்.

உள்ளுக்குக் கொடுக்க:—

எடுத்துக்கொள்

பொட்டாஸ். அயோடைட்.

கிரான் 15

(d)(d)

ஸ்பிரிட். அமோனியா. அரோமேட்டிக்.

துளி 30

டிஞ்சர். ஜென்ஷன். கோ.

துளி 45

ஆக்குவா. சேர்ந்து.

அவுன்ஸ் 3

ஒன்றுசேர்

மிக்சர்செய்

தடவல் 1க்கு 1 அவுன்ஸ் வீதம் நாள் 1 க்கு 3 தடவல் கொடுக்கவும். ஆனால் இதைக் கொஞ்சகாலம் நீடித்துச் சாப்பிடவும். இந்த மிக்சர் சாப்பிடும்போது ஜலதோஷம் கொண்டால் அந்தச் சமயம் நிறுத்திக் கொள்ள வேண்டும்.

“காக்கை வலிப்பு”

இதற்கு

எடுத்துக்கொள்

பொட்டாஸ், புரோமைட்.	கிரான்	30
(b) (d)		
ஸோடியம், புரோமைட்.	கிரான்	30
(d) (b) (d)		
* லைக்கர். ஆர்ஸெனிக்காலிஸ்.	துளி	6
ஸிரப். ஆரன்டி.	துளி	90
ஆக்குவா. சேர்ந்து	அவுன்ஸ்	3
	ஒன்றுசேர்	

மிக்சர்செய்

தடவல் 1 க்கு 1 அவுன்ஸ் வீதம் நாள் 1க்கு
3 தடவல் ஆகாரத்துக்குப்பின் கொடுக்கவும்.
ஆனால் இந்த மிக்சரைக் கொஞ்சகாலம்
நீடித்துக் கொடுக்கவேண்டும்.

“காய்ச்சல்கள்”

“அற்பக் காய்ச்சலோடு, அதாவது காய்ச்சல் 102 டிகிரிவரை இருந்து அதோடு மண்டை இடியும்” இருந்தால்.

இதற்கு:—

(1)

எடுத்துக்கொள்

காலோமல்

கிரான் 4

ஸோடா. பைகார்ப்.

கிரான் 4

(d) (b)

ஒன்றுசேர்

இதை இரவில் வாயில்போட்டு உமிழ் ரீரோடு
சேர்த்து விழுங்கி விடவும். காலையில் 2, 3,
தடவல் மலம் வெளியாகிப் பித்தமும் கழி
யும். இன்னும் மலம் வெளியாக வேண்டு
மென்ற நோக்கம் இருந்தால் மட்டும்,

எடுத்துக்கொள்

எப்ஸம். ஸால்ட்.

டிராம் 4

டிஞ்சர். ஸென்னு கோ.

டிராம் 1

டிஞ்சர். ஜிஞ்சிபெரிஸ்.

துளி 30

(z) (b)

ஆக்குவா. சேர்ந்து.

அவுன்ஸ் 2

ஒன்றுசேர்

மிக்சர்செய்

இதை ஒரே தடவலாகக் கொடுக்கவும். 4, 5,
தடவல் மலம் வெளியாகிக் காய்ச்சலும்
மட்டுப்படும்.

அல்லது

எடுத்துக்கொள்

காலோமல்.

கிரான் 4

பெனாஸெட்டின்.

கிரான் 8

(f)

காபின். ஸிட்ரஸ்.

கிரான் 4

(f)

ஸோடா ஸாஸிஸிலஸ்.

கிரான் 10

(d)

ஒன்றுசேர்

இதை இரவில் ஒரே தடவலாக வாயிற்
போட்டு உமிழ்நீரோடு சேர்த்து விழுங்கி
கொஞ்சம் வெந்நீர் குடிக்கவும்.

பிறகு 3 மணி நேரம் கழித்துக் கொடுக்க:—

எடுத்துக்கொள்

பொட்டாஸ். நைட்ரஸ் கிரான் 10

பொட்டாஸ். புரோமைட். கிரான் 10

(d)

டிஞ்சர். கார்டம். கோ. துளி 15

(d)

ஸிரப். ஆரன்டி. துளி 30

ஆக்குவா. சேர்ந்து. அவுன்ஸ் 1

ஒன்றுசேர்

மிக்சர்செய்

இதை ஒரே தடவலாகக் கொடுக்கவும். மறு
நாள் காலையில் 2, 3 தடவல் மலம் வெளிப்
போய்க் காய்ச்சலும், மேல் வலியும் மட்டுப்
படும்.

பிறகு மத்தியானம் “தர்ம்மாமிட்டர்”
வைத்துப் பார்த்து, 99 டிகிரிக்குமேல்
இருந்தால் அப்பொழுது கொடுக்க:—

எடுத்துக்கொள்

“டயாபோரேட்டிக் மிக்சர்” (அதாவது)

(d) (f)

பொட்டாஸ். நைட்ரஸ். கிரான் 30

லைக்கர். அமோனியா. ஆஸிட்டேட்டிஸ்.

டிராம் 6

டிஞ்சர். அயோஸியாமஸ்	துளி 30
ஸ்பிரிட். ஈதர் டைட்ரோஸி	துளி 60
ஆக்குவா சேர்ந்து	அவுன்ஸ் 3
	ஒன்றுசேர்

மிக்சர்செய்

தடவல் 1 க்கு 1 அவுன்ஸ் வீதம் 4 மணிக் கொரு தடவல் கொடுக்கவும்.

காய்ச்சலோடு, இருமலும் இருந்தால் மேல் படி ஒவ்வொரு தடவல் மிக்சரோடும் 10 துளி “வைனம் இப்பிக்காக்” சேர்த்துக் கொள்ளவும்.

இந்த மிக்சர் 2, 3 நாள் கொடுத்தும் காய்ச்சல் இறங்காமல் மும்மாமாய் இருந்தால் “டெம்பரேச்சர்.” இறங்க:—

எடுத்துக்கொள்

பெனாஸெட்டின்	கிரான் 8
(f)	
காபின் ஸிட்ரஸ்.	கிரான் 4
(f)	

ஒன்றுசேர்

இதை ஒரே தடவலாக வாயிற்போட்டு உமிழ் ரீரோடு சேர்த்து விழுங்கிக் கொஞ்சம் வெந் ரீர் குடிக்கவும். இதை மறுபடியும் கொடுக்க வேண்டிய அவசியமிருந்தால் 8 மணி நேரம் கழிக்க வேண்டும். இதைக் கொடுத்துக் காய்ச்சல் கொஞ்சம் இறங்கினவுடன், முன்

எழுதியிருக்கிற “டயாபோரேட்டிக் மிக்சர்”

(d) (f)

கொடுத்துவந்து இடை இடையே “தாம்
மாமிட்டர்” வைத்துப் பார்த்துக்கொண்டு
காய்ச்சல் 99 டிகிரிக்கு வந்தவுடன்கொடுக்க.

எடுத்துக்கொள்

கொய்னைன், ஸல்பஸ்

கிரான் 9

(f)

ஆஸிட், நைட்ரோ. ஐட்ரோகுளோரிக். டிஸ்

(d)

(h) (d)

(d)

துளி 15

டிஞ்சர், ஜென்ஷன். கோ

துளி 45

ஆக்குவா. சேர்ந்து

அவுன்ஸ் 3

ஒன்றுசேர்

மிக்சர்செய்

தடவல் 1 க்கு 1 அவுன்ஸ் வீதம் 4 மணிக்
கொரு தடவல் கொடுக்கவும்.

காய்ச்சல் பூராவும் நின்ற பிறகு கொடுக்க:—

எடுத்துக்கொள்

டிஞ்சர், லின்கோனா. கோ

துளி 30

ஆஸிட். ஐட்ரோ குளோரிக். டிஸ் துளி 15

(d) (h)(d)

(d)

* டிஞ்சர், நக்ஸ்வாமிக்கா

துளி 15

ஆக்குவா. சேர்ந்து

அவுன்ஸ் 3

ஒன்றுசேர்

மிக்சர்செய்

தடவல் 1 க்கு 1 அவுன்ஸ் வீதம் நான்

1 க்கு 3 தடவல் ஆகாத்திற்குப் பின்

கொடுக்கவும். இதைக் காய்ச்சல்விட்டு 1
வாரம் கொடுக்கவும்.

“எவ்விதமான காய்ச்சல்களிலும்

டெம்பரேச்சர் இறங்க” :—

ஸாலால் கிரான் 30

பிஸ்மத். ஸப்நைட்ரஸ் கிரான் 12

(b) (b)

3 பொட்டணமாக மடித்துக்கொண்டு 4
மணிக்கொரு தடவல் 1 பொட்டணம் வீதம்
கொடுத்து காய்ச்சல் குடு தணிந்தபின்
நிறுத்திக் கொள்ளவும்.

காய்ச்சல் இருக்கும்போது “பார்லிமாவு”க்

(b)

கஞ்சி காய்ச்சி உப்பிட்டுக் கொடுக்கலாம்
அல்லது “ஆர்லிக்ஸ். மால்ட்டேட். மில்க்
கஞ்சி காய்ச்சிக் கொடுக்கலாம்.

தாகமெடுத்தால் உயர்ந்த “ஸோடா. வாட்
டர்” கொடுக்கலாம்.

“கப சுரம்”

இதற்கு:—

எடுத்துக்கொள்

* “லினிமேன்ட். காம்பர். கோ”

(f)

இதைக் கொஞ்சம் நெஞ்சில் தடவி, தடவும் போது (ஒரு காகித அட்டையால் முகத்தில் மறைத்துக்கொள்ளவும். இல்லாவிட்டால் அமோனியாவின் காரம் முகத்தில் அடிக்கும். பிறகு கோதுமைத் தவிடு வறுத்து 4 மணிக் கொரு தடவல் மேல்படி தைலமும் நெஞ்சில் தடவி ஒத்தடம் கொடுக்கலாம்.

குழந்தைகளுக்கு நெஞ்சில் தடவ:—

எடுத்துக்கொள்

டர்ப்பென்டைன்.

அவுன்ஸ் ½

யூக்காலிப்டஸ். ஆயில்

அவுன்ஸ் ½

ஒன்றுசேர்

இந்த இரண்டையும் ஒவ்வொரு தடவலும் சுன்றாய்க் குலுக்கிக்கொண்டு 4 மணிக் கொரு தடவல் நெஞ்சில் தடவி, கோதுமைத் தவிடு வறுத்து ஒத்தடம் கொடுக்கவும். பெரியவர்களுக்கு உள்ளுக்குக் கொடுக்க:—

(1)

எடுத்துக்கொள்

அமோனியா கார்ப்.

கிரான் 12

(b)

டிஞ்சர். ஸின்கோனா. கோ.

துளி 90

டிஞ்சர். ஸெனிகா.

துளி 45

(g)

வைனம். இப்பிக்காக்

துளி 30

ஸ்பிரிட். ஈதர். நைட்ரோஸி

துளி 60

ஆக்குவா. சேர்ந்து.

அவுன்ஸ் 3

ஒன்றுசேர்

மிக்சர்செய்

தடவல் 1 க்கு 1 அவுன்ஸ் வீதம் 4 மணிக்
கொரு தடவல் கொடுக்கவும்.

குழந்தைகளுக்கானால் மேல்படி மிக்சரில்
தடவல் 1 க்கு கால் அவுன்ஸ் வீதம் கொடுக்
கவும்.

(2)

எடுத்துக்கொள்

லைக்கர். அமோனியா.

ஆஸிட்டேட்டிஸ்.

டிபாம் 6

டிஞ்சர். கார்பர். கோ.

துளி 60

(f)

வைனம். இப்பிக்காக்.

துளி 30

ஸ்பிரிட். ஈதர். நைட்ரோஸி.

துளி 60

ஆக்குவா. சேர்ந்து.

அவுன்ஸ் 3

ஒன்றுசேர்

மிக்சர்செய்

தடவல் 1 க்கு 1 அவுன்ஸ் வீதம் 4 மணிக் கொரு தடவல் கொடுக்கவும்.

குழந்தைகளுக்கானால் தடவல் 1 க்கு கால் அவுன்ஸ் வீதம் 4 மணிக்கொரு தடவல் கொடுக்கவும்.

“ஆர்லிக்ஸ். மால்ட்டேட். மில்க்” நாள்
(b) (d)

1 க்கு 3, 4 தடவல் அப்போதைக்கப் போது கஞ்சி காய்ச்சிக் கொடுக்கவும்.

“லிக்குவிட். பெப்டோனாய்ட்ஸ்” இதில்
(d) (d)

தடவல் 1 க்கு கால் அவுன்ஸ் வீதம் நாள் 1 க்கு 4, 5 தடவல் கொடுக்கவும்.

கொடுமான வாத உபத்திரவத்தால்

உண்டாகும் சுரத்திற்கு:—

எடுத்துக்கொள்

ஸோடா. ஸாலிஸிலஸ் கிரைன் 120
(d)

டிஞ்சர். ஜென்ஷன் கோ. துளி 60

ஆக்குவா. சேர்ந்து அவுன்ஸ் 3

ஒன்றுசேர்

மிக்சர்செய்

தடவல் 1 க்கு $\frac{1}{2}$ அவுன்ஸ் வீதம் 2 மணிக் கொரு தடவல் கொடுக்கவும். இடை இடை

யே “தர்மா. மிட்டர்” வைத்துப் பார்த்துக்
கொண்டு காய்ச்சல் மும்மாம் தணிந்தவுடன்
மருந்தை நிறுத்திக் கொள்ளவும். ஒருநாள்
பூராவும் 120 கிரானுக்குமேல் “ஸோடா.
(d)

ஸாலிஸிலஸ்” கொடுக்கக் கூடாது.
இதைக் கவனித்துக்கொள்ளவும்.

(4)

“குளிர் காய்ச்சல், முறைக் காய்ச்சல்”

இவைகளுக்கு:—

எடுத்துக்கொள்

கொய்னைன். ஸல்பஸ். கிரான் 15

(f)

ஆஸிட். ஐட்ரோபுரோமிக். டில் துளி 15

(d)(h)(d) (b) (d)

ஆக்குவா. காம்பர். சேர்ந்து அவுன்ஸ் 3

(f)

ஒன்றுசேர்

மிக்சர்செய்

குளிர் வருவதற்கு முன் தடவல் 1 க்கு 1
அவுன்ஸ் வீதம் நாள் 1 க்கு 3 தடவல்
கொடுக்கவும்.

“கொய்னைன்” கொடுத்தும் குணமாகாத
நாள்பட்ட “குளிர்காய்ச்சல்,” “மலைக்காய்
ச்சல் இவைகளுக்கு:—

எடுத்துக்கொள்

* லைக்கர். ஆர்ஸெனிக்காலிஸ்

தனி 24

ஆக்குவா. சேர்ந்து.

அவுன்ஸ் 3

ஒன்றுசேர்

மிக்கர்செய்

தடவல் 1 க்கு 1 அவுன்ஸ் வீதம் நாள் 1 க்கு
3 தடவல் ஆகாரத்துக்குப்பின் கொடுக்கவும்.
குளிர் காய்ச்சல், மலைக்காய்ச்சல்களின்
கொடும் மட்டுப்பட்டபின் “லைக்கர். ஆர்
ஸெனிக்காலிஸின்” அளவைக் குறைத்துக்
கொடுக்கவும்.

“டைபாய்ட். பீவர்.” “டைபஸ். பீவர்”

(f) (d) (f)

(f) (f)

என்னும் ‘விஷ ஜந்தி. சுரங்கள்’

இந்த இரண்டிற்கும் உள்ள

வித்தியாசங்க ளாவன

“டைபாய்ட்.பீவர்”

(f) (d) (f)

(1) காய்ச்சல் ஆரம்பித்
துக் கொஞ்ச தினத்திற்குப்
பின் தலையின் முன் பாகத்
தில், அதாவது நெற்றியில்
வலியுண்டாகும்.

“சிறு குடலில்” வலியும்
ஒபாத வயிற் றோட்டமும்
இருக்கும்.

(3) காய்ச்சல் கண்டு, 7
வது நாள் முதல் 12 வது
நாளுக்குள் ரோஜாப்பூ சிற

(2) “இலியம்” என்ற

முள்ள கொஞ்சம் தடிப்பான கொப்பளங்கள் முக்கியமாய் வயிறு, நெஞ்சு, முதுகு, இவைகளில் காணும்.

(4) மேல்படி தடிப்புகளை விரலால் அழுத்தினால் மறைந்துவிடும்.

(5) மேல்படி தடிப்புகள் 28 நாள் அல்லது 30 நாள் வரையு மிருக்கும்.

(6) ஒவ்வொரு நாளும் காலை யில் இருந்த “டிகிரி” யைக் காட்டிலும் சாயந்திரத்தில் 2 “டிகிரி” அதிகமாய் ஏற மறுநாள் காலை யில் 1 டிகிரி குறைந்து கடைசியாய் 104, அல்லது, 106 “டிகிரி” யில் நிற்கும்.

“டைபஸ் பீவர்”

(f) (f)

(1) காய்ச்சலின் ஆரம்பத் திலேயே தலை நோவு உண்டாகும்

(2) வயிற் றோட்டம் இராது. ஆனால் கண்கள் அதிகமாய்ச் சிவந்திருக்கும்.

(3) காய்ச்சல் கண்டு 4 அல்லது 5 வது நாளில் மணிக்கட்டைகளின் பின்பாகத்தில் முக்கியமாய்க் கொப்பளங்கள் கண்டு கழுத்திலும் முகத்திலும் தவிர் மற்றப்

பாகங்களில் 1 முதல் 3 தினங்களுக்குள் பாவிக்கும்.

(4) மேல்படி தடிப்புகளை அழுத்தித் தேய்த்தால் சீக்கிரம் மறையாது.

(5) மேல்படி தடிப்புகள் 14 வது நாளில், அல்லது 21 வது நாளில் மறைந்து விடும்.

(6) ஏறதல், இறங்குதல் இல்லாமல் 104 முதல் 105 “டிகிரி” க்கு மேல் நிற்கும்.

“டைபாய்ட். பீவர்”

(f) (d) (f)

இதற்கு:—

நோயாளியின் படுக்கை இடத்தைச் சுத்தமாய் வைத்திருக்கவேண்டும். நோயாளி படுக்

கையிலேயே படுத்திருக்க வேண்டும். சத்
துள்ளதும், லேசாய் ஜீரணமாகக் கூடியது
மான ஆகாரங்கள் கொடுக்கவேண்டும்.

“லிக்குலிட். பெப்டோனாய்ட்ஸ்” தடவல்
1 க்கு கால் அவுன்ஸ் வீதம் நாள் 1 க்கு
5, 6, தடவல் கொடுக்கலாம்.

ஆர்லிக்ஸ். மால்ட்டெட். மில்க்“ கஞ்சி
(h) (d)

காய்ச்சிக் கொடுக்கவும்.

காய்ச்சின பசுவின்பாலில் நல்ல “சோடா
வாட்டர்” சேர்த்துக் கொடுக்கலாம்.

“எஸென்ஸ். ஆப். சிக்கென்“ உபயோகம்
(f)

படுத்தலாம்.

உள்ளுக்குக் கொடுக்க:—

எடுத்துக்கொள்

பொட்டாஸ். குளோரஸ். கிரான் 30

* ஐட்ரோகுளோரிக் ஆஸிட். துளி 60

(h)(d) (d)

கொய்னைன். ஸல்பஸ். கிரான் 30

(f)

ஸிரப். ஆரன்டி. அவுன்ஸ் 1

ஆக்குவா. சேர்ந்து. அவுன்ஸ் 12

ஒன்றுசேர்

மிக்சர்செய்

இதற்குத்தான் “குளோரின். மிக்சர்” என்று
பெயர். இதைப் பக்குவப்படுத்த வேண்டிய
விதம் முன்னமே எழுதி யிருக்கிறது.

தடவல் 1 க்கு 1 அவுன்ஸ் வீதம் நாள் 1
 க்கு 3, 4, தடவல் கொடுக்கவும்.

“வயிற்றோட்டம் அதிகமாயிருந்தால்

மட்டும் நிறுத்தக்” கொடுக்க:—

(1)

எடுத்துக்கொள்

டோவர்ஸ். பவுடர்.

கிரான் 15

(d)

(d)

3 பொட்டணமாக மடித்துக் கொண்டு 4

மணிக்கொரு தடவல் 1 பொட்டணம் கொ
 டுக்கவும்.

(2)

எடுத்துக்கொள்

ஆஸிட். ஸல்பியூரிக். டில்

துளி 15

(d)

(f)

(d)

* டிஞ்சர். ஒப்பியம்.

துளி 15

ஆக்குவா. சேர்ந்து.

அவுன்ஸ் 3

ஒன்றுசேர்

மிக்சர்செய்

தடவல் 1 க்கு 1 அவுன்ஸ் வீதம் நாள்

1 க்கு 3 தடவல் கொடுக்கவும்.

“டைபஸ். பீவருக்கு”

(f) (f)

“டைபாய்ட். பீவருக்கு” க் கொடுக்கச்

(f) (d) (f)

சொல்லியபடி ஆகாரம் கொடுக்கவும்.

ஒவ்வொரு நாளும் மலத்தை வெளியாக்கக் கூடிய மருந்தைக்கொடுத்து வெளியாக்க வேண்டும். நீரும், வேர்வையும் தாராளமாய் வெளியாகும்படிசெய்யவேண்டும். இதற்கு, தாகத்திற்குக் கொடுக்கும்பொழுதெல்லாம் ஒவ்வொரு தடவலும் 5 கிரான் “போட்டாஸ். நைட்ரஸ்” சேர்த்துக் கொடுக்கவும். தேயிலைத் தண்ணீரும், “காப்பியும்” ஏராள

(f)(f)

ளமாய்க் கொடுக்கலாம்.

உள்ளுக்குக் கொடுக்க:—

(1)

எடுத்துக்கொள்

டிஞ்சர். ஸின்கோனா. கோ. துளி 60

ஆஸ்ட். நைட்ரோ. ஐட்ரோகுளோரிக். டிஸ்

(d)

(h)(d)

(d)

துளி 30

ஆக்குவா. சேர்ந்து

அவுன்ஸ் 3

ஒன்றுசேர்

மிக்சர்செய்

தடவல் 1 க்கு 1 அவுன்ஸ் வீதம் 4 மணிக்

கொரு தடவல் கொடுக்கவும்.

எடுத்துக்கொள்

கொய்னைன், ஸல்பஸ்.

கிரான் 15

(f)

ஆஸிட். ஐட்ரோகுளோரிக். டி. துளி 30

(d)(h)(d)

(d)

ஆக்குவா சேர்ந்து

அவுன்ஸ் 3

ஒன்றுசேர்

மிக்சர் செய்

4 மணிக்கொரு தடவல் 1 அவுன்ஸ் கொடுக்கவும்.

“மேக வியாதி”

இது “ஒட்டுவாரொட்டி வியாதி”. இது மூன்று பக்குவங்களாகப் பிரிக்கப்பட்டிருக்கிறது.

முதல் நிலை:—“மேகம்” ஆரம்பித்து ஒருவாரம்வரைக்கும் “மஞ்சள் கலந்த, வெண்மையான மேகம்” வெளிப்படும். இந்தச் சமயம் செய்யவேண்டிய பக்குவம்.

முதலில் நன்றாய்ப் பேதியாகும்படி மருந்து கொடுத்துப் பிறகு ஒவ்வொரு நாளும் மல ஈத்தியாகும்படி கவனித்து வாவும்.

நீர்த் துவாரத்தின் நுனி சிவந்து, வஸ்திரத்தில் படும்போது வேதனை உண்டாகும்.

‘மேகம்’ கசிந்துகொண்டு வஸ்திரத்தில் படும்
ஆகையால் இந்தச்சமயம் “நீர்த்துவாரத்
தின் நுனியை” தண்ணீரில் முக்கிப்பிழிந்த
“போரிக்காட்டன்” கொண்டு சுற்றிப்
(b)

பொதிந்து (டி. பாண்டேஜ்)=(கோவணம்)
(i) (b) (d)

கட்டிக் கொள்ளவும். ஜலபாதைக்குப்
போகும் ஒவ்வொருதடவலும் “போரிக் காட்
(b)

டன்” மாற்றிக்கொள்ள வேண்டும். நாள் 1
க்கு பல தடவல் இப்படிச் செய்வேண்டும்.
இப்படிச் செய்வதால் நீர்த்துவாரத்தின்
வழியாய்க் கசிந்துகொண்டிருக்கிற ‘மேகம்’
வஸ்திரத்தில் படாமல் பஞ்சிலேயே பட்டு
மேல்படி பஞ்சு இழுத்துக்கொள்ளும். மேல்
படி பஞ்சில் “போரிக். ஆஸிட்” என்னும்
(b) (d)

“ஆன்டிஸெப்டிக்” மருந்து சேர்ந்திருப்ப
தால், நீர்த்துவாரத்தின் நுனிப்பாகம் சிவந்து
புண்பட்டிருப்பதையும் சாந்தப்படுத்தும்.

“மேகம் கண்டு 3 நாளைக்கு
நீர்த்தாரையில்”

“ஸிரிஞ்சு பண்ண” :—

எடுத்துக்கொள்

பொட்டாஸ். பெர்மாங்கனஸ். கிரைன். 2
இதை 4 அவுன்ஸ் டிஸ்டில்ட். வாட்டரில்
(d) (d)

கரைத்து இப்படி நாள் 1 க்கு மூன்று தடவல் நீர்த்தாரைக்குள் “ஸிரிஞ்சு” பண்ணவும்.

“பிறகு 4ம் நாள் முதல்”

ஸிரிஞ்சுபண்ண:—

எடுத்துக்கொள்

ஸிங். ஸல்பஸ்.

கிரான் 8

(z) (f)

இதை 4 அவுன்ஸ் தண்ணீரில் நன்றாய்க் கரைத்துக்கொண்டு, இப்படி நாள் 1 க்கு 3 தடவல் நீர்த்தாரைக்குள் “ஸிரிஞ்சு” பண்ணவும். “மேகம்” குணமாகும் வரை இப்படிச் செய்யவும்.

இன்னும் அநேக மருந்துகளை அளவுப்படி தண்ணீரோடு கலந்து நீர்த்தாரைக்குள் “ஸிரிஞ்சு” பண்ணலாமென்றால், விசேஷ மாய் மேல்காட்டியவைகளையே உபயோகப் படுத்தி வருவதால் மற்ற முறைகள் எழுதாது விடப்பட்டிருக்கிறது.

உள்ளுக்குக் கொடுக்க:—

எடுத்துக்கொள்

(1)

(ஸலெட்ஸ்) “லைக்கர். ஸான்டல். பிளேவா.

(h)

(f)

கம். பக்கு. எற். கியுபெப்” டிராம் 3
 (b) (b)(b)
 டிஸ்ட்டிட். வாட்டர். அவுன்ஸ் 3
 (d) (d)

மிக்சர்செய்

ஒன்றுசேர்

தடவல் 1 க்கு 1 அவுன்ஸ் வீதம் நாள் 1 க்கு
 3 தடவல் சாப்பிடவும்.

இப்படி முதல் வாரம் நாள் 1 க்கு 3 பொழு
 தும், இரண்டாவது வாரம் நாள் 1 க்கு 2
 தடவலும் மூன்றாவது வாரத்தில் நாள் 1 க்கு
 1 தடவலும் கொடுத்துவரவும்.

மேல்படி மிக்சர் சாப்பிட்டபின் தொண்டை
 யில் காகாப்பு இருந்தால் மறுபடி கொஞ்சம்
 சுத்தமான தண்ணீர் சாப்பிடவும்.

அல்லது

(2)

எடுத்துக்கொள்

“ஸாண்டல். மிடி”

(d)

இதில் 1 மணி நேரத்திற்கொரு தடவல் 1
 மாத்திரை உட்கொண்டு கொஞ்சம் தண்
 ணீர் குடிக்கவும். பிறகு ‘மேகம்’ நின்றபின்
 3 மணி நேரத்திற்கொரு தடவல் 1 மாத்
 திரை வீதம் கொடுக்கவும்.

‘மேகம்’ பட்டுக் கொண்டிருக்கும் போது.
 மிளகுவத்தல் அதிகம் சேர்க்கக்கூடாது. மத்

தியானமட்டும் காரம் அதிகமாய்ச் சேர்க்காமல் வழக்கம்போல் ஆகாரம் சாப்பிட்டு, காலை யிலும், இரவிலும், 'சவ்வரிசிக்கஞ்சி,' 'ஆரோ ரூட் கஞ்சி,' 'பார்லிமாவு' க் கஞ்சி இவை களில் யாதேனும் ஒன்றுடன் பால், சீனி சேர்த்துச் சாப்பிடலாம்.

இரண்டாவது நிலைமை:—

நீர் வெளிவரும்போது நீர்த்தாரையில் அதிக வலி இருக்கும். கட்டியான மஞ்சள் கலந்த பச்சை நிறமான "மேகம்" வெளிப்படும்.

இந்தச் சமயம் செய்ய வேண்டிய பக்கு வம்:—

ஒவ்வொரு நாளும் மலம் கிரமமாய் வெளியா கும்படி கவனித்து வரவேண்டும்.

“நீர்த்தாரைக்குள் விரிஞ்சுபண்ணை”:

எடுத்துக்கொள்

(1)

ஸிங். ஸல்பஸ்.

கிரைன் 8

(Z) (f)

ஆக்குவா,

அவுன்ஸ் 4

ஒன்றுசேர்

இதை இப்படி காலை, மாலை நீர்த்தாரைக் குள் “விரிஞ்சு” பண்ணவும்.

அல்லது

(2)

எடுத்துக்கொள்

ஆஸிட். டானிக்.

கிரான் 20

(b)

ஆக்குவா.

அவுன்ஸ் 4

ஒன்றுசேர்

இதையும் காலை, மாலை, நீர்த்தாரைக்குள்
“ஸிரிஞ்சு” பண்ணலாம்.

உள்ளுக்குக் கொடுக்க:—

எடுத்துக்கொள்

ஒலியம். கொப்பைபா.

துளி 30

(b)

ஒலியம். ஸின்னமன்.

துளி 3

கம். அக்கேஷியா. போதுமான அளவு

(g)

லைக்கர். பொட்டாஸ்.

துளி 30

டிஞ்சர். அபோஸியாமஸ்.

துளி 30

ஸ்பிரிட். ஈதர். நைட்ரோஸி.

துளி 45

ஆக்குவா. சேர்ந்து

அவுன்ஸ் 3

ஒன்றுசேர்

மிக்கர்செய்

தடவல் 1 க்கு 1 அவுன்ஸ்வீதம் நாள் 1-க்கு

3 தடவல் கொடுக்கவும்.

குறிப்பு:—இந்த “மிக்சர்” கொடுக்கும்போது முதலில்
‘மேகத்தை அதிகப் படுத்தி’ பின்பு
நிறுத்தும்.

அல்லது

(2)

எடுத்துக்கொள்

பொட்டாஸ். பைகார்ப். கிரான் 30

(b) (b)

டிஞ்சர். அயோஸியாமஸ் துளி 45

இன்பியூஷன் பக்கு. சேர்ந்து. அவுன்ஸ் 3

(f) (b)

ஒன்றுசேர்

மிக்சர்செய்

தடவல் 1 க்கு 1 அவுன்ஸ் வீதம் நாள் 1க்கு
3 தடவல் கொடுக்கவும்.

—

மூன்றாவது நிலமை:—

“மேகம்” நாள்பட்டு நீரோடு நீராய்க் கலந்து
நீர் வெளி வரும்போது வலியாவது கடும்
பாவது இல்லாமல் இருக்கும்.

இந்தச் சமயம் செய்யவேண்டிய பக்கு
வம்:—

“நீர்த்தாரைக்குள் விரிஞ்சு பண்ணை:—

எடுத்துக்கொள்

(1)

லெட். ஆஸிட்.டேட் கிரான் 20

(d)

ஸிங். ஸல்பஸ் கிரான் 8

(z) (f)

ஆக்குவா அவுன்ஸ் 4

ஒன்றுசேர்

இதை இப்படி காலே, மாலை, நீர்த்தாரைக்
குள் “ஸிரிஞ்சு” பண்ணவும்.

(2)

எடுத்துக்கொள்

பொட்டாஸ். பெர்மாங்கனஸ். கிரான் 4

ஆக்குவா. டிஸ்ட்டில் லேட்டா அவுன்ஸ் 4

(d)

ஒன்றுசேர்

“பொட்டாஸ். பெர்மாங்கனஸ்” இதை
நன்றாய்க் கரைத்துக்கொண்டு காலே, மாலை,
நீர்த்தாரைக்குள் “ஸிரிஞ்சு” பண்ணவும்.

எடுத்துக்கொள்

உள்ளுக்குக் கொடுக்க:—

எடுத்துக்கொள்

(ஈலெட்ஸ்) லைக்கர். ஸான்டல். பிளேவா

(h)

(f)

கம். பக்கு ஏற். கியூபெப். டிராம் 3

(b)

(b)(b)

டிஸ்ட்டில்ட். வாட்டர். சேர்ந்து அவுன்ஸ் 3

(d)

(d)

ஒன்றுசேர்

மிக்சர்செய்

தடவல் 1 க்கு 1 அவுன்ஸ்வீதம் நாள் 1 க்கு

3 தடவல் கொடுக்கவும்.

“முதலில் கால் பெருவிரலில் ஆரம்பித்துப்

பிறகு சிறு கணுக்களிலும் வர வர

முட்டு முதலிய பெரிய மொளி

களிலும் உண்டாகிற வாத

ரோகத்திற்கு”:

(இதற்கு இங்கிலீஷில் “கவுட்” என்ற

(g)

பெயர்)

இதற்கு

(1)

எடுத்துக்கொள்

டிஞ்சர். ஒப்சியம்,

வைனம். கால்சினி

அவுன்ஸ் ¼

அவுன்ஸ் ¼

ஒன்றுசேர்

இந்த இரண்டையும் ஒன்று சேர்த்து துணியில் தெளித்து, கொதிக்கிற தண்ணீரில் முக்கிப்பிழிந்து வலியுள்ள இடங்களில் ஒத்தடம் கொடுக்கவும்.

(2)

எடுத்துக்கொள்

* லினிமென்ட். பெல்லடோனா. அவுன்ஸ் $\frac{1}{2}$

(b)

* லினிமென்ட். அக்கோனைட். அவுன்ஸ் $\frac{1}{2}$
ஒன்றுசேர்

வலியுள்ள இடங்களில் சூடு பிறக்க மேல் தடவி வைத்திருந்து வெந்நீர் விடவும்.

—

உள்ளுக்குக்கொடுக்க:—

வியாதி ஆரம்பத்தில் நன்றாய்ப் பேதியாகக் கொடுக்க:—

எடுத்துக்கொள்

காலோமல் கிரைன் 2

பில். காலோஸிந்து. காம்ப்வுண்ட். கிரைன் 4

(d)

ஒன்றுசேர்

ஒரே மாத்திரையாக உருட்டி இரவில் கொடுத்து மறுநாள் காலைபில் கொடுக்க:—

எடுத்துக்கொள்

ஏப்ஸம். ஸால்ட் டிராம் 6

டிஞ்சர். ஸென்னா. கோ டிராம் 1

டிஞ்சர். ஜிஞ்சிபெரிஸ்

டிராம் ½

(z) (b)

ஆக்குவா. சேர்ந்து

அவுன்ஸ் ௫

ஒன்றுசேர்

மிக்சர்செய்

இதை ஒரே தடவலாகக் கொடுக்கவும், 4, 5
தடவல் நன்றாய்ப் பேதியாகும்,

அல்லது

எடுத்துக்கொள்

புளு. பில்

கிரான் 4

(b)

பில் காலோஸிந்து காம்ப்வுண்ட். கிரான் 4

(d)

ஒன்றுசேர்

2 மாத்திரைகளாகப் பிரித்துக்கொண்டு இர
வில் ஒரே தடவலாக ஒன்றின்பின் ஒன்றாய்
2 மாத்திரைகளையும் கொடுத்து மறுநாள்
காலையில் கொடுக்க:—

எடுத்துக்கொள்

எப்ஸம். ஸால்ட்

டிராம் 6

மெக்ஸீஷியா. கார்ப்

கிரான் 10

(8) (b)

வைனம். கால்சிலி

துளி 15

ஆக்குவா. மெந்தா,பிப்.சேர்ந்து அவுன்ஸ் 2

ஒன்றுசேர்

மிக்சர்செய்

இதை ஒரே தடவலாகக் கொடுக்கவும்.
மலம் வெளியாகும்.

இதற்குப் பின் உள்ளுக்குக் கொடுக்க:—

(1)

எடுத்துக்கொள்

வைனம். கால்சிலி	துளி 30
ஸோடா. ஸாலிஸிலஸ்	கிரான் 30

(d)

டிஞ்சர். ஜிஞ்சிபெரிஸ்	துளி 45
-----------------------	---------

(z) (b)

ஸ்பிரிட். குளோரோபார்ம்	துளி 30
------------------------	---------

(f)

ஆக்குவா. சேர்ந்து	அவுன்ஸ் 3
	ஒன்றுசேர்

மிக்சர் செய்

தடவல் 1 க்கு 1 அவுன்ஸ் வீதம் 4 மணிக்
கொரு தடவல் கொடுக்கவும்.

(2)

எடுத்துக்கொள்

பொட்டாஸ். பை. கார்ப்	கிரான் 30
(b) (b)	

வைனம். கால்சிலி.	துளி 30
------------------	---------

ஆக்குவா. சேர்ந்து.	அவுன்ஸ் 3
	ஒன்றுசேர்

மிக்சர்செய்

தடவல் 1 க்கு 1 அவுன்ஸ் வீதம் 4 மணிக்
கொரு தடவல் கொடுக்கவும்.

(3)

எடுத்துக்கொள்

பொட்டாஸ். அயோடைட். கிரான் 12

(d)(d)

வைனம். கால்சினி. துளி 30

டிஞ்சர். அயோஸியாமஸ். துளி 30

ஆக்குவா. சேர்ந்து. அவுன்ஸ் 3

ஒன்றுசேர்

மிக்சர்செய்

அல்லது

எடுத்துக்கொள்

லிதியை. கார்ப். கிரான் 15

(b)

ஆக்குவா. அனிஸி. சேர்ந்து அவுன்ஸ் 3

ஒன்றுசேர்

மிக்சர்செய்

தடவல் 1 க்கு 1 அவுன்ஸ் வீதம் நாள் 1க்கு

3 தடவல் கொடுக்கவும்,

“வாதம்”

(1)

“மும்மாமான வாதரோகத்தில் உண்டாகிற
காய்ச்சலை நிறுத்த”:-

எடுத்துக்கொள்

ஸோடா. ஸாலிஸிலஸ் கிரான் 80

(d)

டிஞ்சர். ஜென்ஷன். கோ

துளி 60

ஆக்குவா. சேர்ந்து

அவுன்ஸ் 2

ஒன்றுசேர்

மிக்சர்செய்

2 மணிக்கொரு தடவல் அரை அவுன்ஸ்
ஈதம் கொடுக்கவும்.

(2)

“வாதவலியை நிறுத்த”:

வெளிக்குப் பூசு;—

எடுத்துக்கொள்

லிட்டில்ஸ். ஓரியென்டல். பாம்”

(b)

இதில் கொஞ்சம் எடுத்து வலியுள்ள
இடங்களில் பூசி பிறகு நன்றாய் குடிண்டா
கும்படி அழுத்தித்தேய்க்கவும். இப்படி நாள்
1 க்கு 2, 3, தடவல் தேய்க்கவும். தேய்த்த
வர்கள் கைகளை நன்றாய்ச் சுத்தம் செய்து
விட வேண்டும்.

(3)

எடுத்துக்கொள்

* வினிமென்ட். பெல்லடோனா. அவுன்ஸ் $\frac{1}{2}$

(b) (d)

* வினிமென்ட். ஓப்பியம். அவுன்ஸ் $\frac{1}{2}$

* வினிமென்ட். அக்கோனைட். அவுன்ஸ் $\frac{1}{2}$

ஒன்றுசேர்

ஒவ்வொரு தடவலும் நன்றாய்க் குலுக்கிக்
கொண்டு நாள் 1 க்கு 3, 4, தடவல் வளி
யுள்ள இடங்களில் குடுண்டாகும்படி அழுத்
தித்தேய்த்து வைத்திருந்து, சுடச்சுட வெந்
நீர் விடவும்.

மேல்படி தைலம் மூன்றும் விஷமானவைக்
ளாகையால் தைலம் தேய்த்தவர்கள்
கைகளே “ஸோப்பு” கொண்டு நன்றாய்ச்
சுத்தம் செய்துவிட வேண்டும்.

“வாதத்திற்கு உள்ளாகுக்கொடுக்க:—

(1)

எடுத்துக்கொள்

ஆஸ்பைரின்

கிரான் 30

ஆக்குவா. சேர்ந்து

அவுன்ஸ் 3

ஒன்றுசேர்

மிக்சர்செய்

தடவல் 1 க்கு 1 அவுன்ஸ் வீதம் நாள்
1 க்கு 3 தடவல் கொடுக்கவும்.

(2)

எடுத்துக்கொள்

பொட்டாஸ். அயோடைட்

கிரான் 15

(d)(d)

டிஞ்சர். ஜென்ஷன் கோ

துளி 60

ஸ்பிரிட். அமோனியா அரோமேட்டிக்

துளி 30

ஆக்குவா. சேர்ந்து

அவுன்ஸ் 3

ஒன்றுசேர்

மிக்சர்செய்

தடவல் 1 க்கு 1 அவுன்ஸ் வீதம் நாள் 1 க்கு
3 தடவல் ஆகாரத்துக்குப்பின் கொடுக்கவும்.

(3)

எடுத்துக்கொள்

ஸோடா. ஸாலிஸில்ஸ்

கிரான் 30

(d)

டிஞ்சர். ஸின்கோனா. கோ

தனி 45

ஸ்பிரிட். அமோனியா. அரோமேட்டிக்

தனி 30

ஆக்குவா. குளோரோபார்ம். சேர்ந்து

(f)

அவுன்ஸ் 3

ஒன்றுசேர்

மிக்சர்செய்

தடவல் 1 க்கு 1 அவுன்ஸ் வீதம் நாள் 1 க்கு
3 தடவல் ஆகாரத்திற்குப் பின் கொடுக்க
வும்.

(4)

எடுத்துக்கொள்

பர்காய்ன்ஸ். அயோடைஸ்ட். ஸார்ஸபா

(b) (g)

(d) (d)

ரில்லா

இதில் தடவல் 1 க்கு 1 தேக்காண்டி அளவு
1 அவுன்ஸ் தண்ணீரில் கலந்து நாள் 1 க்கு
3 தடவல் கொடுக்கவும்.

(5)

எடுத்துக்கொள்

“ஸிரப். டிரைபோலியம். காம்பவுண்ட்”

(f)

(d)

இதில் தடவல் 1 க்கு 1 தேக்காண்டி அளவு
 $\frac{1}{2}$ அவுன்ஸ் தண்ணீரில் சேர்த்து நாள்
1 க்கு 3 தடவல் கொடுக்கவும்.

“இடுப்பு வலி”

மேல் தடவ:—

(1)

எடுத்துக்கொள்

* லினிமென்ட். பெல்லடோனா. அவுன்ஸ் 1

(b)

(d)

* லினிமென்ட் காம்பர். கோ. அவுன்ஸ் 1

(f)

ஒன்றுசேர்

ஒவ்வொரு தடவலும் நன்றாய்க் குறுக்கிக்
கொண்டு வலியுள்ள இடத்தில் நாள் 1 க்கு
3 தடவல் நன்றாய் சூடுண்டாகும்படி தேய்
த்து வைத்திருந்து வெந்நீர் விடவும்.

(2)

எடுத்துக்கொள்

- * லீனிமென்ட். ஒப்பியம் அவுன்ஸ் 1
 * லீனிமென்ட். அக்கோனைட் அவுன்ஸ் 1
 ஒன்றுசேர்

ஒவ்வொரு தடவலும் குலுக்கிக்கொண்டு வலியுள்ள இடத்தில் நாள் 1 க்கு 3 தடவல் சூடுபிறக்கத் தேய்த்து வைத்திருந்து வெந் நீர் விடவும்.

தைலம் தேய்த்தவர்கள் கைகளை நன்றாய்ச் சுத்தம் செய்யவேண்டும்.

(3)

எடுத்துக்கொள்

- (1) “லிட்டில்ஸ். ஒரியென்டல் பாம்”

(b)

- (2) “க்ஷாம்பர்லெய்ன்ஸ். பெய்ன். பாம்”

(b)

இவைகளில் யாதேனும் ஒன்றையும் வலியுள்ள இடத்தில் தேய்க்கலாம்.

—

வியாதி ஆரம்பத்தில் உள்ளருக்குக் கொடுக்க:—

(1)

எடுத்துக்கொள்

பொட்டாஸ். அபோடைட் கிரான் 15

(d)(d)

பொட்டாஸ். பைகார்ப் கிரான் 30

(b) (b)

டிஞ்சர். ஜென்ஷன். கோ துளி 45

ஸ்பிரிட். அமோனியா. அரோமேட்டிக்

துளி 30

ஆக்குவா. சேர்ந்து

அவுன்ஸ் 3

ஒன்றுசேர்

மிக்சர்செய்

தடவல் 1 க்கு 1 அவுன்ஸ் வீதம் நாள் 1க்கு
3 தடவல் கொடுக்கவும்.

(2)

எடுத்துக்கொள்

பொட்டாஸ். அயோடைட் கிரான் 15

(d)(d)

வைனம். கால்சினி துளி 30

டிஞ்சர். ஸின்கோனா. கோ துளி 45

ஸ்பிரிட். அமோனியா. அரோமேட்டிக்

துளி 30

ஆக்குவா. குளோரோபார்ப் சேர்ந்து

(f)

அவுன்ஸ் 3

ஒன்றுசேர்

மிக்சர்செய்

தடவல் 1 க்கு 1 அவுன்ஸ் வீதம் நாள் 1க்கு
3 தடவல் கொடுக்கவும்.

“மண்டை இடி”

இதற்கு

வெளிப்பிரயோகமாக வலியுள்ள இடத்தில்
தேயக்க:—

எடுத்துக்கொள்

- (1) “யூக்காலிப்ட்டஸ் ஆயில்”
- (2) “டர்ப்பென்டைன்”
- (3) “ஆயில். கஜபுட்”
- (4) “ஸின்னமன். ஆயில்”
- (5) “ஒலியம். கரிபோபில்லி”

(f)

(அல்லது கிராம்புத்தைலம்)

- (6) “பெப்பர்மின்ட். ஆயில்”
- (7) “மெந்தால்”
- (8) பெப்பர்மின்ட். கிரிஸ்ட்டல்
அல்லது “புகையிலைச்சத்து”
- (9) “சாம்பக்”

(z) (b)

- (10) “லிட்டில்ஸ். ஒரியென்டெல். பாம்ப”
(b)

- (11) “ஹென்றிஸ்.தைலம்”

இவைகளில் யாதேனும் ஒன்றை வலியுள்ள இடத்தில் தேயக்கலாம்.

உள்ளுக்குக் கொடுக்க

(1)

எடுத்துக்கொள்

பெனாஸெட்டின்.	கிரைன் 8
(f)	
காபீன். ஸிட்ரஸ்.	கிரைன் 4
(b)	
ஸோடா. பைகார்ப்.	கிரைன் 4
(d) (b) (b)	

ஒன்றுசேர்

இதை ஒரேதடவலாக வாயிற்போட்டு
கொஞ்சம் வெந்நீர் குடிக்கவும். 1 மணிநே
ரம் கழித்து சுடச்சுட காப்பி சாப்பிடவும்.

(2)

எடுத்துக்கொள்

“ஸ்டெர்ன்ஸ். ஹெட். ஏக். கியூர்”

இதில் 1 வில்லையை 1 அவுன்ஸ் தண்ணீரில்
2 நிமிஷம் ஊறவைத்து மெதுவானவுடன்
விழுங்கி அந்த 1 அவுன்ஸ் தண்ணீரையும்
குடித்துவிடவும். இதிலிருந்து ஆராமணி
நேரம் வரையும் மண்டை இடி நிற்கவில்லை
யானால் மட்டும் இன்னும் ஒருவில்லையை
மேல் செல்லியபடி உபயோகப்படுத்தவும்.

“இருதய வியாதி”

இதற்கு

எடுத்துக்கொள்

* டிஞ்சர். டிஜிடாலிஸ். துளி 15

(d)

லைக்கர். பெர்ரை. பெர்க்குளோரைட்.

(f)

(d)

துளி 15

ஆஸிட் பாஸ்பாரிக். டி.ல்.

துளி 15

(d)(?) (f) (d)

லிரப். ஸிம்பிள்.

டிராம் 3

இன்பியூஷன். குவாஷியா. சேர்ந்து.

(f)

அவுன்ஸ் 1½

ஒன்றுசேர்

மிக்சர்செய்

தடவல் 1 க்கு ½ அவுன்ஸ் வீதம் நாள் 1 க்கு
3 தடவல் ஆகாரத்திற்குப்பின் கொடுக்கவும்.
இப்படி இந்த மிக்சரை இரண்டுமாதம்
கொடுக்கவும். ஆனால் இடை இடையே
இருதயத்தைச் சோதித்துக் கொண்டு மரு
ந்து கொடுக்கவும். பிறகு கொடுக்க:—

எடுத்துக்கொள்

ஸஸ்ட்டன்ஸ். லிரப்.

துளி 60

டிஞ்சர் ஸ்ட்ரோபாந்தஸ்

துளி 15

(f)

ஆக்குவா. சேர்ந்து

அவுன்ஸ் 3

ஒன்றுசேர்

மிக்சர்செய்

தடவல் 1க்கு 1 அவுன்ஸ் வீதம் நாள் 1 க்கு
3 தடவல் ஆகாரத்திற்குப்பின் கொடுக்கவும்.
இப்படி இந்த மிக்சரை ஒருமாசம்கொடுத்து
நிறுத்திக்கொள்ளவும்.

“விக்கல்”

இதற்கு:—

(1)

எடுத்துக்கொள்

ஸல்பியூரிக். ஈதர்

துளி 10

(f)

சீனி.

கொஞ்சம்

ஒன்றுசேர்

ஒரே தடவலாக வாயிற்போட்டு, உள்ளுக்கு
இறக்கி 4 அவுன்ஸ் தண்ணீரை ஒவ்வொரு
தடவலும் 1 அவுன்ஸ் தண்ணீர் வாயில்
ஊற்றிக் கடக்குக்கடக்கென்று குடிக்கவும்.

(2)

எடுத்துக்கொள்

பொட்டாஸ். புரோமைட்.

கிரான் 15

(b) (d)

குளோரல். ஐட்ரஸ்

கிரான் 15

(h)(d)

பொட்டாஸ். பைகார்ப்

கிரான் 15

(b) (b)

ஆயில். பெப்பர்மிண்ட். துளி 2
ஸ்பிரிட். குளோரோபார்ம். துளி 30

(f)

ஆக்குவா. சேர்ந்து. அவுன்ஸ் 3

ஒன்றுசேர்

மிக்சர்செய்

தடவல் 1 க்கு 1 அவுன்ஸ் வீதம் 3 மணிக்
கொரு தடவல் கொடுக்கவும்.

‘சூதக ஜந்தி’

“சூதக ஜந்தி”போல் பெண்களுக்கு “காக்கை
வலிப்பு”ம் வரும். ஆகையால் இந்த இடத்
தில் “சூதகஜந்தி” க்கும். காக்கை வலிப்
பு”க்கும் உள்ள வித்தியாசங்களைக் கொஞ்
சம் காட்டவேண்டும்.

“சூதக ஜந்தி”

“காக்கை வலிப்பு”

(1) கொஞ்சம் ஸ்மாணை
இருக்கும்.

(1) பூராவும் ஸ்மாணை இராது

(2) கண் இமைகள் துடிக்கும்

(2) கண் இமைகள் துடிக்காது.

(3) வாயில் துரை தள்ளாது.

(2) வாயில் துரை தள்ளும்.

“அமோனியா. கார்ப்” முக்கில் பிடித்து

(b)

முகாவைக்கலாம்.

உள்ளுக்குக் கொடுக்க:—

எடுத்துக்கொள்

டிஞ்சர். வெலிரியன். அமோநியேட்டா

டிராம் 1½

ஆக்குவா. குளோரோபார்ம். சேர்ந்து.

(f)

அவுன்ஸ் 3

ஒன்றுசேர்

மிக்சர்செய்

தடவல் 1 க்கு 1 அவுன்ஸ் வீதம் நாள் 1 க்கு
3 தடவல் கொடுக்கவும்.

(2)

எடுத்துக்கொள்

* டிஞ்சர். ஒப்பியம். துளி 15

டிஞ்சர். அஸ்பீட்டிடா. துளி 90

(f) (d)

ஆபில். பெப்பர்மின்ட் துளி 2

ஸ்பிரிட். குளோரோபார்ம். துளி 30

(f)

ஆக்குவா. சேர்ந்து. அவுன்ஸ் 2

ஒன்றுசேர்

மிக்சர்செய்

தடவல் 1 க்கு 1 அவுன்ஸ் வீதம் 4 மணிக்
கொரு தடவல் கொடுக்கவும்.

(3)

எடுத்துக்கொள்

ஸிங். வெலிரியன்.

கிரைன் 6

(z)

பில். ஆலோஸ். எற். மர்.

கிரைன் 30

எக்ஸ்ட்ராக்ட். அயோஸியாமஸ்

கிரைன் 6

பெர்ரை. ஸல்பஸ்.

கிரைன் 12

(f)

(f)

ஒன்றுசேர்

12 மாத்திரைகளாகப் பிரித்துக்கொண்டு
நாள் 1 க்கு 3 மாத்திரைகள் ஆகாரத்திற்குப்
பின் கொடுக்கவும்.

“தூக்கமின்மை”

தூக்கம் உண்டுபண்ண:—

(1)

எடுத்துக்கொள்

* டிஞ்சர். ஒப்பியம்.

துளி 20

ஆக்குவா. சேர்ந்து.

அவுன்ஸ் 1

ஒன்றுசேர்

மிக்சர்செய்

ஒரே தடவலாக இரவில் படுக்கைக்குப் போ
கும்போது கொடுக்கவும்.

(2)

எடுத்துக்கொள்

பொட்டாஸ். புரோமைட். கிரான் 45

(b) (d)

* டிஞ்சர். ஒப்பியம். துளி 30

ஆக்குவா. சேர்ந்து. அவுன்ஸ் 3

ஒன்றுசேர்

மிக்சர்செய்

தடவல் 1 க்கு 1 அவுன்ஸ் வீதம் நாள் 1 க்கு
3 தடவல் கொடுக்கவும்.

இருதய வியாதி இல்லாதவர்களுக்கு

(3)

எடுத்துக்கொள்

குளோல். ஐட்ரஸ். கிரான் 20

(h)(d)

பொட்டாஸ். புரோமைட். கிரான் 20

(b) (d)

ஸிரப். ஆன்டி துளி 30

ஆக்குவா. சேர்ந்து. அவுன்ஸ் 1

ஒன்றுசேர்

மிக்சர்செய்

இதை ஒரேதடவலாக இரவில் படுக்கைக்
குப் போகும்போது கொடுக்கவும்.

(4)

எடுத்துக்கொள்

பொட்டாஸ் புரோமைட். கிரான் 20

(b) (d)

டிஞ்சர். அயோஸியாமஸ்.	துளி 30
ஸிரப் ஆண்டி.	துளி 30
ஆக்குவா. சேர்ந்து	அவுன்ஸ் 1
	ஒன்றுசேர்

மிக்சர்செய்

இதை ஒரேதடவலாக இரவில் படுக்கைக் குப் போகும்போது கொடுக்கவும்.

(5)

எடுத்துக்கொள்

பொட்டாஸ். புரோமைட்.	கிரான் 20
(b) (d)	
* லைக்கா. மார்பைன். ஐட்ரோகுளோமைட்.	
(f) (h)(d)	(d)
	துளி 40
ஸ்டிரிட். குளோரோபார்ம்	துளி 10
(f)	
ஆக்குவா. சேர்ந்து.	அவுன்ஸ் 1
	ஒன்றுசேர்

மிக்சர்செய்

இதை ஒரேதடவலாக இரவில் படுக்கைக் குப் போகும்போது கொடுக்கவும்.

(6)

எடுத்துக்கொள்

“புரோமிடியா” என்ற மருந்தையும் இதன்
(b) (d)
அளவுப்படி உபயோகப்படுத்தலாம்.

(7)

எடுத்துக்கொள்

ஸல்போனல்.

கிரான் 30

(f)

இதை இரவில் படுக்கைக்குப் போவதற்கு
3 மணி நேரத்திற்கு முன் கொடுக்கவும்.

(8)

எடுத்துக்கொள்

பரால்டி. ஐடம்.

துளி 90

(d) (h)(d)

ஸிரப். ஸிம்பிள்.

டிராம் 1

ஆக்குவா. மெந்தா. பிப். சேர்ந்து.

அவுன்ஸ் 1

ஒன்றுசேர்

மிக்சர்செய்

இதை ஒரேதடவலாகப் படுக்கைக்குப் போ
கும்போது கொடுக்கவும்.

குறிப்பு:—ஏழாவது, எட்டாவது மிக்சர்கள் இரண்டையும்
இருதய விபாதி உள்ளவர்களுக்கும் கொடுக்
கலாம்.

“பெண்களுக்குண்டாகிற வெள்ளைப்
பிரமேகம்”

(1)

இதற்கு:—

வெளிப்பிரயோகத்திற்கு.

எடுத்துக்கொள்

* டிஞ்சர். ஒப்பியம். துளி 30
லைக்கர் பிள்ம்பை. ஸப் ஆஸிட்டேட்டிஸ்.

(b) (b)

போர்ட்டிஸ். துளி 30

(f)

ஆக்குவா.

அவுன்ஸ் 10

ஒன்றுசேர்

இதைக் குறிக்குள் “ஸிரிஞ்சு” பண்ணவும்.

(2)

எடுத்துக்கொள்

டிஞ்சர். ஆமாமெலிஸ்.

அவுன்ஸ் 1

(h)

ஆக்குவா.

அவுன்ஸ் 10

ஒன்றுசேர்

இதைக் குறிக்குள் “ஸிரிஞ்சு” பண்ணவும்.

(3)

எடுத்துக்கொள்

ஆஸிட். போரிக்.

கிரான் 100

(d) (b)

ஆக்குவா.

அவுன்ஸ் 10

ஒன்றுசேர்

“லோஷன” கச் செய்துகொண்டு “ஸிரிஞ்சு”
பண்ணவும்.

உள்ளுக்குக் கொடுக்க:—

எடுத்துக்கொள்

(9)

எக்ஸ்ட்ராக்ட்டம். ஆமாமெலிடிஸ். லிக்கு

(h) (d)

விடம். துளி 15

(d)

ஆக்குவா. சேர்ந்து.

அவுன்ஸ் 3

ஒன்றுசேர்

மிக்சர்செய்

இதில் தடவல் 1 க்கு 1 அவுன்ஸ் வீதம்

நாள் 1 க்கு 3 தடவல் கொடுக்கவும்.

(2)

எடுத்துக்கொள்

“அலெட்ரிஸ். கார்டியல்”

(d)

இதில் தடவல் 1 க்கு 1 டிராம் $\frac{1}{2}$ அவுன்ஸ்
வெந்நீரில் கலந்து நாள் 1 க்கு 3 தடவல்
கொடுக்கவும்.

“சூதகப்பெருக்கு” = (பெரும்பாடு) சூதகம்
அதிக அளவில் படுகிறதை நிறுத்த:—

(1)

எடுத்துக்கொள்

எகஸ்ட்ராக்ட்டம் ஆமாமெலிடிஸ். லிக்கு
(h) (d)
விடம். துளி 15
(d)

* டிஞ்சர். டிஜிடாலிஸ். துளி 15
(d)
ஆக்குவா. சேர்ந்து. அவுன்ஸ் 3
ஒன்றுசேர்

மிக்சர்செய்

தடவல் 1 க்கு 1 அவுன்ஸ் வீதம் நாள்
1 க்கு 3 தடவல் கொடுக்கவும்.

(2)

எடுத்துக்கொள்

* எகஸ்ட்ராக்ட். எர்காட். லிக்குவிட்.
(g) (d) துளி 10
டிஞ்சர் பெர்ரை. பெர்க்குளோரைட்.
(f) (d) துளி 15
ஆஸிட். பாஸ்பாரிக். டில். துளி 15
(d) (f) (f) (d)
ஸ்பிரிட். குளோரோபார்ம். துளி 30
(f)
ஆக்குவா. சேர்ந்து. அவுன்ஸ் 3
ஒன்றுசேர்

மிக்சர்செய்

தடவல் 1 க்கு 1 அவுன்ஸ் வீதம் நாள் 1-க்கு
3 தடவல் கொடுக்கவும்.

(3)

எடுத்துக்கொள்

காலிக். ஆஸிட்.

கிரான் 15

(g)

(d)

* எக்ச்ட்ராக்ட். எர்காட். லிக்குவிட்.

(g)

(d)

துளி 60

பொட்டாஸ். புரோமைட்.

கிரான் 45

(b)

(d)

ஆக்குவா. குளோரோபாரம் சேர்ந்து

(f)

அவுன்ஸ் 3.

ஒன்றுசேர்

மிக்சர்செய்

தடவல் 1 க்கு 1 அவுன்ஸ் வீதம் நாள்
1 க்கு 3 தடவல் கொடுக்கவும்.

(4)

எடுத்துக்கொள்

“அலெட்ரிஸ். கார்டியல்”

(d)

இதில் தடவல் 1 க்கு 1 டிராம், $\frac{1}{2}$ அவுன்ஸ்
வெந்ரீரில் கலந்து நாள் 1 க்கு 3 தடவல்
கொடுக்கவும்.

“ஒருத்தலை இடி” = (வலி) வலியுள்ள
இடத்தில் மேல் தேய்க்க:—

(1)

எடுத்துக்கொள்

* குளோரல் ஐட்ரஸ். கிரான் 10
(h)(d)

காம்பர். கிரான் 5

(f)

* ஒப்பியம். கிரான் 1
ஒன்றுசேர்

பசையாகக் கத்தியால் “ஸிலாப்” பில் தேய்
த்து வலியுள்ள இடத்தில் தேய்க்கவும்.

(2)

எடுத்துக்கொள்

“லிட்டில்ஸ். ஓரியென்டல். பாம்”

(b)

இதில் கொஞ்சம் எடுத்து இடியுள்ள இடத்
தில் தேய்க்கவும்.

உள்ளுக்குக்கொடுக்க:—

(1)

எடுத்துக்கொள்

பெனாஸெட்டின். கிரான் 10

(f)

கார்பின். ஸிட்ரஸ். கிரான் 3

(f)

ஸோடா. பைகார்ப். கிரான் 3

(d) (b) (b)

ஒன்றுசேர்

இதை ஒரேதடவலாக வாயிற் போட்டு

1 அவுன்ஸ் வெந்ரீர் குடிக்கவும்.

(2)

எடுத்துக்கொள்

பொட்டாஸ். புரோமைட். கிரான் 30

(b) (d)

டிஞ்சர். அயோஸியாமஸ். துளி 30

ஸிரப் ஆரண்டி. துளி 30

ஆக்குவா. சேர்ந்து. அவுன்ஸ் 1

ஒன்றுசேர்

மிக்சர்செய்

இதை ஒரே தடவலாகக் கொடுக்கவும்.

(3)

எடுத்துக்கொள்

பியூட்டல். குளோரல். ஐட்ரல். கிரான் 12

(b) (h)(d)

எக்ஸ்ட்ராக்ட். கனூபிஸ். இன்டிக்கா.

(b) (d)

கிரான் 1

மியூஸிலேஜ். அக்கேஷியா. போதுமான

அளவு

ஒன்றுசேர்

3 மாத்திரைகளாகப் பிரித்துக்கொண்டு தட

வல் 1 க்கு 1 மாத்திரை வீதம் நாள் 1 க்கு

3 மாத்திரைகள் ஆகாரத்திற்குப் பின் கொடுக்கவும்.

“காதில் சீழ்வடிதலுக்கு”

காதுக்குள் “ஸிரிஞ்சு” செய்ய:—

எடுத்துக்கொள்

ஆஸிட். போரிக், கிரான் 60

(b)

இளஞ்சூடான தண்ணீர். அவுன்ஸ் 6

ஒன்றுசேர்

“லோஷன” கச் செய்து காதுக்குள் “ஸிரிஞ்சு” செய்து நன்றாய்ச் சுத்தம் செய்து விட்டு, காதுக்குள் 20 துளி “கிளிஸெரின்.

(g)

ஆஸிட். போரிக்” விட்டுப் பஞ்சுவைத்து

(d) (b)

அடைத்து வைக்கவும்.

இப்படி மாறி மாறிக் குணமாகும்வரை செய்து வரவும்.

குழந்தைகளுக்கு உள்ளுக்குக் கொடுக்க:—

எடுத்துக்கொள்

ஸ்குயர்ஸ். கெமிக்கல். பூட். அல்லது = (பெ

(f)(d)

(f)

ரோக்கால்)

துளி 60

ஸிரப். பெர்ரை.

அயோடைட் துளி 40

(f)

(d)(d)

ஆக்குவா. சேர்ந்து.

அவுன்ஸ் 1

ஒன்றுசேர்

மிக்கர்செய்

தடவல் 1 க்கு 1 அவுன்ஸ் வீதம் நாள் 1 க்கு
4 தடவல் கொடுக்கவும்.

“கூயரோகம்”=(காசம்)

இந்த வியாதியில் பலவிதமான துர்க்குணங்
கள் உண்டாகும்.

அவைகளாவன.—

(1)“காய்ச்சலும், உடம்பில் அதிகச்
சூடும் உண்டாகும்”

இதற்குக் கொடுக்க:—

எடுத்துக்கொள்

கொய்னைன். ஸல்பன்.

கிரான் 24

(f)

ஆஸிட். ஸல்பியூரிக். டில்,

துளி 30

(d) (f) (d)

* டிஞ்சர். டிஜிடாஸிஸ்.

துளி 15

(d)

ஆக்குவா. சேர்ந்து

அவுன்ஸ் 3

ஒன்றுசேர்

மிக்கர்செய்

தடவல் 1 க்கு 1 அவுன்ஸ் வீதம் நாள் 1 க்கு
3 தடவல் கொடுக்கவும்.

(2) “இரவில் வேர்வை உண்டாகும்”

இதற்குக் கொடுக்க:—

(1)

எடுத்துக்கொள்

ஸிங். ஆக்ஸைட்.

கிரான் 36

(z) (d)

* எக்ஸ்ட்ராக்ட். பெல்லடோனா விரிடி.

(b) (d) (d)

கிரான் 6

எக்ஸ்ட்ராக்ட். ஜென்ஷன்.

கிரான் 18

ஒன்றுசேர்

12 மாத்திரைகளாகப் பிரித்துக்கொண்டு ஒவ்வொருநாள் இரவில் 1 மாத்திரை கொடுத்து வாவும்.

அல்லது

(2)

எடுத்துக்கொள்

காலிக். ஆஸிட்.

கிரான் 42

(g) (d)

* எக்ஸ்ட்ராக்ட். கரோபிஸ். இன்டிக்கா

(b) (d)

கிரான் 3

எக்ஸ்ட்ராக்ட். ஜென்ஷன்.

கிரான் 15

ஒன்றுசேர்

12 மாத்திரைகளாகப் பிரித்துக்கொண்டு ஒவ்வொரு நாள் இரவிலும் 1 மாத்திரை கொடுத்து வாவும்.

அல்லது

(3)

எடுத்துக்கொள்

* டிஞ்சர். பெல்லடோனா.

துளி 5

(b) (d)

ஆக்குவா. சேர்ந்து,

அவுன்ஸ் 1

ஒன்றுசேர்

மிக்சர்செய்

இதை ஒரேதடவலாக இரவில் கொடுக்கவும்.

அல்லது

(4)

எடுத்துக்கொள்

கொய்னைன். ஸல்பஸ்.

கிரான் 12

(f)

ஆஸிட். ஸல்பியூரிக். டில்

துளி 45

(d) (f) (d)

ஆலம்.

கிரான் 15

ஆக்குவா. சேர்ந்து

அவுன்ஸ் 3

ஒன்றுசேர்

மிக்சர்செய்

தடவல் 1 க்கு 1 அவுன்ஸ் வீதம் நாள் 1 க்கு
3 தடவல் கொடுக்கவும். இப்படி 1 வாரம்
தொடர்ந்து கொடுத்துப் பின் நிறுத்திக்
கொள்ளவும்.

(3) “நெஞ்சில்—உலி உண்டாகும்”

இதற்கு:—

நெஞ்சில் “டர்ப்பென்டைன்” தடவி
கொதிக்கிற தண்ணீரில் “பிளானல்” துணி
(f)

முக்கி நன்றாய்ப்பிழிந்து விட்டு, மேல் ஒத்த
டம் கொடுக்கவும்.

(4) தொண்டைப் புகைச்சல்
உண்டாகும்.

இதற்குக்கொடுக்க:—

(1)

எடுத்துக்கொள்

“கிரிமால்ட்ஸ். ஸிரப்”

(g)

இதில் தடவல் 1 க்கு $\frac{1}{2}$ அவுன்ஸ் வீதம்
நாள் 1 க்கு 2 தடவல் காலை. மாலை கொடுக்
கவும். அவசரமானால் இரவில் 1 தடவல்
 $\frac{1}{2}$ அவுன்ஸ் கொடுக்கவும்.

அல்லது

(2)

எடுத்துக்கொள்

அமோனியர். புரோமைட்.

கிரான் 15

(b) (d)

வைனம். இப்பிக்காக்.

துளி 30

டிஞ்சர். காம்பர். கோ.

துளி 60

(f)

* டிஞ்சர். பெல்லடோனா.

துளி 15

(b) (d)

ஆக்குவா. சேர்ந்து,

அவுன்ஸ் 3

ஒன்றுசேர்

மிக்சர்செய்

தடவல் 1க்கு 1 அவுன்ஸ் வீதம் நாள் 1 க்கு
3 தடவல் கொடுக்கவும்.

அல்லது

(3)

எடுத்துக்கொள்

‘ஹேமட்டிக். ஹைப்போ பாஸ்பைட்’.

(f) (f)

இதில் தடவல் 1 க்கு 1 தேக்கரண்டி 1
அவுன்ஸ் தண்ணீரில் சேர்த்து நாள் 1 க்கு
3 தடவல் கொடுக்கவும்.

அல்லது

(4)

எடுத்துக்கொள்

* டிஞ்சர். ஜெல்லெமி.

துளி 15

ஸ்பிரிட். குளோரோபார்ம்.

துளி 30

(f)

ஆக்குவா. சேர்ந்து.

அவுன்ஸ் 3

ஒன்றுசேர்

மிக்சர் செய்

தடவல் 1 க்கு 1 அவுன்ஸ் வீதம் நாள்
1 க்கு 3 தடவல் கொடுக்கவும்.

(5) 'வாந்தி உண்டாகும்'

இதற்குக் கொடுக்க:—

எடுத்துக்கொள்

* லைக்கர், ஸ்ட்ரிக்னைன். ஹைட்ரோகுளோ

(d)

கைட் துளி 6

(d)

ஆக்குவா. சேர்ந்து.

அவுன்ஸ் 3

ஒன்றுசேர்

மிக்சர்செய்

தடவல் 1 க்கு 1 அவுன்ஸ் வீதம் நாள் 1 க்கு
3 தடவல் ஆகாரத்தக்குபின் கொடுக்கவும்.

(6) 'வயிறு, குடல் இவைகள் புண்
பட்டு நிறுத்த முடியாத அவ்வளவு
பலமான வயிற்றோட்டம் உண்டாகும்'

இதற்குக்கொடுக்க:—

எடுத்துக்கொள்

பிஸ்மத் கார்போனஸ்.

கிரான் 15

(b)

(b)

டோவரஸ் பவுடர்.

கிரான் 15

(d)

(d)

ஒன்றுசேர்

3 பொட்டணமாக மடித்துக்கொண்டு தட
வல் 1 க்கு 1 பொட்டணம் வீதம் நாள்
1 க்கு 3 பொட்டணம் கொடுக்கவும்.

கூழ்மரோகியின் தேகத்தில் ரத்தம் உண்டா

கிப் பலத்தைக்கொடுக்க “காட்லிவர் ஆயில்”

(d)

கட்டாயம் கொடுக்கவேண்டும்.

கொடுக்கவேண்டிய முக்கியமான, “காட்

(d)

லிவர்.ஆயில்” களாவன:—

(1) “உ ஜான்ஸ். காட். லிவர். ஆயில்”

(d)

(d)

இதில் முதலில் தடவல் 1 க்கு 1 தேக் காண்டி அளவு 2 அவுன்ஸ் சுடுகிறபாலில் கலக்கிக் கொடுத்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாய் அளவைக் கூட்டி தடவல் 1 க்கு 4 தேக் காண்டி அளவு வரையும் நாள் 1 க்கு 2 அஸ்ஸு 3 தடவல் கொடுக்கவும்.

(2) “கிரீம். ஆப் மால்ட். காட் லிவர்.

(f)

(d)

ஆயில் வித். ஹைப்போ. பாஸ்பைட்டஸ்

(f)

(f)

ஆன்ட். கிரியோஸோட்”

(d)

(3) “கிரியோ ஸோட்டெட். எம்ல்ஷன்

(d)

காட்லிவர். ஆயில்”

(d)

இவைகளில் ஒன்றையும் மேல் காட்டியா விதமாய் உபயோகப்படுத்தலாம்.

க்ஷயரோகிகளுக்குப் பால்தான் முக்கியமான ஆகாரம். வெள்ளாட்டின் பால் கொடுத்தால் நல்லது. இல்லாவிட்டால் நன்றாய்க் காய்ச்சின நயமான பசுவின்பால் கொடுக்கவேண்டும். சூப்புகளாவது அல்லது பாலும் முட்டையும் சேர்த்து “எக்பீட்டர்”

(g)(b)

என்னும் கருவியால் அடித்தாவது கொடுக்கலாம். சிறுபுளிப்பான பசுமோர், அல்லது இதோடு சரிபங்கு நயமான பசுவின் பாலும் சேர்த்தாவது கொடுக்கலாமென்ற அபிப்பிராயங்களும் உண்டு. க்ஷயரோகிகள் எப்பொழுதும் பிளானல் உடுப்புப் போட்

(f)

டுக்கொள்ள வேண்டும். படுக்கை அறையில் சுத்தமான காற்று தாராளமாய் பரவும்படி செய்யவேண்டும்.

“அழுகச் சிரங்கு”

ஆரம்பத்தில் ஒன்று உண்டாகும்போது, அதை உடனே கிள்ளி மேஸ்தோலைப் பிய்த்துவிட்டு அதில் 1 துளி “கார்பாலிக்

(b)

ஆஸிட்” டை ஒரு குச்சியில் முக்கி வைக்கவும். உடனே சிரங்கை அதிகப்படுத்துகிற பூச்சிகளை நாசஞ் செய்து விடும்.

இப்படிச் செய்வது தவறி சிரங்கு அதிகப்பட்டு விட்டால்.

எடுத்துக்கொள்

(1)

ஸல்பர். ஸப்ளிமேட்.

டிசாம் 1

(f) (b)

வாஸலைன்

டிசாம் 9

ஒன்றுசேர்

கழிம்பாகச் செய்து சிங்கில் காலையில் நன்
றாய்த் தேய்த்து வைத்திருந்து சாயந்திரம்
“ஸல்பர் வைநோலியா, ஸோப்” கொண்டு

(f)

சுத்தம் செய்யவும்.

அல்லது

(2)

எடுத்துக்கொள்

ஸிங் ஆக்ஸைட்.

கிரான் 30

(z) (d)

ஆஸிட். போரிக்.

கிரான் 30

(d) (b)

டைலியூட்டெட். ஸிட்ரின். ஆயின்ற் மெ

(d)

(d)

ன்ற. டிசாம் 1

வாஸலைன்.

அவுன்ஸ் 1

ஒன்றுசேர்

கழிம்பாகச் செய்து காலையில் சிங்கில் நன்
றாய்த் தேய்த்து வைத்திருந்து சாயந்திரம்
“கார்பாலிக் ஸோப்” அல்லது “ஸாவாட்
டிஸ். ஸோப்” இவைகளில் யாதேனும் ஒன்
றால் சுத்தம் செய்யவும்.

குறிப்பு:—சிறு குழந்தைகளுக்கானால் மேல் எழுதியிருக்கிற கழிம்பில் “டைல்யூட்டேட். ஸிட்ரின். ஆயின்ற்.

(d)

(d)

மேன்ற். இதை நீக்கிக்கொண்டு, காலையில் கழிம்பை நன்றாய் சிாங்கில் தேய்த்து வைத்திருந்து மாஸையில் “ஸாலூட்டிஸ். ஸோப்” கொண்டு சுத்தம் செய்து பிறகு சரிபங்கு ஸிங் “ஆக்ஸைட்”, ஆஸிட் போரிக்”

(z)

(d)

(d) (b)

இந்த இரண்டையும் ஒன்று சேர்த்து சிாங்கில் தூற்றி வைக்கவும். பிறகு மாறி மாறி மேல்படி “ஸோப்” கொண்டு சுத்தம் செய்து சிாங்கு குணமாகும் வரை மேல் காட்டிய பொடிபைப் பிரயோகம் செய்து வரவும்.

“கண்டமாலை”

வெளிக்குப்போட:

எடுத்துக்கொள்

“எம்பிளாஸ்ட்ரம். அமோனியாக்கை. கம். ஹைட்ரஜ்ரோ”

(d)

இதில் கொஞ்சம்இளக்கி, கட்டிக்குத்தகுந்த அளவில் தோலாவது, முரடான துணியா வது வெட்டி அதில் தடவி மறுபடியும் அனல்காட்டி ஒட்டிவைக்கவும். இப்படி கட்டி கரையும் வரை மாறிமாறிப் போட்டு வரவும்

உள்ளுக்குக் கொடுக்க:—

எடுத்துக்கொள்

பொட்டாஸ். அயோடைட். கிரைன் 6

(d)(d)

டிஞ்சர். ஜென்ஷன். கோ துளி 60

ஸ்பிரிட் அமோனியா. அரோமேட்டிக் துளி 30

* லைக்கர். ஸ்ட்ரிக்னைன். ஹைட்ரோகுளோ (d)

ரைட். துளி 6

(d)

லைக்கர் ஹைட்ரார்ஜரி. பெர்க் குளோரைட். (d)

துளி 60

ஆக்குவா சேர்ந்து அவுன்ஸ் 3
ஒன்றுசேர்

மிக்சர்செய்

தடவல் 1 க்கு 1 அவுன்ஸ் வீதம் நாள்
1 க்கு 3 தடவல் ஆகாத்திற்குப்பின் கொடு
க்கவும். இதை நீடித்துச் சாப்பிட்டு வரவும்.

பிறகு

(1)

எடுத்துக்கொள்

“டீஜான்ஸ். காட். லிவர். ஆயில்”

(d)

(d)

இதில் தடவல் 1 க்கு 1 தேக்காண்டி.
அளவு எடுத்து 1 அவுன்ஸ் ஒயினில்
கலக்கி இதோடு 30 துளி “ஸிரப் பெர்ரை

(f)

அயோடைட்” சேர்த்து நாள் 1 க்கு 2, அல்லது 3 தடவல் ஆகாரம் சாப்பிட்டு 1 மணி நேரம் கழித்துச் சாப்பிடவும்.

அல்லது

(2).

எடுத்துக்கொள்

கெப்ளர்ஸ். ஸொலியூஷன். கரட். லிவர்.

(d)

ஆயில். இன். மால்ட். எக்ஸ்ட்ராக்ட். ஷித். அயர்ன். அயோடைட்”

(d)(d)

இதில் தடவல் 1 க்கு 1 தேக்காண்டி அளவு 2 அவுன்ஸ் சுடுகிற பசுவின் பாலில் கலக்கி நாள் 1 க்கு 2 அல்லது 3 தடவல் ஆகாரத்திற்குப் பின் சாப்பிடவும். கொஞ்சம் நீடித்துச் சாப்பிட வேண்டும்.

“அரையாப்பு”

இதற்கு:—

முதலில் நன்றாய்ப் பேதியாகும்படி செய்ய

எடுத்துக்கொள்

காலோமல்.

கிரான் 4

ஸோடா. பை. கார்ப்.

கிரான் 4

(d) (b) (b)

ஒன்றுசேர்

இதை ஒரே தடவலாக இரவில் படுக்கைக்குப் போகும்போது கொடுத்து.

மறுநாள் காலை யில் கொடுக்க:—

எடுத்துக்கொள்

எப்ஸம். ஸால்ட். டிராம் 6
இதை 4 அவுன்ஸ் சுக்குக் கஷாயத்தில் கரைத்து இதோடு 1 டிராம் “டிஞ்சர். சென்னை கோ” சேர்த்து ஒரே தடவலாகச் சாப்பிடுவம். 5, 6 தடவல் மலம் வெளியாகும்.

கட்டியின்மேல் தடவி:—

எடுத்துக்கொள்

* டிஞ்சர். அயோடின் அவுன்ஸ் $\frac{1}{2}$
(d)
* லினிமென்ட். அயோடின் அவுன்ஸ் $\frac{1}{2}$
ஒன்றுசேர்

இந்த இரண்டையும் ஒன்று சேர்த்துக் குலுக்கிக்கொண்டு இதில் கொஞ்சம் காலை மாலை கட்டியின்மேல் தடவி வரவும்.

இதே காலத்தில் உள்ளுக்குக் கொடுக்க:—

எடுத்துக்கொள்

“புளூ. பில்” கிரைன் 2
(b)
ஒவ்வொரு நாளும் இரவில் படுக்கைக்குப் போகும்போது கொடுத்து பிறகு.

பகலில் கொடுக்க:—

எடுத்துக்கொள்

பொட்டாஸ். அயோடைட், கிரைன் 6
(d)(d)
டிஞ்சர் ஜென்ஷன். கோ. துளி 45

ஸ்பிரிட். அமோனியா. அரோமேட்டிக்.

துளி 30

ஆக்குவா. சேர்ந்து,

அவுன்ஸ் 3

ஒன்றுசேர்

மிக்சர்செய்

தடவல் 1 க்கு 1 அவுன்ஸ் ஸீதம் நாள் 1 க்கு
3 தடவல் கொடுக்கவும். இப்படி இரவில்
மாத்திரையும், பகலில் மிக்சரும் சாப்பிட
வும்.

இப்படிச்செய்தும் கட்டி அழுங்காமல் இருந்
தால்

வெளிக்குப்போட:—

(1)

எடுத்துக்கொள்

எக்ஸ்ட்ராக்ட். பெல்லடோனா.

(b) (d)

அவுன்ஸ் $\frac{1}{2}$

இக்தியால். அமோனியேட்டா. அவுன்ஸ் $\frac{1}{4}$

கிளிஸேரின்

டிபாம் 1

(g)

ஒன்றுசேர்

“பிக்மென்றாக” ச் செய்து கட்டியில் தடவி

(g)

வைத்து மேல் பஞ்சு வைத்துக் கட்டவும்.

மாறிமாறித் தடவிவரவும்.

அல்லது

(2)

எடுத்துக்கொள்

எம்பிளாஸ்டாம். அமோனியாக்கை. கம், ஹைட்ரார்ஜினோ.”

(h)

இதில் கொஞ்சம் இளக்கிக் கட்டிக்குத் தகுந் தபடி தோலாவது முரடான துணியாவது வெட்டி அதில் தடவி மறுபடியும் அனல் காட்டி, கட்டியின்மேல் ஒட்டிவைத்து மேல் பஞ்சுவைத்து இறுக்கிக் கட்டவும். கட்டி களையும் வரை மாறிமாறிப் போட்டு வாவும்.

அல்லது

(3)

எடுத்துக்கொள்

“ஹைட்ரார்ஜினி. ஒலியஸ்”

(d)

இதில் கொஞ்சம் எடுத்து நாள் 1 க்கு 5, 6, தடவல் கட்டியின்மேல் நன்றாய்த் தேய்க் கவும். இப்படி வெளிப்பிரயோகம் செய்து வருவதோடு உள்ளுக்கும் முன் எழுதியிருக் கிறபடி இரவில் “புளு. பில்” லும் பகலில்

(b)

“பொட்டாஸ். அயோடைட் மிக்சரும்

(d)(d)

கொடுத்து வாவும். இப்படிக்கெல்லாம் செய் வதை விட கட்டியைப் பழுக்க வைத்து அறுத்து உள்ளிருக்கும் களங்கத்தை வெளி

பாக்கி “கார்பாலிக் லோஷன்,” “ஆன்டி”

(b)

ஸெப்டிக். லோஷன்” “கார்பாலிக். ஸோப்”

(b)

இவைகளால் சுத்தம்செய்து “அயோட பார்ம்” . “போரிக். ஆஸிட்” இவைகளினால்

(b)

(b)

(d)

வது, அல்லது, “ஆன்டிஸெப்டிக். டிராஸிங்”

(d)

லாவது புண்ணைக் குணமாக்கிப் பிறகு

(1)

1 அவுன்ஸ் “பொட்டாஸ். அயோடைட்.

(d)(d)

மிச்சர்” இதோடு தடவல் 1 க்கு 20 துளி

“லைக்ர. ஹைட்ரார்ஜினி. பெர்க்குளோரைட்”

(d)

(d)

சேர்த்து நாள் 1 க்கு 3 தடவல் ஆகாரத்துக்

குப்பின் கொஞ்சகாலம் நீடித்துக் கொடுத்து

வரவும்.

அல்லது

(2)

எடுத்துக்கொள்

“பர்காய்ன்ஸ். அயோடைஸ். ஸார்ஸ்பா

(b)(g)

(d) (d)

ரில்லா”

இதில் தடவல் 1 க்கு 1 தேக்காண்டி எடு

த்து 1 அவுன்ஸ் தண்ணீரில் கலந்து நாள்

1 க்கு 3 தடவல் ஆகாரத்திற்குப் பின்

கொடுக்கவும் இதையும் நீடித்துச் சாப்

பிட்டு வரவும்.

‘கார்ப்ப வ்ஸ்திரீகளுக் குண்டாகும் வாந்தி’

இதற்குக் கொடுக்க:—

(1)

எடுத்துக்கொள்

ஆஸிட். ஹைட்ரோகுளோரிக். டிஸ்

(d)

(d)

(d)

துளி 15

டிஞ்சர். ஜென்ஷன். கோ.

துளி 60

ஆக்குவா. சேர்ந்து.

அவுன்ஸ் 3

ஒன்றுசேர்

மிக்சர்செய்

தடவல் 1 க்கு 1 அவுன்ஸ் வீதம் நாள்

1 க்கு 3 தடவல் கொடுக்கவும்.

அல்லது

(2)

எடுத்துக்கொள்

* ஸிரியை. ஆக்ஸாலஸ்.

கிரான் 18

எக்ஸ்ட்ராக்ட். ஜென்ஷன்

கிரான் 12

ஒன்றுசேர்

6 மாத்திரைகளாகப் பிரித்துக்கொண்டு தட

வல் 1 க்கு 1 மாத்திரை வீதம் நாள் 1 க்கு

3 தடவல் கொடுக்கவும்.

அல்லது

(3)

எடுத்துக்கொள்

வைனம். இப்பிக்காக்.

துளி 6

ஆக்குவா சேர்ந்து.

அவுன்ஸ் 6

மிக்சர்செய்

ஒன்றுசேர்

3 மணிக்கொரு தடவல் 1 அவுன்ஸ் கொடுக்கவும்.

நாள் 1 க்கு 3, 4, தடவல் சிறு “ஐஸ் கட்டி”த் துண்டுகள் கொடுக்கலாம்.

“குத்திருமல்”

இதற்குக் கொடுக்க

(1)

எடுத்துக்கொள்

பொட்டாஸ். புரோமைட்.

கிரான் 6

(b) (d)

* டிஞ்சர். பெல்லடோனா.

துளி 6

(d)

ஸிரப். டீலு.

துளி 30

ஆக்குவா. சேர்ந்து.

அவுன்ஸ் 1

ஒன்றுசேர்

மிக்சர்செய்

தடவல் 1 க்கு 2 தேக்காண்டி வீதம் 4 மணிக்கொரு தடவல் கொடுக்கவும்.

(2)

எடுத்துக்கொள்

அமோனியா. புரோமைட்.

கிரான் 10

(b) (d)

வைனம். இப்பிக்காக்.	துளி 15
டின்சர். அயோஸியாமஸ்.	துளி 20
ஸிரப். ஆரண்டி.	துளி 40
ஆக்குவா. சேர்ந்து.	அவுன்ஸ் 1
	ஒன்றுசேர்

மிக்சர்செய்.

தடவல் 1 க்கு 2 தேக்காண்டி வீதம் 4 மணி
க்கொரு தடவல் கொடுக்கவும்.

(3)

எடுத்துக்கொள்

* குளோரல் ஹைட்ரஸ். கிரைன் 6

(d)

ஸிரப் டீலு துளி 30
ஆக்குவா. சேர்ந்து. அவுன்ஸ் 1
ஒன்றுசேர்

மிக்சர்செய்

தடவல் 1 க்கு 2 தேக்காண்டி வீதம் 4-மணி
க்கொரு தடவல் கொடுக்கவும்.

(4)

எடுத்துக்கொள்

“சாம்பர் லேயின்ஸ். காப் ரேமிடி”

(b)

(f)

(d)

இதில் தடவல் 1 க்கு 1 தேக்காண்டி வீதம்
4 மணிக்கொரு தடவல் கொடுக்கவும்.

பீகா ரண் - 451ஆவ்
456 மாணா கல்.

(16) டிஞ்சர். கார்டம். கோ

(d)

(17) டிஞ்சர். டிஜிடாஸிஸ்

(d)

(18) டிஞ்சர். ஜிஞ்சிபெரிஸ்

(z) (b)

(19) டிஞ்சர். ஒப்பியம்

(20) ஆஸிட். ஸல்பியூரிக் டிஸ்

(d) (f) (d)

(21) ஆஸிட். ஸல்பியூரிக். அரோமேட்டிக்

(d) (f)

(22) குளோரோடைன்

(d)

(23) ஓமம். கர்ப்பூர்.

(24) கார்பாலிக். டஸிட்டிங். பவுடர்

(b) (d) (d)

(25] மஸ்ட்டர்ட்

(d)

“நான்காவது பாகம்”

விஷமான மருந்துகள், அவைகளில் முக்கியமான சிலவற்றை அளவுக்கு அதிகமாகச் சாப்பிட்டு விட்டால், முறிக்க வேண்டிய முறைகள்.

“பாய்ஸன்” மருந்துகளாவன:—

- (1) ஆலோயின்
- (2) கொக்கெய்ன். ஹைட்ரோகுளோ
(d) ரைட்
(d)
- (3) அட்ரோபைன். ஸல்பஸ்
(f)
- (4) அர்ஜென்டி. ரைட்ரஸ்
- (5) குளோரல். ஹைட்ரஸ்
(d)
- (6) ஸிரியை. ஆக்ஸலஸ்
- (7) குப்ரி. ஸல்பஸ்
(f)
- (8) கிரைஸரோ பைனம்
(b)
- (9) பெர்ரை. ஆர்ஸெனஸ்
(f)
- (10) அயோடபார்ம்
(d)(f)
- (11) அயோடம்
(d)

- (12) ஹைட்ரார்ஜி. அயோடைட். சூப் ரம்
(d) (d)(d) (b)
- (13) ஹைட்ரார்ஜி. ஆக்ஸைட். சூப் ரம்
(d) (d) (b)
- (14) ஹைட்ரார்ஜி. ஆக்ஸைட். பிளேவா
(d) (d) (f)
- (15) ஹைட்ரார்ஜி. பெர்க்குளோரைட்
(d) (d)
- (16) மார்பைன். ஆஸிட்டஸ்
(f)
- (17) மார்பைன். ஹைட்ரோகுளோரைட்
(f) (d) (d)
- (18) ஸ்ட்ரிக்ளைன். ஹைட்ரோகுளோரைட்
(d) (d)
- (19) ஒப்பியம்.
- (20) போடோபில்லி. ரெஸினு.
(d)(f)
- (21) காஸ்ட்டிக். பொட்டாஷ்
- (22) பிளம்பை. ஆஸிட்டஸ்
(b)
- (23) தைமால்
- (24) எக்ஸ்ட்ராக்ட் பெல்லடோனா. விரிடி
(b) (d) (d)
- (25) எம்பிராஸ்ட்ரம் கந்தாரிடிஸ்
(d)
- (26) அங்குவன்ட்ம். ஹைட்ரார்ஜி. அயோ
(d)
டைட். சூப்ரம்
(d)(d) (b)
- (27) எக்ஸ்ட்ராக்ட். கனாபிஸ் இன்டிக்கா
(b) (d)
- (28) எக்ஸ்ட்ராக்ட் நக்ஸ்வாமிக்கா.

- (29) எகஸ்ட்ராக்ட்டம் நகஸ்வாமிக்கா. லிக்கு
விடம்
(d)
- (30) ஆஸிட் கார்பாலிக்
(d) (b)
- (31) ஆஸிட். ஆஸைட்டிக்
(d)
- (32) ஆஸிட் ஹைட்ரோகுளோரிக்
(d) (d)
- (33) ஆஸிட். ஸல்பியூரிக்
(d) (f)
- (34) ஆஸிட் நைட்ரிக்
(d)
- (35) ஆஸிட். ஹைட்ரோஸியானிக். டிஸ்
(d) (d) (d)
- (36) அமில். நைட்ரிஸ்.
- (37) காம்ப்ரோடைன்
(f) (d)
- (38) கிரியோஸோட்டம்
- (39) குளோரோபார்ம்
(f)
- (40) லைக்கர் ஆர்ஸெனிக்காலிஸ்
- (41) எகஸ்ட்ராக்ட். எர்காட். லிக்குவிட்
(g) (d)
- (42) லைக்கர் அட்ரோபைன். ஸல்பேட்டிஸ்
(f)
- (43) லினிமென்ட். பெல்லடோனா
(b) (d)
- (44) இன்ஜெக்ஷன். கொக்கெய்ன். ஹைப்
போடெர்மிக்கா
(d)

(45) லைக்கர் எப்பிஸ்பாஸ்டிக்கஸ்

(46) லைக்கர் ஹைடார்ஜிரி, ஹைட்ரேட்டி

(d)

ஸ். ஆஸிடஸ்

(d)

(47) டிஞ்சர். அயோடின்

(d)

(48) லினிமென்ற் அயோடின்

(d)

(49) லைக்கர் மார்பைன். ஆஸிட்டேட்டிஸ்

(f)

(50) லைக்கர். ஸ்ட்ரிக்னைன் ஹைட்ரோ குளோ

(d)

வைட்

(d)

(51) லைக்கர், மார்பைன் ஹைட்ரோகுளோ

(f)

d)

வைட்

(52) லைக்கர் ஆர்ஸெனிக். ஹைட்ரோ

குளோரிக்கஸ்.

(53) ஈதர்.

(54) டிஞ்சர். அக்கோனைட்

(55) டிஞ்சர். பெல்லடோனா

(b) (d)

(56) டிஞ்சர். கனாபிஸ். இன்டிக்கா

(b)

(d)

(57) குரோட்டன். ஆயில்

(58) டிஞ்சர். டிஜிடாலிஸ்

(d)

(59) டிஞ்சர். ஜெல்ஸெமி

(60) டிஞ்சர். லொபிலியா. ஈதர்

(b)

- (61) டிஞ்சர். நக்ஸ்வாமிக்கா
 (62) டிஞ்சர் ஒப்பியம்
 (63) லைக்கர். ஒப்பியம் ஸெட்டிடீவ்
 (d)

“விஷேமுறிவு”

“நைடிக். ஆஸிட்” “ஹைட்ரோகுளோ
 (d) (d)

ரிக். ஆஸிட்” , “ஸல்பியூரிக். ஆஸிட்”
 (d) (f) (d)

இவைகளில் யாதேனும் ஒன்றைக் குடித்து
 விட்டால் சுண்ணாம்பு, ஸோடா. உப்பு,
 க்ஷாக்கட்டி, இவைகளில் யாதேனும் ஒன்
 றைத் தண்ணீரில் கரைத்துக் கொடுக்கவும்
 இவைகள் அவசரத்திற்கு அகப்படாவிட்
 டால் சுவரிலுள்ள காரைக்கட்டியைத் தண்
 னீரில் கரைத்து வடிகட்டிக்கொடுக்கவும்,

ஆல்மண்ட். ஆயில் (வாதங்கொட்டை.
 எண்ணெய்.) ஆலிவ். ஆயில்=(சைதுள்
 எண்ணெய்)இவைகளில் யாதேனும் ஒன்
 றைக் கொடுக்கலாம்.

“இன்ஜெக்ஷன். ஊசி” கொண்டு “மார்
 பியா” “இன்ஜெக்ஷன்” செய்வலாம்.
 அபாயகரமான நிலைமை நீங்கினபிறகு “பார்
 லி. அரிசித்தண்ணீர்” , ஆவது அல்லது முட்
 டையின் வெள்ளைக்கருவைப் பாலில் அடித்
 தும் கொடுக்கலாம்.

“அக்கோனைட்” = (கலப்பக்கிழங்கு)

“டிஞ்சர். அக்கோனைட்”. இவைகளில் யாதேனும் ஒன்றைச் சாப்பிட்டுவிட்டால் உடனே 4 தேக்காண்டி, பொடிபண்ணின கடுகை 1 தமிளர் வெந்ரீரில் கலக்கிக்கொடுத்தாவது, அல்லது $\frac{1}{2}$ முதல் 1 டிராம் “ஸிங் (g)

ஸல்பஸ்” இதை 1 அவுன்ஸ் தண்ணீரில் (f)

கரைத்துக் கொடுத்தாவது வாந்தி எடுக்கச் செய்யவேண்டும். 6 துளி “லைக்கர். ஸ்ட்ரிக்ளைன். ஹைட்ரோகுளோரைட்” இதை (d) (d)

1 அவுன்ஸ் தண்ணீரில் கலந்து வாய்வழி யாகவாவது, அல்லது ஆசனத்தின்வழியாக வாவது செலுத்தவேண்டும். 20 முதல் 30 துளி “டிஞ்சர். டிஜீடாலிஸ்” இதை “இன் (d)

ஜெக்ஷன். ஊசி” கொண்டு “ஹைப்போ டெர்மிக். இன்ஜெக்ஷன்” செய்யவும். இந்த (d)

விஷம் சாப்பிட்டவரை மல்லாந்து தலைதொங்கப்போட்டு அசையாமல் படுக்கவைக்க வேண்டும். கடுகு அரைத்துத் துணியில் தடவி 15 முதல் 30 நிமிஷம் வரை இருதயத்தில் போடவேண்டும்.

“ஆர்வெஸரிக்”

அல்லது

“வெள்ளைப்பாஷாணம்” தின்று விட்டால்
“அக்கோனைட்” டிற்சுச் சொல்லியபடி வாந்
தி பெடுக்கச்செய்து, “லக்காயில்” ஆவது,
சுண்ணாம்புத் தண்ணீராவது, விளக்கெண்
ணையாவது ஏராளமாகக் கொடுக்கவேண்டும்.
1½ அவுன்ஸ் லைக்கர். பெர்ரை. பெர்க்குளோ

(f)

ரைட்” இதை 10 அவுன்ஸ் பிடிக்கக்கூடிய
(d)

பாட்டிலில் போட்டு தண்ணீர் விட்டு நிரப்பி
வைத்துக்கொண்டு, ½ அவுன்ஸ் “மெக்ஸீஷி
(g)

யா. கார்ப்”, இதை மற்றொரு 10 அவுன்ஸ்
(b)

பாட்டிலில் போட்டு தண்ணீர்விட்டுக் கரைத்
துக்கொண்டு, பிறகு இந்த இரண்டையும்
20 அவுன்ஸ் பிடிக்கக்கூடிய பாட்டிலில்
ஒன்றுசேர்த்துக் குலுக்கிக்கொண்டு 5 அல்
லது 10 நிமிஷத்திற்கு ஒருதடவல் ½ அவு
ன்ஸ் வீதம் கொடுத்துவாலாமெனத் தீர்
மானிக்கிறார்கள்.

“கார்ப்ரலிக். ஆஸிட்” குடித்துவிட்டால்

(b)

(d)

விளக்கெண்ணையாவது, முட்டையும்பாலும்
சேர்த்தாவது, இளஞ்சூடான பார்லி மாவுக்

(b)

கஞ்சியாவது, ஆரோருட்கஞ்சியாவது தாரா

எமாய்க் கொடுக்க வேண்டும். “கிளிஸெ
(g)
ரின்” அடுத்தடுத்துக் கொடுக்கவேண்டும்.

“குரோட்டன் ஆயில்”

அல்லது

“நேர்வாள. எண்ணெய் குடித்து விட்டால்
வாந்தி பெடுக்கச்செய்த பிறகு “பார்லி
மாவு,” “ஆரோருட். கஞ்சி” யாவது கொடுக்
கவேண்டும். “அபின்” கொடுக்கவேண்டும்.

சையனைட். ஆப். பொட்டாலியம்”

(d) (f)

தின்ற உடனே “பெர்ரை. ஸல்பஸ்” = (அன்
(f) (f)

னவதி)யைக் கரைத்துக்கொடுக்கவும். தின்ற
தைக்காணாமல் கொஞ்ச நேரம் சென்று விட்
டதானால் “பொட்டாஸ். பெர்மாங்கனஸ்”
இதைத்தண்ணீரில் கரைத்துக்கொடுக்கவும்.

“அயோடபார்ம்”

(d)(f)

தின்றவிட்டால், வாந்தியெடுக்கச் செய்து
பிறகு “ஸோடா உப்பு” அதிக அளவில்
(d)

கரைத்துக் கொடுக்க வேண்டும்.

“ஹைட்ரார்ஜிரி. பெர்க்குளோரைட்

(d)

(d)

அல்லது

“சவ்வீரம்” தின்றுவிட்டால் வாந்தி யெடுக்கச் செய்து, கச்செய்து, பார்லிமாவுக் கஞ்சி, ஆரோருட் கஞ்சி, பால், விளக்கெண்ணெய், இவை களைக் கொடுக்கவேண்டும்.

“அபின்”

தின்றுவிட்டால், வாந்தி யெடுக்கச் செய்து, காட்டமான காப்பித்தண்ணீராவது, தேயிலைத்தண்ணீராவது தாராளமாய்க் கொடுக்கவேண்டும். 2 அவுன்ஸ் தண்ணீரில் 1 கிரான் “பொட்டாஸ், பெர்மாங்கனை” கரைத்துக் கொடுக்க வேண்டும் தூங்கவொட்டாமல் விழித்திருக்கச் செய்யவேண்டும்.

“அர்ஜென்டி” நைட்ரஸ்

அல்லது

“வெள்ளிக் காடிக்காரம்”

சாப்பிட்டுவிட்டால், கரி உப்பை ஏராளமாய்க் கரைத்துக் கொடுக்க வேண்டும். வாந்தி யெடுக்கச் செய்யவேண்டும். பாலில் முட்டையின் மஞ்சள் கருவை அடித்துக் கொடுக்கவேண்டும். கோதுமைமாவை தண்ணீரில் கரைத்துக் கொடுக்க வேண்டும்.

“நக்ஸ்வாமிக்கா” = (எட்டிக்கொட்டை)

ஸ்டிரிக்னைன். ஹைட்ரோகுளோரைட்” =
(d) (d)

(எட்டி உப்பு)

தின்றுவிட்டால், முதலில் வாந்தி யெடுக்கச்
செய்து, 2 அவுன்ஸ். தண்ணீரில் 2 டிராம்
“பொட்டாஸ். புரோமைட்” கரைத்துக்
(b) (d)

கொடுக்க வேண்டும்.

கை கால் இழுப்பு அதிகமாயிருந்தால்
“குளோரோபாரத்தை” முகாவைக்க வேண்
(f)

டும். எட்டி உப்பு சாப்பிட்ட வுடனே
“பொட்டாஸ். பெர்மாங்கனஸ்” கரைத்
துக்கொடுக்கலாம்



அட்டவணை

பெயர்	பக்கம்	பெயர்	பக்கம்
அக்கேஷியா. கம்மி	19	அங்குவன்ட்ம், ஐட்	
(g)		ரார்ஜிரி. நைட்ரே	
அங்குவன்ட்ம். ஆஸிட்.		ட்டிஸ் அல்லது	
(d)		ஸிட்டிரின். ஆயின்	
போரிக்	28	ற். மென்ற	143
(b)		அங்குவன்ட்ம். ஐட்	
அக்கோனைட். ரூட்	41	ரார்ஜிரி. ஆக்ஸை	
அமோனியா. பென்சாஸ்	6	ட். பிளேவா	144
(b) (z)		(d) (f)	
அமோனியா.		அயோனியாமஸ். லீவ்ஸ்	151
புரோமைட்	47	(h)	
(b) (d)		அயோடம்	153
அமோனியா. கார்போ		(d)	
(b)		அயோடோபார்ம்	159
னஸ்	48	(d) (f)	
அனித்தி	50	அயோடால்	159
அனிஸி	51	(d)	
அரோபா	54	அபின்	189
(b)		அங்குவன்ட்ம். ரெஸினி	221
அர்ஜென்ட்ம். நைட்ரஸ்	55	அங்குமன்ட்ம். ஸல்பர்	253
அஸ பீட்டிடா	56	(f)	
(f) (d)			
அனா கார்டியம்	58	அஜீரணம் (குழந்தை	
(d)		களுக்கு)	294-298
அப்பியால்	58	அஜீரணம் (பெரியவர்	
அரிஸ்டால்	58	களுக்கு)	298-309

பெயர்	பக்கம்	பெயர்	பக்கம்
அன்னத்துவேஷம்	369-375	ஆஸிட். நைட்ரிக்	35
அழகச்சிரங்கு	439-441	(d)	
அரையாப்பு	443-447	ஆஸிட். நைட்ரோ. ஐட்.	
ஆஸிட்டானிலிடம்		(d) (h)(d)	
(d)		ரோ குளோரிக். டில்	35
அல்லது ஆண்டி	18	(d)	
பெப்ரின்		ஆஸிட். பாஸ்பாரிக். டை	
(f)(b)		(d) (f) (f) (d)	
ஆஸிட்டிக். ஆஸிட்	20	வியூட்	36
(d)		ஆஸிட் ஸாலினிலிக்	36
ஆஸிட்டிக். ஆஸிட். டை		(d)	
(d) (d)		ஆஸிட். சல்பியூரிக்	38
வியூட்	20	(d) (f)	
ஆர்ஸனிக்	22	ஆஸிட். சல்பியூரிக்.	
ஆஸிட். பென்ஸாயிக்	24	(d) (f)	
(d) (b) (z)		அரோமேட்டிக்	38
ஆஸிட். போரிக்	25	ஆஸிட். ஸல்பியூரிக். டை	
(d) (b)		(d) (f) (d)	
ஆஸிட் கார்பாலிக்	29	வியூட்	39
(d) (b)		ஆஸிட். டானிக்	40
ஆஸிடம் லிற்றிக்கம்	31	(d)	
(d)		ஆஸிட். டார்ட்டாரிக்	41
ஆஸிட். காலிக்	31	(d)	
(d) (g)		ஆலோயின்	45
ஆஸிட். ஐட்ரோ		ஆன்டிமோனியல். பவுடர்	52
(d) (h)(d)		(d)	
குளோரிக் டைவியூட்	32	ஆன்டிமோனியம்.	
(d)		டார்ட்டரேட்டம்	53
ஆஸிட். ஐட்ரோஸியானிக்		ஆர்னிக்கா	56
(d)(h)(d)		ஆரன்டி. கார்ட்டெக்ஸ்	57
டைவியூட்	34	ஆஸிட். பிக்ரிக்	57
(d)		(d)	
		ஆஸ்பைரின்	55

பெயர்	பக்கம்	பெயர்	பக்கம்
எம்பிளாஸ்ட்ரம்.		ஒருத்தலை இடி	429-431
அமோனியாக்கை.	141	ஒ	
கம் ஐட்ராஜிரி		ஒப்பியம்.	189
(h)(d)		ஒடால்	194
எப்ஸம், ஸால்ட்.	170	(d)	
எம்பிளாஸ்ட்ரம்.		க	
ரெஸினி.	221	கஜ்புட். ஒலியம்.	71
எக்பிளிப்	244	கலம்பா. ரூட்	74
(g)(f)		கனாபிஸ். இன்டிக்கா.	78
எக்ஸ்ட்ராக்ட். டாராக்ஸ்		(b) (d)	
ஸெஸி,	256	கந்தாரிடிஸ்.	80
எக்ஸ்ட்ராக்ட்டம்.வை		(d)	
பர்னம். புருதி போ		கரியோபிஸ்லம்.	83
(b) (f)	263	(f)	
வியம் விக்குவிடம்		கரோஸிவ். ஸப்ளிமே	
(d)		(b)	
எக்ஸ்பக்ட்டோரென்ற		ட்.டேபிளாய்ட்ஸ்	147
மிக்சர்	276	(d)	
ஐ			
ஐட்ராஜிரி. கம்.		கண்வலி, அமரம்; கண் சிவப்பு	349-351
(h d)			
கிரீட்டா.	139	கண்டமாலை	441-443
ஐட்ராஜிரி ஒலியஸ்.	144	கர்ப்பஸ்திரீகளுக்குண்டாகும்	
(h)		வாந்தி	448-449
ஐட்ராஜிரி. பெர்க்கு		கா	
(h d)			
ளோரைட்	144	காபின். ஸிட்ஸ்-	70
(d)		(f)	
ஐட்ராஜிரி ஸப்குளோ		கால்ஸியம். ஐட்ரஸ்	73
(d)		(h)(d)	
ரைட்.	148	காரோன். ஆயில்.	73
(d)			

பெயர்	பக்கம்	பெயர்	பக்கம்
காம்பர்,	75	கி	
(f)		கிரைஸரோ பைனம்	96
காப்லிஸி.	82	(b)	
கார்டமம்.	82	கிரியாலோட்	109
(d)		கிரிட்டா பிரிப்போட்டா	111
காஸ் காரா. ஸாக்ரடா.	83	கிளிஸெரின்	134
(g)(d)		(g)	
காட்டிக்கு	87	கிளிஸிரிஸா. ஸூட்	136
கால்ச்சிஸி.	103	(g)	
காலோஸிந்து பல்பு	106	கிரேபவுடர்	139
காப்பர். ஸல்பேட்.	114	(g) (d)	
(f)		கிரிஸின்	164
கார்ல்ஸ்பேட் ஸால்ட்.	116	கிரீம். ஆப் டார்ட்டார்	218
(b)(d)		(f)	
காலோமல்.	148	கிருமிப்பொடி	231
காட். லிவர். ஆயில்	181	கிரு மிகளுக்கு	325
(d)		கு	
காஸ்ட்டர். ஆயில்	224	குளோரல். ஐட்ரஸ்	90
கார்மினேட்டிவ். மிக்சர்	275	(h)d)	
காஸ்ட்டிக். ஸொலியூஷன்		குளோரின். மிக்சர்	92
நம்பர் 1, 2, 3, 4, முத		குளோரோ பார்ம்	93
லியவை	289	(f)	
காந்ராக் காலங்களில் கை		குரோட்டன். ஆயில்	113
வசு மிருக்கவேண்டிய		குவாக்கல். கார்போ	
மருந்துகள்	456-457	(g) (b)	
கால்ரா	336-348	னேட்	118
காக்கைவலிப்பு	381	குவாஷியா. லிக்னம்	218
காய்ச்சல்கள்	381-386	(g)	
காதில் சீழுவடி		குடிவெறி குடிமயக்கம்	307
தலுக்கு	431-432	குத்திருமல்	449-450
காசம்	432-438	கோ	
		கொடினா	101
		(d)	

பெயர்	பக்கம்	பெயர்	பக்கம்
கொப்பைபா	107	குதகஜந்தி	419-421
(b)		குதகப்பெருக்கு	427-428
கொய்னைன். ஸல்பஸ்	219	சோ	
(f)		சோகை	314
கொய்னெட்டம்	228	ட	
கொய்னைன் மிக்சர்	272	டயூரெட்டின்	118
கொடபைபா. மிக்சர்	278	(d)	
(b)		டயாபோரெட்டிக்.	
கோ		(d) (f)	
கோக்கா. போலியா	104	மிக்சர்	277
(f)		டயூரெட்டிக் மிக்சர்	278
ச		டா	
சயரோகம்	432-439	டாக்கா. டயாஸ்டேஸ்	261
சி		(a)	
சிட்டா	89	டான்னல் பின்	262
சின்கோனா. கார்ட்டெக்ஸ்	99	(b)	
சின்னமன் பார்த்	101	டி	
(b)		டிஜிடாவிஸ். போலியா	116
சின்னமன். ஆயில்	101	(f)	
சிங். ஆக்ஸைட்.	265	டியோட்டால்	118
(z) (d)		(d)	
சிங், ஸல்பஸ்	265	டிஞ்சர். அயோடின்	154
(x) (t)		(d)	
சிங். வெவிரியன்	266	டிபினம்	155
(z)		(b)	
சிஞ்சி பெர்	268	டிபிந்தினி. ஒலியம்	226
(z) (b)		(b)	
சின்கோனா. மிக்சர்	272	டிராககந்த்	268
சூ		(g)	
சூதகக்கட்டு	310	டு	
சூதகவலி	367-369	டுவின்னிங்க்ஸ். மிக்சர்	287

பெயர்	பக்கம்	பெயர்	பக்கம்
டெ			
டெர்மட்டால்	119	பல்விஸ். இப்பிக்காக்	155
(d)		பல்விஸ். இப்பிக்காக்.	
டோ			
டோனோவான்ஸ். ஸொ		கோ	155
(d)		பல்விஸ். ஜாலப். கோ	160
லியூஷன்	24	பல்விஸ். கைநோ	163
டோவாஸ். பவுடர்	155	பல்விஸ். கைநோ. கோ	163
(d)		பல்விஸ் மெக்நீஷியா. எற்	
(d)		பிஸ்மத்	290
த		(b)	
தலையில் வழுக்கை,		பல்விஸ் ரீயை, எற். லோ	
பொட்டல்	309	டியை	291
		(d)	
தூ		பல்விஸ். டோவரி எற்.	
தூக்க மின்மை	421-424	(d)	
தை		அமோனியை	292
தைமால்	260	பலயினத்திற்கு	384-358
தோ		பல்வலி, அரண்கட்டினதால்	
தொண்டைப்புக்கைச்சல்	331	வலி வீக்கம்	358-360
ந		பல்விஸ். டோவரி. கம்.	
நக்ஸ். வாமிக்கா	187	கிரீட்டா. அரோமேட்	
		டிக்கா	290
நா		பா	
நாப்தால்	185	பாராபினம். மோலி	194
(f)		(f)	
நார்க்கொட்டைன்	189	பாரால்டி. ஐடம்	195
நீ		(d)(h)(d)	
நீழிவு	451-454	பாஸ்பாஸ்	202
		(f) (f)	
பி			
பல்விஸ் கிளிஸிரிஸா.		பிஸ் ஐடார்ஜிரி அல்லது	
(g) (z)		புளு பிஸ்	141
கோ	136	(b)	

பெயர்	பக்கம்	பெயர்	பக்கம்
பிளாக். வாஷ் அல்லது		பெர் ராட்டின்	131
(b)		(f)	
லோஷன். ஐட்ராஜிரி.		பெர்ரை. பைரான்	131
(h)(d)		(f)	
நிக்ரா	149	பெப்பர்மின்ட் ஆயில்	173
(g)		பெப்பர்மின்ட். கிரிஸ்டல்	175
பிளம்பை. ஆஸிட்டஸ்	204	பெப்ஸினம்=(பெப்	
பிளாக். டிராப்ட்.	281	ஸின்)	196
(b) (d) (f)		பெனாஸெட்டின்.	199
பெ		(f)	
பெர்ரம்	123	பொ	
(f)			
பெர்ரை. கார்போனஸ்		பொட்டாஸ். ஆஸிட்டஸ்	207
(l) (b)		பொட்டாஸ். பைகார்ப்	208
ஸாக்ரடா	123	(b) (b)	
(g)(d)		பொட்டாஸ். புரோமைட்	208
பெர்ரை ஸெஸ்க்யூ.		(b) (d)	
(f)		பொட்டாஸ். கார்	
ஆக்ஸைட்	123	போனஸ்	210
(d)		(b)	
பெர்ரை. எர். அமோ		பொட்டாஸ். குளோரஸ்	210
(f)		பொட்டாஸ். ஸிட்ரஸ்	211
ஸியர். ஸிட்ரஸ்	124	பொட்டாஸ். அயோ	
பெர்ரை எற்கொய்னைன்.		டைட்	212
(f)		(d)(d)	
ஸிட்ரஸ்	124	பொட்டாஸ். கைட்ரஸ்	215
பெனாஸோனம்	203	பொட்டாஸ் பெர்மாங்	
(f) (z)		கனஸ்	216
பெர்ரை. ஸல்பஸ்	128	பொட்டாஸ். டார்ட்	
(f) (f)		ரஸ். ஆஸிட்டஸ்	218
பெர்ரை. பாஸ்பஸ்	130	(d)	
f) (f) (f)			

பெயர்	பக்கம்	பெயர்	பக்கம்
பொட்டாஸ். அயோ		மி	
டைட். மிக்சர்.		மிக்சர். ஆஸிட். ஸல்பியூரிக்.	
(d)(d)	269	(d) (f)	
• நம்பர் 1		கம். ஒப்பியம்	273
பொட்டாஸ். அயோ		மிக்சர் கிரீட்டா. கம். காட்டிக்.	
டைட். மிக்சர்.		கியூ	274
(d)(d)	271	மிக்சர் பெர்ரை. டயூ	
நம்பர் 2		(f) (d)	
விதியை கார்போனஸ்	167	ரெட்டிக்	279
(b)		மிக்சர். ஸென்ஞூ. கோ	280
வினிமென்டம். ஸப்		மிக்சர் பிஸ்மத். ஸெடட்	
போனில்	233	(b) (d)	
வினிமென்ற டர்ப்		டிவ்	282
பென்டைன்	259	மிக்சர். ஸ்ட்ரிக்ளைன்	
போ		எற். பெர்ரை	284
போடோபில்லம்		(f)	
(d)(f)		மிக்சர். ஆமோனியா குளோ	
ரெஸின்	206	ரைட்	285
ம		மிக்சர். ஸல்பேட்டிஸ். டிரிப்	
மர்	180	(f)	
மஸ்ட்டர்ட்	237	எரிஸிஸ்	285
(d)		மிக்சர். ஸர்ரை பெர்க்குளோ	
மந்தம் (குழந்தை		ரைட் (f)	286
களுக்கு)	296-298	மிக்சர். இப்பிக்காக்.	293
மலச்சிக்கல்	351-353	மு	
மண்டை இடி	414-416	முகப்பரு	305
		மு	
மா		மூத்திரப் பையில் ரணம்,	
மார்பைன். ஐட்ரோ		எரிச்சல்	328
(f) (h)(d)			
குளோரைட்	176	மே	
மாஸ்க்கஸ்=(மஸ்க்)	179	மெக் நீஷியா. கார்ப்	168
மார்அடைப்பு	320	(g) (b)	

பெயர்	பக்கம்	பெயர்	பக்கம்
மெக்ஷேஷியா. ஸல்பஸ்	170	லெ	
(f)		லெட். ஆஸிட்டேட்	204
மெல். டிபியூராட்டம்	171	(d)	
(d)		லை	
மெந்தா. பிப்பரிட்.		லைஸால்	168
ஒலியம்	173	லைக்கர். பொட்டாஸ்	207
மெந்தால்	175	லைக்கர். ஸ்ட்ரிக்ளைன்	
மே		ஐட்ரோகுளோரைட்	274
மேகவியாதி	396-404	(d)	
மோ		வ	
மொர்ரே. ஒலியம்	181	வயிற்றுவலி குழந்தை	
யு		களுக்கு	294-295
யுக்காலிப்டஸ். ஆயில்	121	வயிற்றுவலி பெரிய	
யுரோட்ரோபைன்	262	வாளுக்கு	298-303
யூ		வயிற்றோட்டம்	361-364
யூக்கொய்னைன்	122	வயிற்றழைச்சல்	364-367
ரி		வா	
ரிஸினி. ஒலியம்	224	வாஸலைன்	194
ரிஸார்ஸின்	229	வார்பர்க்ஸ். டிஞ்சர்	264
ரி		(b)	
ரீயை ராடிக்ஸ் அல்		வாய்ப்புண்	322
லது ரூபார்ப் ரூட்	221	வாதம்	408-412
(b)(b)		வி	
ரே		விதைவிக்கம், வலி,	
ரெக்ட்டிபைட். ஸ்பிரிட்	244	வேதனை	379
(f)(d)		விக்கல்	418
ல		விஷமுறிவு	462-467
லவண்டியூலே. ஒலியம்	165	வே	
லி		வெலிரியன். ரிஸோமா	262
லின்ஸீட்=(லினம்)	166	வெள்ளைப்பிரமேகம்	425-426
(d)			

பெயர்	பக்கம்	பெயர்	பக்கம்
வை		ஸோ	
வைனம். இப்பிக்காக்	156	ஸோடா. டார்ட்ட	
வைபர்னம். புரு நிபோ		(d)	
(b) (f)		ஸோட்டா	238
வையம்	263	ஸோடியை. பென்ஸாஸ்	240
வையோபார்ம்	264	(d) (b) (z)	
(f)		ஸோடா பைகார்ப்	240
வைரால்	264	(d) (b) (b)	
ஸ		ஸோடியை புரோமிடம்	241
ஸல்போனல்	251	(d) (b) (d)	
(f)		ஸோடா. ஸாஸிஸிலஸ்	242
ஸல்பர். ஸப்ளிமேட்	252	(d)	
(f) (b)		ஸோடா. ஸல்பஸ்	243
ஸனாட்டோஜன்	253	(d) (f)	
ஸா		ஸோடா. ஸல்பிஸ்	243
ஸாலால்	226	(d) (f)	
ஸான்றல். ஓலியம்	229	ஸோமா. டோஸ்	254
ஸான்டோனைன்	231	ஸ்	
ஸார்ஸா ராடிக்ஸ்	233	ஸ்டிராமோனியா.	
(d)		போலியா	245
ஸாங்குவினல்	254	(f)	
ஸான்மெட்டோ	255	ஸ்ட்ரோபாந்தஸ். ஸீட்ஸ்	246
ஸி		(i) (d)	
ஸில்லா	234	ஸ்ட்ரிக்னைன்	247
ஸினாப்பிஸ்	237	ஸ்டிமியூலென்ட் மிக்சர்	283
ஸே		ஜா	
ஸெனிகா. ரூட்.	235	ஜாலப்	160
(g)		ஜாம்பல்	162
ஸென்னா	236	(b)	
ஸெட் லிட்ஸ். பவுடர்	238	ஜே	
(d) (d)		ஜெல்ஸெமி. ரூட்	132
ஸெனிகா. மிக்சர்	276	ஜென்ஷன் ரூட்	132
(g)			

குறைந்த சந்தா !

நிறைந்த விசேஷம் !!

“ஆனந்த போதினி” ஓர் செந்தமிழ் வாரப்பத்திரிகை

—:(0):—

“ஆனந்தபோதினி” மாத சஞ்சிகையின் ஊழியம் உலகம் அறியும். அவ்வுழியத்தை அதிகப்படுத்தும் நோக்கத்துடன், பல ரூடைய வேண்டுகோளின் மேல் மாத சஞ்சிகையோடு “ஆனந்த போதினி” வாரப்பத்திரிகையும் வெளி வருகின்றது. தமிழ்ப் பெரும்புலவர்களும் ஆங்கிலமறிந்த பேரறிஞர்களும் பிறரும் மத சமூக தேசிய முன்னேற்றதைப்பற்றிய தங்கள் தங்கள் ஆராய்ச்சி முடிவுகளைக் கொட்டிக் குவிக்கக் கங்கணங்கட்டி யிருக்கின்றனர்.

உங்களுக்கு என்ன வேண்டும்?

மத உண்மைகளா ?

தத்துவ ஆராய்ச்சிகளா ?

கைத்தொழில் விளக்கங்களா ?

வியாபார ரகசியங்களா ?

விஞ்ஞான

விநோதங்களா ?

கிராமச் சீர்திருத்தங்களா ?

சமூக இயல்களா ?

வைத்திய விசேஷங்களா ?

தேசிய தத்துவங்களா ?

சிறுகதைப் பகுதிகளா ?

இன்னிசைப் பாட்டுகளா ?

எல்லாவற்றிற்கும் “ஆனந்த போதினி” வாரப் பத்திரிகை பூலோக கற்பகமாக விளங்குகிறது.

உள்ளாடு வகுடசந்தா ரூ. 3, 6 மாத சந்தா ரூ. 1-12-0

பிணங்கு, சிங்கப்பூர், முதலிய வேளி நாகேட்கு

வகுட சந்தா ரூபா 4.

வேளி நாகேட்கு 6-மாத சந்தா கிடைப்பாது.

“ஆனந்தபோதினி” ஆபீஸ்.

தபாற்பெட்டி நெ. 167, மதராஸ்.