


16
MADHU

MEHAM.



82100

BY

K. M. RADHAKRISHNAN.

L. M. F., M. R. A. S., (London).

1925.

மதுமேகம்



அல்லது

நீ ர ழி வு .

DIABETES MELLITUS.

க ல் லி டை க் கு றி ச் சி

மெடிக்கல் பிராக்டிஷனரும்,

மருத்துவசாஸ்திரம், கூடியரோகம்,

முதலியபுத்தகங்களின் ஆசிரியருமான

கே. எம். ருதாகிருஷ்ணன்,

எல். எம். பி., எம். ஆர். ஏ. எஸ்., (லண்டன்)

அவர்களால் எழுதப்பெற்று

அம்பாசமுத்திரம்

ஸ்ரீ ராமகிருஷ்ணபிரஸில்

பதிப்பிக்கப்பெற்றது.

1925.

அண-8.]

[காப்பிரைட் ரிஜிஸ்டர்ட்.

ஆக்கியோனரை.



பல வருடங்களாக மானிடர் அநேக வியாதிகளாற்
பீடிக்கப்பட்டு வருகிறார்களென்பது யாவருமறிந்த ஓர் விஷய
மல்லவா? எனினும், தற்காலத்தில், வியாதிகள் வரவர அதி
கரித்து நோயில்லா வாழ்வு வாழ்வோரைப் பார்ப்பது மிகவும்
தூர்லபமாகிவிட்டது. இதற்கு முக்கிய காரணமென்ன?

அவரவர்களுக்குக் கடவுள் அருளியிருக்கும், மனைவி
டக்கள், சொத்து, சுதந்திரம் முதலியவைகளைக் கொண்டு
மனோநிலையைத் தவரவிடாது, ஆத்ம திருப்தியுடன், தங்
களுக்குரிய வேலைகளைச் சரிவரச்செய்து, நித்தியகர்மானுஷ்டா
னம், ஹோமம் முதலிய கிரியைகளை பொருபொழுதும் தவ
றாது நடத்தி, வேளாவேளைகளில் செளம்மிய போஜனங்களை
மிதமாகவே புசித்து, பிர்மசர்யம், இல்ஹம், வானப்பிரஸ்தம்,
துறவறமாகிய இந்நான்கு ஆசிரம தர்மங்களையும்னுஷ்டித்து,
சரீரவன்மையும், மனோவன்மையும் ஒருங்கே எய்தி நூறு
வருடத்திற்குக் குறையாமல் நமது முன்னோர்கள் இனிது
வாழ்ந்துவந்தார்களென்பதைச் சரித்திர பூர்வமாக நாமென்
றென்றும் படிக்கிறோமல்லவா? அவ்வாறாய் பெரியோர்கள்
வயிற்றிற் பிறந்தும், அன்னவர்களினுதிர்மே நம் முதிர்க்
குழாய்களிலோடிக்கொண்டிருந்தும், அவர்கள் செய்துவந்த
சர்மங்களை மறந்து, நித்தியகர்மானுஷ்டானங்களை அறவே
பொழித்து, நான்கு ஆசிரம தருமங்களையுங் கவனியாது,
நினைத்த வேளைகளிலெல்லாம் நினைத்த இடத்தில் போஜனம்
லாப்புடைக்கப் புசித்து, நோயினால் யேவப்பட்ட தூதர்க
டைய, பொடி, புகையிலை, சுருட்டு, காப்பி, தேயிலை, கள்,

சாராய மிவைகளாற்கட்டுண்டு, சரீரபலம் சிதறடிக்கப்பட்டவர்களாய், தன்னைத்தானே காப்பாற்றிக்கொள்ளமுடியாமல் பிறர் பொருளை இச்சிப்பதிலும், பணத்தைக் குன்றிப்போடவேண்டுமென்றெண்ணத்துடனும், சதா மனக்கிலேசமடைந்து ஆகம் திருப்தியில்லாமல் சதா நோயினால் பீடிக்கப்பட்டு வீணே மடிகின்றோமென்று உள்ளங்கை நெல்லிக்கனிபோல் விளங்கவில்லையா?

ஆகையால், நாம் நீழை நோயில்லா வாழ்வு வாழவேண்டுமாயின், நமது ஆன்றோர்களால் வரையப்பட்ட சாத்திரக் கோட்பாட்டுகளுக்கிணங்கி, அவர்களது ஒழுக்கவழக்கங்களை யனுஷ்டித்து நடக்கவேண்டியது மிகவு மின்றியமையாததாகும். “சாஸ்திராயச சுகாயச” எனும் ஆன்றோர் வாக்குப் பொய்யாகுமோ?

மேலே சொல்லிய சாத்திர விதிகளினின்றும் பிறழ்ந்து நடப்பதால் அநேக பிணிகளுண்டாகின்றன. அவைகளில் முதன்மையாயும், ஜனங்களை அதிகம் வதைக்கின்றதாயும், தற்கால நவீனநாகரீகத்தினாலெங்கும் அதிகதுரிதமாய்ப்பரவிக்கொண்டு வருகிறதாயுமுள்ள வியாதிகள் பலவுள. இவ்வியாதிகளின் குணம், சின்னங்கள், அவைகளுக்குரிய பரிசாரங்கள் முதலியவைகளை யெனது சிற்றறிவிற் கெட்டியவரை, தமிழ்நாட்டு மக்களுக்குதவுமாறு, சிறு சிறு புஸ்தக ரூபங்களாக வரையத் துணிந்துள்ளோன். அதில் முதன்முதலாக “மதுமேகம்” என்னும் வியாதியை முதற் பகுதியாக யெடுத்துள்ளோன். இப் புத்தகத்திலிருக்கும் குறை குற்றங்களை நீக்கி, குணத்தை மாத்திரமெடுத்துக்கொண்டு, தமிழ்நாட்டுமக்களின் புறவே நீழை வாழவேண்டுமாறு எல்லாம் வல்ல இறைவனைப் பிரார்த்திக்கின்றேன்!

கல்லிடைக்குறிச்சி, } கே. எம். இராதாகிருஷ்ணன்.
16-7-1925. } L.M.P., M.R.A.S., (London).

ம து மே க ம்

அல்லது

நீ ர ழி வு .

(DIABETES MELITUS)



மதுமேகமென்றாலென்ன ?

ஒருநாளேக்குப் பல தடவைகள், ஏராளமாக, சர்க்கரையோடுகூடிய நீர் (Urine) போவதும், தேகம்நாளுக்குநாளினேத்து, பலம் குன்றி அசதி மேலீட்டினாலும், நரம்புத் தளர்ச்சியினாலும், தங்களுக்குரிய வேலைகளைச் சரிவரச்செய்யமுடியாமலும், சதா தண்ணீரருந்தவேண்டுமென்ற ஓர் அவாவும், தீராப்பசியும் ஆகிய இக்குறிகள் அல்லது சின்னங்களை யுடைத்தாய் வோர் வியாதியே “மதுமேகம்” எனப்படும்.

இவ் வியாதியானது பல நூற்றாண்டுகளுக்கு முன்னமேயே, ஜனங்களைத் துன்பப்படுத்திவந்தது. புராதன வைத்தியர்கள் அதையறிந்து, அதற்குத் தக்க பரிகாரங்களுக்குச் செய்து, பல பிணியாளர்களைக் குணப்படுத்தி யிருக்கிறார்கள். இதற்கு அத்தாக்ஷியாக நமது புராதன கிரந்தமாகிய “சாரக சம்ஹிதை” யென்னுமோர் அறிய பெரிய நூலில், மதுமேக

முண்டாவதற்காய காரணங்களும், அதன் பல சின்னங்கள் அல்லது அடையாளங்களும், அந்நோய்க்குறிய மருந்துகளும், அவையின் பக்குவ பாகங்களும், வெகு விரிவாகவும், விமரிசையாகவும் விவரித்திருக்கின்றதை இன்றும் படித்தறியலாம்.

ஆங்கில விற்பன்னர்களில் முதன்முதலாக இவ்வியாதியை யறிந்தவர் அரேட்டஸ் (Araetus) என்பவர். இவரே இதற்கு டயபீடிஸ் (Diabetes) என்று பெயர்கொடுத்து, எலும்பு, தசை ஆகிய இவைகளே யுருகி மூத்திரமாகப்போவதாயும் வரைந்துள்ளார். பின்னர், லில்லிஸ் (Willis) என்பவர் பதினேழாவது நூற்றாண்டில் இவ் வியாதியை யுடையவர்களது நீர் (Urine) தித்திப்பாயிருக்கிறதாகவும் அதில் ஏராளமாக தேனும் சர்க்கரையுங் கலந்திருப்பதாகவும், மற்றும் பலவாறுள்ள அதன் சின்னங்களையும் நன்குகவனித்து, விவரமாக எழுதியிருக்கிறார். பின்னர், ரோலோ (Rollo) என்பவர், மா நிறைந்த பதார்த்தங்கள் (Carbohydrates) இனிப்பான தின்பண்டங்கள் முதலியவை தின்பதினால் வியாதி யதிகரிக்கிறதென்றும், மாமிச பதார்த்தங்களைப் புசிப்பதினால் வியாதியினுக்கிரம் தணிகிறதென்றும், பல சோதனைகளினாலறிந்தெழுதியிருக்கிறார். தற்கால சாஸ்திரீய முறைப்படி இவ் வியாதியை யறிய முயன்றவர் முதன்முதலாக 1856-வது வருடத்தில் கிளாட் பெர்னாட் (Claud Bernard) என்பவராவர்.

மதுமேகமுண்டாவதின் முக்கிய காரணங்கள்.

நாம் முதலாவது பொதுப்படையாயுள்ள அம்சங்களைக் கவனித்துவிட்டுப் பின்னர் தனித்தனி அம்சங்களைக் கவனிப்போம்.

நாம் உண்ணும் உணவுகளிலுள்ள மா பதார்த்தம் (Starches), இனிப்புப் பதார்த்தமாகிய இவைகள், சிறு குடலிற்கு [Small Intestines]ச் சென்றதும், அங்கு அக் குடலினுட்பாகத்திலுருகின்ற ஒருவித ஜீரணநீர் [Enzymes] மற்றும், § மதுரகோசத்தி (Pancreas) லுருகின்றவோர் ஜீரணநீர் (Pancreatic juice) இவைகளாற் நன்கு கலக்கப் பட்டு, மானோசாக்கரைட்ஸ் (Mono-saccharides) என்ற சில சர்க்கரை சம்மந்தமான பதார்த்தங்களாக மாறுகின்றன. பின்னர் இப் பதார்த்தங்கள், சிறு குடலில் மயிந்து கிடக்கும் சிறு சிறு உதிரக் குழாய்கள் வழியாக, கல்லீரலுக்கு (Liver)ப் போய், அங்கே, கிளிகஜான் (Glycogen) என்று சொல்லப் பட்ட ஒரு பதார்த்தமாக மாறி, கல்லீரலிலேயே தங்குகின்றன. கல்லீரலின் நிறையின் பத்திலொருபங்கு நிறைவரை யதில்த்தங்க இடமிருக்கின்றது. அதாவது சுமார் 1,500 கிராம் (Gram) இடை கல்லீரலிருந்தாலதில் 150-கிராம்வரை கிளிகஜான் தங்க இடமுண்டு. இவ்வாறு தங்கியிருந்து, தேகத்தின்கணுள்ள தசைநரம்பு முதலியவைகளுக்கு வேண்டிம்போதெல்லாம், இந்த கிளிகஜான், குளுகோஸ் (Glucose) என்ற சர்க்கரையாக மாறி, தசைகளுக்குச் செல்லுகின்றன. ஆகையால், நாம் சற்றுக் கவனித்துப் பார்ப்போமாகில், கல்லீரலை ஓர் பெரிய களஞ்சியத்திற் கொப்பிடலாம்.

ஒவ்வொரு நாளும் சாப்பாட்டிற்குச் சிறிது நேரத்திற்குப்பின் தேகபோஷணைக்கு முக்கியமாய்வேண்டிய பதார்த்தங்கள், பின்னுபயோகத்திற்காக இங்கு குவித்துவைக்கப் படுகின்றன. ஓர் விளக்கு நன்கு பிரகாசமாய் எரியவேண்டு

§ இதை மதுரகோளமென்றும் சொல்லலாம்.

மாயின், எவ்வாறு அதற்கு எண்ணை வேண்டுமோ அதே மாதிரியாக நம் தேகத்திலுள்ள தசை (Muscle) நரம்புகள் (Nerves) முதலிய பற்பலவுறுப்புக்களும் ஊக்கத்தோடுவேலை செய்யவேண்டுமாயின், அவைகளுக்கு, நாம் மேலே சொல்லிய குளுகோஸ், (Glucose) என்னும் சர்க்கரைவேண்டும், இச்சர்க்கரை, வேண்டும்போதெல்லாம் கல்லீரலிலிருந்து, (Liver) சிறிது சிறிதாகச் செல்லுகின்றது. எண்ணை, விளக்கிலெரியும் பொழுது நமக்கு பெவ்வாறு வெளிச்சத்தைக் கொடுத்துவிட்டு, கரிமலவாயு (Carbon Dioxide) வாயும் தண்ணீராயும் மாறிவிடுகிறதோ, அதேபோல குளுகோஸ், (Glucose) என்னும் சர்க்கரை ஜாடரூக்கினிபா லெரிக்கப்பட்டு, தேகத்திலுள்ள தசை, நரம்பு ஆகிய பலவுறுப்புக்களுக்கு சக்தி, உறுதி, உரம் (Energy) ஊக்கமிவைகளைக்கொடுத்து விட்டு, கரிமலவாயுவாகவும் (Carbon Dioxide) தண்ணீராகவும் மாறுகிறது.

இனி, எக்காரணத்தினாலாவது கல்லீரலில் கிளிகஜான் தங்கயிடமில்லாமற்போனாலாவது, அல்லது அளவிற்குமிஞ்சித் தங்கினாலாவது, அல்லது தசை, நரம்பு இவைகளிலுள்ள ஜாடரூக்கினி இச்சர்க்கரையை பெரித்து உபயோகப்படுத்திக் கொள்ள சக்திகுன்றியிருந்தாலாவது, அல்லது ஏராளமாகச் சர்க்கரைவருவதால் எவ்வளவுபயோகப்படுத்தியு மீந்துபோவதினாலாவது, தேவையில்லாத அல்லது உபயோகிக்காத சர்க்கரை தேகவுதிரத்திலிருந்து மூத்திரத்தோடுகலந்து வெளியாகிறது. சாதாரணமாய், ஒருமனிதன் தேகத்திலிருந்து உதிரத்தை பெடுத்துச் சோதனை செய்து பார்த்தால், அதில் நூற்றிற்கு 0.05-முதல் 0.15 வரை சர்க்கரைகலந்திருக்கும். நீரழிவு

வியாதியில் இவ்வளவிற்கு மீறி யுதிரத்தில் சர்க்கரையிருப்பதால், தேகத்திலுள்ள தசை, நரம்புகள் முதலியன அதை உபயோகப்படுத்தாமல் விட்டுவிடுகிறது. இவ்வாறு, சர்க்கரை வீணேபோவதால் தேகசக்தி குன்றி வியாதிகள் வெகு யெளிதாக அணுகி, குணமடைவதற்கு மார்க்கமில்லாமலும், பல வருடங்கள் பிடிக்கின்றன. தேகத்திற்குத்தக்க பலத்தையும் சக்தியையும். ஊக்கத்தையும் தருகின்ற மிகவும் முக்கியமாயுள்ள சர்க்கரையானது, தேகதசைகளினு லுபயோகிக்கப்படாமல் வெளியே சடுதியிற் செல்லுவதானது, ஓர் எண்ணையில்லாதீபமெரிவதற்கொப்பாகும். ஆகையால், நாம் நன்கு கவனித்தால், மதுமேகத்தினுற் பிடிக்கப்பட்டு வருந்தும் ஜனங்கள் நடைப்பிணங்களேயாவார்கள். அந்தோ பரிதாபம்! இனி, விவரமாக எக்காரணங்களினால் மதுமேகம் வருகின்ற தென்பதைப்பற்றிக் கவனிப்போம். இவை நான்குள்:—

மாவுபதார்த்தங்களை (Carbohydrates) அதிகரித்துண்ணல்:—

நமது தேகபோஷணைக்கு வேண்டியதற் கதிகம் உட்கொண்டால், இவை கல்லீரலிற் றங்கி அங்கும் நிறைந்தபின்னர் தேக உதிரத்திற் ப்ரவி மூத்திரம்வழியாக வெளியே வீணாவருகின்றன. தேகவுதிரத்தில் நூற்றில் 0.15-க்கு மேல் சர்க்கரை யிருக்கக்கூடாதென்று நாம்முன்னமே சொல்லியிருக்கிறோமல்லவா? இந்த அளவிற்கதிகம் சர்க்கரை உதிரத்திலிருந்தால் அதிகமாயுள்ள சர்க்கரை மூத்திரம் வழியாக வெளியாகிறது. இதற்கத்தாகியாக நாம் மாபதார்த்தங்களைச் சிறிது சிறிதாகக் குறைத்துக்கொண்டேவந்தால், மூத்திரத்திலுள்ள சர்க்கரையும் குறைந்து கொண்டேவரும்.

நரம்புமண்டலத்திலேதாவது

கேதேல்கள் வருவதினாலுண்டாவது:-

நரம்பு மண்டலத்தில் முக்கியமாக மெடல்லா (Medulla) என்று சொல்லப்பட்ட பிரதேசத்தில், ஏதாவது கட்டி (Tumour) அல்லது உதிரப்போக்கு (Haemorrhage) யேற்பட்டால், அப்பொழுது மூத்திரத்தில் ஏராளமாகச் சர்க்கரை வருகிறதென்று பல வருடங்களுக்கு முன்னரேயே அநேகர் அறிந்திருக்கின்றனர். ஆனால், இப்பிரதேசத்தில் ஆராய்ச்சி செய்ததில் முக்கியமானவர், கிளாட்பெர்னார்ட் (Claud Bernard) என்ற மேனாட்டு விற்பன்னராவர். மூளையின் கீழ்ப்பாகமாயும், முள்ளந்தண்டிற் (Vertebral column) குள்ளிருக்கும் மூளைக்கொடி (Spinal chord) யின் மேற்பாகம் அல்லது சுகரமாயுமிருக்கும் மூளையின் பகுதிக்கு மெடல்லா ஆப்ளாங்கேட்டா (Medulla oblongata) என்று பெயர். இப்பாகத்திற்கேதாவது வியாதிவந்தாலாவது அல்லது இதில் ஓர் துவாரஞ்செய்தாலாவது நீரழிவு வியாதி வருகிறதென்று பல சோதனைகள் செய்து கிளாட் பெர்னார்ட் என்பவர் கண்டிருக்கிறார். மற்றும் அவரது கொள்கையாவது, கல்லீரலிலிருக்கும் சர்க்கரை தேகத்தசைகளினுபயோகத்திற்கு வேண்டுமளவுமட்டும், போருமாறு இந்த மெடல்லா ஆப்ளாங்கேட்டா அனுமதி கொடுக்கிறதென்றும், மூளையின் இப்பாகத்திற்கடங்கியே கல்லீரலிருக்கிறதென்றும், இப்பாகத்திற்கேதாவது நெடுதல்களோ அல்லது நோயோ வந்தால், ஸாரதியில் லாக்குதிரைபோன்று கல்லீரலை யடக்கியாள, எஜமானனில் லாததால் சுயேச்சையாக ஏராளமான சர்க்கரை தேகவுதிரத்திற்கு வந்துவிடுகிறதென்றும் அச் சர்க்கரையே மூத்திரம்வழி

யாக வெளியே வருகின்றதென்றும் கருதுகிறார்கள். ஆனால் இம்மாதிரியான மதுமேகம் சம்பவிக்கிறது மிகவும்கொல்பமே. எனினும், இது ஒரு முக்கிய காரணமாகும்.

மதுரகோளம் அல்லது மதுரகோசம் அல்லது பான்கிரியாஸ் (Pancreas) என்று சொல்லப்படும்

ஓர் கோளத்திலேற்படும் மாறுதல்களினாலுண்டாவது:—

இதுவே மிகவும் முக்கியமான காரணமாகையால் இதை நன்கு கவனிக்கவேண்டும். மதுரகோளத்தில் ஓர் ஜீரணரசம் ஊறி, சிறு குடலிற்கு வருகின்றது. மா பதார்த்தங்களை ஜீரணிப்பிக்க இந்தஜீரணரசம் மிகவும் இன்றியமையாததாயிருக்கின்றது. விபாதியினாலாவது, அல்லது மற்றெக்காரணத்தினாலாவது இந்தரசம் ஊறிக்கலப்பது, தடைபட்டால், மூத்திரத்தில் ஏராளமாகச்சர்க்கரை வெளியாகிறது. இதையறியுமாறு, பல நியுணர்கள் நாயைப்பிடித்து, குளோரோபாரம் (Chloroform) கொடுத்து மயக்கம் வருத்தி அதன் மதுரகோளத்தை (Pancreas) வெளியேயெடுத்து அந்நாயின் மூத்திரத்தைச் சோதித்துப்பார்த்திருக்கிறார்கள். அப்பொழுது ஏராளமாகச் சர்க்கரை நீரிலிருக்கின்றது. மற்றும் இவ்விபாதியைப்போக்கடிக்கமுடியுமாவென்றறிய அனுதினமும், மற்றயநாய்களிடமிருந்தெடுத்த மதுரகோளத்தை யிதற்கு உண்ணக் கொடுத்ததில் விபாதி நீங்காமல் நீரில் சர்க்கரையிருந்து வந்தது. ஆனால், மதுரகோளத்தினொருதுண்டை யதன் இருப்பிடத்திலோ அல்லது அதற்கண்டையிலோ வைத்துத்தைத்து விட்டால் சிறிது நாட்களுக்குள் மூத்திரத்திலுள்ள சர்க்கரை குறைந்து முழுதும் மாறிவிடுகிறது. இதைக்கவனிக்குங்காலையில் மதுரகோளம் ஓர் சிறிய உறுப்பானபோதிலும்

அதன் அத்தியாவசியமும் அதன்முக்கிய உபயோகங்களும் நன்கு விளங்கவில்லையா? இதேமாதிரியாக, நீரழிவினாலிறந்த வர்களின் மதுரகோளத்தை யெடுத்து அணுதரிசிணி (Microscope) யினால் சோதித்துப்பார்த்தால் அது நிரம்பச் சுருங்கியும், மிருதுவாயில்லாமல் கரடு முரடாயிருப்பதையு மறியலாம். ஆகையால், இக்கோளத்திற்குக் கெடுதல் வருவதினாலேயே மதுமேக வியாதிவருகிறதென்று இதன் மூல மறியலாமல்லவா?

மற்றும் சிற்சில சில்லரைக்காரணங்களினாலும்

மதுமேகமுண்டாகலாம்:—

அவை 1. சில ஜூரங்களுக்குப் பின்னர்,

2. குளோரோபாரம் (Chloroform) ஈதர் (Aether) முதலிய போதை மருந்துகளைக் கொடுத்த பின்னர்.

3. மனப்பீதி அல்லது மனச்சடைவிற்குப்பின்னர் ஆகிய இவைகளாகும். ஆனால் மேலே சொல்லிய இம்மூன்று காரணங்களினாலுண்டாகும் மதுமேகம் சிறிது நாட்களுக்குப் பின்னர் குணமாகிவிடும். ஆகையாலிவைகளைப்பற்றிக் கவனிப்பது அவசியமாகும்.

மதுமேகமானது உலகத்திலெங்கணும் பரவியிருந்தாலும் முக்கியமாக இந்தியா, அயர்லாந்து, ஜெர்மனி ஆகிய இந்நா ன்கு தேசங்களிலும் மிகுதியாக ஜனங்களைப்பீடிக்கின்றது. இதற்குக்காரணம் இத்தேசத்தவர்கள் அதிகமாக மாபதார்த் தங்களை யுண்ணுவதேயாகும். இந்தியாவிலும் வங்காளத்தி லேயே இந்நோய் வெகு அதிகம். பரம்பரையாய் சில குடும் பங்களிலுமின்னொயிரங்கிலருவதுண்டு. ஆனால், இதுமிகவும்

சொற்பம், இவ்வியாதியாற் பீடிக்கப்படும் ஆண் பெண் ஆகிய யில்விருவகுப்போரின் துகையை நாம் கணக்கிட்டுப்பார்ப்போமாயின் ஆண்மக்களே யதிகம் பீடிக்கப்படுகின்றனர். அதாவது, மூன்று ஆண்மக்கள், இன்னொருவர் பீடிக்கப்பட்டால் பெண்களிருவரே பீடிக்கப்படுகின்றனர். இதற்குக்காரணம் ஆண்மக்கள் அதிகவேலை செய்வதாலும் மனக்கவலை யிவர்களுையே யதிகம் வாதிக்கின்றதாலுமேயாம். நல்ல செல்வவந்தர்களும், நல்ல புத்திமான்களுமே யில்வியாதியால் அநேகமாகப் பீடிக்கப்படுகின்றனர். செல்வமுள்ளோர், சதா உண்ணுவதும், உறங்குவதுமாய், யாதொரு வேலையோ அல்லது தேகப்பயிற்சியோ யில்லாமல் தங்களது தேகபேரடிக்கைக்குத் தேவையானதைவிடப் பன்மடங்கு உணவருந்துவதாலேயே அவர்களை இவ்வியாதிவெகுசுலபமாகப்பற்றிக்கொள்ளுகிறது. புத்திமான்கள், சதா மூளையையுபயோகித்து வேளாவேளைகளில் போதுமான உணவருந்தாமல், நரம்பு, மூளைமுதலிய வறுப்புக்கள் பலஹீனமடைந்து, சதா ஆழ்ந்தயோசனையிலேயே யிருப்பதாலெனிதில் மதுமேகத்திற்காளாகின்றார்கள். உதாரணமாக நாம் சர்க்கார் உத்தியோகஸ்தர்கள், வக்கீல்கள் முதலியோரை யெடுத்துக்கொள்வோம். இவர்கள் காலையிலெழுந்ததும் காப்பி பானமருந்தி, ஒன்பது மணிக்கு, வெகு பரபரப்புடன், சூடான தங்கள் மத்தியான போஜனத்தை விழுங்கி சடுத்தியில் இந்தியாவின் சீதோஷணத்திற்கு அடிகாதகனத்த பலவுடைகளை யணிந்து கச்சேரிக்கேசுன்றார்கள். அவ்வண் சென்றதும் சிறிதும் ஒழிவில்லாமல் தங்களுக்குறிய வேலைகளைச்செய்கின்றார்கள். பின்னர், ஒருமணி அடித்ததும் காப்பிகிளப்பன்றுசொல்லப்பட்ட, வியாதிகளைப்

பரவச்செய்கின்ற சாலைகளுக்குச்சென்று அங்கு பன்னாறுபுள்ள சிற்றுண்டியைப் புசித்துவிட்டு மீண்டும் இரண்மேணிக்கு ஆபீஸ்சென்று சாயங்காலம் ஐந்தல்லது ஆறுமணிக்குத் தங்கள் வீட்டிற்குத்திரும்புகிறார்கள். அந்தோ! இவர்களின் கதிஎன்ன? போஜனமருந்தியவுடனேயே வேலைகளைச்செய்வதால் ஜீரணக்கருவிகளுக்குப் போதுமான உதிரத்தில் ஒரு பகுதி மூளைக்குச் செல்லுகின்றது. இவ்வாறு செல்லுவதால் உணவு ஜீரணிக்காமல் அன்னகோசம், குடல்முதலிய விடங்கலிற்றங்கி, ஜீரணக்கருவிகளை சம்மந்தித்த அநேக வியாதிகள் உண்டாகின்றன. பின்னர், சிலவருடங்களில், சார்! எனக்கு டிஸ்பெப்ஸியா (Dyspepsia) விருக்கிறது, டயபிடீஸ் (Diabetes) இருக்கிறது என்று ஒருவருக்கொருவர் சம்பாஷிப்பதையும், இளவயதிலேயே கஷ்டமடைந்து விண்ணுலகேடுவதையும் நாம் அனுபவத்தில் பார்க்கலாம்.

நாம் இவ்வாறு மேலே சொல்லியதிலிருந்து எளியவர்களுக்கு ஒரு நாளும் இவ்வியாதி வறுதென்றல்ல. இவர்களுக்கும் மனக்கவலையினிமித்தமாகவாவது அல்லது மிதமிஞ்சி யுணவருந்துவதாலாவது இவ்வியாதிவரக்கூடும். ஆனால் இவர்களது தொகை மிகவும் சொற்பமேயாம்.

இவ்வியாதி இந்தியாவில் முப்பது வயதிற்கு மேல் ஐம்பது வயதிற்குள்ளேயே வருவது பெரும்பாலும் சகஜமாயிருக்கிறது. ஐம்பது வயதிற்கு மேலும் வரலாம். முப்பது வயதிற்குக்கீழாகவும் வருவதை நாம் அனுபவத்திற் பார்க்கலாம். தனவந்தர் வீட்டுக் குழந்தைகளுக்குக்கூட, மதுமேகம் வருவதுண்டு. ஆனால், எவ்வளவுக்கெவ்வளவு இளமையில்

இவ்வியாதி வருகின்றதோ, அதற்குத்தக்கபடி யதிகக் கஷ்டமும், அதிக துரிதமாக பிராணபத்தும் வருவது நிச்சயம்.

மதுமேகத்திற்குரிய சின்னங்கள்:—

நாம் சொல்லப்புகும் சின்னங்கள் திடீரென்றாவது அல்லது மெதுவாகவாவது ஆரம்பிக்கலாம்; ஆனால் திடீரென்று துவக்குவது மிகவும் துர்லபம். அவ்வாறாரம்பித்தால் சடுதியாகவே மாணம்சம்பளிக்கும். நூறு மேஸூரளில் 99-வரை, சின்னங்கள் இலேசாகத் துவக்கிப் பின்னர் நாளுக்குநாள் அதிகரித்துக் கொண்டேபோகும். பகலிலுமிரவிலும் பல தடைவைகள் மூத்திரவிஸர்ஜனம் செய்யவேண்டியிருப்பதை முதலாவது அறியலாம். அல்லது அதிகமான தாகத்தையுணரக்கூடும். மற்றும் சிலர் அதிக அசதியடைவதையும், தங்களுக்குறியவேலைகளை, பழையவூக்கத்துடன், செய்வதற்கு அசக்தியாயிருப்பதையு முணரக்கூடும். பின்னர், நாளுக்கு நாள் பசி, தாகமாகிய யிரண்டும்திகமாவதையும், எவ்வளவருந்தினபோதிலும், திருப்தியேற்படாமல், மீண்டுமருந்த வேண்டுமென்ற வேர் அவாவையும், நாளுக்குநாள் தேகம் இளைத்துக்கொண்டு வருவதையும் அறியலாம். இனி, ஒவ்வோர் சின்னங்களையும் தனித்தனியே கவனிப்போம்.

85902

தாகமானது, போஜனமருந்திய சில நேரங்களுக்குப் பின்னர் அதாவது சுமார் இரண்டுமணி நேரத்திற்குப் பிறகே யதிகமாகவிருக்கும். தாகம், எவ்வளவுக்கவ்வளவு அதிகமாயிருக்கின்றதோ, அதற்குத்தக்கபடி வியாதியும் பலமாயிருக்கிறதென்று நிச்சயித்துக்கொள்ளலாம். தேக உதிர்த்திற்கு

உபயோகப்படாமல் மீந்து கிடக்கும் சர்க்கரை, கரைந்து மூத்திரத்தோடு வெளியேவருவதற்கு ஏராளமாகத் தண்ணீர் வேண்டுமாதலாலேயேயுதிக தாகம் உண்டாகின்றதென்றும் பலராலும் கருதப்படுகின்றது. நாவிலுள்ள சதா வரண்டேயிருக்கும். உமிழ்நீர் (Saliva) மிகவும் சொற்பமாகவே ஊருகின்றது.

தேகசரீரம் அல்லது தோல் (Skin) உலர்ந்தும், மிருதுவாயும் பளபளப்பில்லாமலும் மரத்தின் பட்டை போன்று மிருக்கும். வியர்வை அபூர்வமாகவேயுண்டாகும். தேகமுழுதும் அல்லது மர்மஸ்தானத்தில் மாத்திரம் தினவுண்டாவது (அல்லது ஊறனுண்டாவது) சுகஜம்.

பசியதிகமாயிருப்பதால், சதா, சாப்பிட வேண்டியதாயிருக்கும். ஆனால், எவ்வளவுண்ணவருந்தினபோதிலும் தேகம் நாளுக்கு நாள் மெலிந்துகொண்டேவரும்.

மலச்சிக்கலும் (Constipation) ஒரு சுகஜமான சின்னமாகும். இடுப்பு வலி, கைகால்களில்வலி அல்லது உளைச்சலுமுண்டாவதுண்டு. நாடி சிறிது வேகமாயும், பலமாயுமடிப்பதையுணரலாம். தேக சிதோஷ்ணம், சாதாரணமாக யிருக்க வேண்டியதிலிருந்து, அதாவது $98\frac{1}{2}$ டிகிரிக்குச் சிறிது குறைந்தேயிருக்கும்.

இனி, மூத்திரத்தினளவு, குணம், அதன் சோதனைமுதலியவைகளைப்பற்றிச் சிறிது கவனிப்போம். மூத்திரம் ஏராளமாகவும், மஞ்சள் நிறமாகவோ அல்லது வேரெந்தநிறமாகவோ யில்லாமல் தண்ணீர் போன்று தெளிவாகயிருக்கும். சாதாரணமாக ஒரு மனிதன், ஒருநாளோக்கு 40-முதல் 50

அவுன்ஸுகள்வரை மூத்திரவிஸர்ஜனம் செய்யவேண்டும். இது ஒரு உத்தேசமான அளவேயொழிய உறுதியானதல்ல. ஏனென்றால், இந்த அளவு, நாம் பருகும் தண்ணீர், தேகவமைப்பு அதாவது அதிகம் வியர்க்கக்கூடிய தேகமாயில்லைபா, மற்றும் நாம் வசிக்குமிடத்தின் சீர்தாஷ்ணஸ்திதி முதலியவைகளைப் பெரும்பாலும் பவவாறுகப் பொருத்ததாயிருக்கிறது. எனினும், நாம் மேலே சொல்லிய 40-முதல் 50-அவுன்ஸுகளுக்கு, அதிகங்கூடவோ அல்லது குறையவேகூடாது, அவ்வாறு அதிகமாகக் கூடுதல் குறைதல் ஏற்பட்டால் ஏதோ வியாதியிருக்கிறதென்று அதையறியவேண்டும்.

மதமேகம் அல்லது நீரழிவு வியாதியில் ஒரு நாளை நிரையளந்து பார்த்தால் இந்த அளவைவிட நிரம்ப அதிகமாயிருக்கும். அதாவது 90 அவுன்ஸ் முதல் 500 அவுன்ஸுகள்வரை நீர்போவது சகஜம். பகலில் ஏழு அல்லது எட்டுத்தடவைகளும், இரவில் ஐந்தாறு தடவைகளும் நீர் கழியவேண்டியதாயிருக்கும். நீரினளவிலிருந்தே அநேகமாக நீரழிவுவியாதி யிருக்கிறதென்பதை நாம் எளிதிலறியலாம். மூத்திரம் தண்ணீரைப் போன்று தெளிவாயிருந்தபோதிலும் அதில் ஏராளமாகச் சர்க்கரை கலந்திருப்பதால் அதன் விசிஷ்டகுருத்துவம் (Specific Gravity) 1030-முதல் 1040-வரை இருக்கும். அதாவது தண்ணீரைவிட கனமுள்ளது. தண்ணீரின் விசிஷ்ட குருத்துவம் ஆயிரமென்றும், இதைப்போல ஒரு மூலஅளவு (Standard) அல்லது பரிமாணமாகவைத்து இதிலிருந்தே எவ்வளவு ஜாஸ்தி பளுவாயிருக்கிறதென்று பார்ப்பது வழக்கம். இதை யூரினமீட்டர் (Urinometer) என்னும் அளவு கருவியாலளக்கலாம். சாதாரணமாக

யாதொரு வியாதியுமில்லாதவர்களின் மூத்திரத்தின் விசிஷ்ட குருத்துவம் 1015-முதல் 1025-வரையிருக்கும். விசிஷ்ட குருத்துவம் பார்க்கவேண்டுமாயின், ஓர் உயரமாயிருக்கும் கண்ணாடி ஜாடியில் மூத்திரத்தை யூற்றி அதற்குள் யூரினா மீட்டரென்னுங் கருவியை மெதுவாகவிடவேண்டும். அப் பொழுது அக்கருவியானது ஒரு பாகம் மூத்திரத்துக்குள் னும், மற்றொரு பாகம் அதற்கு மேலாகவும் மிதக்கும். நீரின் மட்டத்திற்கு நேராக யூரினாமீட்டரிலெழுதியிருக்கும் தொகையை வாசித்தாலதுவே அந்நீரின் விசிஷ்டகுருத்துவமாகும்.

இனி, நிரில் சர்க்கரை யிருக்கிறதாவென்றறிய எவ்வாறு சோதிக்கவேண்டுமென்பதைக் கவனிப்போம். இதற்கு பேலிங்கு (Fehling) என்பவரின் முறையே யெளிதாயிருப்பதால் அதையே ஈண்டு குறிப்பிடுகிறோம். ஸோடா டார்ட்டரேட்டா (Soda Tartarata) கிரெயின் 332½, லைக்குவர் பொட்டாஸே (Liquor Potassae) அவுன்ஸ் 2½ இவை யிரண்டையுங்கலந்து ஒரு சீசாவில் 'ஏ', என்றடையாளம்போட்டுவைக்கவேண்டும். பின்னர், மற்றொரு சீசாவில் 'பி', என்றடையாளம்போட்டு, காப்பர்-ஸல்பேட் (Copper sulphate) அல்லது துத்தம் கிரெயின் 33½ சுத்தமான மழைத்தண்ணீர் அவுன்ஸ் 2½ இவையிரண்டையுங் கலந்துவைக்கவேண்டும். 'பி', அடையாளம்போட்ட சீசாவிலிருந்து ஒரு டிராழும், 'ஏ', அடையாளம் போட்ட சீசாவிலிருந்து 4-டிராழுமெடுத்து இரண்டையும் ஒரு டெஸ்ட் ட்யூபில் (Test tube) கலந்து சாராய விளக்கிற் காய்ச்சவேண்டும். இம்மருந்துகள் இரண்டையுங்கலந்ததும் நீலநிறமாகவிருக்கும். கொதிக்கும்பொழுதும்

நீலமாகவேயிருக்கும். கொதித்த பின்னர், மூத்திரத்திற் கொஞ்ச மெடுத்து டெஸ்ட் டியூப்பினுள் னூற்றவேண்டும். பிறகு மீண்டும் கொதிக்கவைத்துக் கீழே குளிரவைக்கவேண்டும். முன்னிருந்த நீலநிறத்தோடு கூடிய மருந்தானது, சிகப்பாகவோ, செங்கல் நிறமாகவோ அல்லது மஞ்சள் நிறமாகவோ மாறினால், நாம் சோதிக்கும் நீரில் சர்க்கரையிருக்கிறதென்று கண்டுகொள்ளவேண்டும். மூத்திரம் கலந்த பின்னரும் பழைய நீல நிறமே யிருக்குமாயின் மூத்திரத்தில் சர்க்கரையில்லைமென்று சொல்லலாம். மதுமேகமுள்ளவரின் நீரில் கட்டாயம் சர்க்கரையிருக்குமாதலால் இச் சோதனை செய்தால் உறுதியாக நிறம் சிகப்பாக மாறும். இனி, மூத்திரத்திலிருக்கும் சர்க்கரையினளவை யறியலாம். அதற்கு சாக்ரோமீட்டரெ (Sachrometer) ன்னுமோர் கருவியிருக்கிறது. இதன் மூலம் எவ்வளவு கிரெயின் சர்க்கரையிருக்கிறதென்றறியலாம்; ஆனால் அவ்வழி கடினமாதலால் இவ்வண் வரையாது விடுத்தனம். நிரழிவு ரோகஸ்தர்களின் மூத்திரத்தில் ஒரு அவுன்ஸுக்கு சுமார் 2 கிரெயின் முதல் 40, 50 கிரெயின்வரை சர்க்கரையிருக்கும். அதாவது ஒருநாளோக்கு 10-அவுன்ஸ் முதல் இரண்டு பவுண்டுவரை சர்க்கரை வெளியாகின்றன. சர்க்கரை எவ்வளவுக்கெவ்வளவு அதிகமாய் வெளியாகின்றதோ அவ்வளவுக்கவ்வளவு வியாதி உக்கிரமாயிருக்கிறதென்று அறிந்துகொள்ளவேண்டும்.

மதுமேகத்தினால் வரக்கூடிய சிற்சில வியாதிகள்:—

அதிசுழுத்தி அல்லது மயக்கம். (Coma)

மயக்கம் வருகிறதாயிருந்தால் அதற்கு முன் சிற்சில சின்னங்கள் தோன்றும். அவை அஜீர்ணம், மலச்சிக்கல்,

வயிற்றுவலி, மனவமைதியின்மை முதலியவைகளாகும் இச்சின்னங்கள் தோன்றினால், ஆபத்து சமீதில் வருகிறதென்று கருதி அதற்குரிய பரிகாரங்களை முன்னமேயே தேடவேண்டும். அவ்வாறு தேடாவிடில் பிராணாபத்து உறுதியாக சம்பவிக்கும். மயக்கம் முக்கியமாக மூவகைப்படும்:— அவை 1. திடமென்று சுவாஸமடைப்பேற்பட்டு, அதிக கஷ்டத்துடனும், பலமாயும், ஆழ்ந்த சுவாஸமிழுத்து வெழியே விடுவான். நைநாடியும் சிறிது சிறிதாக அசதியாகிக் கடைசியாக இறப்பான். அபூர்வமாக, சிலர், இதன் பின்னர் நித்திரையினின்றொழுவதுபோல் எழுந்திருப்பதுமுண்டு.

2. யாதொரு சுவாஸ அடைப்புமில்லாமல் தலைவலியிலாரம்பித்துப், பின்னர், நக்குளறி, சூடித்தவனுக்கு வருவது போல், மயக்கம் வந்து இறப்பதுமுண்டு.

3. ஏதாவது, ஒருகடினமான வேலைக்குப் பின்னர், பல வீனமடைந்து மயக்கம்வந்து கை கால்கள் குளிர்தும், நாடிநடை, ஊர்வது போலாகி, சுவாஸம் துரிதமாகச் சிறிதுநேரங்களுக்குள்ளிறப்பதுமுண்டு.

சர்மம் அல்லது தோலை யோட்டி வரக்கூடிய வியாதிகள்.

இவை முக்கியமாக, பிளவைகள், சிரங்குகள், சொறி, கரப்பான் ஆகிய இவைகளே தேகஉதிரத்தில் நிரம்ப சர்க்கரை யிருப்பதால், சர்மத்தின் பளபளப்பு, மிருதுத் தன்மையிவைகுன்றி, பிளவை, சிரங்குகள், வந்தாலெளிதில் குணமாகாமல் வெகுதூரம் நீடித்தே குணமாகின்றன..

அடிக்கடி நீர் கழியவேண்டியிருப்பதால் நீர்த்தவாரங்களிற் ஊரலாரம்பித்து சதா சொறிவதனால் வீக்கமடைந்து அதிகவலி யுண்டாவதுமுண்டு.

சுவாஸகோசம் அல்லது நுறையீரலை (Lungs) ச்

சம்மந்தித்த வியாதிகள்:—

குளிற் காற்றடிக்கும் சமயங்களில், வெளியே செல்லவா
வது அல்லது படுக்கவாவது செய்தால் வெகு சுலபமாக இரு
மல் இழுப்புமுதலிய வியாதிகள் பாதிக்கும். மற்றும் மது
மேகமுள்ளவர்களை யெளிதாகக் கூடியரோகம் (Pthisis) பீடிக்கி
ன்றது. இவ்விரண்டு ரோகங்களும் மனிதனைக் கரைக்கி
ன்ற வியாதிகளாகையால், மரணம் சடுதியில் சம்பவிப்பது
திண்ணம். மதுமேகத்தினால் பீடிக்கப்பட்ட மனிதர்களில்
மூன்றிலொரு பங்கு கூடியரோகத்தினால் பீடிக்கப்பட்டு மரிக்
கின்றார்கள்.

நரம்பைச் சம்மந்தித்த வியாதிகள்:—

முக்கியமாக மனவமைதியின்மை, கைகால்களில் உளைச்
சல், இடுப்புவலி, பலக்குறைவு, மனக்கலேசம், நேத்திர
ரோகம் ஆகிய இவைகளே. மற்றும், வீரியவிருத்தி நாளுக்கு
நாள் குறைந்துவிடும். கண்களில் ஒரு விதமான பூப்படர்ந்து
பார்வை மங்கிவிடும். கடைசிபாகப் பார்க்குமளவில் எந்த
வியாதியும் மதுமேகமுள்ளவர்களை யெளிதிற் பீடிக்கும். அவ்
வியாதி குணமடைவதற்கும், பலநாட்கள் பிடிக்கும்.

சிகிச்சை.

முதன்முதலாக மதுமேகமுள்ள ஒருவன் கவனிக்கவே
ண்டியதென்ன வென்றால், ஒருபொழுதும் மனக்கவலை, வீண்
தொந்திரவு, முதலியவைகளில்லாமலும், கோபம், அதிகத்

துக்கம் அல்லது சந்தோஷம், முதலியவையில்லாமலும் சதா மன ஊக்கத்தோடும் சாந்தியோடுமிருக்கவேண்டும். இவ்வாறில்லாது திடீரென்று மனக்கலேசமோ அல்லது பயமோ ஏற்பட்டால், வியாதி நாளாகுநாள் அதிகப்பட்டு சீக்கிரம் மரணம் சம்பவிக்கும். ஆகையால் எது வந்தபோதிலும் மனோ நிலையைத் தவிரவிடாது மனவுறுதியுடனும், மனவமைதியுடனும், மிருக்கவேண்டிவது மிகவும் அவசியமாகும். இதற்கு அத்தாக்ஷியாக சிலருக்கு, மதுமேகமிருந்தபோதிலும் அதைக் கவனியாது தங்களுக்குறியவேலைகளைச் சரிவரச்செய்து வருகின்றார்கள். இவர்களது மூத்திரத்தைப் பரிசோதித்து, சர்க்கரையிவ்வளவிருக்கிறதென்று சொன்னால் அன்றயதினமுதல் மன யேக்கத்தினால் நீர்திகம் போவதையும், அதில் சர்க்கரை ஏராளமாகயிருப்பதையும் அனுபவத்தில் நாம் பார்க்கலாம். ஆகையால் எக்காரணத்தினாலாவது, மதுமேகவியாதி யுடையவனுக்கு மனப்பீதிபடையுமாறென்றும் சொல்லவே கூடாது. வியாதி எவ்வளவு பலமாயிருந்தாலுஞ்சரி, சீக்கிரம் குணமாகுமென்றும் விசேஷ பயமில்லையென்றுமே அன்னவர்களிடம் சொல்லவேண்டும். இவ்வாறு சொல்லிவிட்டு வியாதியைப்பற்றிய உண்மையான விஷயங்களை வியாதிபஸ்தருக்குக் கிட்டிய பந்துக்களிடம் சொல்லிவிடவேண்டும். தேகம் ஸ்தூலித்திருந்தாலாவது, அல்லது தாய் தகப்பன், பாட்டன் முதலியவர்கள் மதுமேகத்தினால் பீடிக்கப்பட்டிருந்தாலாவது, அன்னவரது வாரீசுகள், மாபதார்த்தங்கள், மிட்டாய் முதலிய இனிப்புத் தின்பண்டங்க ளிவைகளைக் குறைத்தே யுபபோகிக்கவேண்டும்.

மதுமேகமுள்ளவர்களனுதினமும், காலையிலெழுந்து, குறைந்தது ஒருமைலாவது வெளியேசென்று, பின்னர் சுத்தஜலத்தில் ஸ்நானஞ்செய்து, தங்களுக்குறிய உணவுகளை மிதமாக உண்ணவேண்டும். பின்னர், தங்களுக்கேற்பட்ட கடினமற்ற வேலைகளைச் செய்யலாம். ஒரு மாதத்திற்கொரு முறை, சர்மத்தின்கணுள்ள, துவாரங்களைத் துலக்குவதற்காக நீராவிஸ்நானம் (Turkish Bath) செய்யவேண்டும். மாதாமாதம் தேகத்தை நிறுத்துப்பார்த்து கனம் குறைகிறதா அவ்வாறு குறைந்தால் எவ்வளவு குறைகிறது என்றும் கவனிக்கவேண்டும். இவ்வியாதியைச் சமனப்படுத்த அல்லது குறைக்க முக்கியமாக நாம் செய்யவேண்டியது, நமது சாப்பாட்டைநிர்ணயம்பண்ணி எதைத்தள்ளவேண்டுமோ அதைத் தள்ளுவதேயாகும். இவ்வாறு செய்வதற்கு முக்கியமாக யிரண்டுமுறைகளுள். அவை:—

1. ஒவ்வொரு நாளும் சிறிதுசிறிதாக மாபதார்த்தங்கள் இனிப்புப்பண்டங்கள் முதலியவைகளைக்குறைத்துக்கொண்டே வா வேண்டும். இதேசமயத்தில் அனுதினமும் முத்திரத்திலிருக்கும் சர்க்கரையினளவை சோதிக்கவேண்டும். என்றையதினம் நீரில் சர்க்கரையிலையோ, அன்றையதினம் முதற்கொண்டு, சோதனை செய்ததினத்திற்கு முந்தினநாட் செய்த ஆகாரத்தையே ஒழுங்காகவும், கூடிக்குறையாமலும் சாப்பிட்டுவரவேண்டும். பின்னர், ஒருமாதஞ்சென்றதும், ஒவ்வொருநாளும்மாபதார்த்தங்களைச்சிறிதுசிறிதாகக்கூட்டிக்கொண்டேவரவேண்டும். இதேகாலத்தில் நீரையும் அனுதினமும் சோதித்துவரவேண்டும். இவ்வாறு மாபதார்த்தங்களை யதிகரித்துக்கொண்டே வந்தால் இதுவரை நீரில் சர்க்கரை

யில்லாதது மாறி, ஒருநாள் நீரில் சர்க்கரை வரும். அதற்கடுத்த மறுதினம், மாபதார்த்தங்களைச் சிறிது குறைக்க, சர்க்கரை மாறியும். மேலேசொல்லியபடி அனுபவத்தின்பார்த்தபின்னர், மாபதார்த்தங்களில்வளவுதான் சேர்க்கலாமென்று நன்கு தெறிந்து விடுமாதலால், அதன் பின்னர் அதேயளவுள்ள ஆகாரங்களை, ஆயுள்வரை புதிக்கலாம். இதே மாதிரி ஒவ்வொருவரும் தத்தம் தேகத்திற்கொத்தபடி பரிசீலனை செய்து ஆகாரவகைகளையும், அதனளவையும் நிதானம் பண்ணிக்கொள்ளவேண்டும்.

ஆகையால், இவ்வியாதியைச் சமனப்படுத்த உபாயங்கள் அவசரம் கையிலேயே யிருப்பதா லதையறிந்து அனுஷ்டானத்திற்குக் கொண்டுவரவேண்டியது மிகவும் அவசியமாகும்.

2. இனி, மதுமேகத்தைச் சமனப்படுத்த மற்றொரு முறையுமுண்டு. இதுவும் மேலே சொல்லியதுபோல், போஜனத்தை நிர்ணயப்படுத்துவதேயாகும். இம்முறை கீழ்வருமாறு:—

நோயாளியைப் படுக்கையிற் படுக்கவைத்துப் பட்டினி போடவேண்டும். அடிக்கடி தண்ணீர் ஏராளமாகக் கொடுக்கலாம். ஒவ்வொரு நாளும் நீரைச்சோதனைசெய்யவேண்டும். எத்தனை நாட்கள் பட்டினியாயிருந்தால் நீரில், சர்க்கரை முழுதும் மாறியிகெறதோ அத்தனை நாட்கள்வரை பட்டினியாயிருக்கும்படி செய்வவேண்டும். அதாவது சுமார் இரண்டு நாட்களிலிருந்து ஐந்தா நாட்களுக்குள் சர்க்கரை முழுதும் மாறியும், சர்க்கரை மாறிய தினத்தன்றுமுதல் பட்டி

னியை நீத்துச் சிறிது சிறிதாக ஆகாரங்களை யுட்கொள்ளக் கொடுக்கவேண்டும். பின்னர் ஒவ்வொரு நாளும் ஆகாரங் களையதிகரித்துக்கொண்டே போகவேண்டும். இவ்வாறு செய் யும்பொழுது நீரில் சர்க்கரை வந்தால் ஆகாரங்களை நிறுத்தி ஒருநாள் பட்டினிபோடவேண்டும். பட்டினியின் பின்னர் சர்க்கரை மாறிவிடுமாதலால் மீண்டும், ஏற்பட்ட ஆகாரங்களை உண்ணலாம். இவ்வாறு பலதடவைகள் சோதித்துப்பார்த் தால் இன்ன ஆகாரங்களை இவ்வளவு சாப்பிட்டால் நீரில் சர்க்கரை வராதென்று தெரிந்துவிடுமாதலால் அதன் பிறகு ஒரு கணக்காக ஆகாரங்களை சாப்பிட்டுக்கொண்டு வரலாம். நாம் மேலே சொல்லியவாறு ஆகாரத்தை நிர்ணயஞ்செய்து அதன்படி புசித்துவந்தால், வியாதிசமனமாகி நீழீழிவாழலாம்.

இதைக்கருதியே நமது முன்னோர்கள் ஒவ்வொருமாதத் திலும் சிற்சிலநாட்கள் உபவாசமிருந்து வந்திருக்கிறார்கள். நாம், எவ்வாறு வேலைகளைச்செய்த பின்னர், களைப்பாறச் சிறிதுநேரம் படுக்கறோமோ, அதேமாதிரியாக, ஓயாமல் வேலைசெய்துகொண்டிருக்கும் ஜீரணக் கருவிகளுக்கு, மாதத் தில் ஒருநாளாவது ஓய்வுவேண்டாமா? இதை ஒருவரும் சரி யாகக்கவனிக்கிறார்களில்லை! சிலர், உபவாசமிருப்பதாகச்சொ ள்லிக்கொண்டு, தினசரி உட்கொள்ளுமுணவைவிடப் பன் மடங்கதிகபோஷணையைத் தரக்கூடியதாயும், எளிதில் ஜீர ணிப்பிக்கக்கூடாததாயுமுள்ள, பலகாரங்களைச் செய்து அன்று புசிக்குகின்றார்கள். அந்தோ! அன்னவர்களது மூடத் தனத்தை நாம் என்னென்று சொல்வது!

இனி, மதுமேகவியாதியஸ்தர்கள் சேர்க்கக்கூடிய பதார்த்தங்களையும், விலக்கவேண்டிய பதார்த்தங்களையும் கீழ்வரும் அட்டவணையினாலறியலாம்.

சேர்க்கக்கூடிய பதார்த்தங்கள்:—

1. கோதுமை, கேப்பை முதலிய தானியங்களையுபயோகிக்கலாம்.
2. சாம்பார், ரசமுதலியவைகள் சேர்க்கலாம்.
3. பருப்பு, உளுந்து இவைகளையும் சேர்க்கலாம்.
4. மாமிசவகைகள், [கல்லீரலை(Liver)த்தவிர] மற்றவை சேர்க்கலாம்.
5. முட்டை, (Egg) சேர்ப்பதனால் அனுகூலமுண்டு.
6. வெண்ணை, நெய், எண்ணை இவை ஏராளமாகச் சேர்க்கலாம்.
7. தயிர் நிரம்பச்சேர்க்கலாம். தயிர் எவ்வளவுக்கெவ்வளவு அதிகம் உபயோகப்படுத்துகிறோமோ அவ்வளவுக்கவ்வளவு அனுகூலமுண்டு.
8. தேயிலை, காப்பிமுதலிய பானங்கள் பாலில்லாமல், சர்க்கரைக்குப்பதில் சாக்கரையின் (Sacharin) மாத்திரைபைச் சேர்த்துக்கொண்டு, மிதமாக உபயோகிக்கலாம்.
9. காய்கறிகளில், கத்திரிக்காய், கொத்தவரைக்காய், அவரைக்காய், பின்ஸ் முருங்கக்காய், பாலைக்காய், வெண்டங்காய், மற்றும் கீரைத்தினுசுகளும் உபயோகிக்கலாம்.
10. பழவகைகளில் ஆரஞ்சு, எலுமிச்சை, திராசை முதலிய பழங்களும், வாதுமைப் பருப்பும் சாப்பிடலாம்.
11. இளநீர் ஏராளமாகக்குடிப்பதால் அதிக அனுகூலமுண்டு.

விலக்கவேண்டிய பதார்த்தங்கள்:—

1. சர்க்கரைப்பண்டங்களையும், மாபதார்த்தங்களையும் (Carbo-Hydrates) அறவேயொழிக்கவேண்டும்.
2. ஆரிசியை கூடுமானவரை குறைக்கவேண்டும்.
3. மாமிசபதார்த்தங்களில் கல்லீரல் (Liver) மாத்திரம் சேர்க்கக்கூடாது.
4. கடையில்லிற்கும் ரொட்டியில் ஏராளமாக மாவு (Starch) இருப்பதால், ரொட்டி பிஸ்கொத்து முதலியவைகள் சாப்பிடக்கூடாது.
5. ஜவ்வரிசி (Sago) ஆரோட்மா இவைகள் சேர்க்கக்கூடாது.
6. பால் சேர்க்கக்கூடாது.
7. கொக்கோவென்னும் பானம் உபயோகப்படுத்தக் கூடாது.
8. காய்கறிகளில், உருளைக்கிழங்கு, வாழைக்காய், சேனை, சேப்பங்கிழங்கு, வெங்காயம், (Onions) முதலியவைகள், முக்கியமாகச் சேர்க்கக்கூடாது. பூசனிக்காய், சீமைத்தக்காளி (Tomatoes) முதலியவைகளையும் விலக்குவது நலம்.
9. மாம்பழம், ஆப்பிள், (Apple) வாழைப்பழம் முதலியவைகள், சாப்பிடக்கூடாது.
10. கள், சாராயம், மதுமுதலியவைகளையும் அறவேயொழிக்கவேண்டும்.

சாதாரணமாக, பலத்த நீரழிவு வியாதியோடு கூடிய ஒரு வருக்கு, ஒருநாளேக்கு வேண்டிய உணவின் அளவாவது:—

- (a) மாபதார்த்தங்கள் (Carbo Hydrates) 15-கிராம்.
- (b) ஊனுணவு அல்லது மாமிசம் (Proteins) 80-கிராம்.
- (c) நிணபதார்த்தம் அல்லது தைலபதார்த்தங்கள் (Fats) 200-கிராம் ஆகிய இந்த அளவேயாகும்.

இனி, இவ்வியதிக்குக்கொடுக்கக்கூடிய மருந்துகளையும், அவைகளின் அளவுகளையும், எம்மாதிரி கொடுக்கவேண்டுமென்பதைப்பற்றியுங்கவனிப்போம்.

அபின் சேர்ந்த எந்த மருந்துகளைக்கொடுத்தாலும், நீரினளவு, சர்க்கரையினளவு இவை குறையும். ஆனால், அபின் மலச்சிக்கலையுண்டாக்குமாதலால் அதை, நன்குபேதியாகும், மருந்துகளோடு சேர்த்தேகொடுக்கவேண்டும். அபினை (Opium) வீட, கொடியா (Codea) வென்னும் அபின் மருந்து, நிரம்பவும் மேலானது. ஏனெனில், இதற்கு மலபந்தஞ்செய்கிற குணம் கிடையாது. முதலாவது ஒருநாளேக்கு $\frac{1}{2}$ கிரெயின் கொடின் பாஸ்பேட் (Codein Phosphate) வீதம் துவக்கி, மெள்ள மெள்ள 6—கிரெயின் வரை கூட்டிக் கொண்டு போகலாம். பின்னர், அதாவது, நீரிலுள்ள சர்க்கரை நன்கு குறைந்தபிற்பாடு இந்த மருந்தை நிறுத்திவிடலாம்.

R/

Codein Phosphate.	gr. iss.	கொடின் பாஸ்பேட்.	கி. 1 $\frac{1}{2}$
Sachrum Lactis.	gr. xx.	சாக்கிரம் லாக்டிஸ்.	கி. 20

இதை நன்கு கலந்து மூன்றுபொடியாகச் செய்து ஒரு நாளேக்குச் சாப்பிடவும்.

R/—

Lithii Carbonatis	gr. v.	லிதியை கார்பானாடிஸ்	கி. 5
Sodii Arsenatis	gr. ss.	சோடை ஆர்ஸினாடிஸ்	கி. $\frac{1}{2}$
Ext. Gentianae	gr. x.	எக்ஸ்ட்ராக்ட் ஜென்ஷியன்	கி. 10

பத்து மாத்திரைகளாகச் செய்து, காலை ஒருமாத்திரை, மாலை ஒருமாத்திரைவீதம், மூத்திரத்தில் சர்க்கரை மறையும் வரை சாப்பிடவேண்டும்.

R/—			
Tr. Opii	... m. xv.	டிங்சர் ஒபியை	து. 15.
Liqr. Arsenicalis	m. xii.	லிக்வர் ஆர்ஸனிகாலிஸ்	து. 12.
Tr. Cardamom Co dr.	i.	டிங்சர் கார்டமம் கோ திரும்.	1.
Aqua ad	oz. iii.	அக்குவா	அவுன்ஸ் 3.

ஒருநாளைக்கு மூன்று வேளையாகச் சாப்பிடவும். ஆண் டிபைரின (Antipyrin) யுரேனியம் நைட்ரேட் (Uranium-Nitrate) புரோமைட்ஸ் (Bromides) முக்கியமாக தோல்ட் புரோமைட் (Gold Bromide) இவைகளைக் கொடுத்துப் பார்க்கலாம்.

மதுரகோளத்தின் (Pancreas) ஸத்தைக்கொடுத்துப் பார்க்கலாம்.

நவ்வல்புழத்தின் கொட்டைபைச் சூரணித்துக் கொடுக்கலாம்.

மற்றும் ஆயுர்வேத முறைப்படி, அப்பிரேகபஸ்பம், செந்தூரமிவைகளும், சிலாஜத்தின் பஸ்பமுதலியவைகளும், முறைப்படி செய்துகொடுக்க வியாதிதீரும்.

டாக்டா டயாஸ்டேஸ் (Taka Diastase) என்னும் மருந்தை போஜனமானதும் உபயோகித்தால், யாதொரு கெடதியும் வராமல், மாபதார்த்தங்களை (Carbo Hydrates) நிறம்பச்சாப்பிடக்கூடும்.

தாகத்தைச்சமனப்படுத்துவதற்கு ஆலிட் பாஸ்பாரிக் டைலூட்டம் (Acid Phosphoric-dilutum) ஐந்து துளிகள் வீதம் சாப்பிடலாம். இளநீரும் சாப்பிடல் நலம்.

இப்பொழுது, புதிதாக, டோராண்டோ யுனிவர்ஸிட்டி டிஸி (Toranto University) இன்ஸ்லின் ட்ரீட்மென்ட் (Insulin treatment) என்று ஒருமுறை டாக்டர் பாண்டிங்

(Doctor Banting) என்பவர் கண்டுபிடித்திருக்கிறார். அதாவது ஆடு, மாடு, பன்றி முதலியவைகளின் மதுரகோளத்தை (Pancreas) யெடுத்து அதனின்றும் ஓர்வித சத்து (Extract) எடுத்திருக்கிறார்கள். இம்மருந்தை உள்நுக்குக்கொடுத்தால் அவது அல்லது ஊசிகுத்தியிறக்கினாலவது, மதுமேகவியாதி நன்கு குணப்பட்டு விடுகிறதாம்.

இதன், உண்மையையும், குணகுணங்களையும் நன்கு அறிவதற்காக, பல பிரபல டாக்டர்களடங்கிய ஒரு கமிட்டியை நமது கவர்ண்மெண்டார் நியமித்திருக்கிறார்கள். அவர்களும் நிரம்ப ஊக்கத்துடன் சோதனை செய்துவருகின்றார்கள். கூடிய சீக்கிரத்தில் அம்முறை, யாவருக்கும் உபயோகப்படும்படி வெளியிடப்படும்.

அதிசுழுத்தி (Coma) யின் சிகிச்சை:—

இதற்குரிய சின்னங்கள் தோன்றினால், ஏராளமாக ஸோடா பைகார்பை (Sodi Bi-Carb) உள்நுக்குக்கொடுக்க வேண்டும். அதிசுழுத்தி (Coma) பலத்துவிட்டால் 1 அல்லது 2-பெர்ஸன்ட் ஸோடா பைகார்பையும், நார்மல் ஸலைன் (Normal Saline) என்று சொல்லுகிற உப்பு ஜலத்தையுங்கலந்து கைநாள் (Vein) த்திற்குட் செலுத்தவேண்டும். மற்றும், மலச்சிக்கல் சகஜமாயிருக்குமாதலால், உப்பு பேதிகள் எதாவது கொடுக்கவேண்டும்.

நாம் மேலே சொல்லிய சிகிச்சைகளிலெல்லாவற்றிலும் மிகவும் முக்கியமானது போஜன நிர்ணயமேயாம். ஆகையால் அதைச்சரிவர அனுசரித்தபின்னரே, மருந்துகளை யுபயோகித்தல் நலம்.

85902

L29346
N25

