

64.53639

T. 12787

GOD SPEED THE PLOUGH.

விவசாயவேட்டி.

அ. சேதுபாமையார்

FIELD AND GARDEN CROPS OF MADRAS

A. SETUPAMA AIYAR.

*Dipl. in Agr. Sci. (Hon. Dist.) - Mannargudi - Tanjore District.*

REVISED EDITION BY

DEWAN BAHADUR R. RAGUNATHA ROW.

.....

தமிழ்நாடு :

ஜி. எ. நே. ச. கம்பனியார்.

1908.

*All Rights Reserved.*

பேர்டீபு பைண்டு ந 1-4-0. கால்கோ பைண்டு ந 2.







# SOME SELECT OPINIONS.

---

The Tamil work on Agriculture by Mr. A. Seturama Iyer of Nidamangalam is, in my opinion, a most valuable and timely publication. He has devoted many years to the study of the subject and his practical knowledge cannot but enhance the value of the work. The publication has been with him a work of love, and it is to be hoped that it will prove not a source of pecuniary loss. I wish the publication every success.

ORATOR,

S. SUBRAMANIAN,

13—1—08.

*Judge, High Court.*



I have seen the work on Agriculture and Horticulture written by M. R. Ry. A. Seturama Iyer. It is a very useful book, not only to the Agriculturist but to every Revenue Officer who has anything to do with land. It is written in easy Tamil and illustrated with several pictures. Though the subjects are briefly treated, the work has become a bulky one containing very useful information which every landowner ought to know. M. R. Ry. A. Seturama Iyer has rendered a valuable service to the Agricultural public. I hope it will meet with such patronage from the public as would induce him to publish many more works of the description.

KUMBAKONAM,  
2—12—07.

R. RAGOONATHIA ROW.



I have seen the advance sheets of Mr. A. Seturama Iyer's Tamil work on Field and Garden Crops. It is written in a very easy, popular style and is full of information which, I think, must be very valuable to the Agriculturist. Himself a landowner of considerable experience, he has also freely utilized the information available in the latest agricultural publications. Large numbers of the educated classes desire to invest in land but do not possess the requisite technical knowledge to make themselves successful Agriculturists. To persons of this class as well as to members of the Agricultural classes, Mr. Seturama Iyer's book ought to be welcome. The publication of popular hand-books like this on a subject of vital importance to the country deserves encouragement.

MYLAPORE,

2—1—08.

P. S. SIVASWAMY AIYER,

*Advocate-General.*



The book is the first of its kind in Tamil. It is written in easy Tamil and deals with the methods of cultivation, &c., of the different field and garden crops of the Presidency, and gives suggestions here and there for improved methods for raising the crops, which are brought home to the minds of readers by illustrations which are fairly well depicted. The book will be a useful guide to every one interested in Agriculture. The author deserves every support.

T. V. NARAYANA ROW,

*Farm Manager,*

S. H. D'SILVA,

*Govt. Farm, Saidapet.*

*Ag. Vice-Principal,*

28—1—08.

*College of Agriculture, Madras.*

28—1—08.



Written in no pedantic Tamil, and well illustrated, the book should be welcome as it is calculated to spread the knowledge which is so necessary to our people. It would be very useful in the hands of the rural school master in serving to fix correct ideas on matters of every-day interest as food grains and oil seeds in the minds of the pupils. As to the usefulness of the book in the hands of landowners and cultivators, there can be no two opinions.

Mr. Seturama Iyer deserves all encouragement in the good work to which he has devoted himself.

TRIPPLICANE,  
4--1--08.

K. B. RAMANATHAN,  
*Lecturer, Pachaiyappa's College.*



# நற்சாட்சி பத்திரங்கள்.



கிருஷ்ண விஷயமாகத் தாரிழி ல் நீடாமங்கலம் மீஸ்டர்  
அ. சேதுராமையரால் எழுதப்பட்டிருக்கிற புத்  
தகம் என்னுடைய அபிப்பிராயத்தில் மிகவும் அருமை  
யானதும் நல்ல சமயத்தில் வெளி வந்ததுமா யிருந்  
கிறது. அந்த சாஸ்திரத்தில் அவர் வெகு வருஷங்  
களாக பயின்றிருக்கிறார். அவருடைய அனுபவக்  
ஞானமும் இந்தப் புத்தகத்தின் மதிப்பை அதிகப்  
படுத்தாமல் போகமுடியாது. கிருஷ்ண விஷயத்தில்  
ஆசை மேம்பாட்டினால் எழுதப்பட்ட இப்புத்தகம்  
திரவிய நஷ்டத்துக்கு ஹேதுவாகாதென்றும் நம்புகி  
றேன். இப்பிரசுரம் நன்கு நின்னுலவப் பிரார்த்திக்  
கிறேன்.

ஓரத்தூர்,  
13-1-08.

எஸ். சுப்பிரமணிய அய்யர்.

மாஜி ஹைகோர்ட்டு ஜட்ஜ்.



ம-ந-ந-ஸ்ரீ சேதுராமையரால் விவசாய விஷயமாக எழுதப்பட்டிருக்கிற புத்தகத்தைப் பார்வையிட்டேன். அது விவசாயிகளுக்கேயன்றி, நிலவிஷயமாய் சற்றேனும் சம்பந்தப்பட்ட ஒவ்வொரு ரெவினியூ உத்தியோகஸ்தர்களுக்கும் மிகவும் பிரயோஜனமுள்ளது. அது எளிய தமிழ் நடையில் எழுதப்பட்டு பல படங்களால் விளக்கப்பட்டிருக்கிறது. விஷயங்கள் சுருக்கமாய் சொல்லப்பட்டிருந்தாலும் புத்தகம் பருத்து ஒவ்வொரு நிலச்சுவான் தாரருக்கும் முக்கியமாய்த் தெரிய வேண்டிய உபயோகமுள்ள சங்கதிகளே ஆடங்கியதாயிருக்கிறது. கிருஷிகர்களுக்கு ம-ந-ந-ஸ்ரீ சேதுராமையர் ஒரு உயர்ந்த உபகாரத்தைச் செய்திருக்கிறார். இத்தகைய புத்தகங்கள் இன்னும் பலவற்றை அவர் வெளியிடுமாறு இதைப் பலரும் பெரிதும் ஆதரிப்பார்களென்று நம்புகிறேன்.

சும்பகோணம்,

12-2-07.

ஆர். ரெகுநாதராவ்.

திவான்பகதூர்.



நன்செய், புன்செய் தோட்டக்கால் பயிர்களைப்பற்றி  
**அ சேதுராமையர்** தமிழில் எழுதியிருக்கிற புத்  
தகத்தைப் பார்வையிட்டேன். அது மிகவும் எளிய  
வழக்கு நடையில் எழுதப்பட்டிருக்கிறது. பிரசு  
தார்களுக்கு மிகப் பிரயோசனமான சமாசாரங்கள்  
அதில் நிரம்பியிருக்கின்றனவென்று நான் எண்ணு  
கிறேன். அவர் மிகுந்த அனுபோகசாலியான பிரசு  
தாராயிருப்பதன்றிச் சமீபகாலத்தில் வெளியாகியிருக்  
கிற பல விவசாய பிரசுரங்களிலிருந்து கிடைத்த  
அநேக சங்கதிகளையும் அதிகமாகப் பிரயோஜனப்  
படுத்தியிருக்கிறார். உயர்தரக் கல்வியில் தேர்ச்சி  
பெற்றவர்களில் அநேகர் பூமியில் பணத்தைப்போட்டு  
விருத்திபண்ணப் பிரியமுடையவர்களாகயிருந்தும் தங்  
களை லாபமடையக்கூடிய விவசாயிகளாக்கிக்கொள்வ  
தற்கு அவசியமான சாஸ்திரஞானம் இல்லாதவர்களா  
யிருக்கிறார்கள். இத்திறத்தாருக்கும் குடித்தனக்காரர்  
களுக்கும் ம-ள-ளஸ்ரீ அ. சேதுராமய்யருடைய புத்த  
கம் நிரம்ப அவசியம். நம்தேசத்திற்கு மிகவும் முக்கிய  
மான இவ்விஷயத்தைப்பற்றி எழுதப்படும் இவ்வித  
சுலபமான சிறு புத்தகங்கள் நன்கு ஆதரிக்கப்பட  
வேண்டியவையே.

மைலாப்பூர், பி. எஸ். சிவசுவாமி அய்யர்.

2-1-08.

அட்வகேட் ஜனரல்.



இவ்விதமாய்த் தமிழில் இதுவே முதலில் எழுதப் பட்ட புத்தகம். இது எளிய தமிழ்நடையில் எழுதப் பட்டிருக்கிறது. அது சென்னை இராஜதானியிலுள்ள நன்செய், புன்செய், தோட்டக்கால் பயிர்களின் சாகுபடிகளின் வகைகளைப்பற்றிச் சொல்லுகிறது. நூதன விவசாயமுறைப்படி பயிர்களை உண்டாக்கவேண்டிய வழிகளைப் பல இடங்களிலும் காண்பித்திருக்கிறார். இவைகள் பாடிப்பவர்களுடைய மனத்தில் நன்றாய்ப் பதியும்படி நன்கமைந்த பாடங்களால் விவரிக்கப்பட்டிருக்கின்றன. விவசாயத்தில் ஊக்கமுள்ள ஒவ்வொரு வருக்கும் இது நல்ல பற்றுக்கோடாயிருக்கும். நூலாசிரியர் எல்லாருடைய சகாயத்துக்கும் அருகராயிருக்கிறார்.

சென்னை விவசாயக்காலேஜ், எஸ். எச் டிசில்வா,

28-1-08. ஆக்டிங் உதவி அக்கிரசனாபர்,

சைதாப்பேட்டை பாரம், டி. வி. நாராயணராவ்,

28-1-08. மாணேஜர்.



நம்மவர்களுக்கு மிகவும் இன்றியமையாததான விஷயங்களைப் பலருக்கும் அறிவிக்கும்பொருட்டு அதிக கடினமில்லாத நடையில் எழுதப்பட்டு நல்ல பாடங்க ளோடு கூடியிருப்பதால் இப்புத்தகம் அன்போடு ஏற் றுக்கொள்ளப்பட வேண்டியது. பள்ளி பிள்ளைகளு டைய மனதில் நித்தியாவசியமான உணவுத் தானியங் கள், எண்ணெய் விதைகள் முதலியவைகளைப்பற்றிச் சரியான அபிப்பிராயங்களை நிலை நிறுத்துவதற்கு இது கிராமப் பள்ளிக்கூட உபாத்தியாயர் கையில் மிகுந்த பிரயோஜனமுள்ளதா யிருக்கும். பிராக்ஷணர்களுக் கும் குடிகளுக்கும் இதனால் உண்டாகிற பிரயோஜனத் தைப்பற்றிச் சொல்லவேண்டியதில்லை. அவர் எடுத்துக் கொண்டிருக்கிற நல்ல காரியத்தில் சேதுராமய்யர் உற்சாகப்படுத்தத் தகுந்தவராயிருக்கிறார்.

திருவல்லிக்கேணி, K. B. ராமனாதன், M.A.B.L.L.T.

4-1-1908. ஸெக்சரர், பச்சையப்பன் காலேஜ்.



To

DEWAN BAHADUR

R. RAGOONATHA ROW, A.V.,

*Vice-President of the Kumbakonam Agricultural Association.*

THIS LITTLE VOLUME

IS MOST RESPECTFULLY DEDICATED

AS A MARK OF GRATITUDE

For the great trouble which the Grand Old Man of Southern India  
takes for improving South Indian Agriculture.

சமர்ப்பணம்.

---

சும்பகோணம் விவசாயசங்கத்தின்

உதவி அக்கிராசனாதிபர் ம-ந-ந-ஸ்ரீ, ஸ்ரீமான்

திவான் பகதூர்

இரகுநாதரூவ் அவர்களுக்கு,

ஜனங்களின் விவசாயமுயற்சியை சீர்திருத்த உற்  
சாகப்படுத்திக்கொண்டு வரும் காருண்ய குணத்திற்  
காக எனது நன்றியறிதலைக்காட்டக் கருதி வணக்க  
மாக இந்த நூல் சமர்ப்பிவிக்கப்பட்டது.



## INTRODUCTION.

---

**T**HE British Indian Empire is now larger than the whole of Europe inclusive of Russia. It includes several tracts which were once independent principalities. For the past many centuries, these were not famous for their military glory, for their industries, and for their navy. Yet they maintained their population, and that mostly from their agriculture. Agricultural science is the most ancient one and used to be known to hereditary cultivators from time immemorial. It used to be studied and rules used to be made by learned people in each village, so long as Village Governments existed. These have been recorded as axioms in several languages of India ; but they are all axiomatic, and the village scientists used to explain and enlarge as necessities arose. With the disappearance of this class of men, the facility which existed for the explanation, demonstration of the rules and the science of Agriculture has been lost. The agriculturist continues to know the rules and their usual application, without the knowledge of the science and without knowing the reasons for the practice. This state of things is not very satisfactory. In other parts of the earth, the science does not appear to have existed ; but from peculiar circumstances, these countries did not suffer much as long as



their populations were limited. As population increased, the knowledge of Agriculture became necessary; and people began to turn their attention to the cultivation of this science. The most advanced nation for the present is the American. Europe then felt the necessity; and it has made during the last century some good advance. The great manufacturing country—Great Britain—has lately turned its attention to the important subject of Agriculture.

In India more than three-fourths of its population depends for its existence on Agriculture. The Indian Government draws a large proportion of its revenue from the agriculturist. It saw in the latter part of the last century the necessity for educating its subjects on Agriculture; but did not adopt enough of measures for giving instructions on the subject. Some good men, such as Mr. Robertson of the Saidapet Farm, were asked to do the needful; but sufficient means were not supplied to them. After the dawn of the present century, earnest measures are thought of for adoption. At this juncture, publications on the subject in the vernaculars of the country are a *desiderata*. There are not many in Southern India who can write popular treatises in Tamil on Agriculture. Some have, of late, come into the field and are doing valuable service to the country. Of these, M. R. Ry. A. Sethurama Iyer Avergal is one, and a very prominent one too. He



has taken the trouble of writing an elaborate and useful work giving the rules of cultivation with their reasons, with a large number of diagrams. It is beyond doubt a very useful production, and a very valuable work which ought to be in the hands of every landowner. As a class-book in the schools, it will prove of immense advantage to the coming generation. It will help the old and experienced agriculturists in improving the production of food for the people. It must have cost him heavily to bring out the work and present it to the public. It is hoped that the public will afford such patronage to it as would induce him to continue the publication of similar works.

To Revenue officers it will prove very instructive in knowing and reporting the exact and true state of the annual production of the lands which they have to inspect and report upon.

KUMBAKONAM,  
13th February 1908.

R. RAGHUNATHA ROW.



## மு க வு ளை .

பிரிடிஷ் இந்தியா இராஜஜியமானது உருஷியாவும்  
சேர்ந்து ஐரோப்பாந் கண்டம் எவ்வளவு பெரிதாக  
இருக்கிறதோ அதிலும் அதிக விஸ்தீர்ணமுள்ளதாக  
இருக்கிறது. ஒருகாலத்தில் சுவாதந்திரியமுள்ள சிறு  
நாடுகளாயிருந்த அநேகம் பிரதேசங்கள் இந்த இராஜ  
ஜியத்தில் சேர்ந்திருக்கின்றன. சென்ற பலநூற்றாண்  
டுகளாக, இந்த நாடுகள் தங்கள் யுத்த கீர்த்தியிலும்,  
தொழின் முயற்சிகளிலும், போர்க்கடப்பல்கள் வைத்  
துக்கொள்ளுதல் முதலிய கடல் யாத்திரை முயற்சிக  
ளிலும் பிரசித்தியற்று பின்னடைந்து விட்டன. இங்  
ஙனமிருந்தபோதிலும் தங்கள் ஜனங்களுக்கு ஒரு  
வாறு சாப்பாட்டுக்குக் கிடைக்கும் டியாக இருந்தன.  
இப்படி ஜீவனோபாயம் கிடைத்ததும் முக்கியமாய்  
விவசாயத்தாலேயே. விவசாய சாஸ்திரம் மிகவும்  
பழமையானது; தலைமுறை தலைமுறையாகத் தொ  
ன்று தொட்டு வேளாண்மைத் தொழிலைச் செய்து  
வந்த சாதியார்களுக்கு, இந்த சாஸ்திர நுட்பங்கள்  
முற்காலத்தில் நன்றாகத் தெரிந்திருந்தது. கிராம ஆர  
சாட்சிகள் இருந்துகொண்டிருந்தவரையில் இந்த சாஸ்  
திரத்தை கிராமத்தார் ஆராய்ச்சி செய்வதும், கல்வி  
மான்கள் விவசாய முறைகளுக்கு விதிகள் ஏற்படுத்து  
வதும், வழக்கமாகயிருந்து வந்தது. இந்த விதிகள்



இந்தியாவின் பல பாதைகளிலும் தானாய் விளங்கக் கூடிய உண்மைகள்போல பழமொழிகளாக்கப்பட்டு வழங்கி வருகின்றன. ஆனால் இந்த விதிகளெல்லாம் அதிக சுருக்கமான அந்தப் புஷ்டியுள்ள பழமொழிகளாக இருந்தபடியால் கிராமத்து விவசாயசாஸ்திரிகள் சந்தர்ப்பங்களின் தேவைகளுக்குத் தக்கப்படி இந்தப் பழமொழிகளுக்கு விரிவாக வியாக்கியானம் பண்ணிக்கொண்டார்கள். இப்படிப்பட்ட அநுபோகசாலிகள் துர்லபமாகப்போன பிறகு, இந்த விவசாய குத்திரங்களின் வியாக்கியானங்களும், வியாக்கியானங்களை அநுபோக பூர்வமாகச் செய்து காட்டுவதும், விவசாயசாஸ்திர ஆராய்ச்சியும் அபிவிருத்தி யடைவதற்குரிய செளகரியங்கள் அற்றுப்போயின. இப்போது கிருஷிகர்களுக்கு விவசாய விதிகளும், அவைகளை பிரயோகிக்கும் வழக்கமான முறைகளும் மட்டும் தெரிந்திருக்கின்றன ; விவசாய சாஸ்திர ஞானமும், பயிர்த்தொழிலில் அநுஷ்டிக்கப்படும் செய்தொழில் முறைகளுக்குக் காரணங்களும் தெரியாமற்போய் விட்டன. இப்படிப்பட்ட சம்பவங்கள் திருப்திகரமாக இருக்கவில்லை. உலகின் மற்ற பாகங்களில் விவசாய சாஸ்திரம் என்பதே பூர்வீகத்தில் இருந்திருப்பதாகத் தோன்றவில்லை. அந்தந்த தேசங்களின் ஜனத்தொகை குறைவாக இருந்தபடியாலும், அந்தந்தத் தனி நாட்டிற்கு மட்டுமே உரிய விசேஷ செளகரியங்களாலும், விவசாய ஞானக்குறைவால் அந்த நாடுகள் கஷ்டப்பட



வில்லை. ஜனத்தொகை அதிகப்பட அதிகப்பட விவசாய ஞானம் அவசியமானதாகி விட்டது; இந்த சாஸ்திர அபிவிருத்தியில் ஜனங்கள் கவனத்தை செலுத்த ஆரம்பித்தார்கள். இப்போது விவசாய ஞானத்தில் எல்லா நாடுகளையும்விட முன்னிட்டு நிற்பது அமெரிக்காவே; இப்படி அமெரிக்கா முன்னுக்கு வருவதைப் பார்த்துக்கொண்டு, ஐரோப்பியர் இந்த சாஸ்திரம் தங்களுக்கும் அவசியமான தென்னை கண்டு கொண்டார்கள். சென்ற நூற்றாண்டில் இந்தியாவுக்குத் தொழில் சாஸ்திரம் ஒருவாறு தன்முன்கு அபிவிருத்தி யடைந்திருக்கிறது. தொழில் முயற்சிகளில் பெருமைபெற்ற நாடாகிய மகா பிரிட்டானியாவே தந்தார் கொந்த காலமாக விசேஷமானதெனக் கண்டுகொள்ளப்பட்ட விவசாய சாஸ்திரத்தில், கவனத்தை செலுத்திக்கொண்டு வருகிறார்கள்.

இந்தியாவில் ஜனங்களில் முக்கால் பாகத்தவர் பயிர்த்தொழிலை மட்டுமே தங்களுக்கு ஜீவனோபாயமாகக் கொண்டிருக்கிறார்கள். இந்தியா துரைத்தனத்தார் தங்கள் அரசிதை வரும்படியில் பெரும்பாகத்தை வேளாண்மைத்தொழில் உடையவர்களிடத்திலிருந்தே பெறுகிறார்கள். சென்ற நூற்றாண்டின் பின்பாகத்தில் தங்கள் பிரஜைகளுக்கு விவசாய ஞானத்தில் பயிற்சி உண்டிபண்ணல் அவசிய மென்று தெரிந்து கொண்டனர். அந்த விஷயத்தில் போதுமான அளவு கல்விப் பயிற்சி செய்விப்பதற்கு வேண்டிய தகுந்த ஏற்பாடு



களைச் செய்தார்களில்லை. சைதாப்பேட்டை துரைத் தனத்து மாதிரிப் பண்ணை அதிகாரியாக யிருந்த மிஸ்டர் ராபர்ட்ஸன் (Robertson) என்பவரைப் போன்ற சில நல்ல மனிதர்கள் அவசியமான பிரயத்தனங்களைச் செய்யும்படி கேட்டுக் கொள்ளப்பட்டார்கள். அவைகளுக்கு வேண்டிய சாதனங்கள் அவர்களுக்குப்போதுமான அளவு கொடுக்கப்படவில்லை. இந்த சதாபதத்தின் உதயத்திற்குப் பிறகு அதுஷ்டிக்கத் தக்க உபாயங்களை உபயோகிக்க அதிக சிரத்தையோடு ஆலோசித்து வருகிறார்கள். இந்தசமயத்தில் இந்த விஷயத்தைப்பற்றி நமது நாட்டின் பேசும் பாலைஷ்களில் புஸ்தகங்கள் எழுதப்பட வேண்டியது அத்தியாவசியம். விவசாய விஷயத்தைப்பற்றி ஜனங்களுக்கு தமிழில் எளிதிற் புரியும் நடவடிக்கை எழுத சக்தியுள்ளவர்கள் கிடைப்பது தென்னிந்தியாவில் அருமை.

கொஞ்ச காலமாக சிலர் இந்தத் துறையில் இறங்கி வேலைசெய்ய முன்னிட்டு வந்திருக்கிறார்கள். இவர்களால் நாட்டிற்கு நல்ல உபயோகமான வேலை நடந்து வருகிறது. அப்படிப்பட்டவர்களில் மகா-நா-ஸ்ரீ, அ. சேதுராமய்யர் மிகவும் பிரபலஸ்தரான ஒருவர். மிகக்கஷ்டப்பட்டு உபயோகமான சங்கதிகளைச் சேர்த்தெடுத்து, விவசாய விதிகளையும் அவைகளின் நியாயங்களையும் எடுத்துக் காட்டி பெருந்தொகையான படங்களுடன் ஒரு நல்ல விவசாய நூலை எழுதி முடிக்கும் சிரமத்தை எடுத்துக்கொண்டிருக்



கிரார். இது மிகவும் உபயோகமுள்ள நூல். அதற்கு சந்தேகமே இல்லை. ஒவ்வொரு பிராசுதாரன் வசத்திலும் இருக்கவேண்டிய அது சிலாக்கியமான புஸ்தகம். பள்ளிக் கூடங்களில் வகுப்பில் உபயோகப்படத்தக்க நூலா என்று யோசித்தால் வருங்காலத்துக்குரிய தலைமுறையாராகிய சிறுவர்களுக்கு அது மிகவும் உபயோகமுள்ளதென்று அனுபோகத்தில் தெரியவரும். ஜனங்களுக்காக ஆகாரத்தை உண்டிபண்ணுவதை விருத்தி ஆக்கும் விஷயத்தில் அதுபோகசாலிகளான பெரியவர்களுக்குக்கூட இந்த நூல் உபயோகமுள்ளதாக இருக்கும். இந்தப் புஸ்தகத்தை தயார்செய்து ஜனங்களுக்குக் கிடைக்கும்படி செய்ததில் அவருக்கு அதிக பணச் செலவா யிருக்கும். இதுபோல உபயோகமுள்ள நூல்களைப் பிரசுரம் செய்வதில் அவருக்கு உற்சாக முண்டாகும்படி ஜனங்கள் தக்கவாறு உதவி செய்து ஆதரிப்பார்களென்று நம்புகிறேன்.

ரெவினியூ உத்தியோகஸ்தர்களுக்கோ எனில் அது மிகவும் அறிவு புகட்டத்தக்கது. தாங்கள் பரிசீலனை செய்து மேலாருக்கு விவரங்களைத் தெரிவிக்கவேண்டி வருகிற நிலங்களில் வருஷாவருஷம் கிடைக்கக்கூடிய வரும்படியைப்பற்றி சரியான நிஜமான சங்கதிகளைத் தெரிந்துகொள்வதற்கு மிகவும் உபயோகமாகும்.

கும்பகோணம்,

ஆர். ரெகுநாதராவ்.

13-2-08.



## கனம் ஜி. சுப்பிரமணிய ஜார் அவர்கள் தெரிவிப்பதாவது.

சுதேசம் த்திரனில் கிருஷி விஷய நிபுணர்களெழுதும் தஞ்சாவூர்ஜில்லா நீட்டாமங்கலம் ஆ. சேதுராயையரால் எழுதப்பட்டிருக்கிற சென்னை ராஜதானியில் செய் யப்படும் பயிர்வகைகளின் விவரங்களடங்கிய புஸ்த கத்தை வாசித்துப் பார்த்ததில் அது விவசாயிகளுக் கும், ரெவினியூ, உத்தியோகஸ்தர்களுக்கும் பிரம்ப முக்கியமென்று நான் அறிபிராயப்படுகிறது. கிராமாந்தர பள்ளிக்கூடங்களில் ஆதைப் பாட புஸ்தகமாக வைக்கக்கூடுமென்றும் நினைக்கிறேன். அப்படிப் பாட புஸ்தகமாக வைக்கப்படின் கிராமப் பள்ளிக்கூடங்களை நிர்வகிக்கும் கவர்னமெண்டாரும், மாணேஜர்களும் சில முக்கியமான ஏற்பாடுகளை செய்தால் படிப்பின் பிர யோசனம் அதுபோகத்தில் மிகப் பலன் தருவதாகும். அவைகளாவன :

(1) “கூடுமான இடங்களில் கிராமப் பள்ளிக் கூடத்துடன் சுமார் இரண்டு ஏகர் நிலத்துக்குக் குறை யாமல் ஒருமாதிரிப் பண்ணையைச் சேர்த்து அமைக்க வேண்டும். அதில் அநேக பயிர்களை சிறுபான்மையி ல், பையன்களையே சாகுபடிபண்ணச் சொல்லியும், சிறுதோட்டங்கள் வைத்து வளர்க்கச்சொல்லியும் உற் சாகப்படுத்தவேண்டும்.”



(2) “ஒவ்வொரு பள்ளிக்கூடத்துக்கும் ஒரு சிறு பொருட்காட்சிச்சாலை (Museum) யிருக்கவேண்டும். இதில் அநேக தினுசு மாதிரிகளுள்ள நம்தேசத்துத் தாலியங்களும், நார்வகைகளும், பழவகைமாதிரிகளும், கிழங்குவகை மாதிரிகளும், கருவிகள் இறைவைகளின் மாதிரிகளும், சாயவகைகளும், அநேகவித மண்களை உண்டாக்குகிற பாதைகளும் இருக்கவேண்டும். விவசாய விஷயங்களை விளக்கக்கூடிய முக்கியமான படங்கள் சாலைகளில் தொங்கப்பட்டிருக்கவேண்டும்.”

(3) “வருஷம் வருஷம் சிலநாள் விடுமுறைவிட்டு, ஒவ்வொரு பள்ளிக்கூடத்துப் பிள்ளைகளையும் தங்கள் பள்ளிக்கூடத்தைச் சுற்றியோ அல்லது வேறு தகுந்த யிடங்களிலோ சில மரங்கள் நடுகிறபண்ணி அவைகளை வருஷம்முழுதிலும் வளர்த்துவரும்படி பண்ணவேண்டும். இந்த விடுமுறைநாளுக்கு மரம் நடுகிற உற்சவநாள் என்று பெயர்கொடுக்கவேண்டும். இந்த உற்சவநாளில் மரம் நடுகிற விஷயங்களில் தகுந்தோரால் உபநித்யாசங்கள் செய்விக்கப்படவேண்டும். இம் மரங்கள் நடுவதை பெரியவர்கள் ஞாபகார்த்தமாகவும், பெரிய காரியங்கள், விசேஷங்கள், ஞாபகார்த்தமாகவும் நடலாம். இப்படி அமெரிக்கா, இங்கிலாண்டு, பிரான்சு, ஸ்பெயின், ஜப்பான் முதலிய நாடுகளில் கல்வியிலாகாவில் நடந்துகொண்டு வருகிறது.”

(4) “பையன்களை விடுமுறைநாட்களில் உபாத்தியாயர் பெரிய நல்லதோட்டங்களிருக்கிற இடங்களுக்கு



## கிரந்தகர்த்தாவின் முகவுரை.

இரண்டு மூன்று வருஷகாலங்களாக துரைத்தனத் தாரும் ஜனங்களும் நமதுநாட்டு விவசாயத்தை விருத்திபண்ண வேண்டி அங்கங்கே சங்கங்கள் ஏற்படுத்திக் கொண்டு விவசாயத்தை விருத்திபண்ணுவதில் ஊக்கங்காட்டிக்கொண்டு வருவதால் எளிய நிலையில் நமது ராஜதானியின் தென் ஜில்லாக்களின் ஜனங்களும்பு உபயோகமாகும்படி இந்தநூலைத் தமிழில் எழுதலானேன். இந்த நூல் இரண்டு பாகங்களாகப் பிரிக்கப்பட்டிருக்கிறது. முதல் பாகத்தில் பூமி, கருவிகள் பாசனம், எரு, விதைபொறுக்குதல், இவைகளைப் பற்றியும், இரண்டாம் பாகத்தில் நமது இராஜதானியிலுள்ள நன்செய் புன்செய் தோட்டக்கால் பயிர்களின் சாகுபடிகளைப்பற்றியும் எழுதப்பட்டிருக்கிறது. இப்பயிர்களைப்பற்றி எழுதும்போது ஒவ்வொரு பயிருக்கும் அததற்கேற்ற முக்கிய தினுசுகளையும், தகுந்த பூமிகளையும், செய்நேர்த்தி விஷயங்களையும், எருக்கொடுக்கும் முறையையும், விதைதெளிப்பு, விதையின் அளவு, விதை தெளிக்கும் காலம், நாற்றங்கால் செய்நேர்த்தி, நடும் விதம், பாசனம், பின்செய் நேர்த்தி, வயசு, அறுப்பு, கண்டு முதல், விளைபொருளை என்னென்ன கைத்தொழிலுக்கு உபயோகப் படுத்தலாமென்றும் தலைப்புத் தலைப்பாகப் பிரித்து, விவசாயிக



ளுக்கு எளிதில் சமர்ப்பாசனங்களைப் பொறுக்கி யெடுக்க  
செலகரியமாகுர்ப்படி வகுத்து எழுதியிருக்கின்றேன்.

இந்தியாவின் வடமேற்கு மாகாணத்து விவசாய  
இலாகா துரைத்தனத்தார் தங்கள் “**டதீ அண்டு புல்  
லர்ஸ், பீல்டு அண்டு கார்டன் கிறபீஸ்**” (Duthey and  
Fullers Field and Garden Crops) என்கிற பிரசுரத்தி  
லுள்ள விவசாயப்படங்களை உபயோகப் படுத்திக்  
கொள்ள உத்தரவு கொடுத்ததற்கு உன்றியறிவு உள்  
ளவனாக இருக்கிறேன்.

இந்தியா துரைத்தனத்தாரின் பல மாகாணங்களின்  
விவசாய இலாகாப் பிரசுரங்களையும், இந்தியா துரைத்  
தனத்தாரின் பிரசுரங்களையும், சென்னை இராஜநானி  
துரைத்தனத்தாரின் விவசாயக் குறிப்புகளையும், இன்  
னும் அநேக இந்திய விவசாய புஸ்தகங்களையும், ஆரா  
யந்தறிந்து இந்த ராஜநானியின் பல இடங்களில் குடி  
களின் அனுபோகங்களையும், என்னாலியன்ற அளவு  
விசாரித்தறிந்து ஒத்துப்பார்த்துக் கூடியவரையில்  
சராசரிக் கணக்கெடுத்து விஷயங்களையும் கணக்கினங்  
களையும் நிதானமாக எழுத முயன்றிருக்கிறேன்.

இந்த நூலை வாசிப்பதனால் நமது ஜனங்களுக்கு விவ  
சாய முயற்சியில் எவ்வளவேனும் சிரத்தை ஜாஸ்திப்  
பட்டால் அதை எனக்கான பொருட் செலவிற்கும்  
மனமுயற்சிக்கும் தகுந்த பிரதிபலனாகக் கருதுவேன்.

நீடாமங்கலம்.

அ. சேதுராமையர்.



# CONTENTS.



| Nos. |                                            | PAGES. |
|------|--------------------------------------------|--------|
|      | INTRODUCTION—                              | ...    |
|      | <b>Part I.</b>                             |        |
| 1.   | SOILS MET WITH IN THE MADRAS<br>PRESIDENCY | 1      |
| 2.   | RECLAMATION OF WASTE LANDS                 | 9      |
| 3.   | RECLAMATION OF SALT LANDS                  | 17     |
| 4.   | IMPLEMENTS IN THE MADRAS PRESI-<br>DENCY   | 25—65  |
|      | Ploughs                                    | 25     |
|      | Harrows                                    | 33     |
|      | Rollers                                    | 35     |
|      | Cultivators                                | 38     |
|      | Pedda Madaka                               | 41     |
|      | Kundaka                                    | 42     |
|      | • Gorru or Seed-drill                      | 47     |
|      | Tools                                      | 54     |
|      | Chaff-cutter                               | 55     |
|      | Rain-gauge                                 | 57     |
|      | Lifts                                      | 59     |
| 5.   | MANURES—                                   | 65—85  |
| 6.   | SEED SELECTION—                            | 86—88  |



## Part II.

|                                                   |     |       |
|---------------------------------------------------|-----|-------|
| 1. CEREALS—                                       | ... | 1—36  |
| Paddy                                             | ... | 1     |
| Cholam or Great Millet                            | ... | 7     |
| Kambu or Spiked Millet                            | ... | 14    |
| Ragi                                              | ... | 18    |
| Varagu or Common Millet                           | ... | 23    |
| Tenai (Italian Millet) : Samai<br>(Little Millet) | ... | 26    |
| Wheat                                             | ... | 29    |
| Maize                                             | ... | 33    |
| 2. PULSES—                                        | ... | 37—55 |
| Horse-grain                                       | ... | 37    |
| Green-grain : Black-grain                         | ... | 41    |
| Bengal-grain                                      | ... | 45    |
| Red-grain or Dhol                                 | ... | 48    |
| Cow-grain                                         | ... | 51    |
| Lab-lab or Field Bean                             | ... | 55    |
| 3. OIL-SEEDS—                                     | ... | 56—90 |
| Castor                                            | ... | 56    |
| Gingelly                                          | ... | 61    |
| Ground-nut                                        | ... | 66    |
| Cocoanut                                          | ... | 73    |
| Safflower                                         | ... | 81    |
| Linseed                                           | ... | 87    |



|    |               |     |         |
|----|---------------|-----|---------|
| 4. | FIBRES—       | ... | 91—118  |
|    | Cotton        | ... | 91      |
|    | Sun-hemp      | ... | 101     |
|    | Roscelle      | ... | 106     |
|    | Jute          | ... | 110     |
|    | Aloes         | ... | 114     |
| 5. | ROOT CROPS —  | ... | 119—165 |
|    | Turmeric      | ..  | 119     |
|    | Ginger        | ..  | 125     |
|    | Onions        | ... | 130     |
|    | Garlic        | ... | 135     |
|    | Arrowroot     | ... | 137     |
|    | Elephant Yams | ... | 140     |
|    | Tapioca       | .   | 146     |
|    | Egyptian Arum | .   | 152     |
|    | Sweet Potato  | ... | 155     |
|    | Potato        | ..  | 161     |
| 6. | SUGARS—       | ..  | 166—185 |
|    | Sugar-cane    | ... | 166     |
|    | Palmyra       | ... | 177     |
|    | Date-palm     | ... | 182     |
| 7. | FRUITS—       | ... | 186—224 |
|    | Plantain      | ... | 186     |
|    | Mango         | ... | 192     |
|    | Orange        | ... | 198     |
|    | Guava         | ... | 205     |



|                                                |     |         |
|------------------------------------------------|-----|---------|
| Pineapple                                      | ... | 207     |
| Pomegranate                                    | ... | 210     |
| Grape                                          | ... | 212     |
| Cashewnut                                      | ... | 216     |
| Sweet Melon                                    | ... | 218     |
| Jack                                           | ... | 220     |
| 8. DYES—                                       | ... | 225—229 |
| Indigo                                         | ... | 225     |
| 9. SPICES AND CONDIMENTS—                      | ... | 230—259 |
| Chilly                                         | ... | 230     |
| Coriander                                      | ... | 236     |
| Cumin                                          | ... | 239     |
| Mustard                                        | ... | 242     |
| Areca nut Palm                                 | ... | 245     |
| Pepper                                         | ... | 249     |
| Cardamom                                       | ... | 254     |
| Fenugreek                                      | ... | 258     |
| 10. VEGETABLES—                                | ... | 260—298 |
| Brinjal                                        | ... | 260     |
| Tomatoes                                       | ... | 265     |
| Pumpkin, white gourd melon and<br>bottle gourd | ... | 267     |
| Snake Gourd                                    | ... | 272     |
| Cucumber                                       | ... | 274     |
| Water Melon                                    | ... | 276     |
| Ribbed Gourd                                   | ... | 278     |



|     |                                        |     |         |
|-----|----------------------------------------|-----|---------|
|     | Bitter Gourd                           | ... | 280     |
|     | Peas                                   | ... | 283     |
|     | Cluster beans                          | ... | 285     |
|     | Ladies' Fingers                        | ... | 288     |
|     | Beans                                  | ... | 291     |
|     | Radish                                 | ... | 292     |
| 11. | FIREWOOD—                              | ... | 294—297 |
|     | Casuarina                              | ... | 294     |
| 12. | DRUGS AND NARCOTICS—                   | ... | 298—335 |
|     | Betel                                  | ... | 298     |
|     | Tobacco                                | .   | 305     |
|     | Indian Hemp                            | ... | 316     |
|     | Opium                                  | ... | 322     |
|     | Bishop's Weed                          | ..  | 325     |
|     | Coffee                                 | ... | 327     |
|     | Tea                                    | ... | 331     |
| 13. | FENCE CROPS—                           | ... | 336—345 |
| 14. | FODDERS—                               | ... | 346—352 |
|     | Kolakattai grass                       | ... | 346     |
|     | Guinea grass                           | ... | 350     |
| 15. | SILK-WORMS—                            | ... | 353—366 |
| 16. | AREA CROPPED IN THE MADRAS PRESIDENCY— | ... | 367—368 |

---



# பொருளடக்கம் அல்லது விஷயசூசிகை.

— (i) —

நெ.

பக்கம்.

முகவுரை

## முதல் பாகம்.

|                                                   |          |
|---------------------------------------------------|----------|
| 1. தென்னிந்தியாவிலுள்ள மண்கள் ..                  | 1        |
| 2. புது நிலங்களைச் சீர்திருத்தல் ...              | 9        |
| 3. களர் நிலங்களைச் சீர்திருத்தல் ...              | 17       |
| 4. சென்னை இராஜதானியிலுள்ள முக்கிய<br>கருவிகள் ... | 25 to 65 |
| கலப்பைகள் ...                                     | 25       |
| வேர்வாரி ...                                      | 33       |
| உருளைகள் ...                                      | 35       |
| களை எடுக்கும் கருவி ...                           | 38       |
| பெத்தமடக்கா ...                                   | 41       |
| குண்டகா ...                                       | 42       |
| கொர்ளு ...                                        | 47       |
| கையால் வேலைசெய்யும் கருவிகள் ...                  | 54       |
| வைக்கோல் வெட்டி ...                               | 55       |
| மழை அளக்கும் கருவி ...                            | 57       |
| ஏற்றம் ...                                        | 59       |
| 5. எரு ...                                        | 65 to 85 |
| 6. விதைபொறுக்குதல் ...                            | 86 to 88 |



## இரண்டாம் பாகம்.

|                               |     |          |
|-------------------------------|-----|----------|
| 1. தானியவகைப் பயிர்கள்        | ... | 1 to 36  |
| நெல்                          | ... | 1        |
| சோளம்                         | ... | 7        |
| கம்பு                         | ... | 14       |
| கேழ்வரகு                      | ... | 18       |
| வரகு                          | ... | 23       |
| தினே, சாமை                    | ... | 26       |
| கோதுமை                        | ... | 29       |
| முத்துச்சோளம்                 | ... | 33       |
| 2. துவரைமுதலிய கோதுப்பயிர்கள் | ... | 37 to 55 |
| கொள்ளு                        | ... | 37       |
| பயறு, உளுந்து                 | ... | 41       |
| கொத்துக்கடலை                  | ... | 45       |
| துவரை                         | ... | 48       |
| காராமணி ஆல்லது தட்டைப்பயறு.   |     | 51       |
| மொச்சை                        | ... | 55       |
| 3. எண்ணெய்விதைப் பயிர்கள்     | ... | 56 to 90 |
| கொட்டைமுத்து                  | ... | 56       |
| எள்ளு                         | ... | 61       |
| வேர்க்கடலை                    | ... | 66       |
| தென்னை                        | ... | 73       |
| குசம்பா                       | ... | 81       |
| ஆளிவிதை                       | ... | 87       |



|    |                                |     |            |
|----|--------------------------------|-----|------------|
| 4. | நடர்வகைப் பயிர்கள்             | ... | 91 to 118  |
|    | பருத்தி                        | ... | 91         |
|    | சென்னைச்சணல்                   | ... | 101        |
|    | புளிச்சை                       | ... | 106        |
|    | ஜூட் அல்லது பங்காளத்துச் சணல். |     | 110        |
|    | கத்தாழை                        | ... | 114        |
| 5. | கீழங்குவகைப் பயிர்கள்          | ... | 119 to 165 |
|    | மஞ்சள்                         | ... | 119        |
|    | இஞ்சி                          | ... | 125        |
|    | வெங்காயம்                      | ... | 130        |
|    | வெள்ளைப்பூண்டு                 | ... | 135        |
|    | அரூட் அல்லது கூவைக்கிழங்கு...  |     | 137        |
|    | சேனைக்கிழங்கு, கருணைக்கிழங்கு  | ... | 140        |
|    | மாவள்ளிக்கிழங்கு               | ... | 146        |
|    | சேப்பங்கிழங்கு                 | ... | 152        |
|    | சர்க்கரைவள்ளி                  | ... | 155        |
|    | உருளைக்கிழங்கு                 | ... | 161        |
| 6. | சர்க்கரைகொடுத்துப் பயிர்கள்    | ... | 166 to 185 |
|    | கரும்பு                        | ... | 166        |
|    | பனை                            | ... | 177        |
|    | ஈச்சமரம்                       | ... | 182        |
| 8. | பழவகைப் பயிர்கள்               | ... | 186 to 224 |
|    | வாழை                           | ... | 186        |
|    | மா                             | ... | 192        |



|                                      |     |            |     |
|--------------------------------------|-----|------------|-----|
| கிச்சிலி                             | ... | ...        | 198 |
| கொய்யா                               | ... | ...        | 205 |
| அஞ்சு                                | ... | ...        | 207 |
| மா துளை                              | ... | ...        | 210 |
| கொடிமுந்திரி                         | ... | ...        | 212 |
| முந்திரி                             | ... | ...        | 216 |
| கர்பூஜ்                              | ... | ...        | 218 |
| பிலா                                 | ... | ..         | 220 |
| 8. சாயவகைப் பயிர்கள்                 | ... | 225 to 229 |     |
| அவரி                                 | ... | ...        | 225 |
| 9. சுவை அதிகரிக்கச்செய்யும் பயிர்கள் | ... | 230 to 259 |     |
| மிளகாய்                              | ... | ...        | 230 |
| கொத்துமல்லி                          | ... | ...        | 236 |
| சீரகம்                               | ... | ...        | 239 |
| கடுகு                                | ... | ...        | 242 |
| பாக்கு                               | ... | ...        | 245 |
| மிளகு                                | ... | ...        | 249 |
| ஏலக்காய்                             | ... | ...        | 254 |
| வெந்தயம்                             | ... | ...        | 258 |
| 10. கற்காய்ப் பயிர்கள்               | ... | 260 to 293 |     |
| கத்திரி                              | ... | ...        | 260 |
| தக்காளிக்காய்                        | ... | ...        | 265 |
| பரங்கி, பூஷணி, சுரை                  | ... | ...        | 267 |
| புடலை                                | ... | ...        | 272 |
| கக்கிரி                              | ... | ...        | 274 |



|                                       |     |            |     |
|---------------------------------------|-----|------------|-----|
| வெள்ளெரி                              | ... | ...        | 276 |
| பீர்க்கை                              | ... | ...        | 278 |
| பாகல்                                 | ... | ...        | 280 |
| பட்டாணி                               | ... | ...        | 283 |
| கொத்தவரை                              | ... | ...        | 285 |
| வெண்டை                                | ... | ...        | 288 |
| அவரை                                  | ... | ...        | 291 |
| முள்ளங்கி                             | ... | ...        | 292 |
| 11. விறதகொடுக்கும் பயிர்கள்           | ... | 294 to 297 |     |
| சவுக்கு                               | ... | ...        | 294 |
| 12. மயக்கங்கொடுக்கும் பயிர்கள்        | ... | 298 to 335 |     |
| வெற்றிலை                              | ... | ...        | 298 |
| புகையிலை                              | ... | ...        | 305 |
| கெஞ்சா                                | ... | ...        | 316 |
| ஆபினி                                 | ... | ...        | 322 |
| ஓமம்                                  | ... | ...        | 325 |
| காபி                                  | ... | ...        | 327 |
| தேயிலை                                | ... | ...        | 331 |
| 13. வேலிப்பயிர்கள்                    | ... | 336 to 345 |     |
| 14. சிலவகை மாட்டுத்தீவனப்புல்கள்      | ... | 346 to 352 |     |
| கொழக்கட்டைப்புல்                      | ... | ...        | 346 |
| கினிப்புல்                            | ... | ...        | 350 |
| 15. பட்டுப்பூச்சிகளை விரித்தியாக்ததல் | ... | 353 to 366 |     |
| சென்னை இராஜநானியிலுள்ள முக்கிய பயிர்  |     |            |     |
| களின் சாதபடி விஸ்தீரணம்               | ... | 367 to 368 |     |



## ILLUSTRATIONS.

### படங்கள்.

#### PART I. முதல் பாகம்.

##### Tamil.

##### Page.

|                                     |    |
|-------------------------------------|----|
| Light Plough லேசான சீமைக்கலப்பை.    | 27 |
| Improved Plough சீமைக்கலப்பை ...    | 28 |
| Harrow வேர்வாரி ...                 | 33 |
| Rollers மகசூல் கல்லுருளை ...        | 37 |
| Kundaka குண்டகா ...                 | 43 |
| Metla kundaka மெட்ல குண்டகா ...     | 45 |
| Gorru or seed-drill விதைதெளி கருவி. | 47 |

#### PART II. இரண்டாம் பாகம்.

|                                     |        |
|-------------------------------------|--------|
| Paddy நெல் ...                      | 1      |
| Cholam சோளம் ...                    | 7      |
| Kambu கம்பு ...                     | 14     |
| Ragi ராகி ...                       | 18     |
| Varagu வரகு ...                     | 23     |
| Tennai தினை ...                     | 26     |
| Wheat கோதுமை ...                    | 29, 30 |
| Maize மக்காச்சோளம் முத்துச்சோளம்... | 33     |
| Horse gram கொள்ளு ...               | 37     |
| Green gram பயறு ...                 | 41     |
| Black gram உளுந்து ...              | 42     |
| Bengal gram கடலை ...                | 45     |
| Dholl or Red gram துவரை ...         | 48     |
| Cowgram காராமணி ...                 | 51     |
| Field bean மொச்சை ...               | 54     |
| Castor கொட்டைமுத்து ...             | 56     |
| Gingelly எள்ளு ...                  | 61     |
| Ground-nut வேர்க்கடலை ...           | 66     |
| Cocoanut தென்னை ...                 | 73     |
| Safflower குசம்பா ...               | 81     |



|                              |     |          |
|------------------------------|-----|----------|
| Linseed ஆளிவிதை              | ... | 87       |
| Cotton பருத்தி               | ... | 91, 93   |
| Sun hemp சணப்பு              | ... | 101      |
| Roscelle புளிச்சை            | ... | 106      |
| Jute சூட்                    | ... | 110      |
| Alces கத்தாழை                | ... | 114      |
| Turmeric மஞ்சள்              | ... | 119      |
| Ginger இஞ்சி                 | ... | 125      |
| Onions வெங்காயம்             | ... | 130      |
| Garlic வெள்ளைப்பூண்டு        | ... | 135      |
| Yams சேனை, கருளை             | ... | 140      |
| Tapioca மரவள்ளி              | ... | 146, 150 |
| Egyptian Arum சேப்பங்கிழங்கு | ... | 152      |
| Sweet Potato சர்க்கரைவள்ளி   | ... | 155      |
| Potato உருளைக்கிழங்கு        | ... | 161      |
| Sugar cane கரும்பு           | ..  | 166      |
| Datepalm நச்சமரம், குலை      | ... | 182, 184 |
| Plantain வாழை                | ... | 186      |
| Mango மாம்பழம்               | ... | 192      |
| Orange கிச்சிலி              | ... | 198      |
| Pineapple அனாஸ்              | ... | 207      |
| Grape கொடிமுந்திரி           | ... | 212      |
| Sweet melon கர்ப்பூஜ்        | ... | 218      |
| Jack பலா                     | ... | 220      |
| Indigo ஆவிரி                 | ... | 225      |
| Chilly மிளகாய்               | ..  | 230      |
| Coriander கொத்தமல்லி         | ... | 236      |
| Cumin சீரகம்                 | ... | 239      |
| Mustard கடுகு                | ... | 242      |
| Pepper மிளகு                 | ... | 249      |
| Fenugreek வெந்தயம்           | ... | 258      |
| Brinjal கத்திரி              | ... | 260      |



|                                                                                                      |     |     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|
| Pumpkin பரங்கி                                                                                       | ... | 267 |
| White gourd பூவிணி                                                                                   | ... | 268 |
| Bottle gourd சுரை                                                                                    | ... | 269 |
| Snake gourd புடலை                                                                                    | ... | 272 |
| Cucumber கக்கிரி                                                                                     | ... | 274 |
| Water melon வெள்ளிரி                                                                                 | ... | 276 |
| Ribbed gourd பீர்க்கை                                                                                | ... | 278 |
| Bitter gourd பாகல்                                                                                   | ... | 280 |
| Peas பட்டாணி                                                                                         | ... | 283 |
| Cluster beans கொத்தவரை                                                                               | ... | 285 |
| Ladeis's Finger வெண்டை                                                                               | ... | 288 |
| Radish முள்ளங்கி                                                                                     | ... | 292 |
| Betel வெற்றிலை                                                                                       | ..  | 298 |
| Tobacco புகையிலை                                                                                     | ... | 305 |
| Indian Hemp கஞ்சா                                                                                    | ... | 316 |
| Opium அபினி                                                                                          | ... | 322 |
| Bishop's weed ஒமம்                                                                                   | ... | 325 |
| Coffee காபி                                                                                          | ... | 327 |
| Tea தேயிலை                                                                                           | ... | 331 |
| Ingadulcis கொருக்காப்பள்ளி                                                                           | ... | 336 |
| Breeding Room for silk worms பட்டுப்<br>பூச்சி முட்டையிலிருந்து புழுக்களு<br>ண்டாக்குதல்             | ... | 353 |
| Mulberry tree முசுக்கட்டைச்செடி                                                                      | ... | 355 |
| Shelves for feeding silk worms பட்டுப்<br>பூச்சிப் புழுக்கள் இலைகளை ஆகார<br>மாக உட்கொள்ளும் தட்டுகள் | ... | 356 |
| Brush for spinning the cocoons கிளை<br>களில் கூடுகள் உண்டாக்குதல்                                    | ... | 359 |
| Silk moth and eggs பட்டுப்பூச்சி முட்<br>டைகள்                                                       | ... | 361 |





# தென்னிந்தியாவிலுள்ள மண்கள்.

நமது சென்னை ராஜதானியிலுள்ள பூமிகளாவன :—  
பருத்தி பயிரிடும் கரிசற்காடு, செம்மண் நிலம், அடை  
மண் நிலம், சுக்கான், மணல், சதுப்பு, களர்.

## பருத்தி பயிரிடும் கரிசற்காடு.

இது பஸால்ட்டு பாறையின் சிதைவால் உண்டா  
யிருக்கலாம். கிருஷ்ணை, கோதாவரி ஜில்லாக்களி  
லுள்ள கரிசல்கள், பஸால்ட்டு பாறையின் சிதைவு  
பாசங்களை வாரி சுருட்டிக்கொண்டு வருகிற கிருஷ்ணை,  
கோதாவரி ஆறுகளின் வண்டல்களாலமைந்திருக்க  
வேண்டும். இவ்வித மீ. சுருப்பு சிறமுள்ள கரிசல்கள்,  
பெண்ணை பாறு, பாலாறு, காவேரி, முதலிய நதி தீரங்  
களிலேயும், அநேக இடத்திலிருக்கின்றன. இவ்வாறு  
களின் வண்டல் சேற்றோடு, மூலதிரவியங்கள், மக்கிச்  
சிதைந்து கலந்தால், கரிசல் மண்ணுண்டாகிறதென்  
கிறார்கள். காடுகளில் பூமி முழுமையும் கரிசலாயிருக்  
கிறது. ஏனெனில், இலை, காய், கனி, செடி, பூண்டு  
முதலிய மூலதிரவியங்கள் பூமியில்விழுந்து மண்ணுடன்  
மக்கி மண்ணோடு மண்ணாய்ப்போகின்றன. பருத்தி  
கரிசல்களெல்லாம் முன் காடாயிருக்குமோ வெனில்,  
கிண்டியெடுக்கப்பட்ட காட்டுச்சின்னங்களாகிய முக்  
கிய பிரமாணங்கள் இதுவரையில் அவைகளில் ஒன்றை  
யும் காணோம். ஆகையால் பருத்திக் கரிசல்கள் முன்



## 2 தென்னிந்தியா விலுள்ள மண்கள்

காடாயிருந்திரா. களியுடன் மூலதிரவியங்கள் சம்பந்தப்பட்டாவது, அல்லது வண்டல் சேற்றோடு செடி, காய், கனி முதலியன மக்கிக் கலந்தாவது, அல்லது பஸால்ட்டு பாதையின் சிதைவினாலாவது “கரிசற்பருத்திக்காடு” அமைந்துண்டா யிருக்கவேண்டும். இவ்வித நிலம் ஒரே கருப்பு நிறமாயிருக்கும். இந்நிறத்துக்குக் காரணம் மூலதிரவியங்கள்தான். எங்கே பார்த்தாலும் கனதூரம் ஒரே கரிசலாயிருக்கும். வெட்டிச் சோதனைசெய்தால் கரிசற்படை பன்னிரண்டு அங்குலம்முதல் பதினைந்து அடிவரையில் ஆழ்ந்திருப்பதைப் பார்வையிடலாம். பருத்திக்கரிசல் இவ்விராஜதானியில் அநேக இடங்களிலிருக்கின்றது; கடப்பை, பல்லாரி, அனந்தப்பூர், கர்னூல், கிருஷ்ணா, கோதாவரி, நெல்லூர், திருநெல்வேலி, மதுரை, வடஆர்க்காடு, தஞ்சை, திருசிராப்பள்ளி, கோயமுத்தூர் ஜில்லாக்களிலேயும், மைசூர் பிராந்தியத்திலேயு மிருக்கின்றது. இது கோடை காலத்தில் வெகு வெடிப்புள்ள தாயும், மாரிகாலத்தில் நிரம்ப பிசுபிசுப்புள்ளதாயுமிருக்கும். இத்தன்மைபூமி மிகவும் வளமானது. ஜலத்தை இறுக்கிவைத்துக்கொள்ளும் சக்தியும் இதற்கு ஜாஸ்தி. மூலதிரவியங்கள் இவைகளில் 100க்கு 4 பாகம் முதல் 9 பாகம்வரை யிருப்பதாகக் கண்டுபிடிக்கப் பட்டிருக்கிறது. சில ஜில்லாக்களில் கரிசல் பருத்திக் காட்டில் வெள்ளைக் கப்பியைப்போன்ற சில சுக்கான்கல் அகப்படுகின்றது. இந்த சுக்கான்படை கரிசற்



## தென்னிந்தியாவிலுள்ள மண்கள். 3

படைக்குக்கீழுள்ளது. பல்லாரியிலுள்ள கரிசல் நீரம்ப உரப்புள்ளது. இப்படி உரப்புள்ள கரிசற்காட்டை யுடைய ஜில்லாக்களில், பூமியில் பெத்தமடக்கா என்னும் பெரும் கலப்பைபைக்கொண்டு உழுகிறார்கள். இதை இழுக்க 5, 6 ஜோடி மாடுகள் கட்டி ஒட்டுகிறார்கள். பார்வைக்கு நீரம்ப காட்சியுள்ளதாயிருக்கும். இந்த கலப்பைபைக்கொண்டு பூவதைப் பார்க்கிலும், சீமைக் கலப்பைபை வாங்கி இந்த பூமிகளில் போட்டு வேலை செய்தால் எவ்வளவோ லாபகரமுண்டு. வேலையும் நன்றாயிருக்கும். கருவிகளைப்பற்றி யெழுதும்போது இவைகளின் (சீமைக் கலப்பைகள்) லாபகரத்தை எடுத்துத் தெளிவாகக் காட்டுகிறேன். ஆகையால் பல்லாரி, அனந்தப்பூர், கர்னூல், கடப்பைமுதலிய ஜில்லாக்களில் பருத்தி கரிசல் காட்டில் 60 அல்லது 70 ரூபாய் மதிப்புள்ள சுவிடிஷ் கலப்பைகளைப் போட்டு வேலைசெய்து பெத்தமடக்காவைவிட அநேகவிதத்தில் திறமென்று, அறிந்துகொள்ளுவார்க ளென்று நம்புகிறேன்.

கடப்பை, கோயமுத்தூர் ஜில்லாக்களில் கரிசற்காடு, சுக்கான்சம்பந்தத்தால் நொருங்கலாயிருக்கும். இது நீரம்ப செழுமையுள்ளது. உரத்தகரிசல்களுக்கு 1000 ராத்தல் முதல் 5000 ராத்தல் வரையில் சுண்ணாம்பு நீற்றைவாங்கி எருவிடலாம். முக்கியமாய் இந்நிலங்களில் பயிரிடும் தானியாதிகள் பருத்தியும், சோள முந்தான். கோதுமையும், அவுரியும், அவைகளில்



#### 4 தென்னிந்தியாவிலுள்ள மண்கள்.

ஏராளமாய்ப் பயிரிடுகிறார்கள். பருத்தி பயிரிடுவது கோடைகாலம். விளைபுரப் பருவத்தில் செடி இளைக்காமல், செழிக்க ஏரம் பூமியிலிருக்க வேண்டுமே ஆகாயத்திலிருந்து நரத்தைக் கவர்த்து அருகிற் கொள்ளும் சக்தியிருப்பதால், கரிசல் நிலத்துச் சா, பருத்தியைக் கோடையில் ஏரம் ஊட்டி விளைவிக்குமே யோக்கியதையுண்டு. கொத்துக்கடலை, கொட்டைச் செடிகளுட அவைகளில் பயிரிடப்படுகின்றன.

#### செந்நிலம்.

இந்த இராஜதானியில் காணப்படுகிற இன்றோருவந்த நிலம் யாதெனில் செம்மண் நிலம் இது செவப்பு வர்ணமுள்ளது. இந்த செவ்வர்ணத்துக்குக் காரணம் அயப்பஸ்பம்தான். நம்முடையவீடுகளில் இரும்புபாத்தி ரங்களைத் தேய்த்து சலத்தைத் தொடைக்காமல் வைத்தால் துரு பிடித்து விடுகிறதல்லவா? இந்தத் துரு தான் அயப்பம். கலப்பை கொழுக்களிலேயும் இந்தத் துருவைப் பார்க்கலாம். செந்நிலம் ஆறுகளின் வக்கல் வண்டலினால் படிந்து ஒத்ததரையாகி அடைமண் நிலமாயிருந்தாலு மிருக்கலாம். அல்லது பாறைகளின் சிதைவாலமைந்திருந்தாலு மிருக்கலாம். கீழ் சமுத்திரக்கரையில் இப்பூமி செம்பூரான் கல்களின் சிதைவு நாசத்தால் உண்டாயிருக்கின்றது. வடஆர்க்காடுஜில்லாவைப்போல் சிலஇடங்களில், கனதூரம் ஒரேமைதானமாய், இந்த செந்நிலம் அமைந்து, பூமி கெட்டிப்பட்டு, பாறையைப்போல் ஒரே அடையாயிருக்கிறது.



## தென்னிந்தியாவிலுள்ள மண்கள். 5

இதில் சுவேதசத்திலுண்டாகும் புற்பூண்டுகள் கூட விரத்தி ஆகாமல் ஷரோ பொட்டையாயிருக்கிறது. மெடமார்பீக் பாறைகளிலிருந்து உண்டாகிய சில செங்கிலம் அநேகமாய் நல்ல வளமானதுதான். செம்பூரான் கல்லிலிருந்துண்டாகிய செங்கிலம் பொதுவாய் மட்டமான பூமிதான். சிலாக்கியமான செங்கிலம் வேலை செய்வதற்கு வெகு ரொடுங்கலான தன்மையானது. ஆகாசத்திலிருந்து நாசத்தைக்கொதிக்கும் சக்தியுள்ளது. இந்த நாசத்தை இழக்கும் சக்தி அயப்பப்பத்காலுண்டாகிறது. இதில் புன்செய் தானியங்கள் நன்றாய் விளையும். பாசனத்துக்கு நீர் குறைவில்லாமலிருந்தால்தெல்லும் பயிரிடலாம். சில ஜில்லாக்களில் இதில் பருத்தி பயிரிடுகிறார்கள். கடப்பை, கர்னூல், பல்லாரி, அனந்தபூர் ஜில்லாக்களில் இந்த இரண்டுவித பூமிகளைத் தவிர (பருத்தி கரிசற்காடு, செங்கிலம்) செம்மண் வெண்மண் இந்த இரண்டு மண்களும் கலந்த ஒருவித பூமி இருக்கிறது. இதற்கு மஸ்ஸாப்பு என்று பெயர். ஆகையால் இந்த கான்கு ஜில்லாக்களில் பருத்தி பயிரிடும் கரிசற்காடு, செங்கிலம், மஸ்ஸாப், என்று மூன்றுவித பூமிகளிருக்கின்றன.

### அடைமண் நிலம். (Alluvial soil.)

அடைமண் நிலமாகிறது, நதி, ஆறு, கால்வாய்முதலியவற்றிலிருந்து வண்டல் எக்கல் படிந்து அடைந்திருக்கப்பட்ட மண். இது நதி தீரங்களில் விசேஷம். சகல விதமான பாறைகளிலிருந்துண்டாகிய மக்கிப்போன



## 6 தென்னிந்தியா விவசாய மண்கள்.

வளத்துக்களை உடைத்தாயிருப்பதால் இப்பூமி நிரம்ப வளமுள்ளது. இதில் எல்லா பயிருட்டங்களும் குறைவில்லாமலிருக்கின்றன. அடைமண் இரண்டு விதமுண்டு :—

(a) “ கரிசல் அடைமண்.” (b) “ அடைமண்மணல் ”

(a) கரிசல் அடைமண் (Black alluvial) கரிநிறமாயிருக்கும். இது ஆறுகளின் உற்பத்தி பாகங்களுக்குச் சமீபத்திலும், நதிகளின் பிரிவுகளின் மத்திய ஸ்தலங்களிலேயும் விசேஷம் : கரிசல் பருத்திக் காட்டைப் போல் வளமுள்ளது, ஆனால் அவ்வளவு உரப்பல்ல : நிரம்ப நொருங்கலான தன்மையுண்டு ; யாவற்றும் பயிர்களும் விர்த்தியாகும். இதில் மூலதிரவியம் ஜாஸ்தியாதலால் இப்பூமி கருப்பு நிறமாய்த் தோற்றுகிறது. ஆற்றுப்படுகை இவ்வித வகுப்பு நிலத்தைச் சேர்ந்தது.

(b) மணல் அடைமண். (Alluvial sand) சமுத்திரக் கரைக்குச் சமீபத்திலிருக்கும் ஆறுகள், சமுத்திரத் தோடு சங்கமாகு மிடத்துக்குச் சமீபத்திலுமிருக்கும். இப்பூமியின் வளம் பாசனத்துக்குத் தக்கபடி அமைந்திருக்கிறது. பாசனக் குறைச்சலான இடத்தில் வளமும் குறைச்சல்தான்.

சுக்கான்.

இப்பூமி கரிசலோடு அநேக ஜில்லாக்களில் கலந்திருக்கிறது. சிலாக்கியமான பூமிதான்.



## தென்னிந்தியாவிலுள்ள மண்கள். 7

மணல்.

இவ்வித நிலம் சமுத்திரக்கரை ஓரம் விசேஷம், சவுக்கு, தென்னை யைவைத்துப் பயிரிட்டு லாபத்தைப் பெறலாம்.

சதுப்பு.

சதுப்பாவது, பள்ளம், பதிவுகளிலுள்ள பூமி. வெகு காலம் நீரிலும் நிலத்திலும் முளைத்து வளர்ந்து முதிர்ந்து பட்டுப்போன மூலதிரவியங்கள் பாதி மக்கியும் மக்காமலு மிருக்கின்ற காலத்திலமைவது ; நீலகிரியில் லாவில் மிகுதி. மலைப்பிராந்தியத்தில்தான் இவ்வித நிலத்தைக்காணலாம். சமபூமியில் காணமுடியாது.

காரி.

இது உப்பு பூத்திருக்கப்பட்ட பூமி. இதன் சீர்திருத்தத்தைப்பற்றி, இவது அத்தியாயத்தில் தெரிவிக்கப்படும்.

இவ்விராஜதானியின் பொது லட்சணங்கள்.

நமது சென்னை இராஜதானி இயற்கையில் செழிப்புள்ள தேசமல்ல. மிகவும் வளமுள்ளபாகங்கள் சமபூமியில் இருக்கின்றன. மலைச்சரிவில் வளமே கிடையாது. வளமுள்ள பாகமெல்லாம் அநேகமாய் அடைமண் நிலந்தான். இது தஞ்சை, கோதாவரி, கிருஷ்ணை, திருசிராப்பள்ளியில்லாக்களில் மிகுதி. இவ்விராஜதானி விஸ்தீரணத்தில் அநேகமாய் முக்கால்பாகத்தில் பாசனமேகிடையாது. ஏற்றம்வைத்து நீர்பாய்ச்சக்கூட சாத்தியமில்லை. அதாவது வானவாரிதான். இதிலும் அநேக



## 8 தென்னிந்தியாவிலுள்ள மண்கள்.

விடத்தில் வருஷம் 40 செவிக்குமேல் மழை கிடை யாது. இந்த மழைகூட இப்போது சரிவரப் பெய்கிற தில்லை.

சாகுபடி விஸ்தீரணத்தை ராஜாங்கத்தார் நஞ்சை, புஞ்சை, தோட்டக்காலென்று வகுப்பிட்டிருக்கிறார்கள். நஞ்சையாவது, காவாயிலிருந்து சுபாவமாய் பாயக் கூடிய நிலங்கள்.

புஞ்சை எல்லாம் வானவாரிதான். அதாவது மழை ஜலத்தைக்கொண்டு பயிர்கள் உண்டிபண்ணுகிற பூமி கள். புஞ்சை, சாகுபடி, விஸ்தீரணத்தில் முக்கால் பாகத்துக்குமேலிருக்கிறது. புஞ்சையில் முக்காலே அரைக்கால்வாசி வளக்குறைவானஸ்திதியிலிருக்கின்றது.

தோட்டக்கால் பூமியாவது கிணறு, குளம், குட்டை முதலியவைகளிலிருந்து ஏற்றத்தினால் இறைக்கப்படுகிற பூமி. சாகுபடி விஸ்தீரணத்தில் கமது இராஜ தானியில் நஞ்சை 100க்கு 15 பாகம்தானுள்ளது; 100க்கு 2 பாகம் தோட்டங்கள்; 100க்கு 80 பாகம் புஞ்சை; பாக்கி 3 பாகம் மேச்சல்களும், தரிசு நிலங் களுமாயிருக்கின்றன.

---



# புதுநிலங்கவளச் சீர்திருத்தல்.



நம்முடைய ராஜதானியில் ஆயிரம் பதினாயிரம் ஏக்கர் கணக்காய் பயிரிட்டிராத பொட்டல்நிலங்கள் அநேகமிருக்கின்றன. இவைகளைக் கவரன்மெண்டார் அநேக விபந்தளைகளுக்கட்படுத்தி தர்க்காஸ்த்துக்கு விடுவது வழக்கமாயிருக்கின்றது. அப்பேர்க்கொத்த பூமிகள் நமக்குக்கிடைத்தால் எவ்விதமாகத் திருத்திப் பயிருண்ணிபண்ணுவது என்பதைச் சொல்லுவோம். இந்நாட்டில் வாவா ஜனசங்கியை அதிகரிக்கிறது. எவ்வளவுக்கு ஜனசங்கியை அதிகப்படுகிறதோ அவ்வளவுக்கு சாகுபடிபும் அதிகரித்தால்தான் வறுமையின்றி இருக்கலாம். ஆகையால் நம்முடைய நாட்டு விவசாயம் விர்த்தியாக வேண்டும்; விர்த்தியாவதோடும் கூட சாஸ்திரோக்தமாய் இருக்கவேண்டியது. இவைகளை யெல்லாம் ஊன்றி நோக்கிப்பார்ப்பது நிரம்ப அவசியம்.

ஒருவித நிலம் காடாயிருந்தால் சீர்படுத்தலாது எப்படி? காடுகளிருப்பது கிருஷிகனுக்கு அனுகூலமென்கிறார்கள். ஏனெனில் அவைகளுக்கும் சீதோஷ்ண மழைகளுக்கும் சம்பந்தமுண்டென்று பிரத்தியட்ச பிரமாணமாகக் குறிப்பிடப்பட்டிருக்கிறது. காடு ஜாஸ்திக்குத் தகுந்தபடி மழையும் ஜாஸ்தியுண்டு. காடுகளை எல்லாம் தாறுமாறாய்த் தறித்ததினால் முன் செழுமை



## 10 புதுநிலங்களைச் சீர்திருத்தல்

யாயிருந்த இடமெல்லாம் இப்போது மழையன்னியில் வறுமையாயிருக்கின்றன. ஆகையால் காடுகளைச்சாகு படிக்குக் கொண்டுவருவதில் எல்லாமரங்களையும் ஒரே அடியாய் வெட்டி விடாமல் யோசித்து எங்கெங்கு தறிக்கவேண்டுமோ அவ்வவ்விடத்தில் மாத்திரம் தறித்துவிட்டு பாக்கியை இருந்தபடியே விட்டுவிட வேண்டும். காடுகளால் சீதோஷ்ணச் சிதபாருமலிருக்கும். விவசாயத்துக்கு வேண்டிய தண்ணீரானது ஊற்றங்களால் சேகரித்து வைக்கப்படுகிறது. காட்டை அழித்து விட்டால், மழை ஜலம் சேகரித்து வைக்கப்படாமல், ஒடிப்போய் ஆறுகளில் விழுந்து, வரவர, அந்தக் காணாறுகளில் ஜலத்தட்டுண்டாய் கோடையில் வரண்டுபோய் விடுகிறது.

இவ்வகைக் காரணத்தைப்பற்றிச் சீர்திருத்துகையில் முதலில் மரங்களைத் தறிப்பதில் நிரம்ப கவனமிருக்க வேண்டும். வெட்டின மரங்களைகள் சிலாக்கியமாயில்லாத்துடன், விற்பனைக்கு வண்டிச்சத்தமும் அதிகரித்தால், அவ்வித மரங்களை அவ்விடத்திலேயே எரித்து விட்டு சாம்பலைப் பூமியில் பரப்பிவிடலாம். இல்லாவிடில் வெட்டப்பட்ட துண்டங்களுக்கு அங்கேயே கிராக்கியிருந்து அல்லது சமீப இடங்களுக்குக்கொண்டுபோய் இலாபங்கிடைக்கக்கூடியதாயிருந்தால் விற்று விடலாம். இப்படி மரங்களைச் சாக்கிரதையாய்ச் சரிப்படுத்தின பிறகு, புல் பூண்டுகளை நீக்கியாவது அல்லது எரித்துவிடவாவது வேண்டும்.



## புதுநிலங்களைச் சீர்திருத்தல். 11

சப்பாத்திக் காடாயிருந்தால் அவைகளை வெட்டி பெரியகுழி தோண்டி அதில்போட்டு மடியச்செய்து பிறகு நெருப்புவைத்துக் கொளுத்திவிடுவது நன்மை.

காடு, செடி, புல், பூண்டுகளுடைய பூமியை ஸர்வே (Survey) பண்ணி அழித்தபிற்பாடு, பள்ளம் மேடுகளை நீர்வி, கொஞ்சமாக சரிவுவைப்பது நன்று. இப்படி சமப்படுத்தப்பட்ட பூமியை நல்லவாப்புடன் வயல்களாகத் தடுக்கவேண்டும். இந்த வயல்கள் சதுரமாகவாவது அல்லது நீண்ட சதுரமாகவாவது இருக்கவேண்டும். நீர்ப்பாசனத்துக்கு நல்ல பாம்படைகளும் வடிமடைகளும் வைக்கவேண்டும்.

மலைப்பாகங்களில பூமி ஒரேசரிவா யிருப்பதால் அந்தப் பூமியைப் படிப்படியாய் வெட்டி அமைக்கவேண்டும். பூமியில் கற்கள் அதிகமாயிருந்தால் அவைகளை யிடித்து பிரயோசனமிருந்தால் கிணறு, கொட்டில், சுவர்முதலான கட்டிடங்கள் கட்ட உபயோகித்துக் கொண்டு, இல்லாதவரையில் அப்புறப் படுத்திவிட வேண்டியது. விவசாயக் கருவிகளைப் பூமியில்போட்டு வேலைசெய்வதற்கு முந்தி, பெரிய கற்களை எடுத்துவிட வேண்டும். சின்னகற்கள் ஐரஸ்தியாயிருந்தால் அவைகளைப் புறப்படுத்திவிட வேண்டும். சின்ன கற்கள் சிறுபான்மையிலிருந்தால் அவ்வளவு கவலைவைக்க வேண்டாம். இவ்வளவு முயற்சியெடுத்துக்கொண்டு வரப்பட்ட பூமியின் குணத்தையும் திறத்தையும் அதிகரிக்க, சாள்வதத்திருத்தங்கள் செய்யவேண்டும்.



பொதுவாக பசளைமண்தான் விவசாயத்துக்குத் திறம். அவ்வாறில்லாமல் பூமியிலுள்ள களி, மணல், சுக்கான், இர்திரியவஸ்து, தாதுவஸ்துக்கள் ஆகிய இந்த ஐந்து பூதக்கூறுகளில் எதாவது ஒன்று மிதமிஞ்சியிருந்தால் அப்போது அப்பூமி சிலாக்கியமில்லை. அந்த நிலத்தில் எது குறைவாகவிருக்கிறதோ அதைப்போட்டுச் சேர்த்து விட்டால் குறை தீர்த்து திறப்பட்டுப்போய் விடுமீ. ஆகையால் இந்தக்குறைகள் நிவர்த்திக்காகச் சீர்திருத்தல் அவசியம். சாஸ்வதத்திருத்தங்களாவன :—

### நிலங்களைச் சுத்தித்தல்.

சுக்கான் நிலம், மணற்பூமி, நீருடன் சுவர்த்து மூலதிரவியங்களை ஜாஸ்தியாயுள்ள பள்ளத்தாக்கு நிலங்கள், களிச்சேர்க்கையால் கன்மைப்படுகின்றன. மணல், களி, பள்ளம், பதிவு, நிலங்களுக்கு, சுக்கான் மண்ணைச் சேர்ப்பது சாஸ்வத விர்த்ததிக்கு இடமுண்டு. ஒரு பூமியில் மேற்படைமண், கீழ்ப்படைமண் இரண்டையும் பரிசோதித்து விர்த்ததிக்குக் கொண்டு வரலாம். மேல்படை, மண்ணைப்போல கீழ்ப்படை மண்ணுமிருக்கலாம். இல்லாவிடில் மேல்படை ஒரு மாதிரியாகவுமீ கீழ்ப்படை ஒருமாதிரியாகவு மிருக்கும். இப்படி வெவ்வேறு மாதிரியுட னிருக்கையில் விர்த்ததிக்குக் கொண்டுவர இடமுண்டு. உதாரணமாக, மேற்படை மணலாயிருந்து கீழ்ப்படை களியாயிருந்தால் களியை வெட்டி மணலின்மேல் தூவிவிடலாம்; மேற்படை களியாயிருந்து கீழ்ப்படை மணலாயிருந்தால் களியை



நன்றாய்க் குத்திக் கிளறி மணலுடன் சேர்த்துக் கலந்து விடலாம். இவ்விதமன்னியில் ஒவ்வொரு தினுசான நிலம் சமீபத்திருக்கலாம். ஒரு களிமண் நிலத்துக்குச் சமீபத்தில் ஒரு மணல்பூரி நிரந்தரம் களியைக் கொண்டு வந்து மணலுக்கும், மணலைக் கொண்டு வந்து களிக்குமடிக்கலாம்.

#### சுண்ணாம்பு நீர்வைப்போடும் கலத்தல்.

அதிக களியாயுள்ள நிலத்துக்கும், அதிக மூலதிரவி யங்களடங்கிய பள்ளத்தாக்கு நிலத்திற்கும் சுண்ணாம்பு நீர்வைப்போடுவது மிகவும் நலம். இவ்வித நிலத்தில் ஒரு ஏகருக்கு 1 டன் முதல் 6 டன் வரையில் போட லாம். அடிக்கடி நீர்வைக் கலக்கக்கூடாது. 8 வரு ஷத்துக்கு ஒரு தடவை ஒரு டன் அல்லது இரண்டு டன் ஒரு ஏக்கர நிலத்துக்கு அடித்துவர வேண்டியது.

#### களி சுடுதல்.

உரப்பான களி நிலம் இவ்வித திருத்தத்தால் நன்மை யடையும். களியை உழுது சுரண்டிக் குவித்து அதிக தீப்படாமல் சுள்ளிகளால் சுட்டு, பூமியில் பரப்பிவிட வேண்டியது. இதனால் நிலத்தின் பிசுக்குமாறி, வேர் நன்றாயிரங்கிப் பயிர் திறப்படும்.

#### சுரண்டிச் சுடுதல்.

இது களி நிலத்துக்கும், புல், பூண்டுமுதலிய களை கள் ஜாஸ்தியாய்த் தொந்தரவு பண்ணுகிற நிலங்களுக் கும் சிலாக்கியம். இதற்கும், முந்தின களி சுடுதலுக்



## 14 புதுநிலங்களைச் சீர்திருத்தல்

சும் வித்தியாசம் யாதெனில், இதின் மேல் ஒரு அங்கு  
லம் அல்லது இரண்டுதான் சுரண்டிச் சுடப்படும் :  
அதிலே ஜாஸ்தி ஆழமெரிக்கப்படுகிறது. இது முக்  
கியமாய்ப் பயிர்களுக்கு இடஞ்சல்பண்ணுகிற களைகளை  
யும், பூச்சிகளின் புழுமுட்டைகளையும், தொலைக்கச்  
செய்யும் திருத்தம். இதனால், களைகளின் வேளையும்,  
விதைகளையும், பூச்சியின் முட்டையையும் அடியோடு  
தொலைக்கப்படுகிறது. இப்படி எரிப்பதால் இந்திலங்  
களில் இந்திரியவஸ்து எரிந்துபோய் நஷ்டமுண்டா  
கிறது. இந்நஷ்டத்தைத்தீர்க்க அவுரி இலை முதலிய  
பச்சை எருவை அடிக்கவேண்டும். இல்லாவிடில்  
அவுரி முதலிய பயிரைப் பயிரிட்டு பூக்கு முந்தி பூமியி  
லுழுதுவிடவேண்டும். இப்படி பண்ணுவதால் மறுபடி  
யும் நிலத்தில் இந்திரியவஸ்து உண்டாய்விடுகிறது.

**ஜலதாரா.**

அதிக களியுள்ள நிலத்தில் மேல்படைமண் வழி  
யாய் பாசனத்துக்கு மடைகள் வைப்பதுடன், கீழ்ப்  
படை மண்ணில் குசவன் மண் சட்டி பண்ணுவது  
போல, மண் குழாய்கள் செய்து, அவைகளைக் கொ  
ண்டு வைத்து, பிணைத்து, சில முனிசிபாலிதிகளில்  
தண்ணீர்க் குழாய்கள் வைக்கப்பட்டிருப்பது போல  
வைத்துவிட வேண்டியது. இதால் ஜலம் அதிகமாகத்  
தேக்கங்கொள்ளாமல் நிலத்துவாரங்களிலிறங்கி குழாய்  
வழியாய் வடிந்து விடும். வாயு நன்றாயிறங்கி வேர்  
ஆழ ஓடி பயிர் கொழிக்கும். சதுப்பு நிலங்களில் அதா



வது ஜலம் வடிய ஏது அன்னியில் தங்கிக்கிடக்கின்ற பூமியிலாவது அல்லது மூலதிரவியங்கள் எதேஷ்டமா உள்ள சதுப்பிலாவது ஜலதாரை வைத்து வடியச் செய்வதுடன், அவ்வித இடங்களில் சிலவித விருட்சங்கள் வைத்து வளர்க்கவேண்டும். கற்பூர விருட்சம் (Eucalyptus), ரெயின் டிரி (Rain tree) முதலிய மரங்களைப் பயிர்செய்தால் ஜலங்களைப்போக்கடித்து விடும். இவ்வித மரமொன்று தன் நிறை எவ்வளவோ அதற்குப் பத்துப்பங்கு கனதியுள்ள ஜலத்தை 24 மணி காலத்தில் நீராவியாய்ப் புகைத்து போகும்படி பண்ணிவிடுகிறது. இப்படி இந்தமரங்களை விர்த்திபண்ணி ஐரோப்பாக்கண்டத்திலும், அல்ஜீரியாவிலுமுள்ள சதுப்புகளெல்லாம் சாகுபடிக்கு நல்ல பூமியாகவிருக்கின்றன. அந்த சதுப்புகளில் ஜ்வரம் (காய்ச்சல்) வருவது இயற்கை. கற்பூரவிருட்ச விர்த்தியால் இவ்விதம் ஜ்வரம் தொலைந்து பூமி சீர்பட்டு நன்னூடாயிருப்பதற்கு பிரத்தியட்சம் அல்ஜீரியாதான். நமது கவர்னர் கோடைக்குப் போகும் நீலகிரியிலும் இப்படியே செய்கிறதாகக் கேள்வி.

#### வண்டலடித்தல்.

கால்வாயில் அணைகட்டி, வண்டல் ஜலங்களைப்பூமியில் விட்டு, அவ்வண்டல் படிவால், நிலந்திறப்படுகிறது. மேற்சொல்லிய திருத்தங்களில் எந்த எந்த பூமிக்கு எப்படி எப்படிச் செய்யவேண்டுமோ அப்படி சமய உசிதம்போல் திருத்திக்கொள்ளவேண்டியது.



## 16 புதுநிலங்களைச் சீர்திருத்தல்

ஆறு, நதி, கால்வாய், பாசனமில்லாத இடத்தில் நன்றாய் யோசித்து வெத்தின் அளவுப்படிக்கு வேணி கிணறுகள் தோண்டி கற்கட்டிடங்களைக் கக்கட்டி நல்ல சிலாக்கிய ஏற்றப் ஏற்படுத்தவிட வேண்டும்.

இவ்வித ஏற்பாடுகளுடன் தன்னுடைய பூஸ்திதிக்கு மத்தியில் கிருஷ்ணன் வசிக்க ஒரு விடு கட்டவேண்டியது : அவனுக்கு வேலை செய்யும் பண்ணை ஆட்களுக்கும் தன்னருகில் வசிக்க இடமளிக்கவேண்டும். மாடு ஆடுகள் முதலிய விவசாயக் கால்நடைகளுக்குக் கொட்டிலும் சமீபத்தில் சாஸ்திரப்படி அமைப்பது நன்மை. கிருஷ்ணன் தன்னுடைய பூஸ்திதியைச் சுற்றிலும் உயிருள்ள வேளி உண்டு பண்ணுவதுடன், பல விருட்சங்களும் அநேக விடததில் உண்டாக்க வேண்டியது. உயிருள்ள வேளிகளாவன—கொருங்காப்பள்ளி, கத்தாழை திருகுக்கள்ளி முதலியன. இப்படிச் செய்தால் கிருஷ்ணனுக்கு நிரம்ப நன்மையைக்கொடுக்கும். பயிர்களை நன்றாய்ப் பார்வையிடலாம். எருக்களை சாஸ்திரோக்தமாய்க் கொட்டிலுக்குச் சமீபத்தில் சேகரித்து வைத்திருக்கும் இடங்களிலிருந்து பூமிக்குக் கொண்டு அடிப்பதில் தொந்தரவில்லை. வண்டிச் சத்தங்களில் அதிக நஷ்டப்படவேண்டியதில்லை. வேலையை ஊழலன்னியில் கவனித்துப்பார்க்குகூடும். வயல்களுக்குச் சமீபத்திலிருப்பதால் விவசாயிக்கு இன்னும் அநேக வித லாபங்களிருக்கின்றன.

---



களர் நிலங்களைச் சாகுபடிக்குக்

கொண்டுவரச் சீர்ருத்தல்.

களர் நிலமாவது உப்பு நிலந்தான். இவ்வித நிலம் பார்வையிலேயே வெளுத்தகிறமாகவும், சாப்பல்வர்ண மாயுந் தோன்றும். பாறைபோல் கெட்டியாயிருக்கும். இதில் ஒருவித பயிரும் விளையாது. மாரிகாலத்தில் மாத்திரம் சிலவித பிரயோசனமற்ற புற் பூண்டுகள் காணப்படும். கோடையில் இவைகள் வாடி அவிந்து கிடக்கும்.

இந்தக் களர் நிலத்தைத் தமிழ்நாட்டில் களர் அல்லது உவர் நிலமென்றும், தெலுங்கு தேசத்தில் செளடு என்றும், இந்தியாவின் வடபாகத்தில் உசார் (Usar) என்றும் சொல்லுகிறார்கள். பூமியின்மேல் பூத்திருக்கப்பட்ட உப்புக்குத்தான் களர் என்று பெயர். இப்பேர்ப்பட்ட நிலம் இந்தியாவின் வடபாகத்தில் விசேஷமாய் மிகுதி. நம்முடைய ராஜதானியிலும் அநேக இடங்களிலிருக்கின்றது. இந்தக்களர் நன்செய் சாகுபடி பூமியில்தான் காணப்படுகிறது. புன்செய் சாகுபடியில் அவ்வளவு ஜாஸ்தியாய்க் காணப்படவில்லை. நமது ராஜதானியில் துங்கபத்திரை, கிருஷ்ணா கால்வாய்கள் பாசனமுள்ள இடங்களில் களர் கொஞ்சம் விசேஷம். புன்செய் நன்செய்யாக மாற்றப்பட்ட சில இடங்களில் கூட களரைப்பார்க்கலாம். இப்படி புன்செய் நன்செய்யாய் மாறின இடங்களில், தரை முகத்



## 18 களர் நிலங்களைச் சீர்திருத்தல்.

தில் பூத்திருக்கப்பட்ட உப்பு கொஞ்சமாயிருந்தால், பாசனத்தை சிலகாலம் நிறுத்திவைத்தால் களர் நீங்கி பூமி முன் ஸ்திதிக்கு வந்துவிடுகிறதாக அநுபோகத்தினால் தெரியவந்திருக்கிறது. களரினால் பூமி வெளுத்திராமல், சுக்கான் மிகுதியால் வெளுப்புநீற மடைந்திருந்தால் அந்தப் பூமிக்கு சுண்ணாம்புக் களர் என்று பெயர்.

உப்பு பூத்தலுக்குக் காரணம்.

கிருஷி சாஸ்திரத்தில் மேல்படை மண், கீழ்ப்படை மண் என்று இரண்டுவித மண்ணுண்டு. மேல்படை மண்ணாவது பூமியில் விவசாயக்கருவிகளால் உழுது கொத்தப்படுகிற மண்தான். இது சுமார் ஒன்பது அங்குல ஆழத்துக்குமேல் போகாது. இதற்குக் கீழுள்ள மண்ணெல்லாம் கீழ்ப்படைதான். இந்த மண்களில் அநேக துவாரங்கள் (pores) இருக்கின்றன. இந்தத் துவாரங்கள் நுட்பமானவை. நாம் ஒரு சாம்பல் கட்டியை எடுத்து நுனியில் பிடித்து, அடியை ஜலத்தின் மீது வைத்தால், ஜலம் சரேலென்று நுனிக்குப்போய் அந்தக்கட்டி முழுவதையும் நனைத்து விடுகிறது. ஏனெனில், இந்தச் சாம்பற்கட்டியில் அதிக நுட்பமான துவாரங்களிருக்கின்றன. எவ்வளவுக்கு துவாரங்கள் அதிக நுட்பமாயிருக்கின்றனவோ அவ்வளவுக்கு ஜலம் ஜாஸ்தியாய் ஏறும். இப்படியே நம்முடைய வீட்டிலெரியும் விளக்குத் திரிகளிலேயும், மசி ஒத்துகிற கடிதத்திலேயும், (Blotting Paper) இவ்விதசக்தியை (Capillary



action) பார்க்கலாம். இதேமாதிரி பூமியிலும் துவாரங்களிருக்கின்றன அவைகள் வழியாய் நுட்பத்துக்குத் தகுந்தபடி ஜலமேறுகின்றது.

சிலத்துக்கு இறைக்கிற ஜலம் மழைஜலமாயிருந்தாலும் சரி, பாய்ச்சல் ஜலமாயிருந்தாலும் சரி, பூமியில் ஈவார்து கீழ் இறங்குகிறது. கீழ்ப்படை மண்ணில் சிரம்ப நுட்ப துவாரங்களிருந்தால் அதிலுள்ள ஜலம் கோடையில் இந்தத் துவாரங்கள் வழியாய் ஓடி நீராவி யாய்ப் புதைகதுபோய்விடுகின்றது. இந்தக் கீழ்ப்படை மண் ஜலத்தில் சிலவித உப்புக்கள் கரைந்திருக்கின்றன. இவ்வித ஜலம் மேலேறி ஆவியாய்ப் புதைந்தபிறகு இந்த உப்புகள் மேல்படை மண்ணில் தங்கிவிடுகின்றன. மேற்கூறிய காரணத்தினாலு களர் நிலம் உண்டாகிறது.

அநேகவித உப்புகள் துறைமுகத்திலிருந்து மலர்ந்து படர்கின்றன. நாம் தினம் சாப்பாட்டுக்குப் பிரயோகிக்கிற உப்பு (Common salt or Sodium chloride) ஒன்று. வாணக்காரர்கள் வெடிமருந்துக்காக உபயோகப்படுத்துகிற பொட்டிலுப்பு (Salt petre or Potassium nitrate) ஒன்று. இந்தப் பொட்டிலுப்பு மாதிரி யாக (Sodium nitrate) ஒன்று. மற்ற உப்புகளாவன:— ஸோடா உப்பு (Sodium carbonate), கந்தக உப்பு (Sodium sulphate), ஆக இந்த ஐந்து உப்புகள்தான் முக்கியமாய் காணப்படுகின்றன. இவைகளுக்குள் பொட்டிலுப்பும், ருசக்கரமில் ஸௌடியமும் (Sodium



## 20 களர் நிலங்களைச் சீர்திருத்தல்.

nitrate) நல்ல எருக்கள். பயிருக்குவேண்டிய முக்கியமான பதார்த்தங்கள் இவைகளிருக்கின்றன. ஆகையால் இவைகளைக்கொண்டு நல்லபிரயோசனப்படுத்திக்கொள்ளலாம்.

களரின் விசேஷபாகம் பூமியிலிருந்து அரை அங்குல ஆழத்துக்குள்ளாகக் காணப்படுகின்றது. நிலத்தின் மேல்படைமண்ணைப் (soil) பரிசோதனை செய்யும் பொருட்டு ரசாயன சாஸ்திரிகள் ஒரு இடத்தில் ஒன்பது அங்குலம் ஆழமுள்ள சிறகுழியை வெட்டி அதிலுள்ள மண்ணை எடுத்து நன்றாய்க் கலக்கி தீயில் காட்டி நரத்தைப் போக்கடித்து விடுகிறார்கள். பிறகு விதிப்படி அணுப்பிரிவாகப் பிரிக்கிறார்கள். பிரித்து 100 பங்கு மண்ணுக்கு இன்ன இன்ன பதார்த்தம் இவ்வளவு நிறையிருக்கிறது என்று கண்டுபிடிக்கிறார்கள். ஏகரா 4840 சதுரகஜம். மேல்படைமண் ஒன்பது அங்குலமாக, ஒரு ஏகரா பூமியில்  $4840\frac{1}{4} = 1210$  கஜக்குழி மண்ணிருக்கிறது. இந்த 1210 கஜக்குழி மண்ணரத்தின் நிறையை நீக்கி, அதாவது 1210 கஜக்குழி வரண்டமண் (dry soil) சுமார் 3,000,000 பவுண்டு (lbs) நிறையிருக்கும். இந்த வரண்ட மேல்படைமண்ணில் 100க்கு  $\frac{1}{2}$  பங்குக்கு அதாவது ஒரு ஏகராவுக்கு 15,000 பவுண்டுக்குமேல் கரையக்கூடிய உப்பு இருந்தால் பூமி வளங்குறையும். 100க்கு 2 பங்கு அதாவது ஒரு ஏகராவுக்கு 60,000 பவுண்டுக்கு மேலிருந்தால் பூமியில் ஒரு பயிரும் விளையாது. ருசக்கரா



மில் லவணசாரங்கள் (Nitrates) 100க்கு 4 பங்கு அல்லது ஒரு ஏக்கருக்கு 120,000 பவுண்டு வரையில் நல்ல செழுமையான பூமியிலிருக்கிறதாகக் கண்டுபிடிக்கப்பட்டிருக்கிறது. கோதுமைப் பயிரை (Wheat) உள்ள சிலபூமிகளில் 100க்கு 6பங்கு அல்லது 180,000 பவுண்டு ருசக்கராமில் லவணசாரம் (Nitrates) இருக்கிறதாகத் தெரியவருகிறது. ருசக்கராமில் லவணங்கள் மாத்திரம் 100க்கு 6 பங்குக்குமேல் போனால் நிலம் பொட்டைதான். இதனால் நாம் என்ன அனுமானிக்கலாம். பூமியில் 100க்கு 2 பங்கைப்பார்க்கிலும்கரையக்கூடிய உப்புகள் அதிகரித்தால் அந்தப் பூமி பொட்டை.  $\frac{1}{2}$  பங்குக்குமேல் 2 பங்கு வரையில் செழுமை வரவரக் குறைந்துகொண்டேவரும். ருசக்கராமில் லவணசாரங்கள் (Nitrates) மாத்திரம் 100க்கு 6 பங்கு வரையிலிருக்கலாம். இதற்கு மேற்பட்டால் நிலந்தரிசையாய்த்தான் போடும்படி நேரிடும்.

களர் நிலம் யாதென்று இப்போது நன்றாய் விளங்கக்கூடும். ஒரு பூமியில் 100 பங்கு மண்ணுக்கு 2 பங்குக்குமேல் சாதாரண கரையக்கூடிய உப்புகளிருந்தாலும் அல்லது 100 பங்குக்கு 6 பங்குக்குமேல் ருசக்கராமில்லவணகாரம் (Nitrates) இருந்தாலும், அந்தபூமிகளர்தான். இந்தக் களரில் பயிர் முளைக்காது, ஆதலால் பயிருண்டுபண்ண சிகிச்சைகளைக் குறிப்போமாக. இந்தச் சிகிச்சைகள்தான் நிரம்ப முக்கியம். யாவற்றுகுடித்தனக்காரர்களும், விவசாயிகளும் இவைகளைக்



## 22 களர் நிலங்களைச் சீர்திருத்தல்.

கவனித்துப் பார்த்து தாங்கள் அனுபவித்துக்கொள்ள வேண்டுகிறேன்.

### களரைச் சீர்படுத்தல்.



களர் நிலங்களை முதலில் நான்கு பக்கத்திலேயும் வேலியால் அடைக்கவேண்டியது. அப்படி பண்ணினால் ஆடு மாடுகள் நடந்து அதிக கெட்டிப்படாமலும், இயற்கையாய் வளர்ந்திருக்கிற புற்பூண்டுகள் கால்நடைகளால் நாசப்படுத்தப்படாமல் இன்னும் அதிகமாக வளர்ந்து படரும். இப்படி வளர்ந்து படருகிற புற்பூண்டுகளின் வேர்கள் களர்பாறையின் கெட்டியைக் கொஞ்சம் இளக்குகின்றன. இதில் செலவு மிகவும் சொற்பம். மூலதிரவியம் ஜாஸ்தியாய், உப்பு அடங்கலாம். (2) களர் நிலங்களில் நான்கு பக்கத்திலேயும் நல்ல பெரிய கரைகள் கட்டி கால்வாயில் கவிணை (littledam) வைத்து வண்டல் ஜலத்தை நிரப்பிவிட வேண்டும். ஜலம் வற்றின பிறகு வண்டல்கள் படிந்திருக்கும் வண்டல் நிரம்பப் படியவேண்டியது. அப்போதுதான் நிலம் திறப்படும். (3) பூமியின் கீழ் ஜல்தாரை வைத்தால், இவைகள் வழியாய் உப்பு ஜலம் தொலைந்து, பூமியில் களர் நீங்கிவிடும். நமது நாட்டில் இதைசெய்ய நிரம்ப கஷ்டமாகும். (4) பூமியை நன்றாய் முழங்கால் துடை பரியந்தம் வெட்டிக் கொத்திவிடவேண்டும். இப்படிச் செய்தால் நிலத்துவாரங்கள் எல்லாம் நாசப்பட்டு துவாரங்களின்



வழியாய் ஜலம் ஏறுகிற சக்தி (Capillarity) யும் குறைவு பட்டுப்போய்விடுகிறது. இந்த சக்தி குறைந்தால் மேல்படை மண்ணில் உவர் எழாது. (5) மனுஷச்சாணமாகிய மலங்கள் (Night soil), அவுரிமுதலிய பச்சை எருக்கள் (Green-manure), தோல்கிடங்கு எருக்கள், தோல்கிடங்கைக் கழுவின ஜலம், பிண்ணாக்குகள் (Oilcake), புளியம் விதைகள், பெரண்டை, வரகு (Varagu) வைக்கோல், அவரிச்சாணம் (Indigo refuse) முதலியவைகளை எருக்களாக அடித்து நிலத்தைக் காத்திரப்படுத்தவேண்டியது. மேற்கூறிய எருக்களில் எது அதிகமாக அகப்படுகிறதோ அதைப்போட்டாலும் சரி, எல்லாம் கிடைக்கக்கூடிவையாயிருந்தால் அவைகளைப்போட்டாலும் சரி, கிடைத்ததை யெல்லாம் போட்டால், களர் நீங்கி பூமி நல்ல ஸ்திதிக்குவரும். (6) களர்பூமியில் நாம் தினம் உண்ணும் உப்பு அதிகமாயிருந்தால் இதில் மிகவும் பிரியமுள்ள பயிர்களைப் பயிருட்டு விர்த்திசெய்யவேண்டும். அவ்வித பயிர்களாவன தென்னை, கேழ்வரகு, சிலவித நெற்பயிர், கற்றாழை, சவுக்கு, கொருக்காப்புள்ளி, பெரண்டை, சிலவித பூண்டுகள் (Salt bush) கருவை மரம் முதலியன. பிரத்தியட்சமாய் சமுத்திரக்கரையில் தென்னையும் சவுக்கும் செழிக்கிறதை நாம் அறியோமா? இந்தப் பயிர்களை உண்டுபண்ணினால் களர்நீங்கும். (7) உப்பு நிலங்களுக்குப் பின்வருமாறு சலதாரையும் வடிமடையுங் கட்டவேண்டியது.



## 24 களர் நிலங்களைச் சீர்திருத்தல்.

முதலில் வயலில் ஜலத்தைக்கட்டி கலப்பையால் நல்ல குழப்ப யடித்து உழுது, உடனே கிடங்குகள் (Trenches) வெட்டி, உப்பு சலத்தைக் கிடங்குகள் வழியாய் வடியவிடவேண்டும் இன்னுமொன்று யாதெனில், பூமியில் பன்னிரண்டு அடி பன்னிரண்டு அடிக்கு மண்ணைக்கொண்டு மேடுகள் (Ridges) வைத்து மேடுகள் கொஞ்சம் சரிவுடன் போட்டுவிடவேண்டியது. மேடு மூன்றடி உயரம் இருக்கவேண்டும். சரிவுகளில் கேழ்வரகைப் பயிரிடவேண்டும். இரண்டு பாத்திக்கும் மத்தியிலிருக்கப்பட்ட பள்ளமடை, மழைக்காலத்தில் உப்பு ஜலத்தைக் கொண்டுபோய்விடும். வயலின் பள்ளபாகத்துக்குக்கீழ் ஒரு பெரிய கிடங்குவெட்டியிருந்தால் அதில் போய் இந்த உப்புஜலமெல்லாம் விழுந்துவிடும். இந்தியாவின் வடபாகத்தில் கவர்ன்மெண்டார் இந்தக் களர் நிலங்களைப்பற்றி கவனப்பெடுத்துக் கொண்டு, ஒரு கமிட்டி ஏற்படுத்தி விசாரிக்கச் சொன்னபோது, அந்தக் கமிட்டிக்காரர்கள் உப்புப்பூத்தலுக்கு அநேக காரணங்களைச் சொல்லி அவைகளைப் போக்க அநேக சீர்பாடுகளையும் எழுதியிருக்கிறார்கள். ஒருவர் கால்வாய் ஜலத்தால் களர் உண்டாகிற தென்கிரார். இது நம்பக்கூடியதல்ல! ஏனெனில் அந்தப்பக்கங்களில் கால்வாய் ஜலத்தைப் பார்க்கிலும் கேணிஜலம், ஜாஸ்தி ஸோடா உப்புகளை உடைத்தாயிருக்கிறது. அவர்கள் சொல்லியிருப்பதைத் தவிர இன்னுமனேக திருத்தங்களை நான் இதிலுட்படுத்தி யிருக்கிறேன்.



# சென்வன இராஜதானியிலுள்ள முக்கிய கருவிகள்.

## (1) கலப்பைகள்.

—: 0 :—

நாட்டுக்கலப்பை அல்லது குச்சிக்கலப்பை யென்றும், கொல்லைக்கலப்பை யென்றும், கொழுக்கலப்பை யென்றும், சீமைக்கலப்பையென்றும் அநேக கலப்பைகள் உபயோகப்படுத்தப்படுகின்றன.

(a) நாட்டுக்கலப்பை அல்லது குச்சிக்கலப்பையில், வால்கட்டையைக் கூர்மையாகச் சீவி, அந்தக் கூர்மையான பாகம் தான் கொழுவாகிறது. இது அடிக்கடி தேய்ந்துபோய்விடுமாதலால் அடிக்கடி தச்சனால் சீவப்பட்டுக் கூர்மை பண்ணப்படும். இதை அநேகமாக நஞ்சை வயலில் குழிகள் உபயோகப்படுத்துவார்கள் சிலவேளை வால்கட்டையில் இரும்புக்கொழுவை அமைப்பதுமுண்டு. உழுகிறவன் அஜாக்கிரதையினால் சில சமயம் நாட்டுக்காலில் கொழு ஏறிவிடுமென்று சில குழிகள் அதன்னியில் உழுகிறார்கள். குச்சிக்கலப்பையைப் பார்க்கிலும் கொழுக்கலப்பை சிலாக்கியம்.

(b) கொல்லைக்கலப்பை என்பது குச்சிக்கலப்பையைப்போலிருப்பது மன்னியில் பெரிதாகவிருக்கும். இது இரும்புக்கொழுவோடும், கொழுவன்னியிலும்



உபயோகப்படுத்தப்படுகிறது. புஞ்சைகளிலும், படுகையிலும் இதனால் பூமி உழப்படுகிறது.

(c) பெத்தமடக்கி என்பது 5 6 ஜோடி மானிகளால் இழுக்கப்பட்ட கலப்பையாக இருந்தபோதிலும், இது கரிசல் காட்டில் உபயோகப்படுத்தும் கொல்லைக் கலப்பையாகச் சொல்லலாம்.

(d) கொர்டு கலப்பை என்பது 3 வாக் கட்டைக்குக் குறைவன்னியில் அமைத்துள்ள கலப்பை. கொர்டு என்னும் விதை தெளிகருவியில் மூங்கில் குழாயையுள், உடுக்கையையும் எடுத்துவிட்டால் இக்கருவியாகிறது. இது கரிசலிலும் செவ்வலிலும், புஞ்சையில் உபயோகப்படுத்தப்படுகிறது.


(e) சீமைக்கலப்பை.

இதில் கொழு நன்றாயிருப்பதுடன், மண்ணைப் புறட்டித்தள்ள இறகுடன் அமைக்கப்பட்டிருக்கும். இதில் லேசான கலப்பையும், கனமான கலப்பையும், இரட்டை இறகு கலப்பையும், இப்படி அநேக கலப்பைகள் உண்டு. ஆனால் நமது இராஜதானி நஞ்சைகளுக்கு 6, 7 ரூபாய் விலையுள்ள லேசான சீமைக்கலப்பைகள் போதுமானவை. புஞ்சையில் பொலபொலத்த மண்களுக்கும் மணல்சாரிக்கும் 10, 12 ரூபாய் விலையுள்ள சீமைக்கலப்பை போதுமானது ; பருத்தி பயிரிடும் கரிசல் காட்டிற்கு 60, 70 ரூபாயுள்ள சுவீடிஷ் கலப்பைகள் நிரம்ப பிரயோஜனமென்று சொல்லுகிறார்கள்.



லேசான சீமைக்கலப்பை.

A-கொழு  
B-இறகு  
C-ஏர்க்கால்  
D-பிடி



A. கொழு.


B. இறகு.

C. ஏர்க்கால்.

D. பிடி.



சீமைக்கலப்பை.



- |                |                      |
|----------------|----------------------|
| (1) பிடி.      | (5) கொழு.            |
| (2) ஏர்க்கால். | (6) இறகு.            |
| (3) கத்தி.     | (7) கலப்பைச் சட்டம். |
| (4) சங்கிலி.   | (8) சக்கரம்.         |



சீமைக்கலப்பைக்கும் நாட்டுக்கலப்பைக்கும்  
உள்ள தார தம்மியம்.

—:0:—

நாட்டுக்கலப்பை உழுதுகொண்டு போகும்போது 5 அங்குல அகலமும், 4 அங்குல ஆழமுமுள்ள படைச் சாலை பிரிக்கிறது ; ஆனால் சீமைக்கலப்பையோ 7 அங்குல அகலமும் 5 அங்குல ஆழமுமுள்ள படைச் சாலைப் பிரிக்கிறது ; அதாவது ஒரு படைச்சாலின் பிரிவு சுமார் 35 சதுர அங்குலமிருக்கும். ஒரு ஏகரா 4840 சதுரகஜமானதால், 5 அங்குல ஆழம் கிளறப் படும்போது  $\frac{4840 \times 5}{36}$  அதாவது 672 கனகஜமண் கிளறப்பட்டு புறட்டப்படுகிறது. இப்படி ஒரு ஏகர் உழ  $\frac{4840 \times 36}{7} \times \frac{1}{1760} =$  சுமார் 14 மயில் மாடுகள் நடக்கும்படியாகவிருக்கும். இவ்விதம் ஒரு ஏகர் உழ  $1\frac{1}{4}$  நாள் செல்லும்.

சீமைக்கலப்பையினால் உழ ஒரு தினத்திற்கு  
நேரிடும் செலவு.

கலப்பை ரூபாய் 20 என்று வைத்துக்கொண்டும், வருஷத்தில் 60 நாள் வேலை செய்கிறதென்று வைத்துக்கொண்டும், ரூபாய் 100க்கு வருஷம் 1க்கு ரூபாய் 12 வீதம் வட்டி போட்டுப்பார்த்தால் ஒரு நாளைக்கு வட்டி ஆகிறது.



$$\frac{12 \times 20 \times 1}{100 \times 60} = \text{ஒரு சுமார்} \quad \dots \quad 0-0-8$$

$$\left. \begin{array}{l} \text{ஒரு கலப்பை 10 வருஷமிருக்கும்.} \\ \text{ஒரு நாளைக்கு சேதாரம் பார்த்தால்} \\ \frac{20}{100} \times \frac{1}{60} \dots \dots \dots \end{array} \right\} 0-0-6$$

$$\left. \begin{array}{l} \text{மாட்டின் விலை 80 ரூபாயென்றுவைத்} \\ \text{துக்கொண்டு வருஷத்தில் 300 நாள்} \\ \text{வேலை செய்கிறதென்றும் வைத்துக்கொ} \\ \text{ண்டு 1 நாளைக்கு ஒரு 80க்கு வட்டி பார்த்} \\ \text{தால் } \frac{1}{100} \times 80 \times \frac{1}{300} = \dots \end{array} \right\} 0-0-6$$

$$\left. \begin{array}{l} \text{மாட்டுக்கு சேதாரம் ரூபாய் 100க்கு} \\ \text{ரூபாய் 10 என்றும், அதை 300 நாளைக்} \\ \text{குக்கணக்கிட்டால் ஒரு நாளைக்கு} \dots \end{array} \right\} 0-0-5$$

$$\left. \begin{array}{l} \text{கலப்பை செப்பனிட வருஷம் 2 ரூபா} \\ \text{யென்றுவைத்துக்கொண்டு 60 நாளைக்கு} \\ \text{கணக்கிட்டால் ஒரு நாளைக்கு} \dots \end{array} \right\} 0-0-6$$

$$\left. \begin{array}{l} \text{ஒரு நாளைக்கு ஒரு ஜதைமாட்டுக்கு} \\ \text{தீனி வகைஞ்ச செலவு} \dots \end{array} \right\} 0-6-0$$

$$\left. \begin{array}{l} \text{உழுகிறவன் கூலி} \\ \text{1 நாளைக்கு} \end{array} \right\} 0-3-0$$

$$\text{ஆக மொத்தம் சுமார்.} \quad \underline{\underline{0-12-0}}$$

ஆக சீமைக்கலப்பையால் 5 அங்குலம் ஆழம் ஒரு ஏக்கர் உழ சுமார் 1 ரூபாய் செலவு பிடிக்கும்.

நாட்டுக்கலப்பை உழும்போது மேலே 5 அங்குலம் அகலமும், அடியில்  $\frac{1}{2}$  அங்குலம் அகலமும், 4 அங்குலம் ஆழமும் உள்ள படைச்சாலை உண்டாக்குகிறது. படைச்சாலின் அகலம் 5 அங்குலமானதினால்,




$\frac{4840}{5} \times 36 \times \frac{1}{1760}$  (ஒரு ஏகர் உழ) 20 மயில் நடை  
 மாட்டுக்காகிறது. படைச் சால் ஒன்றோடொன்று  
 சேர்த்தாப்போலிருந்தால் ஒரு ஏகர் உழ மாடு நடக்க  
 இப்படி 20 மயில் செல்லும். ஆனால் நாட்டுக்கலப்பை  
 வேலையில் படைச்சால் ஒன்றோடொன்று சேர்த்தாப்  
 போலிருக்கிறதில்லை. ஆகையால் ஒரு பூமியை 4  
 அங்குலம் ஆழம் நன்றாய் உழ, குறைந்த பட்சம் 3  
 உழவாவது உழவேண்டியிருக்கிறது. நாட்டுக்கலப்பை  
 உழவில் 2 படைச்சால்களுக்கு மத்தியில் எப்போதும்  
 சிலபாகம் உழுபடாமலே இருக்கும். ஆகையால் ஒரு  
 ஏகர் உழ, மாடு குறைந்த பட்சம் 40 மயிலாவது  
 நடக்க வேண்டியதாக இருக்கும். இப்படி மாடு 40  
 மயில் நடந்து ஒரு ஏகர் நாட்டுக்கலப்பையால் நன்  
 றாய் உழ தினம் 8 மணி மேனிக்குக் குறைந்த பட்சம்  
 3 நாள் செல்லும் மாட்டின் தீனிக்கு தினம் 5  
 அணுவாகவும் உழுகிறவன் கூலி தினம் 3 அணுவாக  
 வும் ஒரு ஏகர் நாட்டுக் கலப்பையால் உழ சுமார்  
 ரூ. 1—8—0 ஆகும். இப்போது நாட்டுக்கலப்பை  
 சீமைக்கலப்பையின் தாரதம்மியம் நன்றாய் விளங்கு  
 கிறதல்லவா? நாட்டுக்கலப்பையினுடைய வேலையா  
 னது மட்டமாயிருப்பதுடன் அதிக செலவுள்ளதாக  
 வும், காலம் ஜாஸ்தி பிடிக்கக்கூடியதாகவுமிருக்கிறது.  
 சில பருவங்களில் காலத்தினுடைய விலை மதிப்பற்ற  
 தென்றும், நிரம்ப முக்கிய மென்றும் யாருக்குத்தான்  
 தெரியாது?



குழிகள் புஞ்சையில் 5, 6 ஏகராவுக்கு ஒரு கலப்  
பையும், நஞ்சையில் 3 ஏகராவுக்கு ஒரு கலப்பையும்  
வைத்திருக்கிறார்கள். உரப்பான 15 ஏகர் புஞ்சை  
உழவு செய்நேர்த்திக்கு ஒரு சீமைக்கலப்பை போது  
மானது. இந்த விஸ்தீரணத்துக்குக் குறைவுபட்டால்  
சீமைக்கலப்பைக்குப் போதுமான வேலை இருக்காது.  
டாக்டர் வாயல்கர் நில விஸ்தீரணம் ஜாஸ்தியாயுள்ள  
விடங்களிலும், கரும்பு சாகுபடிக்கும், குந்தானத்,  
அருகம் புல் முதலிய களைத்தொந்தரவு இல்லாத பூமி  
களிலேயும், மழை ஜாஸ்தியாயுள்ள இடங்களிலேயும்,  
ஆகிய இந்த நான்கு வழிகளில் சீமைக்கலப்பையை  
தாராளமாய் உபயோகிக்கலாமென்று சிபார்சு செய்  
கிறார்.



(2) வேர்வாரி.





எங்ஙனே சீமைக்கலப்பை உபயோகப்படுத்தப் படுகிறதோ, அங்ஙனமெல்லாம் வேர்வாரியை கட்டாயம் உபயோகப்படுத்தவேண்டும். இது சட்டத்தில் கூருள்ள முனைகள் அநேகம் அடித்ததாக இருக்கும் ஒரு கருவி; அம்முனைகளுக்கு வேர்வாரி பல் என்று பெயர். பற்கள் வேர்வாரிச்சட்டத்தில் ஒன்றுக்கொன்று சமதூரமாகவும், ஒருவரிசை பற்கள் மறுவரிசை பற்களுக்கு நேராக இராமல் விலகிப்பொருந்தியிருக்கும். இப்பற்கள் உபயோகிக்கும்போது எங்கும் ஒரே விதமாகப் பதியும்.

#### பிரயோசனம்.

மண்ணுக்குள் இருக்கும் புல், பூண்டு, முதலிய களைகளின் வேர்களை நன்றாய் வாரிக்கொண்டு வரும். உதிராமலிருக்கிற மண்ணுங்கட்டியைத் தூளாக்கிவிடும். விதைத்த தானியத்தை மண்ணால் மூடும். பூமியை ஒத்தாப்போலாக்குகிறது. இப்படிச் செய்வதனால் விதையும் ஒத்தாப்போல் விழுந்து ஒத்தாப்போல் முளைக்கிறது. உழவு முதலிய செய்நேர்த்தி செய்யப் பட்ட வயளில் மழை பெய்து பூமி கெட்டிப்பட்டுப் போய் விட்டால் அதைக்கிண்டிவிடப் பிரயோசனப்படும். வேர்வாரியில் வேலைக்குத் தகுந்தபடி வெவ்வேறு வடிவமாய் அமைக்கப்படும். கட்டி உடைக்கிறதற்கு நிரம்ப கனமுள்ள மாக்கட்டைகளில் நீளமான பற்கள் அமைந்துள்ளதாக இருக்கும். விதையை மூடுவதற்கும் மழையால் மூடிப்போன விதைக



ளின் முனை வெளிவர பூமியைக்கிளறவும் சின்ன பற்களைபுடைய இலேசான வேர்வாரி போதுமானது. சுமார் 15 ரூபாய் விலையுள்ள ஒரு வேர்வாரியின் ஒரு நாள் வேலைக்குச் செலவு விபரம்.

|                             |        |               |
|-----------------------------|--------|---------------|
| ஒரு ஜதை மாட்டுக்கு வாடகை    | ரூ.    | 0—8—0         |
| ஒட்டுகிறவன் கூலி 1 நாளைக்கு | „      | 0—3—0         |
| சேதாரம் வகைரா               | „      | 0—1—8         |
|                             | ஆக ரூ. | <u>0—12—8</u> |

ஒரு நாளைக்கு 4 ஏகர் வேர்வாரியால் வேலை செய்யலாம். ஒரு நாளைக்கு ஒரு ஏகர் வேர்வாரியால் வேலை செய்ய சுமார் 0—3—2 செலவாகிறது.

### (3) உருளைகள்.

மாத்தினாலாவது, கல்லினாலாவது, இரும்பினாலாவது தரையில் தடையின்றி உருளத் தக்கதாய்ச் செய்து சட்டத்தில் மாட்டி, அந்தச் சட்டத்தில் எருது இழுக்க ஏர்க்காலுடன் அமைந்திருக்கும் ஒரு கருவி. சாதாரணமாய் மர உருளையே போதுமானது.

#### பிரயோசனம்.

வேர்வாரிகளால் உடைக்கப்படாத கட்டிகளை உடைக்கிறது. கற்கள் ஏதாவது நீண்டுகொண்டிருந்தால், அறுப்புக் காலத்தில் அரிவாளில் படாமலிருக்கும்படி மண்ணில் அழுத்திவிடுகிறது.



மண் நிரம்ப பொலபொலப்பாக இருந்தால் அதை கெட்டிப்படுத்துகிறது. அப்படி கெட்டிப் படுத்துவதால் பூமியில் பூச்சி, புழுக்கள் அதிகமாக வீர்த்தியாகிறது.

நிரம்ப சிறியவிதைகள் தெளிக்குமபோது பூமியில் ஆழத்தில் போய் முளை காணாமல் கெட்டுப்போய் விடுவதைத் தவிர்க்க உருளையால் கெட்டிப்படுத்தி பிறகு தெளிப்பது நல்லது. இப்படி அவுரி, ராகி, புகையிலை முதலிய சிறு விதைகள் தெளிக்குமுன் உருளையால் அவசியம் வேலை செய்யவேண்டும். உருளைகள் புஞ்சைக்கு உபயோகமே ஒழிய நஞ்சைக்கு உபயோகமில்லை. புஞ்சையிலேயும் மணல் சாரிக்கும் பொலபொலத்த மண்களுக்கும் தான் பிரயோசனப்படுகிறது. சாதாரண 10 ரூபாய் விலையுள்ள உருளையால் ஒரு ஏக்கர் வேலைசெய்ய செலவு விபரம்.


|                                   |            |
|-----------------------------------|------------|
| ஒரு நாளைக்கு மாட்டுக்கு வாடகை ரூ. | 0—8—0      |
| ஆள் கூலி                          | ... 0—3—0  |
| சேதாரம்                           | ... 0—1—4  |
|                                   | —————      |
|                                   | ஆக. 0—12—4 |
|                                   | —————      |

ஒரு நாளைக்கு 4 ஏக்கர் உருளையால் வேலை செய்யலாம். ஆகையால் ஒரு ஏக்கர் வேலை செய்ய சுமார் ரூ. 0—3—1 செலவாகிறது.



3. (a) மாகூல் கல்லுருளை.

---





கதிரடி போரடிக்கு மாடுகளை பிணையலாகக்கட்டி தானியம் வைக்கோலிலிருந்து பிரிக்கப்படுகின்றது. இதற்குப் பதிலாக கல்லுருளையை கதிரின் பேரிலும், போரின் பேரிலும், ஒட்டினால் சுலபத்தில் தானியம் பிரிந்துவிடும். மாட்டுப் பிணையலைப் பார்க்கிலும் இதல் செலவு நிரம்ப மட்டு. இதைத் தமிழ் ஜில்லாக்களில் போரடிக்கு அனுபோகத்தில் கொண்டுவந்தால் நிரம்ப அனுகூலமுண்டு. சோளத்தை கதிரிலிருந்து பிரிக்க 4 ஏரதுகளை பிணையல் கட்டினால், 8 மணி சாவகாசத்தில் சுமார் 200 பட்டணம்படி தானியத்தை கதிரிலிருந்து பிரிக்கும். கல்லுருளையை 2 ஏரதுகளைக் கொண்டு 6 மணி சாவகாசம் வேலை செய்தால் சுமார் 500 பட்டணம் படி தானியத்தை கதிரிலிருந்து பிரிக்கிறதாய்.

#### (4) களை எடுக்கும் கருவி.

இது அநேகமாய் நாட்டுக்கலப்பையைப் போலத் தான் ; ஆனால் கொழுவோடு இருக்கும். இதில் அநேகம் தினுசுகளுண்டு. உழுத நிலத்தை நெகிழச் செய்வதற்கும் அல்லது உழுவதற்கு முன் பூமியை பெயர்க்கிறதற்கும் இதை பிரயோகிப்பதுண்டு. பயிர் அடர்த்தியாக இருந்து அதைக்கலக்கச் செய்வதற்கும், பயிருக்கு நடுவில் கொத்தி களையெடுப்பதற்கும், இக் கருவியால் மாடு கட்டி இரண்டு வரிசைப் பயிருக்கு நடுவில் ஒட்டுவதுண்டு.



பிரயோஜனம்.

ஆட்டுக்கிடை, மாட்டுக்கிடை ஏருவை பூமியில் ஒத்  
தாப்போல் கலப்பதற்கும், ஆழமாய் ஓடி தொந்தரவு  
செய்யும் களைகளைத் தொலைப்பதற்கும், பூமியின் ஈர  
த்தை ஆவியாகப் போகாமல் பாதுகாப்பதற்கும், பூமி  
யின் செய்நேர்த்திகளை சீக்கிரம் செய்வதற்கும், பயிர  
டித்தலுக்கும் இக்கருவி பிரயோசனமாகும்.

ஒரு ஏகர் வேலைசெய்ய செலவு விபரம்.

35 ரூபாய் விலையுள்ள ஒரு களையெடுக்கும் கருவி  
ஒரு நாளில் 2½ ஏகர் கொத்தி களையெடுக்கும். இத  
ற்கு ஒரு ஜோடி மாடு பெரிதாக இருந்தால் போது  
மானது.

|                             |        |         |
|-----------------------------|--------|---------|
| ஒரு நாளைக்கு மாட்டுக்கூலி   | ரூ.    | 0—8—0   |
| ஒட்டுகிறவன் கூலி            | ...    | „ 0—3—0 |
| சேதாரம்                     | ...    | „ 0—3—6 |
|                             | ஆக ரூ. | 0—14—6  |
| ஒரு ஏகராவுக்கு செலவு சுமார் | ...    | 0—6—0   |

பயிர்த்தொழிலில் சாதாரணமாய் வழங்கும் கருவி  
கள், ஏரும், வேர்வாரியும், உருளையுமாம். உழவு  
செய்நேர்த்தி காரியங்களில் பூமி முதலில் கலப்பை  
யால் உழப்பட்டு, கட்டிகளை உடைப்பதற்காக கன  
மான வேர்வாரியால் வேலை செய்யப்படுகிறது. பிறகு  
அநேகமாய் உருளையால் கெட்டிப்படுத்தப்பட்டு விதை



கள் கையாலேயோ, அல்லது வரிசை வரிசையாகவோ தெளிக்கப்படுகின்றன. விதைகளை மூடுவதற்கு வேசான வேர்வாரியால் வேலை செய்யப்படுகின்றது. சில சமயம் கலப்பையால் உழுதபிற்பாடு களையெடுக்கும் கருவியால் வேலை செய்யப்படுகின்றது பூமி நிரப்ப களைத் தொந்தரவால் மூடப்பட்டிருந்தாலும், வறட்சிகாலமாக இருந்து பூமியினுடைய ஈரத்தைப் பாதுகாக்க வேண்டியிருந்தாலும் அந்தக்காலங்களில் கலப்பையை உபயோகப்படுத்தாமல் களையெடுக்கும் கருவியைக்கொண்டு பூமியைக் கீறிக் கிண்ட உபயோகிக்கலாம். இப்படி நமது இராஜதானி கவரன்மெண்டு பண்ணைகளில் உழவு செய்கிறீர்த்திகள் நடந்துகொண்டு வருகின்றன.

நமது இராஜதானி தென் ஜில்லாக்களில் பூமியை உழ, நாட்டுக் கலப்பை, அல்லது கொழுக் கலப்பையைக்கொண்டு வேலைசெய்து கட்டிகளைச் சிலசமயம் தடிக்கம்புகளால் உடைத்து, சமத்துவம் செய்வதற்குச் சில சமயம் பரம்புப்பலகையைக் கட்டி இழுத்து விதை மூட நாட்டுக் கலப்பையைக்கொண்டு உழுதாவது அல்லது முட்படலைக்கட்டி இழுத்தாவது மூடுகிறார்கள். ஆனால் கடப்பை, கர்நூல், பல்லாரி, அனந்தபுரம் ஜில்லாக்களில் செய்கிறீர்த்தி வேலைகளுக்கும், பின்செய்கிறீர்த்தி வேலைகளுக்கும் அநேகவித சொற்ப விலையுள்ள நல்ல பிரயோசனமுள்ள கருவிகள் இருக்கின்றன. அவைகளில் அநேகமாய் எல்லாம் தென் ஜில்லாக்களில் பரவுவது நலம்.



## அவைகளாவன.

(1) பெந்த மடக்கா. இது ஒரு பெரிய நாட்டுக் கலப்பை. இது சுமார்  $\frac{1}{4}$  டன் நிறையிருக்கும். இது 4, 5 அல்லது 6 ஜோடி மாடுகளால் இழுக்கப்படும். கலப்பைக்குச் சமீபமாயிருக்கும் ஜதை நிரம்ப பெரிய தாயிருப்பதுமன்னியில் நிரம்ப நீண்ட நுகத்தடியில் பூட்டப்பட்டிருக்கும். அடுத்தவரும் ஜதைகளில் லாம் வரவர குறுகிவரும் நுகத்தடியில் பூட்டப்பட்டிருக்கும். இதனால் படைச்சாலை பெயர்க்கும்போது மாடுகளுக்கு சிரமம் ஜாஸ்தி கொடுக்கிறது. நன்றாய் பூமியைக்கிளற, குறுக்கு உழவு கட்டாயம் அவசியம். இல்லாவிடில் சிலபாகம் உழுபடாமல் நின்றிவிடும். 6 ஜதை மாட்டுக்கு 6 பெயர் ஒட்டுகிறவனும் 2 பெயர் கலப்பை உழுகிறவனும் வேண்டும். இவர்கள் எல்லாரும் சேர்ந்து ஒரு நாளில்  $\frac{1}{2}$  ஏகர்தான் உழ முடியும். குறுக்கு உழவு அவசியமானதால் ஒரு ஏகரை உழ 4 நாள் செல்லும். இதை வருஷாவருஷம் உபயோகிக்கிறதில்லை. பூமியில் கோரையும், புல்லும் ஜாஸ்தியாய் விட்டால் அதைத் தொலைப்பதற்காகவே 3 வருஷத்திற்கு ஒருதரமாவது அல்லது 4 வருஷத்திற்கு ஒருதரமாவது வேலை இல்லாதகாலத்தில் கூட்டின்பேரில் குடிகள் வேலைசெய்கிறார்கள். இதன் விலை சுமார் 5 முதல் 12 ரூபாய் வரையிலிருக்கும். பருத்தி பயிரிடும் கரிசல்காட்டில் 10, 12 ரூபாய் செலவுடன் களைதொலைப்பதற்காக இக்கலப்பையை உபயோகிப்பதற்குப் பதிலாக



60 ஸுபாய் பொருமானமுள்ள இரும்புக் கலப்பையை உபயோகித்தால் செலவில் நிரம்ப லாபம் உண்டு.


(2) இதற்கு அமித்தபடி மடக்கா என்று ஒருவித கொல்லைக்கலப்பை உண்டு. அது பெத்த மடக்காவைப் போல் பெரிதாக இல்லாவிட்டாலும், சாதாரணமாய் நஞ்சையில் உபயோகப்படுத்தும் குச்சிக் கலப்பையைப் பார்க்கிலும் நிரம்ப பெரியதாக இருக்கும்.

(3) குண்டக1. குண்டகாவும், கொர்ருவும்தான் சாதாரண முக்கிய விவசாயக்கருவி. கொர்ருவுக்குத் தகுந்தபடி ஆஸ்திபைக் கணக்கிடலாம். கொர்ருவுக்கு இரண்டுபெங்கு குண்டகா கிடைக்கும். குண்டகாவாவது ஒரு கட்டையில் பிடியும், அதற்குச் சரியாக ஒரு இரும்புக் கொழுப்பாளத்தை மர முனையால் அதோடு சேர்க்கப்பட்டிருக்கும் கருவி; கட்டையின் நடுவில் ஏர்க்கால் அமைக்கப்பட்டிருக்கும். இந்த இரும்புப்பாளம் அல்லது கொழு 3 அடி நீளமிருக்கும். இந்தக் கொழுப்பாளம் தட்டையாக இருப்பதுடன் ஒருபக்கம் கூர்மையாக இருக்கும். இது சுமார் 3 ஸுபாய் விலை. இதுதான் சாதாரண குண்டகை என்று பெயர். அநேக வித வேலைகளுக்கு அநேகவித குண்டகாக்கள் உண்டு. அடித்தாளை அப்புறப்படுத்தவும், பூமி மண்ணை சீவவும், மேடு பள்ளத்தை நிரவவும், விதையை மூடவும், விதைமுளைக்க பூமி மழையால்கெட்டிப்பட்டிருப்பதை சீவவும், பயிர்சளுக்கு நடுவில் கொத்திக் கிளறவும், ஆகிய வேலைகளுக்கெல்லாம் குண்டகா உபயோகப்படு



கிறது. ஆகையால் குண்டகா நாட்டுக்கலப்பை வேலையும் வேர்வாரி வேலையும் சேர்த்து வேலைசெய்கிறது.

குண்டகா.



1. பிடி.
2. மரத்துண்டு.
3. சட்டக்கால்.

4. மோதிரம்
5. இரும்புச்சட்டம்.
6. ஏர்க்கால்.




(a) பாரதூண்டகா இதில் கட்டை பெரியதாக இருப்பதுடன் அகலமானவும், கனமானவும் 3 அடி நீளமுள்ள கொழுப்பாளத்தை உடைத்தாயிருக்கும். பெத்த மடக்கா வேலை செய்தபிறகு பூமியை நிரவ இதைக் கொண்டு வேலைசெய்வார்கள். 3, 4 ஜதை மாடுகளால் இது இழுக்கப்படும். ஒரு நாளைக்கு 3 ஏக்கர் வேலை செய்யும். இதன் விலை 4, 5 ரூபாய் இருக்கும்.

(b) போதொனு குண்டகா அல்லது சாதாரண குண்டகா. இது கலப்பையின் வேலைபைச் செய்கிறது. அதாவது தாட்களை நீக்கி மண்ணைச் சீவிக்கிறது. ஒட்டுகிறவன் கட்டையில் நின்றுகொண்டு அழுத்தி ஒட்டுகிறான். விதை தெளிப்பதற்கு முந்தியும் பிந்தியும் வேர்வாரியின் வேலைசெய்கிறது. இரு ம்புப்பாளம் 3 அடி நீளமிருக்கும். 3 வருஷத்திற்கு ஒருதாம் பாளத்தை மாற்றும்படியாக இருக்கும். இது சுமார் 3 ரூபாய் விலை. ஒரு நாளைக்கு 3 அல்லது 4 ஏக்கருக்குக் குறையாமல் வேலைசெய்யும்.



மெட்ல குண்டகா.



1. பிடி.

2. மரத்துண்டு.

3. குறுக்குக்கால்.

4. இரும்பு மோதிரம்.

5. இரும்புத் தகடு.

6. ஏர்க்கால்.




(c) மெட்டல குண்டகா. இது மாடுகட்டி பயிருக்கு நடுவில் ஒட்டும் களையெடுக்கும் கருவி. குண்டகா வைப்போல் இதில் மாக்கட்டையும் ஏர்க்காலுமிருப்பதுடன், கொழு ஒரே பாளமாயில்லாமல் 3 பற்களில் 3 தனி சிறு கொழுப்பாளங்கள் அமைக்கப்பட்டிருக்கும். இந்தப் பாளங்கள் பயிருக்கு நடுவில் வேலைசெய்து கொண்டுபோகும். சிலசமயம் 6 பாளங்கள்கூட இருப்பதுண்டு. இந்தப்பாளங்களெல்லாம் மரப்பல்லில் அமைக்கப்பட்டிருக்கும். 3 பல் மெட்டலகுண்டா சுமார்  $1\frac{1}{2}$  ரூபாய் விலை. இது ஒரு நாளைக்கு 3 ஏகரா வேலை செய்யும். இது பயிரடித்தல், கொத்தல், களைபிடுங்கல் முதலிய வேலைசெய்வதுடன் பயிருக்கு மண்ணையும் அணைக்கும். இரண்டு, 3 பல் மெட்டலகுண்டகாவை ஒரே ஏர்மாட்டைக்கட்டி வேலைசெய்வதுண்டு. இதில் குண்டகைக்கு 1 ஆள் மேனிக்கு 2 ஆள் வேணும். இதில் நுகத்தடி நிரம்ப நீளமாயிருக்கும். 1 ஏர் மாட்டைக் கட்டி 2 குண்டகை வேலை செய்வதால் அதாவது 6 ஏகரா வேலைசெய்வதால் செலவுமட்டு.

(d) தந்துலு. (ஒருவகை குண்டகா) இதுவும் பயிர்களுக்கு நடுவில் மாடுகட்டி ஒட்டி களையெடுக்கும் கருவி. இது 3 சிறு குண்டகை சேர்ந்தாப்போல் வேலைசெய்யும் கருவி. இது ஒரு ஏர் மாட்டினாலும், 3 ஆட்களைக்கொண்டும் ஒட்டப்படுகிறது. இது சுமார்  $1\frac{1}{2}$  ரூபாய் விலை. ஒரு நாளைக்கு 1 ஏகர் வேலைசெய்யும். இது அநேகமாய் கல் ஜாஸ்தியாயுள்ள நிலங்களில் வேலை செய்யப்படுகிறது. வேலை செய்துகொண்டு போகும்போதே ஒரு குண்டகைக்கு கல்லால் தடை ஏற்படும் பட்சத்தில் அந்த குண்டகையைத் தூக்கிக் கொண்டுவிட்டால் வேலை தவக்கமன்னியில் நடக்கும்.



(4) கொர்ரு அல்லது விதைதெளி கருவி.



1. பிடி.
2. மரத்துண்டு.
3. கலப்பைக்கொழு.
4. மூங்கில் குழாய்.
5. உடுக்கைக்கயிறு.
6. கொக்கி.

7. விதை உடுக்கை.
8. பிசுவுக் கட்டை.
9. பிசுவுக் கயிறு.
10. பிசுவுக் கம்பி.
11. ஏர்க்கால்.



இந்தக் கருவி நாட்டுக் கலப்பைப்போல் கீறி உழுவதற்கும், பயிர்களுக்கு நடுவில் நாடுகளால் கட்டி இழுக்கப்பட்டு கொத்தி பயிரடித்தலுக்கும், விதை தெளிப்பதற்கும் பிரயோசனப் படுகிறது.

இக்கருவி ஒரு மாக்கட்டையில் கைப்பிடியுடனும், 3, 4 அல்லது 6 கொழுக்களுடன் அமைந்த வால்கட்டைகளுடனும், ஏர்க்காலுடனும், எவ்வளவு வால்கட்டைகளோ அவ்வளவு மூங்கில் குழாய்களுடனும், அம்மூங்கில் குழாய்களுக்குமேல் விதை உடுக்கும் அமைந்ததாயிருக்கும். உடுக்கையின் நாலு பக்கத்திலும் கயிறு கோத்து இறுக்கப்பட்டு, பிடியுடனும், மாத்நுண்டில் கொக்கியுடனும் ஏர்க்காலில் பிசுவு கட்டையுடனும் கயிறுகளா லீறுக்கப்பட்டு, உடுக்கை குழாய்களில் பொருந்தி கட்டப்பட்டிருக்கும். இக்கருவியில் மூங்கில் குழாய்களையும், உடுக்கையையும், எடுத்து விட்டால் கொள்ளு கலப்பையாகிறது. இக்கலப்பை உழுவதற்கும், பயிரின் மத்தியிலேட்டுவதற்கும், பிரயோசனப் படுகிறது. உடுக்கையையும், மூங்கில் குழாயையும் சேர்த்துவிட்டால் விதைதெளி கருவியாகிறது. வால்கட்டையில் துவாரங்கள் ஏற்படுத்தி அவைகளில் மூங்கில் குழாய் பொருந்தி அமைக்கப்பட்டிருக்கும். விதையை உடுக்கையில் போட்டால் அதிலுள்ள துவாரங்களின் வழியாய் மூங்கில் குழாய்களில் இறங்கி வால்கட்டையின் துவாரங்களால் பூமியில் விழுந்துவிடும். மூங்கில் குழாய்களும், உடுக்கையும் ஆட்டங்கொடுத்துப் போகா



மல் கெட்டியா யிருப்பதற்காக ஒரு பக்கத்தில் மாத் துண்டின் கொக்கிகளில் கயிறுகளால் இறுக்கப்பட்டும், மற்றொருபக்கத்தில் ஏர்க்காலின் மேலுள்ள பிசுவு கட்டையில் கயிறுகளால் இறுக்கப்பட்டும் இருக்கும். இந்த பிசுவை கட்டையின் கீழ், வால் கட்டை ஆட் டங்கொடுக்காமலிருப்பதற்காக, வால் கட்டைகளோடு பிசுவை கட்டை சுப்பிகளாலும், கயிறுகளாலும், இறுக் கப்பட்டிருக்கும்.

உகீக்து.

இது மாட்டின் தைப் போல் நடுவில் குறுகியகழுத் தையுடையதா யிருக்கும். அதிலுள்ள துவாரங்கள் குவிந்த வடிவமுள்ளதா யிருக்கும். இது கருமாம், அல்லது செம்மரத்தினால் செய்யப்படுகிறது. இதின் விலை சுமார் 0—12—0 அணா.

கொள்ளு ஒரு ஜதை மாட்டினால் ஒட்டப்படுகிறது. இதை வேலை செய்ய மாடு ஒட்டுவதற்கு ஒருவனும், விதை தெளிக்க ஒருவனுமாக இரண்டு பெயர் வேண் டும். விதை தெளிக்கிறவன் ஒட்டுகிறவனுக்கு எப் போதும் இடது பக்கத்திலேயே யிருப்பான். விதை தெளிக்கிறவன் நிரப்ப அனுபோக சாலியா யிருக்க வேண்டும். இடுப்பில் விதையுடனுள்ள ஒருவிதகூடையைக் கட்டிக்கொண்டு அதிலிருந்து கையால் விதை எடுத்து உடுக்கையில் மெதுவாயும், சாக்கிரதையாயும் கை எடுக்காமல் விதையை அளவாய்ப் போட்டுக்கொ ண்டுவருவான். விதை சரியாய் ஒத்தாப்போல் விழு



கிறதற்கு இப்படி செய்கிறான். தலைமாட்டில் திரும்புகையில் கொள்ளு ஒரு விதமாகத் திருப்பப்படுகிறது. 6 வால் கட்டையுள்ள கொள்ளுதான் சாதாரணம். ஒரு நாளைக்கு சுமார் 6 ஏகர் விதை தெளிக்கும். இதன் விலை சுமார் 10, 15 ரூபாயிருக்கும்.

இந்த கொள்ளு வேலையில் சிலவித அசௌகரியங்களிருக்கின்றன வென்று ஆங்கிலேய கிருஷி சாஸ்திரிகள் சொல்லுவார்கள். அதாவது :—

1. விதை தெளிக்கவேண்டிய ஆழத்தை கிரம்பப் படுத்தமுடியாது.

2. பயிர்களுக்கு மத்தியிலிருக்க வேண்டிய இட வெளியை மாற்ற முடியாது.

3. விதையின் அளவையும் திட்டமாய் ஒழுங்கு படுத்த முடியாது.

4. மண் சிலவேளை வால்கட்டையின் துவாரத்தை அடைத்துவிடும். அப்போது மூங்கில் குழாய்களில் விதை நிரப்பிக்கொண்டு வருமாதலால், விதைகள் ஒழுங்காய் கீழே விழாது.

மாடு பழக்கப்பட்டும், விதைக்கிறவன் அனுபோக சாலியாய் மிருந்தால் சாத்தியமானவரையில் இக்கெடுதிகள் வராதபடி காக்கப்படுகின்றன.

கொத்துக் கட்டையைப்போல சிலவித விதைகளை ஆழத்தில் விதைக்கவேண்டி யிருக்கும்போது அனுபோகசாலியாகிய விதைக்கிறவன் கட்டையின் மே



மேல் ஒட்ட, விதை ஆழத்தில் விழுகிறது. அவரிமுதலிய சிறு விதைகளை பூமியின் மேல் விதைக்கவேண்டியிருக்குமோ து தேபந்த வால்கட்டையை உபயோகப்படுத்துகிறான். அது போகத்தினால் இப்படி விதை தெளிக்கவேண்டிய ஆழத்தையும், விதையின் அளவையும் ஒழுங்கு படுத்துகிறான். கணக்காக எவ்வளவு விதை தெளிக்க வேண்டுமோ அவ்வளவே ஒரு ஏக்கருக்கு விதைக்கிறான். தலைமாட்டில் குழாயில் மண அடைபட்டிருக்கிறதாவென்று பரீட்சைபண்ணுகிறான். இவ்வித அறுபோகங்களால் அசௌகரியங்களை நிவர்த்தி செய்துகொள்ளுகிறான்.

கலாபுரப்பயிர்களும் கொள்ளுமினால் தெளிக்கலாம்:—  
 1. காரணமாக:—பருத்தி ஒருவரிசையும், தினை இரண்டு வரிசையும் தெளிக்கவேண்டியிருந்தால் தினைவிழும் துவாரங்களை உடுக்கையிலடைத்துவிட்டால் பருத்தி பாததிரும் விழும். பருத்தி வரிசைக்கு அடுத்தாற்போல் தினை இரண்டு வரிசை விழுவதற்கு வேறொரு உடுக்கை மையம் மூங்கில் குழாய்களையும் சேர்த்தாற்போல் கட்டி அவைகளின் வழியாய் தினை விதை விழும்படி செய்வார்கள். ஆனால் இதில் பருத்திவிதை தெளிக்க ஒரு வனும, தினை விதைதெளிக்க ஒருவனுமாக இரண்டு பேர் செல்லும். மாடு ஒட்டுகிறவனுக்கு வலது பக்கத்தில் ஒரு தெளிக்கிறவனும், இடது பக்கத்தில் ஒரு தெளிக்கிறவனுமாக இருப்பான். கொள்ளுவானது திரும்புகையில் இடதுபக்கத்திலிருப்பவன் வலதுபக்



கத்திலேயும் வலதுபக்கத்திலிருப்பவன் இடதுபக்கத்திலேயும் இருப்பான்.

இன்னொருவிதமாகவும் கலப்புப்பயிர்கள் தெளிக்கப்படுகின்றன.

பருத்தியையும், திணையையும் கலந்து தெளிக்கவேண்டியிருந்தால் உடுக்கையில் திணைவிழவேண்டியதுவாரங்களை யடைத்து பருத்திமாத்திரம் அதன்வழியாய் விதைக்கப்படும். திணை தெளிக்கிறதற்காக உடுக்கை செய்யும்வேலையை அக்கடிலோட்டா என்பது செய்யும். இந்த அக்கடிலோட்டா உருவத்தில் உடுக்கையைப்போல் இல்லாதிருந்த போதிலும் அதிலுள்ள துவாரங்களில் மூங்கில் குழாய்கள் அமைக்கப்பட்டிருக்கும். இது கொர்ளுவுக்கு சுமார் 6 அடிக்குப் பிந்தி கயிற்றூல்கட்டப்பட்டிருக்கும். இதில் தனியாக ஒருவிதை தெளிக்கிறவன் இருப்பான். கொர்ளு இழுக்கிற மாடுகளை அக்கடிலோட்டாவையும் இழுத்துக்கொண்டுபோகும்.

#### சனிகை கொர்ளு

இது கொத்துக்கடலை தெளிப்பதற்காக ஏற்படுத்தப்பட்டிருக்கிற விதைதெளி கருவி. இது கொர்ளுவைப்போலத்தான் இருக்கும். ஆனால் நிரம்ப பெரிது. சாதாரணமாய் 4 வால்கட்டைகள் அமைந்ததாயிருக்கும். இது 4 ஜோடி மாடுகளால் இழுக்கப்படும். இதில் 4 மாடு ஒட்டுகிறவனும், ஒருவிதை தெளிக்கிறவனும் விதை ஆழத்தில் விழவேண்டியதற்காக 3, 4 பெயர்கள் மரக்கட்டையிலும் உட்கார்ந்திருப்பார்கள்.



விதை தெளிக்கிறவன் ஏர்க்காலில் உட்கார்ந்துகொண்டு முதல் ஜதை ஒட்டுகிறவனை பார்த்துக்கொண்டிருப்பான். 1 அங்குலம் ஆழம் கலப்பைகள் பெயர்க்கும். கொத்துக்கடலை ஆழத்தில் தெளிக்க இவ்வளவு சிரமம் எடுத்துக்கொள்ளப்படுகிறது. கொத்துக் கடலைக்கு முன் சோளமாவது, தினையாவது பூமியிலிருப்பதாலும் மேல்படை மண்ணின் சாரத்தை சோளம் கிரகித்து விடுவதாலும், கொத்துக்கடலை இப்படி ஆழத்தில் தெளிக்கப்படுகின்றது. மேலும் கொத்துக்கடலை தெளிக்கப்படுகிற நவம்பர்மாதத்தில் கடப்பை, கர்நூல், பல்லாரி, அனந்தபுரத்தில் மேல்படை மண்ணில் ஈரமில்லாததினாலும், கீழ்படைமண் ஈரத்தினால் முளைகாண்பதற்காக இப்படி ஆழத்தில் தெளிக்கப்படுகிறதாம். கொத்துக்கடலையை நவம்பருக்கு முந்தி தெளிக்க முடியாது. ஏனெனில் அப்படி தெளித்தால் மழையினால் அதிலிருந்து உண்டாகும் புளிப்புக்காயை அடித்துக்கொண்டு போய்விடுமாம். இப்படி ஆழத் தெளிக்கவேண்டியிருப்பதாலும், ஈர்க்குறைவினால் முளை சரியாகக் காணாததினாலும் ஒன்றுக்கு இரண்டுபங்கு சுமார் 50 பவுண்டு வரையில் விதை தெளிக்கும்படியாக நேரிகிறது. சனிகை கொள்ளு வின் விலை சுமார் ரூபாய் 8.



நமது இராஜதானியில் உபயோகப்படுத்தப்  
படும் கையாள் வேலைசெய்யும் கருவிகள்.

—:0:—

(1) பரப்புப்பலகை.

இது கஞ்சையில் உழுத வயலை மேடு, பள்ளம் நீர்ச்  
ஒத்தாப்போலாக்குகிறதற்கு உபயோகிக்கப்படுகிறது. இ  
தாரணமாய் நாற்றங்காலில் தான் வேலைசெய்யப்படு  
கிறது.

2. மண்வெட்டி.
3. கைக்கோடாவி.
4. இருதலைக் கூந்தாவி.
5. கூந்தாவி.
6. கடப்பாறை.
7. வெட்டரிவாள்.
8. வாங்கரிவாள்.
9. கருக்கரிவாள்.

இங்கிலீஷ் கைக்கருவிகள்.

1. ஷவல் மண்வெட்டி.
2. போர்க்கு மண்வெட்டி.
3. ரேக் மண்வெட்டி.

அறுப்பு யந்திரங்கள்.

- (a) புல்வெட்டிக் கருவிகள்.
- (b) கதிரடிக் கருவிகள்.



(c) தானியங்களை தூற்றும் கருவிகள்.

(d) கொண்டையிலிருந்து தானியங்களை பிரிக்கும் கருவிகள்.

எண்ணெயிறுக்கும் கருவிகள்.

1. செக்குகள்.

(a) ஒத்தைமாட்டுச் செக்கு.

(b) இரட்டைமாட்டுச் செக்கு.

வண்டிகள்.

(a) கட்டைவண்டி.

(b) கைவண்டி முதலியன.

ஆலைபந்திரங்கள்.

அரிசி ஆலை, சர்க்கரை ஆலை, பஞ்சு ஆலை, எண்ணெய் ஆலை முதலியன.

மாட்டுத் தீவனக் கருவிகள்.

வைக்கோல் வெட்டி. (Chaff cutters.)

சோளத்தட்டை முதலிய வைக்கோல்கள் மாடுகளுக்குக் கொடுத்தால் நிரம்ப நீண்டிருப்பதால் அதிகமாகக் கழித்துவிடும். வைக்கோல் வெட்டியில் கொடுத்து சிறு குண்டங்களாக ஆக்கி மாடுகளுக்குக் கொடுத்தால் கழிக்காது. ஆகையால் வைக்கோல் வெட்டியை உபயோகிப்பதில் குடிகளுக்கு நிரம்ப லாபமுண்டு.

(பிண்ணுக்குத் தூள்செய்யும் கருவிகள்.)

பிண்ணுக்குகளை மாடுகளுக்குத் தூள்பண்ணாமல் கொடுக்கப்பின் மாட்டின் தொண்டையிலடைபட்டு



அபாயம் நேரிடும். இதைத் தவிர்க்க, கருவியில் கொடுத்து உடைத்து தூள்செய்யப்படுவதை மாடுகளுக்குக் கொடுப்பதற்காக வேண்டியவர்கள் இக்கருவியைத் தருவித்துக் கொள்ளலாம்.

#### பாசனம்.

பாசனங்களில் ஆற்றுப்பாசனமென்றும், ஏரிப்பாசனமென்றும், கிணற்றுப்பாசனமென்றும், வானமாரி என்றும், அநேக விதங்கள் உண்டு. பாசனம் சில சமயம் சுபாவமாயும், சில சமயம் ஏற்றம் முதலிய உபாயங்களினாலும் பண்ணப்படுகின்றது. ஏற்றங்களின் விபரங்களைச் சொல்லுவதற்குமுன் மழையின் அளவுப் பிரமாணங்களை குறிக்கவேண்டியது அவசியமாக இருக்கிறது.

ஒரு ஏகர் 4840 சதுர கெஜம். அதாவது  $4840 \times 9 \times 144 =$  சதுர அங்குல விஸ்தீரணமாகிறது. ஒரு அங்குல ஆழம் ஒரு ஏகர் பூமியில் மழை பெய்தால் அது  $4840 \times 9 \times 144 \times 1$  கன அங்குலம் மழையாகிறது. ஒரு பட்டணம் படி 100 கன அங்குல மழையைக்கொள்ளும். ஒரு ஏகரில் ஒரு அங்குல

மழையானது  $\frac{4840 \times 9 \times 144 \times 1}{100} =$  அதாவது

சுமார் 62726 பட்டணம் படி ஜலமாம். ஒரு காலன் ஜலம்  $277\frac{1}{4}$  கன அங்குல அளவுள்ளதா யிருக்கும்

ஒரு ஏகரில் ஒரு அங்குல மழை  $\frac{4840 \times 9 \times 144 \times 1}{277\frac{1}{4}}$

$= 22600$  காலன் ஆகிறது. ஒரு காலன் ஜலம் 10



பவுண்டு சிறை இருக்கும். ஒரு ஏக்கரில் ஒரு அங்குல மழைபானது 226000 பவுன் சிறை உள்ளதாக இருக்கும். அதாவது சுமார் 100 டன்.

மழை அளக்கும் கருவி.

இக்கருவிபானது மழை ஜலத்தை சேகரிக்க சக்கர வடிவமான தலையுள்ள ஒரு பொனலையும், இந்தப்பொனலைத் தாங்குகிறதற்கு ஸ்தம்ப வடிவமுள்ள ஒரு பாத்திரத்தையும், இந்தப் பாத்திரத்துக்குள் பொனல் வழியாய்வரும் மழை ஜலத்தை வாங்க ஒரு ஏனத்தை யும் இந்த ஏனத்திலுள்ள மழை ஜலத்தை அளக்க ஒரு அளவு கிளாசையும் உடைத்தாயிருக்கும்.

பொனல் வழியாய் வரும் மழை ஜலத்தை வாங்கும் ஏனமானது குறுகிய கழுத்துள்ளதாக இருக்கவேண்டும். ஏனெனில் அதிலுள்ள ஜலம் ஆவியாய்ப்போய் குறைந்து போகாமல் இருப்பதற்காகத்தான்.

பொனலைத்தாங்கும் ஸ்தம்ப வடிவப்பாத்திரமானது (இதற்குள்ள்தான் மழை ஜலத்தை வாங்க குறுகிய ஏனமிருக்கும்.) இந்தியாவில் எங்கேயும் ஒரு அடி உயரமிருக்கும். பொனல் வழியாய் ஏந்திவைத்திருக்கப்பட்ட மழை ஜலமானது காற்றிலுள்ள நீரவியினால் அதிகரித்தாலும் அதிகரிக்கலாம் அல்லது காற்றிலுள்ள உஷ்ணத்தினால் குறைந்தாலும் குறையலாம். இப்படி கம்மி ஜாஸ்தி அதிகமில்லாமலிருப்பதற்காக மழை அளக்கும் கருவியை வீடு, சுவர், மாங்கள் முதலிய இடங்களுக்குச் சமீபத்தில் வைக்காமல் பொட்டை



வெளியில் தரைமட்டத்திற்குமேல் உயர வைக்கப் பட்டிருக்கும்.

மழை பெய்தால் மழை ஜலத்தை பொனல்வாங்கி, ஒரு அடி உயரமுள்ள எதம்ப வடிவமான பாத்திரத் துக்குள்ளிருக்கும் குறுகிய கழுத்துள்ள ஏனத்துக்குள் விடும். உள்ளேயிருக்கப்பட்ட ஜலம் ஆவியாகப்போகாமலிருப்பதற்காக பொனலானது எதம்ப வடிவப் பாத்திரத்தில் நன்றாகப் பொருந்தியிருக்கும். பொன லும் அளவு கிளாகும்தான் இக்கருவியில் முக்கிய பாகங்கள். இன்றைக்கு மழை இரண்டு அங்குலமென்றால் இரண்டு அங்குலம் ஆழமுள்ள மழை ஒரு சமமான இடத்தில் சேர்க்கப்பட்டிருக்கிறதென்றும் அதிலிருந்து ஒரு துளி ஜலமாவது பூமியில் சுவறிப்போகாமலும், காற் றில் ஆவியாகப் போகாமலும், அடித்துக்கொண்டு போகப்படாமலும் ஆகிய எந்தவிதத்திலும் நஷ்டப் படாமல் இரண்டு அங்குலம் ஆழம் மழை சேகரித்து வைத்திருப்பதென்பது அர்த்தம்.

காற்றோட்டத்தில் ஒரு திறந்த பாத்திரத்தில் ஜலத்தை வைத்திருந்தால் ஜலம் ஆவியாய்ப்போய் கிரம்ப நஷ்டமுண்டாகும். ஆனால் மழை அளக்கும் கருவி யில் அது ஏற்பட்டிருக்கிற தன்மையினால் அப்படி நஷ்டம் அடைய ஏதுவில்லை.

24 மணிக்கு ஒருதரம் காலை 8 மணியில் இக்கருவி யானது எவ்வளவு மழை ஜலத்தை உடைத்தாயிருக்கிறதென்று சோதனை செய்யப்படும்.



ஒரு வட்டவடிவமுள்ள விஸ்தீரணம் அல்லது பரப்பு அந்த வட்டத்தின் குறுக்களவின் பாதியைச் சதுரித்து  $\frac{1}{2}$  னால் பெருக்கினால் கிடைக்கும்.

பொனலுடைய வட்டமுள்ள உச்சியானது 5 அங்குலம் குறுக்களவை உடைத்தாயிருந்தால் மழை ஜலம் சேகரிக்கப்படுகிற பரப்பானது  $\frac{5 \times 5 \times 22}{2 \times 2 \times 7} = \frac{275}{14}$  = சுமார் இருபது சதுர அங்குலமாகும்.

ஒரு அங்குலம் மழைபெய்ததாக வைத்துக்கொண்டால் பொனலின் பரப்பில் 20 கன அங்குல மழை சேகரிக்கப்படும்.  $\frac{1}{2}$  அங்குலம் மழையென்று வைத்துக்கொண்டால் 10 கன அங்குல மழையாகும்.

அளவு கிளாஸ் 10 கன அங்குல மழையைக் கொள்ளும். அந்த கிளாசானது 50 பாகமாகப் பிரிக்கப்பட்டிருக்கும். ஒரு பாகத்துக்கு ஒரு செண்டு என்று பெயர். இப்படி 100 செண்டு கொண்டது ஒரு அங்குல மழை. கிளாசை அளவுபடுத்த பொனால் வட்டத்தின் விஸ்தீரணத்தைக் கண்டுபிடிக்கிறோம்.

ஏற்றம்.

கிணற்றிலிருந்து ஜலத்தை மொண்டு மேலே பாசனத்துக்காகக் கொண்டுவரப்படும், உபாயங்களுக்கு ஏற்றமென்று பெயர். ஏற்றங்களில் சாதாரண இரும்பு சால் உள்ள ஏற்றமாம், ஒற்றைக் கபிலை, இரட்டைக் கபிலை, காற்றாடியந்திரம், ஆயில் இன்சின், முதலிய அநேக தினுசுகள் உண்டு.



ஏற்றமரம். Picotta.

இதில் இருசு அல்லது அச்சு, மாமன்னியில் இரும்புக் கம்பியாயிருந்தால், நிரம்ப சுலபமாய் வேலைசெய்யும். ஜலமட்டம் 12 அடிக்குள் இருக்கப்பட்ட இடங்களிலெல்லாம் ஏற்றமாத்தைக்கொண்டு வேலைசெய்வது நிரம்ப மலிவு. இதில் 3 ஆள் வேலைசெய்ய வேண்டியிருக்கும். ஒருமணிக்கு சுமார் 290 கன அடி ஜலம் வீதம் ஒரு ஏகரை ஒரு அங்குலம் ஈரப்படுத்த சுமார் 13 மணி சாவகாசமாகிறது. அதாவது சுமார் 2 நாள் செல்லும். இதை எந்தாபிக்க சுமார் 10 ரூபாய் செல்லும். ஒரு ஏகர் ஒரு அங்குலம் ஈரப்படுத்த சுமார் ரூபாய் 1—2—(1) செலவாகும்.

ஒற்றக் கபிலை:

இதில் மாடுபோவதற்கு 4 அடிக்கு ஒரு அடி சரிவுள்ள சமதளமும், கபிலையால் ஜலம் கொட்டப்படுகிற இடத்தில் 4, 5 அடி உயரமுள்ள நேர்மையான இரண்டு கட்டைகளும், இரண்டு கயிறுகளும், இரண்டு உருளைகளும், ஆகிய இவ்வித அவயவங்களுடன் அமைந்துள்ளதாயிருக்கும். இது ஒரு ஜதை மாட்டாலும், அதை ஒட்டுகிறவனாலும் வேலைசெய்யப்படுகிறது. சில ஜில்லாக்களில் 2 ஜதை மாட்டைக்கொண்டும் வேலைசெய்யப்படுகிறது. ஒரு ஜதை மாட்டைக்கொண்டு வேலைசெய்யும்பொழுது மாடு சரிவில் இறங்கி மறுபடியும் பின்னாலேயே நகர்ந்து ஏறவேண்டி யிருக்கிறது. இப்படி வேலைசெய்வதில் மாட்டுக்கு நிரம்ப கஷ்டம்



உண்டாகிறது. தமிழ்நாட்டில் இந்தக் கபிலை உபயோகப்படுத்தப்படுகிறது. பல்லாரியில் வாரியானது நிரம்ப அகலமாயும் சாம்பாயுமிருக்கும். சரிவில் மாடுமேலே இருந்து கிழே இறங்குகிறது. உடனே மாடு அவிழ்க் கப்பாட்டு இன்னொரு வழியாய் மேல்நோக்கி வருகிறது. ஒட்டுகிறவன் கயிற்றை பிடித்துக்கொண்டு மேல்நோக்கிச் செல்லுகிறான். அப்போது மாடு அங்கே வந்து நிற்கும். வடக்கயிற்றையும், நுகத்தடியையும் முளைக் கட்டையால் பூட்டுகிறான். இதில் மாடுகளுக்கு பின்னால் நகர்த்துபோகிற சிரமம் இல்லாததினால் தமிழ்நாட்டுக் கபிலையைப் பார்க்கிலும் திறமென்றே சொல்ல வேண்டும். சரிவு நிரம்ப நூரமிருந்தால் ஒருஜதைக்கு மேல் 2 ஜதை மாடுகள் உபயோகப்படுத்துவதுமுண்டு. ஜலமட்டத்தின்மேல் 20 அடிக்கு உள்பட்ட கணற்று களுக்கெல்லாம் ஒற்றைச்சால் கபிலையை உபயோகப் படுத்துவது நல்லது. ஒருமணிக்கு சுமார் 256 கன அடி ஜலம் இறைக்கப்படுகிறது. ஒரு ஏகரை ஒரு அங்குலம் நரப்படுத்த சுமார் 14 மணி சாவகாசம் செல்லும். இந்தக் கபிலையைக் கட்டிமுடிக்க சுமார் ரூபாய் 25 செலவாகும். ஒரு ஏகரை ஒரு அங்குலம் நரப்படுத்த சுமார் 1½ நாள் செல்லும். இதற்குச் சுமார் ரூபாய் 1—1—0 செலவாகும்.

கூற்றுக்கபிலை அல்லது இரட்டைக் கபிலை.

இதில் இரண்டுதோல் இறைவைச் சால்களும், கயிறுகள் சுற்றி இருக்கப்பட்ட தம்பட்ட வடிவமுள்ள



ஒரு ராட்டினமும் (இந்த ராட்டினம் பூமியிலிருந்து 6 அடி உயரத்தில் ஒரு ஸ்தம்ப அச்சில் கோர்த்து கப்பட்டிருக்கும்) ஒரு ஏர்க்காலும் உள்ளதாயிருக்கும்.

இந்த ராட்டினம் ஆட்டம் கொடாமலிருப்பதற்காக, நேர்கோணத்தோடு இருக்கப்பட்ட இரண்டு உத்திரத்தோடு அமைக்கப்பட்டிருக்கும். இந்த உத்திரங்களைத் தாங்க நான்கு கட்டைகள் கட்டப்பட்டிருக்கும். இந்த உத்திரங்களிலும் ஸ்தம்பத்திலும் ராட்டினம் இணைக்கப்பட்டிருக்கும். இந்த ராட்டினமானது சுற்றக்கூடியது. மட்டத்தின்மேல் ஜலம் எவ்வளவு தூரம் சூக்கப்படுகிறதோ அதில் 5ல் 1 பாகம் இந்த ராட்டினத்தின் சுற்றளவாயிருக்கவேண்டும். ஏர்க்காலில் வளைவான நுகத்தடி இணைக்கப்பட்டிருக்கும். கிணற்று ஓரமாகவும் உருளைகளோடு கட்டைகளிருக்கும். ராட்டினத்தில் ஒரு கயிறு சுருளும், ஒரு கயிறு பிரியும்; ராட்டினத்தைச் சுற்றி மாடு  $1\frac{1}{2}$  சுற்று வந்தால் ஒருசால் ஜலம் மொண்டு கொட்டப்படும். மறுபடி திருப்பினால் சால் கிணற்றில் இறங்கும். இந்தக் கபிலையைக் கட்டிமுடிக்க சுமார் ரூபாய் 135 செலவாகும். ஜல மட்டத்துக்குமேல் 20 அடி உயரமிருந்தால் 1 மணி நேரத்தில் 384 கன அடி ஜலம் இறைக்கப்படும். ஒரு ஏக்கரில் ஒரு அங்குலம் ஈரப்படுத்த சுமார் 10 மணிகாலம்செல்லும். இதற்கு சுமார் அணு 10 செலவாகும்.



ஏற்றங்களின் சிலாக்கியத்தை அநிய 4 விஷயங்கள் கவனிக்கப்படவேண்டும்.

1. அதன் வள்ளமை.

2. அதிக சிக்கலான அவயவங்களில்லாம விருத்தல்.

3. வேலைசெய்வதின் சிரமம்.

4. வேலைசெய்ய வேண்டும் செலவு. ஆகிய இந்த நான்கையும் கவனித்து எது சிலாக்கியமாகக் கொள்ளப்படுகிறதோ அதை நாம் ஏற்றுக்கொள்ளலாம்.

நீர் மட்டத்திற்குமேல் 1, 2, அடி உயரமுள்ள இடங்களுக்கு இறை கூடையாலும், முக்காலிமரத்தின் கயிறு களாலகட்டி தொங்கவிடப்பட்ட மா இறைஆப்பையாலும் ஜலம் பாய்ச்சப்படுகிறது.

நில விஸ்தீரணம் ஜாஸ்தி உள்ள இடங்களிலும் அதாவது 50 ஏக்கருக்கு குறைவாக இடங்களிலும் ஜலத்தட்டு இல்லாத இடங்களிலும் லாபகரமான பயிர்களை உண்டாக்கினால் ஆயில் இஞ்சின் வைத்து வேலைசெய்வது லாபம் உண்டு.

கமது இராஜதானியில் உஷ்ணமான பாகங்களில் சாதாரண பூமியில் கலப்புப் பயிர்களுக்கு வாரம் 50 டன் தண்ணீர் வேண்டியிருக்கும். அதாவது வாரம்  $\frac{1}{2}$  அங்குலம் மழைபாகிறது. கரும்புக்கும், வாழைக்கும் வாரம் ஓரங்குலம் மழை அல்லது 100 டன் தண்ணீர் வேண்டும். பொதுவாகவே தோட்டக்கால் பயி



ர்களுக்கு வாரம் 1<sup>1</sup> அங்குலம் முதல ஓங்குலம் வரையில் மழை வேண்டியிருக்கும்.

புதிதாக கட்டப் பபிர்களுக்குச் சிறுபான்மையில் அடிக்கடி ஜலம் வேண்டியிருக்கும். வேளாண்முகிறவரையில் நாள் 1-க்கு ஒருதரம் இவ்விதப் பபிர்களுக்குத் தண்ணீர் பாய்ச்சவேண்டும். வேளான்றிப் பூரியில் வளருகிற பபிர்களுக்கு நீடித்த இடை வெளியில் தேவை யான ஜலம் கிடைத்தால் மேலுமானது. எப்போதும் நீடித்த இடைவெளியில் ஏராளமான பாசனம் கொடுப்பது சொற்ப இடைவெளியில் சொற்ப பாசனம் கொடுப்பதைப் பார்க்கிலும் நிரம்ப நன்று. ஏனெனில் ஏராளமான பாசனம் அதிக ஆழம்போய்ச் சுவறு வதுமன்னியில் வேர்களுக்கும் அதிக ஆழம் ஓடுகின்றன.

சிலவிதப் பபிர்களுக்குத் தண்ணீரின் குணமே சிலாக் கியமாகக் கொள்ளப்படுகிறது. உதாரணமாக—புகை இலைக்கு உவர்த் தண்ணீர் நல்லதாகக் கொள்ளப்படுகிறது. சக்கரவள்ளிக்கு நல்ல ஜலம் வேண்டியிருக்கிறது.

ஆற்றுப் பாசனத்தைப் பார்க்கிலும் கேணிப் பாசனத்தில் ஜலம் நிரம்ப செட்டாகச் செலவழிக்கப்படுகிறது. ஆகையால் தோட்டக்காலில் செட்டாயும் நஞ்சையில் ஜலம் ஜாஸ்தியாயும் செலவழிக்கப்படுகிறது. கேணிப்பாசனத்தைப் பார்க்கிலும் ஆற்றுப் பாசனத்தில் 3 பங்கு ஜலம் ஜாஸ்தியாக செலவழிக்கப்படுகிறது.



ஜலத்தினுடைய அளவெல்லாம் பூமியினுடைய சுபாவத்தையும், பூமி வாய்த்திருக்கப்பட்ட இடத்தையும், சீதோஷண ஸ்திதியையும், கால ஸ்திதியையும், பாசனத்துடைய உத்தேசத்தையும், பயிரின் சுபாவத்தையும், பொருத்ததாக இருக்கிறது. பூமி சமமாக இல்லாமல் செங்குத்தாக இருந்தால் அப்பேர்ப்பட்ட நிலங்களுக்கு ஜாஸ்தி ஜலமேவண்டி இருக்கும். வண்டல் படியவேண்டியிருந்தாலும் அப்போது ஜாஸ்தி பாசனம் பண்ணப்படும்.

எரு.

“எருச்செய்கிறது இனத்தான் செய்யமாட்டான் ; உரம் செய்கிறது, உறவுடையான் செய்யமாட்டான்,” என்ற பழமொழி யாருக்கும் தெரிந்ததே. எப்படி பசு, கன்று ஊட்டாவிட்டால், பால் சுறக்காதோ அது போல் உரம் கொடுக்காத வயல் நல்ல கண்டுமுதலைக் கொடுக்காது. பூமியானது பயிரூட்டங்கள் அடங்கிய களஞ்சியம். பயிர்களைப் பூமியில் உண்டாக்கினால், ஊட்டங்கள் குறையுமல்லவா. இக்குறைவுக்கு எரு வினால் ஈடுபண்ணாமல் பயிர்செய்துகொண்டே போனால் வரவாக் கண்டுமுதல் கம்மிப்படும். இப்படிப் பூமி வளம் குறைந்து கண்டுமுதல் கம்மிப்படாமலிருப்பதற்காக, எருவிட்டுப் பயிர்செய்யவேண்டியது முக்கியம்.

1. மாட்டுக்கொட்டில் எரு.

மாட்டுக்கொட்டிலில் விழும் சாணம், மூத்திரம், களம், குப்பை இவைகளை எல்லாம் சாஸ்திரோக்த



மாய்ச் சேதப்படாமல் ஓரிடத்தில் சேர்த்துவைத்து மக்  
 கும்படிசெய்து ஊதாக்கருப்புநிறமாய் மாறிப் பக்கு  
 வத்துக்கு வந்து இருப்பதுதான் மாட்டுக்கொட்டில்  
 எருவென்பது. இவ்வெருவில் இலை, தழை, உரி,  
 உதவாதென்று விலக்கியகுப்பை, சாம்பல் இவைகளும்  
 சேர்த்திருக்கலாம். இவைகளில் குடிகள்மூத்திரத்தைச்  
 சேகரித்துவைப்பதே கிடையாது. மூத்திரம் பூமியில்  
 ஓடி, ஒதம்பலாய்ப் போயோ, அல்லது வேறுவிதமாக  
 நஷ்டமடைந்தோ, குடிகளுக்குப் பிரயோசனமில்லா  
 மல் கெட்டுப்போய் விடுகிறது. விறகு கிராக்கியென்று  
 அடுப்பு எரிக்கச் சாணத்தை முட்டைதட்டி விடுகிறார்  
 கள். ஆகையால் மாட்டுக்கொட்டில் எருவில் நிரம்ப  
 முக்கியமான மூத்திர நஷ்டத்தினாலும், விறகு சாண  
 நஷ்டத்தினாலும் நமது குடிகள் நஷ்டத்தை அடை  
 கிறார்கள். மாடுகளுக்குக் கூளம், குப்பைகளைப் படுக்  
 கையாக விரித்து, அவைகள் மூத்திரத்தைக் கிரகிக்கும்  
 படி செய்யவேண்டும். இப்படிச் செய்தும், சாணத்தை  
 முட்டையாக்காமலும் நமது குடிகள் சிலவிடங்களில்  
 சேகரித்துவைப்பதுபோல் பொட்டல் வெளியில் குழி  
 கள்வெட்டி அவைகளில் போட்டுவிடுகிறார்கள். இப்  
 படிப் போட்டுவிடுவதினால் வெய்யிலால் காரமெல்லாம்  
 ஆவியாய்ப்போய், மழையால் சத்துக்களெல்லாம் கரை  
 த்துக்கொண்டு ஓடிப்போய்க் குடிகள் நஷ்டமடைகிறார்  
 கள். சாணத்தை முட்டைதட்டி எரித்துவிடம்காலத்  
 திலும், அப்படி முட்டைதட்டாயல் சாஸ்திரோக்த



மாய்ச்சேகரித்துவைக்கத் தெரியாமல் பொட்டல்வெளியில் சேகரித்து வைக்கும்போதும் ஆகிய இந்த 2 வகையினாலும் குடிகள் நஷ்டமடைகிறார்கள்.

ஒரு ஜதை மாட்டின் சாணத்தை ஒருவருஷம் சேகரித்து முட்டைதட்டினால் சுமார் 3,000 முட்டைகள் கிடைக்கும். இதன்விலை சுமார் ரூபாய் 4க்கு மேல் போகவே போகாது. சாணத்தையும், மூத்திரத்தையும் சாஸ்திரோக்தமாய் சேகரித்துவைத்தால் ஒருஜதை மாட்டிலிருந்து சுமார் 7½ டன் அதாவது சுமார் 20 வண்டிக்குக் குறைவாமல் எருக் கிடைக்கும். இதன் விலை சுமார் ரூபாய் 20. ஒருஜதை மாட்டின் எருவி லிருந்து ரூபாய் 4 கிடைக்கிறது லாபமா, ரூபாய் 20 கிடைக்கிறது லாபமா, நீங்களே அறிந்துகொள்ளுங்கள், ஆகையால் விறகு கிராக்கிக்காகச் சாணத்தைமுட்டை தட்டாமல் இருக்கும்பொருட்டு வயல் வரப்புகளிலும் மனைகளிலும், திடல்களிலும் விருட்சங்களை உண்டு பண்ணி அவைகளை விறகுக்காக உபயோகிப்பதுதான் புத்திசாஸித்தனம்.

எருவைச் சாஸ்திரோக்தமாய்ச் சேகரித்துவைக்கும் விதம்.

ஒரு மாட்டுக்கொட்டிலின் கீழ் நிலம் நிரம்ப கெட்டியாயும் மிருதுவாயு மிருப்பதோடு ஒருபக்கம் மேடும் ஒருபக்கம் பள்ளமுமுள்ள சரிவா யிருக்கவேண்டும். கடுவில் கவணைவைத்துக் கவணைக்கு இருபக்கத்திலும் மாடுகட்டும்பட்சத்தில் கவணைப்பக்கம் மேடாயும் இதர பக்கங்கள் பள்ளமாயுமிருக்கலாம். ஓரங்களில் கவணை



வைத்து நடுவில் சரிவு இருக்கலாம். பின் சொன்ன இரண்டுவிதத்திலும் மாட்டுக் கொட்டிலில் இரண்டு வரிசை மாடுகட்டும்படியாக இருக்கும். சரிவுகளின் கடைசியில் ஒரு ஜலதாரை ஏற்படுத்தி அந்த ஜலதாரையில் விழும் மூத்திரம் வெளியில் ஒருசட்டியில் விழப்படி, ஏற்பாடுபண்ணிவிட வேண்டும். கொட்டிலுக்குச் சமீபத்தில் எருக்குழி ஒன்று வெட்டி. அக்குழியின் அடியிலும், பக்கத்திலும், களிமண்ணால் மெழுகி, மேலே கொட்டகைபோட்டுக்காற்றினாலும் மழையினாலும் உஷ்டம் வராமலிருக்கும்படி செய்து, தினம்விழும் சாணத்தையும் கூளம், குப்பை, மூத்திரத்தையும் கொட்டிப், பிறகு நிரவி, தினம் அதன்மேல் காய்ந்த மண்ணைத் தூவிக்கொண்டு வரவேண்டும். குழியைச் சுற்றிவர விளிம்புகள் கட்டி, வெளி ஜலம் குழியில் விழாமல் இருக்கும்படியாயும் செய்யவேண்டும். எருக்குழியில் கூளம், குப்பை, இலை, தழைகள், சேர்த்துக்கொண்டு வரலாம். குழியில்விழும் தழைமுதலிய எருக்களைக் கலந்து அப்போதப்போது சமமாய் நிரவி மிதித்து அழுத்திவைத்திருக்கவேண்டும். இப்படி வைத்திருந்தால் மெதுவாயும், ஒத்தாற்போலவும் எருவானது மக்கிக்கொண்டே வரும். நன்றாய் மக்கி ஊதாக்கருப்பாய் மாறி, வெண்ணெய்போன்ற பக்குவமடையும் போது எடுத்து உபயோகிக்கலாம். இவ்வித எருவை வெட்டி எடுத்தால் காரமுள்ள ஒருகாற்று வெளிவரும். அக்காற்றில் நரமஞ்சள் துணியைப் பிடித்தால் அது



சிவப்பு நிறமாகிவிடும். ஜலதோஷமுள்ளவர்கள் அக் காற்றில் நின்றால் ஜலதோஷம் மாறிவிடும். இதில் சாணத்தைப்பார்க்கிலும் 4பங்கு விலையுயர்ந்த பயிரூட்டங்கள் அடங்கி இருக்கிற மூத்திரமானது நன்றாய்ச் சேகரித்து வைக்கப்படுகிறது. அடிக்கடி நன்றாய் மிதித்துவிடுவதினால் காரமான வஸ்துக்கள் ஆவியாய்ப் போய்விடுகிறதில்லை. எப்போதும் எருக்குழி ஈரப் பசையாகவே இருக்கிறது. இவ்விதம் எருவைச் சேகரிப்பது சிரமமாக இருந்தாலும் ஒரு ஜதை மாட்டிலிருந்து சுமார் 20 வண்டி முதல் 30 வண்டிவரையில் எருக்கிடைக்கும். அதாவது சுமார் 7½ டன் எருக்கிடைக்கும். மேற்கூறிய விதத்துக்கு இங்கிலீஷில் Byre-pit system என்று பெயர்.

இன்னுமொருவிதம் எருவைச்சேகரிப்பது இதைவிட சுருவு. அதற்கு Loose Box system என்று பெயர்.

இதில் கொட்டிலின்கீழ் நிலம் தரைமட்டத்திற்கு 2, 3 அடி ஆழம் கீழ்வெட்டப்பட்டுப் பள்ளமாயிருக்க வேண்டும். கீழ் நிலம்பக்கத்திலேயும் அடியிலேயும் களிமண்ணால் மெழுகப்பட்டிருக்கவேண்டும். வெளியிலிருந்து ஜலம் உள்ளே வரமுடியாமல் நல்லபலமான விளிம்போடு இருக்கவேண்டும். குழிக்கு மேல்கொட்டை இருக்கவேண்டும். இந்தக் குழியில் ஒவ்வொரு நாளும் கூளம், குப்பைகளை மாட்டுக்குப் படுக்கையாகப் போட்டுக்கொண்டு வரவேண்டும். சருகு, தழை, உமி, கருக்காய், இவைகளை எல்லாம் ஒழிந்தகாலத்தில்



எதேஷ்டமாய்ச் சேகரித்துவைத்து தினம் கொஞ்சம், கொஞ்சமாய்ப் போட்டுக்கொண்டு வரலாம். முதலில் கூளம் குப்பையைப் பரப்பினவுடன் மாடுகளை அதில் தனித்தனியாகவாவது அல்லது 10 அடி நீளம் 6 அடி அகலமுள்ள அரைகளாகத் தடுத்தாவது அவைகளில் விட்டுவிடலாம். அரை அரையாகத் தடுக்காதபட்சத்தில் மாட்டுத் தீவனத்திற்காக நடுவில் கவணைவைத்து விடலாம். அரையாகத் தடுக்கும் பட்சத்தில் அரைகளில் கவணைவைத்துவிடலாம். ஒருநாள் இரத்திரி மாட்டைக்கட்டினால் மறுநாள் கட்டுவதற்கு முன்னால் சாணங்களை எல்லாம் உடைத்துவிட்டு அவைகளின் மேல் புதுக்கூளங்களை உதறிப் படுக்கையாகப் போட வேண்டும்; தினம் சிறுகச் சிறுகப் போட வேண்டும். ஜாஸ்திபோட்டால் எரு சிலாக்கியமாக இல்லாத்துடன் நன்றாக மக்கியுமிராது. ஆகையால் சிறுகச்சிறுகப் பிரயோசனப்படுத்தவேண்டும். இதில் மூத்திரம் சேதமன்னியில் கூளம் குப்பைகளால் உருஞ்சப்படுகிறது. மாடு நடமாடுவதால் எருவெல்லாம் நன்றாய் அழுத்தப்பட்டு காரம் வெளியில்போகாமல் இருக்கும். இப்படிக்குழி நிரம்பித் தரைமட்டத்திற்கு வந்தவுடன் எடுத்து உபயோகித்துவிடலாம். எருவை எடுக்கும்போது மேலே மக்காமலிருக்கப்பட்டவைகளைத் தனியாக ஒதுக்கி விட்டு அடியில் வெண்ணெய்போல் மெதுவாயும், கருப்பு நிறமாயும் இருக்கப்பட்ட எருவை எடுத்து உபயோகிக்கவேண்டும். அரைகுறையாய் மக்கி இருந்து



மேல் சுரண்டி எடுத்து வைக்கப்பட்டிருந்த எருவை மறுபடியும் கொட்டி லின்கீழ் போட்டுவிடலாம். இதில் ஒரு ஜதை மாட்டிலிருந்து சுமார் 40 வண்டி எருக் கிடைக்கும். ஒரு காலத்திலும் 30 வண்டிக்குக் குறையாது. அதாவது சுமார் 10 டன் எருக் கிடைக்கும். குடிகள் இப்போது பொட்டைவெளியில் சேகரித்து வைப்பதுபோல் வைத்தால் ஒரு ஜதை மாட்டிலிருந்து அரைகுறையாய் மக்கின மட்டமான எரு சுமார் 1½ டன் கிடைக்கும். அதாவது சுமார் 5 வண்டி.

#### சுருங்கமாக.

ஒரு வருஷத்தில் ஒரு ஜதை மாட்டின் சாணத்தை முட்டைதட்டி விறரூல் சுமார் 4 ரூபாய் கிடைக்கும். ஒரு ஜதை மாட்டின் எருவை மழையாலும், வெய்யிலாலும் நஷ்டம் அடையும்படி பொட்டல்வெளியில் போட்டிருந்தால் ஒரு வருஷத்திற்குச் சுமார் ரூபாய் 5, 6 பெறும்படியான எரு கிடைக்கலாம்.

பயர்பீடீஸ் சீஸ்டம் பிரகாரம் ஒரு ஜதை மாட்டின் எருவைச் சாஸ்திரோக்தமாய்ச் சேகரித்து வைத்தால் வருஷத்தில் சுமார் 15, 20 ரூபாய் எருக்கிடைக்கலாம். லாஸ்பாக்ஸ் சீஸ்டம் பிரகாரம் சேகரித்தால் ஒரு ஜதை மாட்டிலிருந்து சுமார் ரூபாய் 30 பெறும்படியான எருக்கிடைக்கும்.

நமது சென்னை இராஜதானியில் மாடுகள் சுமார் 100 லட்சத்துக்குக் குறையாமலிருப்பதாகத் தெரிய வருகிறது. இவைகளின் எருவைச் சாஸ்திரோக்தமாய்



சேகரித்துவைத்தால் குறைந்தபட்சம் 6 கோடி ரூபாய் க்குக் குறையாத நல்ல எரு கட்டாயம் கிடைக்கும். அப்படிச் செய்யாததினால் வருஷத்தில் நமது குடிகள் இந்த மாட்டுக்கொட்டில் எருவிஷயத்தில் நமது இராஜ தானியில் சுமார் 3 கோடி ரூபாய் நஷ்டம் அடைகிறார்கள். எல்லாவற்றையும் விளக்கிக்காட்டி இருப்பதால் நஷ்டம் அடையாத வழியை இனிமேலாவது தேடிக்கொள்ளும்படி கேட்டுக்கொள்ளுகிறேன்.

இந்த எருவை எவ்விதபூமிக்கும் போடலாம். இதன் குணம் கொட்டிலின் தன்மையும், மாடுகளின் வர்க்கத் தையும், வயதையும், தேகஸ்திதியையும், ஆகாராதிகளையும், படுக்கையாக விரிக்கும் கூளம், சூப்பையின் அளவையும், குணத்தையும் பொறுத்ததாக இருக்கிறது.

இந்த மாட்டுக்கொட்டில் எருவைப் பூமியை உழுவதற்கு முன்னால் கொட்டி ஒத்தாப்போல் பரப்பி உடனே உழுதுவிடவேண்டியது. உழ முடியாவிட்டால் எருவைப் பரப்பக்கூடாது. முட்டுமுட்டாகக் கொட்டி வைத்திருந்து மண்ணால் மூடிவைத்திருக்க வேண்டும். தானியப் பயிர்களுக்கு அடிக்கும் பட்சத்தில் ஏகர் 1க்கு 10 வண்டிக்குக் குறையாமல் அடிக்கவேண்டும். கரும்புமுதலிய லாபம் தரக்கூடிய பயிர்களுக்கு ஏகர் 1க்கு 30 வண்டிக்குக் குறையாமல் அடிக்கவேண்டும்.

## (2) பசுந்தாள் எரு.

பசுந்தாள் எருவாவது தழை, செடி, பூண்டுமுதலியவைகளைக்கொண்டு பூமியை உரப்படுத்துவதும் அல்



லது கொள்ளு, மணிலாக்கொட்டை, அவுரி, துவரை, உளுந்து, கொத்துக் கடலை, மொச்சை, காராமணி, பயறு, சணல்முதலிய பயிர்களை உண்டாக்கிப் பூக்கும் முந்தி நிலத்தோடு உழுதுவிடுவதும் தான். மேற்கூறிய பயிர்களுக்கு நிலத்தை உரப்படுத்துகிற பயிர்களென்று பெயர். சில பயிர்களைப்போல இவைகள் அவ்வளவு பூமியைச் சளைக்கப்படுத்துகிறதில்லை. இப்பயிர்களின் வேர்களில் குண்டு ஊசியின் அடிப்பக்கத்துக் குண்டைப்போலவும், பாலுண்ணிகளைப்போலவும் அநேகத் தோற்றங்கள் சிதறியிருப்பதைப் பார்க்கலாம். இத்தோற்றங்கள் எண்ணிமுடியாச் சிறு கிருமிகளின் துத்தில்களால் உண்டாக்கப்படுகின்றன. மேற்கூறிய பாலுண்ணி வடிவங்களில் இக்கிருமிகள் ஆகாயம் அல்லது வாயுவிலுள்ள நைட்ரசனைக் கிரகித்து அதனால் ஜீவித்து வருகின்றன. ஆகையால் இவ்வேர்களில் நைட்ரசன் எதேஷ்டமாய் இருக்குமல்லவா? எல்லா எருவைப்பார்க்கிலும் நைட்ரசன் எரு நிரம்ப விலையுள்ளதுடன் நிரம்ப முக்கியமானது. ஆகையினாலே அவுரி முதலிய பயிர்வர்க்கங்களைப் பூமியில் உழுது மண்ணுடன் மண்ணாய்க் கலந்துவிட்டால் நில முரப்படுவதில் என்ன தடை? தானியப் பயிர்களுக்கு முன்னால் இப்பயிர்களில் ஏகாவது ஒன்றை உண்டாக்கிப் பூக்குமுன் உழுதுவிட்டால் பிந்திய தானியப்பயிர் நல்ல கண்டு முதலைக் கொடுக்கும். கரும்புப்பயிருக்கு மத்தியிலும், பழவகைப் பயிருக்கு மத்தியிலும், சணல், நரிப்பயறு,



அவுரி, மொச்சை முதலியவைகளை உண்டாக்கி உழுது விட்டால் பூமி நன்றாய் வளப்படும். பூமியை வளப்படுத்தவேண்டுமானால் இவ்விதப் பயிர்களை உண்டாக்கிப் பூக்குமுன் உழுதுவிடவேண்டும். நமது இராஜதானியில் பசுந்தாள் எருவைப்பற்றி குழிகள் நிரப்பத் தவனமெடுத்துக்கொள்ளவேண்டும். வளங் குறைந்துகொண்டுவருகிற நமதுபூமிகளுக்குச் சிராமன்னியில் நஷ்டத்தை நடுபண்ண இவ்வுரத்தினால்தான் முடியும். ஆகையால் பசுந்தாள் உரத்தை வருஷா வருஷம் உண்டுபண்ணி ஒவ்வொரு குடியும் தன் நிலத்தை வளப்படுத்தவேண்டும். நெற்பயிர் அறுவடைக்குப்பின் பசுந்தாள் உரத்துக்காவது அல்லது மாட்டுத் தீவனத்துக்காவது ஒரு பயிர் உண்டுபண்ணினால் அதற்குத் தண்ணீர்வரி கிடையாதென்று கவர்ன்மெண்டார் அலுவலமான ஒரு உத்தரவு பண்ணி இருக்கிறார்கள். குழிகள் இவ்வனுசலத்தினால் மேல்மேலும் பசுந்தாள் உரத்தை விர்த்தி செய்யவேண்டும். சுமார் 2 ரூபாய் சாகுபடிச் செலவில் கொள்ளுப் பயிரைப் பசுந்தழை உரத்துக்காக உண்டாக்கி விதைத்து 2 மாதத்துக்கெல்லாம் பயிரை பூமியில் மிதித்து உழுதுவிடலாம். பசுந்தழை உரத்துக்குச் சணற்பயிர் முதல்தரம். வயல் கரைகளில் புங்கன், ஆடாதொடை முதலியவைகளைப் பயிர்பண்ணித் தழைகளைக்கொண்டு பூமியை உரப்படுத்தலாம்.



(3) மலம்.

கமது இராஜதானியில் சுமார் 3 கோடி ஜனங்களிருக்கிறார்கள். கமது இராஜதானியில் ஒரு மனிதன் ஒரு வருஷத்தில் சுமார் 6 பவுண்டு ரயிட்ராஜன் சத்தும், 3 பவுண்டு எலும்பு சத்தும் மல, மூத்திராதிகளினால் கழிக்கிறான். அதாவது சுமார் 60 பவுண்டு மலத்தையும், சுமார் 600 பவுண்டு மூத்திரத்தையும் கழிக்கிறான். இந்த மல, மூத்திராதிகளைச் சுகாதாரத்துக்குக் குறைவன்னியில் ஒரிடத்தில் சேகரித்துப் பூமிக்கு இட்டால் பூமாதேவி நல்ல நன்றியறிதலுடன் ஒன்றுக்கு இரண்டுபங்குகண்டு முதலைக் கொடுப்பாள். துவேஷத்தினாலேயும், தப்பு எண்ணத்தினாலேயும், இந்த முக்கிய எருவைப் பற்றி கவனிக்காமல் கண்ட இடம், கேட்ட இடங்களில் ஒதுக்கிச் சுகாதாரக்குறைவு உண்டாக்குவதுமன்னியில் சிலம்வளம் அடைவதையும் ஜனங்கள் கெடுக்கிறார்கள். ஒருமனிதன் வருஷத்தில் சுமார் 2 அணு பெறும்படியான மல, மூத்திராதிகளைக் கழிக்கிறானென்று வைத்துக்கொண்டாலும் கமது இராஜதானியில் குடிகள் சுமார் 40 லட்சம் விலையுயர்ந்த எருவைச் சேகரித்து வைத்துப் பூமிக்கு இடாததினால் நஷ்டம் அடைகிறார்கள். இதைப் பூமியில் கிடங்குகள் வெட்டி மண்ணோடு கலப்பித்து மக்கினவுடன் பூமிக்கு அடிக்கலாம். அல்லது முனிசிபாலிடி, யூனியன் எருக்களோடு கலந்து மக்கும்படி செய்தும் அடிக்கலாம். அல்லது ரசாயன சாஸ்திரப் பிரகாரம் சாம்பல், சுண்ணாம்பு நீறு, சில உப்



புக்களோடு கலந்து பக்குவம் பண்ணின பிறகும் அடிக்  
கலாம். இவ்வாறு மல எரு களர் நிலங்களுக்கு  
ஏராளமாய் இடப்பட்டால் களர் தொலைந்துபோகும்.  
சில இடங்களில் இதுடன், சுமார் ரூபாய் 1—8—0  
மேனிக்கும் சில இடங்களில் சுமார் ரூபாய் 6 மேனிக்  
கும் விற்கப்படுகிறதாம். ஒவ்வொரு குடியும் தன் நிலத்  
தில் மல, மூத்திராதிகளைக் கழிக்கிறதென்று ஒரு தீர்  
மானம் பண்ணிக்கொண்டால் நஷ்டத்தைக் கொஞ்  
சும் ஈடுபண்ணலாம்.

#### (4) ஆட்டுக்கிடை வைத்தல்.

ஆட்டு எருவை இரண்டுவிதமாகப் பூரிக்கு எருவிட  
லாம். ஆடுகளைக் கொட்டி விலகட்டிச் கொட்டி விலக்கீழ்  
நிலத்தில், மண், மணல்களைத் தூவி அந்தமண், மணலி  
ன்மேல் விழும்புழுக்கை மூத்திராதிகளைத் தினம்கூட்டி  
ஒரிடத்தில் நஷ்டமவராமல் சேகரித்து வைத்திருந்து  
மேய்ச்சல் நிலங்களுக்கும் தாவலாம்; பயிர்களுக்கும்  
கொத்திவிடும்போது அணைக்கலாம்.

இன்னுமொருவிதம். இராக்காலங்களில் தட்டிகளி  
னால் அடக்கிக்கிடைவைத்தோ அல்லது தட்டிவைக்  
காமல் கிடைமறித்தோ பூமி உரப்படுத்தப்படும்.

100 ஆடுகிடைவைத்தலுக்குச் சுமார் 6 அணா செல  
வாகும். ஒரு ஏக்கருக்கு 2000 ஆட்டுக்குக் குறையா  
மல் கிடைவைக்கவேண்டும். மாட்டுச்சாணத்தைப் பார்  
க்கிலும் ஆட்டுப்புழுக்கைக்கு வீரியம் ஜாஸ்தி. மாட்டுக்



கிடையைப் பார்க்கிலும் ஆட்டுக்கிடை சிலாக்கியம். கிடை வைக்கும்போதெல்லாம் பசங்கிடையினால் கொடுக்கிறலாயும் பாக்கிவிதம் கிடைவைக்கிறதினால் கிடைக்கிறதில்லை. ஏனெனில் பசங்கிடையில் நஷ்டம் உண்டாகிறதில்லை. ஆகையால் கிடை வைத்தவுடன் உழுது விட்டால் காற்றினாலும், மழையினாலும் காரங்கள் நஷ்டமடையாமல் உரம் மண்ணோடு சேர்ந்து நல்லபலனைக் கொடுக்கும். கிடைவைத்தலில் மூத்திரம் நஷ்டமாகிறதில்லை. சாணம், புழுக்கையைப் பார்க்கிலும் மூத்திரம் நல்லபலனைக் கொடுக்கக்கூடிய எரு. ஆகையால்தான் இராக்காலங்களில் கீதாரிகள் 3, 4 தடவை ஆடு மாடுகளை எழுப்பிவிட்டு மூத்திரம் பெய்யும்படி பண்ணுகிறார்கள்.

சென்னை இராஜதானியில் சுமார் 130 லட்சம் ஆடுகள் இருக்கின்றன. இந்த ஆடுகளை விரத்தியாம்சம் பண்ணிக் கூட்டின்பேரில் தொழில்செய்தால் எவ்வளவோ லட்சக்கணக்காக லாபம் அடையலாம். நமது இராஜதானியில் மேற்கூறிய 130 லட்சம் ஆடுகளை உரத்துக்காகச் சரிவர உபயோகப்படுத்தினால் வருஷத்தில் ரூபாய் 50,000 பெறும்படியான உரத்துக்கு மேலேயே கிடைக்கும்.

(5) தோல்கிடங்கு எரு ; ஆடு மாடு அடிக்கும் தோட்டி எரு.

ஆடு மாடு அடிக்கும் தோட்டியில் மாம்சங்களும், தோல்களும்போக பாக்கி கழிசல் பதார்த்தங்களை எல்



லாம் ஒருகுழியில் கூளம், குப்பைகளோடும் தழைக்க  
ளோடும் போட்டுவைத்துத் தூர்க்கும் உண்டாகாமல்,  
இருப்பதற்காகத் தனம் சார்பலாலும், மண்ணாலும்  
மூடப்பட்டுச் சீக்கிரம் மடிப்பதற்காகக் கொஞ்சம் சுண்ணா  
ம்பு நீறும் மேலே தூவப்பட்டுக் கொண்டுவந்தால்  
இந்த எரு மடித்தவுடன் நல்ல உயர்ந்த எருவாகிறது.  
இந்த எருவில் இரத்தம், எலும்பு, பழக்கோல, குள  
ம்பு, கொம்பு, மயிர் எல்லாம் சேர்க்கிருக்கும். இவை  
கள் எல்லாம் சரிவரச் சேகரித்து வைக்கப்பட்டு எரு  
விடப்படாததினால் காது இராஜதானியில் சுமார்  
50,000 ஏக்கருக்கு மேல் புஷ்டி கொடுக்கக்கூடிய எருக்  
கள் நஷ்டமாய்விடுகின்றன. இப்படி நஷ்டம் உண்  
டாக்காமலிருக்கும்படி குடிகள் இதுவிஷயத்தில் கவன  
மெடுத்துக்கொள்ளவேண்டும். அசடு கசடு ஒன்றை  
யும் அலட்சியம் செய்யாமல் சேகரித்துப் பூமிக்கு எரு  
வாக இடவேண்டும். இப்படிச் செய்துவந்தால் ஒரு  
நாளும் நமக்கு வறுமைவராது.

#### (6) எலும்புகள்.

எலும்புகளை ஒரிடத்தில் சேகரம்பண்ணிச் சுண்ணாம்புக் கல்லுருளைகளால் கலவை ஒட்டத்தில்  $\frac{1}{4}$  அங்குலம்  $\frac{1}{2}$  அங்குலம் தூள்களாகப்பண்ணிப் பூமிக்கு இட்டாலும் இடலாம். இத்தூள்களை மேய்ச்சல் நிலங்களுக்கு மேல்நாட்டில் போடுவது வழக்கம். இதனுடைய குணம் நன்றாய் மக்கினவுடன்தான் தெரியவரும். இவைகளைப் பட்சிகளும், நாய், நரிகளும் கொண்டு



யோனாலும் கொண்டுபோகலாம். அப்படிக் கொண்டு போகமளிருப்பதற்காக எலும்புகளைத் தூள்பண்ணிப் போடுவதும் உண்டு. அல்லது எலும்பை, மாவாக அறைத்துப் பூமியில் தூவுவதும் உண்டு. மேய்ச்சல் நிலங்களுக்குத் தூவுகையில் ஏகர் 1க்கு 1,000 பவுண்டுமேனிக்குத் தூவப்படுகிறது. இது களிநிலத்தைப் பார்க்கிலும் மணலசாரி பூமிக்குத் தகுந்தது. இன்னும் எலும்புகளை வேகவைத்துத் தூள்பண்ணியும் கொதிக் கிற ஆவிபிலவைத்துத் தூள்பண்ணியும் பூமிக்கு இட லாம். எலும்புத் தூளெல்லாம் பழுவகைப் பயி ருக்கும், பருத்திப் பயிருக்கும், காப்பிக்கொட்டைச் செடிக்கும் நிரம்ப முக்கியமான எரு. எலும்புகளைக் கரியாக்கிச் சர்க்கரை ஆலைகளில் வெல்லத்தின் பழுப்பு வர்ணத்தை இக்கரிகள் நீக்கினவுடன், அக்கரிகள் நல்ல எருவாகிறது. சென்னை இராஜதானியில் எலும்புகள் தப்பெண்ணத்தினால் தூவிக்கப்பட்டு, பூமிக்கு உரமா கக் கொடுக்கப்படுவதில்லை. ஆகையால் வெட்டியான் திடல்களிலும், பறைச்சேரிகளிலும் உள்ள எலும்பு களை அன்னிய நாட்டார்கள் ஏஜண்டி மூலமாய் வாங்கி ஏற்றுமதி செய்துவிடுகிறார்கள். ஒரு செத்தமாட்டில் சுமார் 40 பவுண்டு எலும்பு கிடைக்கும். வருஷத்தில் நமது இராஜதானியில் லட்சக் கணக்காய் மாடுகள் சாகின்றன. எலும்பு ஏற்றுமதியில் சுமார் 4, 5 லட்ச ரூபாய் நமது இராஜதானி நஷ்டமடைகின்றது. ஆகை யால் குடிகள் தங்களுக்குக் கிடைக்கும் எலும்புகளை



எல்லாம் எருக்குழியில் போட்டு மக்குப்படி செய்து பூமிக்கு இட்டால் நஷ்டம் கேரிடும்படி ஏற்படாது. நல்ல லாபம் அடையலாம். 1 டன் எலும்பு சுமார் 40 ரூபாயாக விற்கப்படுகிறது.

### (7) அவுரிச்சாணம்.

எங்கெங்கே அவுரிச்சாயம் காய்ச்சப்படுகிறதோ அங்கெல்லாம் இவ்வெருக் கிடைக்கும். ஒருவாண்டி அவுரிச் சாணம் 2 ரூபாய் முதல் 3 ரூபாய் வரையில் விற்கும். முக்கியமாய் நெல்பயிருக்கு உரமாகக் கொடுக்கப்படுகிறது.

### (8) மீன் உரம்.

சமுத்திரக்கரை ஓரங்களிலுள்ள இடங்களில் இவ்வரம் கிடைக்கும். மலபார் பக்கங்களில் இவ்வரத்தை உபயோகப்படுத்துகிறார்கள். சிறு மீன்கள், மீனாடைய அசடு, கசடு, கூளம், குப்பைகளெல்லாம் சேகரித்து வைக்கப்பட்டு ஏக்கர் 1க்கு 1½ டன் வீதம் பூமிக்குச் சில விடங்களில் அடிக்கப்படுகிறது. கிழங்குவகைப் பயிர்களுக்கும், பழவகைப் பயிர்களுக்கும் நிரம்பத் திறமான உரம்.

### (9) பிண்ணுத்த உரம்.

இதில் கொட்டைமுத்துப் பிண்ணாக்கென்றும், இலுப்பைப் பிண்ணாக்கென்றும், சுகம்பாப் பிண்ணாக்கென்றும், கடலைப் பிண்ணாக்கென்றும், பே எள்ளுப் பிண்ணாக்கென்றும் அனேகவிதப்பிண்ணாக்குகள் இருக்கின்



றன. சில பிண்ணாக்குகள் மாட்டுத் தீவனத்திற்காகவும், சில உரத்திற்காகவும், சில இரண்டுக்கும் பிரயோசனப்படுத்தப்படுகின்றன. கொட்டைமுத்துப் பிண்ணாக்கு ஏகர் 1க்கு 2 பாரத்துக்குக் குறையாமல் உரம் கொடுத்து கோதாவரி ஜில்லாவில் கரும்பு சாகுபடி செய்வது வழக்கம். கரும்புமுதலிய லாபந்தரக்கூடிய பயிர்களுக்கு ஏகர் 1 க்கு சுமார் 2 பாரம் பிண்ணாக்கு உரம் கொடுக்கவேண்டும். தானியாதிப்பயிர்களுக்கு ஏகர் 1 க்கு 500 பவுண்டு பிண்ணாக்கு உரம் கொடுத்தால் போதும். பயிர்களின் லாபத்துக்குத்தக்கபடி ஏகர் 1 க்கு 200 பவுண்டு முதல் 1000 பவுண்டு வரையில் உரம் அணைக்கலாம். குசம்பாப்பிண்ணாக்கு உரம், கொட்டைமுத்து பிண்ணாக்கைவிட கரும்புக்கு சிலாக்கியமாம். வேப்பம் பிண்ணாக்கும் கொட்டைமுத்து பிண்ணாக்குக்குச் சமமாக சொல்லலாம். பிண்ணாக்கு உரங்களை எல்லாம் தூள் செய்து களை கொத்தும்போது சிறுகச் சிறுகப்பயிருக்கு உரமாக அணைக்கவேண்டும். நமது இராஜதானியில் பிண்ணாக்குகளை அதிகமாக உரத்துக்கு உபயோகப்படுத்தாமல் ஏற்றுமதி செய்யப்படுகிறது. எண்ணெய் கொடுக்கும் விதைகளும் கூட ஏற்றுமதி செய்யப்படுகின்றன. எண்ணெய் ஏற்றுமதியில் நமது பூமிக்கு நஷ்டம் உண்டாக மாட்டாது. ஆனால் எண்ணெய் விதைகளும், பிண்ணாக்குகளும் ஏற்றுமதி செய்யப்பட்டால் நமது பூமிக்கு நிரம்ப நஷ்டம் உண்டாகிறது. விலை மோரில் வெண்



ணைய் எடுப்பது போல நமது பிண்ணாக்கிலிருந்து அன்  
னிய நாட்டார்கள் எந்திரப் பிரயோசனத்தினால் மறு  
படியும் எண்ணெய் எடுத்து, பாக்கி இருக்கும் பிண்ணா  
க்கை உரமாகக் கொடுக்கிறார்கள். நம்முடைய அறி  
வின்மையால் எண்ணெய் விதைகள், பிண்ணாக்குகள்  
ஏற்றுமதியால் நமது இராஜதானியிலிருந்து சுமார் 50  
60 லட்சரூபாய்க்குக் குறைபாத விலையுள்ள எருவை  
நஷ்டமடைகிறோம். இந்த எருவைப் பூமிக்கு இட்டால்  
நாம் எவ்வளவோ லாபம் அடையலாம்.

(10) சுருது, தழை, கேரீக்கை உரம்.

பழுத்த சாகு, தழை, புல, பூண்டு முதலியவைகள்  
எங்கெங்கே ஜாஸ்தியாய்க் கிடைக்கிறதோ அங்கே எல்  
லாம் இவைகளைச் சேகரித்து, ஒரு குழாயில் போட்டு,  
மக்கும்படி செய்து பூமிக்கு உரமாக இடலாம். இதை  
ப்பற்றியும் குடிகள் கவனிக்கவேண்டும்.

(11) கடற்பாசி, கடற்பூண்டுகள்.

கடற்கரை யோரங்களிலும் சமுத்திர சலத்திலும்  
உண்டாகி, இருக்கும் பூண்டுகளையும் முன் சொல்லி  
இருக்கிறபடி சேகரித்து வைத்துப்பயிர்களுக்கு உர  
மாகக் கொடுக்கலாம்.

(12) உப்பு.

இது சிறுபான்மையில் கேழ்வரகு, தென்னை, சவு  
க்கு சிலவித நெல்லுகளுக்கு உரமாகிறது.



(13) பட்சி எருக்கள்.

இவ்வெரு நிரம்ப விலையுயர்ந்தது. எங்கெங்கே கிடைக்கிறதோ, அங்கெல்லாம் சேகரித்துப் பூமிக்கு இடலாம். கோயில்களிலும், காலிமனைகளிலும் கிடைக்கும் வெளவால் புழுக்கைகளை சேகரித்து பூமிக்கு இட டால் நிரம்ப லாபம் உண்டு.

(14) பொட்டிலுட்பு மண்.

இது பாழ் மனைகளில் உப்புப்பூத்து சொரிந்து இருக்கப்பட்டமண். இது மணங்கு (80 பவுண்டு) 2½ ரூபாய் முதல் 3 ரூபாய் வரையிலிருக்கும். தானியப் பயிர்களுக்கு உரமிட்டால் நல்லகண்டு முதல் கொடுக்கும். பொட்டிலுப்பு சிலவித கேணி சலத்தில் ஜாஸ்தி. அவ்விடங்களில் புகையிலைச் சாகுபடி செய்வார்கள். மிளகாய், புகையிலை, கத்திரி உருளைக்கிழங்கு இவைகளுக்கு நல்ல எருவு. ஏகர் 1க்கு சுமார் 100 பவுண்டு வீதம் பயிரில் 3 தடவையில் தூவவேண்டும்.

(15) சுண்ணாம்பு நீறு.

இது கோதுப்பயிர்களுக்கு முக்கியமான உரம். கோதுமைப்பயிர்களாவன :—நிலைக்கடலை, அவுரி, துவரை, உளுந்து, கொள்ளு, பயறு, முதலியன. ஏக்கர் 1க்கு சுமார் ½ வண்டி உரம் கொடுக்கலாம். இது பிசு பிசுப்பான களியை தளர்ச்சிப்படுத்தவும், தளர்ச்சியான மணலை கெட்டிப்படுத்தவும் பிரயோசனப்படுத்தப்படுகிறது. நிலக்கடலைக்கு ஏகர் 1க்கு சுமார் ½



வண்டி சுண்ணாம்பு நீற்றுடன் 1 வண்டி சாம்பலைக் கலந்து பயிரில் தெளித்தால் அதற்கு தகுந்த உரமாவதுடன், அதில் வாழும் பூச்சி புழுக்களையும் தொலைத்து விடுகிறதாம். பழவகைப்பயிர்களுக்கு ருசி கொடுக்கவும், வரீசனை கொடுக்கவும் இவ்வுரம் அவசியமென்று தெரியவருகிறது.

(16) குளத்துப் பொருக்கு.

குளம், ஏரி, வாய்க்கால்களில் சலம வற்றினவுடன் வண்டல் பொருக்குகள் வெடித்திருப்பதைப் பார்க்கலாம். அவைகள் மணல்சாரி பூமிகளுக்கும் மட்டமான பூமிகளுக்கும் நல்ல உரமாகிறது. ஆற்று மண்ணுக்கு வேற்று மண் என்கிற பழமொழிப்பிரகாரம் இது நல்ல எருவாகும். தென் ஆர்க்காடு ஜில்லாவில் வேர்க்கடலை பூமிகளுக்கு வண்டல் பொருக்குகளை உரமாக அடிக்கிறார்கள்.

சுருக்கமாக.

உலகத்தில் உபயோகமற்ற வஸ்து ஒன்றும் கிடையாது. அசடு, கசடு என்று தள்ளப்படுவதெல்லாம் நிரம்ப முக்கியமான எருவாகிறது. ஒன்றையும் தப்பெண்ணத்தின்பேரில் துவேஷித்து அலட்சியம் செய்யக்கூடாது. எவ்வளவு அற்ப வஸ்துவென்று சொன்னபோதிலும் அவைகளைச் சேகரித்து வீணாக்காமல் பாதுகாப்போமானால் நமக்கு ஒரு விஷயத்திலும் ஒரு காளும் குறைவு ஏற்படவேமாட்டாது. மேற்கூறி இருக்கப்பட்ட ஒவ்வொரு எரு விஷயத்திலேயும் குடி



கள் கவனமெடுத்துக்கொண்டு நஷ்டம் உண்டாக்காமல் சேகரித்து வைத்துப் பூமிக்கு இவார்களேயானால் அவர்களுக்கு இப்போது கிடைக்கும் வரும்படியைப் பார்க்கிலும் ஒன்றுக்கு ஒன்றரை கிடைப்பதற்கு சந்தேகமே இல்லை. இங்கிலீஷில் ஒரு பழமொழியுண்டு. (Waste not, want not) எனபதாக. அதாவது எவ்வளவு அற்பவஸ்துவாயிருந்தாலும் ஒருவன் அதை வீணாக்கி பாழ்படுத்தாமல் இருந்தானேயாகில், அவனுக்கு ஒரு நாளும் வறுமை உண்டாகாது. எரு சேகரிக்கிற விஷயத்தில் நமது குடிகள் இந்த பழமொழியை எப்போதும் ஞாபகத்தில் வைத்திருக்கவேண்டும். சில எருக்கள் பூமியின் செய்நேர்த்திகாலத்திலும், சில எருக்கள் பயிர்கள் பூமியிலிருக்கையில் பின்செய்நேர்த்தி காலங்களிலும் அடிக்கும்படியாக இருக்கும். மாட்டுக்கொட்டில் எருவை பூமி உழுவதற்கு முன்னால் அடித்து ஒத்தாப்போல் பாப்பி உழுதுவிடவேண்டும். இப்படியே மலஎருவையும் பண்ணவேண்டும் பொட்டிலுப்பு மண்ணை பயிராக்கொத்திவிடும் காலங்களில் பயிர்களின் அடியில் அணைக்கவேண்டும். வளர்ச்சியை தூண்டிதல் பண்ணி நல்ல சுண்டுமுதலைக் கொடுக்கவேண்டியதற்காக, வளர்ச்சி காலங்களில் சிலவித எருக்களை அணைக்கும்படியாக இருக்கும். பொட்டிலுப்பு ஜலத்தை கறைத்து புகையிலை, உருளைக்கிழங்கு முதலிய பயிர்களுக்கு கொத்தி விடுங்காலத்தில் பயிரின் அடியில் தெளிக்கலாம். கரும்புக்கு 2 வது, 3 வது கொத்தல்களில் பிண்ணாக்குகளை தூள் செய்து உரமாக பயிரின் அடியில் அணைக்கவேண்டும். எருவிடவேண்டிய காலமும், தன்மையும், அளவும், அனுபோகத்தினால் தான் தெரிந்துகொள்ள முடியும்.



## விதை பொருக்குதல்.

—:0:—

விதை ஒன்றுபோட சூரை ஒன்று முளைக்குமா? நல்ல பயிர் உண்டாக்க நல்ல விதை வேண்டியது அவசியம். நல்ல விதைகள் முதிர்ந்ததாயும், புதிதாயும், அதாவது பலங்குறையாததாயும், கொழுப்பானதாயும், நோவு அற்றதாயும், மருக்கலப்பு இல்லாததாயும் வீரியம் ஜாஸ்தி உள்ளதாயுமிருக்கவேண்டும். இப்படி நல்ல விதைகளைப் பொருக்கி எடுப்பதில் நமது குடிகள் கவனக்குறைவாயிருக்கிறார்கள். முந்திய அறுப்புக் காலத்தில் இவ்வித விதைகளைப் பொருக்கி எடுத்துப் பக்குவமாய் வைத்திருந்து பிந்திய தகுந்த பருவகாலத்தில் தெளிக்கவேண்டும். விதைகளைச் சரிவரப்பொருக்கி எடுத்துவரும் பட்சத்தில் இப்போது சாகுபடிக்காக விதையின் அளவு எவ்வளவு செலவாகிறதோ அதில் பாதி போதுமானது. விதைகளைப் பொருக்கி எடுத்துச் சாகுபடி செய்யும்போது நல்ல கண்டுமுதலும் கிடைக்கும்.

உதாரணமாக.—சோளம் முதலிய தானியப் பயிர்களில், விதைகளைப் பொருக்கி எடுக்க வேண்டுமானால் கதிர்கள் உச்சியில் முதலில் பழுத்துக் கீழே முதிர்ந்து கொண்டுவரும்போது உச்சியில் முதிர்கிற தானியங்களில் பெரிய வீரியமுள்ள தானியங்களைப் பொருக்கி எடுத்து, அடுத்த பருவம்வரையில் பக்குவமாய்ப் பாதுகாத்து வைத்திருக்கவேண்டும். வருஷா வருஷம்



விதைகளை இப்படியே பொருக்கி எடுத்துக்கொண்டு போனால் நல்ல ஒருவர்க்கத்தை உண்டுபண்ணலாம். குழிகள் ஒரு ஏகர் நெல்பயிர் நாற்றுநட, சுமார் 8 செண்டில் சுமார் 36 பட்டணம்படி விதை தெளிக்கிறார்கள். விதைபைப் பொருக்கி எடுத்து நல்ல விதைகளைத் தெளித்து நாற்றைப்பிடுங்கி அலகு களைக்கிள்ளி 1 அல்லது 2 அலகுளாக நடடால் ஏகர் 1க்கு சுமார் 4 பட்டணம் படி விதைபோதுமென்று சிலரால் அனுபோகத்துக்குக் கொண்டுவரப்பட்டிருப்பதாகத் தெரியவருகிறது. இப்படிச் செய்வதில் கண்டுமுதலும் நிரம்ப ஜாஸ்தி கிடைத்திருப்பதாகவும் தெரிய வருகிறது. அமெரிக்காவில் சீ அயலண்டு பருத்தி விதைகளைப் பொருக்கி எடுத்து சிலகுணங்கள் அமைந்த வார்க்கங்கள் உண்டாக்கிச் சாகுபடி செய்வதில் கண்டுமுதல் அதிகரித்துப் பருத்தியின் இழையின் நீளங்களும் ஜாஸ்தியாகி முன் பவுண்டு ரூபாய் 0-8-0 விற்குப் பஞ்சு இப்போது விதை பொருக்குவதனாலுண்டாகும் கூர்மை சாகுபடியால் பவுண்டு 1க்கு ரூபாய் 2 விற்கும்படியான நேர்த்தியான பஞ்சை உண்டாக்கி இருக்கிறார்கள். ஆகையால் நமது இராஜதானியில் விதைகளைப் பொருக்கிச் சாகுபடி செய்துவந்தால் விதைகளின் அளவில் இப்போது உபயோகிப்பதைப் பார்க்கிலும் குறைச்சலாய் உபயோகித்து விதைகளின் அளவிலேயே மிஞ்சுவதில் நமக்கு ஒருலாபமாகுவது மன்னியில் கண்டுமுதலிலும் வரும்படி ஏராளமாய் கிடைத்து இப்



போதைவிட இன்னும் அதிக லாபம் கிடைக்கும். இதன் உண்மையை அறிவீர்களாக.

நமது ராஜதானியில் சுமார் 70 லட்சம் ஏக்கராவரையில் நெல் சாகுபடியாகிறது. இப்போது மேற்கு விஸ்தீரணத்துக்கு சுமார் 210 லட்சம் ரூபாய் (சுமார் 2 கோடி ரூபாய்) விதை விதைக்கப்படுகிறது. விதைகளைப் பொறுக்கி செட்டாயும் சாஸ்திரப்படியும் அனுப்புகத்துக்குக் கொண்டுவந்து சரிவாத் தெளித்தால் சுமார் ஒரு கோடி ரூபாய்க்குக் குறையாத விதைபை மீற்றலாம்.



தானியவகைப் பயிர்கள்.

நெல்.



நெல் பயிரும் நெல் கதிரும்.



**பயிர்விசுவம் :—**

நம்முடைய இராஜதானியில் தானியப்பயிர்களில்  
நெல் முக்கியமான பயிர்.

**மாதிரிகள் :**

இதில் கார், சர்பா என்று இரண்டு முக்கியமாதிரி  
இருக்கின்றன.

**தகுந்த பூய்கள் :—**

இவை, களியிலும், செவ்விலும், சதுரபு நிலங்களி  
லும் பயிராகும். பசனக் கறைவல்லாத இடங்களில்,  
களியிலும் சதுரபு நிலங்களிலும் நஞ்சைப்பாகவும்,  
வானவாயில் நஞ்சைப்பாகவும், சதுரபு செவ்வாய்  
கின்றன.

**கேய் நேர்த்தி :—**

புஞ்சையில் சதுரபு செவ்வாய் வண்டி நேர்த்தால்,  
மே, சூன், மாதங்களில் கார்ப்பும கிடைமலைகளைக்  
கொண்டு பூய்கள் இரண்டு, மூன்று தரம் உழுப்படுகின்  
றன. நஞ்சைச் சதுரபு யில் சூன் மாதக்கடைசியில்  
ஆற்று வெள்ளத்தைக்கொண்டு பூய்யை மூன்று தரம்  
உழுது நன்றாகக்கொத்தி விடப்பட்டு, களைபிடுங்கி  
கரைகள் போட்டு நடவுக்குத் தயாராய் வைத்திருக்க  
வேண்டும்.

**தகுந்த உரம் :—**

ஏகரா ஒன்றுக்கு உழும்போது இரண்டு வண்டி  
கொளிஞ்சித்தழைகளாவது அல்லது 5 வண்டி ஆடா



தெகாடை, புங்கன், எருக்கு முதலிய தழைகளாவது  
மேடலாம். அல்லது 10-வண்ணி மடித்த குப்பைச்  
சாம்பலாவது, 1 பாரம் பண்ணுக்காவது உரமாகக்  
கொடுக்கலாம். வண்டல், பெருக்கு கிடைக்கும்  
பட்சத்தில் ஏகா ஒன்றுக்கு இருபது வண்ணிக்குக்  
குறையாமல் அடிக்கலாம். எருவை உழும்முன்  
நிலத்தில் பார்ப்பினு லும் பார்பலாம். தழைகளை உழும்  
மேது நிதிக்குவிடலாம். பண்ணுக்குகளை கடும்  
மேது தூளாக்கிக் தெலிக்கலாம். பசுத் தழை  
உரத்துக்காக அவரி முதலிய பயிர்களை உண்டாக்கி  
பூக்குமுன் பூமியில் உழுதுவிடலாம்.

விதையின் அளவு, விதைப்பு, நடவு முதலியன :

பஞ்சைசலில் சூலை, ஆகஸ்ட் மாதங்களில் ஏகாவது  
மழைபெய்தால், தெகாடை உழவேண்டு இன்னும், ஒரு  
தரம் அல்லது இரண்டு தரம் உழுது, ஏகா ஒன்றுக்கு  
சுமார் 36 பட்டணம் பயி விதம் விதைதெளிப்பார்  
கள். வரிசை வரிசையாய் படைச்சாலில் விதைக்கின்  
சுமார் 30-பட்டணம்படி விதைமேது தூமானது. காற்று  
விட்டு கடும்பட்சத்தில் ஒரு ஏகா கட 8-செண்டில்  
புழுதிக்காவிலாவது, சேற்றுக்காவிலாவது சுமார் 36-  
பட்டணம்படி விதை விதைக்க வேண்டியதாயிருக்  
கும். புழுதிக்கால் காற்றாவது மழையில் காற்றங்கால்  
உழப்பட்டு, கிணற்றிறவைபால் காற்றை விருத்தி  
பண்ணுதல். சேற்றுக்கால் காற்றாவது, ஆற்று ஜலத்  
தால் காற்றங்கால் சேருக்கப்பட்டு அதில் விதை



விதைக்கப்பட்டு நாற்றை உண்டாக்குதல். நடவு சுமார் சாணுக்கு ஒன்று வீதமிருக்கவேண்டும். அலகைக்கிள்ளி நடவேண்டும். பள்ளத்தாக்காயிருந்தால் அலகு கொஞ்சம் கூடவைக்கவேண்டும்.

**தகுந்தகாலம் :—**

புஞ்சையில் சூலை, ஆகஸ்ட்டு மாதங்கள் விதைக்கத் தகுந்தகாலம். நஞ்சையில் சூன் மாதச்சுடையில் விதைவிட்டு, சூலை இறுதியில் அல்லது ஆகஸ்ட்டு மாதம் 15-தேதிக்குள் நட ஆரம்பித்துவிடவேண்டும்.

**பாசனம் :—**

ஒரு ஏக்கர் நெல்பயிர் விருத்திக்கு 40 அல்லது 45 அங்குலம் மழைபெய்தால் போதுமானது; அல்லது சுமார் 3,13,6000 பட்டணம்படி ஜலமிருந்தால் போதுமானது. ஆனால் இதற்கு இரண்டு, மூன்று படங்கு இப்போது அதிகமாக பிரயோசனப்படுத்தப் படுகின்றது. ஏரிப்பாசனம், கிணற்றுப்பாசனங்களில் ஜலம் குறைவாயும், ஆற்றுப்பாசனங்களில் ஜலம் ஜாஸ்தியாயும் உபயோகப்படுத்தப்படுகிறது.

**பிள்கெய் நேர்த்தி :—**

புஞ்சையில் இரண்டு தரமும், நஞ்சையில் ஒருதரமும், களை எடுக்கப்படுகிறது. நஞ்சையில் களை எடுப்பதோடு, பயிரை நன்றாய் மிதித்து விடவும்படுகிறது.

**வயது, அடிப்பு :—**

கார் 4-மாதத்துப்பயிர்; சம்பா 6-மாதத்துப்பயிர். கார் அக்டோபர் மாதத்திலும், சம்பா பிப்ரவரி மாதத்



திலும் அறுவடை செய்யப்படுகிறது. பயிரை அரிவாளால் அறுத்து அரிக்காய்ச்சல் போட்டும் அல்லது போட்டாமலும் கட்டுக்கட்டி நெற்போராய் போட்டு பிந்தி அவகாசமிருக்கையில் கட்டடித்தாவது அல்லது உடனேயே கோட்டுப்பிடித்து அடித்தாவது மாகுலை உண்டாக்குகிறார்கள். வைக்கோல் பழுக்க ஆரம்பிக்கும்போதும் கதிரில் கீழ் 1-வாசி பால் பிடித்திருக்கிற சமயத்திலும் நெற்பயிர் அறுவடை செய்யவேண்டும். வைக்கோல் கொஞ்சம் பசுமையாயிருக்கும்போதே, தானியத்தை விரலினால் அதுக்கினால் பால் வெளிவராமலிருந்தால் உடனே அறுத்துவிடலாம். தானியப்பயிர்கள் லெவலாம் அறுப்பில் இப்படியே கவனம் செலுத்த வேண்டும்.

**கண்டுழதல் : —**

ஏகரா ஒன்றுக்கு சுமார் 500-பட்டணம்படி நெல் சராசரியில் கிடைக்கும். நல்லபூமியாயிருந்தால், 1000-பட்டணம்படியும் கிடைக்கலாம். நிலம் மட்டமாயிருந்தால் 500-பட்டணம்படிக்குக் கீழும்போகலாம். ஒரு போகத்தில் சுமார் 30 ரூபாய் மொத்தவருமானமாக வைத்துக்கொள்ளலாம். இதற்குச்செலவு, உழவு, ஏருகளைபிடுங்குதல், நடுதல், சர்க்கார் கிஸ்தி முதலியன எல்லாம் சுமார் ரூபாய் 25க்கு குறைவில்லை. ஆகையால் செலவெல்லாம்போக ஒரு போகத்தில் குடிகளுக்கு மிஞ்சுவது ஏகரா ஒன்றுக்கு சுமார் ரூபாய் 5 தான். இருபோகத்தில் செலவெல்லாம்போக சுமார் ரூபாய் 13 கிடைக்கலாம்.



கைத் தொழில்:—

அரிசியிலிருந்து ஒருவந்தாவும், சாறுபழம் உண்டு பண்ணலாம். 100-மாக்கால் கெல, 4 மாக்கால் தீட்டல் தவடும். 12-மாக்கால் உரித்தவகை கிடைக்கலாம். அரிசித் தவடு பகவுக்கு கல்ல உணவு ஆனால் வண்டி க்காளைக்கு அவ்வளவு தீரம் அல்லலாம். அவலும், புழுங்கலர்சிபா அதிக புஷ்டியை கொடுக்கக் கூடியதாம். எனினெனில் அவைகளில் தவடும் சர்ப்பம் தப்பட்டி நுக்கிறதாம்.



# சோளம்.



சோளப்பயிர், சோளக்கதிர்.



## 8 தானியவகைப் பயிர்கள்.

**பயிரின் சுபாவம் :—**

நமது இராஜதானியில் சென் ஜில்லாக்களுக்கு எப்படி நெல் முக்கிய உணவோ, அதுமீபால காபை, கர்நூல், பல்லாரி, அந்தபூ ஜில்லாக்களுக்கு சோளம் முக்கிய உணவாகிறது. சோளம் தனியாகவாவது அல்லது பருக்தியாவது அல்லது துவரை, மொச்சை முதலிய கோதுப்பயிர்களுடனாவது கலந்து பயிர் செய்யப்படுகிறது.

**மாதிரிகள் :—**

சோளத்தில் வெள்ளை, மஞ்சள், சிவப்பு, கறுப்பு ஆகிய நான்கு முக்கிய மாதிரிகள் இருக்கின்றன. ஆனால் வெள்ளையும், மஞ்சளும் தான் ஜாஸ்தியாக சாகுபடி செய்யப்படுகின்றன.

**தகுந்த பூமிகள் :—**

நல்ல உரப்பான களியிலும், பாதிகள் பாதிமணலும் சம்பந்தப்பட்ட பசளை மண்பூமியிலும், செவ்வலிலும் இவை உண்டாகின்றன.

**செய்நேர்த்தி :—**

கோடைமழையில் பூமியை மூன்று அல்லது நான்கு தரத்துக்குக்குறையாமல் உழவேண்டும். களை ஜாஸ்தியாயிருக்கும்பட்சத்தில் சீமைக்கலப்பையைக்கொண்டு உழலாம். பாக்கி காலங்களில் சாதாரண கலப்பை களைக்கொண்டாவது, அல்லது குண்டகா, கொர்ரு கலப்பை முதலிய கருவிகளைக் கொண்டாவது வேலை செய்யலாம். சோளத்துக்கு ஆழ உழுவது திறம்.



**திருந்தஉரம்:—**

தழை யெருக்களையாவது, நத்தத்துக்குப்பைகளை யாவது எருவாய்ப்போடுவது கலம். சோளம் பூமியின் சத்தை இழுத்துவிடுமாதலால், கட்டாபம் எருவிட்டே பயிர்செய்யவேண்டும். ஏகரா ஒன்றுக்கு ஆறுவண்டி எருவுக்குக்குறையக்கூடாது.

**திருந்தகாலம், விதைப்பு:—**

சோளத்தை நவம்பிரஜதானியில் சூன், சூலையிலும், அக்டோபர் நவம்பரிலும் சாகுபடி செய்கிறார்கள். சூலையாதம் முதல் வரதத்தில் தெளிப்பதுதான் விசேஷம். சூலையில் பாஞ்சள் சோளமும், அக்டோபரில் வெள்ளைச் சோளமும், சாகுபடிசெய்வது சாதாரணம். தென் ஜில்லாக்களில், ஒருநாளில் குடிகள்  $3\frac{1}{2}$  ஏகரா நிலத்தில் 20 பட்டணம்படி சோளவிதைகளை, கைத் தெளியால் தெளித்து இந்த விதைகளேமூட 6 ஏக்கரைக்காட்டி உபயோகப்படுத்துகிறார்கள். இதற்குபதிலாக கோர்நுவை (மூங்கில் குழாய் விதை தெளிக் கருவி) உபயோகித்தால் ஒரு நாளில் ஒரு ஜதை மாட்டைக்கொண்டு  $3\frac{1}{2}$  ஏகரா நிலத்தில் 5 பட்டணம்படிக்கு மேல் போகாமல் சோளவிதையை தெளிக்கலாம். இது துடன் குண்டகா என்னும் கருவியை உபயோகித்தால் இன்னும் ஒரு ஜதை மாட்டைக்கொண்டு அகே ஒரு நாளில் மேற்படி விதையையும் மூடி விடலாம்.

**விதையின் அளவு:—**

ஏகரா ஒன்றுக்கு கொர்ரு (விதை தெளிகருவி) வினால் விதை தெளித்தால் சுமார் 8 பவுண்டு. அல்லது



3-4 பட்டணம்படி விதை வீயாதுயானது. கையால் தெளிக்கும்பட்சத்தில் சுமார் 8 பட்டணம்படி விதை செலவாகும். கரிசல் நிலம்போல கலவ புரீயாமிடம் கும்பட்சத்தில் 3 பட்டணம்படி விதை வீயாதுயானது. மணல் சாரியாமிடம் கும்பட்சம் சுமார் 8 பட்டணம்படி விதை தெளிக்கும்படி வீயாது. சாசச்சுதையுடன் தீவனத்துக்காக சாகுபடி செம்புர்ப்பட்சத்தில், சுமார் 16 பட்டணம்படி விதை செலவாகும். சாகுபடி வினாள் வீயாது விதைக்கப்பாயின் கருவாசை சாகுபடி இன் ஒருருவரிசைக்குள் சுமார் 2 அடி வரையாசாய்ந்து க்கவேண்டும். விதை தெளித்தபின் ஹேரோ (Harrow) மைக் கொண்டு பார்ப்பாத்து விதைகளை மூடுவார்கள். விதைக்கு முன் விதைகளை வைக்கிறதெனது அல்லது மைல்தூத்தம் சமைத்த நீர் வைத்து மை வைத்து தெளிப்பது சிறக்கியது.

### கனையுடுத்தல் முதலிய பிட்டுயேடுத்தல்

விதை தெளித்து ஒருபாதத்துக்கெல்லாம், கலையையில் மாட்டைக்கூட்டி பயிருக்க, பத்தாளில் ஒட்டிக்களை எடுப்பார்கள். இரண்டாவது முன்றுவது பாதங்களில் பூமி கொத்திவிடப்பட்டுக் களைகள் பிடுங்கப்படுகின்றன. கதிர் விடுகிற சமயத்தில் கல்ல பயிராமிருக்கும்பட்சத்தில் பயிர் கீழே விழுந்து விடாமல் நுட்பதற்காக ஒன்றோடொன்று கட்டுவது வழக்கம்.

**பாசனம்:—**

பயிர் ஒரு அடி உயரமிருக்கையில், மழையாவது அல்லது பாசனமாவது முக்கியம். மொத்தம் 7-8-தட்



**கண்டுமுதல் :—**

ஏகரா ஒன்றுக்கு நல்ல பூமியாயிருந்தால் 400-பட்டணபடி தானியம் கிடைக்கும். சராசரிக்கண்டு முதல் 500-பவுண்டு அல்லது சுமார் 2000 பட்டணபடி தானியந்தான். மாட்டுத்தீவனத்துக்காகப்பயிர் செய்யும்பட்சத்தில் சோளத்துக்கு மிஞ்சினது வேறொரு பயிருமில்லை. சோளத்தை பூச்சமுன் வெட்டவேண்டியது. ஒரு வருஷத்தில் முன்று கான்து தடவை மாட்டு தீவனத்துக்காக வெட்டலாம். வெட்டி, வெட்டப்பயிர் வளருமா? பாசனத்தில் வந்ஷப ஒன்றுக்கு சுமார் 60000 பவுண்டு ஓர் ஏகராவுக்குப்பாகப் சோளத்தண்டு கிடைக்கும். பாசனமில்லாத இடத்தில் சுமார் 4 அறுப்பில் சுமார் 20000 பவுண்டு பாகப் சோளத்தண்டு கிடைக்கும். இளம் சோளப்பயிரை அசாவது ஓர் அடி உயரமிருக்கையில் மாடுமேயக்கூடாது ஏனெனினில் அதுவிஷமாம். 400-பவுண்டு பசுந்தான் சுமார் ஒரு ரூபாய் விலை. ஏகரா ஒன்றுக்கு கட்டு 1க்கு 5 பவுண்டு நிறையுள்ள 3000 கட்டுகொங்கத சோளத்தட்டைகிடைக்கும்.

**செலவுபேக வரும்படி :—**

செலவெல்லாம்பேக ஏகரா ஒன்றுக்குக் குழிகளுக்கு மிஞ்சுவது சராசரியில் சுமார் ரூபாய் 5 தான். நல்ல பூமியில் ஏகரா ஒன்று மொத்தவருமானம் சுமார் ரூபாய் 25-ல் சாகுபடி செலவு சுமார் ரூபாய் 10. தள்ளினால் ஏகரா ஒன்றுக்கு ரூபாய் 15 கிடைக்கலாம்.




கைத்தொழில் —

சிலவகை சோளத்திலிருந்து சர்க்கரை பெடுக்கலாம். சாராயம் உண்டு பண்ணலாம். சோளத்தட்டையிலிருந்து பேனா செய்வலாம். தானியத்தின் கம்புகளைக் கைத்துடையவர்களிடம் பிரியமானப்படுத்தலாம்.

---



கம்பு.



கம்புப்பயிரும், கம்புக்கதிரும்.



விதையின் அளவு, விதைப்பு:—

ஏகா ஒன்றுக்கு 10—15-பவுண்டு அல்லது 4,5 பாட்டனம் படிவிதை போதுமானது. தானியம் சிதிகா கையால் கைத்தெளியில் விதை ஒத்தாப்போல பூமியில் விழ, மணலை சேர்த்துக் கொண்டு தெளியப்பது நல்ல கம்பு விதைத்த வுடன் மண் மூர்வதற்காக முர் பட்டலை கட்டி இழுப்பது நல்லது.

தகுந்தகாலம்:—

சூன், சூலைமாதங்கள் தான் கம்பு விதை தெளிக்கத் தகுந்தகாலம்.

பாசனம்:—

அழுத்தமான தானியமானதால் கம்புக்கு அதிக பாசனம் வேண்டியதில்லை. மழை அதிகமானால் தாங்காது ஒரு மாதம் வரையில் பயிர்காய்ந்தாலும் சுகடாது. தோட்டச் சாகுபடியில் சுமார் 4-5. தடவை ஜலம் இறைத்தால் போதுமானது. வருஷம் சுமார் 20 அங்குலம் மழையுள்ள இடங்களில் இப்பயிர் சாகுபடி செய்யலாம்.

பிச்செய்நேர்த்தி:—

விதை தெளித்து ஒருமாதத்திற்கு பிறகு ஏரினால் பயிரைக் கலைக்கவேண்டும். இரண்டாவது மாதத்தில் பூமியைக் கொத்திக் களை பெடுக்கவேண்டும்.

வயகு, அறுப்பு:—

கம்பு மூன்று மாதத்திய பயிர். கம்பந் தட்டை அதிகமாக மாட்டுத் தீவனத்திற்கு பிரயோசனப் படா



தாதலாஸ, சுதிர்களை மாத்திரம் முன்னாடியே அறுத்து  
விடுவது வழக்கம். பிறகு சால்காசமாய்க் கூராவேய  
வாவது, அல்லது, வைக்கா லுக்காவது தட்டைகளை  
வெட்டுவது வழக்கம்.

### கண்ணிமுதல்:

ஏகரா ஒன்றுக்கு முதலாகக் கண்ணிமுதல் 600  
பாட்டணம் படி; சாதபணம் கண்ணி முதல் சுமார் 400  
படிவாண்டு அல்லது 2000 பாட்டணம் படிக்குமேல் கிடை  
யாது.

### செலவுபோகவருப்படி:

ஏகரா ஒன்றுக்கு விமாத்த வருமானம் 12 ரூபாயில்  
கிளித்தின்பட செலவு தொகை சுமார் ரூபாய் 7. போ  
லஸ் குடிசைக்கு மிஞ்சுவது சுமார் ரூபாய் 5. தான்.  
கல்ல பூமியில் செலவெல்லாம் போக சுமார் ரூபாய் 10.  
கிடைக்கலாம்.

### வைக்கோல்: —

கம்பைக் கொள்ளு, மொச்சை முதலான பயிர்  
களோடு கலந்து பயிரிடலாம். கம்பந்தட்டையை,  
வைக்கோல் வெட்டியால் சோளத்தட்டையை வெட்டி  
மாட்டுக்குக் கொடுப்பது போல கொடுக்கவேண்டும்.



# கேழ்வரகு.



கேழ்வரகுப் பயிரும் கேழ்வரகுக் கதிரும்.

பயிரின் சுபாவம்:---

இது யைசூர் மாகாணப், கோயமுத்தூர் மக்கங்களு  
க்கு முக்கிய உணவு தானியம். இதைத் தோட்டச்.



சாகுபடியிலேயும், புஞ்சைப் பயிராகவும் சாகுபடி  
செய்யலாம். இது கோடைப்பயிராகவும், மாரிப்பயிரா  
கவும் சாகுபடி செய்யப்படுகின்றது.

**பூம் :**

கிணற்றுப்பாபர்ச்சை விவசாயிகளிலும், புஞ்சை நிலங்  
களிலும் புஞ்சையிலும் கன்றும் வளரும். புஞ்சைப்  
மேட்டுப் பூமியாயிருக்கவேண்டும்.

**செய்தேர்த்தி :**

பூம்பூக் கொடை பாதையில் கன்றும் 5, 6 தரமும்,  
சூலை ஆகண்டு பாதையில் 5, 6 தரமும் 2 முது புஞ்சையில்  
விதை விதைக்கப்படுகின்றது. கிணற்றுக்குச் சமீபத்தி  
லும் புஞ்சையிலும், காற்றுக்கள் மணமாகி நடப்படு  
கின்றன. சூன், சூலையில் காற்றங்கால் வரு, தழை முத  
லியவைகளால் செம்மீகர்த்தி பண்ணப்பட்டு, பாத்திகள்  
கட்டப்பட்டு, கிணற்று ஜலத்தைப்பாவிது ஆற்று ஜலத்  
தைப்பாவிது ஆகப்பாபர் கொண்டு விதைகள் புழுதிக்கா  
லில் விதைக்கப்படுகின்றன.

**உரம் :**

பாகிக்குத் தீதாலகிடங்கு வருவும், ஆட்டுக்கிடை  
பூம், படித்த சாணமும் கல்ல உரங்கள். ஏகரா ஒன்  
றுக்கு சுமார் 5, 6 வண்டி சாணத்துக்குக் குறையக்  
கூடாது. கிடைவைக்குப்பாபர் சத்தில் ஏகரா ஒன்றுக்கு  
ஒர் இரவு 1000 ஆட்டுக்குக்குறையக்கூடாது. தேரல்  
கிடங்கு வருவானால், இரண்டு வண்டிக்குக்குறையக்  
கூடாது. சப்பாத்திக்கள்ளியினடியிலிருக்கும் மண்  
காற்றுக்கு கல்ல வருவாம்.



காலம் :—

தோட்டச்சாகுபடி அதாவது கிணற்றிறைவைச் சாகுபடியில் வருஷம் 360-நாளும் சாகுபடி செய்யலாம். புஞ்சை சாகுபடிக்கு சூலை ஆகஸ்டு மாதங்கள் தகுந்தகாலம்.

விதையின் அளவு; நடவு:—

புஞ்சையில் விதைக்க ஏகா ஒன்றிற்கு 10-15 பவுண்டு விதைபோதும். நாற்றங்காலில் விதைவிடுவதில் சத்தில் சுமார் 10 பவுண்டு விதை தெளித்தால் போதும். நாற்றை முப்பதாவது நாள் பிடுங்கி செம்பேர்த்தி செய்திருக்கப்பட்ட வயலில் ஒன்பது அங்குல வித்திபாசத்தில் நாற்றைக்கிள்ளி நடவேண்டும். பூமிப்பைப் படைச்சால்களாகவும், முகமிகளாகவும் பிரித்து, முகமிகளில் நாற்றை நடுவது சிலாக்கியம்.

பாசனம் :—

சுமார் 30 அங்குலம் மழையுள்ள இடங்களில் பயிர் செய்யலாம் சுமார் 2, 2½ அடித் தண்ணீர் பாசனம் கொடுத்தால் போதுமானது. சுமார் 15 தரம் தண்ணீர் இறைக்கும்படியாய் நேரிடும்.

பிச்செய் நேர்த்தி :—

நட்டு ஒருமாதத்திற்கெல்லாம் களையெடுக்க வேண்டும். இரண்டு தரத்துக்குக்குறையாமல் களைபிடுங்க வேண்டும். கொத்திவிடும்போது கம்புக்கு மண்ணைப் பதுபோல மண் அணைப்பது திறம். பயிர் தழைத்து வளரும்பட்சத்தில் நெல் பயிர் தலை யறுப்பதுபோல் இதையும் அறுத்துவிடலாம்.



**வயசு அறுப்பு:**

ராசி 4-மாசத்துப்பயிர். செப்டம்பர், அக்டோபரில் நடட்டால் ஜனவரிக்கடைசிக்குள் அறுத்து விடலாம். பயிர் ஒரே காலத்தில் சேர்த்தாற்போல் பழுக்காததால் அறுவடைக்குக் கொஞ்சம் சிரமமும் செலவும் நேரிடும். கதிரைத்தாளினின்றும் பிரிப்பது கொஞ்சம் கஷ்டம். ஆகையால் பயிரை அறுத்துக் கதிர்ப்போராய்ப் போட்டு தாளியை கொஞ்சம் புழுங்கினவுடன் கதிரடிப்பது வழக்கம். செலவுக்கும் இதற்கும் போரடிக்கக் கல்லுருளைகளைப் பாம்பாசனம் படுத்துவது திறம். பயிரை சிரமமுதிரவிட்டு அறுத்தால், நெல்லைப்போலக் கொட்டுண்டு போகும்.

**கண்டு முதல்:**

புஞ்சையில் ஏகாவுக்கு சராசரி கண்டுமுதல் 500 பவுண்டு. நல்ல புஞ்சைபானால் சுமார் 1000 பவுண்டு, கண்டு முதலும் கிடைக்கும். நஞ்சையிலும் தோட்டக் காலிலும் நல்ல பூமியில் சுமார் 2000 பவுண்டு வரையில் தானியம் கிடைக்கும். ஆனால், நஞ்சையிலும் தோட்டக்காலிலும் சராசரி கண்டுமுதல் சுமார் 1000 பவுண்டு தான். சுமார் 5000 பவுண்டு வரையில் வைக்கோல் கிடைக்கும். கேழ்வரகு வைக்கோலை மாடுகள் ருசியுடன் தின்னும்.

**செலவுபோக வரும்படி:—**

புஞ்சையில் ஏகா ஒன்றுக்கு சகல செலவும்போக ரூபாய் 5ம், இதரச்சாகுபடிகளில் சுமார் ரூபாய் 15ம் வருமானம் கிடைக்கலாம்.



சிறைச்சாலை உணவு:—

கேழ்வரகு நமது இராஜதானியில் சிறைச்சாலைகளில் குற்றவாளிகளுக்கு உணவாகக் கொடுக்கப்படுகின்றது.



## வரகு.



வரகுப் பயிரும் வரகுக் கதிரும்.

பயிரின் சுபாவம்:—

வரகு மகா கெட்டியான தானியம். பாக்கி தானியப் பயிர்களைப்பார்க்கிலும் இது மகா கோடையையும்,



மகாமாரியையும் தாங்குந் இது சாதாரணமாய் புஞ்சையில் தான் சாகுபடி செய்யப்படுகின்றது.

**மாதிர்கள் :—**

பெரு வாகு, பனிவாகு என்று இரண்டு முக்கிய மாதிர்களிருக்கின்றன.

**பூமி :—**

மகா கீழ்த்தரமான நிலத்தில் சாகுபடி செய்யப்படுகின்றது. நல்ல நிலத்தில் சாகுபடி செய்தால் பூமியை சளைக்கப்பண்ணும்.

**செய் நேர்த்தி :—**

மட்டமான தானியமானதால், இதன் சாகுபடியில் அதிக கவனம் பாராட்டுகிறதில்லை. ஒரு மழையில் உழுது வரகைத் தெளிப்பது வழக்கம்.

**விதையின் அளவு :—**

ஏகரா ஒன்றுக்கு சுமார் 15 பவுண்டு விதை செல்லும்.

**காலம் :—**

அநேகமாய் சூலை, ஆகஸ்டில் தெளிக்கப்படுகிறது. அதுதான் தகுந்தகாலம்.

**உரம் :—**

இதற்கு எருவே போடுகிறதில்லை.

**பின்செய் நேர்த்தி :—**

சில ஜில்லாக்களில் துவரையோடு கலந்து விதைக்கிறார்கள். ஒருதரம் அல்லது இரண்டு தரம் கொத்திக் களை யெடுப்பதுண்டு.



பாசனம்:—

சுமார் 15 அங்குலம் மழை பெய்யக்கூடிய இடங்களில் வளருமா.

வயக அறுப்பு:

இது சுமார் 5 மாதத்துப்பயிர். ஆகஸ்ட்டு மாதந்தொடங்கியதில் ஜனவரியில் அறுவடை யாகும்.

கண்டு முதல்:

ஏகா ஒன்றிற்கு சராசரி சுமார் 500 பவுண்டு தானியம் கிடைக்கிறது.

வைக்கோல்:

வரகு வைக்கோல் மாட்டுத் தீவனத்துக்குப் பிரயோசனமில்லை. கிராம கெட்டியாய்க் கூடுபோல இருப்பதால், மாடுகள் அதைத் தின்று ஜீரணிக்க சக்தியில்லாதனவாயிருக்கின்றன.

பிரயோசனம்:

பாக்கியிலே பாடம் பண்ணுவதற்கும், பழங்களை பழுக்கவைப்பதற்கும் வரகு வைக்கோல் பிரயோசனப்படுகிறது. வரகு வைக்கோலினால் ஒருவித நல்லவாசனையும், நல்ல ருசியும் உண்டாகிறது. இந்த குணம் பாக்கிவைக்கோல்களுக்குக் கிடையாதாம். கூரைமேல்வதற்கு வரகு வைக்கோல் முதல் தரமானது.

பணவருமானம்:—

ஏகா ஒன்றுக்கு செலவெல்லாம் போக சுமார் 3, 4, ரூபாய் கிடைக்கலாம்.



# திவனயும் சாமையும்.



தினைப் பயிரும், தினைக் கதிரும்  
பயிரில் சுபாவம்:—

தினை வரகைப்போல் தேகத்துக்கு உஷ்ணம் கொடுக்  
கக்கூடியது. சாதாரணமாய் இதையும் புஞ்சைப்பயிர்



பாசனத்தான் சாகுபடி செய்துள்ளான். தினையில் அநேக தினுக்கள் உண்டு. புஞ்சையிலுள் சாகுபடி செய்வதுண்டு.

**பூம் :**

இது கரிசனிலும் செவ்வனிலும் வருமா.

**செய் நெர்த்தி :**

உழவு முசலியவை கீகழ்வாகுக்குப் பண்ணுவது போலத்தான்.

**விதை முதலியன :**

ஏகா ஒன்றுக்கு சுமார் 15 பவுண்டு விதைசெல்லும்; ஆள், ஆலைகள் விதை செவ்வசாய்கிறது. இது உலுபாத்ததுமாயிர்.

**கண்டு முதல் :**

ஏகா ஒன்றுக்கு சுமார் 400 பவுண்டு கண்டுமுதல் கிடைக்கும்.

**கலப்புப் பயிர் :**

இது தனிபாகவாவது அல்லது புஞ்சையில் பருத்தி யோடாவது கலந்து சாகுபடி செய்யப்படுகிறது.

ஏகா ஒன்றுக்கு செலவெல்லாம் போக சுமார் ரூபாய் 5 கிடைத்தால் பெரிது.

**சாமை :—**



இது ஒருமட்டமான தானியப்பயிர். சப்பையான நிலங்களில் நன்றாய் வளரும். பாசனத்தில் நல்ல மாட்டுத் தீவனத்தை கொடுக்கும். தினையைப்போல தான் சகல சாகுபடியும். சாமை களத்திலேயும், எள் முரத்



திமேலும் என்ற பழையொழிபாடி. களத்துக்கு கொண்டுபோனபிற்பாடு தான் கட்டு முதலில் உருவாக்கலாம். சைதா மேட்டைப் பண்ணையில் 4 மாதத்திலுமார் 40000 பயண்டு பசுந்தாள தீவனம் கொடுத்ததாகவும், இதைக் காயப்போட்டதிலுமார் 15000 பயண்டு கிடைத்ததாகவும் தெரிபவருகிறது. மாட்டுத்தீவன சாகுபடிக்காக ஏக்கர் 1க்கு 28 வண்டி சாண உரமும் பாசனம் தீவனமும் செலவாகியுள்ளது.



# கோதுமை.




கோதுமைப் பயிரும் கோதுமைக் கதிரும்.

பயிரின் கபாவம் :—

இது வட இந்தியாவுக்கு முக்கிய உணவு. நல்ல புஷ்டி  
கொடுக்கக்கூடிய தானியம். இது மாரிகாலப்பயிர்.





கோதுமைப் பயிரும் கோதுமைக் கதிரும்.

இது புஞ்சைப்பயிராகவும், தோட்டப்பயிராகவும் சாகுபடி செய்யப்படுகின்றது. இது கம்மிராஜதானியில் சொற்பமாய்ப்பயிரிடப்படுகிறது.

மாதிர்கள் :—

மாவுகோதுமை, ரவைகோதுமை, வால்கோதுமை என்று சிலவகைகள் உண்டு.



**பூம் :**

கல்ல கரிசலிலும், செவ்வலிலும் படுகை நிலங்களிலுமாகிய கல்ல கொழுமைபுடைய நிலங்களில் தான் வளரும்.

**உரம் :**

இதற்குக் குப்பைப் பொருஷா, ஆட்டுக்கிடையும், சப்பா கதி அடி மண்ணுமா, வாசகால பொருக்கும் ஏருவாகக் கொம்பழத்தாரில் போடப்படுகின்றன. பசுந்தாள் ஏரு மண்ணி பண்ணி உழுதுவிடுவதும் திறம்.

**செய் நோத்தி :**

செய்யெய்யில் நிலம் 1—2 தடவை உழுப்பட்டு ஏக ரா ஒன்றுக்கு 2000 ஆந் வதம் கிடை வைக்கப்படு கிறது. கவாபா வரையில் ஆகையும் உழுவுகளை பெறு கின்றது புஞ்சையில் சீசாவித்துக்கு உழுவதுபோல உழுகிருர்கள்.

**விதையின் அளவு :**

ஏகரா ஒன்றுக்கு 80 முதல் 120 பவுண்டு வரையில் விதை செல்லுகிறதாய். அனால் சுமார் 40 பட்டணம் பாடி போதும். கைத்தெளியால் விதைகள் விதைக்கப் பட்டு, தேரால் சச்சா குபடியில் தண்ணீர் இறைவைக்கா கப் பாத்திகளும் போடப்படுகின்றன.

**காலம் :—**

அக்டோபர் கவாபா மாதங்கள், சாகுபடியிலும் பிக்கத் தகுந்தகாலம்.



**பின்செய்நேர்த்தி :**

சமயத்துக்குத் தகுந்ததுபோல் பூரி, 2-3 கரம் கொத்திவிடப்பட்டு களைகள் நீக்கப்படுகின்றன.

**பாசனம் :—**

விதை தெளித்து 3-வாரத்துக்கெல்லாம் ஒருகரம் ஜலம் இறைக்க வேண்டும். அதுபிற்போகாண்டு, பழை இல்லாவிடின வாரம் ஒரு தண்ணீர்விதம் பாம்பச்சி வா வேண்டும்.

**வயக, கண்டுழதல் :**

இது நான்கு மாதத்தயபயிர். ஏகரா ஒன்றுக்குத் தோட்டச்சாகுபடியில் சுமார் 1000, பவுண்டு தானியம் கிடைக்கும். புஞ்சையில் சுமார் 500. பவுண்டுதான் கிடைக்கும். தானியம் கன்றும்படி பழுத்து முதிர்கிற வரையில் அறுவடை செய்கிறதில்லை.

**செலவுபோகவருமானம் :**

ஏகரா ஒன்றுக்கு சுமார் மொத்தவருமானம் தோட்டச்சாகுபடியில் ரூபாய் 30-க்கு செலவு ரூபாய் சுமார் 15 போய்விட்டால் பாக்கிவரும்படி ரூபாய் 15க்குமேல் கிடையாது. புஞ்சையில் ஏகரா 1க்கு மொத்த வருமானம் சுமார் ரூபா 15 செலவு ரூபாய் சுமார் 10 போனால் பாக்கி வரும்படி ரூபாய் 5 கிடைத்தால் பெரிது.

**கைநீநொழில் :—**

கோதுமையிலிருந்து ஒருவித—மாவும் ரவாயும், ரொட்டியும் உண்டாக்குகிறார்கள்.



# முத்துச்சோளம்.



முத்துச்சோளப் பயிரும, முத்துச்சோளக்கதிரும்.



**பயிரின் சுபாவம் :—**

இது வட இந்தியாவில் சிலபாகங்களில் முக்கிய உணவாயிருந்த போதிலும், சென்னை இராஜதானியிலும், சாகுபடி செய்யப்படுகின்றது. இது அமெரிக்கர்களுக்கு முக்கிய உணவு. பால் கறவை ஜாஸ்தி பண்ணுவதற்கும், மாட்டைக் கொழுக்கவிடவும் இத்தானியத்தை அரைத்துக்கொடுப்பது வழக்கம்.

**மாதிரிகள் :—**

இதில் வெள்ளை, சிவப்பு, பஞ்சள், ஊதா, கறுப்பு இப்படி அநேக மாதிரிகள் உண்டு. சிலசமயங்களில், ஒரே மீசாளக்கொண்ட அநேக நிறத்தை உடைத்தாயிருக்கிறது. வெள்ளையும், ஊதாவும், கல்ல உயர்ந்த ஜாதிகள். கறுப்பு நிறம் மட்டமான தினுசு.

**பூமி:—**

சுக்கான் சம்பந்தமுள்ள களிமண் பூமியும், படுகை நிலமும் முதல் தரமானவை. மணல் சம்பந்தமுள்ள களியிலும் உரத்தின் பேரில் நன்றாய் வளரும்.

**காலம் :—**

வடகிழக்கு மழைக்காலம் பயிர் செய்வதற்குத் தகுந்தகாலம்.

**செய் நேர்த்தி :—**

சூன், சூலையில் உழப்பட்டு செப்டம்பரில் அப்படி உழுதபூமியை முகடுகளாகவும், உழவுச் சால்களாகவும் பிரித்து, உழவுச்சால்களை மடித்த சாணம், ரூப்பை முதலியவைகளால் நிரப்பி முன் உழவுச்சால்



களாக இருந்தவைகளை முகடுகளாகவும் முன் முகடுகளாக இருந்தவைகளை உழவுச்சரால் களாகவுமாக்கி இரண்டாவதுகாலை ஆக்கப்பட்டிருக்கிற முகட்டில் விதைகள் புதைக்கவேண்டும். ஒரு முகட்டுக்கும மற்றொரு முகட்டுக்கும் 2 அடி வித்தியாசமிருக்கவேண்டும். முகட்டிலேயே ஒன்றையாடிக் கொருதரம் கூர்மை யான குச்சியால் குழிகள் பண்ணி ஒவ்வொரு குழிக் குழிதான் விவவிதை 2-வீதம் புதைக்கவேண்டும். பசுந்தானா வருவால் விதைகளை வளம்பண்ணுவது நலம். விதை :

ஏகா ஒன்றுக்கு சுமார் 30-பவுண்டு அல்லது 10 பட்டணம் படி விதை வேண்டுமாம்.

**பிஞ்செய்தேர்த்தி:**

பயிர் 6-அங்குலம் உயரமிருக்கையில் முகடுகளைக் குறுக்கே உடைத்து விட்டால், ஒவ்வொரு பயிரும் ஒரு சிறு குன்றிலிருக்கும். பயிர் 9-அடி உயரமிருக்கையில் பிண்ணாக்கு முதலிய உரத்தைப் பயிரடியில் வைத்து பூமியைக் கொத்தி மண்ணைத் தால் பயிர் நன்றாய் வளரும்.

**களையெடுத்தல் :**

தெளித்து இரண்டரை மாதத்துக்கெல்லாம் பூக்க ஆரம்பிக்கும். அதற்குமுன் மூன்று நாளுக்கு நடவை கொத்திக் களையெடுப்பது உத்தமம்.

**வயக, அறுப்பு:**

இது 4½ மாதத்துப் பயிர். செப்டம்பரில் விதை தெளித்தால் ஜனவரிக் கடைசியில் அறுவடை செய்ய



லாம். சோளக் கொண்டைகள் தாளிலிருந்து கொய்து காயவைக்கப் படுகின்றன. கொண்டைகள் கன்றாய்க் காய்த்தவுடன், தானியம் பிரிக்கப்படுகின்றது.

ஒரு செடிக்கு இரண்டு கொண்டைகளுக்கு மேல் சில வேளைபிருந்தாலு மிருக்கலாம்.

**கண்டு முதல்:**

ஏகா ஒன்றுக்கு சுமார் 1000-பவுண்டு தானியப்புர 2½ டன் வைக்கோலுள் கிடைக்கும். செடி வெல்லா போக, ஏகா ஒன்றுக்கு சராசரி 15 வரையிலாவது வரலாம்.

**கைத்தொழில்:—**

முத்துச் சோளத்திலிருந்து சர்க்கரையா ஒருங்க—மாவும் உண்டுபண்ணலாம்.

**கலப்புப்பயிர் :**

இப்பயிரைத் தனியாகவும் பருத்தியோடு கலந்தும் சாகுபடி செய்யலாம். பருத்தியோடு கலந்து சாகுபடி செய்யும் பட்சத்தில் பருத்தி இரண்டுமாகும். சோளம் ஒருபாகமுமாக நிலவிச் திரைத்திலிருக்க வேண்டும். அப்போது ஏகா ஒன்றுக்கு சோளவிதை 10-பவுண்டு போதும்.


**மழை யாவு :—**

25—30 அங்குலம் மழை பெய்யுமிடங்களில் வளரலாம்.



துவரை முதலிய கோதுப்பயிர்கள்.

கொள்ளு.



கொள்ளுப் பயிர்.



**பயிரின் சுபாவம் :—**

இதை தானியத்துக்காகவும், தீவனத்துக்காகவும், பசுந்தாள் எருவுக்காகவும், சாகுபடி செய்யலாம். கொள்ளை வேகவைத்து வண்டி மாடுகளுக்கும், குதிரைகளுக்கும், கொடுப்பது வழக்கம். கொள்ளுப்பயிர் நம்மிராஜதானியில் ஏராளமாய்த் தண்ணியில் சாகுபடி செய்யப்படுகின்றது. நல்ல பூமிகளில் பருத்தியோடாவது, வேறு இதர தானியப்பயிரோடாவது கலந்து சாகுபடி செய்யப்படுகின்றது.

**தகுந்த பூமிகள் :—**

மிக்க சப்பையான நிலங்களிலும் சாகுபடி செய்யலாம். பூமியில் சுக்கான் சமபந்தம் கொஞ்சமட்டு பட்டிருக்கும்பட்சத்தில் பயிர் தானியமல்லாமல் தண்டுத் தழையமாய்ப்போய்விடும். இப்பயிருக்கு சுண்ணாம்பு முக்கிய தீனியானதால், சுக்கான் சமபந்தமுள்ள நிலம் இதற்கு சிலாக்கியம்.

**காலம் :—**

இதை அதிக கோடையிலும் உண்டாக்கலாம். தனியாக சாகுபடி செய்யும்பட்சத்தில், அநேகமாக அக்டோபர், நவம்பர் பயிர் செய்வதற்குத் தகுந்த காலம். பசுந்தாளுக்காக சாகுபடி செய்யும்பட்சத்தில் சூன், சூலையில் பயிரை உண்டு பண்ணலாம்.

**செய்நேர்த்தி விதையின் அளவு :—**

2—3 தரம் பூமி உழப்பட்டு, விதைகள் விதைக்கப்படுகின்றன. காலஸ்திதி சரியாயில்லாமலும் பூமியும் இளப்பமாயிருந்தால் ஏகராவுக்கு சுமார் 40 பவுண்டு



விதை செல்லும். நல்ல பூமியிலும் நல்ல பருவத்திலும் விதைக்க ஏகரா ஒன்றுக்கு சுமார் 200 பவுண்டு விதை போதும். மாட்டுத் தீவனத்துக்கும் பசுந்தாள் எருவுக்கும் சாகுபடி செய்யும்பட்சத்தில் ஏகரா ஒன்றுக்கு சுமார் 500 பவுண்டு விதை செல்லும். இதைக் கைத்தெளியிலும் தெளிக்கலாம். கொள்ளு (மூங்கில் குழாய் விதைதெளிகருவி) வினாலும் தெளிக்கலாம். கைத்தெளிபால் தெளித்தால் கலப்பைப்பால் உழுது விதைபை மூடுவது வழக்கம். கொள்ளுவால் தெளித்தால் குண்டாகாவால் மூடலாம்.

**பிளாசுமேரீத்தி :**

இந்தப் பயிருக்குக் களை பிடுங்குதல் முதலியவை வேண்டுவதில்லை. ஏனெனில் பயிர் படரும் சுபாவமானதால், அதிக விதக்களைகளை வளரவொட்டாமல் செம்கிறது. விதை தெளித்த பிறகு, அதிக மழை பயிருக்குக்கெடுதல்.

**வயகு, கண்டுழதல் :**

இது 4 மாதத்துப்பயிர். அக்டோபரில் தெளித்தால் ஜனவரியில் அறுவடை செய்யலாம். நல்ல பூமியில் ஏகரா ஒன்றுக்கு சுமார் 2000 பட்டனம்படி தானியம் கிடைக்கும். மாட்டுத்தீவனத்திற்காகச் சாகுபடி செய்யும்பட்சத்தில் ஒரு வருஷத்தில் பசுந்தாள் 4—5 அறுப்பு அறுக்கலாம். ஒவ்வொரு அறுப்பிலும் சுமார் 5000 பவுண்டு பசுந்தாள் கிடைக்கும். 1 டன் பசுந்தாளை காயவைத்துப் போர்போட்டால்  $\frac{1}{4}$  டன் காய்ந்த புல் கிடைக்கும்.



**பிரயோகனம்:—**


இது தானியப்பயிர்களைப்போல நிலத்தைச் சளைக்க  
ப்பண்ணுது. இதை தானியத்துக்காவது, மாட்டுத்தீவ  
னத்திற்காவது சாகுபடி பண்ணினபோதிலும் பூமிக்  
குல்ல வளப்பத்தை உண்டாக்குகிறது. இதன் நீவ  
ரினாலும், இலை உதிர்வதாலும் நிலம் கொழுநாயடை  
கிறது. ஆகையால் பசுந்தான் எருவுக்காகச் சாகுபடி  
செய்தபயிரை பூமிமீயாடு உழுதுவிட்டால் சாயை  
நிலம் அல்லது சளைத்த நிலம் வளப்பமானது.

**காய்ந்தபுல் நீவனம்:—**

இதனுடைய பசுந்தானைக் காய்மீயாட்டு, மாட்டுத்  
தீவனமாகக் கொடுக்கலாம்.



# பயறும், உளுந்தும்.



பயற்றம் பயிர்.

பயரின் சுபாவம்:—

இவைகளும் சுண்ணாம்புத் தீனிப்பயிர்கள் தான். இவைகள் மாரிகாலைப்பயிர்களாகச் சாகுபடி செய்யப்படுகின்றன. பயறு அகேகமாய் ஏதாவது ஒரு தானியப்பயிர்களோடு கலந்து தான் பயிர்பண்ணப்படுகிறது.





உளுந்துப்பயிர்.

உளுந்தோ தனியாயில் சாகுபடி செய்யப்படுகின்றது ஆனால் உளுந்து அதிக விஸ்தீரணத்தில் பயிர் பண்ணப் படுகிறதில்லை



மாதிரி:—

பயறில் பல்வகைகள் உண்டு. பச்சைபயறு, பனிப் பயறு முதலியன.

பூம்:

இவைகள் களி சிலங்களில் சாகுபடி செய்யப்படுகின்றன. சிலவேளை அதிகக்களியில்லாத மண்சாரிலும் சாகுபடி செய்யப்படுகின்றன.

காலம்:—

செப்டெம்பர் அக்டோபர் மாதங்கள் சாகுபடி செய்யத்தகுந்த காலம்.

செய்நேர்த்தி

செய்யப்பரில் சிலம் இரண்டு மூன்று தார் உழப்பட்டு, விதைகள் தெளிக்கப்படுகின்றன.

உளுந்துக்குப் பயற்றம்பார்க்கிலும் கல்ல உழவும் எருவும் வேண்டும்.

விதையின் அளவு:—

செய்யம்பர் அக்டோபரில் ஏகா ஒன்றுக்கு சுமார் 25 பவுண்டு விதைகள் கைத்தெளியால் கலக்கவாவது அல்லது வரிசை வரிசையாகவாவது தெளிக்கப்படுகின்றன.

பின்செய் நேர்த்தி:—

பயிர் நெருங்கியிருக்கும்பொழுது ஏர்களைக்கொண்டு பயிரடித்தலும், களை மிகுந்திருக்கும்பொழுது களைக் கொட்டால் கொத்திக் களை பிடுங்குதலும் 2, 3 தரம் செய்யவேண்டும்.



**வயசு, கண்டுமுதல் :**

இவைகளிரண்டுமே காசு கு மாதத்தையாயிடு. செப்  
டம்பரில் தெளித்தால், ஜனவரி ஆரம்பத்தில் அறுவடை.  
செய்யலாம். ஏகா ஒன்றுக்கு சுமார் 300 பயுண்டு  
முதல் 500 பயுண்டு வரையில் சுண்டு முதல் சீனைக்  
கும். இக்கண்டுமுதல் தனியாயில் சாதாபடி செய்யா  
பட்ட பூமிக்கே பொழிய வேறு தானியாயிரகிளாடு  
கலந்து பண்ணப்பட்ட பயிருக்கல்ல. தானியாயிராடு  
கலந்து பயிரிட்டால் ஏகா ஒன்றுக்கு சுமார் 200-பயு  
ண்டு தான் தானியம் சீனை சதுர.

**தீவனம் :**


கொறுக்கப்பட்ட காயடி, இலை, பொதுக். மீதால் முத  
லியவைகள், மாட்டுக்கு கல்ல தீவனமாசின்றன. பயற்  
றம் பொட்டைப்போல உளுத்தம் பொட்டு அவளவு  
சிலாக்கியமல்ல. உளுத்தம் பொட்டில் சீனை ஜூஸ்தி  
ஆகையால் அதைப் பயற்றம் பொட்டை கலந்து  
கொடுப்பது நலம்.

**வரப்பிலும் சாதாபடி செய்யலாம் :**

உளுந்தை, நஞ்சை வயல் வரப்புகளில் செபட்டம்ப  
ரில் விதைத்து டிசம்பரில் அறுவடை செய்யலாம்.  
பயற்றை நஞ்சையில் அறுப்புக்கு 20 நாள் முந்தி நாப்  
பசையிருக்கும்போது தெளித்து விடுவது வழக்கம்.  
இந்த வயற் பயற்றை மார்க்கு மாதம் அறுவடை செய்  
கிறது வழக்கம்.



# கொத்துக்கடவஸ்.



கொத்துக்கடலை.

பயிர்ச் சுவை:—

கடலைப் 'ஜலத்தில் ஊறவைத்தாவது வேகவைத்  
தாவது, பெங்களத்தில் குதிரைகளுக்கு உணவாகக்



கொடுக்கிறார்கள். இதுவும் சுண்ணாம்புத்தீனிப் பயிர் தான். இது பனிகாஸ்ப் பயிர்.

**பூம் :—**

இது கரிசல் காட்டியில் முக்கியமாய் பயிரிடப் படுகின்றது. உரப்பான்களி நிலங்களில் நன்றாய் வளரும். இது அநேகமாய்த் தனிமையில் பயிர்செய்யப் படுகின்றது. நவம்பர் டிசம்பரில் கீசாளம் அடிவடை பண்ணப்பட்டு பூரியில் இது பயிர்பண்ணப்படுகின்றது.

**காலம் :—**

நவம்பர் டிசம்பர் மாதங்கள் பயிர்விதைக்கத் தகுந்த காலம்.

**செய் நேர்த்தி :—**

இதற்கு 5-6-தாத்திற்குக் குறைவாமல் நல்ல ஆழமான உழுவு வேண்டும். கடப்பை, பல்லாநிலைலாக் களில் குண்டகா. கொட்டுகலப்பை முதலியவைகளைக் கொண்டு பூரி நன்றாய் செய்கோத்தி பண்ணப்படுகிறது.

**விதையின் அளவு :—**

நவம்பர் கடைசியிலாவது, டிசம்பர் ஆரம்பத்திலாவது ஏக்கர் ஒன்றுக்கு சுமார் 25-பவுண்டுக்கு மேல் 40-பவுண்டு வரையில் விதைகள் தெளிக்கப் படுகின்றன.

**பாசனம் மழை :—**

முளை கண்டபிறகு இப்பயிருக்கு அதிகமழை வேண்டியதில்லை குளிர்காலத்துப் பனியைக்கொண்டே பயிர் முதிர்ந்துவிடும்.



**கொத்தல் :—**

விதை தெளித்து மூன்று வாரத்துக் கெல்லாம்  
ஒருதரம் கொத்தி விட வேண்டும்.

**வயாக கண்டுழதல் :—**

கிது மூன்றுபாதத்தியாயியி. ஏகரா ஒன்றுக்கு  
ஜாஸ்தி கண்டு முதல கமார் 1300-பவுண்டாகும்.  
சராசரி கண்டு முதல் 2000-பட்டணம் படிக்குமேல்  
கிலை.

**மாட்டுத்தீனி :—**

காலைப் பெயர்ச்சியு மாட்டுக்கு நல்ல தீவனம்.

**கைத்தொழில் :—**

பயிர் வளர்கையில் ஒருவிதமான புளிப்பு ஜலத்தை  
வடிய வந்திடுவது. இதற்குக் கடலைப்புளிப்பு என்று  
பெயர். ஓர் இயந்தரியில் நல்ல சுத்தமான வெள்ளை  
மஸ்லின் (Muslin) துணியைக் காலைப்பிரின்பேரில்  
விரித்து வைத்திருந்தால், பிசுபிசுப்புள்ள காடிகலந்த  
பனி ஜலம் துணியில் கவறும். இத்துணியை மறுநாள்  
காலையில் பிழிந்தால் கடலைப்புளிப்பு உண்டாகும்.  
இதை சீமைக்களில் அடைத்து அஜீரணம். மலக்கட்டு,  
இவைகளுக்கு மருந்தாக உபயோகிப்பது வழக்கம்.



# துவரை .

—:0:—



துவரை .

பயிரின் கபாலம் :—

சுண்ணாம்புத் தீனிப் பயிர்களுள் துவரை நிரம்ப முக்கியமானது. ஏனெனில், இதன்பருப்பை நம்மவர்கள் கிணம் உண்ணாமலிருப்பதில்லை. புஷ்டி கொடுக்க



கூடியவள்து இச்சு ஜன்சி. இது எப்போதும் தானியப் பயிர்களைக் கெடுத்துதான் பயிரிடப்படுகிறது. சில வேளைகளில் சாகசவகையாக பயிரிட நிற்கின்றது. வேளிக்காக இப்படி மரமாகவளர விடுவதுண்டு. இது வருஷா வருஷம் சாதாபடி செய்யப்படுகிறது.

மாதிரி

இச்சு மலைத்துவரை மென்மம், நாட்டுத் துவரை மென்மம், வெள்ளைத் துவரை மென்மம் சிவப்புத் துவரை மென்மம் அந்நாட்டினரிலிருக்கின்றன. நாட்டுத் துவரை மென்மம், மலைத் துவரை வெள்ளையும் சிவப்புமாயிருக்கும்.

பூமி

துவரை மலர் சாகசத்தினால் பூமியிலும், கல்லென முள்ள சிவ்வளவிலும் வளரும். சாதாரணபாம்பு புஞ்சை கல்லென சாகச சாதாபடி செய்யப்படுகின்றது. கையேந்தி

பயிர் சீவர் ஆழமாய் ஒடுபாதலால் ஐந்தாறு உழுவுக்குக் குறைபாடில் உழவீவண்டும். அப்படி உழுத பூமியை சாயப்பொலூர், சுண்ணாபு நீர்நிலையும் உரப்படுத்தி எட்டு வரகு, கம்பு, முதன்யவற்றோடு கெந்து பயிரிட வேண்டும். ஒரு வரிசைப்பயிருக்கும், இன்னொரு வரிசைப்பயிருக்கும் 6 அடி வித்தியாசத்துக்குக் குறைபாடுகூடாது. வரிசையிலேயே ஒரு பயிருக்கும் இன்னொரு பயிருக்கும் 1½ அடி வித்தியாசம் இருக்க வேண்டும். 5 வரிசை வரகும் ஒரு வரிசை துவரைப்பயிருமாக இருக்கவேண்டும்.



**காலம் :—**

சூன், சூலை மாதங்கள் தான் விதைப்பதற்குத் தகுந்த காலம். சிலவேளை ஆகஸ்டிலும் தெளிக்கப் படுகிறது.

**விதையின் அளவு:—**

ஏகரா ஒன்றுக்கு சுமார் 15-பவுண்டுவிதை செல்லும். இதை சொர்ருவால் வரிசை வரிசையாய்த் தெளிக்கலாம். தென்னில்லாக்களில் இது கைத்தெளியால் தான் தெளிக்கப் படுகின்றது. துவரைப்பயிர் மத்தியில் தானியப்பயிர்களைத் தெளிப்பது வழக்கம்.

**களையெடுத்தல் :—**

இதற்கு மூன்று நான்குதரம் கொத்திக் களையெடுக்கவேண்டும்.

**வயக கண்டுமுதல்:—**

இது 6 மாதத்தியபயிர். சூலையில் விதை தெளித்தால், ஜனவரியில் அறுவடை செய்யலாம். ஏகரா ஒன்றுக்கு ஜாஸ்தி கண்டுமுதல் தானியம் சுமார் 1000 பவுண்டும், சராசரிக் கண்டுமுதல் 500-பவுண்டும் தான் கிடைக்கும்.

**மாட்டுத்தீனி :—**

துவரம் பொட்டு மாட்டுக்குப் பால் கறவையை ஜாஸ்திபண்ணக் கொடுப்பது வழக்கம்.

**பிரயோசனம் :—**

துவரை மலார்க்கரியை, வெடி மருந்து செய்ய உபயோகிப்பது வழக்கம். மலாரை கூரைவேய்வதற்கும் கூடு பின்னி உரைக்கிணற்றில் மண்ணணையாக வைப்பதற்கும் பிரயோஜனப்படுகிறது.



# காராமணி அல்லது தட்டைப் பயறு.



காராமணி அல்லது தட்டைப்பயறு.



**பயிரின் சுபாவம் :—**

இது மாட்டுக்குத் தீனிக்காகவும், பசுந்தான் எருவுக்காகவும், தானியத்துக்காகவும். பயிரிடலாம். இதன் கொடி சீக்கிரத்தில் வளரும். அமெரிக்கா தேசத்தில் பசுந்தான் எருவுக்கு, இப்பயிரை நியாய சிலாக்கியமாகக் கொண்டு பயிர் செய்கிறார்கள். காது ராஜ தானியில இப்பயிர் கேழ்வரகு. கம்பு இவைகளுடன் கலந்து சாகுபடி செய்யப்படுகின்றது.

**மாதிரி:—**

அநேக நிறமுள்ள காராமணி திணைகள் ஆகக் கின்றன. இதில் செடிக்காராமணி யென்றது. அகலக் காராமணி யென்றும் இரண்டிவகைகளுண்டு.

**பூம் :—**

இசற்கு சுக்கான் சம்மந்தமுள்ள அளிக்கை சிலாக்கியம். இதில் தானியத்தை எடுக்கலாம். பதிலா நிலமும் திறம்தான். வளம்குறைந்த பூமியாய்நக்குமபட்சத்தில், அந்நிலங்களில இப்பயிரை உண்டாக்கப் பூக்கும்போது பூம்மேயாடு உழுதுவிட்டால் பூமியிலுள்ள இளப்பம் நீங்கிப்போய்விடும். இவ்விதமாக அமெரிக்கா தேசத்தார்கள் இளப்பமான பூமிகளை வளப்பமுள்ள பூமிகளாக ஆக்குகிறார்கள்.

**காலம், விதை முதலியன :—**

இது மாரிகாலப்பயிர். அக்டோபர் நவம்பர் மாதங்கள் சாகுபடிக்குச் சிலாக்கியம். இதை வரிசை வரிசையாகவும், கைத்தெளிபாலும் தெளிக்கலாம். ஏகரா ஒன்றுக்கு சுமார் 10-15-பவுண்டு விதைசெல்லும். பசுந்தாளு



## காராமணி அல்லது தட்டைப்பயறு. 53

க்காக அமெரிக்கர்கள் சுமார் 50-60-பவுண்டுவிதை வலையில் தெளிக்கிறார்கள். வரிசை வரிசையாய் தெளிக்கும் பட்சத்தில் ஒருவரிசைக்கும் இன்னொரு வரிசைக்கும் சுமார் 2-அடி வித்தியாசம் இருக்கவேண்டும். விதைகளை 2-3-அங்குல ஆழத்தில் புதைக்க வேண்டும் அதிகமானது குளர்இல்லாத காலத்தில் வலாத தெளிக்க வேண்டும். கொத்தல், களைபிடுங்கல் எல்லாம் இதற்கு பொதுபயிர்களைப் போலத்தான்.

வயசு கன்றுமுதல்.

இது ஏறாவூ மாநகத்தியாயிர். ஏசுரா ஒன்றுக்கு சரா சராசரி 500 பவுண்டு தானியம் கிடைக்கும். மாட்டுத் தீவைத்துக்காக பசுந்தான் எடுக்கும் பட்சத்தில் சுமார் 25,000-பவுண்டு பசுந்தான் கிடைக்கும். இதைக்காய வைத்து உப்பு போராகப் போட்டால் சுமார்  $2\frac{1}{2}$  டன் காப்பகத்தான் கிடைக்கும்.

தீவனத்திற் உபயோகம் :

தட்டைப்பயற்றங் கொடிகளைக்கால் நடைகளுக்கும் தீவனமாக்கி அவைகளின் மலமூர்த்திராதிகளை மேதாமன்னியில் சேகரித்துவைத்து பூமிக்கு உரமாக இடுவதுண்டு. இப்படி இடுவது பசுந்தான் ஒரு னைவாய் பார்க்கிலும் சிலாக்கிப்பமாகக் கொள்ளப்படுகின்றது.


அறுப்பு :—

இதில் பயிர்கள் ஒரேதடவையில் முதிராமலிருப்பதால் அறுவடையும் ஒரே காலத்திலாவதில்லை.



பசுந்தாள் உரம் :—

நல்ல பூமியிலுண்டாகும் பசுந்தாள் கண்டுமுதல், இளப்பமான பூமியிலுண்டாவதைப் பார்க்கிலும் ஜாஸ்தியாம். ஆனால் காராமணிக்குப் பின்வரும் பயிர்கள் இளப்பமான நிலத்தில் காராமணி பசுந்தாள் எருவால்



மொச்சக்கொட்டைப் பயிர்.



## காராமணி அல்லது தட்டைப்பயறு 55

குணத்தை பிரத்தியட்சமாய்க் காட்டுமே யொழிய  
நல்லெலத்தில் அப்படிச் காட்டுவது தெரியவராதது.

அமெரிக்கர்கள் ஏகரா ஒன்றுக்கு 300-பவுண்டு  
கரைபக்கடிய எலும்புச்சத்தை உரமாகக் கொடுத்து  
ஏகரா ஒன்றுக்கு சுமார் 2000-பவுண்டு தானியத்தை  
அடைகிறார்கள்.

மொச்சைக் கொட்டைக்கும் இதேமாதிரிதான் சாகு  
படியும் கண்டு முதலும்.

மொச்சை, கொட்டைபோன்ற உயரமான பயிர்  
களுக்கு நாடாடக்கத்திலேயும் சுற்றிவர்ப்பயிர் செய்து  
ஓரங்களி லிருக்கப்பட்ட கொட்டைச் செடிகளில்  
கொடிகள் சுற்றிக் கொள்ளும்படிச் சாகுபடி செய்வது  
வழக்கம். கிராம நத்தங்களிலேயும் வீட்டைச் சுற்றிவர  
சாகுபடிசெய்து,கொடி, சுவற்றிலேயும் கூரைமேலேயும்  
போரும்படி சாகுபடி செய்வதுண்டு. பச்சை மொச்  
சையை கறிகாய்க்காகவும், சிலமாதிரி மொச்சையை  
தானியத்துக்காகவும் புஞ்சைகளில் சாகுபடி செய்வது  
வழக்கம்.

---



எண்ணெய் விதைப்பயிர்கள்.

ஆமணக்கு அல்லது கொட்டை  
முத்துப்பயிர்.



ஆமணக்கு அல்லது கொட்டை முத்துப்பயிர்.



பயிரின் சுபாவமும் வகையும் :

இது ஒரு வகைவிலைதப்பயிர். இதில் பெரிய ஆமணக்கு என்றும், சிற்றாமணக்கு என்றும் இரண்டு துணுக்கம் உண்டு. சிற்றாமணக்கு எண்ணெய் பேதிக்காகவும், பெரியாமணக்கு எண்ணெய் விளக்கு எரிக்கவும் உபயோகப்படுகின்றன. இப்பயிர் எண்ணெய்க்காகவே சாகுபடி செய்யப்படுகின்றது. சிற்றாமணக்குத் தண்டு வெளுப்பாரும் பெரியாமணக்குத் தண்டு சிவப்பாயிரங்க்குமாக இத்த இரண்டு துணுக்க சாகுபடியும் ஒரே மாதிரிகாள். சிற்றாமணக்கு விகதாப்பயிர், பெரியாமணக்கு வரஷா வரஷாம சாகுபடி செய்யப்படுகின்றது. சில சிற்றாமணக்கு மாதாவி வரஷாம விகதாப்போல் ஒன்றின் நுகர்ந்தாய்.

தகுந்தபூமிகள் :

பெரியாமணக்கு விகதாக்களிலும், கல்ல செல்வனிலும், மணலுக்கெந்த களிமண்ணிலும், கண்டம் வளரும். பெரியாமணக்கு தரிசையிலேயும், சிற்றாமணக்கு மேழ் வாகு முதலிய தானியப்பயிர்களோடும், கீழல் கொடுப்பதற்காக மஞ்சள் பயிரோடும், சிலசமயம் கொத்துக்கடலை மீட்டாம சாகுபடி செய்யப்படுகின்றது.

கேய்நீர்த்தீ, தகுந்தகாலம் :

கொட்டைமணழ ஒவ்வொன்றுக்கும் பூமியை கல்ல உழுவு உழுது, பிண்ணாக்கு, சாணம், கிடைவைத்தல் முதலியவைகளால் உரப்படுத்தி வைக்கவேண்டும். ஜூன், ஜூலை பயிர்செய்யத் தகுந்தகாலம். இக்காலத்தில் மணழ பெய்தவுடன் பூமியை உழுது வருவை



## 58 எண்ணெய்விதைப் பயிர்கள்.

யெல்லாம் கலைத்து, பரம்படித்து நல்ல செய்நேர்த்தி யுடன் பூமியை வைத்திருக்கவேண்டும். கொட்டை முத்துப்பயிர் முசுக்கட்டான் பூச்சிகளால் நிரப்பத் தோந்தினை அடைகிறபடியால் பாரிகாலத்தில் பூமி யை உழுது. செய்நேர்த்தி செய்து, பூச்சி, புழுக்களை எல்லாம் வெளிக்கிளப்பி, பட்சிகளாலும், எறும்புகளாலும், நாசமாகும்படி செய்யவேண்டும். இப்படி விதை தெளிக்கிற வரையில் பூமிமையாதல் ஒரு முறை கொத்தி, சிளரி வைத்திருக்கவேண்டியது அவசியம். விதைப்பு, விதையின் அளவு: -

ஏகா ஒன்றுக்கு சுமார் 16 முதல் 24 பவுண்டு வரை விதை செல்லலாம். சுமார் 10 பட்டணை படி விதைபோதும். ஒரு கார்மையான குச்சியால் குழி தோண்டி, குழி ஒன்றுக்கு இரண்டுவிதை விதம் புதைக்க வேண்டும். ஒருவரிசைப் பயிருக்கும் மற்றொரு வரிசைப்பயிருக்கும் சுமார் 4 அடிவித்தியாசம் இருக்கவேண்டும். வரிசையிலேயே ஒரு பயிருக்கும், மற்றொரு பயிருக்கும் சுமார் 1½ அடி வித்தியாசமிருக்கவேண்டும். விதையை குழியில் போட்டவுடன் மூடி விடவேண்டும். விதைக்கு முன், விதையை ஒரு நாள் வெந்நீரில் ஊரவைத்துத் தெளிப்பது நலம்.

கோத்தல், களைபிடுங்கல்:—

பயிர் ஓரடி உயரம் இருக்கையில், காத்திரமுள்ள செடியை வைத்துக்கொண்டு, பாக்கியை பிடுங்கி யெறிந்துவிடவேண்டும். அப்பொழுது ஒரு முறை பூமி யைக்கொத்தி விடலாம். பிறகு மாதத்துக்கு ஒரு



## ஆமணக்கு ரு கொட்டை முத்துப்பயிர். 59

தடவையாகக்கொத்தி களை பிடுங்குதல் நலம். பயிர் அதிக உயரம் வளரும்பட்சத்தில் தலையைக்கிள்ளி கீழ்க்கிளை ஜாஸ்தி உண்டு பண்ணுவது சிலாக்கியம்.

**அறுவடை :**

பயிர் 2-3 மாதமிருக்கையில் பூச்சி, புழு ஏதாவது இருந்தால் அவைகளை எடுத்து எறிந்துவிட்டு சாய்ப் பைத் தூவுவது நலம். 7வது மாதம் முதல் 9வது மாதம் வரையில் காய்கள் பறிக்கப்படுகின்றன.

**வயசு, கண்டுழதல், சேகரித்தல் :** -

இது 9 மாதத்திய பயிர். ஏகா ஒன்றுக்கு ஜாஸ்தி வரும்படி சுமார் 900 பவுண்டு. சராசரிக் கண்டு முதல் சுமார் 500 பவுண்டு தான். இதரப்பயிர்களுடன் கலந்து சாதாபடி செய்தால் ஏகா 1க்கு சுமார் 250 பவுண்டு தான் கொட்டைமுத்து கிடைக்கும். காய்கள் ஒரே காலத்தில் பழுக்காததால் கோடையில் பயிர் காய்க்கிற வரையில், அடிக்கடி காய்கள் சேகரிக்கவேண்டியிருக்கும். காய்கொஞ்சம் ஊதா நிறமாயிருக்கையில் சேகரிக்க ஆரம்பிக்கவேண்டும். சேகரித்து ஒரு மூலையில் கொட்டி வைத்திருந்து, காற்றுப் போகாமல் வைக்கோலால் 6-நாள் மூடிவைத்திருந்தால் மேல் தோல்கள் அழுகும். பிறகு-2-நாள் வெயிலில் போட்டிருந்தால் காய்கள் வெடிக்கும். அச்சமயத்தில் தட்டுப் பலகையால் அடித்தால் கொட்டைமுத்து எல்லாம் வெளி வந்துவிடும்.



## 60 எண்ணெய்விதைப் பயிர்கள்.

தைத்தொழில் எண்ணெய் எடுத்தல் :

இதன் எண்ணெயை, பாரமுள்ள இயந்தரத்தினால் அழுத்தி பிழிதலினாலாவது, அவ்வது வறுத்து கொதிப்பித் தலினாலாவது உண்டாக்கலாம். இவ்வேதொழிலை எடுத்துவிட்டு உயர்வாயுண்டாகின்ற கொணர்ப்பைகளில் போட்டு இயந்தரத்தின் கொதித்து அழுத்தினால் எண்ணெய் உண்டாகும். அசுத்தவைவத்து ஆம் (9) ஆம். எண்ணெய் உண்டாகும். அவ்வது கொட்டை முதலாக அரைத்து ஜலத்தில் குழிப்பி கொதிக்க வைத்தாலும் எண்ணெய் உண்டாகும். 100-பவுண்டு கொட்டை முதலாக சுமார் 35 பவுண்டு எண்ணெய் கொடுக்கும்.

**பிரயோஜனம்.**

ஆமணக்கு எண்ணெய் தர்ப்பாயிருந்தாலும் இவ்விதங்களுக்கு தர வாய். விளக்கெரிக்கவும். பிழிக்கு சாப்பிட வாய் பிரயோஜனம் படுகிறது. கொட்டை முதலும் பிண்ணனுக்கு செல், கரும்பு, மஞ்சள், முதலிய பயிர்களுக்கு கிராய் மேலானதாகும். செல் பயிருக்கு ஏகா ஒன்றுக்கு ஒரு பாரம் பிண்ணனுக்கும், கரும்புக்கு ஏகா ஒன்றுக்கு சுமார் 10-பாரம் பிண்ணனுக்கும், மஞ்சளுக்கு சுமார் 10-பாரம் பிண்ணனுக்கும் கொடுத்தால் ஏராளமான கண்டு முதல் செப்பலாம். கொட்டை முதல்த் தண்டின்கரி, வெடிமருந்துக்கு பிரயோசனம் படுத்தப்படுகிறது. தண்டுகள் விறகுக்கும், இலைகள் மாட்டுத் தீனிக்கும் பிரயோசனம் படுகின்றன.



எ ள் னு .



எ ள் னு .

பயிர்நிகழ்வம் :—

இது கொட்டை முத்தைப்போல் அவ்வளவு கெட்  
டியான பயிரல்ல. மிகவும் மிருதுவானபயிர். இதைப்



## 62 எண்ணெய்விதைப் பயிர்கள்.

புஞ்சைப் பயிராகவும் தோட்டப் பயிராகவும் சாகுபடி செய்யலாம்.

**மாதிரி :—**

கருப் பெள்ளென்றும், வெள்ளை எள்ளென்றும் இரண்டு முச்சுப தினுசுகள் உண்டு. கருப்பெள்ளைதான் விசேஷமாய்ச் சாகுபடி செய்யப் படுகின்றது.

**தகுந்த பூமிகள் :—**

இது புஞ்சைக் காடுகளிலேயும், நஞ்சையிலேயும், தோட்டங்களிலும் சாகுபடி செய்யப்படுகின்றது. படுகை நிலங்களிலேயும் சாகுபடி செய்யலாம்.

**செய் நேர்த்தி :—**

எள்ளுக்கு ஏழுஉழவு வேண்டும். எவ்வளவுக் கெவ்வளவு அதிகம் உழுதாலும் வீண்போகாது. உழுவு ஒத்தாப்போல் இருக்கவேண்டும்.

**பிண்ணுக்கு உரம் :—**

எள்ளுப் பிண்ணுக்குகள் நிரம்ப சத்துடையதாதலால், நல்லெண்ணெயால் நிலத்தின்சத்து குறைவு படாமலிருப்பதாலும், எண்ணெயை எடுத்துக் கொண்டு பிண்ணுக்கை உரமாக பூமிக்குப் போட்டு விடுவது திறம்.

**விதைப்பு விதையின் அளவு :—**

விதை சிறியதாதலால் தெளிக்க, பூமிகல்லும் கட்டியுமாயிராமல் தூவாளியா யிருப்பது திறம். விதையை வரிசை வரிசையாப்த தெளிக்க வேண்டும். ஒரு வரிசைக்கும் இன்னொரு வரிசைக்கும் சுமார் 1 அடி வித்தியாச மிருக்கவேண்டும். விதைகள்  $\frac{1}{4}$  அங்குல



ஆழத்துக்குக் கீழ்போகாமல் இருக்க வேண்டும். ஏகரா ஒன்றுக்கு கைத்தெளியில் சுமார் 10 பவுண்டு செல்லுகிறதாம். அதாவது 3 பட்டணம் படிவரை செல்லலாம். கொர்ரு கலப்பையால் சால்சால்களாக விதைத்தால் ஒன்று அல்லது இரண்டு பட்டணம் படி போதுமானது. நல்லபயிர் உண்டாக வேண்டி யிருந்தால் நெருக்கமாய்த் தெளிக்கக் கூடாது. எள்ளு விதையைச் சாம்பலில் சாதாரணமாய்க் காப்பாற்றி வைக்கப்படுகிறது.

**தகுந்தகாலம் :**

எள்ளுக்கு இரண்டு பட்டம் உண்டு. எப்போது தெளித்தாலும் கோடையில் அறுவடை யாகும்படி யாய்ப் பார்த்துக் கொள்ள வேண்டியது. புஞ்சையில் விதை தெளிக்க நவம்பர், டிசம்பர் தகுந்தகாலம். நஞ்சையிலும் தோட்டக் காலிலும் நெல் அறுவடை யானவுடன் ஜனவரி, பிப்ரவரியில் தெளிப்பது நல்லது. எள்ளு பூக்கிறகாலம் மழைகாலமா யிருப்பது கூடாது.

**பாசனம் :—**

மழையில்லாத பட்சத்தில் இரண்டு தடவை பாசனம் கொடுத்தால் போதுமானது. அறுப்புக்கு 15, 20 நாள் முந்தி பாசனமும் கூடாது மழையும் கூடாது.

**பின்செய் நேர்த்தி :—**

தெளித்து 3 வாரத்துக் கெல்லாம் மாடுகட்டி பயிர் அடிக்கவேண்டும். எவ்வளவுக் கெவ்வளவு மாடுகட்டி பயிரடிக்கப் படுகிறதோ, அதாவது கொத்திகளை யிடுங்கப்படுகிறதோ அவ்வளவுக்கவ்வளவு எண்ணெய்



## 64 எண்ணெய்விதைப் பாரீர்கள்.

ஜாஸ்திகாணும். இரண்டு தடவைக்குக் குவையால்  
கொத்திக் களைபிடுங்க வேண்டும்.

வயது :

இது நாலு மாதத்தியப் பாரீர். டிசம்பரில் தெளித்  
தால் ஏப்ரல் அறுவடை செய்யலாம்.

அறுப்பு :

பாரீர் முத்தினவுடன் ஒரே தடவையால் அறுத்துக்  
கட்டி ஒர்டுக்கில் கொஞ்ச மளைக்குச் சேகரித்து  
வைத்து, கொஞ்சம் அவிந்தவுடன் வெயிலில் பாரீர்க்  
காய வைக்கப்படுகிறது. அப்போது காய்சள் வெடிக்  
கும். தடிக்கமால் காய்ந்த பாரீரை அடித்தால் எள்ளு  
கீழே விழுந்துவிடும். அறுவடை காலத்தில் மலத்  
பெய்தால் விதை சேதப்படும். ஆகையால் மலையில்  
அடிபடாமல் எள்ளைச் சேகரிக்க வேண்டும்.

கண்டுழதல் :

ஏகரா ஒன்றுக்கு சுமார் 500 பவுண்டு ஜாஸ்திகண்  
டுமுதல். அதாவது சுமார் 200 பட்டணம்படி. சரா  
சரிக் கண்டுமுதல் 100 பட்டணம் படியால் வைத்துக்  
கொள்ளலாம். 100-பவுண்டு எள்ளுக்கு சுமார் 50  
பவுண்டு எண்ணெய் காணும்.

பிரயோகனம் :

எள்ளுப் பிண்ணுக்கு மாடுகளுக்கு நல்ல புஷ்டி  
கொடுக்கக் கூடிய உணவு. நல்லெண்ணெய் உணவுக்  
கும், இயந்திரங்களுக்கு வழவழப்பு கொடுக்கப் பூச  
வும், உடம்பு தேய்த்து குளிப்பதற்கும் பிரயோ  
ஜனப்படுகிறது.



சுலப்புப்பயிர்


இதைத் தனிமையிலேயும் அவுரி, கம்பு முதலிய பயிர்களிடமிடம் கலந்து சாதுபடி செய்யப்படுகின்றது.

செலவுப்பாக வரும்படி :—

ஒரு ரூபாக்கு சுமார் 15 பவுண்டுகள் எள்ளு கிடைக்கும். ஏகர் 1க்கு மொத்த வருமானம் சுமார் ரூபாய் 300. செலவு சுமார் ரூபாய் 10 போனால், பாக்கி சுமார் ரூபாய் 200-க்குமா. சராசரியில் ரூபாய் 15 கிடைக்கும்.



வேர்க்கடவா அல்லது  
நிலக்கடவா.



வேர்க்கடலை அல்லது நிலக்கடலை.



## வேர்க்கடலை அல்லது நிலக்கடலை 67

**பயிர்செய்வம் :**

இது ஒரு கைலவிதைப்பயிர். இது சுண்ணாம்புத் தீனி. இப்பயிரின் பூ உதித்த பிற்பாடு காயானது பூபிரியில் வைக்கப்படுகிறதால் மணிலாக்கொட்டை போன்றது, வேர்க்கடலை யென்றும், நிலக்கடலை யென்றும் வெள்ளையது பெயர் உண்டு. இதைப் புஞ்சைப்பயி ராகவும், நீதாப் பயிராகவும் சாகுபடி செய்யலாம். **மாதிரிகள் :**

இதிலுள்ள வேர்க்கடலை யென்றும், மொரீசுக்கடலை என் றும் இரண்டு கிணுக்கள் வழங்கி வருகின்றன. நாட் டுக்கடலையில் எண்ணெய் மட்டாயா, மொரீசுக்கடலை யில் எண்ணெய் ஜாஸ்தியாயும் காண்கிறதாம். எந்த மாதிரி 100 பவுண்டு ஓடு எடுத்த விதைக்கு சுமார் 50 பவுண்டு எண்ணெய் கொடுக்கிறதோ அதுதான் முதல் தரம்.

**தகுந்த பூமிகள் :**

சுக்கான சம்பந்தமுள்ள பாண்ட சாரிலும் தான் சர்வ சிலாககியம். இவ்வித பூமி சாம்பல்வர்ணமுள்ள தாயிருக்குமா. கரத்தை உன்றும் கிரகித்து அடக்கி வைத்துக்கொள்ளும். செவ்வல் நிலங்களிலும், படு கை மண்களிலும் கிராம நத்தங்களிலும் வரும்—களி யில் ஜாஸ்திகண்டுமுதல் கொடுத்தாலும் கூட, அறுவ டை காலத்தில் சேகரிப்பதற்கு மண் பொலபொலப் பில்லாமல் பிசுபிசுப்பு ஜாஸ்தியாயிருக்குமாதலால், கடலையைக் கொத்திச் சேகரிக்க நிரம்ப செலவு பிடிக் கும். ஆதலால் களி நிலமும் நஞ்சை நிலமும் பிசு



## 68 எண்ணெய்விதைப் பயிர்கள்.

யோசனமில்லை. சாதாரணமாய் மணல் சாநிலங்களில் பயிர் செய்யலாம்.

செய்நேர்த்தி :—

புஞ்சைப்பயிராகச் சாகுபடிசெய்தால் மே, சூன் மாதங்களில் கோடை மழையில் பூமி உழப்படுகிறது; மழை இல்லாத பட்சத்தில் சூலை மாதத்தில் உழப்படுகிறது. தோட்டச்சாகுபடியானால் ஆகஸ்டி மாதம் 15வ வரையில் உழப்பட்டு வருகின்றன. சீமைக்கலப்பையை உபயோகித்தால் அதற்குப்பின் புல், வேர், முதலியவைகளை அப்புறப்படுத்த வேல்வா என்னும் கருவியை உபயோகிக்கவேண்டும். மே, சூனில், உழுது கம்பைத் தெளித்தால் சூலையில் கம்பைக் கொத்தி விடும்படியிருக்கும். அப்போதுசிறகுழிகள் உண்டாக்கி கடலையைப்போட்டு மண்ணால் மூடி விடலாம். எவ்வளவுக்கு எவ்வளவு பூமி உழவு, செய்கிறதாயாகிறதோ அவ்வளவுக்கு நல்லது. மொத்தம் 6 உழவுக்கு கம்மிப்படக்கூடாது.

தகுந்த உரம்:—

புஞ்சையில் குளத்துப் பொருக்குகளையும், தோட்டக்காவில் சாணம், கத்தத்துக்குப்பை, சாம்பல் முதலியவைகளால் உரப்படுத்தப்படுகின்றது. ஆனால் அவுரிமுதலிய பசுமை எருக்களை உண்டாக்கி பூமியில் உழுது மடிக்கச் செய்து பிறகு ஏகர் 1க்கு 500 பட்டணம்படி சுண்ணாம்பு நீற்றுடன் மண்ணைப்புறட்டி கலப்பித்து விடுவதோடு 300 பவுண்டு கடலைப் பிண்ணாக்கையும் 2 வண்டி சாம்பலும், ஒரு வண்டி மாட்டுக்



## வேர்க்கடலை அல்லது நிலக்கடலை 69

கொட்டில் எருவும் உரம் கொடுத்தால் முதல் தரலாப மடை வதில் சந்தேகமில்லை.

**விதைப்பு, விதையின் அளவு:—**

புஞ்சை நிலங்களில் ஏக்கர் 1க்கு சுமார் 70 பவுண்டு விதை விழிக்கும். தோட்டத்தில் ஏக்கர் 1க்கு 60 முதல் 80 பவுண்டு வரையில் விதைசெல்லும். அதாவது சுமார் 27 பட்டாணமாய் ஒடு எடுத்த விதை செல்லும் வரிசையில் விதைகளை 6 அங்குலத்துக்கு ஒருதரம் புதைக்க வேண்டும். ஒரு வரிசைக்கும் மற்றொருவரிசைக்கும் சுமார் 3 அடி வித்தியாசமிருக்கவேண்டும். ஒரு படைச்சாலில் விதைகளைப் போட்டுக் கொண்டு மேயானை அடுத்த படைச்சால் மண்ணால் இந்தப்படைச்சால் மூடாபடுகிறது. கடலை விதைக்க ஓட்டை உடைத்த பிறகு, உள்ளே இருக்கும் கடலைகள் பூமியில் போடாபடுமேபோது அவைகளின் மேலுள்ள சிகப்புத் தோளிகள் நீங்காமலிருக்கவேண்டும்.

**காலம்:—**

புஞ்சையில் சூன், சூலையிலும், தோட்டத்தில் சூலை ஆகஸ்ட் மீது விதை தெளிக்கத்தகுந்த காலம்.

**பாசனம்:—**

மழை மோசம் செய்தால் மொத்தம் விதைதெளி காலம் முதல் அறுவடைகாலம் வரையில் 8 முதல் 10 வரையில் நீர் பாய்ச்சவேண்டியிருக்கும். கீழ்காற்று மழை ஒத்துக்கொள்ளும்பட்சத்தில் தண்ணீர் பாய்ச்ச வேண்டிய தில்லை.



**பின்செய்நேர்த்தி:—**

விதை தெளித்த ஒரு மாதத்துக்கெல்லாம் பூமியைக்கொத்தி களைபிடுங்கவேண்டும். இதற்கு 1 அல்லது 2 மாதத்துக்கெல்லாம் இன்னும் ஒரு தடவை கொத்திக் களை பிடுங்கவேண்டும். இக்காலங்களில் பயிரில் ஏதாவது பூச்சி புழு, இருந்தால் சுண்ணாம்பு நீற்றை சாம்பலுடன் கலந்து பயிரில் தெளிப்பது திறம். இந்த சுண்ணாம்பு நீறு பூச்சி, புழுவைத் தொலைப்பதன்னியில், கடலைச் சுண்ணாம்புத்தீனிமானதால், அதற்கு உரமாகவுமாகிறது. இக்காலத்தில் பயிர்பரவ ஆரம்பிக்கும். இப்படி பரவாமல் பூமியில் அழுந்தக்காலால் அழுத்தவேண்டும். பூஷணி சொர்க்காயை பயிருடன் தெளித்து விட்டால் அவைகள் பரிரைப்பரவ விடாது. இப்படி அழுத்தினால் கான் எல்லாக்கொட்டையும் பூமிக்குள் உண்டாகும்.

**வயகு:—**

இது 6 மாதத்துப்பயிர். காலா சரியாக ஒத்துக்கொண்டால் சில பாகம் கடலை, 4வது மாதத்திலும் சில பாகம் 1வது மாதத்திலும் இன்னொரு பாகம் 6வது மாதத்திலும் பழுக்கும்.

**அறுப்பு, கண்டுழநல்:—**

அறுவடைகாலத்தில் ஒரு மழைபெய்தால் பரிசை அப்படியே பிடுங்கிவிடலாம். இல்லாத பட்சத்தில் தாட்களையெல்லாம் அறுத்து அப்புறப்படுத்தி பூமியை கொத்தி அல்லது மண்வேட்டிக் கலப்பையால் உழுது கடலையைச் சேகாம் செய்கிறார்கள். இதற்கு



## வேர்க்கடலை அல்லது நிலக்கடலை. 71

பதிலாக மழை சாத்தைக்கொண்டு சீமைகலப்பை யால் சேகரம் செய்வது சிறப்பாகவுள்ளது. புஞ்சையில் ஏகர் 1க்கு 1000 முதல் சுமார் 1200 பட்டணம்படி வரையில் கடலைக்கொண்டு முதல் கிடைக்கும். மேதாட்டக்காலில் ஓரளவு கணித முதல் சுமார் 5000 பட்டணம்படி வரையில் காணுகிறதாம். சராசரிக் கண்டு முதல் சுமார் 2500 பட்டணம்படி. மட்டமான கண்டு முதல் 1000 பட்டணம்படியாம். புஞ்சையில் சாகுபடிச் செய்வல்லாமல் மேலாக ஏகர் 1க்கு சுமார் ரூபாய் 200, மேதாட்டக்காலில் சுமார் ரூபாய் 50ம் கிடைக்கும். தாளில் சுமார் ஆள் தூக்குப்படியான கட்டு 20க்குக் குறையாது.

**தீவனம் :—**

கடலையின் தாள் ஆகி மாடுகளுக்கு நல்ல தீனி. தாள்களை காயவைத்துப் போர்சிபாட்டு விட்டால் மாரி காலத்தில் குதிரைகளுக்கும் மாடுகளுக்கும் நல்ல தீனியாகிவிடும்.

**கலப்புப்பயிர் :—**

கடலை, புஞ்சையில் கம்போமும் சிலவேளை தினை யோடும், வரகோமும் கலந்துபயிர் செய்யப்படுகின்றது. **கைத்தொழில் :—**

மோரீசுக்கடலையில் 100க்கு சுமார் 45 பாகம் எண்ணெய் கிடைக்கிறதாம். இந்த எண்ணெய் சோப்பு செய்ய அதிக சிலாக்கியமாக கொள்ளப்படுவதால் அன்னிய நாட்டுக்கு ஏராளமாய் ஏற்றுமதி செய்யப்படுகிறது. பருத்தி எண்ணெய், ஆலிவ் எண்ணெய்,



## எண்ணெய்விதைப் பயிர்கள்.


தேங்காய் எண்ணெய் முதனியவைகளைப் பார்க்கிலும்  
இந்த எண்ணெய் சோயா, பொழுதுவத்தி செய்ய நிரம்  
ப சிலாக்கியமாம். கடலைப்பிண்ணாக்கு மாட்டுத்தீவ  
னத்துக்குர், உரத்துக்குர் உபயோகப்படுமும். கடலை  
எண்ணெயை இதர எண்ணெய்களைவிட கலந்து மோச  
டியாய் விற்கக்கூடாது. கடலை எண்ணெய்க்கு அதிக  
வாசனை இல்லாததினால் இதர எண்ணெய்களைவிட கலந்  
தால் இதன் குணம் நன்றும்புத்தெரியவராது.

---



தென்வரை.

— 10 —



தென்னை



டி உலர்ப்போட்டு வி வேண்டியது. நன்றும் உலர்ந்த பிற்பாடு ஒருபடி உப்புடன் சப்பாத்திக்கள்ளி, அதன் வேர்மண், சாணம் முதலிய எருக்களால் பாதிக்குழிபை கிரப்பி வைக்கவேண்டும். குழி + னே ஒரு மாதத்திற்குக்குறையாமல் உலர்ப்போட்டு வைக்கவேண்டும். இளம் பிள்ளைபை கறைபான் அரிக்காமல் இருப்பதற்காக ஒரு சிறு கூடை மாச்சாமல் ஒவ்வொரு குழிக்கும் போடுவது நல்லது.

**நாற்றங்கால், நடவு முதலியன :**

200 சதுரடியுள்ள மணற்பாங்கு மீட்டி பூமியில் நன்றும் 3 அடி ஆழம் கொடுத்தி அடி 3-4 ஒரு சென்று வீதம் முகம் கொஞ்சம் வெளியே தெரியுபடியிடைத்து ஜலம் விட்டுக்கொண்டே வரவேண்டுக. சுமார் 6 மாதத்தில் குருத்து கிளம்பலாம். சென்றை கிணற்று ஜலத்தில் போட்டு வைத்திருந்தாலும் 6 மாதத்தில் முளை கிளம்பும். சென்றுக்கு உதிர்த்த சென்று மரையாசனமில்லை. நல்ல வயதான மாத்திலுள்ள நல்ல சென்றை ஜாக்கிரதையாக எடுத்து சுமார் 6 மாதம் காப்பாற்றி வைத்திருந்து இளநீர் சுண்டிப்போவதற்கு முந்தி புதைத்து விடவேண்டும். குருத்து கிளம்பி 6 மாதத்துக்கெல்லாம் தயார்செய்திருக்கப்பட்ட குழியில் பிடுங்கி நட்டுவிடவேண்டும். 15 அடிக்கு ஒரு குழி இருக்கும்பட்சத்தில் ஏகர் 1க்கு நட 200 பிள்ளை செல்லும்.



பிள்ளைகள் 20 அடிக்கு ஒன்று வைப்பதுதான் திறம். நெருக்கவைத்தால் மயம் கொணிப்போய் காய்ப்பு அதிகமாகக் காய்க்காது. சாதாரணமாய் 2 வருஷத்து பிள்ளைகளை குழியில் நமிகிறார்களாம். இப்படி கட்டவுடன் பிள்ளையை வெய்யினில் படாமல் சூடிவைக்கவேண்டும். சில இடங்களில் 5 வருஷமான பிள்ளைகளையும், சில இடங்களில் 5 வருஷமான பிள்ளைகளையும் மறுபடி நமிகிறார்களாம். இப்படிச் செய்வதால் காய்ப்பு லூஸ் திபாக் மதாம்.

காலம் :

தென்னாடு பிள்ளைவைப்பதற்கு மழைகாலம் தான் திறம். அதாவது செப்டம்பர், அக்டோபர்.

பாசனம் :—

இளம்பிள்ளையை கட்டப் பிற்பாடு 5 வருஷம் வரையில் தண்ணீர் பாய்ச்சிக் கொண்டேவரவேண்டும். கட்டவுடன் 2 தினத்துக்கு ஒரு தண்ணீரும் வீவர் நன்றும்பி பிடித்து ஊன்றிப் போனவுடன் வாரத்துக்கு ஒரு தண்ணீருக்குக் குறைமாயல் பாய்ச்சி வரவேண்டும். 5 வருஷத்துக்குப் பிற்பாடு பாசனம் வேண்டியது வேண்டாது. குழியின் சுபாவத்தைப் பொருத்ததாயிருக்கிறது.

கலப்புப்பயிர் :—

கட்டுப்பயிர் ஊன்றிய பிற்பாடு, இடைவேளியில் முதல் 2-3 வருஷத்தில் கட்டை இஞ்சி, வெங்காயம், கர்பு, கேழ்வரகு, வாழை, கரும்பு முதலிய பயிர்கள்



## 78 எண்ணெய்விதைப் பயிர்கள்.

சாகுபடி செய்யலாம். இப்படிச் செந்தால் பூரி அடிக்கடி கிளறப்பட்டு நல்ல விளைத்திலிருக்கும்.

**பிளேய்நேர்த்தி :-**

பயிர்வளருகையில் அடிக்கடி பூரி வயக்கொத்த பயி ருக்கு உரம் அணைத்து வரவேண்டும். 5 வருஷத்துக் குயிற்பாடு மழைகாலத்தில் தென்னைப்பாசசுற்றி 4 அடி வெட்டிக்கொத்தி வேகளைக்களைத்து சாயல், சாணம், தேநீர் சிவந்து வரு, சாயத்திக்கள்ளி. உப்பு, முதலிய வருவாய் பண்ணுது. இவ்வாறு மாத்தின் அடியில் அணைத்து மரத்தைச்சுற்றி மலபுஜலம் வெளியில் போகாமல் வார்ப்பு கட்டி விட வேண்டியது.

**வயது :-**

தென்னை சாதாரணமாய் 70 வருஷத்துக்கு மேற்பட்டால் தலைமாறிவிடுமென்று சொல்லுகிறார்கள். 50 வயதான மரத்தை நல்ல முதிர்ந்த மரமென்று சொல்லலாம். தென்னைக்கு வயது சுமார் 100 வருஷம்.

**கண்டுழதல் :-**

சாதாரணமாய் 7 வருஷத்திலே காயக்க ஆரம்பிக்கும். செய்கோர்த்தியில் கவனக்குறைவிருந்தால் சில சமயம் 7வது வருஷத்திலும் காயக்க ஆரம்பிக்கும். வருஷத்துக்கு ஒரு மரத்துக்கு சுமார் 10 குலை கிடைக்கும். குலைக்கு சராசரி 10 காய்க்குக்குறையாகு. சராசரி வருஷம் 1க்குமாய் 1க்கு ரூபாய் 1 கிடைக்கும். தென்னைச்சாகுபடியில் போட்ட முதலுக்கு, எல்லாம் உண்டாகொண்டால், வருஷம் 1க்கு ரூபாய் 100க்கு



ரூபாய் 24 வட்டிகிடைக்கலாம். தேங்காய் மட்டையி  
லிருந்து 30 எடுக்கலாம். 50 காய் மட்டையிலிருந்து  
சுமார் 60 பவுண்டி காய்கிடைக்கும். ஒரு மாதத்திலிருந்  
து வரும் தேங்காய்ப்பண்ணை காய் சுமார் அரை 2½ விலை  
பொதுமயப் பானை வைத்து 1 மாதத்துக்கெல்லாம்  
விவ்வுதிகா காரின காய்கள் சாவசிலாக்கியம். அதி  
க இளங்காய் காரும் முத்தாத காய்காரும் அவ்வளவு  
தரமல்ல 100 பவுண்டி தேங்காய்ப் பருப்புக்கு சுமார்  
சுமார் 40 பவுண்டி எண்ணெய்கிடைக்கலாம்.

கைத்தொழில்

தென்னேயப்பாளையிலிருந்து கள் இறக்கலாம். இந்தக்  
களளிலிருந்து 100 காய் இறக்கிறார்கள். சுண்ணாம்பு  
கடவாணி கலாத்தல் பாதணி இறக்கலாம். இந்தப்பாதணி  
யிலிருந்து வெள்ளா காய்ச்சலாம். தேங்காய் எண்ணெ  
யிலிருந்து சீசாயம், மெழுகுவத்தியும் செய்யலாம்.  
தேங்காய் எண்ணெய் கோப்பு உப்பு ஜலத்துக்கு பிர  
யோசன மெய்யாழிய கல்ல ஜலத்துக்கு உபயோகமில்  
லை. தென்னேமாம் கட்டிடத்துக்கு தூண், உத்திரம்,  
கைமரம் இதுகளுக்கு உபயோகப்படும். தேங்காய்  
காரிலிருந்து வாடங்களும், மீமைஜப்பாய்களும், கூடை  
களும், அரைக்க தினுசு கயிறுகளும், விரிப்புகளும்,  
தூடப்பங்களும் பண்ணலாம். தேங்காய்ப் பிண்ணைக்  
கு கறவைமாடுகளுக்குக் கொடுக்கலாம். தென்னேலை  
மட்டையிலிருந்து ஒருவீத கார் எடுக்கலாம். தேங்காய்  
எண்ணெய் புசிக்கவும், குளிக்கவும், உபயோகப்படுகி



## 80 எண்ணெய்விதைப் பயிர்கள்.

றது மட்டையை கீத்து விரியலாகட்டின்னி கூரைக்கு  
உபயோகிக்க முடிகுள்.


வண்டு தேயிலைத்தல் :-

வண்டினால் ஏதாவது மரத்துக்கு தேயிலை ஏற்  
பட்டால் அந்த வண்டை குத்தி எடுத்துவிட வேண்டும்.



குசம்பாப் பயிர் அல்லது செந்  
துருக்கை.

101



குசம்பாப் பயிர் அல்லது செந்துருக்கை.



**பயிரின் சுபாவம் :—**

இது ஒரு தைல விதைப்பயிர். சாயப்பிராகவும் கொள்ளலாம். இது வேஸ்ப்பிராகவும் உதவுகிறது. நமது இராஜதானியில் வா ஜில்லாக்களில் சாயப்பயிராகவும் தைலவிதைப்பிராகவும் சாகுபடி செய்கிறார்கள். இது முட்செடி யாதலால் தானியப்பயிர்களுக்கு வேஸ்பாக உதவுப்படி பிராசெய்வது நன்று. மைசூர பிராகதியத்திலும் சாகுபடி செய்யப்படுகிறது.

**மாதிரிகள் :—**

இதில் 2 மாதிரி ; ஒன்று முட் செடியாகவும், மற்றொன்று முள்ளிலலாத தாகவுமிருக்கும். முட் செடி எண்ணெய்க்கும், முள்ளிலலாத செடி எண்ணெய்க்கும் சாயத்துக்கும், சாகுபடி செய்யப்படுகிறதாம். முள்ளிலலாத செடியின் இலைதான் கறக்கு உபயோகப்படுத்தப்படுகிறது.

**தஞ்சை பூமிகள் :—**

இது கரிசல் காட்டில் சாகுபடி செய்யப்படுகிறது. இது மணலும், களியும், சமமந்தமுள்ள பூமியில் வளரூய் வரும். மணல் சாரி பிரமோஜனமில்லை. அநேக மாய் எல்லா பூமியிலும் வந்தாலுங் கூட பாசன முள்ள பூமியில்தான் விசேஷமாய்ச்சாகுபடி செய்யப்படுகிறது. **செய் நேர்த்தி :—**

ஆறு உழவுக்குக் குறையாமல் உழவேண்டும். செப்டெம்பர், அக்டோபரில் உழுது, 1½ அடிக்கு ஒரு தரம் வரிசைவரிசையாக ஏகர் 1க்கு சுமார் 18 பவுண்ட் விதை தெளித்து விடவேண்டும். சோளம், கோது



## குசும்பாப் பயிர் அல்லது செந்துருக்கை. 83

மை, ௨ ருளைக்கிழங்கு, கொத்துக்கடலை முதலிய பயிர் களைநடு கலந்து பயிரிடப்பட்டால் இவ்வளவு விதை வேண்டியதில்லை. தனிமையில் பயிர் செய்தால் சுமார் 10 செர் விதை வேண்டுமானது. நான்கு கரையிலும் வேளியாயிராகச் சாதுபடி செய்தால் சுமார் 5 செர் விதை வேண்டும். இப்படி கலந்து பயிரிடும்போது சிறு கண்ணிக்கரைகளில் தெளிப்பது வழக்கம்.

காலம் :

செப்டெம்பர், அக்டோபர் மாதம் விதை தெளிக்க கல்ல தகுந்த காலம். இளம்பயிராக இருக்கையில் மழை பெய்வது நலம். பூக்கும்போது மழைபெய்வது கெடுதல்.

பிள செய் நேர்த்தி :

ஒரு செடிக்கும் மற்றொரு செடிக்கும் ஒரு முழவித் தியாசமிருக்க வேண்டும். இப்படிக்கு அன்னியில் நெருக்கத் தெளித்தால் நெருக்கமாயுள்ள பயிர்களைப் பிடுங்கி விட வேண்டும். கைத்தெளியா லுண்டாகும் பயிருக்கு இப்படி செய்ய வேண்டியிருக்கும். பூக்க ஆரம்பிக்கையில் நுனி மொட்டுகளைக் கிள்ளி எறிந்து விட வேண்டும். இப்படி கிள்ளி எறிந்தால் பக்கங்களில் முளை கிளம்பிப் பயிர் பரட்டையாக வளரும். இரண்டு தரம் கொத்திக் களை பிடுங்குவது திறம்.

வயது :—

இது நாலுமாதத்துப் பயிர். செப்டெம்பரில் எரித்தால் ஜெனவரியில் அறுவடை செய்யலாம்.



## 84 எண்ணெய்விதைப் பயிர்கள்.

**அறுப்பு கண்டுழநல்:—**

சாயத்துக்காக பூக்களைக் காலையில் பறிக்கவேண்டாம். அதிகவெய்யிலில் பறித்தால் அதிக சாயாராகு. மூன்று நாளைக்கு ஒருதரம் பூக்களை வெயிலுக்கு முந்தையாக அறுத்து ஜாக்கிரதையாகப் பயிரைப் பாதுகாத்தால், மூன்று காலங்களில் பூக்களைப் பறிக்கலாம். பூக்கள் ஒருநாளைக்குக்காயவைக்கப்பட்டு நல்லெண்ணெயால் சாயப்படுகின்றன. 1-பவுண்டு புஷ்பத்துக்கு 1 1/2 கால்காயை எண்ணெய்ப்பிசுத்தப்பிடிக்குமா. பிறகு காயவைத்துப் புஷ்பங்கள் தூளாக்கப்படுகின்றன. ஏகா 1க்கு காயை 40-45 80 பவுண்டு புஷ்பமாகிடைக்குமா. பூவிக்காயால் விதை எடுக்கும் பாட்சத்தில் ஏகா 1க்கு காயை 600 பவுண்டுகேந்துருக்கை விதை காணும். ஜிண்டி காயை முதல் 1000-ம் பவுண்டு. விதை சாய்சரியில் புஷ்பத்துக்கு 8பங்து கூட இருக்கும். 100-பவுண்டு விதைக்கு காயை 30-பவுண்டு எண்ணெய்கிடைக்கும். ஏகா 1க்கு சாய்படிச்செலவு சுமார் ரூபாய் 12-ம் முன்காலத்தில் மொத்த வரும்படி சுமார் ரூபாய் 25-ம் செலவெல்லாம் போக சுமார் ரூபாய் 13 கிடைத்துக்கொண்டிருந்தது. இப்போது அன்னிய நாட்டுப்போட்டியால் இன்னொட்டு சாயங்களுக்கு மகிமை இறங்கியிருக்கிற படியால் இப்போது மொத்த வருமானம் ரூபாய் 15 தான். ஆகையால் இப்போது செலவெல்லாம் போக ஏகா 1க்கு ரூபாய் 3-4 தான் கிடைக்கும். எண்ணெய்க்காகச் சாகுபடி செய்தால் ஏகா 1க்கு செலவெல்லாம் போக ரூபாய் 10 தான் கிடைக்கும்.



## குசம்பாப் பயிர் அல்லது செந்துருக்கை 85

கைத் தொழில் பிரயோகனம்:

குசம்பா எண்ணெய் விளக்கு எரிக்கவும், கவலை களுக்கும் கடவவும், கலியாணகாலங்களில் பட்சணம் செய்யவும் பிரயோகப்படுத்தப் படுகிறது. எலிகள் இந்த எண்ணெயைத் தொடாதாம். குசம்பா பிண்ணாக்கு மாட்டுத்தீனிக்கு சிலாக்கியமல்ல. ஆனால் உரத்துக்கு சிரப்பதற்கும், கால்தாமணிநீராம் எண்ணெயை மெதுவாகக் காய்ச்சினால், அவ்வெண்ணெய் தடவப்பட்டு துணி ஜலத்தில் களைவாதாம்.

குசம்பாப் புஷ்பத்திலிருந்து சாயம் எடுக்கும் விதம்:—

குசுக்களைக் கொத்து, காயப்போட்டு, தூளாக்கிக் கோணியினாயில் கட்டி ஒருதொட்டியில் போட்டு அதன் மேல், சலா ஒப்படி பண்ணி பையை அடிக் கவாவது, மிதிக்கவாவது, வேண்டியது. இப்படிப் பண்ணினால் அசுத்தங்களை வாரம் வெளியில் போய் விடும். தொட்டியிலிருந்து சலம் சுத்தமாய்ப் போகிற வரையில் கழுவி சுத்தம் செய்யவேண்டும். சலம் சுத்தமானதாக இருக்க வேண்டும். சலம் காரமுள்ளதாக இருக்கும் பட்சத்தில் சாயத்தைக் கரைத்து விடும். ஆகையால் சாயத்தைக் கரைக்காமலிருக்கிற தற்காக சுத்த சலமாக இருக்க வேண்டும். இப்போது கோணியில் பூக்கள் சதையாகவும், சொனையாகவு மிருக்கும். இதுகளை அரம்போக நன்றாய்ப் பிழிந்து சிறு சிறு கட்டியாக செய்யப் படுகின்றன. இந்தக் கட்டி களைக் காயவைத்துக் குசம்பாச் சாயமென்று விலைக்கு விற்கிறார்கள்.



## 86      எண்ணெய்விதைப் பயிர்கள்.


சூசம்பாச்சாயம்பருத்திநூல், பட்டு, கம்பளித்துணி,  
முதலிய வைகளுக்குச் செகப்புச்சாயம் ஏற்ற உப  
யோகப் படுகின்றது. அநேகவித அளவுகூத்  
தகுந்தபடி அநேகவித ரெங்குகள் உண்டாகின்றன.

---



# ஆளி விதை.

— 10 —



ஆளிவிதைப் பயிர்.



## 88 எண்ணெய்விதைப் பயிர்கள்.

**பயிரின் சுபாவம்:—**

இதை ஒருதலை விதைப் பயிராகவும், கார்வகைப் பயிராகவும் கொள்ளலாம். ஆனால் உமது இராஜதானியின் வாடஜில்லாக்களில், விதைக்கும், எண்ணெய்க்கு மாத்திரந்தான் சாகுபடி செய்யப் படுகிறதே ஒழிய, நாருக்காகச் சாகுபடி செய்யப்படுவதில்லை. நல்ல சீதோஷ்ண மிருந்து சரியாய்ச் சாகுபடி செய்தால் நாரும், விதையும், உண்டாக்கலாம்.

**பூம் :**

நல்ல வடிகால வசதியுள்ள பூமிபாகவும், பருத்திப் பயிரிடும் கரிசல் காட்டிலும், நல்ல களி நிலத்திலும் சாகுபடி செய்யலாம்.

**சாகுபடி, சேய்நேர்த்தி முதலியன :**

இது கோதுமைவயல்களுக்கு சுற்றிலுய்க்கைகளில் போடுவதுண்டு. சோளத்தோடும், கொத்துக் கடலை யோடும், வரிசை வரிசையாக தெளிப்பது உண்டு, தனிமையிலும் சாகுபடி செய்வதுண்டு. சுமார் 3-4 தடவை உழுது, ஏகரா 1க்கு சுமார் 12-பவுண்டு வீதம் அக்டோபர், நவம்பரில் தெளித்து, பிப்ரவரியில் பயிர் முதிர்ந்தவுடன் அறுத்து காய்களை தடிக்கப்பால் அடித்து விதைஎடுப்பது வழக்கம்.

**கண்டுமுதல், கைத்தொழில், முதலியன :—**

ஏகரா 1க்கு சராசரியில் சுமார் 500-பவுண்டு விதை காணும். விதையில் 100 க்கு 25 வீதம் எண்ணெய் கிடைக்கும். இதின் பிண்ணாக்கு மாட்டுத்தீனி ஆகிறது. இந்த எண்ணெயை காற்றோட்ட மாயிருக்கும் ஏதி



எவது தடவினால் சீக்கிரம் காய்ந்து பளபளப்பாய் விடுமாதலால், இதை மீனுக்கு எண்ணெயாகக் கொள்ளுவர், வர்ணங்கள் கலக்கவும், பிரயோசனப்படுகிறது. இதன் பண்ணாறுக்குத்தானே சிறங்குகளுக்கு மாவாகக் கட்டுவது வழக்கம். சரிக்குச்சரி, இந்த எண்ணெயையும், சுண்ணாம்பு தெளிவு ஜலத்தையும் கலந்தால், (carroll oil) காரன் எண்ணெய் என்ற எண்ணெயாகி ஆகை பண்ணாறுக்கு உபயோகப்படுத்திவது வழக்கம். நர்ப்பாயர்.

அதிக உஷ்ணமில்லாத நீசங்களில் நாருக்காக பயிர் செய்யப்படுகிறது. கமது நாட்டில் உஷ்ணம் ஜாத்தியானதால் கார் ழரிந்து போய்விடும். ஆகை மால் நாருக்காக பயிர் செய்யும் பட்சத்தில் சீதோஷ்ணம் ஒரே நிலைமையாக இருக்கவேண்டும். அதிக வாட்சியம் கூடாது. அதிக சீதளமும் கூடாது. பயிரை அறுவடை செய்யும் காலத்தில் மழை கூடாது. பூமி நல்ல செய்மேகத்தியாக இருக்கவேண்டும். இதற்கு முந்தி சாகுபடி செய்யும் பயிருக்கு உரம் அடிக்க வேண்டும். இதற்கு மேலாக உரம் அடித்தால் அதிக கிளைகள் உண்டாகும். அப்போது நீளமான கார் கிடைக்காது. விதைகளை நிரப்ப நெருக்கடியாக தெளிக்கவேண்டும் அப்போதுதான் ஒழுங்கான தண்டிகள் கிடைக்கும். ஏகர் 1க்கு சுமார் 100 பவுண்டி விதை தெளிக்கவேண்டும். அஃதாவது சுமார் 35 பட்டணம்படியாம். இப்படி நெருக்கமாகத் தெளித்



தால் கிளைகள் விடாமல் தண்டிகள் ஒழுங்காய் வளர்ந்து நீளமான நாரும் கிடைக்கும் தண்டை வெட்டி பனியில் போட்டாவது. அல்லது ஜலத்தில் ஈரப்போட்டாவது அழுகவைத்து நார் உரியது வழக்கம். ஆளி விதைப் பயிரின் சணல் நார், துணிகள் நெய்யவும், உதவுகிறது. இந்நார் உரோமங்கட்டினாகலக்கப்படுகிறது. பெஸ்லீயார் தேசத்துத் துணிகளை வலம் இந்நாரால்தான் உண்டாக்கப்படுகின்றன.



நார்வகைப் பயிர்கள்.

பருத்தி.

— 10 —



பருத்திப் பயிர்.



**பயிரின் கபலம் :—**


இது நார்வகைப் பயிரில் நிரம்ப முகையானது. ஊனுக்குப்பின், உடை முக்கியமாகலை. உடைகளுக்காகப் பயிரிடும் பயிர்களில், பருத்தி, நால் நிரம்ப வில்ல சரசமானதலை. பருத்தி நால் உடைவை அதிகமாகத் தரித்தப் பதிவதால், இப்பயிரை சாகுபடியை அதிகரிக்க வேண்டியது. எல்லா நடைபயிர்களைப்போலக் குக்கிறதது. நமது இராஜதானியில் தருக்கலவேளி ஐல்லாவழண்டாகும் பருத்தி இதர ஐல்லவாக்களி, லுண்டாகுப பருத்தி வையப்பார்க்கிலும் சிலாக்கியமாகக் கொள்ளப்படுகிறது. **மாதிரிகள் :**

உப்பம் பருத்தி, கார்பன் பஞ்சு, போர்பன் பஞ்சு, கூம்பா பஞ்சு. என்று அநேகமாதிரிகளுமா அன்னிய தேசத்திலிருந்து விலைககள் வரவழைத்து வந்து காட்டு சீதோஷ்ணத்துக் தள்ளாக்கப்பட்ட இஜிபட்டு சீசசத்துப் பருத்தி, சீஜலண்ட பருத்தி, பெருவீதசத்துப் பருத்தி, போர்பன் பஞ்சுகளும், இந்தியா தேசத்து இதர மாகாணங்களிலிருந்து வரவழைக்கப்பட்ட அநேக மாதிரிகளுமிருக்கின்றன.

**தருத்த பூய்கள் :—**

கரிசல் காட்டு பூயியில்தான் பருத்தி நிரம்ப சாகுபடி செய்யப்படுகின்றன. சுக்கான் சம்பந்த முள்ள கரிசல் காடு முறுகுபதமாய் பொலபொலவென்று இருக்குமா தலால் சர்வ சிலாக்கியமாய் கொள்ளப்படுகிறது. சுக்கான் சம்மந்த மில்லாத கரிசல்நீரம்ப பிசுபிசுப்பு களியாயிருக்கு மாதலால் அவ்வளவு திறமானதல்ல.





பருத்தி நூல் இழைகள்.

நமது இராஜதானியில் செவ்வாலில் அநேக இடங்களில்  
பருத்தியை முக்கியமாய்ச் சாகுபடி செய்கிறார்கள்.



சுண்ணாம்பு நீறும் வாங்கி அடிக்கால் நீர்ப்பசியா  
பருத்திச் செடியின் தண்டை வீர்த்தசாயபலா சால்  
சிலாக்கியம். எல்லாவற்றையும் உழுவிதந்து 4 அடி  
மண்வினாடு கவர்த்து விடவேண்டும். புகாயில்  
சாகுபடி செய்தால் முகடுகளின்கீழ் வந்த கிருமியை  
செய்யவேண்டும்.

விதைக்கத் தகுந்தகாலம் : விதைப்பு மாதம் : விதையின்

அளவு, முதலியன :

செய்விடையப் மாதம் விதைத்தல் 4 அடி தகுந்தகாலம்.  
வடலில்லாசுகளில் சூலை, ஆகஸ்ட் மூலம் கொடிசுகள்  
கள். ஏகாதிக்கு 10 அல்லது 15-படிவை விதை  
செலவும். விதையில் பஞ்ச ஒட்டிக்கொண்டிருப்ப  
தால், சாணசலத்தில் விதைகளை களைத்துப் பூர்த்தி  
போட்டு, கையால் பிடிந். கையாடலால் விதை  
தெளிக்கப் படுகின்றது. வரிசை வரிசையாக உழுவு  
சாலில் விதைபயம் போட்டுக்கொண்டு போய் மூடப்  
படுகிறது. கொள்ளுவால் விதைத்தல்பயது திறம்  
முகடுகளில் 4 அடிக்கு ஒருதடவை குழிகள் தோண்டி  
குழி ஒன்றுக்கு 2 விதை வீதம் போட்டு மூடவேண்டி  
யது. விதை பொறுக்குவதில் கல்ல கவனமிருக்க  
வேண்டும். நல்லகாத்திரமாயுள்ளவும், பஞ்ச இழை  
நீளமுள்ளவும், எல்லா இழைகளின் நீளம் ஒரேதன்மை  
யுள்ளவும், இழை நேர்த்தியாயும் கொட்டை பரும  
னுள்ளவும் ஆகிய இந்த லட்சணங்களமைந்த செடி  
களின் விதைகளைப் பொறுக்கி வைக்கவேண்டும்.



பாசனம், கொத்தல், களைபிடுங்கல் :-

பருத்திப் பயிற்சூழ முளைகாணும் பருவத்தில் மட்டாய் சலம் போதும் வளரும் பருவத்தில் ஜாஸ்தி சலம் போதும் பயிர் முதிரும் காலத்தில் மழை அல்லது எவ்வகை மழைமே கால வேகமடாது. பஞ்ச இழை களமாயும் தீர்ந்தவாயும் இருக்கவேண்டுமானால் பாசனம் கட்டாமல் பருத்திச் சூழக் கொடுக்கவேண்டும். பாசனம் பண்ணிச் சாறுபடி செய்தால் இப்போது கிடைப்பதற்கு முன் மக்களுடைய பங்கு கிடைப்பதற்குச் சந்திக்கவில்லை. இது நன் மழைப் பரீட்சை பண்ணி அந்நாள் பாடி நக்கிறது. பயிர் முதிர்வதற்கு முன் மழை கிடைப்பாறால் இரண்டு மூன்று முறை சலம் பாடிச் சேவணம். வலை தெளித்து ஒருமாதமானவுடன் களைபிடுங்க கொத்திவிடவேண்டும். இன்னும் 2 தடவை, களைகள் எடுத்து மொத்தம் 3 தடவை களைகள் எடுக்கவேண்டும். வட ஜில்லாக்களில் மெட்டல குண்டகாவால் களை எடுக்கிறார்கள். பொதுவாக மாதம் ஒருகளை வீதம் மூன்றுமாதத்துக்கு மூன்று களை எடுக்கவேண்டும். பயிர் 5-6 அங்குலம் உயர்மிருக்கையில் நல்லகாத்திரமான பயிர்களை மட்டும் வைத்துக்கொண்டு பாக்கி பலவீனமான பயிர்களைப் பிடுங்கி எறிந்துவிட வேண்டும். பயிர் நல்ல வளமாய் வந்தால் நுனியைக் கிள்ளி எறிந்து விடவேண்டும். இப்படிச் செய்தால் பக்கங்களில் ஜாஸ்தி களைகள் உண்டாகிப் பரவும்.



வயக, பொறுத்தல் கண்டுழதல், முதலியன :

இது 6 மாதப்பயிர். சிலமாதரிகள் நிரந்தரமாய் பூமி யிலிருக்கும். இம்மாதரிகளுக்கு வருஷாவருஷம் சீனைக னைவெட்டி கபாத்துசெய்து, உரம் கொடுத்து, பாசனம் பண்ணிக் கொண்டுவந்தால், நல்ல பலன்கொடுக்கும். சாதாரணமாக, செப்டெம்பரில் தெளித்தால், பிப்ரவ் வரி, மார்ச்சில் பஞ்சு பொறுக்கப் படுகிறது. காய் வெடித்த வுடன் பொறுக்க ஆய்ந்தது வர வேண்டும். அவைகள் சீரேழவழமாடி வந்துவரக் கூடாது. மொத்தம் மூன்றுதரம் பொறுக்கினால் போதுமானது. ஆனால் சில இடங்களில் ஜாஸ்திக் கைவழம் பொறுக்கு கிறார்கள். முதல் முதலில் பொறுக்கப்படும பஞ்சு சர்வசிலாக்கியம். கடைசியில் பொறுக்கப்படும பஞ்சு மட்டம். ஆகையால் முதலில் பொறுக்கப்படுவதை தனியாகவும் கடைசியில் பொறுக்கப்படுவதை தனியாகவும் வைக்க வேண்டும். முதலில் பொறுக்கப்பட்ட காத் தரமாயுள்ள காய்களிலிருந்து விதைகளைப் பொறுக்கி வைப்பது திறம். பொறுக்குங் கூலி மொத்தவரும்படி யில் சுமார் 10 ல் ஒரு பாகம் பஞ்சிலேயே கொடுக்கப் படுகிறது. ஏகரா 1க்கு சராசரிக் கண்டுழதல் கூலி நீங்கலாக சுமார் 300-பவுண்டுவரையில் கொட்டை யுள்ள பஞ்சு கிடைக்கும். இதில் சுமார் 80 முதல் 100 பவுண்டு வரையில் பஞ்சும் பாக்கி கொட்டையு மிருக் கும். திருநல்வேலி, கோயம்புத்தூரில் இப்படி கிடைக் கிறது. வட ஜில்லாக்களில் இதில் பாதிதான் கிடைக்கு



மாம் பாசனம் பண்ணி, எலும்பு சத்து உரம் கொடுத்து, சொல்லி இருக்கிறபடி சாகுபடி செய்தால் சிந்து தேசத்தில்கிளைத்திருப்பதுபோல ஏகர் 1க்கு சுமார் 200 பவுண்டு பஞ்சம் 500 பவுண்டு கொட்டை முக்கனாக்கலாம். திருகெல்வெளியில் ஏகர் 1க்கு சாகுபடி செலவு சுமார் ரூபாய் 10; மொத்தவருமானம் சுமார் ரூபாய் மூன்று; செலவுகளெல்லாம் போக ரூபாய்களுக்கு மஞ்சுவது ஏகர் 1க்கு சுமார் ரூபாய் 20 தான் முக்கிகள் போட்டு, நன்றும்க் கொத்தி, மார் கொடுத்து கல்லவிறைத தெளித்துப் பாசனம் பண்ணி, சாகுபடி செய்தால் ஏகர் 1க்கு செலவெல்லாமபோக சுமார் ரூபாய் 50க்குக் குறைமாமல் சிந்து தேசத்தில்கிளைத்திருப்பதுபோல் ரூபாய் 140 வரையில் கிளைக்கலாம்.

கைத்தொழில். —

பஞ்சிலிருந்து நூல வஸ்திரங்கள் நெய்யலாம். கொட்டைபையும பஞ்சையும் லாட்டணத்தினாலாவது அல்லது எந்திரத்தினாலாவது பிரித்து, பஞ்சிலிருந்து நூல நூற்று கைத்தறியாலாவது அல்லது விசைத்தறியிலாவது வஸ்திரங்கள் நெய்யப்படுகின்றன. பருத்திக் கொட்டையிலிருந்து அமெரிக்கர்கள் பருத்தி எண்ணெய் எடுக்கிறார்கள். இது சோப்பு செய்யவும், விளக்கு எரிக்கவும் உபயோகப்படும். 100 பவுண்டு பருத்திக்கொட்டை சுமார் 20 பவுண்டு




எண்ணெய் கொடுக்கும். பருத்திய் பாயி விவரின்  
பட்டை, மருந்துக்கு சிரயோசனமாய். இதற்கு  
அமெரிக்கா தேசத்தில் கிருக்கியுண்டாய். பருத்திய்  
கொட்டை. ஓடு காகிதம் செய்ய உபயோகப்படுகிறது.

---



செய்யுள் சான்ற அல்லது சான்று  
புறநாடு நல்லது



செய்யுள்

செய்யுள் சான்ற அல்லது சான்று



**பயிரின் சுபாவம்:—**

இது ஒரு நார்வகைப்பயிர். பருத்திபைத் தனி. பாக்கி நாரெல்லாம் பயிரின் தண்டுகளின் பூந்து கிடைக்கின்றன. ஆனால் பருத்தியிலே, வளைவுகளின் பூந்து கிடைக்கின்றன. இதை மாட்டுத் தீவனத்துக்காகவும், பசுந்தழை எருவுக்காகவும் சாகுபடி செய்யலாம். இது சுண்ணாம்புச்சீனி.

**தகுந்த பூமிகள்:—**

இது மாட்டுத் தீவனத்துக்காகவும், பசுந்தழை எருவுக்காகவும் கஞ்சையில் முதிர்ந்த கழம்பு பூந்து பருத்தியிலாவது, அல்லது அறுவடை செய்யப்பட்ட பஞ்சையிலாவது சாகுபடி செய்யப்படுகின்றது. பருக்காக சாகுபடி செய்யப்பட்சத்தில் வடிகால் வசதியுள்ள கன்கான் சம்பந்தமான களி நிலம் திறம். சீதாட்டகசால் களிலேயும் சாகுபடி செய்யப்படுகின்றது.

**செய் நேர்த்தி:—**

நாருக்காக பயிர் செய்யப்பட்சத்தில், மேலகாற்று மழையைக்கொண்டு, பூமியை நன்றம் உழுது வைத்திருக்கவேண்டும். சுமார் 3-4 உழுவுக்குக் கம்மிப்படுக கூடாது.

**தகுந்த உரம்:—**

நார்ப்பயிராகையால், உரம் கொடுத்தால் அதிக கிளைகள் உண்டாகும். இதற்குமுன் இருக்கப்பட்ட பயிருக்கு உரம் கொடுத்தால் போதுமானது. இதற்கு முன் பயிர் தானியப்பயிராக இருக்கவேண்டும். ஏதர்



## சென்னைச் சணல் அல்லது சணப்பு. 113

1க்கு சுமார் ரூபாய் 2க்கு சண்ணாம்பு நீறும் 2 வண்டி சாம்பலும் அடிப்பது கலவறு.

தகுந்த காலம், :-

எருவை எல்லாம் பரப்பினவுடன் சூன், சூலையில் ஏதாவது மழைபெய்தால், உழுது விதைத் தெளிக்கப் படுகிறது. கிருக்காகச் சாகுபடி செய்யப்பட்சத்தில் சூன், சூல்தான் தகுந்தகாலம். சாதாரணமாய் மாரி அல்லது குளிக்காவத்தல் தான் சாகுபடி செய்யப்படுகின்றது. கீதாட்டங்களில் எப்பொழுதும் சாகுபடி செய்யலாம்.

விதைப்பு மாதிரி, விதையிரி அ. அ. :-

நார்ப்பயிருக்காக 20 முதல் 30 பாட்டணம்படி வரையில் விதை தெளிக்கப்படுகிறது; (ஏதாவது சுமார் 50 படிவரை), வரிசை வரிசையாக தெளிக்கவேண்டும். ஒரு வரிசைக்கும மற்றொரு வரிசைக்கும் 9 அங்குலம் வித்தியாசம் இருக்கவேண்டும். விதை அடர்த்தியாக தெளிக்காவிட்டால் களைகள் ஜாஸ்தி வெடிக்கும். ஆகையால் நார்ப்பயிருக்கெல்லாம் விதை ஜாஸ்தியாகத் தான் தெளிக்கவேண்டும். அடர்த்தியாகத் தெளித்தால் தண்டு கீளமாயும் கோணல் அன்னியிலும் நேராய் வளர்க்குது, நார் உரிப்பதற்குப் பக்குவமாக இருக்கும். ஆகையால் நார்ப்பயிருக்கே விதைகள் ஜாஸ்தியாக தெளிக்கப்படும். சில இடங்களில் சுமார் 40 படிவரையில் தெளிக்கிறார்களாம். மாட்டுத்தீவனத்திற்காகவும், பசுந்தழை எருவுக்காகவும் சாகுபடி செய்யப்படும்பட்சத்தில் முதிர்ந்த நெற்பயிருக்கு மத்



திருவேலோ அல்லது நெற்பயிர் அறுவடை யானவுடன் அதே அளவு சுமார் 25 பட்டணம்படி தெளிக்கப்படுகின்றது. பசுந்தழை ஒருவுக்கும் மாட்டுத் தீவனத்துக்கும் தெளிக்கும்பட்சத்தில் அச்சற்குர் விதை ஐஸ் திதான் தெளிக்க வேண்டும. விதை, தானியத்துக்காக தெளிப்பதைப் பார்க்கிலும், ஒண்ணுக்கு மூன்று மாவது தெளிக்கும்படியாக இருக்கார்.

**வயக, கண்டு, முதல், முதலியான:**

இது மூன்று மாகத்து பயிர். குடை கடை சீரில் தெளித்தால் செம்பெம்பரில் அறுவடை செய்யலாம். டிசம்பரில் தெளித்தால் மார்ச்சில் ஏதாவது ஒரு மழை பெய்யுமபட்சத்தில் அந்த மாதத்தைக்கொண்டு இதைப் பூரியில் உழுது மிதித்து விடலாம். சிறுகச் சிறுக மாட்டைவிட்டு மேயவிடலாம். பாருக்காகப் பயிரை அறுக்குமபட்சத்தில் பாரிபூக்கிற சமயத்தில் அறுத்தாவது அல்லது பயிரைக் கையால் பிடுங்கியாவது, இலைகள் உதிர்கிற வரையில் காயவைத்துப் பிறகு பனியில் போட்டாவது அல்லது சலத்தில் ஊரவைத்தாவது தண்டு கொஞ்சம் அழுகினவுடன் நார் உரிப்பார்கள். நார் நேர்த்தியாயும் மிருதுவாயும் இருக்க வேண்டும்பட்சத்தில், பூக்கிறசமயத்தில் அறுத்துவிட வேண்டும். விதைவிட்ட பிறகு அறுத்தால் நார் பல மாயிருந்தாலும கூட, மிருதுவாயிருக்காது. சராசரிக கண்டுமுதல் ஏகர் 1க்கு சுமார் 800 முதல் 1000ம் பவுண்டு வரையில் நார் கிடைக்கும். ஊர்ப்போடு வதற்கு மிருதுவான ஓடும் தண்ணீர் திறம். சுமார்



## சென்னைச் சனல் அல்லது சனப்பு. 105

3, 4 கான் ஸார்போட்டால் போதுமானது. அதிக கான் ஸார்போட்டால் கார் கறுகி பலவீன மடைந்துவிடும். ஸார்போடுவதற்கு உப்புசலம் கூடாது. உப்புசலமாக இருந்தால் கார் வெளுப்பாக இரது. கார் ஸார்புதற்கு அதிக பாஸ்காலமில்லாம லும், அதிக வாய்சிகாலமில்லாமலு மிருக்கவேண் தும். ஸார்பாவதற்கு தண்ணீர் அடித்து கார் எடுப்பது வாழக்கூடாது. கார் சுமார் 36 அங்குல நீளமிருக்கும். ஒரே மணி அல்லது 2240 பவுண்டு சனல் கார் சீமை மில் சுமார் 16 பவுன் அல்லது 240 ஸ்டாப் விலே போகிற கார். ஏகா 1க்கு மீட்டர் வரமானம் சுமார் ஸ்டாப் 40ல் 41 துபடிச் செலவு சுமார் ஸ்டாப் 20 லோனால் ஏகர் 1க்கு சுமார் ஸ்டாப் 20 கிடைக்கலாம்.

**கைத்தொழில் :**

கார் எந்தெந்தச் சிறுகயி டாக முறுக்கிச் சாக்குகள் வெங்கிறார்கள். இப்படி கட்டுப்பை ஜில்லா ராசம்பட் டால் இந்த கைத்தொழில் நடக்கிறது. பார்பாய் இராஜ கானியில் செம்பா வாசன் மீன் பிடிக்க, வலைகளுக்காக இங்காரிமுல் வலைகள் மீன்னுகிறார்கள். இங்காரி முல் செம்பா வாசன் வலைகள் 5, 6 மாதிரி உண்டாம். சமுத்திரத்தில் மீன் பிடிக்கவும் இதர இடங்களில் மீன் பிடிக்கவும் இந்த வலைகள் பிரயோசனப்படுகின்றன. இங்காரிமுல் செய்தவலைகளை துவர்ப்புக் கஷாயங்களில் போட்டு, மாதத்துக்கு ஒரு தாம் தோய்த்துத்தோய்த் து எடுத்துப் பதப்படுத்திப் பிரயோசனப் படுத்து கிறார்கள்.



# புளிச்சை.

—:0:—



புளிச்சை.



பயிர் சுபாவம் :—

இதை ஒரு கார்ப்பியாகவும், வேளிப் பயிராகவும், சாகுபடி செய்யலாம். இதைத் தனிமையில் அதிகமாகச் சாகுபடி செய்யப் படுகிறதில்லை. இது பயிர்களுடன் கலந்துதான் சாகுபடி செய்யப்படுகிறது. இதன் தண்டு, காய்ப்பு, காய்கள் சுணையுள்ளதாக இருக்கும். அனையால் அகப்படுவது, சுலபமல்ல. நார்வனையப் பயிற்சுக்கும். புளிச்சை வர்க்கத்தைப் போல், சந்தானவர்க்கத் சுபாவம், அதாவது காய்கள் ஜாஸ்தியாய் வெடிக்கும் சுபாவம். வெடிமன்றற்கும் கிடைமாதது. இதன் இரண்டு மாதிரிகளிருக்கின்றன. இதன் இலைகளைக் கற்காயாகச் சுவாசல பண்ணுகிறதூண்டு. இக்காய்ப்பு சுமார் 4-அடி உயரம் இருக்கும்.

தகுந்த பூமிகள்:

கிராமத்தங்களிலேயும், புளிச்சைத் திடல்களிலேயும், கறிகாய்க் கொட்டைகளிலேயும், சாகுபடி செய்யப் படுகின்றன. படுகையண் சர்வசிலாக்கியம். செவ்வல், கரிசனிலும், சாகுபடி செய்யலாம்.

செய்நேர்த்தி, பருவம், வதைப்பு, விதையின் அளவு, முதலியன :

தனியாகப் பயிர் செய்தால், கோடைமழையில் பூமிமை 2-3 தடவை உழுதும், விதைக்குமுன் சூலைமாதக் கடைசியில் ஒருதடவை உழுதும், விதை தெளிக்க வேண்டும். இதரப்பயிர்களுக்கு மத்தியில் பயிர் செய்தால், அங்கு மிங்குமாய் விதை தெளிக்கப்பட்டு அந்தப் பயிர்களுக்குள்ள செய்நேர்த்தி.



தான் இதற்கும் ஏற்படுகிறது. கிளை விடுமானதால் அதிக உரம் கொடுப்பதில்லை. தனிப்பயிரில் பயிர் செய்தால் ஏகரா 1க்கு சுமார் 50-பவுண்டு விதை செல்லும். இதர பயிர்களுடன் தெளிக்குறா பட்சத்தில் ஏகரா 1க்கு சுமார் 2-பவுண்டு வீதமானது. கலந்து பயிர்செய்யும்போது வேலிப் பயிராகக் கரை ஓரங்களில் விதை தெளிப்பது நலம். சூலையாதக்கனம் சி தான் விதைதெளிக்கத் தகுந்தகாலம் தெளித்து ஒருபாதத்துக் கெல்லாம் கொத்திக் களைட்டுங்க வேண்டும.

**வயக. அறுப்பு. கண்டுழதல். முதலியன.**

இது மூன்றுபாதத்தைய பயிர். அகலி பாய, நலம் பரில் பயிர் முதற்க்குவிடும. முதற்க்கவுடன் வேலிபாடு பிடுங்கி வெப்பலில் காயவைத்து 50-40-தண்டுகளை ஒருகட்டாக கட்டி இலைகளையும், காய்களையும் கீழ் விழும்படியாக அடிக்காப்படுகிறது. காய்கள் அடிக்கப் பட்டு பற்றப்பட்டு விதை சேகரிக்கப்படுகிறது. தண்டுகள் கட்டுகளை எல்லாம் ஒரு பெரிய கட்டாகக் கட்டி கல்சுமையுடன், சுமார் 10 நாள் கண்ணீரில் ஊர வைத்தால், பின்பாய்மை யை சுலபமாக அடியிலிருந்து உரித்து விடலாம். இந்தப் பட்டைகளைத் தடியால் அடித்தால் கார்பிரிந்துவிடும். சலத்தில் கழுவி, அடித்தால் சுத்தநார்கிடைக்கும். ஏகரா 1க்கு சுமார் 5000-ம் பவுண்டு காய்க்த தண்டுகள் கிடைக்கும். இந்த தண்டுகளிலிருந்து சுமார் 1,000-பவுண்டும் நார்கிடைக்



சூர். 1 அடாங்கு 8-பவுண்டு கார்விலை போகிறதாம்.  
காரின் கீளம் 3, அடி முதல் 6 அடி வரையிலிருக்கும்.

கைத்தொழில்.

இந்த காரிலிருந்து தாம்புக்கயிறுகளும், மாலைக்  
கயிறுகளும், கலப்பை வாக்கயிறுகளும், துர்புகளும்,  
பூட்டுக் கயிறுகளும், சாக்குகளும் செய்பப் படு  
கின்றன. ஆனால் இதிலிருந்து உண்டாகும் சாக்குத்  
தண்ணீரில் பட்டால பலவீன மடைகிறது.

—



# ஜுட் அல்லது பங்களத்துச் சணல்.



ஜுட் அல்லது பங்களத்துச் சணல்.



## ஜூட் அல்லது பங்காளத்துச் சணல். 111

பயிரிற் கபாவம் :

இந்த கார்வனைய பயிரில் 2 மாதிரிகள் இருக்கின்றன. ஒரு மாதிரியின் விதை 2 நுண்டையாயும், மற்றொன்றின் விதை நீளமாயிருக்கும். இது பங்காளத்தில் ஏராளமாகச் சாகுபடி செய்யப்பட்ட போதிலும் கடல் கடந்து இராஜகாவியில் கிருஷ்ணா, விசாகப்பட்டணம், கஞ்சம், முதலிய இடங்களில் சொற்பமாகச் சாகுபடி செய்யப்பட்வதாகத் தெரியவருகிறது. பயிரின் அடி முதல் 12 அடி வரையில் வளரும்.

தகுந்த புழிகள் :

செவ்வை, கரிசனிலும், வரும். ஆனால் பங்காளத்தில் சாகுபடிமாய்க் தாழ்த்தபடுகை நிலங்களிலும், கஞ்சைகளிலும், தான் சாகுபடி செய்யப்படுகின்றன. மேல்த்தியான கபா க்கை க்கவண்ணியானால் நல்ல வாழ்காணுள்ள வளமான களி நிலத்தில் தான் சாகுபடி செய்யவேண்டும். 2 ஷ்ணமான நீர்க் காற்றுள்ள சீதோஷ்ணம் இப்பயிர் வளர்ச்சிக்கு முக்கியம். கஞ்சையிலும் சாகுபடி பண்ணலாம். புஞ்சையிலும் சாகுபடி பண்ணலாம். புஞ்சையில் கிணற்று இறவை யாயிருக்க வேண்டும்.

செய்நேர்த்தி, விதைப்பு, பருவம், முதலியன :—

ஆகஸ்டி, செப்டம்பர் முதல் ஏப்பிரல் வரையில் அதிகம் தடவை உழப்பட்டு, கட்டிகள் உடைக்கப்பட்டு தரிசாய் வைத்திருக்கிறார்கள். ஏப்பிரல், மே மாதங்களில் ஏகர் 1க்கு 8 முதல் 20 சேர்வரையில் அதாவது 3 முதல் 12½ பட்டணம்படி வரையில்



விதை தெளிக்கப்படுகிறது. விதையைக் கையால் தெளித்தாலும் தெளிக்கலாம் அல்லது நூற்றுவிட்டு நட்டாலும் நடலாம். நமது இராஜதானியில் சூலை, ஆகஸ்டுமாதம்கான் விதைவிட தகுந்தகாலம். நமது இராஜதானியில் நெல் எப்படி ஆற்றுவாண்டில் படிச்ச சலத்திலே நஞ்சையில் விர்த்தியாகிறதோ, அதுபோல ஜூன் பயிர் பங்காளத்தில் ஆற்றுவாண்டில்லாவிட்டால் விர்த்தியாகிறது. ஆகையால் நமது இராஜதானி மந்தளர்கள் லெல்லாம் விர்த்தி செய்தால் நல்ல பயிர் சிடைக்கும். அபூர்வமாக சாணம், பசுந்தழை முதலிய வருக்களைக் கொடுக்கிறார்கள். பயிர் ஒரு அடி உயரமிருக்கையில் களை பிடுங்கப்படுகிறது.

வயக. அறுப்பு. கண்டுமுதல், முதலியன :

ஆகஸ்டு மாதத்தில் பூக்க ஆரம்பிக்கும். ஆகையால் இது 3½ மாதத்துப்பயிர். நாளுக்குக் கவனஞ் செலுத்தி பூக்கிறதற்கு முன் அறுப்பது தான் சர்வசிலாக்கியம். பயிர் நன்றாய் முதிர்ந்த பிற்பாடு அறுத்தால் நிரம்ப மட்டமான நாரைக் கொடுக்கும். பூ, மொட்டு விட்டவுடன் அறுப்பது இரண்டாந்தரமான நாரைக்கொடுக்கும். பூத்த பிற்பாடும் காய் பிடிக்கும் சமயத்திலும் அறுக்கும்பயிர் மூன்றாம் தரமான நாரைக்கொடுக்கிறதாம். பயிரை வேருடன் பிடுங்கி இலையும் காயும் உதிர்வதற்காகக் காயப்போட்டு, பிறகு கட்டாகக்கட்டி தண்ணீரில் 10, 20 நாள் ஊரப்போட்டு, அழுகினவுடன், கொட்டாப் பிடியால் அடியிலும், நடுவிலும்,



## ஜூட் அல்லது பங்காளத்துச் சணல். 113


அடித்து நார் எடுக்கிறார்கள். நார் சுமார் 8 அடி நீள மிருக்கும். ஏகர் 1க்கு சுமார் 500 முதல் 700 பவுண்டு வரையில் சுத்தமான நார் கிடைக்கிறதாம். ஒரு காளைக்கு ஒருமணிதன் 10 சேர் முதல் ஒரு மணங்கு வரையில் நார் எடுப்பானும். ஒரு டன் ஜூட் நார் சுமார் ரூபாய் 300 லண்டனில் விலை போகிறதாம் இந்த நாருக்கு இப்போது மலல கிராக்கி. ஏகர் 1க்கு சுமார் 100 ரூபாய் நார் கிடைக்கும். சாகுபடிச் செலவு சுமார் ரூபாய் 40 போனாலும் ஏகர் 1க்கு சுடிகளுக்கு ரூபாய் 50 நிஞ்சும்.

கைத்தொழில் :

இந்த நாரிலிருந்து பலமான சாக்குகள் உண்டாக்க லாம். பங்காளத்தில இக்காரிலிருந்து, படுக்கிற பாய் களும், சாக்குகளும் ஏராளமாய் செய்யப்படுகின்றன. இப்பயிர் பீவர், கடுதாசு செய்ய பிரயோஜனப்படுகிறது. நார் உரித்தவுடன் தண்டைக்கரியாக்கி வெடிமருந் துக்கு உபயோகப்படுத்துகிறார்கள். இதன் இலைகளைக் கறியாகச் சமைத்துச் சாப்பிடுகிறார்கள். இதின் காய்ந் த இலையின் கஷாயம் தேகத்துக்கு பலவிர்த்தி ஒளஷ தமாகக் கொள்ளப்படுகிறது.



## கத்தாழை.



மருள்கத்தாழையும், சா தாரணிக கத்தாழையும்.

பயிரின் கபாவம்:—

இதை நார்வகைப் பயிராகவும், வேலிப்பயிராகவும், சாகுபடி செய்யலாம். இதில் யானைக்கத்தாழை என்றும், சோற்றுக்கத்தாழை என்றும், மருளென்றும்,



முள்ளிலலா ராக்ஷசிடலென்றும், சாதாரண கத்தாழை என்றும் இப்படி அதிக தினுசுகள் உண்டு. மருள் முதலிய கத்தாழைகள் சாகுபடி செய்யப்படாமல் சபாவமாகவே வளருதாயாய் வளருகின்றன. மருள் நாடிலெகளில் பரப்பாதிக்கப்பட்டு வந்தது. சோற்றாக கத்தாழை மாடுக்காக உபயோகப்படும். எல்லா கத்தாழைகளிலிருந்தும் நாம் எடுத்தாலும்கூட யானைக் கத்தாழை நான் முக்கியமானதால் அதன் சாகுபடி உபயோகம் மாடுக்காகப் பரிந்துரைக்கப்படும். இந்தப்பயிர் மெதுவாக வளருவதினால் மாடுக்காக அதிகமாகச் சாகுபடி செய்யப்படுவதில்லை.

### தகுந்த பூமிகள்.

எல்லா பூமியிலும் வரும். செவ்வல், கரிசல, கப்பி முதலிய பூமிகளில் வளரும். ஆனால் நல்ல நாருக்காக சாகுபடி செய்யப்பட்சத்தில் நல்ல வளமுள்ள, பாதி களி, பாதி மணல் சம்மந்தமுள்ள களிமண் பூமிதான் திறம். பொட்டை வெளியிலேயும், நிழலிலேயும் சாகுபடி செய்யலாம். ஆனால் நிழலில் சாகுபடி செய்வது அவ்வளவு சிலாக்கியமல்ல. ஏனெனில் மடல் குறுகிப்போய் விடுவதோடும் கூட, கொடி முதலியவைகள் படருவதனால் நோவுமுண்டாகும். சேய் நேர்த்தி, வீதைப்பு, பருவம், முதலியன :—

வேளிக்காகச் சாகுபடி செய்யும் பட்சத்தில் பயிரைச் சுற்றிக்கரை போட்டுக் கரைகளின்பேரில், கத்தாழைக் கிழங்குகளை 1. முதல் 3 அடிக்கு ஒருதரம்



நடவேண்டும். கரை 3-4 அடி உயர்நிருக்கவேண்டும். ஒருகெஜம்நீளம் கரை போட அணுஒன்று செலவாகும். நாருக்காக சாகுபடி செய்யும் பாட்சத்தில் பூரிமை நன்றாய் உழுது 5 அடிக்கு ஒருகுழி தோண்டி ஒவ்வொரு குழியிலும் உரம்போட்டு எத்தாழைப் பதிகன் களைநடுவது திறம். மழைகாலத்தில்தான். பதிகன் களைநடவேண்டும்.

வயக. அறுப்பு, கண்டுழதல், முதலியன :

சாதாரணமாய் நட்டு. மூன்று வருஷத்துக் கெல்லாம். நாருக்காக மடலை அறுக்கலாம். 5-6 வருஷத்துக்குப் பிற்பாடு மடலை அறுக்க அமர்பிற்பது நன்று. பிறகு வருஷா வருஷம் மடலை அறுக்கலாம். 7வது வருஷத்தில் 280 மணங்கு மடலிலிருந்து 5 மணங்கு நார்கிடைக்கும். வெளிப் பக்கத்தில் அடியிலிருந்து எடுக்கப்பட்ட பழுத்தமடல்கள் சாதாரணமாய் நார் எடுக்க சர்வசிலாக்கியம். முதிராத உள் மடலிலிருந்து எடுக்கும் நார், குட்டையாயும், பளவின் மாயுமிருக்கும். சுமார் 7வருஷமுள்ள ஒருகத்தாழைச் செடியிலிருந்து வருஷா வருஷம் 12 முதல் 15 வரையில் முதிர்த மடல்கள் அறுக்கலாம். நட்டு 7 வருஷத்துக்குப் பிற்பாடு முதலில் அறுக்கும்போது ஒவ்வொரு செடியிலிருந்து சுமார் 25 மடல் அறுக்கலாம். பிறகு வருஷாவருஷம் 12 முதல் 15 மடல் அளவில்தான் அறுக்கலாம். யானைக்கத்தாழை ஒரு



மடல சுமார் 2½ பவுண்டு நிறை இருக்கிறதாம். முள்ளுள்ள யானைக் கத்தாழையின் கார் நீளமாயிருந்த போதிலும்கூட முள்ளிலலா யானைக் கத்தாழையின் கார் அதிக மலமுள்ள தன்னியில், வேலிப்பயிருக்கு சாவசிலாக்கியம். முள்ளில்லா யானைக் கத்தாழையின் மடல ½ பவுண்டு நிறை இருக்கும். மடலை வெட்டி முன்களை நீக்கி துளியில் 6 அங்குலம் வெட்டிவிட வேண்டும். பிற்பாடு கீளத்தில் 5-6 துண்டாகக் கிழித்துக் கொண்டு கொட்டாய் பிடியால் அடித்து 4 அடி நீளம் 4 அங்குலம் அகலம் 3 அங்குலம் கனமுள்ள கட்டையில் கால்கட்ட விரலால் அழுத்திக் கொண்டு மீசாறு, சதைகளை, சுறண்டியால் சுறண்டி விட வேண்டும். பிற்பாடு நாரை வெய்யிலில் காயவைத்துப் பிரயோகிக்கலாம். அல்லது முன் சொன்னபடி மே கிழித்து கொட்டாய் பிடியால் அடித்து கட்டாகக் கட்டி சுமார் 15, 20 நாள் தண்ணீரில் ஊரப்போட்டுச் மீசாறு அழுகி, பாக்கிப்போனவுடன் எடுத்துக் காயவைத்து நார எடுக்கவேண்டும். முதல்சொன்ன மாதிரியில் சிலாக்கியமான நார் கிடைக்கும். லண்டனில் ஒரு டன் நார் சுமார் ரூபாய் 375 விலைபோகிற தாம். தண்ணீரில் ஊரவைத்த நார் சுமார் ரூபாய் 150 விலை போகிறதாம். கையால் எடுக்கும் நாரைப்பார்க்கிலும் யந்திரத்தினால் எடுக்கும் நாருக்கு விலை ஜாஸ்தி. நமது பக்கத்தில் ஒரு பவுண்டு நார் இரண்டு அனா விலை. தண்ணீரில் ஊரவைத்து எடுத்த நார், சுரண்டி எடுக்




சூம் நாரைப்பார்க்கிலும் நீளமாயிருக்கும்; அனல் வெளுப்பாக இராகு.

கைத்தொழில் :—

நல்ல பலமான விவசாயக் கயிறுகளுக்குப் இதா கயிறுகளுக்குப் இது உபயோகப்படுகிறது. நிகாசாப் பாய்கள் குறுக்கு கயிறுகளுக்கும் இது விவசாயப் படுகிறது.



கிழங்குவகைப் பயிர்கள்.  
மஞ்சள்.



மஞ்சள்.



பயிரின் சுபாவம் :—

இது ஒரு கிழங்குவகைப் பயிர். இதைச் சாயாயி ராகவும் கொள்ளலாம். இதில் பசும் மஞ்சளென்றும் கஸ்தூரி மஞ்சளென்றும் இரண்டிவகைகள் உண்டு. கஸ்தூரி மஞ்சள் சாகுபடி செய்யப்படுகிறதில்லை. இது வானந்திரமாய் வளருகின்றது. இதனுடைய கிழங்கு வைத்தியத்தில் பலவிர்த்திக்காகவும், வாயு நிவர்த்திக்காகவும் பிரயோசனப்படுகிறது. பசு மஞ்சள்தான் சாகுபடி செய்யப் படுகின்றது. இத லிருந்துதான் வரளிமஞ்சளென்றும் பலகை மஞ்ச ளென்றும் உண்டாக்கப் படுகின்றன. நமது இராஜ தானியில் வாய்க்கால் பாசனத்திலும் கிணற்றுப் பாசனத்திலும் சிலவிடங்களில் ஏராளமாய்ச் சாகு படி செய்யப் படுகின்றது. மழை ஜாஸ்தியாயுள்ள மலையாளபக்கங்களில் பாசனமன்னியில் சாகுபடி செய்யப் படுகிறது. இதைத் தனிமையிலாவது அல்லது இஞ்சி, மீசனை, கருனை, சேம்பு, கரும்பு, வெங்காயம், கொட்டைமுத்து, அகத்தி, சிலகறிகாய்ச் செடிகளோடும் கலந்தாவது சாகுபடி செய்யப் படுகிறது.

நதந்த பூமிகள் :—

நல்லவழிகால் வசதியுள்ள சாதாரண கரிசல்பூமி நீரம்ப திறம். பாதிமணல் பாதிகளியாயிருக்கப்பட்ட களிமண் பூமி திறம்.



செய் நேர்த்தி :—

முதியை அடிக்கடி ௨ முதுமண் தூவாளியா யிருக்க வேண்டும். சுமார் 6 ௨ முடிக்குக்கம்மிப் படக்கூடாது. பிறகு வேர்வாரியினால் 2 தரம், களை, புல், வேர் முசையவைகளை அப்புறப் படுத்த, வேலை செய்ய வேண்டும். பிறகு பாடும்பலகையினால் மேடுபள்ளங் களை 3 சாததுவம் பண்ண வேண்டும். பிறகு 12 அடி நீளம் 6 அடி அகலமுள்ள பாத்திகளாகப் பிரித்து, இப்பாடாட்ட பாத்திகள் இரண்டுவரிசைக்கு ௩டுவில், பாசனத்துக்காக ஒருசிறு கண்ணி ஏற்படுத்தி விட வேண்டும். இப்படி வயல் முழுவதும் பாத்திகளும் கண்ணிகளும் இருக்கும். ஒருகண்ணிக்கும் மற்ற ஒரு கண்ணிக்கும் 12 அடி வித்தியாசமிருக்கும். இந்தப்பாத்திகளில் 1 முதல் 1½ அடி வித்தியாசத்திலும் 3 அங்குல அழகத்திலும் அநேக குழிகள் உண்டாக்கி கிழங்குக் கண்களைப் புதைத்து மூடுவது வழக்கம்.

தகுந்த ஏரு :

ஏகரா 1க்கு 40 வண்டி சாணம் அடிக்கவேண்டும். இல்லாவிடில் ஆட்டுக்கிடையினாலும், நத்தத்து ஏருவி னாலும் உரப்படுத்தவேண்டும் குளத்துப்பொருக்கும் அடிக்கலாம். ஏகரா 1க்கு 30 வண்டிக்குக் குறையக் கூடாது.

தகுந்தகாலம், விதைப்பு, விதையின் அளவு, முதலியன :—

சூன் சூலையில் உழுது ஏரு அடித்து பாத்தி கட்டி பாத்தியின் குழிகளில் கிழங்குக் கண்கள்



புதைக்கப் படுகின்றன. ஏகா 1க்கு 1800-பவுண்டு முதல் 2000ம் பவுண்டு வரையில் விதைக்கிழங்குகள் செல்லும். ஒவ்வொருவிதைக் கிழங்குதான் 2-3 கண்கள் உள்ளதாய் பொறுக்கிவைக்கவேண்டும். இஞ்சியோடுகலந்து சாகுபடிசெய்தால் இஞ்சியைப் பாத்திகளிலும், மஞ்சளைப் பாத்திக்கரைகள் ஓரம் பாடுவது வழக்கம். அப்போது ஏகா 1க்கு 600 முதல் 800 பவுண்டு வரையில் விதைக் கிழங்கு செல்லும். பாத்திகளில் விதைக் கிழங்குகளை புதைத்தால் பாத்திக்கரைகளில் கருணை, சேம்பு, போடலாம். அப்போது ஏகா 1க்கு சுமார் 600 முதல் 700 பவுண்டு வரையில் கருணை, சேம்பு, விதைசளைக்கரை ஓரங்களில் போடும்படியாக இருக்கும். பாத்திகளில் மஞ்சள் கிழங்குகள் போட சுமார் 600 பவுண்டு வரையில் விதைச் செல்லலாம். கருணையைக் கரைகளில் 4 அங்குல ஆழத்தில் 3 அடிக்கு ஒரு தரம் பயிர் செய்ய வேண்டும். பாத்திகளின் 4 மூலைகளிலும் கொட்டை முத்து அல்லது அகத்தி உண்டுபண்ணலாம். கொத்தவரை, மிளகாய், கத்தரிமுதலிய பயிர்களும் கரைகளில் உண்டாக்கலாம். ஆகையால் சூன், சூலை மாதம்தான் விதைபோட நல்லகாலம்.

**பாசனம், கொத்தல் :—**

புதைத்து 5, 6 மாதத்துக்கு, வாரம் ஒரு முறை வீதம் ஜலம்பாய்ச்சிக் கொண்டுவரவேண்டும். பயிர் ஒரு மாதமானவுடன் மாதத்துக்கு ஒரு தரம் கொத்தி,



களைபிடுங்கி பூமி சுத்தமாபிடுக்க வேண்டும். மொத்தம் சுமார் 15,20 தாத்துக்குக் குறையாமல் இரவைத் தண்ணீர் கொடுக்குமபடியாயிருக்கும். கிணற்றிரவை யானால் இதற்கு சுமார் ரூபாய் 40 செலவு பிடிக்கும். வயது, அறுப்பு, கண்டு முதல் :

இது சுமார் 9 மாதத்துப்பயிர். ஐப் பூனில் விதைக் கிழங்கு ஊன்றினால் சிப்ரவரி, மார்ச்சில் மஞ்சளை வெட்டலாம். இலைகள் காய்ந்து சருகாய்ப் போனது தான் மஞ்சள் முதிர்ந்ததற்கு அடையாளம். பயிர் முதிர்ந்த பிற்பாடுகூட கிழங்கு பூமியினிருந்தாலும் அதனால் கெடுதல் ஏன் றும் ஏற்படாது. கல்ல விலைவரும் போது பக்குவமாய் வெட்டி விற்றுவிடலாம். சின்னக் கூத்தாவினால் பயினை சேதப்படாமல் வெட்டவேண்டும். கருணை சிரப்ப அழத்தினிருந்தால் சேதமன்னியில் வெட்டியெடுக்க சிரப்ப செலவாகும். ஏகர் 1க்கு சுமார் 15,000ம் பவுண்டு பசும மஞ்சள் கிழங்கு கிடைக்கும். கருணையில் சுமார் 5,000ம் பவுண்டு கிடைக்கும். இவைகளில் வேர், மண், முதலிய அசடுகளைப் போக்கி சுத்தப்படுத்தினால், ஏகர் 1க்கு 10,000ம் பவுண்டு சுத்தப்படுத்தின மஞ்சளும், 3,500 பவுண்டு சுத்தப்படுத்தின கருணைக்கிழங்கும் கிடைக்கும். மஞ்சளில் சுமார் ரூபாய் 150ம் கருணை முதலிய பயிரில் சுமார் ரூபாய் 100-ம் ஆக மொத்த வரும்படி சுமார் ரூபாய் 250-ம் வரலாம். இதற்குச் செலவு சுமார் ரூபாய் 150 போனாலும் ஏகர்



1க்கு மஞ்சள் சாகுபடியில் சுமார் ரூபாய் 100 கிணா க்கும். இஞ்சியோடு சாகுபடி செய்தால் ஏகா 1க்கு சுமார் 3,000 பவுண்டு பசும் மஞ்சள் கிணா க்கும். வேகவைத்துப் பக்குவப்படுத்தின மஞ்சள் சுமார் ஏகர் 1க்கு 3,000ம் பவுண்டு தான கிணா க்கும். பசும்மஞ்சள் ரூபாய் 1க்கு சுமார் 60-பவுண்டு, பாடம் பண்ணின மஞ்சள் ரூபாய் 1க்கு 10-பவுண்டுமே விலை போகிறது.

**மஞ்சளை வியாபாரத்துக்குத் தயார் செய்தல்.**—

கிழங்குகளை வெட்டி வேர் முதலிய அசடுகளைச் சுத்தம் செய்தவுடன், மண் சட்டியில் சாணசெய்தலில் போட்டு கலந்து வேகவைத்தும் பிற்பாடு கிழங்குகள் காயவைக்கப் படுகின்றன.

**வைகத்தொழில்** :—

மஞ்சள் விலிருந்து மஞ்சள் சாயம் எடுக்கலாம். இந்த சாயக்கஷாயத்தில் துணிவைக் களைத்து மஞ்சள் வர்ணம் ஏற்றுவார்கள்.



இஞ்சி.



இஞ்சிப்பயிர்.



**பயிர்ச்சபாவம் :—**

இது ஒரு கிழங்குவகைப் பயிர். இதை வாசனைச் சாக்குப் பயிராகவும் கொள்ளலாம். இது உஷ்ண தேசத்துப் பயிர். சமஸ்தானிகளில்தான் முக்கியமாக சாகுபடி செய்யப்படுகிறது. மலைப்பகுதிகளில் அதிகமாகச் சாகுபடி செய்யப்படுகிறதில்லை. பயிர் சுமார் 2 அடி உயரமிருக்கும். இஞ்சி தனியாகிய லாவது அல்லது மஞ்சள், கருவே, வெங்காயம், மிளகாய், கத்தரி, முதலியவைகளுடன் கலந்தாவது சாகுபடி செய்யப்படுகிறது. முக்கியமாக இஞ்சியும், மஞ்சளும், கலந்து சாகுபடி செய்யப்படுகிறது.

**தகுந்தபூமிகள் :**

கல்லவழிகால் வசதியுள்ள வளமான பொல பொலப் புள்ள மண்புழைய பூமி சிறக்கியம். படுகைமண்ணில் கன்றும் வருகிறது. நீதாட்டக் கால் பூமி திறம். கொஞ்சம் களிசாப்பகதப் பட்ட மணல் சாரியிலும் வரும.

**சேய்நேர்த்தி :—**

ஜூன்மாதத்தில் சுமார் 40-வண்ணி சாணம் உரம் கொடுக்கவேண்டும். இல்லாத பட்சத்தில் 30-40-வண்ணி பொருக்கு அடிக்கலாம். அப்போர்ப்பட்ட பூமியை ஒரு மழைக்குப் பிந்தியாவது அல்லது பூமியை ஈரப்படுத்தின பின்பாவது உழுது களை, புல், முதலியவைகளை வேர் வாரியால் சுத்தப்படுத்தி,



பாம்பு பலகையால் மேடு பள்ள மன்னியில் சமமாக்கி, 12 அடிநீளம் 6 அடி அகலமுள்ள பாத்திகள் கட்டி, இரண்டு பாத்திகளுக்கு மத்தியில் பாய்ச்சலுக்காக கண்ணிகள் ஏற்படுத்தி, இப்படி வயல முழுவதும் பாத்திகளுடைய கண்ணிகளுடைய யிருக்கும்படி செய்ய வேண்டும். ஜூன் மாதத்துக்கு முந்தி சுமார் 5 உழவு ஆயிருக்க வேண்டும். மொத்தம் 6 உழவுக்குக்குறையக் கூடாது. (கண்ணிகளைத் தவிர) ஏக்கர் 1க்கு சுமார் 550 பாத்திகளிருக்கும்.

தகுந்தகாலம் விதைப்பு விதையின் அளவு, முதலியன:—

ஜூன், ஜூலைகளில் பாத்திகளில் 1 அங்குல வித்தியாசத்திலா. 2 அங்குல ஆழத்திலும், 2, 3 கண்ணிகளையா இஞ்சித்துண்டத்தை புதைக்கவேண்டும். இப்படி 1 அங்குல வித்தியாசத்தில் குச்சியால் குழிகள் உண்டாக்கி 2 அங்குல ஆழத்தில் புதைத்திடுவாடு. குழிகளை மூடிக்கையால் சமத்துவம் செய்து விடவேண்டும். ஒரு பாத்திக்குப் புதைக்க சுமார் 144 இஞ்சிக் கண்விதைகள் செலவாகும். ஒரு ஏக்கருக்கு சுமார் 77,000ம் விதைக்கண்கள் செலவாகின்றன. இந்த 77,000ம் கண்களும் சுமார் 1,200 முதல் 1,500 பவுண்டு வரை இஞ்சிக்கிழங்கிலிருந்து விதைக்கிழங்காக கிடைக்கும். சிலசமயம் 2,000ம் பவுண்டு கூட செல்லலாம். விதைக்காகக் கிழங்குகள், நல்லகாத்திரமாயிருக்கவேண்டும். ஜூன், ஜூலைதான் விதைக்கத் தகுந்தகாலம். இஞ்சியை பாத்தியிலும், இஞ்சிக்கு



நிழல்கொடுப்பதற்காக கரைகளில் பாஞ்சள், கருணை, அகத்தி, கொட்டை, கொத்தவரை முதலியவைகள் பயிரிடப் படுகின்றன.

**பாசனம், கொத்தல், களைபிடுங்கல் :—**

மழை யில்லாதகாலத்திலே வாரம் ஒருமுறை வீதம் விதை புதைத்த நாள் முதல் பயிர் முதிருகிறவரையில், இறவைத் தண்ணீர் கொடுக்கவேண்டும். கொத்தப சுமார் 20 இறவை கொடுக்கும்படியாம். கொதி மாதம் 1 தரம் வீதம் 4 தடவைப் பயிலாக் கொத்தக் களைபிடுங்க வேண்டும். 2வது கொத்தும்போது பயிருக்கு மண்ணைக் கொடுக்க வேண்டும். அப்போது கொட்டைப் பிண்ணாக்கைத் தூளாக்கிப் பயிருக்கு உரம் அணைப்பது திறம். இப்படி 2, 3 கொத்தலிலும் பிண்ணாக்கு உரம் கொடுப்பதும் திறம்.

**வயகு, அறுப்பு, கண்டுழதல், முதலியன :**

இது சுமார் 8 மாதத்துப் பயிர். ஒழுண்டி புதைத்தால் பிப்பிரவரியில் இஞ்சியை வெட்டலாம். எவ்வளவுக் கெவ்வளவு உரம் ஜாஸ்தியாய்க் கொடுக்கிறோமோ அவ்வளவுக் கெவ்வளவு பயிர் ஒரு மாதம் சீக்கிரம் முதிரும். கூந்தாலியினாலாவது அல்லது மண்வெட்டியினாலாவது சேகப்படாமல் வெட்டி யெடுக்கவேண்டும். ஏகர் 1க்கு வேர், மண் முதலிய அசடுகள் நீக்கப்பட்ட இஞ்சிக் கிழங்குகள் சுமார் 12,000ம் பவுண்டு கிடைக்கும். ரூபாய் 1க்கு சுமார் 40-பவுண்டு விலைபோகும். இந்தக்கிழங்குகளில் விதைக்கு எடுத்து வைக்கப்படும் கிழங்குக்கு விலை



ஜாஸ்தி. அதாவது விதைக்கிழங்கு ரூபாய் 1க்கு சுமார் 25 பவுண்டு. எனக் 1க்கு சுமார் மொத்த வரும்படி ரூபாய் 3000, சுரூபடிச்செலவு ரூபாய் 2000ம் போனால் குடிசைக்கு தராளமாய் ரூபாய் 100 மிஞ்சும்.


**இஞ்சியைப் பயனாகாத்து வைக்கும் விதம் :-**

கல்ல காற்றோடாட்டமுள்ள சூளிமையான இடத்தில், அழுகலை எல்லாம் நீக்கி வெய்யலில் காயவைத்து, தாம்பாத்தூப்பிட்டு 4. 5 அடி உயரத்தில் குவியல் குவியலாக அமிக்கி விடவேண்டும். அடிக்கடி குவியலை சோதிக்கவேண்டும். குவியல்களின் கடுவில் உஷ்ணம் புறப்படாமலிருந்தால், இஞ்சிகள் கெட்டுப்போகவில்லையென்றும் எண்ணவேண்டும். உஷ்ணம் புறப்பட்டால் மறுபடி அழுகலை எல்லாம் நீக்கி மறுபடி அடுக்கவேண்டும். இப்படி கெட்டுப்போகாமல் சுமார் 7-8 மாதம் வரையில் அமிக்கிவைக்கலாமாம். இப்படி அமிக்கி வைப்பதில் கிடை குறையும். கல்காத்திரமாயுள்ள இஞ்சியை ஜஸ்த்தில் களைத்து சுறண்டி சுத்தப்படுத்தி மறுபடி கழுவி 3. 4 நாள் வெய்யலில் காயப்போட்டு, சுத்தப்படுத்தி மறுபடி காயப்போட்டு வைப்பது தான் சுக்கு என்று பெயர். 20 மணங்கு இஞ்சியை சுக்காக்குவதற்கு 5 ரூபாய் செலவு பிடிக்குமாம். இஞ்சி, சுக்கு, வைத்தியத்திலேயும் சுவை அதிகரிக்க உணவு பதார்த்தத்திலும் உபயோகப்படுகின்றன.



# வெங்காயமும் வெள்வளப் பூண்டும்.

வெங்காயம்.



வெங்காயப் பயிர்.



## வெங்காயமும் வெள்ளைப்பூண்டும். 131

பயிரின் சுபாவம் :--

இதைக் கிழங்கு வகைப்பயிராகவும் சுவை அதிகரிக்கச் செய்யும் வாசனைச் சரக்குப்பயிராகவும் கொள்ளலாம். இது ஒரு முக்கியமான தோட்டக்கால் பயிர். இது தனிநாயினை சாகுபடி செய்யப்படுகிறது. இதில் ஆளாறு முக்கிய மாதிரிகள் இருக்கின்றன ; சிகப்பு, மஞ்சள், வெள்ளை. சிகப்பு மாதிரியில் வெளியில் தோல் நல்ல சிகப்பு நிறமாயிருக்கும். மஞ்சளில், வெளித் தோல் ஒரு விசக்கலந்த வெளுப்பாயிருக்கும். வெள்ளையில் சிறிதாயும் சுத்த வெளுப்பாயிருக்கும். இது மாரிகாலைத் தோட்டக்கால் பயிர்.

தகுந்த பூமி:--

நல்லவாழ்கால் வசதியுள்ளது. கஷ்ட மன்னியில் கருவிகள் வேலை செய்யக்கூடிய, பொலபொலத்த மண்ணை அடைய பூமி திறம். தோட்டக்கால் கரிசலிலும் செவ்வல்லும வரும்.

வயல் தேய்நேர்த்தி :--

பூமியை ஆறு உழவுக்குக் குறையாமல் உழவேண்டும். செப்டம்பரில் கடைசி உழவு உழுது, ஏகர ஒன்றுக்கு 15 மீன் அல்லது சுமார் 30 வண்டி நல்ல மடித்த சாணம் எருவடித்துப் பரப்பி உழுதபிற்பாடு, களை, புல், வேர் முதலியவைகளை நீக்கவேர்வாரி யென்னும் கருவியால் இரண்டு தரம் வேலைசெய்து, பரம்புப் பலகையால் மேடு பள்ளத்தை நிரவி, பாத்திகள் கட்டி இரண்டு வரிசைப் பாத்திகளுக்கிடையே கண்ணி



களுமேற்படுத்தி, இப்படி வயல் முழுவதும் பாத்தி களும் கண்ணிகளுமாயிருக்க வேண்டும்.

நாற்றங்கால் செய்யே நீர்த்தீ : —

நாற்றங்காலை நன்றும் வெட்டி வாங்கி, ஏராள மாய் உரமடித்து நல்ல தூவாளியாய் வைத்திருக்க வேண்டும். மணல சம்பந்தமுள்ள களிமண் பூரி நாற் றங்காலுக்குத் திரும். செப்டம்பர் மாதத்தில் நாற்றங் காலில் 15 பவுண்டு நல்லகாத்திரமான விதை, கைத் தெளியால் நெருக்கமாய்த் தெளிக்கப்படுகின்றது. இந்த 15 பவுண்டு விதையிலிருந்துண்டாகும் நாற்று ஒரு ஏகர் நடபோதுமானது. நாற்றங்கால் காய் 10 செண்டு விஸ்தீர்ணமிருக்கவேண்டும். நாற்றங்கா லில் களை முதலியவைகளை சுத்தப்படுத்தி நெருக்க மாயிருக்கப்பட்ட இடங்களைக்கெக்கப்படுத்தி நொ வற்ற காத்திரமான நாற்றுகளை உண்டாக்கவேண்டும்.

நகுந்த காலம்:—

செப்டம்பர், அக்டோபர் மாதந்தான் விதை தெளிக் கத்தகுந்த காலம். பயிரை, நாற்றைக்கொண்டு நட்டா வது, அல்லது கண்பதியன்களினாலாவது உண்டாக்க லாம். விதை விட்டு நாற்று உண்டாக்கி நடும்போது, விதையைச் செப்டம்பரில் தெளித்து நவம்பரில் நாற் றைப் பிடுங்கித்தயாராயிருக்கப்பட்ட வயல் பாத்தி களில் நடவேண்டும். நாற்றங்காலில் தண்ணீர் கட்டி பூம் மிருதுவாயிருந்தால், நாற்றைக் கையால் பிடுங்கி விடலாம். நாற்றுகளின் உச்சியில் பாதி கொய்து



## வெங்காயமும் வெள்ளைப்பூண்டும். 133

நாற்றை முந்தி பாசனம் பண்ணப்பட்ட பாத்திகளிலாவது, அல்லது வெறும் பாத்திகளிலாவது, நடவேண்டும். வெறும் பாத்திகளில் நடடால் நடடவுடன் தண்ணீர் பாய்ச்சவேண்டும். ஒவ்வொரு நாற்றுக்கும் 4 அங்குல வித்தியாசமிருக்க வேண்டும். இப்படி நாற்றுக்கி் நட்பி பயிர்செய்தாலும் வேறு தினுசாகவும் பயிர் செய்யலாம். பாத்திகளில் சுமார் 6 அங்குல வித்தியாசத்தில் சிறு வெங்காயங்கள் புதைக்கப்படுகின்றன. இப்படி ஒரு ஏக்கராவில புதைக்க சுமார் 1,000ம் பவுண்டு சிறுவெங்காய விதை செல்லும். தீச்சிறு வெங்காய விதைகளைக் குச்சியால் குழிகள் உண்டாக்கி அவைகளில் புதைத்து மூடி விடவேண்டும். தீவ்வெங்காய விதை நவம்பர் மாதத்தில் குழிகளில் புதைக்கப்படுகின்றது.

பாசனம், கொத்தல், களைபிடுங்கல், முதலியன:—

பாத்திகளில் நடட்ட வெங்காய நாற்றுகளுக்கு நாலாவது நாள் ஒரு தண்ணீரும் பிற்பாடு வாரம் ஒரு முறை ஜலம் இறைக்கவேண்டும். விதை வெங்காயம் புதைத்தவுடனும் ஜலம் இறைத்து பிற்பாடு வாரம் ஒருமுறை ஜலம் இறைத்துக்கொண்டே வரவேண்டும். மொத்தம் சுமார் 20 தரம் ஜலம்பாய்ச்சவேண்டியிருக்கும். இரண்டு தரம் கொத்தி களை பிடுங்கவேண்டும். டிசம்பரில் கொத்தும்போது சாம்பலுடன் கொட்டை முதலுப் பிண்ணாக்கைக்கலந்து உரம் அணைப்பது திறம்.




வயசு, அறுப்பு, கண்டுழதல், முதலியன :-

இது ஆறுமாதத்தியப் பயிர். செட்டம்பரில் தெளித்தால் மார்ச்சு, ஏப்ரலில் அறுவடை செய்யலாம். நவம்பரில் விதைக்கிழங்குகளைப் புதைத்தால் ஏப்ரல் கடைசியில் அறுவடை செய்யலாம். பயிர் முதிர்ந்ததற்கடையாளம் நுனியில் மஞ்சளாய்வு போய்க் கீழ்விழும். கடைசி பாசனத்துக்குப் பத்து நாள் பிற்பாடு கையால் பிடுங்கி விடலாம். இல்லாவிடின் கந்தாவிமண் வெட்டியால் பக்குவமாய் எடுத்து விடலாம். பிற்பாடு அசடுமுதலியவைகளை எல்லாம் எடுத்து, அப்புறப்படுத்தி சுத்தம் செய்து தாங்கட்டி பிரித்து விடவேண்டும். நுனி இலைகளையும், அடிவேர்களையும் கத்தியால் நீக்கிவிடவேண்டும். ஏகரா ஒன்றுக்குச் சுமார் 30,000 பவுண்டு வெங்காயம் கிடைக்கும். இது சுமார் ரூபாய் 200 விலையிருக்கலாம். ஏகராவுக்கு மொத்தவருமானம் ரூபாய் 200ம் சாகுபடிச்செலவு சுமார் ரூபாய் 120ம் வைத்துக்கொண்டாலும் செலவெல்லாம்போக சுமார் ரூபாய் 80 மிஞ்சும்.



# வெள்ளைப்பூண்டு



வெள்ளைப்பூண்டுப் பயிர்.



இதற்குச் சாகுபடி விஷயம் சகலமும் வெங்காயத்  
தைப்போலவே. பயிர் உண்டாக்ருவதற்குச் சிறுபூண்டு  
களையே விதைமாக உபயோகிக்கப்படுகின்றன. அக்  
டோபர் மாதத்தில் 10 சதுர அடியுள்ள பாதத்தில் 1½  
பவுண்டு காய்க்க விதைப் பூண்டை விதைக்க வேண்  
டும். இப்படி புதைத்தால் ஏகர் ஒன்றுக்கு 7000 பவுண்  
டு விதைப்பூண்டு செல்லும். உரம், செங்காய்த்,  
காலம், பாசனம் எல்லாம் வெங்காயத்தைப்போலவே.  
பயிர் முதிர்ந்ததற்கு அடைமானம் இவைகள் பழுத்துப்  
போய்விடும். விதைபுதைத்து 15 மீ ததுக்கெல்லாம்  
பயிர் அறுவடைக்குத்தயாராயிருக்கும். இது 6 மாதத்  
துப்பயிர். ஏகர் ஒன்றுக்கு சுமார் 8,000 பவுண்டு முத  
ல் 10,000 பவுண்டு வரையில் விவளைப்பூண்டுகிடைக்  
கும். இதன் விலை சுமார் ரூபாய் 250. ஏகர் 1க்கு  
செலவெல்லாம்போக சுமார் ரூபாய் 100 கிடைக்கும்.



# அரளுட் அல்லது கூவைக் கிழங்கு.

பட்டம் - அநேகமாய்

பயிர் கொத்தல்தப்போல தானிருக்கும்.

பயிர் கபாவம்.

இது ஒரு கிழங்கு வகையாகும். இந்தக் கிழங்கினிருந்து வருமானம் உண்டாகுதல் உபயோகம் படுத்தப் படுவதால், இதை ஒரு உணவுப் பானாகவும் கொள்ளலாம். இதன் மூலம் இந்தியன் அரளுட் பென்றும், வெஸ்டு இந்தியன் அரளுட் பென்றும் இரண்டு மாதிரி புண்டு. என்டி இந்தியன் அரளுட் கிழங்குமற்றொரு மாதிரியைப் பார்க்கிலும் பெரிது. அதிக வேர்களை புடையதாயிருக்கும். கிழங்குகளில் பச்சையில் ஒருவித கசப்பான வஸ்து இருக்கிறதாம். தென் இந்தியா சிலபாகங்களிலும், மலேயாளப் பக்கங்களிலும், கோதாவரி ஜில்லாமேல் பாகத்திலும் ஏராளமாகச் சாகுபடி செய்யப் படுகின்றது. மலேயாளப் பக்கங்களில் மழை ஜாஸ்தி யானதால் பாசன மன்னியில், மழையைக் கொண்டே



சாகுபடி செய்து விடலாம். நல்ல செய்நேர்த்தி யுடனும் நல்ல உரத்து நும் சாகுபடி செய்தால் கிழங்குகளில் அதிக மாவுக் கசையும் பதார்த்தம் குறைச்சலாயும் உண்டாகும்.

### தகுந்த பூமிகள் :

மணல் ஜாஸ்தியாயுள்ள களிமண் பூமி நாயபச்சாக்கியம். பொலி பொலித்த மண்ணையுடைய களிமண் பூமியும் சிறம். நல்ல வடிகால் வசதியுள்ளதாயிருக்க வேண்டும்.

### செய்நேர்த்தி :

4-5 உழவுக்குக் குறைமாவல் உழிவண்டும். பிறகு வேர்வாரியால் சுத்தப் படுத்தி, நாயபடித்துப் பாத்திகள் உண்டாக்க வேண்டும்.

### காலம், விதைப்பு, முதலியன :—

ஆகஸ்டும் செப்டெம்பரும்தான் விதைக்க நல்ல காலம். நல்ல கிடைவைத்து அல்லது சாணம், சாயபல், பிண்ணாக்கு முதலிய உரங்களினால் உரப்படுத்தி செய்நேர்த்தி செய்யப்பட்ட பாத்திகளில் சுமார்  $1\frac{1}{4}$  அடிக்கு ஒருதரம். குச்சியால் குழிகள் உண்டாக்கி, அவைகளில் விதைக் கண்களைப் புதைக்க வேண்டும். சுமார் 1,000 ம் பவுண்டு அளவுக் கிழங்கிலிருந்து விதைக் கண்கள் எடுக்கும்படியாயிருக்கும்.

### பாசனம், கொத்தல் களைபிடுங்கல், முதலியன :—

மழை இல்லாத போது வாரத்துக்கு ஒருதடவை தண்ணீர் இறைக்க வேண்டும். 2-3-கொத்தலுக்குக்



## அரநுட் அல்லது கூவைக்கிழங்கு 139

கம்மிப்படக்கூடாது. கொத்தும்போது உரம் அணைக்கலாம்.

**வயாக. கண்டுழதல். முதலியன :-**

சுமார் 6 மாத்துப் பயிர். ஆகஸ்ட்டில் விதைக்கிழங்குகளைப் பழைத்தால் ஜனவரி சுடைசியில் வெட்டி விடலாம். பயிரைக் கந்தாஸ்யினுராவது அல்லது மண வெட்டியினுராவது சேதானீயில் வெட்டி விண்ணெ. ஏகர் 1-க்கு சுமார் 6,000ம்-7,000-பவுண்டு அரநுட்க் கிழங்கு கிடைக்கும். 100-பவுண்டு கிழங்குக்கு சுமார் 12½ பவுண்டு அரநுட் மாவு கிடைக்கும். அகாவது ஏகர் 1க்கு சுமார் 750 பவுண்டு அரநுட் மாவுகிடைக்கும். ஒரு பவுண்டு அரநுட் மாவு 4 அணை வில்ல

**கைத் தொழில்.**

கிழங்குகளிருந்து அரநுட் மாவு செய்யும் விதம். கிழங்குகளை நன்றும் அலம்பிவிட்டு. சதை சதையாய்த் தீருத பலகையினால் சுரண்டி, வரும் தூளகளை ஜலத்தில் கலந்து, குழப்பி, ஒரு துணியினால் வடிக்கட்டினால், மாவும் ஜலமும் ஒரு பக்கமும், சக்கை ஒரு பக்கமாய்ப்போய்விடும். பிறகு ஜலத்தைத் தெளிய வைத்துத் தெளிந்த ஜலத்தைக் கொட்டி மாவைக்கழு வி சுத்தம்செய்து காயவைத்து எடுத்து வைப்பதை தான் அரநுட்மாவு என்று சொல்லுவார்கள்.



சேவனக்கிழங்கு, கருவணக்  
கிழங்கு.



சேனைக்கிழங்குப் பயிர்.



பயிரின் சுபாவம் :

இதைக்கிழங்குப் பயிராகவும் கருகாய்ப் பயிராகவும் சாகுபடி செய்யலாம். கருணைக்கிழங்கில் காராத கிழங்குகளாயினும், மாணைக்கால் மீளாலு இருக்கும் கிழங்குகளுக்கு சேனைக்கிழங்கு அல்லது காராக்கருணை என்று பெயர். சாதாரணக்கருணைக் கிழங்குகள் காரலாம். ஒவ்வொரு கிழங்கிலும் நடுவில் ஒரு கண் முளை இருக்கும். அக்கிழங்குகளுக்கு தள்ளிக்கிழங்கு என்று பெயர். ஒவ்வொரு தாளியின் பக்கத்தில் அநேக விரளிக்கிழங்குகளும் முடைத்திருக்கும். இந்த முளை களைபயம் சிறுகிழங்குகளாகிய விரளிகளையும் வெட்டி நடட்டால் முதல் வருஷத்தில் சிறிய கிழங்குகள் உண்டாகும். பாது இராஜதானியில் பழையாளப்பக்கங்களிலும் கையழுத்தூர், சேலம் ஜில்லாக்களில் சில பாகங்களிலும் சாகுபடி செய்யப்படுகின்றது. அநேக இடங்களில் இதைத்தனிமையில் சாகுபடி செய்யப்படுகிறதில்லை. மஞ்சள், இஞ்சி முதலிய சிலபயிர்களோடு கலந்து சாகுபடி செய்யப்படுகிறது.

தகுந்த பூமிகள் : -

பொலபொலத்த வண்டல் மண்ணையுடைய பூமியில் வரும். நல்லவளமான மணல்சாரியிலும் வரும். தோட்டக்கால் கரிசனிலும் வரும்.

தகுந்த உரம் :—

ஏகரா ஒன்றுக்கு 30 வண்டி சாணம் உரமாகக் கொடுக்கவேண்டும். எவ்வளவுக்கெவ்வளவு உரம்.



ஜாஸ்தியாகக்கொடுத்து சரியாய்ச் சாகுபடி செய்கிறே  
மோ. அவ்வளவுக்கவ்வளவு கிழங்கு பெருகுகாலும்  
மட்டாயிருக்கும்.

**செய்நேர்த்தி :**

பூமிபை நன் மடக ஐந்தாமதரம் உழுது, களை, புல்,  
வோர் இவைகளை வெல்லாந் நிக்க வேர்வாயால் இரண்டு  
தரம் வேலைசெய்து, பாம்புப்பலகையால் மேடுபள்ள  
த்தைநீர்வி. 12 அடி நீளம் 6 அடி அகலமுள்ள பாத்தி  
கள் உண்டாகதி, இரண்டு பாத்திகளில் வரிகைககு  
நடுவே கண்ணிகள் ஏற்படுத்தி, வரல் முழுவதும் பாத்  
திகளும் கண்ணிமுனமாய் இருக்குமபடி செய்யவேண்  
டும். ஏகரா ஒன்றிக்கு சுமார் 500 பாத்திகள் போடும்  
படி நேரிடும். ஜூன் மாதத்துக்கு முந்த் சகலவித  
மான செய்நேர்த்திகளும் செய்துவிட வேண்டும்.

**தகுந்த காலம் : --**

ஜூன், ஜூலை மாதங்களில் தான், முளைக்கிழங்கு  
கள் ஊன்றத் தகுந்த காலம். நல்ல பெரிய கிழங்கு  
களிலிருந்து நடுமுளைகளையும், விரளிக் கிழங்குகளையும்  
எடுத்துப் பாத்திகளில் நடவேண்டும். ஒரு பெரிய  
கிழங்கில் சுமார் 5 அல்லது 6 விரளிக்கிழங்குகள்  
இருக்கும். பாத்தி 1க்கு சுமார் 60 விரளிக்கிழங்கு  
கள் புதைக்கவேண்டும். முளைத்துக்கொஞ்சம் இலை  
விடுகிறவரையில் பயிர் வெயிலில் காய்ந்துவிடாமலிருக்  
கும்படி இலைகளால் மூட்டம்மீபோட்டு வைக்கவேண்



## சேனைக்கிழங்கு, கருணைக்கிழங்கு. 143

பாசனம் முதலியன :

பழைய காலம் தவிர, பாக்கிகாலங்களில் வாரம் 1 முறைவந்தம் செய்யப்பட்ட வேண்டும். களைகள் ஜாஸ்தியாக்களானும் போதெல்லாம் கையால் ஜாக்கிரதை பாய்க்கொத்திக்களை களை நீக்கவிடவேண்டும்.

வயசு அறுபடி, கண்டுமுதல் முதலியன: -

இது காயா 60 முதல்திய பரிர். ஜூன் மாதத்தில் முதைக்காலடி காயா மாதத்தில் இலைகள் பழுத்துகேழே விழுந்துவிடாது அறுபடி துகான் கிழங்குகளை வெட்ட வேண்டும். கிழங்குகளை வெட்டி அசடுகளை நீக்கி, காயாப்பார்க்கிழலில் ஜாக்கிரதையாய் வைக்கவேண்டும். முதல் வருஷத்தில் கிழங்கு வெட்டியானவுடன் இரண்டாவது வருஷம் ஜூன் மாதத்தில் வேறொரு பூரியில். அந்த செய்க்கீர்த்தி, அந்த உரத்தில், பாத்தி 1க்கு காயா 40 பெய் கருணைக்கிழங்குகள், புதைக்கப் படுகின்றன. கிழங்குகள் ஜனவரி மாதத்தில் அறுவடை செய்யப்படுகின்றன. முதல் வருஷத்து ஒரு கிழங்கைப்பார்க்கிலும் இது 4 பங்கு ஜாஸ்தி கனமுள்ள கிழங்காயிருக்கும். இதுவும் முன்போல ஜாக்கிரதையாய் கிழலில் பாதுகாத்து வைக்கப்படுகின்றது. மூன்றாம் வருஷத்து ஜூன் மாதத்தில் வேறு பூரியில் ஏகா ஒன்றுக்கு 40 வண்டி உரத்தில் பாத்தி 1க்கு 15 கிழங்குகள் வீதம் புதைக்கவேண்டும். இதை அடுத்த ஜனவரியில் அறுவடை செய்யும்போது மூன்றாவது வருஷத்து கிழங்கு இரண்டாவது வருஷத்து கிழங்



கைப்பார்க்கிலும் சுமார் 4 பங்கு கனம் ஜாஸ்தியாள்ள தாயிருக்கும். அடுத்த ஜூனில் வேறு பூமியில் அதே மூன்று வது வருஷத்திற் பயிருக்குள்ள செம்பைத்தி யில் பெரிய கிழங்குகளை விலக்கு வைத்துக்கொண்டு, சிறு கிழங்குகளைப் பாத்திக்கு சுமார் 8 விதா முதைக் கவேண்டும். நாலாவது வருஷத்தில் பயிர் 1 அடி உயரம் வளர்ந்து பூமியை நிழல் படுத்தி, பாலைவத்து நீரம்ப நன்றாயிருக்கும். இப்பயிருக்கு கடுவா ததை வருஷக்காக சணலைப் பூமியில் பயிரிடுவதாய் பாலைவ பாத்திகளின் கோடியில் பூசலி பரப்ப, சுரைக்காய் முதலிய பயிர்களைப் பயிர்செய்யலாம். பூசலி சுமார் 300 அல்லது 400 காய்களுக்கு குவையாய் சிடைக் கும். சுரைக்காய் 1000 கிடைக்கலாம். 4வது வரு ஷத்துக்கிழங்கு 3-வது வருஷத்துக் கிழங்குபார்க்கி லும் 4 பங்கு கனம் ஜாஸ்தியாயிருக்கும். அதாவது 1 சேனைக்கிழங்கு சுமார் 10 முதல் 20 பவுண்ட்வரையி லில் நிறையுள்ளதாயிருக்கும். அதாவது ஒரு ஏக்கர வுக்கு சுமார் 3000 சேனைக்கிழங்குகள் கிடைக்கும். இது சுமார் 15 டன் நிறையிருக்கும். இது சுமார் 1000 ரூபாய் விலையிருக்கும். நல்ல வெளிச்சமுள்ள அரையில் அடுக்கிவைத்திருந்தால் கெடாமல் வெகு நாள் வரையிலிருக்கும். நாலாவது வருஷத்தில் சாகு படிச் செலவு சுமார் 500 ரூபாய் ஆகலாம். இதிலும் சுமார் வருஷாவருஷம் சராசரியில் வருஷம் 1க்கு செலவெல்லாம்போக ரூபாய் 50 முதல் 100 வரையில்



## சேனைக்கிழங்கு, கருணைக்கிழங்கு. 145

கிடைக்கலாம். சில சேனைக்கிழங்குகள் 40 பவுண்டு நிறையுள்ளதாய்க்கூட இருக்கும்.

கருணைக்கிழங்கு சுமார் 6 மாதத்திய பயிர். ஜூனில் நடட்டால் டிசம்பர், ஜனவரியில் வெட்டலாம். ஏகரா ஒன்றுக்கு விதைக்க 10, 15 மணங்கு விரளிக் கிழங்குகள் செல்லும். செய்கோர்த்தி யெல்லாம் சேனைக் கிழங்குகளுக் குள்ளதுபோலத் தான். ஏகரா ஒன்றுக்கு சுமார் 2000 மணங்கு கிழங்கு கண்டுமுதல் கிடைக்கும்.

---



மாவள்ளிக் கிழங்கு.



மாவள்ளிக் கிழங்குப் பயிர்.



பயிரின் சுபாவம் :—

இதற்கு ஆள்வள்ளிக் கிழங்கென்றும், சவாரிக்கட் டை என்றும் பெயருண்டு. இக்கிழங்கில் பச்சையில் ஒரு மகா விஷவஸ்து இருக்கிறது. வேகவைத்தால், விஷவஸ்து போர்விடும். இவ்விஷயம் தெரியாததினால் தான், ஏழைகள், பசியின்கொடுமையால் பச்சைக்கிழங்கைத் தின்று உயிர்மாண்டிருப்பது, அநேகருக்குத் தெரியும். ஆகையால் கிழங்கை வேகவைத்தே உண்ண வேண்டும். இதை ஒருகிழங்குவகைப் பயிராகவும், உணவுப்பயிராகவும், சாகுபடிசெய்யலாம். இது முக்கியமாக ஏழைகளுக்கு உணவுக்கு உபயோகப்படுகிறது. இக்கிழங்கினிருந்து உண்டாகும் டப்பாக்கி அல்லது பிசின் அரிசி பணக்காரர்களுக்கு உணவாகிறது. இப்பயிரின் இலையை மாடுதின்னும். செடி, நிரம்ப அழகுள்ளதால், பூத்தேதாட்டங்களில், அழகுக்காகப் பயிர் செய்வது வழக்கம். இதை வேலிப்பயிராகவும் சாகுபடிசெய்யலாம். நமது இராஜதானியில் எங்கேயும் சாகுபடி செய்தபோதிலும், முக்கியமாக அனந்தசயனம், மலையாளம் பக்கங்களில் சாகுபடிசெய்வது ஜாஸ்தி. இதில் அநேக மாதரிக ளிருக்கின்றன.

தகுந்த பூமிகள் :—

நல்லவழிகால் வசதியுள்ள பொலபொலத்த மண்ணையுடைய மேட்டுக்கால் பூமி சிலாக்கியம். தேட்டக்கால், நல்லவளமுள்ள மணல் சாரி பூமியிலும் வரும்.



## 148 கிழங்குவகைப் பயிர்கள்.

உரம் :—

ஏகர் 1க்கு சுமார் 20 வண்டி சாணம், சாம்பல், குப்பை குறையாமல், ஒரு கொடுக்கவேண்டும்.

செய்நேர்த்தி :—

கோடை மழையில் பூமியை நன்றும் நீ, (தரம் உழுது, உரமடித்து பாப்பி, சுத்தமாய் மேடு பள்ளம் நீரவி, வைத்திருக்க வேண்டும். பாத்திகள் கட்டி பாத்திகளில் சிறு முகடுகளும், படைச் சாட்களும் போடவேண்டும். முகடுகள் சுமார் 3 அடி வித்தியா சுத்திலிருக்கவேண்டும்.

தகுந்தகாலம், விதைப்பு, முதலியன :—

மலையாளப் பக்கத்தில் மார்ச்சு, ஏப்பிரல் மாதமும், கடலூர் முதல் திருநெல்வேலி வரையில், பதியன்களை நட, சூலை, ஆகஸ்டும் தகுந்த காலம். இக்காலங்களில் 4 முதல் 8 அங்குலம் நீளமுள்ள கிளைகளை வெட்டி முகடுகளில் சுமார்  $1\frac{1}{2}$ , 2 அடிவித்தியாசத்தில் சாய்வாய் நடவேண்டும். கட்டவுடன் பதியின்களின் உச்சியில் சிறுசாண உண்டையால் கிரீடம் சாத்த வேண்டும். சிலர் 2, 3 அடி நீளமுள்ள பதியன்களை கட்டால் சீக்கிரம் பயிர் உண்டாகுமென்று சொல்லுகிறார்கள். இப்பயிருக்கு நடுவில் முத்துச்சோளமும், மானவாரி நெல்லுகளும் சாகுபடி செய்யலாம். அல்லது உரத்துக்காக சணலைப் பயிர் செய்து பூமியில் மிதித்துவிடலாம். ஏகர் 1க்கு சுமார் 20,000ம் பதியன்கள் செல்லும்.



பாசனம், கொத்தல், களைபிடுங்கல், முதலியன :—

மழை இல்லாத காலத்தில், வாரம் ஒருதரம் ஜலம் இறைக்க வேண்டும். அநேகவிடங்களில் ஜலம் இறைக்காமலே சாகுபடி செய்யப்படுகிறது. பயிர் பூரிசைய நிறில் படுத்துகிற வரையில் கொத்தி, களை பிடுங்க வேண்டும். நிறில் உண்டாகி விட்டால் களைகள் ஜாஸ்தி இருக்காது. கொத்தும்போது மண் அணைத்து வாரம் கொடுப்பது திறம்.

வயசு, அறுப்பு, கண்டுமுதல், முதலியன :—

இது சுமார் 9, 10 மாதத்துப் பயிர். சிலமாதிரி கள் 6 மாதத்திலேயும், சிலது 18 மாதத்திலேயும், முதிர்கிறதாம். டிசம்பர், ஜனவரியில் தோட்டக்கா லில் நடவால் கவம்பரில் கிழங்கை வெட்டலாம். பாசனம் கொடுக்காத பூரியில் ஜூலை கடைசியிலாவது அல்லது ஆகஸ்டி முதலிலாவது நட்டால் பிப்ரவரி, மார்ச்சில் வெட்டலாம். ஏகர் 1க்கு சிலோனில் 10 டன் பச்சைக்கிழங்குகளும், இதை காயவைத்தால் 2½ டன் கிழங்குகளும் கிடைக்குமாம். இந்த 2½ டன் கிழங்கிலிருந்து சுமார் 2,800 பவுண்டு மாவு கிடைக்கு மாம். சாராசரி கண்டுமுதல் ஏகர் 1க்கு சுமார் 12,000 பவுண்டு பச்சைக் கிழங்காக வைத்துக் கொள்ளலாம். 18 மாதத்தில் வெட்டுகிற ஒரு கிழங்கு சுமார் 10 முதல் 25 பவுண்டு நிறை இருக்கிற தாம்.





மாவள்ளிக் கிழங்கு.



கைத்தொழில் (டப்பாக்கி அரிசி செய்யும்விதம்) :--

பச்சைக் கிழங்குகளை வெட்டி சுத்தப்படுத்தி, ஜலத்தில் கழுவி, ஒரு தொட்டி ஜலத்தில் சுமார் 6 மணி நேரம் போட்டு வைத்திருக்க வேண்டும். போட்டு வைத்தால், கையால் மேல்தோலை, சுலுபமாக உரித்துவிடலாம். பிற்பாடு திருகுபலகையால் சுறண்டி, தூள்களைப் பிழிந்தால், பால் உண்டாகும். அந்தப்பாலை 8 மணி நேரம் ஒரு சிறு தொட்டியில் வைத்திருந்தால், மாவு, கீழ்ப்படிந்துவிடும். பிற்பாடு தெளிவுஜலத்தைக் கொட்டிவிட்டு, மாவை ஒரு தட்டியில் போட்டு 2, 3 மணி சாவகாசம் வெய்யிலில் காயவைக்க வேண்டும். பிற்பாடு சூடுள்ள தட்டுகளில்போட்டு, கிளறவேண்டும். இப்படிச் சிளந்தனால மாவெல்லாம் சிறு உண்டை உண்டையாய் சேர்ந்து விலைக்குத் தயாராகிவிடும். 1 பவுண்டு டப்பாக்கி அரிசி 4 அணு விலை. கிழங்கின் ரசத்திலிருந்து ஒருவித சாராயம் காய்ச்சலாம்.



# சேப்பங் கிழங்கு.

—:0:—



சேப்பங்கிழங்குப் பயிர்.



**பயிர்ச் சபாவம் :—**

இதற்குச் சாமைக் கிழங்கு என்றும் பெயருண்டு. இதை ஒரு கிழங்குவகைப் பயிராகவும், கரிகாய்ப் பயிராகவும் சாகுபடி செய்யலாம். இதின் இலை, கிழங்கு, தண்டு, முதலியன சமையல் செய்வதற்கு முன்னால், மிகவும் காலாரிருக்கும். இதில் அநேக திணுகள் உண்டு; வால்கரைகளில் சில இடங்களில் சேம்பு, சாகுபடி பன்னியில் காய் வளர்த்திருப்பது ஒரு திணுக. நீர்ச் சேம்பு ஒரு திணுக. இதை அநேகமாய்த் தனிமையில் சாகுபடி செய்யப்படுவதில்லை. கொல்லைகளிலும், கிணற் றீரூரங்களிலேயும் கரிகாய்க்காக சாகுபடி செய்யப்படும. தோட்டக்காவில் அநேகமாய் இதர பயிர்களைக் கலந்துதான் சாகுபடி செய்யப்படுகின்றது. ஜூன் தி விஸ்தீரணத்தில் இதை அதிகமாகச் சாகுபடி செய்யப்படுவதில்லை.

**தகுந்த பூமிகள் :**

கைப்புள்ள பூமியில் நன்றாய் வரும். சாக்கடைக் கும்பிமண்ணில் வெகு நன்றாய் வரும். தோட்டக்கால் பூமிகளில் நன்றாய் வரும்.

**செய் நேர்த்தி :—**

இது தனிமையில் சாகுபடி செய்யப்பட்டால், பூமியை 5 அல்லது 6 தரம் நன்றாய் உழுது, சுத்தப்படுத்தி மேடுபள்ளம் நிரவி, 12 அடி நீளம் 6 அடி அகலமுள்ள பாத்திகள் உண்டாக்கி, பாத்திகளில் 40 செடி வீதம்



## 154 கிழங்குவகைப் பயிர்கள்.

பயிர்செய்யவேண்டும். பூமியை நன்றாய் உரப்படுத்த வேண்டும்.

தகுந்தகாலம். விதைப்பு. முதலியன.

ஜூன், ஜூலை விதைக்கத் தகுந்தகாலம். பாத்தி 1க்கு 2 விசை விதைக்கிழங்கு செல்லாம். விதைக்கிழங்கைப் பாத்தியில் கிழங்குக்காகப் பயிர் செய்தால், 1 அடி வித்தியாசத்தில் புதைக்கவேண்டும். சேலாந்தண்டு, இலைக்காகச் சாகுபடி செய்தால். துளிகளை நீக்கவேண்டியதில்லை. கிழங்குக்காக சாகுபடி செய்தால் வேர்விடுவதற்கு முந்தி துளிகளை நீக்கிவிட வேண்டும். இதற்கு வாரம் ஒருமுறை வேண்டிய போது ஜலமும், அவசியமான போதெல்லாம் கொத்தி, களைபிடுங்கி, உரம் அணைப்பது திறம்.

வயகு, அறுப்பு, கண்டுழதல். முதலியன :

இது சுமார் 10 மாதத்திய பயிர். விதை புதைத்து 4, 5 மாதத்துக்கெல்லாம் இலைகளையும் தண்டுகளையும் மூன்று அல்லது நான்கு நாளைக் கொருதரம் பறிக்கலாம். இளந்தண்டுகளையும் இலைகளையும் பறிக்கும் போது, பூமியின் மட்டத்துக்குப் பறிக்கவேண்டும். ஒவ்வொரு செடியிலும் சில முதிர்ந்த இலைகளை வைத்திருக்கவேண்டும். ஏகர் ஒன்றுக்கு சுமார் 1,000 மணங்கு கிழங்கு கிடைக்கும். இது சுமார் ரூபாய் 200 விலை.



# சர்க்கரை வள்ளிக்கிழங்கு.

—:():—



சர்க்கரை வள்ளிக்கிழங்குப் பயிர்.



**பயிரின் சுபாவம் :—**

இதை ஒருகிழங்குப் பயிராகவும், உணவுப் பயிராகவும், சாகுபடி செய்யலாம். கிழங்கை கரிகாய்க்கும் பிரயோசனப்படுத்தலாம். இதில் சிகப்பு வள்ளிக்கிழங்கென்றும், வெள்ளை வள்ளிக்கிழங்கென்றும் 2 தினுசு உண்டு. சிகப்பில் அதிக கொடிகள் இருக்கும். அதிக ருசியாயிருக்கும். வெள்ளை வள்ளியில், கண்டுமுதலதிகம். சிகப்பில் கண்டுமுதல் கம்பி. இதை ஒரு தோட்டக்கால் பயிராகவும், மாரிகால்பயிராகவும் சாகுபடி செய்யலாம்.

**தருந்த பூமிகள் :—**

கல்ல வடிகால் வசதியுள்ள மணல் கலந்த வண்டல், களி, செவ்வல், கரிசல், முதலிய பூமிகள் திறம். எந்த தோட்டக்கால் பூமியிலேயும் சாகுபடி செய்யலாம். மணல் பூமியிலேயும் சாகுபடி செய்யலாம். ஆனால் உரம் ஜாஸ்தியாய் கொடுக்கவேண்டும். களைகள் ஜாஸ்தியுள்ள பூமியிலேயும், சாகுபடி செய்யலாம். செய்தால் பயிர் சுமாராய் வருவதுடன் கொடிகள் படர்ந்து களைகளைத் தொலைத்துவிடும்.

**தருந்த உரம் :—**

ஏகர் 1க்கு 30 வண்டிக்கு குறையாமல் உரம்கொடுக்கவேண்டும். இதற்கு மா உப்பு ஜாஸ்திபிரியமானதால் சாம்பல் உரமே ஜாஸ்தியாக அடிக்கவேண்டும். சுமார் 15 வண்டி சாணமும், 15 வண்டி சாம்பலும் அடிப்பது திறம். பசுந்தழை உரத்துக்காக ஏதாவது ஒரு



பூமி முன்சாகுபடி செய்திருந்தால், அதைப் பூமியில் உழுது 11 அக்கச்செய்தாலும் நல்ல உரமாகும்.

செய் நேர்த்தி :—

ஜூலை, அகஸ்ட்டில் 6 தாத்துக்குக் குறையாமல் உழுது, வேர்வாரியால் 2, 3 தடவைவேலைசெய்து, பூமி பை சுத்தம்செய்து, மேடு பள்ளம் நீர்வி, செட்டம்பரில் 30 வண்டி உரம்கொடுத்து, மறுபடி உழுது, பாத்திகள் கட்டியாவது அல்லது முகடுகள் போட்டாவது, கொடிகளை நடவேண்டும். பாத்திகள் போடும்பட்சத்தில் சுமார் 12 அடி நீளம் 6 அடி அகலமிருக்கவேண்டும். முகடுகள் போட்டால் அலுவகள் சுமார் 2 அடி வித்தி யாசத்திலிருக்கவேண்டும். பாத்திகள் சாகுபடியைப் பார்க்கிலும் முகடுகள் சாகுபடிதான் சிலாக்கியமாம்.

நாற்றங்கால் :—

மாகுல் எடுக்கும் சமயத்தில் நல்ல முதிர்ந்த கொடிகளை அறுத்து 3 கணுக்களையுடைய பதியன்களாக நறுக்கி, 2 கணுக்கள் 2, 3 அங்குல ஆழத்தில் பூமியில் புதைக்கப்பட்டு, பாக்கி ஒருகணு வெளியில் இருக்க வேண்டும். சாதாரணமாய் நாற்றங்கால் ஜலவசதிக்கு சமீபத்தில் இருப்பது திறம். பூமியின் கீழிலுள்ள 2 கணுக்கள் வேர் விட்டு, மேல்காற்று நாளில் கொடிகள் செழுமையாக வளர்ந்து ஓடி இருக்கும். இவைகளிலிருந்துதான் பதியன் களைநறுக்கி, தயார்செய்திருக்கிற பூமிகளில் ஊன்றவேண்டும். நல்லபதியன்கள், கொடித் தண்டின் நடுபாகத்திலிருந்து எடுக்கப்படும்.



வேர்ப்பக்கம் இருக்கப் பட்டவைகளையும், புதிதாய் கொடிவிடும் இளமையான பாகங்களையும், பதியன்களுக்காக எடுக்கப்படுகிறதில்லை. பதியன்களை நறுக்கும் போது கணுக்களிலுள்ள சில்லரை மீவர்களை அரிந்து விடவேண்டும்.

**தகுந்தகாலம், ஏதைப்பு, முதலியன :—**

அக்டோபர், நவம்பர்மாதம்தான் பதியன்களை வயல் பாத்திகளிலாவது அல்லது முகடுகளிலாவது நடத்தகுந்தகாலம். ஏகர் 1க்கு சுமார் 6 ரூபாய் பதியன்கள் செல்லும். பாத்திகளில் 1½ அடிவித்தியாசத்திலுள்ள வரிசைகளில் 1 அடிவித்தியாசத்தில் நடப்படுகின்றன. முகடுகளில் 1 அடி இடைவெளியில் பதியன்கள் நடப்படுகின்றன. 12 அடி நீளம் 6 அடி அகலமுள்ள ஒரு பாத்தியில் சுமார் 100 பதியன்கள் நடுப்படியாயிருக்கும். 16 முதல் 24 அங்குலம் நீளமுள்ள பதியன்களை கட்டால் சிறுபதியன்களைப் பார்க்கிலும் ஜாஸ்தி வரும்படி கொடுக்கிறதாக தெரியவருகிறது. ஏகர் 1க்கு சுமார் 20,000 பதியன்கள் செல்லும். சிலர் 10,000 பதியன்கள் போது மென்கிரார்கள்.

**பாசனம், கொத்தல், களைபிடுங்கல், முதலியன :—**

முகட்டுச்சாகுபடியில் பாசனம் சிலாக்கியம். பாத்திகளில் அவ்வளவு சிலாக்கியமல்ல. ஏனெனில் முகடுகளில் செட்டான பாசனம் ஏற்படுவ தல்லாமல், பயிர்களும் சிலசமயம் அதிகஜலத்தால் கெடுகிறதில்லை. மழை இல்லாத காலத்தில் சுமார் 10 நாளைக்கு ஒரு



தண்ணீர் இறைத்துக்கொண்டு வரவேண்டும். பயிர் பூரியை கிழல் படுத்துகிற வரையில் களை எடுக்க வேண்டும் ; பிற்பாடு, வேண்டியபதிலை, பயிர் வளர்கிற சமயத்தில், கொடிகள் ஒடி கன்றாய் இருந்தால், அடிக்கடி கொடிகளை, பூரியின் மேரில் தூக்கி விட்டு, கண்ட இடங்களிலெல்லாம் வேர்விடாமலிருக்கும்படி செய்ய வேண்டும். இப்படிச் செய்யாதபட்சத்தில், பாசனத்தினால் ஒவ்வொரு கணுக்களிலும் வேர் ஒடி கிழங்கு நிரம்பி அறுத்துப்போய்விடும். நல்லவிலை கிடைக்காது. பயிர் பஞ்சை யாயிருந்தால் இப்படிச் செய்யவேண்டிய நிலை. கொடித்தண்டுகளை தூக்கிவிடும்போது இலைகளும் தண்டுகளும் சேதப்படாமல் ஜாக்கிரதையாக தூக்கிவிடவேண்டும். இப்படிச் செய்தால் முக்கிய வேர்களிலுண்டாகும் கிழங்குகள் பெருத்து, நல்ல விலைமீடாகும். பயிர் காடாய் வளர்ந்திருந்தால், நுனிக் கொடிகளை அரிந்து மாட்டுக்குப் போட்டுவிடலாம்.

**வயசு, அறுப்பு, கண்டுழதல், முதலியன :—**

இது சுமார் 6 மாதத்துப்பயிர். அக்டோபர், நவம்பரில் நட்டால் மார்ச்சு, ஏப்பிரலில் வெட்டலாம். சூன், சூலையில் நட்டால் டிசம்பர், ஜனவரியில் வெட்டலாம். அநேக இலைகள் பழுத்து உதிர்ந்தாலும்கூட, அல்லது கணுக்களிடத்தில் நிரம்ப வெட்டியாய் நார் நாராயிருந்தாலும்கூட, அல்லது ஒரு கிழங்கை வெட்டிகத்தியால் அறுத்துக் கறுப்பு நிறம் அடையாவிட்டாலும்கூட, பயிர் முதிர்ந்துவிட்டதாக எண்ணலாம். கொடிகளை



எல்லாம் பூமியோடு அறுத்து அடுத்த பயிருக்காக நாற்  
றங்காலுக்கு நல்ல பதியன்களை எடுத்துவைத்துக்  
கொண்டு, பாக்கியை மாட்டுக்குப் போட்டுவிடலாம்.  
கிழங்கை மண்வெட்டி யினாலாவது அல்லது சாதாவிடி  
னாலாவது வெட்டலாம். ஏகர் 1க்கு சுமார் 4 டன்  
கிழங்கு கிடைக்கும். ஜாஸ்தி கண்டுமுதல் 6 டன்  
கூட கிடைக்கலாம். 6 டன் கிழங்கு சுமார் ரூபாய் 300  
விலை. சாதாரணமாய் மொத்தவருமானம் ரூபாய் 200  
கிடைக்கலாம். ஏகர் 1க்கு செலவு சுமார் ரூபாய்  
140ம், மொத்த வரும்படி சுமார் ரூபாய் 200ம். செலவு  
எல்லாம்போக ஏகர் 1க்கு சுமார் ரூபாய் 50 கிடைக்  
கலாம். ஏகர் 1க்கு சுமார் 6,000 பவுண்டு கொடிகள்  
கிடைக்கும்.

கைத்தொழில் :—

இது பஞ்சகாலத்துக்கு உணவாகிறது. இதின்  
இளம் இலைகளை கரியாக சமைக்கலாம். கிழங்கிலிரு  
ந்து ஒருவிதமாவு உண்டாக்கலாம். இதை மாடுப்  
பன்றிய்த் தின்னும்.



உருவளக் கிழங்கு.



உருளைக்கிழங்குப் பயிர்.



**பயிரின் சுபாவம் :**

இது மலைப்பிரதேசங்களில் தானை சாகுபடி ஐஸ்தி. சமீபூரிகளில் அவ்வளவு கண்டறிய வராதது. தோட்டக் காவில எங்குமே சிறுபான்மை சாகுபடி செய்யப் படுகிறது. இதில் வெள்ளையும், கொஞ்சம் மாஞ்சள் வர்ணமுள்ள மாதிரியும் நிரம்பத் திறமாம். இதை ஒரு கிழங்குப்பயிராகவும், உணவுப் பயிராகவும் சாகுபடி செய்யலாம். ஐரிஷ் (Irish) ஜாதியார்களுக்கு இது முக்கிய உணவு. இது ஒரு மார்க்கலத் தோட்டக்கால் பயிர். இது எப்போதும் தனியாயில்தான் சாகுபடி செய்யப்படுகிறது. கமது இராஜதானியில் நீலகிரி, பழனி, பெங்களூர், உதிகமண்டலம் முதலிய இடங்களில் ஏராளமாய் பயிரிடப்படுகின்றது. ஒரே வருஷத்தில் சில இடங்களில் 3 போகமுட, சில இடங்களில் 2 போகமுட சாகுபடி செய்கிறார்கள்.

**நடுத்த பூமிகள் :—**

கல்லவடிகால் வசதியுள்ள பொலபொலத்த மண்ணையுடைய பூமி திறம். கிரம்ப உரமேற்றப்பட்ட மணல் சாரியும் திறம். தோட்டக்கால கரிசனிலும் செவ்வளியும் வரும்.

**செய் நேர்த்தி :—**

ஜ-ஒன்மாதம் முதல் செப்டெம்பர் மாதம் வரையில் அடிக்கடி சமயம் நேர்த்தி போதெல்லாம் 6 உழவுக்குக்குறைபாமல் உழுது வேர்வாரியால் வேலைசெய்து, சுத்தப்படுத்தி, ஏகரா ஒன்றுக்கு 30 வண்டிக்குக்குறை



யாமல் மடித்த சாணம் அடித்து, பாப்பி, மறுபடியும் உழுது புரியை எருவுடன் கலந்து, தூவாளியாக்கி, 2 அடி வித்தியாசத்தில் முகடுகள் போட்டு, கண்ணிகளும் ஏற்படுத்தி, இப்படி நல்ல செய்கேர்த்தியுடன் முடி இருக்க வேண்டும். உருளைக்கிழங்குக்கு மா உப்பு சிறியபால்தால் சாம்பலும் பொட்டிலுப்பு மண்ணும் சாணத்தோடு கலந்து அடிப்பது திறம்.

**தீதுத்தகாலம், விதைப்பு, முதலியன :—**

அக்டோபர், நவம்பராதத்திலும், ஜூன், ஜூலையிலும், விதைக்கிழங்குகளை ஊன்றலாம். முதல்போகம் ஜூன், ஜூலையிலும் 2-ஆம் போகம், அக்டோபர், நவம்பரிலும் விதைக்கத்தகுந்தகாலம். முகடுகளில் ஒன்றரைபடி வித்தியாசத்தில், கிழங்குகளையாவது அல்லது கண்முளைகளை யாவது புதைக்கவேண்டும். மட்டமான பாத்திகளிலும் ஊன்றலாம். விதைக்கு நடுத்தரமான கிழங்கு திறம். ஏகா ஒன்றுக்குச் சுமார் 1,200 பவுண்டு கிழங்குகளிலிருந்து கண்முளைகளை வெட்டியாவது அல்லது சுமார் 1500 பவுண்டு முழுக்கிழங்குகளையாவது புதைக்கலாம். கண்முளைகளில் சிறிய பலவீனமான கிழங்குகளும், மற்றதில் பெரிதான கிழங்குகளும் உண்டாகிறதாம். ஆகையால் கண்முளைகளைப் பார்க்கிலும் முழுக்கிழங்குகளை விதைக்க சிலாகியமாம். பாத்திகள் சாகுபடியைப் பார்க்கிலும் முகடுகள் சாகுபடியே திறம். பாத்திகளில் கண்முளைகள் 9 அங்குல வித்தியாசத்தில் போடப்படுகின்றன. விதை



க்கிழங்கு, முழுதாய் நடுர்பட்சத்தல்,  $1\frac{1}{2}$  அங்குலம் முதல்  $1\frac{1}{2}$  அங்குலம் சுற்றளவுள்ளதாயிருக்கவேண்டுமபாசனம். கொத்தல் களைபிடுங்கல்.

வாரத்துக்கு 1 முறை வீதம் ஜலம் பாம்ப்ச்ச வேண்டும. விதைத்து 1 வாரத்துக்குள் முளைகண்டுவிடும். மூன்று வாரத்துக் கொருதாய் களைபிடுக்கவேண்டும. அசுமொத்தம் இரண்டு கொத்தலும், 2 மண்ணைபாடிய திரும்ப மண்ணை + குப்பை சாயலுமா போடும், லுப்பா மண்ணும் உரம்பாபது திரும்ப வார்த்தா சுமார் 10) தடவை ஜலம் பாம்ப்ச்சமபடியா பிநசுதும்.

வயகு, அறுப்பு, கண்டுழதல், முதலியன :

இது சுமார் 4 மாதத்தாய் பயிர். அக்டோபரில் விதைபை ஊன்றினால் மார்ச்சில் கிழங்குவெட்டலாம். பயிர் வாடி பழுப்பாய்ப்போனவதான் பயிர் முதிர்ந்ததற்கு அடையாளம். கிழங்கு வெட்டுவதற்கு 2 வாரத்திற்கு முந்தியே இறவையை நிறுத்திவிடவேண்டும். ஏகரா ஒன்றுக்கு சுமார் 12,000 பவுண்டு கிழங்கு கிடைக்கும். சிலசமயம் 18,000 பவுண்டு வரையில்கூட கிடைக்கலாம். 1 ரூபாய்க்கு 60 பவுண்டு வீதம் ஏகராவுக்கு மொத்தவருமானம் சுமார் ரூபாய் 200. சாகுபடிச்செலவு சுமார் ரூபாய் 130 போனாலும் ஏகரா ஒன்றுக்கு செலவெல்லாம்போக சுமார் ரூபாய் 70 கிடைக்கும். கிழங்குகளைப் பெரிதாகவும், நடுத்தரமாகவும், சிறிதாகவும், மூன்றுவிதமாகப் பிரித்து,



உலல வெளிச்சமுள்ள அரையில் அடுக்கி வைக்க  
மீவிட்டும்.

சுகத்தொழில் :—

இதிலிருந்து ஐருளிதமாள மாவும், சாராயமும்  
உண்டாக்கலாம்.

---





4



பயிர் கபாவம்:—

இது சர்க்கரை கொடுக்கும் பயிர்களில் ஒன்று. இது நிலத்தை கீர்ப்பு சளைக்கப்படுகின்றது. ஆகையால் ஒரோபுறத்தில் அதிக ஒரு அன்னியில் சாகுபடி செய்யக்கூடாது. இது ஒரு தோட்டக்கால் பயிர். இதில் எந்தாளி என்றும், காயக்கரும்பென்றும், செங்கரும்பென்றும், காணல் கரும்பென்றும், பூவன் கரும்பென்றும் அநேகவகைகள் உண்டி.

மாதிரிகள்:

கரும்பில் அநேக திணைகள் இருந்தபோதிலும், எல்லாவற்றையும் திரண்டு பெரிய பிரிவுக்குள்ளடக்கி விடலாம். அதாவது:—

“(a) அடிக்கடி ஏராளமான பாசனத்தை அபேக்ஷிக்கிறதாயும், சுற்றளவு பெரிதாயும், சாறு ஜாஸ்தி கொடுக்கக்கூடியதாயும், சுலபமாகக் கடிக்கக்கூடியதாயும் உள்ளவைகள் ஒருவர்க்கும்.

(b) பாசனம் கம்மியாயும் அடிக்கடி அபேக்ஷை இல்லாமலும், மெலிதாயும், கடிக்க மிகவும் கெட்டியாயும், சாறு குறைச்சலாயு முள்ளவைகள் மற்றொரு வர்க்கத்தைச் சேர்ந்த திணைகள்.” கரும்பிலுள்ள எல்லா மாதிரிகளும் இந்த இரண்டு வர்க்கத்தின் சுபாவங்களை ஏற்றத்தாழ்வுடன் உடையனவாயிருக்கும்.

தகுந்தபூமிகள்:—

பொலபொலத்த மணல் சம்பந்தமுள்ள களிமண் பூமியிலும், வளமுள்ள படுகை நிலங்களிலும் வரும்



## 168 சர்க்கரை கொடுக்கும் பயிர்கள்.

நல்ல வடிகால் வசதியுள்ள மேட்டுப்பூரியாம் இருக்க வேண்டும். நான்கு பக்கமும் நெல்வயலான சூழ்ந்த பள்ளத்தாக்கு நஞ்சை கூடாது. நன்கான சம்பந்தமுள்ள களிமண் பூரியிலும் வருமா. சுமார் 10 பாதம் பாசனக்குறைவில்லாத பூரியாயிருக்கவேண்டும். மேட்டுக்கால் நஞ்சையிலுமா வருமா. நல்லவடிகால் வசதியுள்ள பாசனத்திக்குக் குறைவில்லாத மேட்டுக்காலான மணல சம்பந்தமுள்ள களிமண் பூரியை சாவரலாகியும்.

**நதிநீர் உரம் :—**

ஏகர் 1க்கு 30 டன் மழைநீர் கொட்டில் வருவானது அல்லது 60 வண்டி மாலாவது உரமாகக் கொடுக்க வேண்டும். இது கிடைக்காவிட்டால் பிண்ணாக்கு உரங்களையும் அடிக்கலாம் ஏகர் 1க்கு சுமார் 30 டன் கொட்டைப் பிண்ணாக்கையாவது அல்லது விவாழ்விண்ணாக்கையாவது உரமாகக் கொடுக்கலாம். கருப்பு கொழுந்தாடை, சக்கை, சரகு முதலியவைகளை, குழிகள் வெட்டி, அவைகளில் போட்டு இன்னும் மற்றக் கூளங்குப்பைகளையும் சேர்த்து, மண்ணை வெட்டி மூடி, மக்கும்படிசெய்து, ஏகர் 1க்கு 30 வண்டிக்குக் குறையாமல் பிண்ணாக்கு உரத்துடன் அடிப்பதும் திறம். கூளம், கொழுந்தாடை முதலியவைகளை ஜாக்கிரதையாய்ச் சேர்த்து எருவாக்கினால், எருவில் அதிகசெலவு நேரிடாது. ஆட்டுக்கடை, மாட்டுக்கடை, வைக்கலாம். பசுந்தழை உரமாக சணல் முத



ஸிம பரிசுடன் பூமியில் உண்டாக்கி நிதித்திக் கரும்பை வளப்படுத்தலாம். மீள உரமும் கொடுக்கலாம்.

கொ நேர்த்தி

கொண்ட மழையில் செளகிரியப்பட்டு போதெல்லாம் பூமியை உழுது கல்ல தாவாளியாய் வைத்திருக்க வேண்டும். சுமார் 10 ஆழ உழுவுக்குக் கமமிப்படக் கூடாது. காட்டுக்கலாபை அதிக ஆழம் போகாததினால். காயாபாறபால பூமியைப் பிரித்து, கொத்தி வாங்குவது திறம். இக்கடப்பாறைக் கொத்த வுக்கு ஏகா 1க்கு சுமார் ரூபாய் 10க்குக் குறையா பால் செலவாகுமாம். ஆழந்த உழுவுக்கு சீமைக் கலப் பாபாபே உபயோகிப்பது திறம். கன்றாய் உழுத பிற்பாடு களை, புல, வீவர் முதலியவைகளை நீக்க மொவாயால் வேலைசெய்து, கட்டிகளை உடைத்து போடுபள்ளம் நீவி, ஒரு ஏராளமாக அடித்து, பாபடி, பூமிகளில் மூன்றடிக் கொருதாம், எங்கும் இரண்டடி அகலம், ஓரடி ஆழமுள்ள குழிகளை உண்டாக்கிப் பதியன்களை நடலாம். அல்லது மூன்றடி வித்தியாசத்தில் ஒருஅடி ஆழம் ஒருஅடி அகலமுள்ள கிண்துகளை வெட்டியாவது பதியன்களைப் புதைக்கலாம். பூமி வளமாயிருக்கும் பட்சத்தில், கிடங்குகள் 4 அடி வித்தியாசத்தில் இருந்தால் போதும். முகடுகளும், படைச்சால்களும் ஏற்படுத்தி, முகடுகளிலும் சாகுபடிசெய்யலாம். முகடுகள் சுமார் 2 அடி வித்தியாசத்திலிருக்கலாம்.



## 170 சர்க்கரை கொடுக்கும் பயிர்கள்.

தகுந்த காலம், விதைப்பு, முதலியன :

கரும்பு சாகுபடிக்கு பாது ஜாஜானியில் இரண்டு கொல முண்டு. ஒன்று பிர்வரி மார்ச்சிலும். இன்னொன்று ஜூன் ஜூலை ஜூன் மாதமே மிகவும் வேலானது : என்னினிற் பிப்ரரி 7, 8 மாதத்துக்கு ஜலக்குறைவே பிப்ரரி 20 கரும்பை, கொழந்தாடைமா லுப் பதியன்களாலும். மாற்று களிஞ்ஞலும் முதல் வருஷத்து அடிக்கா னையிருந் தும் உண்டாக்கலாம். பதியன்களால் உண்டாக்கு வதுதான் சிலாக்கியம். கொழந்தாடைமார் பார்க்கி லும் பதியன்களிஞ் ஹண்டாக்குவது பிள்ளையாம் கொடுக்கிறதாம். முதல் வருஷத்து அடிக்கா னையி லிருந்து உண்டா குப் பயிருத்தல் சாகுபடி சிசுவெல லாம் குறைவாயிருந்த போதலும். வரும்படியில் பதியன்களைப் பார்க்கிலும் கம்மிதானும். பதியன் களைக் குழிகளிலாவது அல்லது கிடங்குகளிலாவது அல்லது முகடுகளிலாவது நடவேண்டும். குழிகளில் 2 பதியன்கள் விழுக்காடும், கிடங்குகளில் மூன்று நாலடி வித்தியாசத்தில் 2 பதியன்கள் வீதமும் அடியில் புதைக்கவேண்டும். முகடுகளில் நிரம்ப கிட்ட நடப் படுவதால் ஏகர் 1க்கு சுமார் 20,000 பதியன்கள் கடு கிறார்கள். சிலசமயம் ஜாஸ்தி பதியன்களும் நடப் படுகின்றனவாம். இப்படி ஜாஸ்தியாகப் பதியன்களை நட்டால் கரும்புகள் ஒங்கி வளர்ந்து கீழே விழுந்து வெல்லம் ஜாஸ்தி காணாதாம். ஆகையால் மூன்றடி



வித்தியாசத்தில் ஒரடி ஆழமுள்ள குழிகளில் அல்லது கிடங்குகளில் இரண்டு பதியன்கள் வீதம் நடுவதே மிகவும் பலவது. இப்படித்தான் மொரீசில் (Mauritius) நடுகிராசுமாய். இந்த மொரீஸ் மாதிரியில் ஏகர் 1க்கு சுமார் 13,000 பதியன்கள் செல்லுமாம். இந்தமாதிரி சாகுபடியின் விசேஷம் யாதெனில், “சர்க்கரை கண்டுமுதல் ஜாஸ்தி கொடுப்பதோடும் கூட, இன்னும் அதிக நன்மைகள் இருக்கின்றன. அதாவது சுமார் 7,000 பதியன்கள் ஸாமமாகும். பயிர் கலக்க இரப்பதால் காற்றை பழையால் பயிர் கீழேவிழாமல். பயிர் கீழேவிழாமலிருந்தால் வெல்லம் ஜாஸ்தி காணும்.” பதியன்களுக்கு நல்ல பழுத்த கழிகளாக இருக்கவேண்டும். பதியன்கள் நடுவில் ஒருகணுவையும்கூட இரண்டு கோடிகளிலும் கணுவொடு ஆக மூன்று கணுக்களை யுடையனவா யிருக்கவேண்டும். ஒவ்வொரு கணுவிலும் ஒன்று அல்லது 2 கண் முளைகள் இருக்கும். பதியன்களைப் பூமியில் செங்குத்தாய் நடாமல், மட்டமாய் புதைப்பார்கள். பதியன்களை சும்மாவாவது அல்லது சாணஜலத்தில் மூன்று நாளுக்குநாள் போட்டுவைத்தாவது பிற்பாடு நடுகிரார்கள். கொழுந்தாடைகள் செங்குத்தில் சாய்வாய் நடப்படுகிறதாம். சிலவிடங்களில் பதியன்களை நாற்றங்காலில் நட்டு முளைகண்டவுடன் பிடுங்கி வயல்களில் நடப்படுகின்றனவாம். சிலவிடங்களில் முதல்வருஷத்துப் பயிரின் அடிக்கட்டையிலிருந்து இரண்டாவது வருஷத்துப் பயிர் உண்டாக்குகிறார்கள்.



## 172 சர்க்கரை கொடுக்கும் பயிர்கள்.

பாசனம் :—

பதியன்கள் படுகிறதற்கு சற்றுமுந்தியாவது, அல்லது கட்டிவந்தனையாவது ஜலம் பாய்ச்ச வேண்டியபாசனம் பண்ணி கால்கழித்து படுவது சுத்தமாகிறது. சுமார் பதியன்களை கட்டு உட்களை ஜலம் பாய்ச்சுவதை சாவ சிலாக்கியம். முளைத் தண்ணீருக்குப் பிற்பாடு முதல் இரண்டு வாரத்தில் வாரத்துக்கு 2 தடவை வந்தபாடு பிறகு பயிரை முதிர்ச்சி வரைபடி வாரம் ஒருசுதா வீதம் ஜலம் பாய்ச்சி வரவேண்டியது. மொத்தம் இரண்டாண்டுகள் 40 இறவைபாடு. கிணற்றுப் பாசனத்தில் மட்டிலும் கால்வாயில் ஜலம் தயாராக ஜலம் திறக்கப்படுகிறது. வேண்டிய அளவு செட்டான பாசனம் கல்வது.

கொத்தல், களைபிடுங்கல், உரமணைத்தல், முதலியன

பயிரை பெருக்க உரமணை மோரீஸ் (Marinus) அனுஷ்டிக்கும் பாதிரி கட்டால் கொத்தல், களைபிடுங்கல் நன்றாய் நடக்கும். ஏனெனில் கொத்தலை இடங்களில் காலடிவைக்காமலும் பயிரை சேதப்படுத்தாமலும் வேலைசெய்யலாம். 15, 20 காளில் முளைகண்டு பதியன்கள் சுமார் 15 வாரத்தில் துளிர்விட ஆரம்பிக்கும். அப்போது ஒருகொத்தலும், கொட்டைப் பிண்ணாக்கு உரமணைத்தலும் திறம். பிண்ணாக்குக்கு, காட்டுச்செக்கு பிண்ணாக்கே திறம். சீமை அச்சுப் பிண்ணாக்கு நீம்ப கெட்டியா யிருக்குமாதலால், அவ்வளவு கல்லதல்ல வாம். பிற்பாடு, மாதம் 1 கொத்தல் வீதம் சுமார்



3. 4 கொக்கலுக்குத் துறையாமல் கொத்தி ஒவ்வொரு  
தாளையிலும் சிறுசிறுசிறு பிண்ணாக்கு உரம் அணைத்  
துவருவது சுவைலாக்கியம். கொட்டைப்பிண்ணாக்கு,  
உரம் வதுடன் கனமாயினும் தோலைக்கும, 6 மாதத்  
துக்குள் கொத்தல் எல்லாம் முடிந்து விடவேண்டும்.  
உரம் கொக்கலுள் பாசனம் பண்ணவேண்டும். பயிர்  
6, 6 முதல் உரம் பரிசுக்களில் பூரி கொஞ்சம் இளக  
லாக இரந்தால் பொருங்காற்றினால் பயிர் கீழே சாயும்.  
இளகாததற்குப் பரிசுட்டு ஆங்கில் சாரங்கள் கட்டி  
பயிர்சுளக்கு ஊன்று சீகாலாக்குவார்கள். மோரிஸ்  
(Mauritius)பாகிசுட்டான். பயிர்கள் கொத்துக்கொத்  
தாய் வளர்த்து இவ்வளவு அதிகமாய்க் கீழேவிழாது.  
அதிக உரம் மட்டால் முதலிய செலவு அதிகம் வேண்  
டுவதில்லை. அசைகா கழிகளை ஒன்றோடொன்று சீசா  
ந்துக் கீழ்விழாமல் கட்டலாம். அகத்தி, கொட்டை  
முதல் பசுவகளை தெளித்து வைத்திருந்தால், பிற்பாடு  
ஊன் மீகாலாக உபயோகப்படும். பயிர்களின் சரகு  
களை நீக்கியாவது அல்லது நரி உபத்திரவமிருந்தால்  
சரகுகளை கழிகளில் சுத்தியாவது கட்டவேண்டும்.

வாசு. அறுப்பு. கண்டுமுதல், முதலியன : —

இது சுமார் 1 வருஷத்துப் பயிர். சிலமாதிரிகள் 8,  
9, 10 மாதங்களிலும் முதிர்கின்றன. சிலசமயம் 4, 5  
வருஷம் பயிர் அடிக்கட்டையிலிருந்து உண்டாக்கப்  
படுகின்றது. அடிக்கட்டைப் பயிருக்கு, பூமிக்கு 1  
அல்லது 2 அங்குலமேல், பயிரை வெட்டவேண்டும்.



## 174 சர்க்கரை கொடுக்கும் பயிர்கள்.

இல்லாவிடில் பயினை அடியோடு வெட்டியாவது அல்லது பிடுங்கியாவது விடவேண்டும். காலையில் பணி இருக்கும்போது வெட்டவேண்டும். இல்லாவிடில் வெயிலில் தழைகள் சுனைகளினால் உடம்பைக் கீறாம. ஏகர் 1க்கு சுமார் 30, 35 பன் கழிகள் கிடைக்கும். இந்த 30, 35 பன் கழிகளிலிருந்தும் சுமார் 200, 300 மணங்கு வெல்லம் கிடைக்கும். ஒரு மணங்கு ரூபாய் 1½ ஆக ஏகர் 1க்கு சுமார் ரூபாய் 250 முதல் 375 வரையில் லாபம் கிடைக்கலாம். ஏகர் 1க்கு சாகு படிச்செலவு சுமார் 150 ரூபாயும் மொத்தவருமானம் சுமார் ரூபாய் 300ம் வைத்துக்கொண்டால் செலவில் லாம்போக ஏகர் 1க்கு சுமார் ரூபாய் 150 மிஞ்சும். சராசரியில் ரூபாய் 100க்கு கமடிட்படாது. மேற் சொல்லி யிருக்கிறபடி ஒரு ஜாஸ்தியாய்க்கொடுத்து நல்ல செய்கிறத்தியுடன் ஜாக்கிரதையாய்ச் சாகுபடி செய்தால் ஏகர் 1க்கு சுமார் 500 ரூபாய் கூட லாபம் கிடைக்கலாம்.

**கைத்தொழில் :—**

கரும்பிலிருந்து வெல்லம், பழுப்புச்சர்க்கரை, ஜீனி, கற்கண்டு, சாராயம் முதலியவைகள் உண்டாக்கலாம். சாகு முதலியவைகளை நீக்கி, சுத்தப்படுத்தி, கழிகளை கட்டாகக்கட்டி, ஆலையிருக்குமிடம் கொண்டுபோய், இரும்பாலைகளில் துண்டு துண்டாய் வெட்டிக்கொடுத்து, சாறு உண்டாக்கி, அதிக ஆழமில்லாத சட்டியில் காய்ச்சி, பாகாய்ப்போய்ப் பக்குவ மடைந்தவுடன்,



அச்சுகளில்போர் டோ, அல்லது போடாமலே வெல்  
லாம விலைக்குத் தபாமாகின்றது. மா ஆலைகளைப்பார்க்  
கிலும் இருமடி ஆலைகளில் அதிக சாறு கிடைக்கும்.  
சாற்றில் கொஞ்சம் சுண்ணாம்பு ஜலத்தைக் கலந்து  
கொதிப்பிக்க வேண்டும். இப்படி கொதிக்கையில் மே  
லேவரும் கட்டிகளை எல்லாம் அரித்து நீக்கிவிடவேண்  
டும். பாதுண்டா துமவரையில் கொதிப்பித்துப் பிறகு  
அச்சிலே போர் அல்லது உண்டையாகவோ அல்லது  
பூரிக்குள் பா போட்டுப் பாட்டு புதைத்தோ, வைக்கப்படு  
கின்றது வெல்லம் கெட்டியா யிருக்க வேண்டும்.  
பாகாய் ஒடிப்போகாமல் கெட்டியாய் இருக்கும்படி  
தபா செய்வதில் முக்கியவனமிருக்கவேண்டும்.

சர்க்கரை செய்யும் விதம் :—

இதற்கு வெல்லத்துக்குக் காய்ச்சுவதைப் பார்க்கி  
லும் இன்னும் கொஞ்சம் அதிகமாய்க் காய்ச்சி, ஒரு  
ஆழூரில்லாத பாத்திரத்தில் போட்டு குளுமைப்படு  
த்தி, கட்டைகளால் தேய்த்து நுள்தூளாய் உண்டாக்  
குதிநூகள். இதற்கு வெல்லத்தூள் அல்லது பழுப்பு  
வெல்லச் சர்க்கரை என்று பெயர். அநேகமாய்  
வெல்லப்பாகை ஒரு பாத்திரத்தில் போட்டு அநேக  
நாள் வைத்திருந்தால் சர்க்கரைச் செதில்கள் கீழேபடி  
யும். இப்படி படிந்தசர்க்கரைக்குப் பழுப்புச் சர்க்  
கரை என்றும் பெயர். இந்தப்பழுப்புச் சர்க்கரையில்  
அசுத்தம் கொஞ்சம் இருப்பதால் அவைகளை ஜலத்தில்  
கரைத்து, முட்டை வெள்ளைக்கருவுடன் கொதிப்பித்



## 176 சர்க்கரை கொடுக்கும் பயிர்கள்

தால் அகத்தங்க ளெல்லாம் திண்டு சீழ்ப் பந்தா  
 ளிடம், நெடு பயிப்பு நிறத்தை நீக்க வலுப்புகி  
 யில் பாசுலவத்தை ஒன்றாவார்கள். நெடு பயிப்பு  
 காய்ச்சப்பட்டால் வெள்ளைச் சர்க்கரையைச் செலவா  
 ளாக கீழேபடியார் இச்செய்திகளை அடிக்கடி மன மன  
 ட்டால். கற்கண் நிகளாகத் தரிக்கிறாள் செலவின்  
 கீழேபடியால் பாக்கி இறுக்கும் பாக்கி நுத்து சார்புக்  
 கள் இறுக்கப்படுகின்றன. சர்க்கரையைச் சுவைக்கா  
 திக்குமேயோ, அடிக்கடி அகத்தங்களை நீக்க, அடிக்கடி  
 மையான குண்டு கொடுத்தாகவேண்டிய, ஜலம்  
 திகொடுத்தாலும், அல்லது மட்டால் திகொடுத்தாலும்,  
 வெல்லம் சுவைக்கார் நெடுபாடு, கொடுத்தாகவேண்டிய  
 அகாவது தூக்கி தூக்கி சர்க்கர்கள் வந்தால் பாலாக,  
 கொஞ்சமெடுத்து குளிர்த்த ஜலத்திலே மட்டும் அக  
 உட்கொண்ட கொட்டிப்பாட்டுகின்றால் காய்ச்சுவதை நீழ  
 த்தி பாலாகக் கீழே இறக்கவிடவேண்டிய, தூய்மையு  
 கழிகளுக்கு சுமார் 50 பங்குமுதல் 80 பங்குவரையில்  
 சாரும், 8 பங்குமுதல் 20 பங்குவரையில் வெல்லமும்  
 கிடைக்குமா, கோயமுத்தூர் பள்ளத்தாளியில் சுமார்  
 100க்கு 19 பங்குவரையில் வெல்லம் கிடைக்கிறதாம்.  
 ஒருபொதி வெல்லம் காய்ச்ச சுமார் ரூபாய் 2 செலவு  
 பிடிக்கும். அல்லது பயிரை அறுத்து 600 பவுண்டு  
 வெல்லமாக்க சுமார் ரூபாய் 5 செலவு பிடிக்கும்.





## பவண .



இதை ஒரு பழுவைப் பயிராகவும், நார்தொடுக்கும் பயிராகவும், சர்க்கரை கொடுக்கும் பயிராகவும் கொள்ளலாம். இது அதிகமாகப் வடல்கரை ஓரங்களில் காணப்படுகிறது. கன்னட வடல்கரைகளிலும், புஞ்சைகளிலும் இதைப் பார்ப்பது காணலாம். நல்ல நெற்றுப்பழங்களையும் காயல இறக்கி பாத்திகளில் மழைகாலத்து அப்பாக்கல் புலத்தால், குளிக்கால ஆரம்பத்திலே குறுத்துக் கொள்ளும். இக்குறுத்துகளை கறிகாப்பாக்கி கலவதது சில இடங்களில் சாப்பிடுவது வழக்கம். குறுத்துகளைக் கறிகாய்க்குப் பிடுங்காமலும், அமிர்தம் போலவும் ஜாகிரதையாகப் பார்த்துக் கொண்டு பரங்களாகின்றீர். பனை சமுத்திரக்காற்றுக்குள் சமீபமாகுள்ள மணல்சாரியில் நன்றாய் வரும். இதை வேளிக்காகவும், காற்றின் வேகத்தைத் தடுப்பதற்காகவும், மணல்காற்றைத் தடுப்பதற்காகவும், சாகுபடி செய்யலாம். இது அதிக செலவன்னியில், சீக்கிரத்தில் நன்றாய்வளருகிற பயிர். பின்னையைப் பிடுங்கி ரட்டாலும் நடலாம். இல்லாவிட்டால் ஒரேயடியாய் வளர விட்டாலும் விடலாம். இது கரிசலிலும், கப்பிக்கல் பூமியிலும், நன்றாய்வளருகிறது. நீர் சுவறின காற்றுள்ள சீதோஷ்ணம் இதற்குத் தேவை. பிப்ரவரியில் பூத்து ஜூனில்பழுத்து நெற்றுகள் கீழே உதிருகின்றன. இப்படி உதிர்வதால் நெற்றுகள் தானாகவே சில இடத்தில்



## 178 சர்க்கரை கொடுக்கும் பாயிர்கள்.

முளைத்த பாயிரங்களின் மூலம், இதற்கு 2 மட. கொத்தல் முகவிய செம்மையாக்கிகள் சரிவாசெய்யும் பாய்சத்தில கல்ல பல்னைக்கொடுப்பதால் கண்ணின்மை, பனை இருத தாலும் 1,000 வருஷம், இரண்டாவது 1,000 வருஷம் எனபதில் பழமையாகி, 10 முதல் 30 வருஷத்துக்குள்ளாக காய்க்க ஆரம்பிக்கலாம். ஆகவே இது முதல்தர பனைகளுக்கும் ஆரம்ப பாயிரங்கள், இரண்டாவது முதல்தர பனைகளுக்கும் முதல் 10 பாயிரனை விடையில் பதனிச்சுக் கொடுக்கலாம். இத்தர பதனில்லாமல் கண்ணுறையுதல் கண்ணுறையில் காய்க்கு வாய்க்கலாம். கண்ணுறையுதல் கண்ணுறையில் வைத்து இருதர பனைகளாகிவிட்டால், இத்தர பனைகளைச் சர்க்கரை பதனி லையிப்பாயிரங்களிலும், பனை பதனிப்பில் ஜாக்கதி சர்க்கரை இருக்கிறது. பனை பதனித் துடித்துக்காய்க்க, ஏராள மாயிரஞ்சுக்கிரப்படிமால் அதன்விருந்து சர்க்கரை இருக்கப்படுகிறது. ஆண் பனையில், பெண் பனையில் கீடைப பதில் 2 திட்டமதான் பதனிச்சுக் கொடுக்கலாம். பாயிரவா மாதம் ஆரம்பம் முதல் அக்டோபர் ஆரம்பம் வரையிலில் பதனி கொடுக்கலாம். 2 குவாடடு பதனியி லிருந்து 1 பவுண்டு வெல்லம் கடைக்குடம், பனை மரத்தை இப்படி பதனி கட்ட 30 வருஷமாவரையில் உபயோகப்படுத்தலாம். ஆனால் வருஷத்துக்கு ஒரு தரம் கள்ளுக்கட்டுவதை நிறுத்தி காய்க்கவிடவேண் டும். பனையில் ஆண் பனை, பெண் பனை, என்று இரண்டு வகைகள் உண்டு. ஆண் பனை கள்ளுக்கட்ட மா த்திரமும், பெண் பனையை கள்ளுக்கட்டவும், காய்க்க வும், குழிகள் விடுகிறார்கள். ஒவ்வொரு மரத்திற்கும்



[illegible]



## 180 சர்க்கரை கொடுக்கும் பயிர்கள்.

மரம், ஏற்றச்சால், கபிலை இறவை வேலைகளுக்காகவும், வாய்க்காலாகவும், பிரயோசனப்படுகின்றது. ஒலைகளிலிருந்து கடிதாசம் செய்யலாம். பனங்காயின் மட்டையிலிருந்தும் கார் எடுக்கலாம். பனையில்லை முதல் ஒலைவரையில் பிரயோசனம் படாதது ஒன்றாய்லை. ஒலையை பழைக் குடையாகவும், பாராகவும் செய்யலாம்.

இளம் பிள்ளையை கறிகாய்க்காக சாகுபடி (சுரத்தி)

கறிகாய்க்காக சாகுபடி செய்யும் மட்டை கத்தல் ஜூன் ஜூலையில் முதிர்ந்த நெற்றுகளைப் பொறுக்கப் படுத்தியார் செய்திருக்கப்பட்ட காற்றங்காவில் ஐந்து வேண்டும். நட்டு 4 மாதத்துக் செல்லார் கறிகாய்க்கு பிரயோசனப்படுகிறது. காற்றங்காவில் செண்டு அல்லது 10 செண்டு விஸ்திரணத்துக்கு மேல் இராமது. ஒரு சதுரகஜத்தில் 50 நெற்றுக்கள் நடப்படுகின்றன. இந்த அன்பது நெற்றிலிருந்தும் 100 இளம் ஆணியேவர்களுக்கு மேல் கிடைக்கும். இந்த ஆணியேவர் 9 முதல் 12 அங்குலம் நீளமாகவும் சுமார் 1 அங்குலம் சுற்றளவு உள்ளதாகவு மிருக்கும். இதற்கு நல்ல வளமான மணல் சம்பந்தமுள்ள களிமண் பூமிதிறமாம். 1 அணுவுக்கு 16 குறுத்து விலைக்கு கிடைக்குமாம். இக்கறிகாய் சாகுபடியில் ஏகர் 1க்கு மொத்த வருமானம் சுமார் ரூபாய் 1500 பம்பாய் இராஜதானியில் கிடைப்பதாக Mr. மாரிசன் சொல்லுகிறார். கறிகாய்க்காக



சாகுபடி செய்யும் பட்சத்தில் சுமார் 10 செண்டு சொ  
ல்ப விஸ்தீரணத்தில்தான் சாகுபடி செய்யப்படுகிறது.  
இதில் நல்ல வரும்படி வருவதால் நமது இராஜதானி  
யில் இச்சாகுபடியை விர்த்தி பண்ணுவது நன்மை  
பயக்கும. இதன் குறுத்துகளையும், ஆணியேர் நுனி  
யையும், ஏழை ஜனங்கள்தான் கறிகாயாக சாப்பிடுகி  
றார்களாம்.

---



நச்சு மரம்.



நச்சு மரம்.



இதைக் கவனித்து பழுவண்ணம் பாரிசாகவும், சர்க்கரை கொடுக்க  
முடியாவிடாகவும் கொள்ளலாம். இதில் ஆண் எச்சு,  
பெண் எச்சு என்பது இரண்டு வகை உண்டு. இதன்  
வகைகளைப் பற்றி நுத்து அறியலாம். பொழுது பனை  
பழக்களை வகைகாற்று அறிவது பால் பொதிவளை யங்  
களில்தான் வகைகளை அறியமுடியாது. உதற்கு மணல்  
சாம்பல் உள்ள கவமண்பூரிதான் தீரம். இதை விதை  
யிழைவா. பள்ளைகளிலுமூர் வித்திபண்ணலாம். மரம்  
10 வயது முக்கா 20 வயதுக்குள்ளாகத் தான் கள்ளுக்  
கம்பிச் சுவைக்கா. கால் பூரில் கள்ளுக்கட்டி 10  
வயதுக்குக் கல்லாம். மரம் 40 வயதுக்குப் போய்விடுகிற  
காலம். அதனிலைமக் காய்ச்சினால், வெல்லம் உண்டாக்  
கலாம். இலையிலிருந்து பாய்விடின்னலாம். இதன் பழ  
முடிசாம்பல் உபயோகமாகுகிறது.



பேர்ச்சங் குலை.




பேர்ச்சங் குலை.



பேரீச்சை நச்ச ஜாதியைச் சேர்ந்தபோதிலும் கூட  
அது மமது இராஜதானியில் இல்லை. ஆகையால் அதின்  
சாகுபடி எடுத்து எழுதப்படவில்லை. பேரீச்சை சாகு  
படி நல்ல லாபம் கொடுக்கக் கூடியதாக தெரியவரு  
கிறது.



பழவகைப் பூக்கள்  
வாழை.



வாழை மரம்.



LEIYU 11 4511011

[illegible]

**தத்துவ பூமிகளி**

தலைவரவர்களே வாசகர்களின் விருந்தினராக இருப்பதற்கான களிப்பை உண்டாக்கியோ. பரிசைக் கிடைக்கவிரும்பும், கண்டும் விரும்பும் சமவாசகர்களின் விசுவாசத்தை உங்ககளில் வளரும்; மாண்புமிகு சாரிபாபிநாகால், அக்க உபாபம், தண்ணீரும் சீவனப்படுத்தும் ஜலம் வாசகர்களின் கருக்கன் சம்பந்தமான களிப்பை உண்டாக்கியோ. ஏனெனில் சுண்ணாம்பு படித்திட்டு ஸ்ரீரங்க வாசனையும் ருசியையும் கொடுக்கிறது.

**செய் நேர்த்தி :** ...

வாழையை நட இரண்டு மாதத்திற்குமுந்தி பூமியை  
8-தரம் உழவிவாண்டு நாம். உழுது புல, களை முத  
லியவைகளை நீக்கி 8 அடிக்கு ஒரு தரம் குழிகள்



உண்டாக்கி, கன்றுகள் புதைக்கப்படும். அல்லது வாழைக் கொல்லையை மண்வெட்டியால் அழிவாட்டி வாங்கி, நிரவி வழிகாலுக்காக கிடங்குகள் வெட்டி சுமார் 5 அடிக் கொடுதரம் கன்றுகளை புதைக்கப்படும்.

**ததூந்தகாலம். விதைப்பு முதலியன** —

வாழையை ஆடி அதாவது சூலை, அல்லது மார்ச்சி அதாவது ஜனவரியில் புதைக்கத் தகுந்த காலம். புதைப்பதற்கு முன்னால் ஆற்றுவண்ணம் மரம் மாதிரி வங்களுக்கு ஏகர் 1க்கு 30 வண்ணங்குக் குழாய்ப்பால் ஒரு இடவேண்டும். புதைத்தவுடன் ஆட்டுக்கொலை வைத்தாலும் வைக்கலாம். ஏகர் 1க்கு சுமார் 700 கன்றுகள் புதைக்கவேண்டும். கன்றுகளை உடனே பிடுங்கி கட்டாலும் கடலாம். அல்லது 1 மாதம் வரையில் சேதப்படுத்தாமல் வைத்திருந்து கட்டாலும் கடலாம். புதைத்தவுடன் கன்றைச் சுற்றிலும் உலக்கையில் இடித்து கெட்டிப்படுத்திவைக்கார்கள். பிறகு சேதம் தவிர்த்து வேலியாலடைத்து பந்தைப் பந்து பண்ணுவார்கள்.

**பாசனம். கொத்தல், களைபிடுங்கல், முதலியன:**

புதைத்து 3 வாரத்திற்குப் பிற்பாடு வாரம் இரண்டு முறை வீதம் ஜலம் பாய்ச்சப்படும். முதல் வருஷத்தில் அதமபக்ஷம் மாதம் இரண்டு தாத்திற்குக் குறையாமல் ஜலம் பாய்ச்சிவர வேண்டும். முதல் வருஷம் பாசனத்திற்கு இளங்கால் பாசனமென்று பெயர். இரண்டாவது 3 வது வருஷத்தில், மாதம் ஒரு தரம் பாசனம் கொடுத்தால் போதும். இவைகளுக்கு முதிர்



கால் பாசனம் என்று பெயர். சிலவகைகள் பாசனமன் னியிலும் கட்டாகும். அவை அற்றேற்றங்களில் படுகை யிலிருக்கா வாழைகள். பாசனமன்னியில் ஊற்றத் தலுக்கெல்லாம் வாழைக்கு கொத்தம் 100 கண் ணி என்று சொல்லுவார்கள். கன்றுகள் புதைத்து 3 மாதங்கடிகெல்லாம் கொத்தி, களைபிடுங்கி, வாழைக்கு மண் அள்ளித்து உபயோகப்பாடும். முதல கொத்தில்தான் கொடி வளர்ந்து வரும். பிறகு மூன்றுமாதத்திற்கு ஒருசமயம் கொத்தி உபயோகிணத்ததுவெண்ணும். தோல் கிடைத்து வரும். அப்படியே முதுகைப்பா. கொள்ளிஞ்சி இலை யா. பல்லாங்குரம் உபயோகி அணைக்கப் படுகின்றன. அகம்மாத்தா முதல வருஷத்தில் 4 கொத்தலுக்குக் குளமாய்விட்டு கொத்தலுக்கு உற்படாமல் கொத்தி வரவேண்டும். 2வது, 3வது வருஷங்களில் வருஷம் 1க்கு இரண்டு கொத்து வீதம் கொத்தி வரவேண்டும். தாய்மரம் நுவிடுவாயில் பக்கத்து கன்றுகளில் ஒன் னைவட்டி பாக்க மேலளம தலையரியப்படும். தாய்மரத் தில் காய வெட்டுகிறவரையில் இலை அழக்கக்கூடாது.

**வயகு, காய்விட்டுதல், கண்டுழதல், முதலியன :—**

வாழை ஒருவருஷத்துப் பயிர். புதைத்து 3வது மாதத்தில் பூக்க ஆரம்பித்து, ஒருவருஷத்திற்கெல்லாம் குலைகள் முதிர்ந்துவிடும். அப்போது, அதாவது புதை த்து 13 வது மாதத்தில குலைகள் வெட்டப்படும். இப் படி ஒரு வருஷத்திற்குள் குலைகள் வெட்டப்பட்டா லும், வாழை சாதாரணமாய் மூன்றுவருஷம் நின்ற








இந்த வாயைக்கூட வாயைவந்து கொட்டாப்பிடியால்  
அடித்துவிடுவதாக குவாரிகள் மட்டைகளை இலத்தில்  
வைப்பினால் காக்காய் பம்பிடியால் அடித்தும் எர்  
மணம் புகலாம். குரலிக்காய்க்கு 600 பவுண்டு சுத்  
தரவாய்க் கொட்டைக்குமானால். மணடன் கயத்தில்  
1 பவுண்டா 150 குரல்களை மிகுந்தால். கா எடுக்  
கமுதலாக விகாட்டை வாயைழைக்காது. இதற்கு  
மணடில்லா வாயைழைக்காமல் செல்லுவதுண்டு.  
இந்த வாயைழைக்காது அசநி கசநிகளிலிருந்து ஓடுவித்  
தடித்துவிட்டு சிவசுராகளாம். வாயைழைக்காயிலிருந்து  
ஓடுவித்த மணவு மணம் புகலாம். மளசுதைமை எடு  
த்து வாயைழைக்கக் கொட்டை 6 மணில் இடித்து  
வாயைழைக்காமல் சுவத்தால் மணவு மணம் புகும்.



மா .



மல்கோவா மாம்பழம்.



**பயிரின் சுபாவம் :**

இந்தப் பழவகைப் பயிரில், பழங்களின் குணங்கள் நிரம்ப வித்தியாசப்படுகின்றன. சில மிகவும் ருசியாயிருக்கும். அனால் முக்காலே மூன்றுவீசம் வாசி பழங்கள் மிகுந்த நாரள்ளனவாயு, ஒருவிதத் தைலவாசனையுள்ளனவாயுமிருக்கின்றன. ஆகையால் மாந்தோப்பு உண்டாக்குவதில், கிளை ஒட்டுவைத்து உயர்ந்த தினுசான பழங்களை உண்டாக்குவதில் நிரம்ப கவனம் வைக்கவேண்டும். பயிலுக்குச் சமீபத்தில் மாந்தோப்பு வைத்தால் ஸரபம் நன்றாய் வரும்.

**முக்கிய மாதிரிகள் :**

மல்கோவா, இது ஒரு ஒட்டு ஜாத. இது பெங்களூர், வட ஆர்க்காடு, சேலம் முதலிய விடங்களில் முக்கியமாய்ப் பயிரிடப்படுகின்றது. சதை, நாரன்னியிலும் நிரம்ப ருசியாயுமிருக்கும். மங்கல் வெளுப்பாயும், மஞ்சளாயுமிருக்கும். இது நிரம்ப பெரிது. பட்டணத்தில் 100 பழம் எட்டுமுதல் பத்து ரூபாய் வரையில் விலை போகிறது.

கோவா, இது மல்கோவாவைப்போல் நிரம்ப ருசியாயிருந்தபோதிலும் கூட, ஆகிருதியில் நிரம்ப சிறிது. இதற்கு வட ஆர்க்காட்டில் காதீபகந்து என்றும், சேலத்தில் குண்டு என்றும் பெயர்.

பீற்றி, முன் இரண்டு மாதிரியைப்போல அவ்வளவு ருசியாய் இல்லாவிட்டாலும், நிரம்பவாசனையை உடை



த்தாயிருக்கிறது. இது எல்லாவற்றையும்விட நிரம்ப மலிவு. இது 3 ஆம் ஒட்டு தினுசுகள்தான்.

**தகுந்த பூமிகள் :**

நல்லவடிகால் வசதியுள்ள பாதி கள், பாதி மனைல் சம்பந்தமுள்ள களிமண்பூமியில் நன்றாய்வரும். அனால் கீழ்ப்படை மண்ணில், கழாங்கல்லுகளும், கம்பிக்கல் லுகளும் இருந்தால் நிரம்பதிறம். செவ்வளி லும் வரும். சேய்நேர்த்தி, உரம், கன்றுகள் முதலியன:—

பூமியை நன்றாய் உழுது 3() அடக்கு ஒரு தரம் 3 அடி நீளம் 3 அடி அகலம் 3 அடி ஆழம் உள்ள குழி கள் உண்டாக்கி மண்ணை ஆரப்போட்டுவிட வேண்டி யது. காற்றில் நீர்சுவறின உஷ்ணமான இடங்களி லும், நல்லவளமான பொலபொலத்த களிமண பூமியி லும், குழிகள் 4() அடக்கு ஒரு குழிவீதம் இருக்க லாம். குழி வெட்டுகையில், மேல் மண்ணை, ஒரு பக் கத்திலும், அடி மண்ணை ஒரு பக்கத்திலும், போட்டு வைக்கவேணும். ஒரு குழிக்கு 5() பவுண்டு பொடி செய்த எலும்பை குழியின் அடியில் போட்டு, சுற்றி வரக்குழியைச் சுறண்டி, அந்த மண்ணால் மூடி, காற் றுடப்போட்டிருக்கிற மேல்மண்ணை, ஒரு கூடை மடித் தசாணத்துடன் கலந்து, அந்த எலும்பு மூடி இருக் கிற மண்ணின் மேல் போட்டுவிட வேண்டும். இதில் நம்பிக்கை உள்ள இடங்களிலிருந்து நல்ல ஒட்டு ஜாதி கன்றுகளை வரவழைத்து வைத்து அந்தக் கன்று களை அடிமண் வேருடன் மொத்தையாய்ப் புதைக்க



வேண்டும். இப்படிப் புதைத்துப் பாக்கி இருக்கிற மண்ணையும் குழியில்போட்டு நிரப்பிவிட வேண்டியது. கன்றுகள் சுமார் 18 மாதமானவுடன் ஒட்டுகட்டி வைத்து பிறகு சுமார் 2½, 3 வருஷத்தில் பூமியில் நட வேண்டும். இப்படி 30 அடிக்கு ஒருதரம் நடடால், ஏகா 1க்கு 50 கன்றுகள் செல்லும். 40 அடிக்கு ஒரு தரம் நடடால் ஏகா 1க்கு சுமார் 30, 35 கன்றுகள் நட லாம். ஆகையால் ஒரு ஏகரில் மாந்தோப்பு உண்டா க்க 30 முதல் 50 கன்றுகளை புதைத்து மரங்கள் உண் டாக்கலாம். கன்றுகள் இளமையாயிருக்கையில் 4 மா தத்துக்கு ஒரு தரம் 40 பவுண்டு காய்ந்த சிறு மீன் களையாவது, பின்னணுக்கையாவது கொத்தும் மண்ணு டன் கலந்து உரமாக அணைக்கவேண்டும். கன்றுகளை மழை காலத்தில் நடுவது திறம்.

கோத்தல், களைபிடுங்கல், இடையில் பயிருண்டாக்குதல் முதலியன.

கன்று புதைத்தது முதல் 3, 4 வருஷங்களில் இடை வெளியில் நிலக்கடலை, கேழ்வரகு, அவுரி, சோளம், அனாஸ்செடி முதலிய பயிர்கள் உண்டாக்கி லாபம் அடையலாம். இப்படிப் பயிர் செய்தால் பூமி பொல பொலத்திருக்கும். இப்படிப்பயிர் செய்யாதவரையில் வருஷா வருஷம் கொத்தி, மாங்கன்றுகளுக்கு உரம் அணைத்துக்கொண்டு வரவேண்டும். சுமார் 5 வருஷத் தில் பூக்க ஆரம்பிக்கும். அப்போது முதல் 4 வருஷத் துக்கு பூமலர்களை எல்லாம் ஒடித்துக்கொண்டு வரவே



ண்டும். வருஷாவருஷம் முதிர்த்த கொழுப்புள்ள மரத்தின் கிளைகளைக் கபாத்துச் செய்யவேண்டும். அதாவது கிளைகளை ரம்பத்தால் நறுக்கவேண்டும். பெரிய மாமரத்துக்குத் தழையாய்ப்போய் மதத்துப் போகாமலிருப்பதற்காகவும், நிரம்ப பூ மோட்டுவிட்டு காய் உண்டாவதற்காகவும் வருஷாவருஷம் மழைக்காலக் கடைசியில் சுமார் 10 பவுண்டு உப்பை சிலவட்டங்களில் உரமாக கொடுக்கிறார்களாம். பொந்துவிழுந்த மரங்களில் புழுக்களிருந்தால் தாளை ஊற்றி வெளிப்படுத்தி நாசப்படுத்தி வீடவேண்டும். மரத்திலுள்ள லுருவி இருந்தால் அதாவது வேறுபயிர்கள் கிளைவிட்டிருந்தால் அவைகளை நீக்கி அப்புறப்படுத்த வேண்டும்.

இது 50 முதல் 80 அங்குலம் மழை பெய்யும் இடங்களில் நன்றாய் வளரும்; பாக்கி இடங்களில் பாசனம் கொடுக்கவேண்டும். இளங் கன்றுகளுக்கு நட்டவுடன் வேருன்றுகிற வரையில் தினம் அல்லது இரண்டுதினத்திற்கு ஒருதரம் தண்ணீர் பாய்ச்சி வரவேண்டும். பிறகு முதல் 1 வருஷத்திற்கு மழை இல்லாத காலத்தில் வாரம் 1 முறையும், 2வது, 3வது வருஷங்களில் 2 வாரத்திற்கு ஒருமுறையும் தண்ணீர் பாய்ச்சி வரவேண்டும். பிறகு மாதம் ஒருமுறை வீதம் தண்ணீர் பாய்ச்சுதல் நல்லது.

**வயசு, கண்டுழதல் முதலியன :—**

மாமரத்துக்கு சுமார் 100 வயசு சொல்லலாம். சுமார் 10, 12வது வயசு முதல் நன்றாய்க் காய்க்க ஆரம்பிக்



சும். சிலசமயம் நல்ல பூமியாயிருந்தால் இதற்கு முந்தியும் காய்க்கலாம். சுமார் 10, 12 வயதுள்ள ஒரு மாத்திலிருந்து சராசரியில் 2 முதல் 5 ரூபாய் வரையில் கிடைக்கலாம் ; அதாவது சுமார் 1000 பழம். உயர்ந்த ஜாதிமாங்களில் மாம் 1க்கு சுமார் 50 ரூபாய்முதல் 100 ரூபாய்வரை சிலவிடங்களில் வருவதாகத் தெரிகிறது. இதின் வரும்படி போட்ட முதலுக்கு வருஷத்துக்கு 100க்கு 24க்கு குறையாமல் வட்டி கிடைக்கும். வரும்படியெல்லாம் கன்றுகள் நட்டு 6 வருஷத்துக்குப் பிற்பாடுதான். அதற்கு முந்தி சில்லரைப் பயிர்களை உண்டாக்கி லாபம் சம்பாதித்து தோப்புக்குச் செலவு செய்துகொண்டு வரவேண்டும்.

---



கிச்சிலி.

—:0:—



கிச்சிலி மரம்.



**பயிர்ன் சுபாவம் :—**

இந்தப் பழவகைப் பயிர் வறட்சியான இடங்களில் நன்றும் வளரும். பள்ளத்தாக்கான ஜில்லாக்களில் நல்ல பழங்களைக் கொடுக்காது. சமுத்திரக்கரையி லிருந்து 2,000 அடி உயரத்துக்குள்ளாக, உஷ்ணமும் நீர் சுவறின சீமிகாஷ்ணமுள்ள இடங்களில் நல்ல கிச்சி லிப்பழம் கிடைக்கின்றது. கிச்சிலி நன்றும் வேரூன்று கிறாபடியால், சாதாரண காற்றுள்ள இடங்களில் கெடுதல் உண்டாகாது ஆனால் அதிக பெருங்காற்றுள்ள இடங் களில், பழவரும்படியில் கம்மி ஏற்படுகிறது. ஆகை யால் அப்பேர்ப்பாட்ட இடங்களில் பொதுவாகவே, எல் லாப் பழவகைக் தோட்டங்களுக்கும் சுற்றிவர வேலி யாக அதிக கிழல்கொடுக்கக் கூடாதவையும் அடர்த்தி யாயில்லாதவையுமான மரங்களை உண்டாக்குவதுதிறம்.

**மாதிரிகள் :—**

சர்க்கரை நார்த்தை என்றும், கசப்பு நார்த்தை என் றும், புளிப்பு நார்த்தை என்றும் அநேக மாதிரிகள் இருக்கின்றன. சிலவகையில் தோல் கெட்டியாயும், சிலவற்றில் இணக்கமானதாய் மிருக்கும். எலுமிச்சை, பொம்பளிஸ், கிடாரை, கொளிஞ்சி முதலியவைகள் கிச்சிலிவகையைச் சேர்ந்தவைகள் தான்.

**தகுந்த பூமிகள் :—**

கிச்சிலித்தோட்டம் நல்ல வடிகால் வசதியுள்ள மே ட்டு பூமியாயிருப்பதுடன், மேற்படைமண் நிரம்ப ஆழ முள்ளதா யிருக்கவேண்டும். வளமான களிசம்பந்த



முள்ள மணல்சாரி திறம். பூமியின் கீழ், கீழ்ப்படை மண் நிரம்ப கெட்டியுள்ளதாய் இருக்கக்கூடாது. சுக்கான் சம்பந்தமுள்ள படுகைமண் சர்வ சிலாக்தியம். உரப்பான களிநிலம் திறமல்ல.

கீச்சிலி வகைகளை விரித்தியாக் குதல்.

A. நாற்றங்கால் :—

பிலாக்கொட்டை, நாகக்கொட்டை வையப்பாள் கீச்சிலி விதைகள் பழத்திலிருந்து எடுத்தவுடன் காய்ந்து விட்டால் அவைகளின் விரியம் போய்விடுமாம். ஆகையால் பழத்திலிருந்து எடுத்தவுடனே சீய காய்ந்து போவதற்குமுன் விதைகளை விதைத்துவிட வேண்டும். விதையினாலும், மொட்டு (Bud grafting) அல்லது அரும்பு ஒட்டுக் கன்றுகளினாலும் பயிர் உண்டாக்கலாம். நல்ல முதிர்ந்த பழங்களிலிருந்து நவம்பர் மாதத்தில் விதைகளை எடுத்து கன்றாய் செய்கேர்த்தி செய் திருக்கப்பட்ட சுத்தமான நாற்றங்காலில் 6 அங்குலத்துக்கு ஒருதரம் விதைகளை தெளித்துவிட வேண்டும். ஒருவாரத்துக்குள் முளைகாணும். ஆறு அங்குல உயரமிருக்கையில் கன்றுகளைப் பிடுங்கி 9 அங்குலத்துக்கு ஒரு கன்றுவீதம் மறுபடி நடவேண்டும். இப்படிப் பிடுங்கி நட்ட கன்றுகள் ஒரு வருஷத்துக்குக் குறையாமல் நாற்றங்காலிலிருக்கவேண்டும். நாற்றங்கால் நிழலான விடத்தி லிருக்கவேண்டும். சிலசமயம் இந்த ஒருவருஷத்துக் கன்றுகளை மறுபடி பிடுங்கி நிழலில்லாத



விடத்தில் நடவேண்டும். அப்போது மொட்டுகளுக் கு மேல் ஒரு அங்குலம் வெட்டி எறிந்துவிடுவார்கள். பொதுவாக ஒரு வருஷம் முதல் இரண்டு வருஷமான கன்றுகளைப் பிடுங்கித் தோட்டங்களில் நடவேண்டும். சில குணங்களுள்ள கிச்சிலி உண்டாக்க வேண்டுமானால், ஒரு வருஷமுள்ள கன்றுகளுக்கு அக் குணங்கள் அமைந்த ஒரு மாத்தின் அரும்புகளைச் சீவி ஒட்டுகள் கட்டி, ஒட்டு சேர்த்த கன்றுகளைத் தோட்டங்களில் பிடுங்கி நடுவதுமுண்டு. அரும்பு ஒட்டுசேர ஒரு வருஷம் செல்லும். ஒட்டுக் கன்றுகள் விலை சுமார் 3 ரூபாய்க்குக் குறைவாது. நாற்றங்காலன்னியில், கன்றுகளை கல்லாண் உரம் நிரப்பிய கூடைகளிலும், கன்றுகளை விர்த்தியண்ணி ஒட்டுக்கட்டியாவது கட்டாமலும் தோட்டங்களில் நடுவதுமுண்டு.

B தோட்டம்.

தோட்டங்களில், கல்ல பூமியாயிருந்தால் 15 முதல் 20 அடிக்கு ஒருதரம் நடவேண்டும். இப்படி நட்டால் ஏகர் 1க்கு சுமார் 130 கன்றுகள் செல்லும். சப்பையான நிலமாயி ருந்தால் 10 அடிக்கு ஒருதரம் கன்றுகளை நடவேண்டும் கன்றுகளை மழைகாலத்தில் நடுவது திறம். தோட்டத்தில் 2 அடி அகலமுள்ள குழிகளை வெட்டி மண்ணைக் கொஞ்சகாலம் ஆறப்போட்டிருந்து சாணம் குப்பைகளினால் நிரப்பி அவைகளில் கன்றுகளை நடவேண்டும். பாசனத்திற்காகப் பாத்திகளும், கண்ணிகளும் ஏற்படுத்தவேண்டும். கன்றுகளை நடட்டு



1, 2 வருஷத்துக்கு நிரம்ப கனம் எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும்.

**பாசனம், கொத்தல், களைபிடுங்கல் முதலியன :**

கன்றுகள் இளமையா யிருக்கையில், இடவெளியில் சில கரிகாய் பதார்த்தங்களையும், சட்டலை, வெங்காயம், இஞ்சி, பஞ்சள், அவுதி முதலிய பயிர்களையும் சாகுபடி செய்து லாபம் அடையலாம். இப்படிச் செய்தால் அடிக்கடி பூமி கொத்திக் கிளப்பாநிசிறது. கன்றுகள் வேளாண்முகிறவரையில் 2 தினத்துக்கு ஒருதரம் பாசனமும், நிறகு வரத்துக்கு ஒரு தரம் பாசனமும் செய்யவேண்டும். இவது வருஷத்தில் 10 நாளைக்கு ஒரு தரமும் நிறகு மாதத்துக்கு ஒரு தரமும பாசனம் செய்து வந்தால் போதும. மட்ட நிறகு கீழ் இருந்து காணுகிற முளைகளை எல்லாம் அப்போதைக்கப்போது கன்றுகளிலிருந்து அப்புறம் படுத்திவிட வேண்டும். கிச்சிலி மேலாகச் சல்லிவேர் ஜாஸ்தியாக விடுவதினால் ஆரம்பத்தில் அதிக ஆழம் கொத்தக் கூடாது. மேலாகக் கொத்தவேண்டும். ஆனால் வருஷத்துக்கு ஒரு தரம் அல்லது 2 வருஷத்துக்கு ஒருதரம் கூந்தாலியால் கொத்திவாங்கினால் நன்மைவிளையுமாம்.

**கபாத்து செய்தல் :—**

கன்றுகளை நட்டு, துளிர்கள் உண்டாகி மரம் 5 அடி உயரம் வளருகிறவரையில் கபாத்து செய்யவேண்டியிருக்கும். மரம் நன்றாய் வளர்ந்தால் பக்கங்களில் நிர



ம்ப கிளைகள் வெடிக்கும். அந்தக் கிளைகளை அப்போ  
தைக்கப்போது வெட்டிவிடவேண்டும். வெட்டி மரத்  
தை ஒழங்காய் கோவளாவிடவேண்டும். முதிர்ந்த கிச்  
சிலி மரங்களில் கோணலாயிருக்கப்பட்ட கிளைகளையும்  
பாட்டுப்போன கிளைகளையும் ரம்பத்தால் அறுத்து, அறு  
பாட்டபாகத்தில் தார் தடவி விடவேண்டும். மரம்  
காய்ப்பில்லாமல் தழையாப் மதத்துப்போனால், மரத்  
தைச் சுற்றிவா சுமார் 4. 5 அடிக்கு வெட்டி, சல்லி  
வேர்களை எல்லாம் களைந்து மறுபடி மண்ணை இருந்த  
விடத்தில் போட்டுவிட வேண்டும். இதற்கு வேர்  
காய்த்து என்று பெயர்.

எரு இடுதல் :-

இளமமரங்கள் நன்றாய் வேரூன்றி வளருகையில்  
அடிக்கடி நல்ல மடித்த சாணத்தையாவது அல்லது  
சிறுமீன்கள் எருவையாவது உரம் அணைத்தால் மரம்  
கொழு கொழுவென்று வரும். காய்ப்புள்ள மரங்க  
ளுக்கு வருஷா வருஷம் மேற்படி உரங்களை எலும்புத்  
தூளுடனும் சுண்ணாம்பு நீற்றுடனும் அணைத்து வர  
வேண்டும்.

கண்டுழதல் :-

6வது வருஷம் முதல் காய்க்க ஆரம்பிக்கும். 6வது  
வருஷத்தில் மரம் 1க்கு சுமார் 50 பழமும் 6வது வரு  
ஷத்தில் மரம் 1க்கு 100 பழமும், 7வது வருஷத்தில்  
மரம் 1க்கு 150 பழமும், 8வது வருஷத்தில் மரம் 1



க்கு 200 பழமும் கிடைக்குமாம். நிறகு வருஷா வருஷம் எல்லாம் ஒத்துக்கொண்டால் சராசரி ஒரு மரத்திலிருந்து 300 பழங்களுக்குக் குறையாமல் கிடைக்குமாம். மரம் 1க்கு 1வது வருஷம் முதல் சராசரி வரும்படி 1 ரூபாய் கிடைக்கும். கிச்சிலித் தோட்டத்தில் போட்ட முதலுக்கு 100க்கு 24 வரிகளுக்குக் குறையாது.

**கைத்தொழில் :—**

கிச்சிலியினுடைய இலைகளையும் துளிகளையும் ஜலத்தில் காய்ச்சி ஆவியை வாளியில்விட்டுத் துளிர்வாய்ப்படுத்தினால் இந்த ஆவி ஒருவித நிலை இல்லா எண்ணெயாய் மாறிவிடும். இதற்கு கிச்சிலி இலைத் தைலம் என்று பெயர். இதைத் திறந்து வைத்திருந்தால் ஆவியாய்ப் போய்விடும். ஆகையால் நன்றும் சூடி வைத்திருக்க வேண்டும். இப்படியோ பழத்தின் தோல்கள் இருந்தும், புஷ்பங்களிலிருந்தும் நிலை இல்லாத தைலம் எடுக்கலாம். பூக்களிலிருந்து எண்ணெய் எடுத்தவுடன் அந்த எண்ணெயோடுசம்பந்தப்பட்டிருக்கிற சுத்தஜலத்திற்கு கிச்சிலி புஷ்ப ஜலம் என்று பெயர். இது வைத்தியத்திற்கு பிரயோசனப்படுகிறது. கிச்சிலி இலை, தோல் பூக்களிலிருந்து உண்டாகும் தைலங்களுக்கு நல்ல கிராக் கியுண்டு.



## கொய்யா.

இப்பழவகைத் தோட்டம் தனிமையில் காண்பது அரிது. பழங்களை காக்கையும், கிளிகளும், பகலிலே யும் வெளவால் இராத்திரி காலங்களிலேயும் நீரம்ப சேதப்படுத்துவதாலும், காவல் காப்பது கஷ்டமாயிருப்பதனாலும் தனி கொய்யாத் தோட்டங்கள் அதிகமாகப் போடுவதில்லை. ஆகையால் கொய்யாமரம் அங்குமிங்குமாயிருக்கும். கொய்யாத் தோட்டங்கள் நீரம்ப அபூர்வமாயிருக்கும்.

பயிர் வித்திசெய்தல் :--

விதைகளிலிருந்து நாற்றங்காலில் கன்றுகள் உண்டாக்கி தோட்டங்களில் நடலாம். நல்லமரங்களிலிருந்து கன்றுகளுக்கு ஒட்டுகட்டி ஒட்டு சேர்த்த கன்றுகளை யுங் தோட்டங்களில் நடுவது சர்வ சிலாக்கியம். கன்றுகள் நட 2 வருஷம் முதல் 4 வருஷம் உள்ள கன்றுகளா யிருக்கலாம். தோட்டங்களில் 20 அடிக்கு ஒரு தரம் குழிகள் வெட்டி கன்றுகளை புதைக்க வேண்டும். மா, கிச்சிலிக்குச் செய்வதுபோல செய்நேர்த்தி, உரம், கொடுக்க வேண்டும். காய்க்க ஆரம்பிக்கிறவரையில் இடைவெளியில், வெண்டை, கொத்தவரை, முள்ளங்கி, கொத்துமல்லி, முதலிய பயிர்களை, உண்டாக்கி லாபம் அடையலாம். 2 வது வருஷத்தில்



நட்டால் 3வது வருஷ முதலிலும். 4வது வருஷத்  
தில் நட்டால் 3வது வருஷ முதலிலும் பூக்க ஆரம்  
பிக்கும். பூரிபை வருஷாவருஷம் களை அன்னியில்  
மரத்தைச் சுற்றி கொத்திட்டு உரம் அணைத்து பழங்  
கள் சேதப்பட்டுப் போகாமல் பாதுகாத்து வரவேண்  
டும். இம்மரங்களுக்கு களை காய்த்து செவ்வதில்லை.  
ஆனால் நீண்ட களை களை எல்லாம் கீழேவளைத்து அன்  
னோடொன்றாகக்கட்டி வெளிச்சமும் காற்றும் போகும்  
படியாய்ச் செய்து பழம் பெருக்குமாபடி செவ்வார்கள்.  
அக்டோபர் நவம்பரில் பழக்கும். வெள்ளைச் சதை  
யுள்ள ஒரு சாதியும், சிவப்புச் சதையுள்ள ஒரு சாதியும்  
உண்டு. ஒரு கொய்யாத்தோட்டம் 12 வருஷம் முதல்  
20 வருஷத்துக்குமேல் இருக்காது. பூரி நல்லசாயிரு  
ந்து நல்லகவனம் எடுத்துக்கொண்டால் 20 வருஷம்  
வரையிலிருக்கும்.



அஞஸ்.



அஞஸ் பழம்.



ஆனால் விர்த்தி யாக்குவதற்கு நீர் சுவர்த்த சிவோஷ்ணமும், பொலபொலத்த பழுப்பு நிறமுமுள்ள பாதி களி, பாதிமணல் சம்பந்தமுள்ள நிலமும், நல்ல வாழ்கால் வசதியும், நல்ல உரம் செய்கிறதாயும், வேண்டுமாம். இதைக் குறுத்துக் கிழங்கினால் விர்த்திபண்ணலாம். ஜெனவரி மாதம் முதல் மார்ச் 4 மாதாவரை யில் 2. அடி விதிகியாசமுள்ள வர்சைகளில், வர்சைகளிலேயே 1½ அடிக்கு ஒரு தாய் நடப்படுகின்றன. குறுத்துக் கிழங்குகளை இளமையில் மூட்டா போட்டு மூடி வைத்திருப்பார்கள். விவசாயவதற்கு முன்னால் வெகு ஜாக்கிரதையாய்ப் பாசனம் செய்யவேண்டும். பயிர் வளருகையில் காய்க்க சிறுமீன்களை உரமாகக்கொடுத்து பூமியை எப்பொழுதும் கைப்பாக வைத்திருக்கவேண்டும். மழைக்காலத்தில் தண்ணீர் வேண்டியதில்லை. பழம் முதிருகையில் ஜாஸ்தி பாசனம் கொடுக்கவேண்டும். கிழலில் பயிர் செய்தால் பழம் பெருமனாக இருக்கும. ஆனால் நல்ல வாசனையைக் கொடுக்காது, நட்டு 9 மாதத்துக்கெல்லாம் பழுத்து முதிர்ந்துவிடும். சேலர், வட ஆர்க்காடு, பெங்களூர் முதலிய இடங்களில் சாகுபடி செய்யப்படுகிறது. இவ்விடங்களி லெல்லாம் மாந்தோப்பு, தென்னந் தோப்புகளில் சாகுபடி செய்யப்படுகின்றது. ஆனால் பழம் கொஞ்சம் காரலாயிருந்தால் உப்பு சலத்தினால் கழுவினால் காரல் நீங்கிவிடும். பாக்குத் தோட்டங்களிலும் சாகுபடி செய்யப்படுகிறது.



கைத்தொழில் :—

அனாஸ் மடலிலிருந்து நேர்த்தியான நார் எடுக்க  
லார். அந்த நாரிலிருந்து நேர்த்தியான வஸ்திரம்,  
பட்டு முதலியவை செய்யப்படுகின்றன.





## மா துவளி.

பூம் :—

நல்ல ஆழமுள்ள வடிகால் வசதியுள்ள சுக்கான் சம்பந்தமான களி அல்லது செவ்வல் தீர்ப்.

விர்த்தியாக்ததல் :

விதைகளிலிருந்து கன்றுகள் உண்டாக்கி அவைகள் லிருந்தும். ஒட்டுக்கனறுகளிலிருந்தும். பயிர் உண்டாக்கலாம். கன்றுகள் 3 வகு வருஷத்தில் நடத்தகுதியுள்ளதாயிருக்கும் : தோட்டங்களில் 20 அடிக்கு ஒரு தரம் நடவேண்டும். சொற்ப மழையுள்ள வறட்சியான இடங்களில் கன்றாய் வளருப. கன்றுகளை 2, 3 தரம் பிடுங்கி நடுவதும் உண்டு.

செய் நேர்த்தி :—

பாக்கிப் பழவகைப் பயிர்களுக்குச் செய்வதுபோல கொத்தல், களைபிடுங்கல், பாசனம், இடைவெளியில் பயிர் உண்டாக்குதல், கபாத்து செய்தல் முதலியன செய்ய வேண்டும்.

கண்டு முதல் :—

செப்டெம்பர் முதல் டிசம்பர் வரையில் மாதளங்காய் முதிர்ந்து கொண்டுவரும். ஒரு மரம் 1 க்கு 30 பழம் முதல் 50வரையில் கிடைக்கும். காக்கை, கிளி, அணில் முதலியவைகளின் தொந்திரவுகளுக்கு பழங்




களை மூடிவைத்திருக்க வேண்டும். மணிகள் கட்டி  
அடிக்கடி அது துக் கொண்டுருக்க வேண்டும். மாம்  
1-க்கு சராசரி வருஷம் 1 க்கு சுமார் ரூபாய்  $\frac{1}{2}$  வரும்  
படி சிடைக்குது.

—



கொடிமுந்திரி.



கொடிமுந்திரிப்பழம்.



**தருந்தபூமிகள் :—**

பொலபொலத்த பாதிகளி, பாதிமணல், கலந்தபூமி திறம். நல்ல பாசன வசதியுள்ள தோட்டக்கால் நிலம் மிகவும் நல்லது. அதிக காற்றுள்ள இடங்கள் கூடாது. நீர் சுவறின அதிக குளிரான இடங்களில் காய் காய்க் காது. அதிக வறட்சியுள்ள இடங்களிலும் அப்படியே. செய்நேர்த்தி, உரம், பதியன்கள், நடவு, கபாத்து முதலியன :

பூமியை வெகு நன்றாய் உழுது, வேர்வாரியால் வேலைசெய்து தாவாளியாக்கி, சுத்தமாய் வைத்திருக்க வேண்டும். இப்படி கருவிகளால் வேலை செய்வதில், தோட்டம் நன்றாய்ப் பலித்துவிட்டால் பிற்பாடு 10 வருஷம் உழவு முதலியது செய்யவேண்டியதில்லை என்று நினைத்து வேலைசெய்யவேண்டும். 8 அடிக்கு ஒருதரம் 2 அடி நீளம், 2 அடி அகலம், 2 அடி ஆழமுள்ள குழிகள் உண்டாக்கி அக்குழிகளை, ஆற்றுவண்ட வினாலும், மடித்த சாணத்தினாலும் நிரப்பி வைத்திருந்து, அவைகளில் நல்ல முதிர்ந்த கொடிகளிலிருந்து 3, 4 கணுக்களையுடைய பதியன் துண்டுகளை எடுத்து நடவேண்டும். பதியன்கள் அக்டோபர், நவம்பரில் நாற்றங்காலில் ஊன்றப்பட்டு, வேளான்றின பிற்பாடு 2 வாரத்துக்கெல்லாம் தளிர்கள்விடும். இப்படித் தளிர்கள் கண்ட பதியன்களை 9, 10 மாதத்துக்கெல்லாம் தோட்டக் குழிகளில் நடவேண்டும். பதியன்களெல்லாம் அக்டோபர் மாதத்தில் கபாத்து செய்யப்படுகிற கொடிகளிலிருந்து எடுக்கப்படும். ஏகர் 1க்கு 30டங்



மடித்த சாணமும் 4() டன் மடித்த நுல்பழம் 4 டன்  
 எலும்புத்தூளும் ½ டன் போட்டி லுப்பா போட்டால்  
 நல்ல கண்டு முதல் கிடைக்குமா. பதியங்கள் தோட்  
 டங்களில் வளருகையில் ஐன்றி கொல கொடுக்க  
 வேண்டும். இதற்குக் களியாண முறையில். ஒவ்  
 வொரு பதியனுக்கும், ஒரு அடி அளவுக்குக்காவல்  
 கைமொத்தமுள்ள போத்துகளை ஐன்றிவது வழக்கம்.  
 கொடிகள் வளரும்போது களியாணமுறையில் போத்  
 துகளில் கட்டுவது வழக்கம். கொடி 6 அடி உயர்  
 மிருக்கையில், தலையைக் கிள்ளிவிடுவார்கள். இளம்  
 பயிரில் கிளைகளை யெல்லாம் தறித்துவிட வேண்டிய  
 பிற்பாடு 6 முக்கிய கிளைகளை வைத்துக்கொண்டு பாக்  
 கியைத் தறித்துவிடவேண்டும். ஒவ்வொரு தளிர் 1 ல்  
 யும் கொடி இளமையாயிருக்கையில் ஒரு குலை உயர்  
 தான் வைத்திருக்கவேண்டும். தோட்டம் பலபாட்டு  
 விட்டால் ஒரு தளிருக்கு 2, 3 குலை வைத்திருக்கலாம்.  
 பெரும் காத்திரமான பழம் வேண்டுமானால் ஒரு தளி  
 ருக்கு ஒரு குலைக்குமேல் வைத்திருக்கக் கூடாது.  
 பழம் முதிர்ந்துகொண்டிருக்கையில் பாசளத்தைக்கூட  
 மிப்பித்திக்கொண்டு வரவேண்டும். கோடைகாலத்  
 திலும், குளிர்காலத்திலும் பழம் பறித்தவுடன் கபா  
 த்து செய்யப்படுகிறது. கோடைகாலத்தில் கபாத்து  
 செய்தவுடன் கொடியின் மேற்பட்டைகளை உரித்து,  
 சாணசலத்தில் மண்ணைக் கரைத்து உரித்த இடத்தில்  
 பூசுவார்கள். இப்படிப் பண்ணினால் தண்டில் பூச்சி



கள் ஏறாதாம். கபாத்து செய்தவுடன், பக்கத்தில் கானும் தளிகள் கிளைகள்விட்டு ஒடும். பந்தல்போட்டு கொடிகளையும், தளிகளையும், ஏற்றுவார்கள். சிலவிடங்களில் பிரந்தமான இரும்புக்கம்பும் பந்தல் போட்டு வைத்திருக்கிறார்கள். முதல் 2 வருஷத்துக்கு திராசைக்ஷத்தோட்டத்தில் இடைவெளியில் ஏதாவது பயிர்கள் உண்டாக்கலாம்.

திராசைக்ஷக்கொடித் தோட்டம் உண்டாக்க பிரம்ப செலவு பிடிக்கும். சாதாரணக் குடிகளால் செய்யக் கூடிய காரியமல்ல. கொத்தல், கபாத்துசெய்தல், ஏரு விடுதல், பாதுகாத்தல் முதலியவைகளுக்கு, பிரம்ப செலவு பிடிக்கும். முதல் 2, 3 வருஷத்துக்கு வரும் படி கிடைக்காது. பூக்களை அப்போதைக்கப்போது பறித்து, முதல் 2 வருஷத்தில் கொடிகளில் காய்க்க விடக் கூடாது. 3வது வருஷம் முதல் 4வது வருஷம் வரையில் நல்ல பலனைக்கொடுக்கும். பிற்பாடு தோட்டம் பலவீனப்பட்டுப் போய்விடும். குலைகளைப் பறித்தவுடன் கொடிக்கு பாசனம் கொடுக்காமலும், பயிரை தளிரவிடாமலும் அடிககவேண்டும். தோட்டம் பறித்துவிட்டால் ஏராளமான வரும்படி கிடைக்கும்.

கைத்தொழில்:—

திராசைக்ஷ ரசத்திலிருந்து ஒருவித உயர்ந்த சாராயம் இறக்கலாம்.



## முந்திரி.



இது ஒரு பழவகைப் பயிர். இது சாதாரணமாய் கடற்கரை யோரங்களிலும், மணல்சாரியிலும் நன்றாய் வருகிறது. இது 15, 20 அடி வரையில் உயரும். ஜூலை, ஆகஸ்ட்டு மாதங்களில் ஒரு உழவு உழுது முந்திரிக்கொட்டையை ஊன்றினால் செடிகள் உண்டாகிவிடும். விதை ஊன்றுவதற்கு முன்னால் விதையை இரண்டு நாள் ஜலத்தில் ஊர்ப்போட்டிருந்து பிறகு ஊன்றுவது நலம். இதைத் தனியாயில் சாகுபடி செய்கிற வழக்கத்தை அதிகமாகக் காணோம். நீவது வருஷத்திலேயே காய்க்க ஆரம்பிக்கும். 7வது வருஷத்துக்குப் பிற்பாடுதான் நல்ல காய்ப்பு உண்டாகும். வருஷத்தில் மரம் 2 தடவை பூக்கும். முந்திரிப் பழம் என்று சாதாரணமாய்ச் சொல்லுவது, முந்திரிக்கொட்டையின் காய்ப்பு ஒழிய வேதல். மரம் விறகுக்கு பிரயோசனப்படுகிறது. பழத்தின் ரசத்திலிருந்து சாராயம் இறக்குகிறார்கள். பருப்புப் போசனப் பதார்த்தத்தோடுச் சேர்க்கப்படுகின்றது. பருப்பிலிருந்து ஒருவித நிலையுள்ள எண்ணெய் எடுக்கிறார்கள். கொட்டையைச் சுட்டு பருப்பு எடுத்தாலும் எடுக்கலாம். இல்லாவிட்டால் கொட்டையை ஊசியால் குத்தி உடைத்து பருப்பு எடுத்தாலும் எடுக்கலாம். உடையாத பருப்புக்குத்தான் விலை ஜாஸ்தி. முந்திரிக்கொட்டை எட்டிலிருந்தும் ஒருவித எண்ணெய் எடுக்க



லாம். பூச்சிவைக்கிற புண்களுக்கு முந்திரி எண்ணெய் உபயோகப்படுத்தப்படுகிறது. ஒரு முதிர்ந்த மரத்துக்கு 2, 3 விசை பிசின் கிடைக்கும். பிசின் வார்னிஸ் கொடுக்க உபயோகப்படுகிறது. மாப்பட்டை திவர்ப்பானதால் அப்பட்டையின் கஷாயம் தோல் பதனிட உபயோகப்படுகிறது.

சபையான நிலம் இம்மரத்தின் இலை உதிர்வதனால் கொழுமை அடைகிறது. நிலத்தை பல துண்டுகளாக வகுத்து, முந்திரியை கட்டு இதர பயிர் சாகுபடிசெய்து வந்தால் நிலம் விழுகிற சாகுகளால் கொழுமை அடைவது மன்னியில் இதர பயிர்ச் சாகுபடிசெய்யத் தகுதி உள்ளதாகும்.

-----



# கர்ப்பூஜ்.

சுருதி (1)



கர்ப்பூஜ் பழம்.



இது பாங்கி. பூஷணிமுதலிய ஜாதியைச் சேர்ந்தது. நல்ல வளப்பமான களிமண் பூமியில் வளரும். பெரிய பாத்திகள் சுட்டி, முகடுகள் உண்டாக்கி, அவைகளில் விதை தெளித்துப் பயிர்செய்தால் பூமியில் அதிக ஜலம் கங்கிக்கொண்டாலும், பயிரை ஒன்றும் பண்ணாது. செப்டெம்பர் முதல் டிசம்பர்வரையில் விதை தெளிக்கப்படுகிறது. பயிர் 1 அடி இருக்கையில் பூனிக் கொழுத்தை ஒடித்துவிட்டால் பக்கங்களில் ஜாந்தி கிளைகள் உண்டாகும், கிளைகளிலேயும் அப்படியே கிள்ளி, சுமார் 12 கிளைக்குமேல் வளரவிடாமல் வைக்கவேண்டும். கிளைக்கு 1 அல்லது 2 பழம் உண்டாகிறவரையில் பயிரை வைத்திருக்கலாம். கர்ப்பூஜ் காய் கன்றும்ப பழுக்கிறவரையில் 2 கிளைக்கு ஒரு தரம் தண்ணீர் பாசனம் பண்ணிக்கொண்டு வரவேண்டும். நிற்பாடு கிறுத்திவிடலாம். நல்ல வாசனையும் கைக்கு மிருதுவாய் மிருந்தால் பழம் பழுத்ததற்கு அடையாளமாகும். குதிரை வத்தி நிரம்ப திறமான உரமாம். பூமியை அடிக்கடி நன்றாய் வெட்டி, கொத்தி, எருவைப்பரப்பி ஆரம்பத்தில் கொஞ்சமாய்ப் பாசனம் கொடுத்து அப்புறம் அதிகரித்து வரவேண்டுமாம். காய்கள் பழுத்தவுடன் பழங்களுக்குக் கீழும், (வைக்கோலால்) வெய்யில் கிரணம்படாதபடி மேலேயும் மூடிவைப்பதுண்டு. வெள்ளரிப் பழத்துக்கும், கர்ப்பூஜ் பழத்துக்கும் உருசியில் அதிக வித்தியாச மிராது. வெள்ளரியைப்போலத்தான் இதற்கும் சாகுபடி.



பலா.



பலா மரம்.



**பயிரின் கபாவம் :-**

இது ஒரு பழுவகைப்பயிர். இதில் வர்க்கை, கூழை, வோயாலொன்று அநேகமாதிரிக ளிருக்கின்றன.

**தகுந்த பூமிகள் :-**

பலாபாத்திற்கு முதலதரமான பூமி செவ்வல் மண், வடிகால வசதியுள்ள ஆற்றுப்படுகையில் நன்றாய்வரும். நீர் பிடியுள்ள பூமிகளும், கரிசல பூமியும் கூடாது.

**கன்றுகள் உண்டாகுதல் :-**

சுமார் 50 வருஷத்திற்கு மேற்பட்ட மரங்களின் சிறுக்கிளைகளில் காபத்துத் தானாகப்பழுத்த பழங்களில் திடமான கொட்டைகளை தொப்புளோடு நரம் காயு முன எடுத்தி, 3 அடி அகலமும் 1 அடி ஆழமுமான பண்ணட்டி அல்லது மூங்கிற் கூடைகளில் மடித்த சாண உரமும் மண்ணும நீர்ப்பி, கூடை அல்லது சட்டி 1க்கு 2 கொட்டைகள் வீதம் ஊன்றி 2 மாதகாலம் நெப்பாக வைத்திருக்கவேண்டும். 2 வது மாத இறுதியில் சட்டியை உடைத்துவிட்டு கன்றுகளை நடலாம். பூமியில் நாற்றுகள் அல்லது கன்றுகள் எடுத்து நடுவதினால், கன்றுகள் அதிகமாகப் பலிதமாகிறதில்லையாம்.

**செய் நேர்த்தி :-**

பூமியை நன்றாய் உழுது 4 அடி சதாரமும் 5 அடி ஆழமுமான குழிகள் 40 அடிக்கு ஒன்றுவீதம் வெட்டி 2 மாதம் ஆறப்போட்டிருந்து, எலும்புத் தூள், கண்ணாம்பு நீறு, சாம்பல், மடித்த சாணம், கருக்காய்



இவைகளைச் சொரண னுடன் கலந்து குழிகளை நீர்ப் பி  
2 மாதக் கன்றுகளை முன்சொல்லி இருக்கியடி வா  
வேண்டும். இப்படி கட்டால் 1 ஏக்கர் நிலத்துக்கு  
சுமார் 30 கன்றுகள் வேண்டியிருக்கும். கன்றுகளு  
க்கு மூங்கில் ஊன்றுகோல் ஊன்றி நீர்வளர் விடுவது  
வழக்கம்.

**பாசனம் :—**

கட்டு நீருந்நி ஒருவருஷகாலம் வரையில் நிலம்  
ஒரு தண்ணீரும் 2 வது வருஷத்தில் 2 நாளைக்கு ஒரு  
தண்ணீரும் 3 வது வருஷத்தில் 3 நாளைக்கு ஒரு தண்  
னீரும் 4 வது வருஷத்தில் 4 நாளைக்கு ஒரு தண்ணீ  
ரும் அகற்குப் பிறகு வெய்யில் காலங்களில் 3 வது  
தண்ணீரும் விட்டால் போதுமானது.

**பின் செய் நேர்த்தி :**

வருஷத்துக்கு ஒரு தரம் பூரியை கண்டும் உழுதும்  
கன்றுகளை சுற்றிவர வருஷத்துக்கு 2 தடவை கண்டும்க்  
கொத்திக் கொடுத்தும், வருஷத்துக்கு 2 தரம் உரம்  
அணைத்துக் கொண்டும் வரவேண்டும். முதல் வருஷம்  
கன்று ஒன்றுக்கு ஒரு கூடையும், 2 வது வருஷம் 2  
கூடையும், இப்படி வருஷந்தோறும் ஒரு கூடை கூட்டி  
உரம் அணைத்து வரவேண்டும். இதில் சுமார் 10 வரு  
ஷம் புஞ்சைப் பயிர் இடவெளியில் தாராளமாய்ப்  
போடலாம். முதல் 4, 5 வருஷத்தில் கல்ல வெள்ளா  
மையும் பிறகு  $\frac{1}{2}$  வெள்ளாமையும் கிடைக்கும்.



முதல் 5 வருஷத்துக்கு செலவு விபரம்:—

|                                                   | ரூபா. அ. பை. |    |   |
|---------------------------------------------------|--------------|----|---|
| 30 சட்டி மும் மண் உரையும் தயார்ப்பண்ணை            | 1            | 0  | 0 |
| நினைத போட ... ..                                  | 1            | 0  | 0 |
| சட்டியில் 2 மாதத்துக்கு தண்ணீர்விட...             | 1            | 0  | 0 |
| 30 குழிகள் வெட்ட ... ..                           | 5            | 10 | 0 |
| 30 குழிக்கும் உரம்போட்டு மண்ணால்<br>சிரப்ப ... .. | 3            | 0  | 0 |
| 5 வருஷம் தண்ணீர் தூக்கிக்கொட்ட...                 | 60           | 0  | 0 |
| மூங்கில் கட்டுக்கும மூங்கில் கம்புக்கும்.         | 3            | 12 | 0 |
| வருஷம் 2 தாம கொத்தி உரம் அணைக்க.                  | 5            | 0  | 0 |
|                                                   | <hr/>        |    |   |
| ஆக மொத்தம்...                                     | 80           | 6  | 0 |
|                                                   | <hr/>        |    |   |

முக்கிய செலவு ஆகும்.

கண்டுமுதல்:

5 வது வருஷத்தில் காய்க்க ஆரம்பிக்கும். ஒரு கிளையில் ஒரு பிஞ்சுக்கு மிஞ்சின பிஞ்சுகளை கறிக்கு பக்குவமான காலத்தில் எடுத்துவிட வேண்டும். பின் காய்களை பால் முறிந்தபிறகு தட்டிப்பார்த்து நன்றாய் முதிர்ந்தபின் மரத்திலிருந்து அறுக்கவேண்டும். 5வது வருஷத்தில் மரத்துக்கு 4 காயும், 10வது வருஷத்தில் மரத்துக்கு 20 காயும், 20வது வருஷத்தில் மரத்துக்கு 100 காயும் காய்க்குமாம். 20 வருஷத்தில் மரம் 1க்கு 10 காய்கள் மாத்திரம் காய்க்கக்கூடிய மரங்களு மிருப்பதால் அதிகமான காய்ப்பு, சிலத்தின் வளத்தையும்,



மரத்தின் சுபாவத்தையும் பொறுத்ததாக இருக்கிறது. 5 வருஷம் முதல் 20 வருஷம்வரையில் பாத்துக்கு சராசரி வருஷம் 1க்கு 40 காய் வரும்படியாக வைத்துக் கொள்ளலாம். காய் 1க்கு ரூபாய் 0-4-0 வீதம் ரூபாய் 10 கிடைக்கும் இப்படி ஏகர் 1க்கு சுமார் ரூபாய் 300 கிடைக்கலாம். 20 வருஷத்துக்கு மேற்பட்டு மரம் 1க்கு வருஷம் 1க்கு சராசரி ரூபாய் 15க்கு கம்மிப்படாதாம். எந்த விதத்திலும், இச்சாகுபடியில் போட்ட முதலுக்கு வாட்டி மாதம் 1க்கு ரூபாய் 100க்கு ரூபாய் இரண்டுக்குக் குறையாமல் கிடைக்கும். மரம் இளமையாயிருக்கையில் காய்கள் கிளையிலும் நிறகு தண்டு அல்லது அடிக்கட்டையிலும், பூக்கிந்தமரத்தின் வேரிலும் காய்க்குமாம்.

**கைத்தொழில் :—**

பலா மரத்தினிருந்து பெட்டிமுதலிய அநேகவித மரச்சாமான்கள் செய்யலாம். இழைப்பு வேலைக்குச் சிலாக்கியமான மரம். பலாமரத்தின் இழைப்புத்துளி விருந்து ஒருவித மஞ்சள் சாயம் படிக்காரத்தினால் இறுக்கப்பட்டு, பர்மா தேசத்து மதாசாரியார்களின் உடைகளுக்கு சாயம்கொடுக்கவும், பட்டுக்கு மஞ்சள் சாயம் கொடுக்கவும் உபயோகப்படுகிறது.



சாயவதைப் பயிர்கள்.

அவரி.



அவரிச் செடி



**பயிரின் கபாவம் :—**

இது ஒரு சாயப்பயிர். பசுந்தான் அல்லது தழை எருவுக்கும் பயிர் செய்யப்படுகிறது. இது சுண்ணாம்புத்தீனி.

**மாதிர்கள் :—**

கொளிஞ்சி முதலிய அநேகவித அவுரிகள் பாது நாட்டில் வளர்க்கிறபா யிருக்கின்றன. இவைகளின்ருந் தும், அவுரியினிருந்து சாயம் எடுப்பது மீடால் ஒருவித சாயம் எடுக்கலாம்.

**பூமிகள் :—**

இது சாதாரணமாக புஞ்சைப் பயிராக சாகுபடி செய்யப்பட்டாலும், அநேக இடங்களில் கிணற்று இறவையில் சாகுபடி செய்யப்படுகின்றது. புஞ்சையில் அதிகமாகச் சாகுபடி செய்யப்படுவதில்லை. இது கரிசல் முதலிய எல்லா நிலங்களிலும் வருமா. வந்தப் பூமியில் சுக்கான் சம்பந்தம் ஜாஸ்தி இருக்கிறதோ, அந்தப் பூமியில்தான் நன்றாய் வரும்.

**செய்நேர்த்தி :—**

செப்டெம்பர், அக்டோபரில் 2, 3 தடவை உழுது டிசம்பர்வரையில் தரிசாகப்போட்டுவிட வேண்டியது. விதை தெளிப்பதற்கு முன்னால் பூமியை மறுபடியும் ஒரு தடவை உழுது, புல், பூண்டுகளை யெல்லாம் களைந்துவிட்டு, விதை சிந்தாகைமால் அதிக ஆழத்தில் போய் முளைகளிப்பாமல் கெட்டுப்போவதைத் தடுக்கும் பொருட்டு உருளையால் பாம்படிப்பது நல்லது.



இல்லாவிடில் உழுத பூரியை கடப்பை, கர்நூலில் செ  
ய்வதுபோல குண்டகை என்னும் கருவியால் மண்  
னை இருகச் செய்வது நல்லது.

**உரம் :—**

மணல் சரியாயிருந்தால் ஏகர் 1க்கு சுமார் 20  
வண்டி வண்டல் பொருக்கடிப்பது திறம். சுண்  
னாம்பு நீறு  $\frac{1}{2}$  வண்டியும் சாம்பல் 1 வண்டியும்  
கலந்து அடிக்கலாம். தோட்டக்காலில் சுமார் 10, 15  
வண்டி சாம்பல் குப்பை எருவாவது அடிப்பார்கள்.

**காலம், விதைகள் அளவு முதலியன :—**

நவம்பர், டிசம்பர் மாதங்கள் விதை தெளிக்கத் தகு  
ந்தகாலம். சாதாரணமாய் டிசம்பர் மாதத்தில்தான்  
அவுரி விதை தெளிக்கப்படுகிறது. தோட்டக்காலில்  
ஜூலை, ஆகஸ்ட்டிலும் தெளிக்கிறார்கள். ஏகர் 1 க்கு  
சுமார் 10, 15 பவுண்டு விதை செல்லும். அதாவது 3  
பட்டணம்படி முதல் 5 பட்டணம்படிவரையில் விதை  
செல்லுகிறதாம். விதைகளை  $\frac{1}{2}$  அங்குல ஆழத்துக்கு  
மேல் தெளிக்கக்கூடாது. விதைகளை கொர்ளுவால்  
(விதை தெளிக்கருவி) வரிசை வரிசையாய்த் தெளிக்க  
வேண்டும். தழை எருவுக்காகப் பயிரிடும் பட்சத்தில்  
ஏகர் 1 க்கு 6, 7 பட்டணம்படி விதை கைத்தெளி  
யால் விதைக்கலாம்.

**பிச்செய் நேர்த்தி :—**

விதைத்தவுடன் மழைபெய்தால் முளைகாண வேர்  
வாரியால் வேலைசெய்ய வேண்டும். விதைத்து ஒரு



மாதத்துக்கெல்லாம் கொத்திகளை பிடுங்க வேண்டும். எப்போது களைகள் தொந்திரவு பண்ணுகிறதோ, அப்போதெல்லாம் களையைப் பிடுங்கிவிடவேண்டும். இல்லாவிடில் பயிரை ஒங்கவிடாது. தோட்டப் பயிரில் 6, 7 தரம் ஐலம் இறைக்குப்படி கேட்கும்.

வயசு, அறுப்பு, கண்டுழதல், முதலியன :--

இது சுமார் 6 மாதத்துப் பயிர் நமது இராஜதானியில் அக்டோபர், ஜனவரி, பிப்ரவரி, ஏப்பிரல் இம்மாதங்களில் அறுவடைசெய்யப்படுகின்றது. விதைத்துச் சுமார் 2 மாதத்துக்கெல்லாம் 1 அறுப்பும், 4 மாதத்துக்குப் பிந்தி ஒரு அறுப்பும், 6 மாதத்துக்குப் பிந்தி ஒரு அறுப்பும், பிறகு விதைக்காகவும் விட்டுவிடுகிறார்கள். இப்படி 10 மாதம் வரையில் ஒரு சமயம் பயிர் பூமியிலிருக்கலாம். ஒரு அறுப்பானவுடன் இலைகளைக் காயவைத்துக் கோணிப்பையில் கட்டிவைத்து விடுகிறார்கள். ஒரு அறுப்புக்குப்பின், இரண்டாம் தரம் தளிர்க்க பூமியை கொள்ளு கலப்பையினால் கீறியும் அல்லது வேறுவிதமாய் உழுதும் அல்லது வேறுவிதமான உழவு செய்நேர்த்தியும் செய்கிறார்கள். ஏகர் 1க்கு சுமார் 12,000ம் பவுண்டு தழைகள் கிடைக்கும். அதாவது சுமார் ரூபாய் 30 பொரும்படியான தழை கிடைக்கும்.

ஏகர் 1க்கு சாகுபடிச் செலவு சுமார் ரூபாய் 15 மொத்த வருமானம் சுமார் ரூபாய் 30 செலவுபோக மீதி தழையில் வருமானம் சுமார் ரூபாய் 15.



பிரயோகனம் :---

அவுரித்தழை நெல் முதலிய தானியப் பயிர்களுக்கு முதல்தர உரம். இது பூமியை உரப்படுத்துகிற பயிரில் ஒன்றாதலால், அறுவடைக்குப்பின் கீழ் வேரோ பின் வரும் தானியப் பயிருக்கு நல்ல உரமாகிறது. அவுரிச் சாணமும் நெற்பயிருக்கு நல்ல உரம். ஒரு வண்டி அவுரிச்சாணம் 3 ரூபாய் விலை.

வகத்தொழில் :—

பச்சைத் தழையிலிருந்தும், காய்ந்த தழையிலிருந்தும் 2½ மணி சாவகாசம் தண்ணீரில் ஊரப்போர்த்தி பிற்பாடு, நீலச்சாயம் காய்ச்சலாம். முதலில் ஒரு தொட்டியில் ஊரவைத்து இன்னும் ஒரு தொட்டியில் துடுப்புகளால் நீலச்சாய ஜலத்தைக் கலக்கினால் அடியில் சாயம் சேரூய்ப் படிந்துவிடும். இந்தச் சாய சேற்றை எடுத்துத் துணியில் ஒத்தி சதூரம் சதூரமாய் வெட்டி, சிழலில் காயவைத்து விலைக்கு விற்கிறார்கள். 1 ஏகர் தழையிலிருந்து சுமார் 2 மணங்கு சாயம் கிடைக்கும். 1 மணங்கு சாயம் சுமார் ரூபாய் 45 விலைபோகும். ஜெர்மனிதேசத்துச் சாயப்போட்டியால் இப்போது அவ்வளவு விலைபோகாது. அவுரிச்சாயத் தால் பருத்தி, பட்டு முதலியவைகள் அநேக ரெங்குகளாக சாயமேற்றப்படுகின்றன.



சுவை அதிகரிக்கச்செய்யும் பயிர்கள்.

மிளகாய்.



மிளகாய்ப் பயிர்.



**பயிர் சுபாவம் :** -

இது ஒரு சுவை அகிரிக்கச் செய்யும் பயிர். இது அநேகராய்த் தனிமையில் சாகுபடி செய்யப்படுகின்றது. சில சமயம் தோட்டக்கால் பாத்திகளின் கரைகளில் அங்கு மிங்குமாப் பல் கலந்தும் சாகுபடி செய்யப்படுகிறது. இது சிலவிடங்களில் புஞ்சைப் பயிராகவும், சிலவிடங்களில் தோட்டக்கால் பயிராகவும் சாகுபடி செய்யப்படுகிறது. புஞ்சை மிளகாய் மிகவும் காரமுள்ளது. இதில் அநேக மாதிரிகள் இருக்கின்றன. மாதிரிகளெல்லாம் நிறத்தையும், பருமனையும், பொருத்ததாயிருக்கிறது. குடமிளகாய் ஒருமாதிரி. மிளகாய், கத்திரி, புதைபிலைவர்க்கங்களைச் சேர்ந்ததால், இதற்கும் அவைகளைப்போல் சாம்பல் காரத்தில் பிரீதி ஜாஸ்தி.

**நடுத்த பூமிகள் :** -

தோட்டக்கால் செவ்வளிலும் கரிசனிலும் சாகுபடி செய்யப்படுகிறது. இது கிணற்றுப் பாசனத்தில் அநேகமாய் சாகுபடி செய்யப்படுகிறது. மணல் கலந்த களி நிலத்தில் நன்றாய் வரும். சுக்கான் சம்பந்தமுள்ள களியிலும் வரும். நிலம், மேட்டு பூமியாயிருக்க வேண்டும். நரத்தையும் நீராவியையும் கிரகிக்கக்கூடிய ஆழமாயுள்ள பொலபொலத்த மண்ணையுடைய கரிசனில் புஞ்சைப் பயிராகச் சாகுபடி செய்யப்படுகிறது. **நாற்றங்கால் செய் நேர்த்தி :** -

மே, ஜூன்மாதத்தில் ஒரு நிழலுள்ள 4 அல்லது 5 செண்டு நல்ல நிலத்தைப் பொறுக்கியெடுத்து, வெட்டி



## 232 சுவை அதிகரிக்கச்செய்யும் பயிர்கள்.

வாங்கி, கொத்தி, சார்பல், சப்பாத்திக் களளியினடி மண், நல்ல மடித்த குதிரைலத்தி முதலியவைகளால் ஒருவண்டி உரம் அடித்து, நல்ல தாவாவிப்பாக்கி, சிறு பாத்திகள் கட்டி, பாத்திகளில் 1 முதல் 1½ பவுண்டு விதை தெளிக்கவேண்டும். விதைகள் சிதிகைகையால் மண்ணோடாவது, சாம்பலோடாவது கலந்து ஒத்தாப் போல்விழுத் தெளிக்கப்படும். இந்த 1½ பவுண்டு அல்லது பட்டணம் படியால் ½ படி விதைகளினருந்து உண்டாகும் நாற்று ஒரு ஏக்கராகப் போதுமானது. நாற்றுகள் நிரம்ப நெறுக்கமா யிருக்கக்கூடாது. விதை த்தவுடன் சாம்பலைக்கொண்டாவது, மண்ணைக்கொண்டாவது பாத்திமேல் தூவிவிடவேண்டும். இளம் நாற்றுகளை வெயிலில் அடிபடாமல், வைக்கோலினால் மூடி வைக்கவேண்டும். ஆகையால் நாற்றுகளுக்குத் தண்ணீர் இறைக்கும்போதெல்லாம் வாளியாவது அல்லது கையால் மூட்டத்தின் பெரிலாவது தண்ணீர் தெளிக்கவேண்டும். தெளித்த மூன்றுவாரம் வரையில் பயிர் நிரம்ப இளமையாயிருக்கும். பிறகு கொஞ்சம் வலுவுண்டாகும். நாற்று 1½ மாதம் வயதானவுடனும், 6 முதல் 8 அங்குலம் வரையில் உயரமுள்ள போதும் பிடுங்கி நடப்படும்.

**வயல் செய்நேர்த்தி :—**

பூமியை நாலு தரத்துக்குக் குறையாமல் ஆழ உழுது, புல், களை, வேர் முதலியவைகளை வேர்வாரியால் நீக்கி, சுத்தம் செய்து, முதல் உழவுக்கு முன்



தியே 3() வண்டி மடித்த சாணத்தினால் உரப்படுத்தி, பூமியை 1() அடி நீளம் 1() அடி அகலமுள்ள பாத்தி களாகப்பிரித்து, பாத்திகளில் முகடுகளும் படைச் சாலகளு மேற்படுத்தி, கண்ணிகளுமுண்டாக்கி, தயார் செய்திருக்கப்பட்ட முகடுகளில் நாற்றுகள் நடப்பட வேண்டும். சிறு மிளகாய்ச் செடியாயிருந்தால் முகடுகள் 1½ அடி வித்தியாசத்தில் இருக்கவேண்டும். வயல் உழவுக்கு இருமடிக் கலப்பையையே உபயோகிப்பது திறம். சில சமயம் கல்ல பயிருக்கு முகடுகள் 3 அடி வித்தியாசத்திலு இருக்கலாம்.

**தகுந்த காலம், நடவு முதலியன:—**

ஜூன் மாதக்கடை சியில், நாற்றங்காலில் விதை விட்டு டால் ஆகஸ்டுமாதக் கடைசியில் நாற்றுகளைப் படுங்கி நடலாம். முகடுகளில் நாற்றை 1½ அடி வித்தியாசத்தில் நடவேண்டும். பெரும் மிளகாய்ச் செடியாயிருந்தால், இன்னும் இட வெளி கொஞ்சம் ஜாஸ்தியாய் விட்டு நடவேண்டும். சில சமயம் 1 நாற்றும், சில சமயம் 2, 3 நாற்றுகளையும் கலந்து நடப்படுகிறது. நடவேல்லாம் மப்பான சாயங்காலத்தில் நடப்படுகின்றன. ஏனென்றால் கட்ட இராத்திரியாவது அல்லது மறு காலாவது சிறுமழை பெய்தால் பயிர் கன்றாய் வருமென்று சொல்லுவார்கள்.

**பாகனம், கொத்தல், களைபிடுங்கல் முதலியன:—**

கட்டு வெகுநாள் வரையில் மழையில்லாவிட்டால் நாற்றுகள் மிகுதியாய் பட்டுப்போய் விடும். அப்



234 சுவை அதிகரிக்கச்செய்யும் பயிர்கள்.

போது பட்டுப்போன இடங்களுக்குப் புதிய காற்றைப் போட்டுக்கலப்பிக்க வேண்டும். பாத்திகளும் முகடுகளும் களையெடுக்க சங்கடமன்னியில் மீசவும் அடிங்காயிருக்கவேண்டும். பயிர் வேர் ஊன்றுகொடுவதில் தினம் ஒருதரம் அல்லது இரண்டு நாளைக்கொருதரம் ஜலம் பாய்ச்சி வரவேண்டும். நிறகு மழையிலாவது காலத்தில் 8 நாளைக்கொருதரம் அல்லது 10 நாளைக்கொருதரமாவது ஜலம் பாய்ச்சி வரவேண்டும். பட்டு 15 நாளைக்கெல்லாம் ஒரு கொத்தலும், 45 நாளைக்கெல்லாம் ஒரு கொத்தலும், நிறகு ஒரு கொத்தலும், ஆகமொத்தம் மூன்று கொத்தல் கொத்த வேண்டும். இரண்டாவ் கொத்தலில் மண்ணைக் கொண்டு உரம் அணைப்பது திறம். தோல் கிடங்கு எருவையாவது அல்லது குதிரையத்து எருவையாவது அல்லது போட்டிலுப்புகரைத்த ஜலத்தையாவது உரமாக அணைப்பது திறம். கொட்டைப்பிண்ணாக்கு உரமும் அணைக்கலாம். கொட்டைப் பிண்ணாக்கு 600 பவுண்டு முதல் 1,000 பவுண்டு வரை தூளாக்கிப் பயிருக்கு அணைத்து, சரிவரபாசனம் பண்ணிக்கொண்டு வந்தால் மூன்று அறுப்பு கண்டு முதல் எடுக்கலாம்.

வயகு, அறுப்பு, கண்டுமுதல், முதலியன: —

இது புஞ்சையில் சுமார் சராசரியில் 6 மாதத்துப் பயிராய் வைத்துக்கொண்டாலும், இறவையில் 9 மாதம் வரையில் பலனை அடிக்கடி அடையலாம். நட்டு மூன்று மாதத்திற்கெல்லாம் முதல் பலனையடைய



லாம். இரவையில் பூமியை சரிவர பாசனப்பண்ணி வந்தால், மூன்று மாதகாலத்தில் 4 அல்லது 5 தடவைக்குக் குறையாமல் மிளகாயைக் கிள்ளலாம். பச்சை மிளகாய்க்கு எங்கு அதிக கிராக்கி இருக்கிறதோ, அவ்விடத்திலெல்லாம் ஆரம்பத்தில் மாதம் 3 தரம் கிள்ளி விற்றுவிடலாம். பிற்பாடு மாதம் இரண்டு அல்லது ஒருதரம்தான் கிள்ள வேண்டும். பழுத்த மிளகாயை மூன்று தடவையோ அல்லது பழுக்கும் போதெல்லாமோ, பறித்துக்கொண்டு வரவேண்டும். ஆகஸ்டு கடைசியில் நட்பது நவம்பர் கடைசியில் காய்க்க ஆரம்பிக்கும். டிசம்பர், ஜனவரி, பிப்ரவரியில் 4, 5 தடவை பழுத்த மிளகாயைப் பறிக்கலாம். ஏகர் ஒன்றுக்கு சுமார் 6,000 முதல் 9,000 பவுண்டு வரையில் பச்சை மிளகாய் கிடைக்கும். அதாவது சுமார் 12 முதல் 18 கண்டியாகும். பழுத்த மிளகாயை வெய்யிலில் காயவைத்தால் ஈரம் சுண்டி ஏகர் ஒன்றுக்கு மூன்று முதல் 4 கண்டி மிளகாய் வற்றல் கிடைக்கும். இதன் விலை சுமார் 150 முதல் 200 ரூபாய்வரையி லிருக்கும். சாகுபடிச் செலவு சுமார் ரூபாய் 100 போனாலும், ஏகர் ஒன்றுக்கு செலவெல்லாம்போக 50 முதல் ரூபாய் 100 வரையில் மீறும். மிளகாய்வற்றலைப் பாடம் பண்ணின பிற்பாடு சாக்கில் தைத்து மூட்டை மூட்டையாய் விலைக்கு விற்றுவிடுவார்கள்.



# கொத்துமல்லி.

—:0:—



கொத்துமல்லிப் பயிர்.



பயிர் கபாவம் :—

இது ஒரு சுவை அதிகரிக்கச்செய்யும் பயிர். இது ஒரு மாரிகாலப்பயிர். இது விதைக்காகவும், இலைக்காகவும் சாகுபடி செய்யப்படுகிறது.

பூம் :

இது பருத்திப்பயிரிடும் கரிசல்காட்டில் நன்றாய் வருகிறது. பொதுவாக கரிசலிலே நன்றாய் வருகிறதாம். தோட்டக்காலிலும் சாகுபடி செய்யப்படுகிறது. தோட்டக்காலில் தனிமையிலும், கரிசலில் உப்பம் பருத்தியோடு சாகுபடி செய்யப்படுகிறதாம்.

செய்நேர்த்தி :—

அக்டோபரில், முக்தியே செய்நேர்த்தி செய்திருக்கப்பட்ட பூமியை, மறுபடியும் ஒரு தாம் உழுது ஏகர் 1க்கு 10 பவுண்டு விதை வீதம் தெளித்தால் ஜனவரியில் பயிர் முதிர்ந்துவிடுமாம். தோட்டக்காலில் ஜூனில் அதே அளவு தெளித்து செப்டெம்பரில் முதிர்ந்து விடுமாம். தோட்டக்காலில் வாரம் ஒரு தாம் வீதம் மொத்தம் 6, 7 தரத்துக்குக் குறையாமல் தண்ணீர் பாய்ச்சுவார்களாம்.

வயது, கண்டுழநல் :—

இது சுமார் 3 மாதத்துப்பயிர். தோட்டக்காலில் ஏகர் 1க்கு சுமார் 300 பவுண்டு விதை கிடைக்குமாம். பருத்தியோடு கலந்து சாகுபடி செய்தால் சுமார் 200 பவுண்டுதான் கிடைக்குமாம். அதாவது



238 சுவை அதிகரிக்கச்செய்யும்பயிர்கள்.

பருத்திவினுடைய சாகுபடிச் செலவை நடுண்ணி விடுமாம்.


**பிரயோசனம் :—**

இதை ஒரு தீவாப்பாயிராக உணர்த்தி இதன் நிலைகள் தினம் உணவில் சேர்க்கப்படுகின்றன. ஆகையால் இதை ஒரு கதிகாப்பாயிராகவும் கொள்ளலாம். இதின் விதை ஒளஷதங்களில் ஏராளமாகப் பிரயோசனப்படுத்தப்படுகின்றது. விதையில் 100 க்கு சுமார் ஒரு பங்கு ஒரு நிலை இல்லா எண்ணெய் எடுக்கலாம். மகமதியர்கள் அம்மையினால் கண்ணெய் பெறும்படியாகப் பருக்கிறதற்காக, இவ்விதையிலிருந்து கண்ணெய் எடுத்தல் செய்கிற மருந்தை உணர்த்துகிறார்கள்.

---



# ஜீரகம்.



மலை ஜீரகம்.



## 240 சுவை அதிகரிக்கச்செய்யும் பயிர்கள்

**பயிர். சுபாவம் :—**

இது ஒரு சுவை அதிகரிக்கச் செய்யும் பயிர். இது சுமார் 1½ அடி உயரமிருக்கும்.

**பூம் :—**

செம்மண்ணில் நன்றாய் வரும். பாதிகள், பாதி மணல் சம்பந்தப்பட்ட களிமண் பூமியிலும் வரும்.

**செய்நேர்த்தி :—**

இதற்கு 7 உழவுக்குக் குறையாமல் உழுது. கட்டிகள் உடைபடவேண்டியதற்காக பெரும் பலகைகளை கட்டி, இழுத்து, ஏகர் 1க்கு சுமார் 10 வண்டிக்குக் குறையாமல் மாட்டுச்சாணம் உரம்கொடுத்து. பிறகு கொட்டு கலப்பையால் உழுது, பிறகு பாம்புப்பலகையால் சமப்படுத்தி, பாத்திகள் கட்டி பாசனத்துக்காக கண்ணிகள் ஏற்படுத்திவிட வேண்டும்.

**விதையின் அளவு, காலம் முதலியன :—**

ஏகர் 1க்கு 12 பட்டணம் படி அல்லது 1 பணங்கு விதை வீதம் அடர்த்தியாய் தெளித்து, மண்ணூல்மூடி விடவேண்டுமாம். இப்படி மூடி 5 நாளைக்குப் பிறகு ஒரு பாசனம் கொடுக்கவேண்டுமாம். இப்படிக் கொடுத்தால் தெளித்த 11 நாளைக்கெல்லாம் முளைகாணுமாம். ஜனவரி ஆரம்பத்தில் தெளிக்கப்படுகிறதாம்.

**பின் செய்நேர்த்தி :—**

வாரத்துக்கு ஒரு தண்ணீர் பயிர் பூக்கிறவரையில் பாய்ச்சிக்கொண்டு வரவேண்டுமாம். விதைத்து ஒரு



மாகத்துக்கெல்லாம் வரப்பிளிஞ்சுந்தபடியே களைகளை எடுத்துவிட வேண்டும். இப்பயிருக்கு அதிக நோவு நொடி உண்டாகக் கூடியதாதலால் நோவுநொடி வராமல் கவனமாகச் சாகுபடி செய்யவேண்டும்.

**வயசு, அறுப்பு, கண்டுமுதல் முதலியன:--**

இது சுமார் 2½ மாதகாலப் பயிர். ஜீரகம் நன்றாய்ப் பழுத்து அசைப்பதமாய்க் காய்த்திருக்கையில் வேருடன் பயிரைப் பிரிங்கி கட்டாகக்கட்டி களத்திற்குக் கொண்டுபோய் காயவைக்கப்படுகின்றன. காயும்போது அடிக்கடி திருப்பிக்கொடுத்து நன்றாகக் காயவைக்கப்பட்டு பிறகு தடிக்காம்பாலடித்து பிறகு மாட்டுப் பிணையலாலும் அடித்து பிறகு விதை தூற்றப்பட்டு ஏகர் 1க்கு சுமார் 20 மணங்கு விதை கண்டுமுதல் செய்யப்படுகிறதாம். மணங்கு 1க்கு சுமார் ரூபாய் 6 வீதம் ஏகர் 1க்கு சுமார் ரூபாய் 120 வருமானம் ஆகிறது. நோய்நொடி இல்லாவிட்டால் நல்ல லாபம் கொடுக்கக் கூடிய பயிர்தான். இல்லாவிட்டால் இவ்வளவு கண்டுமுதல் கிடைக்காதாம். இதில் சாகுபடி செலவுபோக ஏகர் 1க்கு சுமார் ரூபாய் 50 மிஞ்சுமாம்.



கடுகு.



கடுகுப் பயிர்.



கடுகு = காரா. கடுகு = காரமுள்ள பொருள். கடுகு சிறுதால் காரம் போதுமா என்பது பழமொழி.

இது கவை அதிகரிக்கச் செய்யும் பயிர். இதில் வெள்ளைக்கந்நி என்றும் கருப்புக் கடுகென்றும் இரண்டு வகைகள் உண்டு. இந்த இரண்டு தினுசு விதை கன்தா கவைத்தபத்திலும் சமையனிலேயும் பிரயோகப்படுகின்றன. இச்சுண்டை இளம் பயிரை கீரை பாக சுவாசன செய்து சாப்பிடலாம். கடுகை, கறி, முதுப்பு முதல் பசுவகையில் பொரித்துக் கொட்டுவார்கள். வைத்திய சாஸ்திரத்தில் கறிகாய் முதலிய பதப்பாக்கங்களில் உள்ள கெடுதல்களை நீக்கவும் சரீரத்தை ஆரோக்கியமாய் வைப்பதற்கும் கடுகு பொறித்துக் கொட்டுவண்ணிமென்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. இதை ஒரு தைலவிதைப்பயிராகவும் கொள்ளலாம். இது அபூவாய் தனிமையில் சாகுபடி செய்யப்படுகிறது. இது கோதுமை பட்டாணியோடு கலந்து சாகுபடி செய்யப்படுகிறது. அநேகமாய் வயல்களில் சாகுபடி செய்யப்படுகிறது. ஏகர் 1 க்கு சுமார் 30 பவுண்டு விதம் அக்டோபர் மாதக்கடைசியில் விதைத்து பிப்ரவரிமாதக் கடைசியிலாவது அல்லது மார்ச்சு மாத ஆரம்பத்திலாவது அறுவடை செய்யப்படுகிறது. ஏகர் 1 க்கு சுமார் 300 பவுண்டு கடுகு கிடைக்கும். மாட்டுத் தீனி கம்மிப்பட்டால் வடஇந்தியாவில் ஜனவரி, பிப்ரவரியில் பயிர் பகைமையா யிருக்கும்போது அறுத்து மாட்டுக்குத் தீனி



## 244 சுவை அதிகரிக்கச்செய்யும் பயிர்கள்.

யாக்ருகிரூர்கள். கடுகிலிருந்து எண்ணெய் இறுக்கப் படுகிறது. வட இந்தியாவில் கடுகு எண்ணெயைத் தான் உடம்புக்கு தேய்த்துக்குளிப்பது வழக்கா. சமையலில் பொரிப்பதற்கும் தாளித்துக்கொட்டுவதற்கும் இந்த எண்ணெயை உபயோகப் படுத்துவது முண்டு. கடுகில் ஒரு காரமுள்ள வஸ்து இருக்கிறது. இந்த காரமுள்ள வஸ்துவை ஒரு நீலை இல்லா எண்ணெயாகப் பிரிக்கலாம். அதவாது ஜலத்தோடு கடுகை அறைத்து ஜலத்தில் கொதிப்பித்து. ஆவியை ஒரு வாளியில் வாங்கி குளிரச்செய்தால், இக்காரமுள்ள நீலை இல்லா எண்ணெய் உண்டாகும். ஜலத்தோடு சம்பந்தமில்லாத வரையில் இந்த நீலை இல்லா எண்ணெய் உண்டாகாது. அப்போது நீலை உள்ள எண்ணெய் தான் உண்டாகும். ஆகையால் கடுகிலிருந்து நீலை உள்ள எண்ணெயும் நீலை இல்லா எண்ணெயும் உண்டாக்கலாம். இந்த இரண்டுவித எண்ணெயும் கருப்புக்கடுகிலிருந்து தான் உண்டாகும். வெள்ளைக் கடுகிலிருந்து உடம்பில் தேய்த்துக்கொள்ளும் எண்ணெய் தான் உண்டாகும். கடுகுப்பொடியை மாவாக வைத்துக்கட்டி வைத்தியத்தில் பிரயோசனப்படுத்துவது முண்டு.

இங்கிலீஷ் கறிகாய்களாகிய டர்ஸிப், முள்ளங்கி, நோல்கோல், காபேஜ், காலிபளவர், இவைகள் கடுகு ஜாதியைச்சேர்ந்தவை.

---



## பாக்கு மரம்.

பயிர் சுபாவம் :—

இதை ஒரு பழவகைப் பயிராகவும் கொள்ளலாம். சமத்திரத்திற்கு வெகுதூரத்திலுள்ள இடங்களில் இது நன்றாய் வளராது. இது அதிகமழையுள்ள இடங்களில் விருத்தியாகும். பாக்குத்தோட்டத்தில், மிளகு, எலக்காப் சாகுபடி சாதாரணம். நமது இராஜகாணியில் மலையாளப் பக்கங்களில் இதன் சாகுபடி ஜாஸ்தி.

தகுந்த பூமிகள்.

இதை மல்ல குளிர்ந்த இடங்களிலும், ஜலத்தட்டேயில்லாத இடங்களிலும் தான் உண்டாக்கலாம். இது வாசனைச் சரக்கு உண்டாகும் தோட்டங்களில் ஏராளமாக இருக்கும். வெற்றிலைக் கொடிக்கால் பூமியில் நன்றாய் வளரும். படுகை நிலங்களிலும் உண்டாக்கலாம். பூமியானது பாதிகள், பாதிமணல் சம்பந்தமுள்ள களிமண் பூமியாயிருக்கவேண்டும்.

நாற்றங்கால் :—

பூரியை வெட்டி வாங்கி, துவாளியாக்கி, சுத்தப்படுத்தி, மடித்த சாகுகளினால் உரப்படுத்தி, அதில் வயதான மாத்திலிருந்துண்டான முதிர்ந்த பாக்குப் பழங்களைப் பொறுக்கி, ஏப்ரல் மாதத்தில் 9 அங்குல வித்தியாசத்தில் புதைக்கப்படுகின்றன. நாற்றங்காலை ஏப்



## 246 சுவை அதிகரிக்கச் செய்யும் பயிர்கள்

போலும் நாமாய்வைத்திருக்கவேண்டும். ஓடின்பாதத்தில் தளிர்காணும். அக்டோபர் மாதத்தில் பாக்குக்கன்றுகள் தோட்டத்தில் கசியான இடங்களிலாவது. கண்ணிக்கரைகளிலாவது 2 அடி வித்தியாசத்தில் நடப்படுகின்றன. செய்கோர்த்தி செய்திருக்கப்பட்ட தோட்டத்தில் பிடுங்கி நடுகிறவரையில், இப்படி யேயிருக்கும். இந்த இளங்கன்றுகள் சுமார் 3, 4 வருஷத்தில் பிடுங்கி நடப்படும்.

**தோட்டம் :—**

பூமியைக் கொத்தி, நீரவி, சிறுகிடங்குகள் 12 அல்லது 15 அடி வித்தியாசத்தில் வெட்டி, நாஷபக்கத்திலும் பெரிய கிடங்குகள் வெட்டி, இந்தப்படி வடிகால் வசதி ஏற்படுத்தி, இரண்டு கிடங்குகளுக்கும் நடுவில் வாழைகளைக் கிடங்குகள் ஓரமாய் உண்டாக்கிவைத்திருப்பார்கள். வாழை கொஞ்சம் வளர்ந்து பிழல கொடுக்க ஆரம்பிக்கும்போது, 2½ அடி ஆழம் 3 சதுர அடி அகலமுள்ள குழிகளில் தழை முதலிய ஏரூக்களைப்போட்டு 4, 5 அடி உயரமுள்ளவும் 3, 4 வருஷம் வயதானவைகளுமான பாக்குக்கன்றுகளைப்பிடுங்கி நடவேண்டும். இப்படி 6 அடி முதல் 8 அடிக் கொருதரம், குழிகளில் நட்பிடுகிற்பாடு, வாழை கொஞ்சநாள் இருக்கும். பிறகு வாழையை நீக்கி, இரண்டு கன்றுகளுக்கு நடுவில் ஏலக்காய்ப்பயிரை உண்டாக்கி, பாக்குக்கன்றுகளினடியிலிருந்து மிளகுக்கொடிகளைப் பாக்கு மரத்தில் படர்ந்தோடும்படி செய்தி



ஞர்கள். இப்படி ஏகர் ஒன்றுக்கு சுமார் 700, கன்றுகள் புகைக்கப்படும். கட்டு 6 வருஷத்திற்கெல்லாம் அதாவது சுமார் 10 வயதிற்குட்போது, காய்க்க ஆய்மிக்கும். வருஷத்திற்கு இரண்டு கொத்தலும் ஒரு வரு அணைப்படும் கொடுக்கவேண்டும்.

**வயது. கண்டுமுதல் முதலியான :—**

பாக்குமரம் சுமார் 50 வருஷம் வரையில் காய்க்கும். 10 வருஷம் முதல் 30, 40 வருஷம் வரையில்தான் கல்ல காய்ப்பது. 1 மரம் சராசரியில் 2 குலை பழம் கொடுக்கும். சிலசமயம் 3, 4 குலைகளும் கொடுக்கும். எவ்வளவுக் கெவ்வளவு உரம் ஜாஸ்தி கொடுத்து மழையும் ஜாஸ்தியோ, அவ்வளவுக்கவ்வளவு குலை பெருத்திருக்கும். ஒரு கல்ல குலையில் 200 முதல் 300 கொட்டைப் பாக்கு கிடைக்கும். கிரம்ப சிலாக்கியமான குலையில் 400 பாக்குகளும் கிடைக்கும். மார்ச்சு, ஏப்ரலில் பூத்து நவம்பர், டிசம்பரில் குலை பழுக்கும். இரண்டு கல்ல குலைகளிருந்தால் 2, 3 மட்டமான குலைகள் மிருக்கும். பட்டைகளைத் தைத்து பாக்கு மழையில் அடிபட்டு அழுகிப்போகாம விருக்கும்படி அவைகளால் மூடிவைப்பது வழக்கம். சராசரியில் ஒரு மரத்துக்கு வருஷம் ஒன்றுக்கு 8 அணுவீதம் கிடைக்கும். மரம் ஏறுகிறவன், 1 தரம் மரத்தில் ஏறிவிட்டால், பிற்பாடு அவன் கீழே இறங்குகிறதில்லை. ஒருமரத்தி விருந்தபடியே சாதாரியமாய் இன்னுமொரு மரத்திற்குத் தாவி, ஊஞ்சலாடிக் குலைகளை



## 248 சுவை அதிகரிக்கச்செய்யும் பயிர்கள்.

வெட்டிக்கொண்டே போவான். பாக்குப் பட்டைகளைத் தைக்கிறதும். மரத்திலேநிக் குலைகளை மூடுகிறதும், கீழே இறங்காமல் குலைகளை மாத்திக்கு மாமதாவி வெட்டுகிறதும். இந்த வேலைகளெல்லாம் அனுபோகசாலிகளாலேயே நடத்தப்படுகின்றன.

**கொட்டைப்பாக்குண்டாக்தும் விதம் :**

பாக்குப்பழம் ஒரு குலையில் அடியிலிருந்து தளிக்கிப் பழுத்துக்கொண்டு போகிறது. ஆகையால் ஒரு குலையில் சிலது பழுத்தும் சிலது பழுக்காததுபா யிருக்கும். அவைகளில் பழுத்ததெல்லாவற்றையும் எடுத்து மேலமட்டையை அர்வாளால் தரித்து, சுண்ணடி, பச்சைப்பாக்கு எடுக்கப்படுகிறது. பிறகு கொண்டு பாணி சாவகாசம். ஒரு கையளவு சுண்ணாம்பு கலந்த ஜலத்தில், கண்முளைகள் வெளிவருகிறவகையில், வேகவைக்கப்படுகிறது. பிறகு எடுத்து வெயிலில் காயவைத்து மூன்று மாதிரியாய் பிரித்து வைக்கிறார்கள். கன்றாய் பழுத்தவைகளை ஒரு தினுசாகவும், கடுத்தாமாய்ப் பழுத்தவைகளை ஒரு தினுசாகவும், பழுக்காதவைகளை ஒரு தினுசாகவும், தனித்தனியே பிரித்து விலைக்கு விற்பார்கள். பாக்கு வேகவைத்த ஜலத்திற்குப் பாக்குக் குழம்பு என்று பெயர். இந்தக் குழம்பை, வேகவைக்க ஜலத்துடன் அடிக்கடி உபயோகப்படுத்துவார்கள். குழம்பு கிரம்ப கெட்டிப்பட்டுப் போய்விட்டால் அது ஒருவித சாயச்சரக்காகும்.



மிளகு.



மிளகு கொடி.



## 250 சுவை அதிகரிக்கச் செய்யும் பயிர்கள்.

**பயிரின் சுபாவம் :**

இது ஒரு கொடி. இது மலையாளப்பகுதிகளில் காட்டில் வனாகியோ பயிருக்கிறது. இச்சுவை கொடி நிரம்ப தூரம் ஒடும். பாக்கு மரங்களில் இக்கொடியை ஒட விடுவார்கள். இது 100 அங்குலம் மட்டுமே பெரியும் படியான இடங்களில்தான் நன்றாய்வுரும். எங்கெங்கே ஊன்றுகோல் ஏற்படுத்தினதோ அங்கே வளம் நன்றாய்ப்படும்.

**தந்தை பூமிகள் :**

இது குளிர்ந்த நீழலுள்ள ஊர்ப்பாளை பாக்குத் தோட்டங்களில் நன்றாய்வுரும். கழுக்குத்தா, எலத்தா, பயிருக்கும் பொருந்திய பூரி இதற்குமே லவ்வும்.

**காதுபடி :**

பாக்குத்தோட்டங்களில் கழுக்கு நட்டு 7, 8 வருஷத்துக்கெல்லாம் அம்மரங்களில் மிளகு கொடி ஏற்றுப் படுகிறது. மிளகு கொடி பதியான்களினால் உண்டாக கப்படுகின்றது. ஒரு நல்ல கோவற்ற, நீண்ட, முதிர்ந்த கொடியை எடுத்துப்பதியன்களாக வெட்டி, ஒரு மாததிற்கு 2 பதியன்கள் வீதம் ஒவ்வொருகழுகமரத்தடியிலும், நட்டு விடுவார்கள். இப்படி பாக்குத்தோட்டங்களில் ஜூன், ஜூலை யில் நடப்படுகின்றனவாம். கொடிகள் ஒடி கிளைகள் விட்டிருக்கையில், அவைகளை நாரினால் மரத்தோடு கட்டிவிடவேண்டும். ஒரடிக்கொருதரம் கட்டப்படுகிறது. சில நல்ல தோட்டங்களில் வருஷாவருஷம் துனியில் ஒருதரமும், அடியில்



2 தரமுற் கட்டப்படுகின்றன. இளங்கொடிகளை அடிக்கடி கட்டிப்படிப்பாடுகின்றன. வருஷத்திற்கு 5 அடிக்கு 1 குறைபாடில் உயர்ந்து கொண்டிபோகும். நட்டு 3 வருஷத்திற்கு, வருஷாவருஷம் நல்ல மடித்த சாணம், மடித்ததழை, சாகு இலை, கிளை, முதலியவைகளை உயரமாக அணைத்துவந்தால், கொடிகள் வளமாய் ஒடி உயர்ந்து கிளைகள் விடுமாம். மேற்படி இலை, தழை, கிளை, சாகு முதலியவைகளை, மாடுகளுக்குப் படுக்கையாகப் போட்டு, இப்படுக்கையையும் மூத்திரம் சாணம் முதலியவற்றையும் தினம் ஒரு குழியில் போட்டு, இவைகளெல்லாம் மக்கினவுடன் மேற்படி மிளகு, எலக்காய், கழுதுமுதலிய பயிர்களுக்கு உரமாகக்கொடுக்கப் படுகின்றனவாம். ஒரு நல்ல முதிர்ந்த கொடிக்கால் தோட்டத்தில் 1 மிளகு கொடி 15 முதல் 20 அடி வரையில் ஒடி இருக்கும். இக்கொடி குறுக்கில் 1½ அடி நீளத்தில் கிளைகள் விட்டு, இலைகளுடன் அடர்த்தியாயிருக்கும். ஒரு கொடிக்கால் நட்டு மூன்று சான்து வருஷம் வரையில் காய்க்கும். இப்படி பழைய கொடிகளை எறித்து, கழுது மரத்துக்குக்கீழ் பதையன்கள் கட்டு உண்டாக்கிக்கொண்டே இருந்தால், ஒரு மிளகுத்தோட்டம் வெகு நாள் வரையில் பலனைக் கொடுத்துக் கொண்டிருக்கும். ஜெலே, ஆகஸ்ட்டில், பூக்க ஆரம்பித்து மார்ச்சில் சிறுகாய்கள் பழுக்க ஆரம்பிக்கும். எவ்வளவுக்கெவ்வளவு உரம் ஜாஸ்திகொடுத்து மழையும் ஜாஸ்தியாயிருக்கிறதோ, அவ்வளவுக்கவ்



## 252 சவை அதிகரிக்கச்செய்யும் பயிர்கள்.

வளவு கண்டுமுதலும் ஜாஸ்தி ஜ-டன், ஜ-லையில் அவசியம் மழை வேண்டுமாம். ஆனால் கனத்த பெரிய மழை கூடாது.

**கண்டுமுதல் :—**

ஒரு கொடி சுமார் 1,000 குலை கொடுக்கலாம். குலைகள் பருமனில் எத்தியாசப்பட்டாலும், தோகை 1,000 குலைகளுக்காக 168 ஆயம் வரை பயிற்சை காய்க்தா மிளகைக் கொடுக்கலாம். அகாலகை சுமார் 7 மீசர். ஒன்றைமுதலில் எணிகளிலாவது அகலவது. தோகை குலை கொடுக்களை எண்பாபாதுகளுக்காக எய்துகதி. குலைகள் பறிக்கப்படுகின்றனவாய்.

**விலைக்குத் தயாரிசெய்யும் மீரது :**

கன்றாய்ப் பழுத்த குலைகளிலாவது ஒருமாதிரியாகவும், பாக்கி ஒருமாதிரியாகவும். தாங்கப்பட்டிப் படுகின்றன. இப்பாடி பரித்தவாய் 7. 8 நாளைக்குத் தண்ணீரில் களைபா வைத்தீசா. அல்லது குவிபவாய் வைத்தீசா. கையால் தேய்த்து அல்லது துண்டால் தேய்த்து. அல்லது காலால்நிதித்து, மேல்தலையிக்குப் படுகிறது. ஒடுகிற தண்ணீரில் பிசறி மேல்தலையையிக்குலாம். பிறகு ஒருவாரம் வெய்யிலில் காயப்போட்டு, வெள்ளைமிளகு உண்டாக்கப்படுகிறது. கறுப்பு மிளகுதான் முக்கியம். மிளகுக்குலைகள் தாங்கட்டிப் பிரிக்கப்பட்டால் 4 நாளைக்குக் குவியல்களாகப் போட்டிருந்து, கையால் பிசறிக் கசக்கப்பட்டு, பரப்பி வெய்யிலில் காயவைக்கப்படுகின்றன. இவைகளுக்குத்தான்



கறுப்பு மிளகு என்று பெயர். வெள்ளை மிளகு மணங் து ஒன்றுக்கு ரூபாய் 10 விலை. கறுப்பு மிளகு மணங் து ஒன்றுக்கு சுமார் ரூபாய் 8 விலை.



## ஏலக்காய்.

பயிர் கபாவம் :

இது ஒரு நீர்த்தாயான பூண்டு. இது காய் 3 அடி உயரமிருக்கும். இது மஞ்சள் போல சிவங்கிலிருந்துண்டாகிறது. உட்புள்ள வளமான காட்டுழரிகளில் ஏராளமாய் காணப்படும். பயிலை விதைநீர்த்தாய், கிழங்கிலிருந்தும் உண்டாகக்கூடாது. இது பாகத்திற் கோட்டாங்கள் லுப, மிளகு, கொடிக்காய் லுப, ஏராளமாகச் சாகுபடி செய்யப்படுகிறது.

நுந்த பூமிகள் :

நிழலுள்ள குளுமையான கோட்டா ததல் உட்புள்ள பூமியில கண்ணுய்வரும். பாதிமணல் பாத்திகள் சாபந்த முள்ள பூமியிலுப, மணல் சாபந்தமுள்ள கள நிலத்திலும், நா உட்புள்ளதாய் வைத்திருந்தால். அவ்வித பூமிகள் சிவாக்கியம் தான். கோட்டா ம. பெருங்காற்றின் உபத்திரவத்தைத் தடுக்கும்பொருட்டு கண்ணுய் வேலியால் அடைக்கப்பட்டிருக்கவேண்டும். நிழலில் லாவிட்டால் நிழல் கொடுக்கக்கூடிய மாங்களை விருத்தி பண்ண வேண்டும்.

நாற்றங்கால் :—

நாற்றங்காலை வெட்டி வாங்கி நல்ல மடித்த காய்க்த சாகு உரத்தினால் உரப்படுத்தி, 8 அடி நீளம், 4 அடி அகலமுள்ள பாத்திகளில், பாத்தி ஒன்றுக்கு 2 ரூபாய்



இவை எல்லாம் விதை தெளிக்கப்படுகிறது. விதை மிக  
 வுற சிந்தாகையால், ஓசதாப்போல் தெளிப்பதற்  
 குச் சாயப்போல் கலந்து தெளிக்க வேண்டும்.  
 தெளிப்பதற்கு முன்னால அதை முளைக்கப்பண்ணிப்  
 பிறகும தெளிக்கலாம். இவ்வாறில், சாதாரண  
 மாய் தெளித்தால் முளைகாண ஒருமாதம் செல்லுமாம்.  
 சாயப்பாய், அகலி மாய் விதை தெளிக்கப்படுகிற  
 காலம், காற்றங்காலுக்கு எவ்வாறில், மழை முதலிய  
 துன்பகலாதத தடுக்க முன்ற, நாலு அடி உயரத்தில்  
 பந்தலப்பாட்டு வைக்கவேண்டும். காற்றங்காலுக்கு  
 இவ். களைகளிலுள்ள மூட்டமபோட்டு வைக்கவேண்  
 டும். காற்றங்கள் அடர்த்தியாயிருந்தால் கலக்கப்  
 பண்ணவேண்டும். இப்படி காற்றங்கள் சுமார் 4, 5  
 மாதமிருக்கும். இப்படி இருகையில், எப்போதும்  
 வைப்பாயிருக்கவேண்டும். முதலில் இப்படி 4 மாதத்  
 திற்கெல்லாம், காற்றங்கள் படுங்கப்பட்டு, தோட்டத்திற்  
 குச் சமீபத்திலுள்ள கெல்வயஸில் முகடுகளும் கண்ணி  
 களுமாக ஏற்படுத்தி, முகடுகளில் சுமார் 1 அடி வித்தி  
 யாசத்தில் 2 வரிசையாக காற்றங்கள் நடப்படுகின்றன.  
 முகடுகள் சுமார் 2 அடி வித்தியாசத்தி லிருக்கும்.  
 இந்த 2வது காற்றங்காலின்பேரில் நிழலுக்காக பந்தல்  
 போட்டு வைத்திருப்பார்கள். கண்ணிகளின் வழி  
 யாய் எப்போதும் தண்ணீர் ஓடிக்கொண்டிருக்கும்.  
 ஆகையால் முகடுகள் எப்போதும் கைப்பாயிருக்கும்.  
 இப்படி 2வது காற்றங்காலில் சுமார் 15 மாதம் முதல்



256 சுவை அதிகரிக்கச்செய்யுப் பயிர்கள்.

18 மாதம் வரையில் நாற்றுகள் இருக்குமா. அப்போது நாற்றுகள் சுமார் 4 அடி உயரமிருக்கும்.

நோட்டம் :—

இப்படித்தயார் செய்திருக்கப்பட்ட நாற்றுகளைப் பாக்குத்தோட்டங்களில். மாச்சு முதல் ஜூன் மாதம் வரையிலாவது, அல்லது செப்டம்பர், அக்டோபரிலாவது பிடுங்கி. பாக்கு மாங்களுக்கு மிவில் மக்களார்கள். 1½ அடி ஆழம் 1½ அடி அகலமுள்ள குழிகளில் மக்கின சாகுகளை மண்ணுடன் போட்டு நல்ல நாற்றை நடவேண்டும். சிவசமயம் பயிர்க்கொத்தாகளை, எடுத்து கிழங்கைச் சிறுதுண்டாக்கி, அந்த இலைமேலேயே 1½ அடி ஆழம் 1½ அடி அகலமுள்ள குழிகளில் புதைப்பார்களாம். கிழங்குகளை அதிக அழத்தில் புதைக்கக்கூடாதாம். மேலேயே புதைத்துக் கொஞ்சம் மண்ணைத்தூவி விடவேண்டுமாம். இப்படி புதைத்தவுடன் ஒவ்வொரு செடிக்கும் ஒரு குச்சியை நட்டு இலைகள் காற்றினாலும், மழையாலும், கிழிந்து கீழே விழுந்து விடாமலிருக்குமபடி வாழைமரால் இலைகளைக்கட்டி விடுவார்களாம். ஒரு ஏகருக்கு 300 முதல் 400 செடிவரையிலிருக்குமாம். இதற்கு வருஷாவருஷம் வெட்டிவாங்கிக்கொத்தலும், மக்கின சாகுகளால் உரமணைத்தலும் வேண்டுமாம். நட்டு 1 வருஷத்திற்கெல்லாம் காய்க்க ஆரம்பிக்கும். முதல் வருஷம் அதிக வரும்படி கிடைக்காதாம். நட்டபிறகு ஏப்பிரல், மேமாதத்தில் அங்குமிங்குமாய்ப் பூக்க ஆரம்பித்



து, ஜ-ஒன், ஜ-ஒலையில் காய்கள் உண்டாகி, செப்டெம்பர், அக்டோபரில் பழுக்குமாம். பசுமையிலிருந்து காய்கள் மஞ்சள் நிறமாய் மாறும்போழுது பழுத்ததாக வைத்துக்கொள்ளவேண்டுமாம். அதிகமாக பழுக்கிற வரையில் வைத்திருந்தால் காய்கள் வெடித்துப்போய் விடுமாம். கின்றும்போது காம்புடனே கிள்ளவேண்டும். இல்லாவிட்டால் வெடித்துப்போய்விடுமாம். காய்களை எல்லாம் கிள்ளி வெயிலில் 2, 3 நாள் காயவைத்து, காய்ந்தவுடன் விலைக்குத் தயாராக்கப்படுகின்றன. ஒரு நல்ல செடியிலிருந்து சுமார்  $\frac{1}{2}$  பவுண்டு காய்ந்த ஏலக்காய் கிடைக்கும். சராசரியில் 1 செடிக்கு காய்ந்த காய் 4 தோலாதான் கிடைக்குமாம். 48 சேர் கொண்ட ஒரு பணங்கு 40 முதல் 75 ரூபாய் வரையில் விலைபோகிறதாம்.

ஏலக்காயைப் பதிவுவம் பண்ணும் விதம் :—

பழுத்த ஏலக்காய்களை சீயக்காயும், சோப்புத் தண்ணீரும் கலந்த ஜலத்தில் போட்டு பிசறி எடுத்து, மறுபடி இன்னுமொருதரம் இப்படியே சோப்பு ஜலத்தில் சுத்தப்படுத்தி, ஜலம் வடிந்த பிறகு பாயில் பரப்பி 4, 5 மணி நேரம் வெயிலில் காயவைக்கப்படுகின்றன. பிறகு சிறு காம்புகளை எல்லாம் நறுக்கி, தாங்கட்டிப் பிரித்து விலைக்குத் தயாராக்குகிறார்கள். இப்போது அரிசி, கோதுமை, சோப்பு, மோருடன் கஞ்சி உண்டாக்கி, அவைகளைக் கொஞ்சமாய் ஜலத்தில் கரைத்து ஏலக்காயைப்பிசறி வெளுப்புண்டாக்கிக் காயவைத்து விலைக்கு விற்றுவிடுகிறார்கள்.



## வெந்தயம்.



வெந்தயப் பயிர்.

மாரிகாலத்தில் தோட்டங்களில் கீரைப் பயிராகவும், வட இந்தியாவில் அபூர்வமாக மாட்டுத் தீனியாகவும் சாகுபடி செய்யப்படுகிறது. இதை ஒரு சுவை அதிகரிக்கச்செய்யும் பயிராகவும் கொள்ளலாம். வெந்தய விதை சமையலில் தாளித்துக் கொட்டவும், வைத்தி



யத்திலும், பிரயோசனப்படுகிறது. இளங்கீரை சமய  
லுக்கு உபயோகப்படுத்தப்படுகிறது. இதன் கீரையை  
வதக்கி புண்ணுக்கும் வீக்கத்துக்கும், கட்டுவது முண்டு.  
பயிர் உதிருவதைத் தடுப்பதற்கும், இதன் இலைகளை  
உபயோகப்படுத்துவது முண்டு. வெந்தய விதையைப்  
பொடிசெய்து மாட்டுத் தீனிக்கு உருசினைகொடுப்பதற்  
கும், மடித்த வைக்கோலை தீன்பதற்கு வாசனைகொடுக்  
கவும், உபயோகப்படுத்துவது முண்டு. பஞ்சாபில்  
மாட்டுத்தீனிக்காகவே சாகுபடி செய்யப்பட்டு 2, 3  
தடவை அறுத்து தீவனமாகக் கொடுக்கப்படுகிறதாம்.  
பூமியை நன்றாய் உழுது, ஏகர் 1க்கு 16 சேர் வீதம்  
விதை தெளித்து, 1 மாதத்துக்கெல்லாம் ஒரு அறுப்  
பும், பிறகு 4வது மாதத்தில் ஒரு அறுப்பும், 5வது  
மாதத்தில் ஒரு அறுப்பும், 6வது மாதத்தில் ஒரு அறுப்  
பும், அறுத்து மாட்டுக்கு தீவனமாக்குகிறார்கள். ஒவ்  
வொரு அறுப்புக்குப் பின்னும் பாசனம் செய்யவேண்  
கிறாம். இது நிரம்ப அழுத்தமான பயிரானதால் அதிக  
கோய் கொடி உண்டாகாதாம். விதைக்காகச் சாகுபடி  
செய்யும் பட்சத்தில் அக்டோபர் மாதத்தில் சுமார் 10  
சேர் வரையில் தெளித்து பிப்பிரவரி, மார்ச்சில் அறு  
வடைசெய்தால் ஏகர் 1க்கு சுமார் 300 பவுண்டு  
விதை கிடைக்கின்றதாம். தென்னாட்டில் ஒவ்வொரு  
வீட்டிலும் இவ்விதையைப் பலவழியும் உபயோகப்  
படுத்தாத நாள் இராது. ஆதலால் இதுவும் கல்ல வரும்  
படி கொடுக்கும் பயிர்தான்.



கறிகாய்ப் பயிர்கள்.  
கத்திரி.



கத்திரிச் செடி.

பயிரின் சுபாவம் :—

இந்தக்கறிகாய் ஒரு தோட்டப்பயிர். இது எல்லா வகுப்பு ஜனங்களாலும் சாப்பிடப்பட்டு அநேகமாய் வருஷம் முழுவதிலும் சாகுபடி செய்யப்படுகின்றது.



இதின் வகைகளெல்லாம் காய்களின் நிறத்தையும் உருவத்தையும் பொருத்ததாயிருக்கின்றன. சிலகாய் சுமார் 10 அங்குலம் நீளம் வரையில் வளருகிறது. சில காய்கள் பெரியதாயும் உருண்டையாய் மிருக்கின்றன. சிலது நெத்தரமாய் மிருக்கிறது. நிறத்தில் ஊதாவும், சிகப்பும் மஞ்சளும் சேர்க்கதும், சிகப்பும் வெள்ளையும் சேர்க்கதும், பச்சையும் வெண்மையும் சேர்க்கதும், சில கீரலுமுள்ளதாய் மிருக்கின்றன. ஒரு நல்ல கத்திரிக்காய் கைக்கு லேசாயும் விதையற்றதாய் மிருக்கும். சாகுபடி விதம் எல்லாம் மிளகாயைப்போலத்தான். தனிமையில் தான் சாகுபடி செய்யப்படுகிறது. கத்திரியானது புகைபிலை, மிளகாய், உருளைக்கிழங்கு முதலிப பயிர்ஜாதபைச் சேர்க்கதது. இவைகளுக்கெல்லாம் சாம்பல் காரத்தில் பிரீதி ஜாஸ்தி. அதாவது பொட்டிலுப்பு மண்ணில் பிரீதி ஜாஸ்தி.

**கத்திரியின் வகை :—**

கோழிமுட்டைக்காய், செங்கழிநீர்க்காய், கொழிக்கால்காய், முள்ளிக்காய், பச்சைக்காய் எனக்காய்களில் பலவகையுண்டு. இவற்றுள் கோழிமுட்டைக்காய் சுத்த வெள்ளை நிறம் உடையதாயிருக்கும். செங்கழிநீர்க்காய் என்பதுசெம்மை அல்லது ஊதாநிறம் உடையதாய், சிலகாய்கள் உருட்சியாயும் சில நீட்சியாய் மிருக்கும். முள்ளிக்காய் என்பது மிகச் சிறியதாய் முட்டைகள் செடிகளிலும் காய் அடியிலும் செறிக்கிருப்பதுடன் பச்சைநிற முடையதாய் மிருக்கும். இதைப்



பிராமணர்கள் விசேஷமாய் சிரார்த்த தினங்களில் உபயோகிக்கிறார்கள். கொடிக்கால்காய் என்பது மிக நீள முடையதாய் பச்சை, வெள்ளை, செகப்பு முதலிய தனித்தனி பல நிற முடையதாய் இருக்கும். பச்சைக்காய் என்பது பச்சையும், வெண்மையும் கலந்ததாய் உருண்டை, நீட்சி முதலிய பல உருவங்களுடையதாயும் இருக்கும். சில ஜாதி செடிகள் நிறைந்த முட்களை உடையதாயும் சில முட்களே இல்லாமலும் இருக்கும்.

**பூமிகள்:—**

இந்திரிய வஸ்து ஜாஸ்தியாயுள்ள பாதிகள் பாதமணல் சம்பந்தமுள்ளவளமான களிநிலம்தான் இப்பயிருக்கு ஏற்றது. களிநிலமாயிருக்கும் பட்சத்தில் சுபாவத்திலேயே பூமியின்கீழ்வடிவாகவ்விடதி இருக்கவேண்டும். இவற்றைக்கிராமந்தங்களிலும் கொல்லைகளிலும் உண்டாக்கலாம். கொடிக்கால் தோட்டங்களின் கரைகளிலும் இது உண்டாக்கப்படுகிறது.

**நாற்றங்கால்:—**

12 அடி நீளம் 12 அடி அகலமுள்ள 4 பாத்திகளை நன்றாய்க்கொத்தி வெட்டிவாங்கி சுத்தம்செய்து சாம்பல், மடித்த சாணம் முதலிய எருக்களால் உரப்படுத்தி, சுமார் 1 பவுண்டு விதையை மணலுடன் கலந்து ஒத்தாப்போல் அதிக நெருக்கடின்னியில் தெளித்துவிட வேண்டியது. வைக்கோல் புல் முதலியவைகளால் மூட்டம்போட்டு ஜாக்கிரதையாக பார்த்துக்



கொண்டுவரவேண்டும். சுமார் 6 அங்குலம் உயரமிருக்கையில் அதாவது நாற்று 6 முதல் 8 வாரம் உள்ளதாயிருக்கையில் பிடுங்கி நடலாம். நவம்பர் டிசம்பரில் விதை விதைக்கப்படுகிறது.

**தோட்டம் :—**

சுமார் 3, 4 தரம் உழுது அல்லது  $1\frac{1}{2}$  அடி ஆழம் கன்றுப் வெட்டி வாங்கி புல், களை, நீக்கி கட்டிசுளை உடைத்து நீர்வி ஏகர் 1க்கு 20 டன் மடித்தசாணத்தி னாலும் சாம்பலினாலும் உரப்படுத்தி பூமியுடன் கலந்து, பாத்திகளும் கண்ணிகளும், நடப்புப்பாதைகளும் உண்டாக்கி பாத்திகளில் முகடுகள் உண்டாக்கி முகடுகளில் சுமார் 3 அடிக்கு ஒருதரம் 2 கன்றுகள் வீதம் நடவேண்டும். முகடுகள் 3 அடிக்கு ஒருதரம் இருக்க வேண்டும். சிறுதரமான செடி மாதிரிகளை இன்னும் கிட்டவும் நடலாம். மே கடைசியில் விதை தெளித்தால் ஜூலை கடைசியில் பிடுங்கிநடலாம். கத்திரி விதையும் மிளகாய் விதையும் அநேக இடங்களில் நவம்பர் டிசம்பரில் விதைக்கப்பட்டு ஜனவரியில் பிடுங்கி நடப்படும்.

**பின் செய்நேர்த்தி :—**

2, 3 தடவைக்குக் குறையாமல் கொத்தி, 7, 8 தடவைக்குக் குறையாமல் களை எடுக்கும்படி நேரிடும். மழைநாள் தவிர பாக்கி காலங்களில் வாரத்துக்கு ஒரு முறை வீதம் தண்ணீர்பாய்ச்சிக்கொண்டு வரவேண்டும். பயிர் கன்றுவேறுன்றின பிற்பாடு கொ



த்தி மண் அணைக்கவேண்டும். 2வது 3வதுகொத்தலில் உரம் 'அணைக்கலாம். பொட்டிலுப்பு மண்ணை ஏகர் 1க்கு சுமார் 500 பவுண்டும் பிண்ணாக்காயிருந்தால் 1000 பவுண்டும் உரம் அணைத்து மண்ணால் முடிவிட்டால் நல்ல பலனைக் கொடுக்கும்.

**வயசு, கண்டு முதல் :—**

இதை ஒருவருஷத்துப் பயிராகக்கொள்ளலாம். ஆகஸ்டுமாதம் முதலில் கட்டால் அக்டோபர்மாதம் கடைசியில் காய்க்க ஆரம்பிக்கும். ஜனவரி பிப்பரவரியில் கட்டால், ஏப்பிரல் மேயில் காய்க்க ஆரம்பிக்கும். அது முதல் கொண்டே அனைக மாதங்களுக்குக் காய்த்துக்கொண்டே இருக்கும். எவ்வளவுக்கு எவ்வளவு உரம், செய்கோர்த்தி நன்றாய் இருக்கிறதோ அவ்வளவுக்கு அவ்வளவு ஜாஸ்தி வரும்படி கிடைக்கும். 3, 4 நாளைக்கு ஒருதரம் பழுக்கப்பழுக்க காய் பறிக்கப்படுகிறது. நல்ல பூமியில் ஏகர் 1க்கு சுமார் 7000 பவுண்டு காய் கிடைக்கும். இதன்விலை சுமார் ரூபாய் 160 ஆகலாம். ஏகர் 1க்கு சாகுபடிச்செலவு சுமார் ரூபாய் 100 செல்லும். செலவெல்லாம்போக ஏகர் 1க்கு சுமார் ரூபாய் 50, 60 க்கு குறையாது வரும்படி கிடைக்கும்.

கத்திரிச்செடி மிளகாயைப்போல இலைகளும், கிளைகளும், சில விகார ரூபத்தை அடைவதும் உண்டு. அப்பேர்ப்பட்டவை காய்க்கா. ஏதாவது பூச்சி தொத்தாவுசெய்தால் அதற்குப் பொட்டிலுப்பை ஜலத்தில் கரைத்து பயிரில் தெளித்தால் அது போய்விடும்.



குழிவெட்டி சேங்கொட்டையை எரித்து புதை , உண்டாக்கினால் பூச்சி போய்விடும்.

கத்திரிப்பயிர் பண்ணின பூமியில் அடுத்த வருஷம் கத்திரிப்பயிர் பண்ணினால் முதல்வருஷத்து வரும்படி 2வது வருஷத்தில் கிடைக்கிறதில்லை. ஆகையால் சாதாரணமாய் அதே பூமியில் ஒரு வருஷத்துக்குமேல் பயிர் செய்கிறதில்லை. சிலவேளை நல்ல உரத்தினாலும், பரிசனத்தினாலும், முதல் வருஷத்துப் பயிரிலிருந்தே 2வது வருஷத்துப் பயிரும் உண்டாக்குகிறார்கள்.

தக்காளிக்காய்.

Tomatoes.

இதை ஒரு கறிகாய்ப் பயிராகவும் பழப்பயிராகவும் கொள்ளலாம். ஈரல் நேய், அஜீரணம், வயிற்றுப் போக்கு முதலியவைகளை நிரம்ப சாந்தப் படுத்துமாம். கத்திரியைப் போலத்தான் இதன் சாகுபடி எல்லாம். ஆகஸ்ட்டி செப்டெம்பரில் நாற்றங்காலில் தெளிக்கப்பட்டு வாரத்துக் கெல்லாம் 3 அடிக்குள்ள வரிசைகள் ஏற்படுத்தி, வரிசையிலேயே 1½ அடிக்கு ஒரு தரம் நாற்றைப் பிடுங்கி நடப்படுகிறது. பயிர் வளருகையில் ஊன்றுகோல் கொடுத்து ஊன்றுகோலில் வளரவிடுவது வழக்கமுண்டு. ஊன்றுகோல் கடுவதினால் பழங்கள் சேதப்படுவதில்லை. சாகுபடியில் கவனக்குறைவு இருந்தால் காய்நிரம்ப சிறியதாய்ப் போய்விடும். பாக்கிவிஷயங்கள் எல்லாம் கத்திரியைப்போலத்தான். மலைப்பிரதேசங்களில் இப்பயிர் கன்றாய்வரும்.



## கொடியிலிருந்து உண்டாகும் கறிகாய்ப் பயிர்கள்.


—:0:—

**இவைகளாவன :—**

பரங்கி, பூஷணி, கக்கரி, வெள்ளரி, சுரை, பீர்க்கை, புடலை, பாகல் முதலியன. இந்தப் பயிர்களின் காய்கள் கறிகாய்ப் பதார்த்தமாய் உபயோகப் படுத்தப் படுகின்றன. இவைகளில் ஆண் மலரும், பெண் மலரும் தனித்தனியாக விருக்கும். இவைகளுக்கெல்லாம் நல்ல வளமான பூமியும் ஏராளமான எருவும் எதேஷ்டமான பாசனமும் வேண்டும். விதைகளினால்தான் இவைகள் உண்டாக்கப் படுகின்றன. இப்பயிர்களின் காய்களின் தசையில் கசப்பான பேதி உண்டாக்கக் கூடிய ஒரு வஸ்து இருக்கிறது. ஆகையால்தான் இக்கறிகாய்ப் பதார்த்தங்கள் நீர்வடிய வைக்கும் குணத்தை உடைத்தா யிருக்கிற தென்று சொல்லுகிறார்கள். இக்கறிகாய்ப் பயிர் சாகுபடி செய்யும் பூமிகள் மேட்டுப்பூமியாயிருக்கவேண்டும். ஆனால் கொஞ்சம் நைப்பா யிருப்பது நல்லது.



பாங்கி, பூஷணி, சுரை.,



பாங்கி.



புஷணி.



புஷணி.



சுரை .



சுரை .



இவைகள் பெரிய விஸ்தீரணத்தில் சாகுபடி செய்யப்படுவதில்லை. கிராமந்தங்கங்களிலும் கொல்லைகளிலும் அங்குமிங்கும் குழிகள் உண்டாக்கி விதைகளை ஊன்றி கொடிகளை கூரைமேல் வளரவிடுவது வழக்கம். சில சமயங்களில் இதரப்பயிர்களுடன் கலந்து வயல்களில் தெளிப்பதுண்டு. நிலக்கடலைப்பயிர்பூக்களை பூமியில் அழுத்துவதற்காக, இவைகளை அதோடு கலந்து தெளிப்பதுண்டு. கரும்போடும் முத்துச்சோளத்தோடும் தெளிப்பதுண்டு. இந்தப்பயிர்கள் பூமியை விட்டுக் கிளம்பி நிழல்படுத்துவதற்கு முன்னால் கொடி பூமியைவிட்டு கிளம்பி விடும். ஜூலைமாதம் விதைக்கத்தகுந்த காலம். 12 அடி நீளம் 12 அடி அகலமுள்ள ஒரு கொல்லையில் 2 குழிகள் உண்டாக்கி குழிக்கு 2 விதைகள் வீதம் ஊன்றி கொடியை கூரைமேலாவது அல்லது பூமியிலாவது மேடான இடங்களில் ஒடும்படி விட்டால் விதைத்த 4 வது மாதம் முதல் 6 வது மாதம் வரையில் காய்கள் பறிக்கலாம். சுரையும் பாங்கியும் சுமார் 5 மாதத்துப்பயிர். பூஷணி சுமார் 6 மாதத்துப்பயிர். நல்ல வளமாயிருந்தால் 144 சதுர அடிக்கு பூஷணியில் சுமார் 10 காயும், 144 சதுர அடிக்கு பாங்கியில் சுமார் 10 காயும் அதேவிஸ்தீரணத்தில் சுரையில் சுமார் 20 காயும் கிடைக்கும். ஒரு ஏகருக்கு பாங்கி பூஷணியில் சுமார் 1,000 காயும் சுரையில் 1 ஏகருக்கு சுமார் 2,000 - 3,000 காயும் கிடைக்கலாம். பாங்கி பூஷணியில் செலவுபோக ஏகர் 1 க்கு சுமார் ரூபாய் 30 கிடைக்கலாம். குளத்துப்பொருக்கிலும்,



வாயல் கரைகளிலும் இவற்றை உண்டாக்கலாம்.  
கரைக்காய் காய்ந்தால் ஒருவித குடுக்கைப் பாத்திரம்  
பண்ணலாம். வினை முதலிய வாத்தியங்களுக்கும் பிர  
யோஜனப் படுகிறது.

---



പുലം.




പുലം.



இதுவும் சிறுபான்மையில் குறுகிய ஸ்தலங்களில் சாகுபடி செய்யப்படுகிறது. 144 சதுர அடியில் 2 குழிகள் உண்டாக்கி குழிக்கு 4 விதை விதம் ஜொலைமாதக் கடைசியில் போட்டு ஊன்று கோல்கள் ஊன்றி, கொடிகளை வளரவிட்டு பந்தல்போட்டு வளருட்படி செய்து விட்டால், விதை ஊன்றிய 3 மாதத்துக்கெல்லாம் காய்களைப் பறிக்கலாம். 144 சதுர அடிக்கு சுமார் 30 காய்கள் கிடைக்கும். இது சுமார் 4 மாதத்துப்பயிர். கோடைப்புடலும் உண்டு. இதில் ஒரு மாதத்துக்கு பூந்தியும் ஒருமாதத்துக்குப் பூந்தியும் இரண்டு விதைப் பாய் விதைத்தால் இன்னும் ஒருமாதம்கூட காய்த்துக் கொண்டிருக்கும். ஒரு ஏக்கர் மேட்டு பூமியில் அநேக குழிகள் போட்டு விதைகள் ஊன்றி பெரிய பந்தல் போட்டால் செலவெல்லாம் போக இதில் ஏக்கர் 1 க்கு சுமார் ரூபாய் 30 கிடைக்கலாம்.



கக்கரி.



கக்கரி.




இதைபும ஷுட்டலையைப் போல சாகுபடி செய்  
தால் ஷு வில் தீரணத்துக்கு சுமார் 50 காங்கள் கிடை  
க்கும். இது சுமார் 5 மாதத்துப் பயிர். விதை ஊன்றி  
4 வது மாதம் முதல் காங்கும். இதற்கும் பந்தல் அவ  
சியம். இதுவும் ஜூலை மாதத்தில் விதைத்து நவம்  
பர், டிசம்பரில் கொடி அழிக்கப்படுகிறது.

---



வெள்ளரி.



வெள்ளரி.



இதை கோடைப் பயிராகவும், மாரிகாலத்துப் பயிராகவும் சாகுபடி செப்பலாம். இதன் கொடி பூயியிலே யேபடரும். இது சுமார் 4 மாதத்துப் பயிர். இது 3 வது மாதம் பூக்க ஆரம்பித்து 4 வது மாதம் வரையில் காய்க்கும். ஒரு ஏக்கருக்கு சுமார் 15,000 காய்கள் கிடைக்கும். இரண்டு மூன்று தடவையாக விதைகளை விதைத்துக் கொண்டு போனால் இன்னும் 2, 3 மாதம் நீடித்துக் காய்த்துக் கொண்டிருக்கும். கோடையில் பிப்ரவரி மாதக் கடைசியிலும், மார்ச்சு மாத மத்தியிலும், கடைசியிலும் இப்படி 3 தரம் தெளித்தால், ஏப்ரல், மே, ஜூன், இந்த மூன்று மாதங்களில் காய்க்கும். இக்காலத்து வெள்ளரி சிறிதாக இருக்கும். ஜூலை மாதத்தில் தெளித்தால் செப்டம்பர், அக்டோபரில் காய்களைப் பறிக்கலாம். இக்காலத்துக் காய்கள் பெரிதாக இருக்கும். கோடையில் பாசனம் செய்யவேண்டும். ஒரு அடிக்கு ஒரு தரம் வரிசையாக விதைகளை ஊன்ற வேண்டும்.



பீர்க்கை.



பீர்க்கை.



இதில் 2 திணைகள் உண்டு. அவை கம்புள்ளதூர், பம்பில்லாததும். இது சுமார் 5 மாதத்துப் பயிர். தெளித்து நீவது மாதம் முதல் நீவது மாதம் வரையில் காங்க்தும். ஏகர் 1 க்கு சுமார் 30,000 காங்கள் காய்தும். ஜூன்மீயில் தெளித்தால் செப்டெம்பர், அக்டோபரில் காங்கள் பறக்கலாம். 2. 3 விதைப்பு விதைத்தால் இன்னும் 2. 3 மாதம் நீடித்துக் காங்க்கும். வரிசை வரிசையாக வெள்ளரிபைப்போலவே தெளிக்கவேண்டும். இது மாரிகாவத்துப் பயிர். இதை மாதத்தின்பிரிவாவது கூறாயின் மீறிலாவது வளரவிடுவதுண்டு.



பா க ல்.



பா க ல்.



இதில் அநேக மாதிரிகளிருக்கின்றன. எல்லாம் ஆகிருதையையும் உருவத்தையும் பொருத்ததாக இருக்கின்றன. மழைக்காலத்து மாதிரி கொம்புப் பாகலென்றும் கோடைகாலத்து மாதிரி மித்பாகலென்றும் பெயர். கோடைப் பாகலுக்கு பூமிவளமுள்ளதாக இருக்கவேண்டும். பிப்பிரவரி மாத கடைசியிலும் மார்ச்சிலும் தெளிக்கலாம். பூமிகளில் வரிசை வரிசையாக 2 அடிக்கு ஒரு தரம் 2 விதை வீதம் ஊன்றி விடவேண்டும். பூமி கொடிகளால் மூடுகிறவரையில் வாரத்துக்கு 2 தரம் விதமும் பிறகு வாரத்துக்கு ஒரு தரம் விதமும் ஜலம் பாப்ச்சி வரவேண்டும். பிப்பிரவரிமாதக் கடைசியில் தெளித்து ஏப்பிரல் மாதக்கடைசியில் காய்க்க ஆரம்பிக்கும். மே, ஜூனிலும் காய்க்கும். மார்ச்சு மாதத்தில தெளிப்பது இன்னும் ஒரு மாதம் கூடக்காங்க்கும். கொம்புப் பாகல் ஜூலை மாதத்தில் தெளித்தால் கொடிகள் படருவதற்கு ஊன்று கோல் போடுவதுண்டு. செப்டெம்பர் முதல் நவம்பர் வரையில் காய்க்கும். இது சுமார் 5 மாதத்துப் பயிர்.

பாகலின் வகை. (1) கொம்புப் பாகல். (2) மித்பாகல். (3) காட்டுப் பாகல்.

கொம்புப் பாகல் என்பது கொம்புகளிலும், மலாறுகளிலும், பந்தல்களிலும், ஏறிப்படர்ந்து காய் நீளம் நீளமாய் காய்ப்பது. காய் வெண்ணிறமாயும், பச்சையாயுமிருக்கும். கொம்புகளில் ஏறிப்படர்வது கொம்புப் பாகல்.



காலால் மிதிக்கப்படும் தரையில் படர்ந்து காய்ப் பது மிதிபாகல். இதன் காய் சிறியதாயும் சற்று உருண்டை வடிவமாயும் இருக்கும்.

காட்டுப் பாகல் என்பது காடுகளில்தான் முளைத்து மாம். செடி முதலியவைகளில் படர்ந்து காய்ப் பது. இதன் காயும் கொப்புப்பாகல் காய்ப்பால் இருக்கும். ஆனால் சற்றுக் கசப்பு அதிகமாயிருக்கும். இதையும் கறிசெட்டு சாப்பிடுவதுண்டு. இது மித்த மோகத்தை நீக்குதல் என்பதனைவந்தும் அறியலாம்.



பட்டாணி.



பட்டாணி.



இது வெள்ளைப்பூக்கூட்டுடன் ஒடும் ஒரு கொடிச் செடி. இதில் வெள்ளைப்பட்டாணி என்றும், பச்சைப்பட்டாணி என்றும் 2 மாதிரிகளுண்டு. இது மாரிகாலத்துப்பியிர், செப்டெம்பர். அக்டோபரில் தெளித்து மார்ச்சில் அறுவடை செய்யப்படுகிறது. உளுந்து, துவரை, கொள்ளு. இவைகளைப்போலத்தான இதுவும் களிபூமியில் உணடாக்கப்படுகின்றது. அஞல் நல்ல வடிகால்வசதியுள்ளதா யிருக்க வேண்டும். ஏகர் 1க்கு 25 முதல் 40 பவுண்டு வரையில் விதை தெளிக்கவேண்டும். பச்சைப்பட்டாணியை கறிகாய்க்குப் பிரயோசனப்படுத்தலாம். பாசனத்தில் ஏகர் 1க்கு 400 பவுண்டும், பாசனம் இல்லாத பூமியில் சுமார் 200 பவுண்டிம்தான் கண்டுமுதல் கிடைக்குமாம். செல வெல்லாம்போக ஏகர் 1க்கு 10 முதல் 15 ரூபாய் வரையில் வரும்படி கிடைக்கும். பச்சைப்பட்டாணியை ஒரு அடி அகலம் இடைவிட்டு வரிசைவரிசையாய் விதைகளை நெருங்கப்படுதத்து அவைகள் முளைத்து வளரும்பொழுது களையெடுத்து, ஒரு விட்டு தண்ணீர் ஊற்றி, ஒவ்வொருவரிசையிலும் சிறுமலாறுகள் ஊன்றி, அவற்றின்மீது படாவிட்டால் சீக்கிரத்தில் நன்றாய்க்காய்க்கும். இக்காயைக்கறி செய்தால் அவரைக்காயைவிட நன்றாய் இருக்கும்.



# கொத்தவரை.



கொத்தவரை.



இதை ஒரு கறிகாய்ப் பயிராகவும், பசுந்தழை உரத் துக்காகவும் பயிர் செய்யலாம். இது ஒரு தோட்டச் கால்பயிர். வட-இந்தியாவில் இசன் விதை பாட்டுக் கும், குதிரைக்கும் தீனி ஆகிறது. ஒரு பாதிர் கொத் தவரை. கறிகாய்க்காகத் தோட்டங்களில் செல்லாவின்த் தோணத்தில் சாகுபடி செய்யப்படுகிறது. இதைத் தனிமையிலுந் சாகுபடி செய்யலாம். காய். இஞ்சி. கக்கரி, முதலியாயிர்களுடனுந் சாகுபடி செய்யப்படுகிறது. இஞ்சித்தோட்டத்தில் இஞ்சிக்குத் தலை கொடுக்கவும், பசுந்தழை உரத்துக்காகவும். கலந்து சாகுபடி செய்யப்படுகிறது. இது சுமார் 4 அடி முதல் 10 அடி வரையில் வளர்கிற ஓதிகளை உடைத்தாயிருக்கின்றது.

**பூமிகள் :**

கறிகாய்க்காக சாகுபடி செய்யும் பட்சத்தில், கிராநத்தங்களிலுந், வளமான தோட்டக்கால கொல்லைகளிலுந். பொலபொலத்த மணல் சம்பந்தமுள்ள தோட்டங்களிலுந் சாகுபடி செய்யலாம். குதிரை, மாடு இவற்றின் தீலிக்காகச் சாகுபடி செய்யும் பட்சத்தில் வடஇந்தியாவில் கம்போடு கலந்து மணல் சாரியில் சாகுபடி செய்யப்படுகிறது.

**விதைப்பு கண்டுழதல் :—**


பசுந்தழை உரத்துக்காகச்சாகுபடி செய்யும்பட்சத்தில் ஏகர் 1க்கு 40 பவுண்டி வீதம் ஜூன் மாதத்தில்



தெளித்து, ஆகஸ்ட்டு, செப்டெம்பர் மாதத்தில் பயி  
ரை மிகத்து பூரிமை உட்படுத்தி விடலாம். தானி  
யத்துக்காக சாகுபடி செய்யும்பட்சத்தில் ஏக்கர் 1க்கு  
25 பவுண்டு விசம் தனிமையிலாவது அல்லது கம்போ  
டாவது கலந்து ஜூன், ஜூலைமீல் தெளித்து அக்  
டோபரில் ஏக்கர் 1க்கு சுமார் 1,000 பவுண்டு கண்டு  
முகல் செங்கி டீரன். கற்காய்க்குப் பறித்தால் ஏக்கர்  
1க்கு சுமார் 10,000 பவுண்டு கொத்தவரைக்காய்  
கிடைக்கும். இது சுமார் 1, 5 மாதத்துப்பயிர்.



# வெண்டை.



வெண்டை.



இது ஒரு கற்காய்ப் பயிர். இது அநேகமாய் மாரிகாலத்தில் தோட்டக் காஸில் சாகுபடி செய்யப்படுகிறது. 3 அடிக்கு ஒரு தாம் ஒரு விதை ஊன்றினால் ஏகர் 1க்கு சுமார் 5,000 செடி உண்டாக்கலாம். ஒரு செடியிலிருந்து சுமார் 20 காய்க்குக்குறையாமல் காய்க்கும். ஒரு பைசாவுக்கு 5 காய் வீதம் வைத்துக் கொண்டால் ஏகர் 1க்கு சுமார் ரூபாய் 100 கிடைக்கலாம். செலவெல்லாம்போக ஏகர் 1க்கு சுமார் ரூபாய் 40 தான் வரும்படி கிடைக்கும்.

வெண்டைத்தண்டி லிருந்து ஒருவித நார் எடுக்கலாம். இந்த நார் காகிதம் செய்வதற்கு உபயோகப்படுகிறதாம். இது சுமார் 4, 5 மாதத்துப்பயிர். வெண்டையிலுள்ள பின்மருந்தாகப் பிரயோசனப்படுகிறது. வெண்டை, குட்டை வெண்டை யென்றும், ஆகாய வெண்டையென்றும் இரண்டு வகை உண்டு. இவற்றுள் குட்டை வெண்டையை மாரிகாலத்திலும், கோடைகாலத்திலும் பயிர் செய்யலாம். ஆனால் மாரிகாலப்பயிரைவிட கோடைப்பயிர் நல்ல பலனைத்தரும். இது முளைத்து ஏழு இலை விட்டால் உடனே காய்க்கத்தொடங்கும். காய் நிலத்தின்வளப்பத்துக்குத் தக்கபடி நீளமுடையதாயும், பருமனுடையதாயும் இருக்கும். இச்செடி சிறுசிறு கிளைகள் உடையதாய் இரண்டு மூன்று அடி உயரம் வரையில் வளரும். காய்க்கத்தொடங்கிய பிறகு கொஞ்சகாலம் தான் காய்க்கும்.



ஆகாய வேண்டை :—

இது அதிக உயரம் வளரும். விதைத்த 4 மாதத் திற்குப்பிறகுதான் காய்க்கத்தொடங்கும். ஆனால் அதிக நாள் காய்க்கும். காய் அதிக நீளமீராமல் பருமனாய் இருக்கும். காய்க்கு மேலே சுணை பிடித்திருக்கும். இச்செடி விசேஷமாய் நார் எடுப்பதற்காகவே பயிர் செய்யப்படுகிறது. செடி நன்றாய் முற்றின பிறகு அதை அடியோடு அறுத்துத் தண்ணீரில் ஊறப்போட்டு ஊறினபிறகு, மேல் பட்டைபை உரித்து நன்றாய்த் தேய்த்துக்கழுவினால் சுத்தமான நார்கிடைக்கும். நாரினால் கயிறு, புரிமுதலியவை செய்வார்கள். நார் உரித்த தண்டு அடுப்பு எரிக்க உபயோகப்படும.



## அவரை.

---

இது ஒரு கமிகாய்ப் பயிர். ஜூலைபில் 144 சதூர அடியில் 2 குழிகள் உண்டாக்கி குழி ஒன்றுக்கு 2 விதை வீதம் 4 விதை ஊன்றி பந்தல் போட்டு விட்டால், நவம்பர் முதல் ஜனவரி வரையில் காய்கள் பறிக் கலாம். இந்த விஸ்தீரணத்துக்கு சுமார் 50 பவுண்டு காய் கிடைக்கும். ஏகர் 1க்கு சுமார் 15,000 பவுண்டு காய்கிடைக்கும். இது சுமார் 7 மாதத்துப் பயிர். இதின் காய்கள், வெள்ளைக்காய், பச்சைக்காய், ஊதாக் காய், ஊதாநிறவரம்புகளைபுடைய வெள்ளைக்காய் பச்சைக்காய், மொச்சைபைப் போன்ற அவரைக்காய், ஆனைக்காதுக்காய், எனப்பலவகைப்படும். இவற்றுள் கணுக்கள் தோறும் பூத்துக் காய்க்கிற கொடிகளும், கதிர் கதிராய்ப் பூக்கள் தோன்றிக் காய்க்கிற கொடிகளும் உண்டு. கதிர் கதிராய்ப் பூத்துக் காய்க்கிற ஜாதிதான் நல்ல பலன் தரும். மரங்களில் படா விட்டால் பல வருஷங்கள் பட்டுப்போகாம லிருந்து கார்த்திகை அல்லது நவம்பர் மாதம் முதலிலே காய்க்கத் தொடங்கும்.

---



முள்ளங்கி.



முள்ளங்கிப் பயிர்.



இது ஒரு கிழங்குப்பயிர். இது விதையிலிருந்து உண்டாகிறது. இதில் வெள்ளை முள்ளங்கி, செகப்பு முள்ளங்கி என இருவகை உண்டென்று தெரிகிறது. ஆகஸ்ட்டு செப்டெம்பரில் விதை தெளித்து, அக்டோபர், நவம்பரில், கறிபாக சமையல் செய்யத்தயாராகிறது. இது சுமார் 2½ மாதத்துப்பயிர். முள்ளங்கிக்கிழங்கும், அதின் கீரையும் வேகவைத்து கறிபாக உபயோகப்படுத்தப்படுகின்றன. இதின் விதையும், இலை, கிழங்கு இவற்றின் சாறும் வைத்தியத்தில் பிரயோசனப்படுகின்றன. இது சுலபமாய் சாகுபடி செய்யப்பட்டு சீக்கிரத்தில் ஜாஸ்திவரும்படி கொடுக்கக்கூடிய கறிகாய்ப்பயிர்.



விறகு கொடுக்கும் பயிர்கள்.

சவுக்கு.



பயிரின் சுபாவம் :—

இது விறகுக்காக முக்கியமாக பயிர் செய்யப்படுகிறது. வேளிப் பயிராகவும் சாகுபடி செய்யலாம். இது உப்புத் தீனி. ஆகாவது நாம் சாப்பிடும் உப்பில் இதற்குப் பிரீதி ஜாஸ்தி. ஆகையால்தான் இது சமுத்திரக் கரையோரங்களில் நன்றும் வளருகிறது. இதன் தழை பூமியில் விழுந்து பூமிவை வளப்படுத்துகிறபடியால், இதை வளப்படுத்தும் பயிராகவும் கொள்ளலாம்.

நடுந்த பூமிகள் :—

சமுத்திரக் கரையோரங்களிலுள்ள பணைச்சாரி மிகவும் மேலானது. உப்பங்காற்று சம்பீபமுள்ளதும் பாதி களிமண் பாதி மணல் சம்பந்தமுள்ளதுமான பூமியிலும் வளரும். நல்ல வடிகால் வசதியுள்ள படுகை மண்ணிலும் வளரும். களறு நிலத்திலும் உண்டாகக்கலாம்.

நாற்றங்கால் :—

நல்ல முதிர்ந்த காயிலிருந்து விதைகளை எடுத்துப் பக்குவமாய் வைத்திருந்து 10 அடி நீளம் 5 அடி அகலமுள்ள பாத்திகளை உண்டாக்கி, வெட்டி, கொத்திவாங்கி, புல், களை, முதலியவைகளை நீச்சி சுத்தப்படுத்தி, மேடுபள்ள மில்லாமல் நிரவி, பூமியின் மேலாக ஒரு



ராத்தல் விதையைச் சுமாராகக்கலக்கத் தெளித்துவிட வேண்டும். விதைகளின்மேல் சாம்பல், சாணம் முதலிய எருக்களைத்தூவி வைக்கோல், இலை, களைகளினால் மூட்டம் போடவேண்டும். ஒரு ராத்தல் அல்லது ஒரு பவுண்டு விதையின் விலை சுமார் 8 அணா. ஒருபவுண்டு விதையிலிருந்து சுமார் 3,000ம் கன்றுகள் உண்டாகும். ஒரு அடி உயரம் வளருகிறவரையில் அடிக்கடி கொத்திக்கொண்டு வரவேண்டும். 1,000 கன்றுகள் 8 அணா முதல் 3 ரூபாய் வரையில் விற்கப்படுகின்றன. கன்றுகளைப்பிடுங்கி நடுவதில் அனாவசியமாய் அதிக உயரம் வளரவிடக்கூடாது. சுமார் 1 செஜ் உயரமிருக்கையில் பிடுங்கி நடவேண்டும். ஒரு ஏக்கராவில் கன்றுகள் 1 டைக்க சுமார் 3 பவுண்டு விதையை 10 அடி நீளம் 5 அடி அகலமுள்ள 2 பாத்திகளில் தெளித்தால் போதுமானது.

**தோப்பு செய்நேர்த்தி :—**

நன்றும் உழுது, 5 அடிக்கு ஒருதரம் குழிகள் உண்டாக்கி, ஆறப்பெர்ட்டி, மடித்த சாணம், சாம்பல், வண்டல், பொருக்கு முதலிய உரங்களால் நிரப்பி, 6 மாதத்துக்குமேல் ஒரு வருஷத்துக்குக்குட்பட்ட கன்றுகளைப்பிடுங்கி நடவேண்டும். நடும்போது குழியில் ஈரமில்லாவிட்டால், (காடாரம்பத்தில்) குழியை ஈரப்படுத்திக்கொண்டு, அப்புறம் கன்றுகளை நடுவது வழக்கம். சாதாரணமாய் கன்றுகளை மழைகாலத்தில் நடுவது நன்று. அதாவது செப்டெம்பர், அக்டோபர்



## 296      விறகுகொடுக்கும் பயிர்கள்.

மாதங்களிலாம். சவுக்குக்கன்றுகளுக்கு இளமையில் நிழல் கொடுக்கக் கொட்டமுத்துப்பயிரை இடை வெளியில் பயிர் செய்வது நன்று. இல்லாவிட்டால் கன்றுகளுக்கு நிழல் கொடுக்கப் பனைமட்டை முதலியவைகளைச் சொருகவேண்டும். 5 அடிக்கு ஒருதரம் கட்டால் ஏகர் 1க்கு சுமார் 2,000 கன்றுகள் செல்லும்.

பாசனம் முதலிய பிள் செய்நேர்த்தி : —

இளங்கன்றுகள் வேளூன்றுகிற வரையில் தினம் அல்லது, 2 தினத்துக்கு ஒரு முறையும், பிற்பாடு ஒரு வருஷத்துக்கு வாரத்துக்கு ஒரு முறையும், 2 வது வருஷத்தில் 2 வாரத்துக்கு ஒரு முறையும், 3 வது வருஷம் முதல் பாசன மன்னியில் விட்டுவிடலாம். பிறகு ஏதாவது பெருங்கோடையா யிருந்தால் ஏதாவது பாசனம் செய்தால் போதுமானது. சமுத்திரக்கரைகளில் தண்ணீர் குடங்களில் தூக்கி ஊற்ற வேண்டியது. முதல் 2 வருஷத்தில் ஏதாவது பயிர் உண்டிபண்ணி கொட்டை, கேழ்வரகு, கடலை முதலிய பயிர்களைப் பயிர்செய்து லாபம் அடையலாம். இப்படிப் பயிர் செய்தால் பூமி உரப்பட்டு நல்ல வளமையில் இருக்கும். இப்படிச் செய்யாதவரையில் வருஷாவருஷம் கொத்தி உரம் அணைத்து வரவேண்டும். முதல் வருஷத்தில் சுமார் 45 தண்ணீர் ஆகும். 3 வது வருஷம் முதல், பக்கத்துக்களைகளை வருஷாவருஷம் தறித்து மரத்தை ஒழுங்காய் வளரவிடவேண்டும். 3 வது வருஷம் முதல் செலவுக்கும் வரும்படிக்கும்



சமனாகப் போய்விடும். தழைகளைக் கூட்டி எடுக்கும் படி விடக்கூடாது. பூமியிலேயே கொத்தி மக்கும்படி செய்யவேண்டும். ஏகர் 1 க்கு வருஷம் 1 க்கு சுமார் 1½ டன் தழை கிடைக்கும். இந்தத் தழை நல்ல உரமானதினால் பூமியிலேயே மக்கச் செய்யவேண்டும். 3 வது வருஷத்தில் கோணலான மாங்களையும், நெருக்கமான மாங்களையும் வெட்டி தோப்பைக் கொஞ்சம் கலக்கச் செய்யவேண்டும். இப்படிச் செய்தால் ஏகர் 1 க்கு சுமார் 1,500 மரம் தேறலாம்.

**கண்டுழதல் :—**

சமுத்திரக் கரையில், கட்டு 5, 6 வருஷத்திலேயும், உள் காட்டில் 8 வது வருஷத்திலேயும் வெட்டப்படுகின்றது. சில சமயம் 15 வருஷங்கள்கூட வைத்துப் பிறகு வெட்டப்படுகின்றது. மரம் 1 க்கு 8 அணு முதல் 2 ரூபாய் வரையில் விறகுக்காக குத்தகையாய் வெட்டிக்கொண்டு போகிறார்கள். நிரம்ப நல்ல தோப்பில் ஏகர் 1 க்கு 100 டன் கட்டை கிடைக்கும். அதாவது 1,000 ரூபாய்க்குக்குறையாது. சராசரியில் ஏகர் 1 க்கு 8 வது வருஷத்தில 500, 600 ரூபாய்க்குக்குறையாமல் கிடைக்கும். போட்டமுதலுக்கு ரூபாய் 100 க்கு ரூபாய் 24 க்குக் குறையாமல் வட்டி கிடைக்கும்.


**பிரயோகம் :—**

நல்ல மாங்களைப் பதப்படுத்தி உபயோகப் படுத்தினால், உத்திராங்களுக்கும், தூண்களுக்கும் உபயோகப் படுத்தலாம்.



மயக்கம் கொடுக்கும் பயிர்கள்.

வெற்றிவஸ.



வெற்றிலைக் கொடி.



பயிர் கபாவம் :—

இது ஒரு மருந்துச்சாக்குப்பயிர். இது ஒரு கொடி. இதன் இலை போசனத்துக்குப் பிற்பாடு பாக்குடனும், ஏலம், சிறும்பு முதலிய வாசனை சாமான்களுடன் உபயோகப்படுத்தப்படுகிறது. இதற்கு ஜீரணசக்தியும், குரலை இனிமைப்படுத்தவும் சக்தியுண்டு. இதில் அநேக தினுசுகள் உண்டு.

தந்த பூமிகள் :

நல்ல வடிகால் வசதியுள்ள பாதி மணல், பாதி களிசம்பந்தமுள்ளபூமியுள், களிமண்பூமியும், மேலானவை. வடிகால்வசதியுள்ள மேட்டுப்பாங்கான நஞ்சையிலும் வளரும். உரப்பான களியிலும் வளரும். இதற்கு அதிக காற்று கூடாததலால் நான்கு பக்கத்திலும் வேளி அடைப்பு இருக்கவேண்டும். நல்ல ஜலவசதியுள்ள இடமாயிருக்க வேண்டும்.

செய்நேர்த்தி, விதைப்பு, காலம், பாசனம் முதலியன :—

வடஜில்லாக்களில், மே மாதத்தில் பூமி 2 தாம் உழப்பட்டு, கொர்ருவாலும், குண்டக்காவாலும் வேலை செய்யப்பட்டு, 12 முதல் 18 அடி அகலமுள்ளவும், 50 முதல் 100 கெஜம் நீளமுள்ளவும், பாத்திகளாகப் பிரிக்கப்பட்டு, 4 அங்குல ஆழத்திலும் சுமார் 1 அடி அகலத்திலுமுள்ள கண்ணிகளால் பிரிக்கப்பட்டு இருக்கும். ஒவ்வொரு பாத்தியும், மத்தியில் ஒரு பெரிய வரப்பால் பிரிக்கப்பட்டிருக்கும். இந்த வரப்பும், கண்ணிகளும் ஒன்றுக்கொன்று சம



### 300 மயக்கம் கொடுக்கும் பயிர்கள்.

மாகவிருக்கும். கண்ணியில் 3 அடிக்கு ஒருதாம் ஒரு குச்சியை நிறுத்திப்பாத்திகளுக்குக் குறுக்கே கயிறுக ளால் சமமாகக்கோடுகிழித்து, இந்த கோடுகளிலாவது அல்லது படைச்சால்களிலாவது அகத்தி விதைகள் ஒரு அங்குலத்துக்கு ஒருதாம் ஊன்றி மூடப்படுகின் றன. ஒரு ஏக்குக்கு சுமார் 40 பவுண்டு அகத்தி விதை செல்லுகின்றனவாம். இது சுமார் 5, 6 தினத்தில் முளை கண்டு விடும். 1 மாதத்துக்கெல் லாம் சுமார் 1½ அடி உயர மிருக்கும். 3 மாதத்தில் சுமார் 3 அடி உயர மிருக்கும். 3 மாதத்திற்குள் அடிக்கடி. கொத்தி அகத்திக்கு மண் அணைப்பார் கள். 3 வது மாதத்தில் பாத்திகளின் நடுவரப்பின் மேல் பாசனக்கண்ணிகளும் ஏற்படுத்துவார்கள். ஆக ஸ்ட்டு மாதத்தில் பாத்தியின் நடுவரப்புக்கும், வடி கால் கண்ணிக்கும் நடுவிலுள்ள ஒரு அகத்தி வரிசை யில் 16 பதியன்கள் வீதம் நடப்படுகின்றன. பதியன் நட்டவுடன் ஜலம் பாய்ச்சப்படுகிறது. பிறகு 4 நாளை க்கு ஒரு தாம் ஜலம் பாய்ச்சப்படுகிறது. தென் ஜில் லாக்களில் ஜூலை, ஆகஸ்ட்டில், பூமி உழப்படாமல் 7 அடி வித்தியாசத்தில் 50 அடி நீளம், 1 அடி அகல முள்ள கிடங்குகள் வெட்டப்படுகின்றன. முதலில் கிடங்குகள் 3 அங்குலம் ஆழமிருக்கும். 2 கிடங்குக ளுக்கு மத்தியிலுள்ள இடத்துக்குப் பட்டமென்று பெயர். கிடங்குமண், பட்டத்தில் ஒத்தாப்போல் போ டப்படும். இப்படி ஒரு பட்டத்துக்கும் மற்றொரு



பட்டத்துக்கும் கடுவில் கிடங்குகள் இருக்கும். பட்டத்தில் கிடங்குக்கு வரிசையாக 2 அடி வித்தியாசத்தில் இரட்டை வரிசைகள் ஏற்படுத்தி ஒவ்வொரு வரிசையிலும் முக்கால் சாணுக்கு ஒரு தரம் 1 அங்குல ஆழத்தில் 4 முதல் 6 வரையில் அகத்தி விதைகள் ஊன்றப்படுகின்றன. இப்படி ஏகர் 1 க்கு சுமார் 20 பவுண்டு அகத்தி விதை செல்லும். விதை விதைத்தவுடன் தண்ணீர் பாப்ச்சப்படும். பிறகு 4 காள்க்கு ஒரு தரம் தண்ணீர் பாப்ச்சப்படும். கிடங்கிலிருந்து ஊற்றுப்பட்டையால் தண்ணீர் இறைக்கப்படும். அக்டோபர், நவம்பர் வரையில் கிடங்குகளை ஆழப்படுத்தித் தண்ணீர் இறைத்துக் கொண்டுவருவார்கள். அந்தக் காலத்தில் ஒரு முழு கிளமுள்ள பதியன்கள் ஒவ்வொரு அகத்திக் கொத்திலேயும் 2 பதியன்கள் வீதம் நடப்படுகின்றன. இந்தப் பதியன்கள் முக்கால் வாசி பூமியில் மூடப்பட்டு பாக்கி கால்வாசி அகத்தியில் விடப்படுகின்றன. ஏகர் 1 க்கு சுமார் 25,000 பதியன்கள் செல்லும். பட்டத்தில் பாசனக் கண்ணிகளுமேற்படுத்தப்பட்டிருக்கும்.

**தலை அரிதல், கட்டல், எருந்தீதல் முதலியன:—**

நந்தியாலில் பதியன்களை நட்டு 3, 4 மாதத்துக்கெல்லாம் அகத்திச்செடியில் களைகளைக்கிள்ளி 8 அடிக்கு மேல் உயர விடமாட்டார்கள். உச்சியில் மாத்திரம் 2 அடிக்கு ஒரு களை வைத்திருப்பார்கள். கொடிகள் அகத்திச்செடியுடன் 4 மாதம் வரையில் கட்டப்படா



## 302 மயக்கம் கொடுக்கும் பயிர்கள்.

மலிருக்கும். பிறகு மாதத்திற்கு ஒருதரம் 2 கட்டு போடப்படும். இப்படி 2 வருஷம் வரையில் கட்டுகிறார்கள். அகத்தி விதைத்து, ஒரு வருஷத்துக்கெல்லாம் ஏகர் 1க்கு 50 வண்டி சாணமும் 3, 4 வண்டி குளத்துப்பொருக்கும் கலந்து அடிப்பார்கள். ஒரு அடித்தவுடன் ஜலம் பாய்ச்சுவார்கள். பிறகு அகத்திச்செடிக்கு ஊன்று கோஸாக மூங்கில் சாரம் கட்டுவார்கள். வெற்றிலைக் கொடியாகலில் வடஜில்லாக்களில் அகத்தியும். வெற்றிலையும் தவிர வேண்டுன்றும் இராமது. தென்னிலாக்களில் புட்டலை, கருணை, கத்திரி, வாழை முதலியன கிடங்குகள் ஓரமாயும், வேலிகள் ஓரமாயும் இருக்கும். தென்னிலாக்களில் அகத்திச்செடி 15, 18 அடி உயரம் இருக்கையில் இரண்டு வரிசை அகத்திச்செடியை வளைத்து கூடாரம் போட்டுக் கட்டி அவைகளில் கொடியை வளரவிடுவார்கள். ஜனவரி, பிப்பிரவரியில் கொடியை அகத்தியோடு கட்ட ஆரம்பிப்பார்கள். ஆட்டுப்புழுக்கலையும், கழுதைச்சாணமும் தோல் கிடங்கு ஒருவும், சாணம் முதலியவைகளை உரமாகக் கொடுப்பார்கள். இப்படி வருஷத்திற்கு 3 தரம் எங்கேயும் ஒருகொடுத்து வருவார்கள்.

**வயக, கிள்ளுநல், கண்டுழநல் முதலியன :—**

கொடிக்கால் தோட்டம் சுமார் 3, 4 வருஷமிருக்கும். அகத்தி விதை ஊன்றி ஒரு வருஷத்திற்கெல்லாம் வெற்றிலையைக் கிள்ளுவார்கள். இந்த வெற்றிலைக்கு இளங்கால் வெற்றிலை அல்லது கன்னிப்பரி,



என்று பெயர். ஒரு கொடியிலிருந்து 100 முதல் 150 வெற்றிலை கிள்ளுவார்கள். கன்னிப்பரியில் ஏகர் 1 க்கு சுமார் 50 ரூ. விலையுள்ள வெற்றிலை கிடைக்கு மாம். இப்படி ஒரு தாம்பரத்த வுடன் அகத்தி இலை மைய உயமாகச் சிலவிடத்தில் கொடுக்கிறார்கள். சில விடங்களில் காணாமல் கொடுக்கப்படுகின்றது. பிறகு சில விடங்களில் கட்டை அவிழ்த்துவட்டு கொடிகளை வளைத்து கீழே நான்கு கோடுகள் அல்லது சில விடங்களில் நான்கு கோடுகள் அல்லது கொண்டையை வெட்டி கோடுகள், எடுத்து விடுகிறார்கள். பிறகு வெற்றிலைகள் கொடிக்கால் ஏணிமால் மாதம் 1 தாம்பரம் தென் னில் காக்களில் கிள்ளப்படுகின்றன. ஒருஷம் ஏகர் 1க்கு 40 பொதி வெற்றிலை கிடைக்கும். ஒரு பொதி வெற்றிலை சுமார் ரூபாய் 8 விலை. ஒரு பொதி சுமார் 4 லட்சம் வெற்றிலை. இப்படி சுமார் 3 வருஷத்திலேயும் சுமார் 750 ரூபாய் வெற்றிலை கிள்ளப்படும். சிலவரை வருடம்படி, கத்திரி, கொத்தவரை, கருணை, அகத்தி, வாழை. முதலியவைகளில், 3 வருஷத்திலேயும், சுமார் 150 ரூபாய் கிடைக்கலாம். அதாவது வருஷம் 1 க்கு வெற்றிலைக் கொடிக்காலில் சராசரியில் 300 ரூபாய் வரலாம். செலவு ஏகர் 1க்கு 200 ரூபாய் வைத்தாலும் ஏகர் 1க்கு செலவெல்லாம் போக சராசரியில் 100 ரூபாய் கிடைக்கும்.

அகத்தி மாட்டுத் தீவனத்துக்கு சீரம்பதிறம். ஏகர் 1 க்கு வருஷத்தில் 10 ரூபாய் இலை கிடைக்கும்.



### 304 மயக்கம் கொடுக்கும் பயிர்கள்.

இதைக் கறிபாகவும் சமைக்கலாம். இதன் காய்ப்பு  
களை துடைப்பமாகவும் உபயோகப் படுத்தலாம்.  
கொடிக்கால் அழிக்கும்போது 100 வண்டி அகத்திக்  
கழிகள் கிடைக்கும். இது சுமார் ரூபாய் 100 விலை.

கொடிக்கால் சாகுபடி எகத்தெசுத்தில் ஒரு மனுஷிய  
னால் செய்யப்படுவதில்லை. கொடிக்கால்காரர்களை  
ன்றே இதன் சாகுபடிக்காக துஷக்கான் தனியாயில்  
இருக்கிறார்கள். இவர்கள் 20, 30 பெயர்கள் சேர்த்து  
ஒரு கொடிக்கால் தோட்டத்தை ஒப்புக்கொண்டு கூட்  
டுச் சாகுபடி செய்வார்கள்.



# புகையிலை.



புகையிலைப் பயிர்.



பயிரின் சுபாவம் :—

இது ஒரு மயக்கம் உண்டாக்கும் பயிர். நமது இராஜதானியில் முக்கியமாய் கோதாவரி, கிருஷ்ணா, கோயமுத்தூர், மதுரையில் சில பாகங்களில் தான் ஏராளமாய்ச் சாகுபடி செய்யப்படுகின்றது. இலங்கைப்புகையிலையும், திண்டுக்கல் புகையிலையும் பெயர் போனவை. இது ஒரு தோட்டக்கால் பயிர் ; இதில் லஸிக் கப்பல் என்றும், வாரக்கப்பல் என்றும். எருமைச் கப்பலென்றும் அநேக மாதிரிகள் இருக்கின்றன. வானமாரிப் புகையிலையும் இவ்விராஜதானியில் வழங்குகிறது. இது முக்கியமாய், சேலம், வட ஆர்க்காட்டில் சில பாகங்களில் தான் சாகுபடியாகின்றது. சில வாய்ப்புகையிலைக்காகவும், சில தூள் புகையிலைக்காகவும், சில சுருட்டுப் புகையிலைக்காகவும் சாகுபடி செய்யப்படுகின்றன. சில கொல்லைகளில் முதல் தடவை அடிக்கட்டையிலிருந்தும் இரண்டாவது போகம் சாகுபடி பண்ணப்படுகின்றது.

நடுத்த பூமிகள் :—

பொலபொலத்த மணல் சம்பந்தமுள்ள களிமண் பூமியிலும், களிசம்பந்தமுள்ள மணல்சாரியிலும் வரும். பொலபொலத்த பண்ணையுடைய கரிசலிலும், செவ்வனிலும் வரும். சாம்பல் கீறமுள்ள கிராமந்தங்களிலும் வரும். மடுகை நிலங்களிலும் ஆற்றுக்குச் சமீபத்திலுள்ள நிலங்களிலும் வரும். சுக்கான் சம்பந்தமுள்ள களியிலும், பொட்டிலுப்பு மண்ணு



டைய பூமியும் மிகவும் மேலானது. களியிலும் வரும் ; ஆனால் இலைகள் சிரம்பரிருதுவாயிரா. இறைவைக்கு உவரசலமுள்ள பூரி திறம். கல்ல மேட்டிப் பூமியாயும் வடிகால் வசதியுள்ளதாய் மிருக்கவேண்டும்.

செய்நேர்த்தி :

பூமிபை 8 உழவுக்குக் குறையாமல் உழவேண்டும். ஆழமான உழவு திறம். உழுது தாவாளி யாக்கி, வேர் வாரியால், களை, புல், பூண்டு, அடிக்கட்டை முதலிய வைகளை நீக்கி, சுத்தம் செய்து, மேடுபள்ளம் சீரவி, பாத்திகள் கட்டி, கண்ணிகள் உண்டாக்கி, வைத் திருக்கவேண்டும். 2 உழவுக்குப் பிற்பாடு சுமார் 25 வண்டி மடித்த சாணம் உரமாக அடிக்கவேண்டும். ஆட்டுக்கிடை வைத்தலே மேலானது. உழுத பூமி யில் கிடைவைத்து மறுபடியும் உழுதுவிடவேண்டும். சுமார் 2,000 ஆடு கிடைவைத்தால் போதுமானது. தினம் 200 ஆடு வீதம் 1 வாரம் கிடைவைத்தால் போதுமானது. சுமார் 40 வண்டி குளத்துப்பொருக் கடித்தாலும் போதுமானது. கிராம நத்தங்களின் குப் பை, சாம்பல், உப்புமண், முதலியவைகள் ஏகர் 1க்கு 25 வண்டி வீதம் அடித்தாலும் போதும். சப்பாத்திக் குக்கீழ் உள்ள மண்ணையும் உரமாக அடிக்கலாம்.

நாற்றங்கால் :—

ஒரு கிணற்றுக்குச் சமீபமுள்ள ஒரு துண்டி நிலத் தை எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும். அது மேட்டிப் பூமியா யிருக்கவேண்டும். மா நிமலில் இருப்பது



### 308 மயக்கம் கொடுக்கும் பயிர்கள்.

திறம். ஒரு ஏகர் காற்று நட, நூறு சதூர அடியில் 1 அவுன்ஸ் அல்லது ஒரு ஆழாக்கு விதை விதைத் தால் போதும். 1 அவுன்ஸ் விதையிலிருந்துண்டாகும் நாற்றுகளைக்கொண்டு ஒரு ஏகர் நடலாம். நாற்றங்கால் செய்நேர்த்தி நிரம்ப நன்றாயிருக்க வேண்டும். விதை தெளிக்கிறதற்கு 2 மாதத்துக்கு முந்தி அகாவது மார்ச்சு ஏப்பிரலில் நாற்றங்காலை ஒன்றரை அடி ஆழத்துக்கு வெட்டி வாங்கி, ஒரு வாரத்துக்கு முன் ஒரு வண்டி சாம்பல், சாணம், குப்பை, புழுக்கை முதலியவைகளைப் போட்டு, தெளிக்கும் முன் வெட்டி வாங்கி, சுத்தப்படுத்தி, நல்ல தாவாளி மண் பாத்தியாய் வைத்திருக்க வேண்டும். இந்த 10 அடி நீளம் 10 அடி அகலமுள்ள 100 சதூர அடி பாத்தியை மூன்று சிறு பாத்திகளாய்ப்பிரித்து, ஒவ்வொரு பாத்திகளிலும் 4, 5 நாள் இடைவெளிவிட்டு விதை தெளிக்கவேண்டும். விதை நிரம்ப சிறிதால்தால் ஒத்தாப போல் பூமியில் விழ மணலுடனாவது சாம்பலுடனாவது கலந்து தெளிக்கப்படும். தெளித்தவுடன் சாம்பலை மேலே தூவி பூமியைக் கொஞ்சம் அழுத்த வேண்டும். சில இடங்களில் விதையை 3, 4 நாள் நரப்படுத்தி வைத்திருந்து, பிற்பாடு அந்த அளவிற்கு இரட்டிப்பு மணலோடு கலந்து தெளிக்கப்படுகின்றது. சுமார் ஒரு வாரத்தில் முளை கிளம்பும். பாத்தியில் கீழல் இல்லாவிட்டால் மூட்டமாவது அல்லது தட்டிப் பந்தலாவது போடவேண்டும். இந்தத் தட்டிகளை



வேண்டும்போது எடுத்துவிடலாம். மழையிலிருந்தும் வெயிலிலிருந்தும் காப்பாற்ற இத்தத் சட்டிப்பந்தல் பிரயோசனப்படும். விதைத்தவுடன் பாத்தியைக் கொஞ்சம் ஈரப்படுத்தவேண்டும். காற்றடைப்பிடுங்குகிறவரையில் முதல்வாரத்தில் தினம் ஒருதாமும், 2 வது வாரத்தில் ஒன்றுவிட் டொருநாளும் பிற்பாடு வாரம் ஒன்றுக்கு இரண்டு அல்லது 3 தடவை வீதமும் நீர்ப்போக்கிறதையாக வாளிபாலாவது அல்லது கையாலாவது ஜலம் பாய்ச்சி வரவேண்டும். களை எல்லாம் அடிக்கடி எடுத்துவிடவேண்டும். காற்றூர்ப்ப அடர்த்தியாயிருந்தால் சொத்தை சொட்டையைப் பிடுங்கிக் கலக்கச் செய்யவேண்டும். ஒவ்வொரு காற்றுக்கும் ஒரு சதுர அங்குலம் இடம் வேண்டும். ஜூன் மாதத்தில் விதை தெளித்தால் ஆகஸ்ட்டு மாதத்தில் நடலாம். விதை விட்டு 1½ அல்லது 2 மாதமானவுடன் பிடுங்கி நடலாம். அதாவது செடியில் 4 இலை இருக்கும் போதும், செடி 3 அல்லது 4 அங்குல உயரமிருக்கும் போதும் பிடுங்கி நடலாம்.

**தகுந்த காலம்:—**

காற்றங்காலில் ஜூன் 15-ம் தேதி வாக்கில் விதை விட்டால் ஆகஸ்ட்டு முதலிலேயாவது அல்லது மத்தியிலேயாவது காற்றைப்பிடுங்கி வயலில் நடவேண்டும். வயலில் நடுவதற்கு முன்னால் காற்றங்காலில் ஜலம் பாய்ச்சி, காற்றைப்பிடுங்குவார்கள். வயல் பாத்திகளிலாவது அல்லது முகடுகளிலாவது சுமார் 2 அல்லது



## 310 மாயக்கம் கொடுக்கும் பயிர்கள்.

3 அடி வித்தியாசத்தில் சாதாரணமாய் மப்பான மத்தியானத்தில் நடவார்கள். முகடுகள் 3 அடி வித்தியாசத்திலிருக்கவேண்டும். புகையிலைகாற்றை முகடுகளில்  $1\frac{1}{2}$  அடி வித்தியாசத்தில் நடவேண்டும். நட நட நாற்று களை வேப்பிலைகளினாலும் அல்லது இதர இலைகளினாலும் வேருன்றுகிறவரையில் மூடிவைப்பார்கள்.

பாசனம் கொத்தல் களைபிடுங்கல் :—

நட்டு முதல் வாரத்தில் தினம் அல்லது இரண்டு நாளைக்கொருதரம் ஜலம் பாய்ச்சவேண்டும். பிற்பாடு வேர் ஊன்றுகிறவரையில் இப்படி கவனமாயிருக்க வேண்டும். பிறகு இலை முதிர்கிறவரையில் காலத்திற்குத்தகுந்தபடி, 10 நாளைக்கு ஒரு தரம் அல்லது 15 நாளைக்கு ஒருதரம் ஜலம் பாய்ச்சவேண்டும். சுருட்டுப்புகையிலையைப் பார்க்கிலும், பொடி, வாய்ப்புகையிலை இவைகளுக்கு ஜாஸ்தி இறைவைவேண்டும். களை காண்கிறபோதெல்லாம் கொத்திப்பிடுங்க வேண்டும். பயிர் 1 அடி உயரமிருக்கையில் கொத்தி மண்ணைப் பிடித்துடன், சாம்பலை உரமாய்ணைத்தாவது அல்லது பொட்டிலுப்பு கரைத்த ஜலத்தை ஒவ்வொரு செடியின் கீழ் உரமாகவாவது ஊத்தவேண்டும். ஏனெனில் பொட்டிலுப்பில் புகையிலைப் பயிருக்கு நிரம்ப பிரீதி. நட்டு 2 மாதத்துக்கெல்லாம் பயிர் பூக்க ஆரம்பிக்கும். அப்போது பூ மொட்டுகளைக் கிள்ளி, எறிந்துவிட வேண்டும். இளம் இலைகளில் 2 முதல் 4 இலைகளைக் கிள்ளி எறிந்துவிடவேண்டும். இதற்கு கொழுந்து



ஒடிக்கிறது என்று பெயர். இந்தக்காலத்தில் 10 முதல் 15 இலைகள் வரையில்தான் ஒவ்வொரு செடியிலும் வைத்திருக்கவேண்டும். இப்படி நுனியிலேயும் அடியிலேயும் கொழுந்து ஒடிக்கப்பட்ட இலைகளை வயலைவிட்டு அப்புறப்படுத்திவிட வேண்டும். இல்லாவிட்டால் புகையிலைகளுக்குக் கெடுதல் சம்பவிக்கும். கொழுந்தொடித்த பிற்பாடு சிம்புகள் பக்கங்களில் வெடிக்கும். இப்படி பக்கங்களில் வெடிக்கும் சிம்புகளை வாரம் ஒருமுறைவிதம் 2, 3 தரம் நீக்கும்படியாயிருக்கும். இதற்கு சிம்பாடிக்கிறதென்று பெயர். புகையிலைக் கொல்லையில் கொத்தல் களைப்பிடுங்கல் கொழுந்தொடித்தல் சிம்படித்தல் முதலிய வேலைகளை எல்லாம் காலையிலேயே நடத்தப்படுகின்றன. கொழுந்தொடித்தல் சிம்படித்தல் முதலியவைகளால் இலைகள் பெருத்து காத்திரமாயிருக்கும்.

**வயகு, அறுப்பு கண்டு முதல் :—**

இது சுமார் 6 மாதத்துப் பயிர். நட்டு 4 மாதத்துக் கெல்லாம் அறுக்கலாம் ஜூனில் நாற்றங்காலில் விதை தெளித்தால் ஆகஸ்ட்டில் நாற்றை வயலில்நட்டு, டிசம்பர், ஜனவரியில் அறுக்கலாம். பயிர் முதிர்ந்ததற்கு அடையாளம் இலைகளில் மஞ்சள் பொட்டுகள் தோன்றும். கையால் அதுக்கினால் சத்தம் உண்டாகும். இலைகள் முறியத்தக்கதாயும், பிசுபிசுப்பாயும், கனமாயுமிருக்கும். அறுப்புக்கு முதல்நாள் வயலில் ஜலம் பாய்ச்சி முழுப்பயிரை அடியோடே வெட்டி, பனியில் போட்டு



விடுவார்கள். சில இடங்களில் இலைகளை மாதிரம் தனி மையில் அறுத்து வைக்கிறார்கள். ஏகர் 1க்கு சராசரி சுமார் 800 முதல் 1,000 பவுண்டு பாடம் பண்ணின சுருட்டுப் புகையிலை கிடைக்கும். உப்பு ஜலமில்லாமல் நல்ல ஜலத்தில் சாகுபடி செய்தால், பொடிப்புகையிலையிலேயும் இந்தக் கண்டு முதல்தான் கிடைக்கும். உப்பு ஜலத்தில் சாகுபடி செய்தால் பொடிப்புகையிலை ஏகர் 1க்கு 3,000 பவுண்டு பாடம்பண்ணின புகையிலை கிடைக்கும். சுருட்டுப்புகையிலையில் ஏகர் 1க்கு நல்ல பூமியாயிருந்தால் ஜாஸ்தி கண்டு முதல் சுமார் 2,500 பவுண்டு வரையில் பாடம்பண்ணின இலைகள் கிடைக்குமாம். புகைப் புகையிலையில் ஏகர் 1க்கு சுமார் 1,000 பவுண்டுக்குள்ள்தான் கிடைக்கும். பவுண்டு ஒன்றுக்கு அரை நாலுவீதம் ஏகர் 1க்கு சுமார் ரூபாய் 250 மொத்த வருமானம் கிடைக்கும். சாகுபடிச் செலவும், பாடம் பண்ணுகிற செலவும் சுமார் ரூபாய் 150 ஆன ம்லு ஏகர் 1க்கு சராசரியில் எச்செலவும்போக சுமார் ரூபாய் 100 மீறும். சிலசமயம் 200, 300 ரூபாயும் கிடைக்கலாம். ஒரு ஏகர் பச்சையிலைகள் பாடம் பண்ணாமலே சுமார் ரூபாய் 60 முதல் ரூபாய் 100 வரையில் விலைக்கு வாங்கப்படுகின்றன.

**கைத்தொழில்:—**

புகையிலையிலிருந்து சுருட்டுகளும், வாய்த் தூள்களும், முக்குத் தூள்களும் பண்ணப்படுகின்றன. புகையிலையிலுள்ள காரவஸ்து, பொடிப் புகையிலையில் ஜாஸ்



தியாயிருக்கும். சுருட்டுப் புறையிலேயில் அன்வளவு ஜாஸ்தி யிருக்காது. சுருட்டுப் புறையிலேயில் சாம்பல் உப்பு ஜாஸ்தியிருக்கவேண்டும்.

**புறையிலே பாடம்பண்ணும் விதம் :—**

பயிரை சாயங்காலம் அறுத்து, பனியில் போட்டு விட்டு, காலையில் எடுத்து, காம்புகள் வெளியில் இருக்கும்படி 2 அடி உயரம் சக்கரமான குவியல்களாய்ப் போட்டு வைத்திருந்து வைக்கோல் அல்லது சிம்புகளால் குவியல்களை மூடிவைத்திருக்க வேண்டும். இக்குவியல்களை அறுத்த மூன்றாம்நாள் சாயங்காலம்வரையில் திறக்கக்கூடாது. பிற்பாடு இலைகளை பூமியில் கொஞ்ச நாழிகை பரப்பிவைத்திருந்து, பிறகு ஒரு கொட்டகையில் காம்புகள் மேலாக, இலைகளைத் தலைகீழாகக்கட்டித் தொங்கவிட்டு விடுவார்கள். இப்படித் தொங்கவிடுகையில், காம்புகளையெல்லாம் சேர்த்தாப் போல் நெருங்கத்தொங்கவிட்டு விடுகிறார்களாம். இப்படித் தொங்கவிடுவதினால் இலைகள் வாடி வதங்கும். தினம் இக்காம்புகளைக் கொஞ்சம் கொஞ்சமாய் நெருக்கமா யிருக்கப்பட்டதை கலக்கச் செய்கிறார்களாம். அதிக நெருக்கமாய்த் தொங்கவிட்டால், இலைகள் கருத்து அழுகிப்போய்விடும். ஆகையால் கலக்கத்தொங்கவிட்டு ஒத்தாப்போல் வாடவைப்பது திறம். பயிரைக் கலக்கத்தொங்கவிட்டும், இல்லாவிட்டால் தண்டை இரண்டாய்க் கிழித்துக் கலக்கத் தொங்கவிட்டும், ஒத்தாப்போலும் சீக்கிரமும் காயும்படி செய்வது திறம்.



### 314 மயக்கம் கொடுக்கும் பாயிர்கள்.


மழை, அதிககாற்றுள்ள இடங்களில் பயிரைத்தொங்க விடக்கூடாது. இப்படி தொங்கவிட்ட 15 அல்லது 20 நாளைக்கெல்லாம், இலை துருப்பிடித்தாப்போல் சிவப்பு நிறமாயும், மஞ்சள் நிறமாயும் பச்சையாயும் நிறம்மாறியிருக்கும். தண்டுகள் நன்றாய்க்காய்ந்தவுடன் (நரம்புகள் பச்சையாயிருந்தாலும்) இலைகளின் தண்டு குறுக்க இருக்கும்படி சதுரமாக குவியல் குவியல்களாக அடுக்குவார்கள். இக்குவியல்கள் சுமார் 2 அடி உயரமிருக்கவேண்டும். இக்குவியல்களை இரண்டு மூன்று நாளைக்கொருதரம் திறந்து, புறட்டி, மறுபடி புதுக்குவியல்களாக அடுக்குவார்கள். இப்படி அடுக்குவதெல்லாம் காலவேளையில் செய்யப்படுகிறது. ஏனெனில் இலைகள் அப்போது சற்றுவதங்கலாயிருக்கும். ஒருவித கருப்பு நிறமுண்டானவுடன் இலைகளை நடுக்காம்பிலிருந்து உரித்து 1½ பவுண்டு அல்லது 2 பவுண்டு நிறையுள்ள 50 பாடம் பண்ணின இலைகளை சிறுகட்டுகளாகக் கட்டி, அம்பாரம் செய்வார்கள். இலையை உரிக்கிறதற்கு முன்னால், பாடம் பண்ணின இலைகளை வெல்ல ஜலத்தில் தோய்த்துக் கொஞ்சம் காய்ந்தவுடன் இலையைக் காம்பிலிருந்து பிரிப்பார்கள். இலைகளை உரிக்கையில் நல்ல இலைகளையெல்லாம் ஒரு மாதிரியாகவும், நடுத்தரமான இலைகளையெல்லாம் ஒரு மாதிரியாகவும், மட்டத்தையெல்லாம் ஒரு மாதிரியாகவும், பிரித்து, தனித்தனியாய் கட்டவேண்டும். நல்ல நிறமுடைய பெரிய இலைகள் சுருட்டுப்புனைகயிலைக்குப்



பிரயோசனப்படும். காம்பிலிருந்து உரித்த பிற்பாடு மறுபடி குவியல் குவியல்களாக அம்பாரம் போட்டு, மறுபடியும் 110-டிகிரி சூன்டாகும்போது பிரித்து, பிறகு அம்பாரம் போட்டு சிறு கட்டாகக்கட்டி விலைக்கு விற்றுவிடலாம். பாடம் பண்ண சுமார் 4 அல்லது 6 வாரம் செல்லும். பாடமானவுடன் கிழித்துக் கட்டுக்கட்டப்படும். பயிர் தலைகீழாகத் தொங்கவிடப் பட்டிருக்கையில், காற்று நிரப்ப வரகையாயிருந்தால் கொட்டகையின் பூமியில் ஜலம் கொட்டவேண்டும். காற்று நீர் சுவற்றை தாயிருந்தால், இலை பூஞ்சாக்காளம் பூக்க நேரிடும். இப்படி நேரிட்டால் பூமியில் நெருப்புண்டாக்கி இலைகளைக்காயவைக்க வேண்டும். சில இடங்களில் இலைகளைக்காயவைத்த பிற்பாடு, பூமியில் கொஞ்சகாலம் புதைத்துவைத்துப் பாடம் செய்கிறார்கள். இலைகள் தொங்கிக்காய்ந்து கொண்டிருக்கும் போதே சில சமயம் வெல்ல ஜலத்தைக்கொண்டும் ஆவாரைக் கஷாயஜலத்தைக்கொண்டும் தெளிப்பார்கள். சில இடங்களில் புனையிலைக்கு ஒருவித வாசனையுண்டாக்குவதற்காக, திருகுகள்ளி வேளியில் தொங்க விடுவார்கள். இலைகளுக்கு அநேகவிதமான வாசனைகளும் ஏற்றலாம்.



கஞ்சாப் பயிர் அல்லது  
ருஷியா தேசத்துச் சணல்.



கஞ்சாப் பயிர்.



**பயிர் கபாவம் :—**

இதை ஒரு நார்வகைப்பயிராகவும், மயக்கம் உண்டாக்கும் பயிராகவும் கொள்ளலாம். ஆனால் இந்தியாவில், நார்ப்பயிருக்காக சாகுபடி செய்வதில்லை. மயக்கம் உண்டாக்கக்கூடிய கஞ்சா என்னும் சரக்கை உண்டாக்க இது சாகுபடி செய்யப்படுகிறது. வட ஆர்க்காட்டில் குன்றுகளில் இதன் சாகுபடி விசேஷம். நாருக்காகச் சாகுபடி செய்யும் பட்சத்தில் விதைகளை நெருக்கலாக தெளிக்கவேண்டும். கஞ்சாவுக்குக் கலப்பாய்த் தெளிக்கவேண்டும். நாருக்காக வேண்டுமானால் பூக்க ஆரம்பிக்கையில் பயிரை வெட்டவேண்டும். கஞ்சாவுக்காக வென்றால் பயிர் நன்றாய் முதிர்ந்த பிறகு வெட்டவேண்டும். பயிர் சுமார் 10, 12 அடி உயரமிருக்கும். இது தாழ்ந்த ஜாதிகள் சாகுபடி செய்யும் பயிர். இது புலத்தில் சாகுபடி செய்தால் கெடுதல் சம்பவிக்கு மென்ற கொள்கை இருக்கிறது.

**பூமிகள் :—**

நல்ல பொலபொலத்த மண்ணையுடைய பூமியில் இது நன்றாய் வரும். இந்திரிய வஸ்து ஜாஸ்தியாயுள்ள மண்ணிலேயும் நன்றாய் வரும். நல்லவளமான பூமியாயிருக்கவேண்டும். ஒரு இல்லாமல் சாகுபடி செய்ய முடியாது. வருஷா வருஷம் ஒரே பூமியில் சாகுபடி செய்யப்படுவதில்லை. கிராம நத்தங்களிலும் கொல்லைகளிலும் விசேஷமாகச் சாகுபடி செய்யப்படுகிறது.



## 318 மயக்கம் கொடுக்கும் பயிர்கள்.

**சாகுபடி:—**

சாதாரணமாய் சிறுபான்மையில்தான் சாகுபடி செய்யப்படுகிறது. மே, ஜூனில் 4, 5 தடவை உழுது ஜூலை, ஆகஸ்ட்டில் வரிசை வரிசையாக விதை தெளிக்கப்படுகிறது. ஏக்கர் 1 ச்சு சுமார் 5, 6 சேர் அதாவது சுமார் 4 பட்டணம்படி விதை செல்லும். அதிக மழையும் அதிக வெயிலும், அதிக காற்றும் கூடாது. ஒரு வரிசைக்கும் மற்றொரு வரிசைக்கும் சுமார் 3, 4 அடி இடை வெளி வித்தியாசமிருக்கவேண்டும். விதை ஒருவாரத்துக்குள் முளைகண்டுவிடும். பயிர் 3 வாரம் ஆனவுடன் அவசியமிருந்தால் பயிரைக் கலக்கச்செய்து ஒருதரம் கொத்தி விடவேண்டும். பிறகு 15 நாளைக்கு ஒருதரம் கொத்தி மண் அணைத்து வரவேண்டும். மொத்தம் 3, 4 கொத்தல் போதுமானது. 4வது மாதத்தில் பெண்மலருள்ள செடிகள் எல்லாம் கஞ்சாவுக்காகப் பிடுங்கப்படுகின்றன. அக்காலத்தில் பயிர் சுமார் 10, 12 அடி உயரமிருக்கும். ஆண்மலருள்ள செடிகள் தனிமையாகவும் பெண்மலருள்ள செடிகள் தனிமையாகவுமகிருக்கும். பெண்மலரைப்பிடுங்காத பட்சத்தில் விதை உண்டாய்விடும். இப்படி ஐனவரி முதல், மார்ச்சு வரையில் செடிகளைப்பிடுங்கி அப்புறப்படுத்துகிறார்கள். பூவும் இலையும் மஞ்சள் நிறமாய் மாறினவுடனும், இலைகள் உதிர ஆரம்பிக்கும் போதும் பயிரை வெட்ட ஆரம்பிக்கிறார்கள். மழை, மப்பாயிருக்கும்போது பயிரை வெட்டுகிறதில்லை. வெட்டுதலெல்லாம் காலையில் நடக்



கிறது. தண்டிவிருந்து பூவும், இலைகளும் உருவப்பட்டு களத்தில் பரப்பப்பட்டு 3, 4 மணி வெய்யிலில் போடப் பட்டிருந்து அப்புறம் கையாடிக் கஞ்சா செய்யப்படு கிறது. கையாடினால் இலை எல்லாம் கொருங்கிப்போ கும். பூவெல்லாம் ஒன் ருப்ச் சேர்க்குவிடும். பிறகு முரத்தால் புடைத்தால் இலையும் பூவும் வெவ்வேறாகப் பிரிக்குவிடும்.

கஞ்சா பங்கி செய்யும் விதம் —

கொருங்கலாப்பட்டின்லி இருக்கிற ஒரு மூங்கில்கூடை யை எடுத்துக்கொண்டு அதனடியில் மேற்படி செடி யின் இலைத்துளைத் தாவுகிறார்கள். இதன் மேல் 1½ அங்குலத்துக்கு பூவைப் போட்டுவைத்து அதன்மேல் இலைத்துளைத் தாவுகிறார்கள். இப்போது ஒருமனிதன் தன் குதிகாலால் சுற்றிச் சுற்றிவந்து கன்றாய் மிதிக்கி றான். இப்படி ஒருகூடையில் 10 முதல் 25 பூவும், இலை த்துளும், கலந்த அடுக்குகளிருக்கும். கூடை பெரி தாக இருந்தால் ஜாஸ்தி அடுக்குகளும், சிறிதாக இருந் தால் குறைச்சலான அடுக்குகள் மிருக்கும். இப்படி ஒரு கூடை போடப்பட்டு கன்றாய் அழுத்தியானவுடன் கெட்டியான தரையில் கூடையைக் கொட்டி இதன் மேல் 14, 15 மணி சாவகாசத்திற்கு, கல்பாரம் வைத்து குவியல் அழுத்தப்படுகிறது. பிறகு பாரத்தை எடுத்து விட்டு கட்டியிலுள்ள ஒவ்வொரு அடுக்கும் பிரிக்கப்படு கிறது. பிரித்து எடுத்த பெரியகட்டிகளெல்லாம் சிறி தாக உடைக்கப்பட்டு காலால் அழுத்தப்பட்டு வெய்யி



லில் காயவைக்கப்படுகின்றன. மறுபடியும் அவற்றை அடுக்கி முன்போல பாரம்போட்டு பின்பிரித்து காயப் போட்டுப் பதப்படுத்துகிறார்கள். இப்படி 2வது சடவை பதப்படுத்துகையில் காய்ச்சல் போதாவிட்டால் மூன்றாம்தரம் பதம்பண்ணுகிற வழக்கம் உண்டு. கஞ்சாக் கட்டியினுடைய குணமெல்லாம் நன்றாய் நிதித்து அழுத்துவதிலும், போதுமான அளவு கனம்வைத்து சுருங்க வைப்பதிலும், நன்றாய் சாக்கு காய்த்திருப்பதிலும் பொருத்ததாக இருக்கிறது. பிறகு இதை ஈச்சம்பாயில் அடக்கிக் கட்டி, விலக்கு அணுப்பப்படுகிறது. ஒருகட்டு அல்லது ஒருமூட்டை 20 விசை கனமிருக்கும். கஞ்சாக்கட்டி ஒரு வருஷத்துக்கு மேல் வைத்துக்கொள்வதில்லை. அதிகநாள் வைத்திருந்தால் கஞ்சாவின் குணம் செட்டுப்போய்விடும். நைப்பினாலும் புனையினாலும் சாக்கு கெடும். நல்ல சாக்கு பழுப்புவர்ணமாக இருக்கும். இந்தப் பூவிலும், இலையிலும்தான் மயக்கம் உண்டாக்கும் வஸ்து இருக்கிறது. இந்த மயக்கம் உண்டாக்கும் வஸ்து ஒரு பிகபிகப்பான ஊறல். சில இடங்களில் பூவைக் கஞ்சாவாகவும், இலையைப் பங்கியாகவும் கொள்ளுகிறார்கள். இலையைக் கஷாயம்வைத்தால் அந்தக் கஷாயத்துக்குக் கள்ளுக்குள்ள சிலகுணம் இருக்கிறதாம்.

**நார்ப்பயிர்:—**

ஏகர் 1க்கு 30 சேர் விதை தெளித்து 4 மாதத்தில் தண்டிவிருந்து நார் எடுக்கப்படுகிறது. பயிர் சுமார்



12 அடி உயரமிருக்குமாம். ஆண்மலரையுடைய செடிதான் நல்ல நாரைக் கொடுப்பதால் அவைகளைப் பெண்ணா நுள்ள செடியை வெட்டுவதற்கு ஒரு மாதத் திந்த முத்தி வெட்டிவிடுவது வழக்கம். பெண்மலரை விதை விடுவதற்கும், கஞ்சா உண்டாக்கவும் பிரயோசனப்படுத்திக் கொள்ளுகிறார்கள். தண்டை வெட்டி அழகுப்போட்டு, கொட்டாப்பிடியால் அடித்து நார் எடுக்கப்படுகிறது. நாரிலிருந்து கயிறுகளும், சாக்குகளும், துணிகளும், தீஜாபிகளும் செய்யப்படுகின்றன. விதைகள் எடுக்கலடைக்கப்பட்ட பட்சிகளுக்கு நல்ல ஆகாயமாவதுமன்றி பலை ஜனங்களும் வருத்தும் தின்கிறார்கள். விதைகளிலிருந்து எண்ணெயும் எடுக்கப்படுகிறதாம். பண்ணைக்கு மாடுகளுக்கு தீவனமாக்கப்படுகிறதாம்.

கண்டுழதல் :—

வடக்கே ஒரு ஏகர் கஞ்சாப் பயிரிலிருந்து 6 ரூபாய் விலையுள்ள 3 சேர் கஞ்சாவும், 8 ரூபாய் விலையுள்ள 4 மணங்கு சணல் நாரும், 1 ரூபாய் விலையுள்ள சுமார் 5 சேர் எண்ணெயும் கொடுக்கக்கூடிய சுமார் 30, 35 சேர் விதைகளும் கிடைக்குமாம்.



அபினி அல்லது கசகசாப்  
பயிர்.



கசகசாப் பயிர்.



இதைக் குடிகள் சுபேச்சையாய்ச் சாகுபடிபண்ண முடியாது. ஏனெனில் கவரன்மெண்டார் அபினி இலாகா என்று ஒன்று தனியாக ஏற்படுத்திக்கொண்டு அதில் சுதந்தரவர்த்தகம் ஏற்படுத்திக்கொண்டிருப்பதால், கவரன்மெண்டாரிடம் அனுமதி பெற்றுக்கொண்டு அவர்கள் மேற்பார்வையின் கீழ்தான் குடிகள் சாகுபடி செய்யவேண்டும். ஆகையால் சாகுபடிசெய்ய நிஷ்டமுள்ளவர்கள் கவரன்மெண்டாரிடம் எழுத்து மூலமாய் லைசென்சு பெற்றுக்கொண்டு அவர்கள் குறிப்பிடுகிற இடத்தில்தான் அட்வான்சு பெற்றுக்கொண்டு சாகுபடி செய்யலாம். மகசூலை கவரன்மெண்டாரே வாங்கிக்கொள்ளுகிறார்கள்.

இதை தோட்டக்கால் பயிராகச் சாகுபடி செய்யப்படுகிறது. இதை மாரிகாலப்பயிராகவும் கொள்ளலாம். இது அநேகமாக தனிமையில் கிணற்றுக்குச் சமீபத்தில் சாகுபடி செய்யப்படுகிறது. கிராமநத்தங்களில் இதின் சாகுபடி விசேஷம். ஏகர் 1க்கு வருஷம் 1க்கு சுமார் 150 மணங்கு ஒரு அடிக்கிறார்களாம். நல்ல மணல் சம்பந்தமுள்ள களி நிலம் திறமாம். அக்டோபர் மாதத்தில் ஏகர் 1க்கு 3 பவுண்டு வீதம் விதை தெளிக்கப்பட்டு, 4, 5 இறைவையிலும் 4, 5 கொத்தல், களைபிடுங்கலிலேயும், அறுவடைக்குப் பயிர் தயாராகிறது. பிப்பிரவரி மாதத்தில் நன்றாய்ப் பூக்கிறது. அப்போது கீழே விழுகிற, பூ, இதழ்களைப் பொருக்கி அனலின்மேல் காட்டி அழுத்திக் கட்டியாக்குகிறார்கள்.



இப்பூக்கட்டிகளை கவரன்மெண்டார் பாக் செவ்வதற்காக (அபினியை அடக்கிக் கட்டுவதற்காக) வாங்குகிறார்கள். காய்கள் பெருத்தவுடன் ஒருவித அறுத்த தினால் அவைகளில் 4, 5 கீறல் சாயங்காலத்தில் உண்டாக்கி அந்த கீறல்களிலிருந்து உண்டாகும் நிகரிகம்பான சாற்றை மறுபாள் காலையில் சுறண்டி எடுத்துச் சட்டியில் வைக்கிறார்கள். இச்சாறு இருகலானவுடன் அபினியாகிறது. அதாவது கசகசாப்பயிரினம்பூக்காத காயிலிருந்து உண்டாகும் இருகலான சாறுக்குத்தான் அபினி என்று பெயர். ஏகர் 1க்கு 9 சேர் அபினி கிடைக்குமாம். இத்துடன் 5, 6 மணங்கு கசகசா விதையும் 20 சேர் பூ இதழ்க்கட்டியும் கிடைக்குமாம். நல்ல பூமியிலிருந்து வாப்பட்ட வரும்படிக்கு கவரன்மெண்டார் ஏகர் 1க்கு ரூபாய் 50 கொடுக்கிறார்களாம்.



ஓ ம ம்.



ஓமப் பயிர்.



## 326 மயக்கம் கொடுக்கும் பயிர்கள்

இது ஒரு மருந்து சாக்குப் பயிர். இது மட்டமான கரிசலில் உண்டாகிறது. இதன் சாகுபடி புஞ்சைப் பயிருக்கு உள்ளதுபோலத்தான். ஏகர் 1க்கு 1½ படி அல்லது 2 சேர் வீதம் செப்டெம்பர் கடைசியிலாவது அல்லது அக்டோபர் ஆரம்பத்திலாவது தெளிக்கப்படுகிறது. முளைகாண சுமார் 9 நாள் செல்லும். பயிர் முதிர்வதற்கு சுமார் 6 மாதம் செல்லும். ஏகர் 1க்கு சுமார் 120 பட்டணர் படி கண்டு முதல் செய்யலாம்.



காப்பி.



காப்பிச் செடி.



**பயிரின் சுபாவம் :—**

இப்பயிர் மலைப்பிரதேசங்களில்தான் ஜாஸ்தியாக உண்டாகிறது. நீலகிரி, பழநி, குடகு, திருவாங்கூர் முதலிய மலைப்பிரதேசங்களில் நமது இராஜதானியில் காப்பி உண்டாகிறது. இது கந்தியாவட்டை பூச்சொடி போல் இருக்கும். காப்பியில் கார்போகம் காப்பி என்றும், கோடைக் காப்பி என்றும் இரண்டு வகை உண்டு. கார்போகம் டிசம்பர் முதல் மார்ச்சு வரையில் போக ரிக்கப்பட்ட காப்பியை. இதுதான் சிவசிகரங்கிரம், கோடை காப்பி சூலை, ஆகஸ்ட்டில் அறுவடை செய்யப் படுகிற காப்பிகள்.

**பூமிகள் : —**

மலைப்பிரதேசங்களில் அதிக உயர்ந்த இடங்கள் நீக்கி, சூரிய உஷ்ணம் செல்லவாய்ப்புகிற இடங்களிலும், பனி விழாத இடங்களிலும் உள்ள கரிசல் பூமிகளும் சோலைகளுமே தகுந்த பூமிகள்.

**நாற்றங்கால் :—**

நன்றாய் பழுத்த பழங்களை எடுத்து, ஒரு சதா கெஜம் நீள அகலமும், ஒரு அடி ஆழமுமுள்ள குழிகளை நல்ல உயர்ந்த பூமியில் தோண்டி, அவைகளில் ஆட்டுப்புழுக்கை, சாம்பல், மண், இவைகள் கலந்து நிரப்பி பூமி மட்டத்துக்கு மேல் பாத்திகள் கட்டி, அவைகளில் பழங்களை ஊன்றி, அவைகளின் மேல் ஒரு கலந்த மண்ணை மூடி, மூட்டம்போட்டு, தினம் தண்ணீர் விட்டுக்கொண்டு வந்தால், ஒரு மாதத்தில் முளை



கண்டுவிடும். பழங்கள் டிசம்பர், ஜனவரியில் ஊன்  
வப்படுகின்றன. 6 மாதத்தில் தளிர்ரோடும், சிம்புக  
ளோடும் பயிர் 4 அடி உயரமிருக்கும். அப்போது  
நினைவிடத் தகுந்தகாலம்.

வயல்கேள்நேர்த்தி :

நவம்பர் மீதும் உழுது 6 அடிக்கு ஒருதரம் ஒரு  
அடி கீழர், ஒரு அடி அகலம், ஒரு அடி ஆடிமுள்ள  
குதிகள் தோண்டி, அவைகளில் ஆட்டு உரம், மாட்டு  
உரம், கணைக்கு உரம் முதலிய உரங்களைக் கொஞ்  
சும கணைக்கு நிறைபன் கலந்து கீர்ப்பி இப்படி ஏகர்  
1க்கு சுமார் 1,200 செடி தூள், ஜூலைமீல் நடப்படு  
கின்றன.

பாடுதேநேர்த்தி :

மட்டு 6 வருஷம் வரையில் சுமார் 18 தடவைக்குக்  
குறைபாமல் களைவிடுங்கி, கொத்திவிட வேண்டுமாம்.  
வருஷா வருஷம் களை கபாத்தும் செய்யவேண்டும்.  
கோணலான களைகளையும், கெட்டுக்குத்தலாக வளரும்  
கொம்புகளையும், தாய்க்கொம்பு 4 அடிக்கு அதிகம்  
வளர்ந்துவிட்டால் அவைகளின் தலைகளையும் வெட்டிக்  
கொண்டே வரவேண்டும். இப்படி வருஷத்தில் இர  
ண்டு தடவை களைகபாத்து செய்யவேண்டுமாம். காப்  
பிச் செடிக்கு நீழலைக் கொடுக்கிறதற்காக 60 அடிக்கு  
ஒருதரம் பலாமரங்களையும் இன்னும் சில விருட்சங்  
களையும் பயிர் செய்கிறார்களாம்.



### 330 மயக்கம் கொடுக்கும் பயிர்கள்.

**வறுப்பு வயது, கண்டுழதல் முதலியன :—**

இது சுமார் 5 வருஷத்துப் பயிர். டிசம்பர் மாதத் தில் காப்புகள் பழுக்க ஆரம்பித்துவிடும். மார்ச்சுமாதக் கடைசிவரையில் பழங்களைக் கொய்து ஒருவித எர்தி ரத்தில் கொடுத்து தோலை நீக்கிக் கழுவி காயவைக்கிறார்கள். 3வது வருஷத்தில் காப்புகள் ஆரம்பிக்கும். அந்த வருஷத்தில்வரும்படி சொல்பவ்தான். 4வது வருஷத்தில் பயிரைச்சுற்றிவர தோண்டி பின்னாக்கு உரங்களை நிரப்பி, தண்ணீர் தங்குவதற்கும், வளைபங்கள் கட்டிவிடவேண்டும். 3வது வருஷத்தில் கல்ல செய்கோர்த்தியில் ஏகர் 1க்கு சுமார் 450 பவுண்டு காப்பிப் பழங்கள் கிடைக்குமாம். 4வது வருஷத்தில் 1,000 பவுண்டுக்குக் குறைவாதாம். அதாவது 4வது வருஷத்தில் ஏகர் 1க்கு சுமார் ரூபாய் 1,000 வரும்படி கிடைக்கும்.

**செலவுபோக வரும்படி :—**

ஏகர் 1க்கு சுமார் ரூபாய் 400 செலவாகும். வரும் படி சராசரி சுமார் ரூபாய் 800 ஆக வைத்துக்கொள்ளலாம். செலவுபோக வரும்படி சுமார் ரூபாய் 400க்குக் குறையாது. வருஷம் ஏகர் 1க்கு சுமார் ரூபாய் 100க்கு வரும்படி குறையாது.

நீலகிரியில் படுகர் என்கிற ஏழை ஜாதிகள் சிறிய காப்பித் தோட்டங்கள் வைத்து அதாவது சுமார் 300 செடி, 400 செடியுள்ள தோட்டங்களை நன்றாய் சிரமப்பட்டுப் பாதுகாத்துக் கௌரவமாக காலகேஷ்பம் செய்து வருகிறார்களாம்.



# தேயிவஸ.



தேயிலைச் செடி.

பயிர் கபாவம்:—

தேயிலை ஒரு பிரமை உண்டாக்கும் அல்லது மயக்கம் தரக்கூடிய சத்தை உடைத்தாயிருக்கும் பயிர். இது காடுகளில் வனாந்தரமாய் வளர்ந்து விருட்சமாயிருக்கும். சாகுபடி செய்து செடியாகவும், புதராகவும் உண்டாக்கலாம். தேயிலையை கஷாயம் வைத்துப் பானமாகவும் அல்லது பர்மாவில் பண்ணுவதுபோல எண்ணெயில் சிலபதார்த்தங்களோடு கலந்து வதக்கிப் பணியாரமாகவும், சாப்பிடப்படுகிறது. இது மலைப் பிராந்தியங்களிலும், குளிர்ச்சியான காடுகளிலும் விசேஷம். தேயிலையில் அநேகமாதிரிகள் இருக்கின்றன.



**தகுந்த பூமிகள் :—**

காட்டிலுள்ள செவ்வல் நிலம் அதிக சிவாக்கியமாகக் கொள்ளப்படுகிறது. மலைப்பக்கங்களிலுள்ள தேயாட்டங்களிலும் உண்டாக்கலாம். காடுகளில் ஏதாவது ஆறு ஓடினால் அந்த ஆற்றங்கரை ஓரங்களிலும் உண்டாக்கலாம். தேயிலைத்தேயாட்டம் கொஞ்சம் சிறுலுள்ளதாக இருந்தால் நிறம்.

**செய்நேர்த்தி, விதைப்பு, நடவு முதலியன :—**

காடுகளிலுள்ள சிறுபாங்களைப் பறித்து, பூமிகளைப் பறித்துப் பூமிபைக் கொத்தி விட 1 செஜ்ச்சிக்கு ஒருதரம் கர்லாபுள்ள குச்சியால் துத்தி, சிறு குதிகள் உண்டாக்கி குழி ஒன்றுக்கு 3, 4 வகைகள் வகை ஊன்றி ஏழடி, செடி, உண்டாக்குகி மரிகள், ஒரு விலகிக்கு மேல் ஜாஸ்திவிதை ஊன் மர்படுவதில்லை. 1 கிவிலில் பழுது அல்லது வெளி இல்லாமலிருப்பதற்காகத் தான். நாற்றுகள் உண்டாக்கியும் நடவாயாம். தேயாட்டங்களில் நாற்றுகள் உண்டாக்கி ஒரு வருஷம் முதல் 3 வருஷம் வரையிலுள்ள நாற்றுகளைப் பிடுங்கி மழைக்காலத்தில் பூமியில் நடப்படுகின்றனவாம்.

**பின் செய்நேர்த்தி :—**

நட்ட பிற்பாடு இலை பறிக்கிறவரையில் புற்பூண்டுகளை அடிக்கடி நீக்கிக்கொண்டு வரவேண்டும். சில விடங்களில் கொத்தல், கபாத்துசெய்தல் முதலியவைகள் செய்கிறதே கிடையாது. ஏதாவது புல்லுருவி ஏற்பட்டால் அப்போதுதான் கொத்தலும், கபாத்



தும் செய்யப்படுகின்றன. கோடை காலங்களில் புல், பூண்டுசெள் நெருட்டப் பிடித்துக்கொள்ளாமல் பார்த்துக் கொள்ள வேண்டுமாம். மழைக்காலத்தில் பூண்டு செடி முதலியவைகளை களை வெட்டி விட வேண்டுமாம்.

**கபாத்து செய்தல் :—**

தேயிலைக்குக் கட்டாயம் கபாத்து செய்யவேண்டும். ஏனெனில் தேயிலைப்புதர் ஜாஸ்தி உயரம் வளர்த்து விட்டால், ஒரு மனுஷன் சிந்தப்படிபே இலைபறிப்பது கஷ்டமாகும். ஆகையால்தான் ஒரு ஆள் சௌகரிய மாய் பறிக்கிறதற்குள்ள உயரத்துக்குமேல் கபாத்து செய்துவிடவேண்டும். புதர் நிரம்ப அடர்த்தியாய்ப் போய், கொத்தல், களை பிடுங்கல்களுக்கு கஷ்டமாயிருக்குமபடியும் விட்டுவிடக்கூடாது. நிரம்ப அடர்த்தி யாகப் போனாலும் கபாத்துசெய்யவேண்டும். கபாத்து செய்கிறது சிதானமாயும் ஒழுங்காயும் இருக்கவேண் டும். அதிக ஜாஸ்தி கபாத்தும் கூடாது. பட்டுப் போன கட்டைகளையும், கோணலான கிளைகளையும், புல்லுருவிகளையும், நோவுபிடித்த கொம்புகளையும், இன்னும் பயிருக்கு இடைஞ்சலானவைகளையும் கபா த்து செய்யவேண்டும்.

**வயக, அறுப்பு, கண்டுழதல் :—**

நட்டு 3, 4 வருஷத்துக்கெல்லாம் இலைபறிக்க ஆரம்பி க்கலாம். பூமி சுத்தமாயில்லாமல் களைத்தொந்தரவு கள் ஜாஸ்தியிருந்தால் இலைபறிப்பது கொஞ்சம் நீடிக்கும். 8 வது வருஷத்தில் விதை பிடிக்க ஆரம்பிக்கும்.



### 334 மயக்கம் கொடுக்கும் பயிர்கள்.

ஆனால் 15 வருஷத்தில்தான் கன்றாய்ப் பூத்து விதைகள் எதேஷ்டமாய்க் கிடைக்கும். தேயிலை மரம் சராசரியில் சுமார் 40, 50 வருஷகாலம் பூமியில் இருக்கும். சுமார் 75 வருஷமுள்ள தேயிலை மரமும் இருப்பதாகத் தெரியவருகிறது. இளமரத்திலிருந்துதான் இலைவரும் படியும், விதை வரும்படியும் ஜாஸ்தியாகச்சிடைக்கிறதாம். நடுத்தரமான வயதுள்ள மரத்தை அடிக்கட்டைமையைவைத்துவிட்டு வெட்டி விட்டால் அடிக்கட்டையிலிருந்து தளிர் உண்டாகுமாம். விலாதற் தேயிலை என்றும், இலை த்தேயிலை என்றும் இரண்டு தினுசானப்பயிர்களில் இலைகளை ஏப்பால், மேயிலும், ஜூலை, ஆகஸ்டிலும், செப்டெம்பர், அக்டோபரிலும் பறிக்கிறார்களாம். முதலில் பறிக்கிற இலை நீர்ப்ப சிலாக்கியம். தளிர்ல் ஒரு இலையைவிட்டு பாக்கி இலைகளைக் கிள்ளிவிடுவார்களாம். இலையைக் கிள்ளி கொதிக்கிற வெந்நீரில் போட்டுவிடுவார்களாம். இலைகள் மஞ்சள் நிறமாய் மாறுகிறவரையில், அதிலிருக்குமாம். பிற்பாடு ஜலத்தைக்கொட்டி தேயிலைகளைப் பாயில் போட்டு சுருட்டி விடுவார்களாம். சுருட்டின உடனே, வியாபாரிகளுக்கு விற்றாலும் விற்றுவிடலாம் அல்லது வைத்துக்கொள்ள வேணுமென்றிருந்தால் பூமியில் மூங்கில்பாய் சுருட்டலோடு புதைத்து வைத்திருந்தாவது, அல்லது மூங்கில் குழாயில் போட்டு, தண்ணீர் வடிய தலைகீழாக வைத்துப் பூமியில் வைத்திருப்பார்களாம். 100 வீசை (முதல் பறிப்பு) இலை ரூபாய் 16ம்,




(இரண்டாம் தரம், 3ம் தரம் பறிப்பு இலை). ரூபாய் 12-8-0 டும் தோட்டங்களில் விற்கப்படுகிறதாம். விதை எடுக்கும் பட்சத்தில அக்டோபர், நவம்பரில் எடுக்கப் படுகிறதாம். சுமார் 14 விசை ரீறை உள்ள ஒருகூடை விதை சுமார் ரூபாய் 4, 5க்கு விற்கப்படுகிறதாம். இலைவெரும்படி 60 அடி உயரமுள்ள மாங்களிலிருந்து கொடுத்த போதிலும் கூட நல்ல இலைகள் இளஞ்செடி யிலிருந்துகான் கிடைக்கின்றன. பூமியில் புதைத்து வைத்திருக்கும் தேயிலைகளை, தாக்களுக்கு விற்கும் போது விசை ஒரு ரூபாய்க்கு விற்கப்படுகிறதாம்.

தேயிலைச்சாக்கு அல்லது காய்ந்த தேயிலை. மூங்கில் பாயில் சுருட்டின வேகவைத்த தேயிலையை வெய்யிலில் காயவைத்தால் சாக்குத் தேயிலை உண்டாகிறது. சாடிங்காலம் பொருக்கின இலைகளை உடனே ஆவியில் வதக்கி, அல்லது வேகவைத்து, மறுநாள் காலையில் வெய்யிலில் காயவைத்து சாக்குகள் பொட்டலங்களாகவாவது அல்லது தகரடப்பியிலாவது அடைத்து விற்பனைக்கு தயாராக்கப்படுகின்றன.



# வேலிப்பயிர்கள்.



தொருக்காப்பள்ளி.



## வேலிப்பயிர்கள் உண்டாக்குதல். 337

வேலிப்பயிர்களின் பிரயோஜனம்.

பயிர்களிலும் தோட்டங்களிலும் ஆடுமாடுகள் உள்ளே வராமல் தடுப்பதற்கும், திருடர்களும் அன்னியர்களும் எல்லை கடந்து பிரவேசிப்பதைத் தடுப்பதற்கும், பயிர்களுக்கும் மரங்களுக்கும் பெருங்காற்றின் வேகத்தினாலுண்டாகும் கெடுதலைத் தடுப்பதற்கும், பச்சைசைபைக்கண்டு ஆடு மாடுகள் அனுவசியமாய்க் கூட்டங்கூடி மேயவருவதைத் தடுக்கவும், நல்ல உரமாகிய சாணத்தை முட்டைதட்டி விராட்டிக்காக உபயோகப்படுத்துவதை நீக்கி விறகு கொடுக்கும்படி செய்யவும், நார் கொடுக்கவும், மாட்டுத் தீவனத்திற்காகவும், இப்படி அனேகவித செளகரியத்திற்கும், லாபத்திற்கும் வேலிப்பயிர்கள் சாகுபடி செய்யவேண்டும்.

2. வேலிகளில் உயிருள்ள வேலியென்றும், உயிரில்லாத வேலியென்றும் இரண்டு வகையுண்டு.

(a) உயிரில்லாத வேலி :—

மூங்கில் முள்ளினால் படல்போட்டு உண்டாக்கும் வேலியும், கருவைமுள், காரைமுள், இலந்தைமுள், முதலியவைகளால் அடைக்கப்படும் வேலியுமாகும்.

(b) உயிருள்ள வேலியாவன :—

- |                     |                  |
|---------------------|------------------|
| 1. கொறுக்காப்பள்ளி. | 3. கருவேல்.      |
| 2. முட்டிஞ்சை.      | 4. சிறுமூங்கில். |



- |                       |                      |
|-----------------------|----------------------|
| 5. முள் முருங்கை.     | 17. கத்தாலை.         |
| 6. கழக்கோடி.          | 18. ஜமிக்கிச்செடி.   |
| 7. மருதாணி.           | 19. ஆதாளை.           |
| 8. திருகுகள்ளி.       | 20. பேய்க்கருமா.     |
| 9. துப்பாக்கிக் கள்ளி | 21. முள் குசம்பா ஆல  |
| அல்லது பிரம்மசெ       | வது செருங்கை.        |
| ண்டம்.                | 22. மாவள்ளி.         |
| 10. சப்பாத்திக்கள்ளி. | 23. அழிஞ்செடி.       |
| 11. கொடிக்கள்ளி.      | 24. குமிளஞ்செடி.     |
| 12. கண்ணாடிக்கள்ளி.   | 25. தூரா.            |
| 13. ஆடாதொடை.          | 26. தூதுளை.          |
| 14. காட்டாமணக்கு.     | 27. ஆதண்டை.          |
| 15. புளிமஞ்சி அல்லது  | 28. சச்சஞ்செடி.      |
| புளிச்சை.             | 29. சீமாக்காய் முதல் |
| 16. கொச்சி.           | யான.                 |

3. இவைகளைத் தனித்தனியாக எடுத்து விவரிக்கும் முன், வேலிப்பயிர் விருக்கவேண்டிய முக்கிய குணங்களைச் சொல்லுவது அவசியமாயிருக்கிறது. அவையாவன :—

1. அதிகக்கிரத்தில் ஒரு வேலிப்பயிராகவேண்டும்.
2. நீடித்த வயதுள்ளதா யிருக்கவேண்டும்.
3. சீக்கிரத்தில் பழுது பார்க்கும்படியா யிருக்க வேண்டும்.
4. ஒத்தாப்போல் வளரவேண்டும்.
5. பொழிக்குள்ளடங்கி யிருக்கவேண்டும்.



6. அடக்காராயும் அழுத்தமாய் மிருக்கவேண்  
டும்.
7. ஆடுமாடுகள் அழைந்து உள்ளே போகாம  
ல் நஞ்சுர்ப்படியாக முட்களுடன் பலமாயி  
ருக்க வேண்டும்.
8. அராபத்தி அடிகச் செலவின்றிச் சீக்கிரத்தில்  
உண்டாக வேண்டும்.
9. எக்காய் பூரியி லுண்டாக்குகிறோமோ அந்  
தாய் பூரிக்குத் தகுந்ததாயிருக்கவேண்டும்.
10. அதிக வறட்சியினாலும் அதிக குளிரினாலும்  
செதமடையாததாயிருக்கவேண்டும்.
11. குளிர் காற்றுகளைத் தடுத்து மாடுகளுக்குப்  
பாதுகாப்பாயிருக்கவேண்டும்.
12. தரைக்குச் சமீபமாகத் தளிர்விட்டு நாய் நரி  
கள் கூட அழையக்கூடாமல் அடர்த்தியா  
யிருக்கவேண்டும்.
13. பூச்சிபொட்டுகள் அதிகமாய் அடையக்கூடாத  
தாயிருக்கவேண்டும்.
14. காளான் முதலிய ரோவுகளுக்கு இடங்கொடுக்  
கக்கூடாததாயிருக்கவேண்டும்.
15. வேர்கள் அக்கம்பக்கத்து வயல்களில்போய்ப்  
படர்ந்து கெடுதல் பண்ணக்கூடாததாயிரு  
க்கவேண்டும்.
16. கால் நடைகளால் சுலபமாய்த் தின்னக்கூடாத  
தாயிருக்கவேண்டும்.



17. 'வயதானவுடனே வெட்டப்பட்டு, பூமிக்குச்  
சமீபமுள்ள அடிக்கட்டைகள் தளிர்ந்து  
வேலிக்கு உதவும்படியா யிருக்கவேண்டும்.

4. வேலிப்பயிர் உண்டாக்குவதில் சாகவதமான  
நன்மையை உத்தேசித்து உண்டாக்கவேண்டுமே தவிர  
தற்சமயம் ஏற்படுகிறநன்மையைக் கருதி உண்டாக்கக்  
கூடாது. நிரந்தரமான பிரயோஜனத்தை, அற்பப்பிரி  
ரயோஜனத்தைப்பார்க்கிலும் ஜாஸ்தியாய்க் கவனிக்க  
வேண்டியதாதலால் குழிகள் இதுவிஷயத்தில் கவனக்  
குறைவாயிருப்பதை நீக்கவேண்டும்.

5. வேலிப்பயிர்களைத் தரைமட்டத்திலேயாவது,  
அல்லது கரைகள் போட்டு அவைகளின்மேலாவது  
உண்டாக்கலாம். தரைமட்டத்திலிருந்துண்டாக்குவது  
தான் சிலாக்கியம். வேலி யோரமாக அவசியமான  
இடங்களில் வடிகால் ஏற்படுத்தலாம். சாதாரணமாய்  
வடிகால் வசதி இருந்தபோதிலுங்கூட, கால்நடைகள்  
வேலியை எழுப்பித்தாண்டாமலிருப்பதற்காகச் சிறு  
கால்களும் வெட்டிவைக்கிறதும். இப்படிக்கால்க  
ளுண்டாக்குவதினால், பயிர்க்களின் அஸ்திவாரம் இடி  
ந்து விழாமலிருக்கும் பொருட்டு வேலியிலிருந்து  
கொஞ்ச தூரத்திற்கப்பாலேயே வைக்கவேண்டும்.  
பயிர்கள் நுனியைப்பார்க்கிலும் அடியில் பலமாயு  
மடர்த்தியாயு மிருக்கவேண்டும். கரைகளின்மேல்  
ஏற்படும்பட்சத்தில், கரைகள் செங்குத்தாயிருக்கக் கூ  
டாது. அடியில் அகலமாயும் உச்சியில் குறுகலாயும்,



தகுந்த சரிவுடன் போடவேண்டும். வேலிப்பயிர்களை உண்டாக்குவதற்கு முன்னால் தரையில் பூமியை  $4\frac{1}{2}$  அடியகலத்திற்கு வெட்டிவாங்கி, சுத்தப்படுத்தி ஓரங்களில்  $1\frac{1}{2}$ ;  $1\frac{1}{2}$  அடியகலம், 1 அடி ஆழத்திற்கும், நடுவில்  $1\frac{1}{2}$  அடியகலத்தை 2 அடி ஆழத்திற்கும், கொத்தித் தூவாளியாய் வைத்து இருக்கவேண்டும். இதில் விதைகளை நான்கு சமமான வரிசையில் போட்டாவது, அல்லது பதியன்களை நட்டாவது பயிர் உண்டு பண்ணலாம். அடிக்கடி உரங் கொடுத்தால் பயிர் சிக்கிரம் வளரும். மழைகாலத்தில் நட்டால் ஆரம்பத்தில் இறைவைக்கு அதிகச் செலவு ஏற்படாது. நாற்றங்காலில் விதைகளைவிட்டு நாற்றைப் பிடுங்கி வரிசையாக மத்தியில் நடுவது சிலாக்கியமாகவும் கொள்ளப்படுகிறது. சிலபயிர்களுக்கு இரண்டிவருஷ நாற்றைப் பிடுங்கி நடப்படுகிறதாம். நாற்றங்கால் செய்நேர்த்தி நல்லதா யிருக்கவேண்டும். நாற்றங்காலிலடர்த்தியாய் விதைக்கக் கூடாது. காலடிபடாமலிருக்குப்படி சிறு பாத்திகளாக உண்டாக்கி, அவைகளில் ஒத்தாற்போல் ஒருஅங்குலத்திற்கு ஒருவிதையாக விதைக்கவேண்டும். ஒருவருஷமானவுடன் நாற்றைப் பிடுங்கி பயிரின் உச்சியில் 2, 3 அங்குலம் வெட்டி, வெட்டிவாங்கி யிருக்கப்பட்ட இடத்தில் அடிக்கு ஒரு வரிசையாக நாலுவரிசையும், வரிசையிலேயே 4 அங்குலத்திற்கு ஒருதாமும் நடவேண்டுமாம். ஒற்றை வரிசையைக்காட்டிலும் இரண்டு அல்



வது அதற்கு மேற்பட்ட வரிசைகளில் உண்டாக் து வது திறம். நட்ட இளநாற்றுகளையும். பதியன்களையும் ஆமோடுகள் தின்னாமல் பாதுகாத்துக்கொண்டு வரவேண்டும். வேலி பெரிதாகிறவரையில். முட்களால் இளம்பயிரை அடைத்துவைக்கலாம். பெரிதாய்ப் போனவுடன் பிரித்தெறித்துவிடலாம். அடிக்கடி கொத்திக் களைரிடுங்கி எறித்துவிடவேண்டும். அப்போதுதான் வேலி நன்றாய் அடர்த்தியாய் வரும். பயிர் 4. 5 அடியுமாய் வந்தவுடன் வருஷா வருஷம் ஒத்தாற்போல் அழகாய்க்கத்தரித்து வைத்துக்கொள்ளலாம். கத்திரிப்பெல்லாப் பழைகாலத்தில் செய்யவேண்டும். வேலி நன்றாய் ஊன்றிப் போனவுடன் போனவை வந்தவைகளை வருஷா வருஷம்பழுது பார்த்து எப்போதும் இடைவெளியில்லாமல் ஜாக்கிரதையாகப் பார்த்துக்கொள்ள வேண்டும். வளருகையில் ஒன்றோடொன்று பிணைத்து அடர்த்தியாய் வைத்திருக்கவேண்டும்.

கொறுக்காப்பள்ளி.

1. நமது இராஜதானியில் உயிருள்ள வேலிகளில் இதை நிரம்பச் சிலாக்கியமாகச் சொல்லலாம். வேலிக்கு வேண்டிய சகல குணங்களும் இதற்குப் பொருந்தியிருக்கின்றன. இதை விதைகளினாலும், நாற்றுகளினாலும், அடிக்கட்டை வேர்களினாலும் உண்டாக்கலாம். 3 சமமான வரிசைகளில் நடலாம்.



ஆறு மாதத்திற்கெல்லாம் பயிர் நன்றாய்  
 வளர்க்குவிடும். 2வது வருஷம் முதல் கிளை  
 களைக் கழித்து விறகுக்கு உபயோகப்படுத்த  
 லாம். ஆனால், 3வது வருஷம் முதல் சரியாய்  
 வருஷாவருஷம் கழித்துவருவதே உத்தமம்.  
 வருஷம் 2 தரம் கழிக்கலாம். அழகுக்காகக்  
 கழிக்கும் பசுபந்தில் 3 தரமும் கழிக்கலாம்.  
 சாதாரணமாய் விவசாயிகள் ஒருதரங் கழித்  
 தால் போதுமானது. ஒரு மையிலீ தூர  
 முள்ள வேலிபை வருஷா வருஷம் கழித்  
 தால் 30, 40 வண்டி விறகுக்குக் குறையா  
 மல் கிடைக்கும். பயிருக்குச் சுற்றிலும்  
 இவ்வேலி யிருக்கும் பட்சத்தில் வேர்கள்  
 மிகவும் தூரமாய்ப் பரவிப் பயிருக்கு இடஞ்  
 சலுண்டாகும். ஆகையால் இதற்கு அடுத்  
 தாற்போல் கிடங்குகள் வெட்டிவைப்பது  
 உலம். இதன் தழைகளை ஆடுமோடுகள் தின்  
 னும்.

கிளுவை.

2. இது சாதாரணமாய்ப் பதியன்களால் சமமான  
 வரிசையில் நடவேண்டும். இதன் இலை  
 ஆடுகளுக்குத் தீவனமாகிறது. இதற்கும்  
 வேலிப் பயிருக்குள்ள சகல குணங்களும்  
 உண்டு. சீயாக்காய்ப் பயிரும் இப்படியே  
 சகல குணங்களையும் உடைத்தாயிருக்கிறது.



கத்தாழை.

3. இது பெருங்காற்று வேகத்தைத் தணித்து பயிருக்கு அனுகூலத்தை உண்டாக்காது. விறகுக்குப் பிரயோஜனப்படாது. இது கரையின்மேலுண்டாக்கப்படுகிறது. ஒரு கஜ நீளம் கரைபோட ஒரு அணு செலவாகிறது. 7, 8 வருஷம் இலைகளை வெட்டாமலிருந்தால் பிறகு வருஷா வருஷம் வெட்டி நார் எடுக்கலாம். 40 மணங்கு இலைகளுக்கு ஒரு மணங்கு நார் கிடைக்கும்.

கருவேல்.

4. இது வேலியாயிருப்பதுடன், இதன் இலை ஆட்டிற்கும், மரம் விறகிற்கும், வண்டி வேலைகளுக்கும், உழவு கருவிகளுக்கும் பிரயோஜனப்படும்.

களிளி தீனுககள்.

5. முட்களுடனடர்த்தியா யிருப்பதால் வேலிக்குப் பிரயோஜனமாகும். இவைகளிலிருந்து வரும்படியொன்றங் கிடைக்காது.
6. ஆடாதொடை, காட்டாமணக்கு, ஆதானை இவைகளைப் பசுந்தாள் உரத்திற்கும் பிரயோஜனப்படுத்தலாம்.
7. புளிச்சை அல்லது புளிமஞ்சி இவைகளிலிருந்து நீள நாரும் எடுக்கலாம். கிரையைச் சமயலும் செய்யலாம்.



8. முட்குசும்பைப் பயிரிலிருந்து ஒருவித சிவப்புச் சாயமும் எடுக்கலாம். விதையிலிருந்து எண்ணெயும் கிடைக்கும்.
9. மேலே சொல்லியிருக்கிற மற்றவைகளும் சில குணங்களுடன் வேலிக்குப் பிரயோஜனமாகும்.



சிலவகை மாட்டுத்தீவனப் புல்கள்.

## கொழக்கட்டைப் புல்.

இது சாம்பல்மண் என்று சொல்லப்படுகிற சாம்பல் வர்ணமுள்ள களிமண் பூமியில் நன்றும் வளருகிறது. அடுத்தபடி துவாளியாயிருக்கப்பட்ட செவ்வெல் களியிலும், மணலிலும் வளருகிறது. பருத்தி பயிரிடும் கரிசல் காட்டிலும், சுக்கான் பாறைகளின் சிதைவு அல்லது கரைவினால் உண்டாகும் பூரிகளிலும் அடுத்தபடி வருகிறது. பழய கிராமந்தரங்களிலும், அல்லது சில பூரிகள் கிராமங்களுக்குச் சமீபமாயிருப்பதால் குடிகளால், மல, சல உபாடைகளை நீக்க உபயோகப்படுவதால் அவ்வித நிலங்கள் கூட சர்வசிலாக்கியம். இந்தப்புல்லுக்குக் கட்டுத் தண்ணீர் அல்லது தங்கு தண்ணீர் முக்கியமாகக் கெடுதல் பண்ணும்; உரப்பான களி நிலங்களில் இப்பயிர் வராதது.

மேற்படி புல் சாகுபடி செய்யவேண்டிய மேய்ச்சல் பூமியை, மலைக்கிளுவை அல்லது கள்ளி, சப்பாத்தி முதலிய உயிருள்ள வேலிகளால் அடைக்கப்படவேண்டும். மேய்ச்சல் பூமியின் விஸ்தீரணம் 100 ஏக்கர் அல்லது அதற்கு மேற்பட்டிருக்கலாம்.

கொழக்கட்டைப்புல் கிராம்பு உயரமாயும், கம்பிபோன்றதாயும், கொத்துக் கொத்தாயும் வளரும்.



மேற்படி புல் விதை தெளிக்கப்படும்போது ஆட்  
டுக்கிடையால் சாதாணமாய் பூமி உரப்படுத்தப்படு  
கிறது : பிற்பாடு அதே வருஷத்தில் அநேக மாதம்  
மாகிகள் மேய்வதனாலும், நிலம் உரப்படுத்தப்படு  
கிறது.

கோட்டை மழைகளில் பூமி உழப்படவேண்டும்.  
கொழக்கட்டைப்புல் விதை தனிமாகவாவது அல்லது  
மேசாளம், எள்ளுடன் கலந்தாவது தெளிக்கப்படுகிறது.  
கீழ்காற்றாமை ஒத்துக்கொண்டால் பின்வரும் ஜென  
வரி மாதத்தில் மாகிகளை மேய விடலாம்.

கொழக்கட்டைப்புல் பூமிகளில் அநேக கணுக்களு  
டன் ஒடி ஒவ்வொரு கணுவிலிருந்தும் கிளைகளாகப்  
புற்கள் வெளியில் வருகின்றன. கணுக்களின் மத்தியி  
லுள்ள பாகங்கள் பூமியில் மண்ணுக்குள் மறைந்திருக்  
கும். ஒவ்வொரு கணுக்களும் தனிமையில் வேர்கள்  
விடுகின்றன. பயிர்கள் நன்றாய் வளரும் பட்சத்தில்  
ஒரு புல் 50 முதல் 100 கணுக்களுக்குக் குறையாமல்  
விட்டு, கணுக்களின் கீழ் வேர்களும், மேல்புறம் புல்லு  
களுமாயிருக்கும்; ஆகையால் ஒரு கொத்தில் 50  
முதல் 100 புல்லுக்குக் குறையாவிருக்கும்.

இப்பயிரை இதன் வளர்ச்சியின் எக்காலத்திலும்  
பயமில்லாமலும் படுங்கி நடலாம். நிர்ப்ப நீடித்த  
வறட்சிக் காலங்களில் இப்பயிர் காய்ந்து பட்டுப்போ  
னாற்போல் கண்ணுக்கு புலப்பட்ட போதிலும் கூட  
ஒரு நல்ல மழை பெய்தால் பிறகு எல்லாம் தளிர்த்து



### 348 சிலவகை மாட்டுத்தீவனப் புல்கள்.

விடும். இந்தப்புல்லின் வேர்கள் நீர்ப்ப குட்டை. பழைய மேய்ச்சல் நிலங்களில் கூட அதாவது வேரு நாள் கொழக்கட்டைப்புல் சாகுபடி செய்து வரும் நிலங்களில் கூட வேர்கள் 3 அங்குலத்துக்குமேல் ஓடக்காணும். இப்புல் விதை, பூமியின்மேல் எப்போதும் தெளிக்கப்படுகிறது. நிற்பாடு விதையை மூடுவதும் கிடையாது; பூமியைக் கொத்தி விடுவதும் கிடையாது. விதை ஒரு வருஷத்துக்கு மேற்பட்ட விதையாக இருக்கக்கூடாது. ஒரு ஏக்கருக்கு 10 பட்டணம் படி விதை தெளிக்கவேண்டும்.

விதை தெளிக்கிறவன் தன் இடது கையில் ஒரு கூடையில் விதையை வைத்துக்கொண்டு, வலது கையால் கூடையிலிருந்து விதையை எடுத்து, தன் இடது பக்கத்தில் 2 அடி விதை பரவுப்படியாய் தெளித்துக் கொண்டே நேராகப்போகிறான். விதை நீர்ப்ப லேசானதால் அதிகதூரம் போய்விழாது. இப்படி தெளித்துக்கொண்டு நேராய்த் தலைமாட்டுக்குப் போனவுடன், இடது பக்கமாய்த்திரும்பி தலைமாட்டில் 4 அடி நேராய் நடந்து, அங்கிருந்து நேராய் இடது பக்கம் திரும்பி விதையை 2 அடிக்குத் தெளித்துக்கொண்டு நேராய்ப்போய், அந்த 4 அடி அகலமுள்ள தட்டில் எங்கும் விதை சரியாய் விழுப்படி செய்கிறான். இப்படியே நிலம் முழுவதும் தெளிக்கப்படுகிறது. •

பூமியில் தேவையான ஈரம் இருக்கும் பட்சத்தில் விதை தெளித்த 6 நாளைக்கெல்லாம் முளை கிளம்பும்.



ஒருபாட்ட மழை, இப்பயிரை பூமியில் நன்றாய்ப் பிழக்  
கும்படி செய்து விடும்.

முதல் வருஷத்தில் ஆடாவது மாடாவது இப்புல்லை  
மேயாமலிருக்கும்படி வெகு ஜாக்கிரதையாகப் பாது  
காத்துக் கொண்டு வரவேணும். கார்ப்பருவத்தில்  
விதையைத் தெளித்தால், டிசம்பர், ஜெனவரி மாதங்  
களில் மாட்டைவிட்டு மார்க்கமாதம் வரையில் மேய  
விடலாம்; பிற்பாடு அடுத்த கார்மழையினால் தளிர்ந்  
துப்பயிராக ஒரு மாதமாகிற வரையில் மாட்டை மேய  
விடக்கூடாது; பிறகு ஜூலை, ஆகஸ்டில் மழைபெய்  
கிறவரையில் மேயவிடலாம். பிறகு ஒரு மாதத்திற்கு  
மாட்டை மேயவிடாமல் வைத்திருந்து பிற்பாடு பிப்ர  
வரி, மார்க்கமாதம் வரையிலும்கூட மேயவிடலாம்;  
மேய்ச்சலுக்கு மிஞ்சக்கூடியதாக புல் இருக்கும் பட்  
தத்தில் முதிர்வதற்கு முன்னால், அதாவது, பூவிட்டவுட  
னே அறுத்துவிடவேணும்.



# மாட்டுத் தீனிகளில் கிளிப்புல் லின் Guinea Grass, முக்கியம்.

இந்தப்புல் அநேகருக்குத் தெரிந்திராது. கோடை காலத்தில் நமது நாட்டில் பசுந்தாள்களே அகப்படுவது அரிது. அக்காலத்தில் அதைச் சாகுபடி செய்து கரவை மாடுகளுக்குக் கொடுத்தால் நல்ல பாக்தாவை கிடைக்கும். இது சென்னைக்கு அடுத்த சைதாப்பேட்டை கவர்ன்மெண்டு பண்ணையில் சாகுபடி பண்ணப்பட்டுக்கிறது. இப்போது ஆளு கவர்ன்மெண்டு பண்ணையில் வருஷா வருஷம் சுமார் 10 ஏக்கர் சாகுபடி பண்ணப்படுகிறது. இந்தப்புல் சுமார் ஒருமுதலீளமிருக்கும். கொத்தும் கொத்தாய் அடர்த்தியாய் வளரும் சுபாவமுடையது. குறைந்தபட்சம் மூன்று வருஷம் ஒருவயலில் தங்கியிருக்கும். வாழையையுண்டாக்குவதுபோல, பக்கத்துப் போத்துகளின் வேர்களைப் பிடுங்கி நட்டால் பயிருண்டாய்விடும். இப்புல் விதைகளிலிருந்தும் உண்டாகும். ஆனால் வேர்களிலிருந்து (propagation by roots) உண்டாவதுபோலச் செழுமையாய் வளருகிறதில்லை. வயல்களை முகடுகளாகவும், படைச்சாலைகளாகவும் (Ridges and furrows) பிரித்து, படைச்சாலைகளில் எருவைப்போட்டு நிரப்பிவிடவேண்டும். நிரப்பியானவுடன் பழய முகடுகளை உடைத்து படைச்சாலைகளாகவும், பழய படைச்



சால்களை முகடுகளாகவும் பண்ணிவிடவேண்டியது. இப்படி முகடுகளில் அதாவது ஒரு கிரப்பிய முன் படைச்சால்களில் புல்லின் அடிக்கட்டைகளை நட வேண்டும். நீழ் காற்று மழையில் பயிரை நட்டுவிட்டால், பாசனச் செலவு அதிகமிருக்காது. அப்படி நடாமல் பாக்கிக்காலங்களில் நட்டால் பாசனச்செலவு ஜாஸ்தியாகும். கவிவதில் கைபால் நடக்கூடாது. ஒரு குச்சியைப் பெடுத்து ஒரு முனைகூர் பண்ணி, இந்தக் கூரால் முகடுகளில் குத்திநடவேண்டும். இதற்கு இங்கிலிஷில்—(Dribbling) என்று பெயர். வருஷா வருஷம் 3 அல்லது 4 அறுப்பு அறுக்கலாம். இது குறைந்த பட்சம் 3 வருஷப் பயிராதலால் 3வது வருஷத்தில்தான் கண்டுமுதல் ஜாஸ்தியிருக்கிறதாம். ஒன்று இரண்டு அறுப்புக்குப் பிறகு, களைபிடுங்கவும், பயிர் வளருவதை சிக்கிரப்பித்துவதற்கும், வயல், முகடுகளுக்குக் குறுக்கே உழப்பட வேண்டும். இப்படி உழுதுவிட்டால் வயல்முழுவதும் சிறுசுன்றுகளாயிருக்கும். ஒவ்வொரு குன்றிலும் (hill system) புல் அடர்த்தியாய் வளர்ந்து ஒங்கி நிற்கும். ஒருவருஷத்தில் முதல்தரம் கண்டுமுதலில் சுமார் 37,000 பவுண்டு புல் கிடைக்கும். சென்ற 7 வருஷ காலமாய் பூனா கவான்மெண்டு பண்ணையில் சாகுபடிசெய்யப்பட்டு வருவதில் வருஷச் சராசரி வரும்படி சுமார் 17,534 பவுண்டு புல் ஆகிறது. இந்தப்புல் சாகுபடிபண்ண ஏக்கர் 1க்கு செலவு சுமார் 60 ரூபாய் ஆகிறது. ஒரு ஏக்கர் வருமானப் புல்லின் விலை 91 ரூபாய் ஆகிறது. ஆக எச்செலவும்போக



## 352 சிலவகை மாட்டுத்தீ வனப் புல்கள்

ஏகர் 1க்கு வருஷா வருஷம் சுமார் ரூபாய் 30 கிடைக்குமாம். கறவை மாடுகளுக்கு இது சிலாக்கியமென்று அறியப்பட்டிருப்பதால், பூனா கவான்மெண்டுப் பண்ணைக் கறவை மாடுகளுக்கு இதை உபயோகிக்கிறார்கள்.



பட்டுப்பூச்சிகளை விர்த்தியாக்குதல்.




பட்டுப்பூச்சி முட்டையிலிருந்து  
புழுக்களுண்டாக்குதல்.



பூச்சிகளுக்குள் நிரம்ப சிரேஷ்டமானவை பட்டுப் பூச்சிகள். பூச்சிகளிலிருந்துண்டாகும் உற்பத்திகளுக்குள் நிரம்ப முக்கியமானது பட்டு. முதல் முதல் சீன தேசத்தில்தான் பட்டு கைத்தொழிவா லுண்டாக்கப் பட்டது. ஐரோப்பாவி லுண்டாக்கப்படுகிற எல்லாப் பட்டுகளும், சீனா, இந்தியா தேசங்களிலிருந்து மிகுந்த யாய் உண்டாகிற எல்லாப் பட்டுகளும், சாதாரணப் பட்டுப்பூச்சிகளிலிருந்துதான் உண்டாகின்றன. ஆனால் இந்தியாவில் ஏராளமான பட்டுகள் இன்னும் அநேக விதப் பூச்சிகளின் கூடுகளிலிருந்து கிடைக்கின்றன. சாதாரணப் பட்டுப்பூச்சிகள் முசுக்கட்டைச்செடி அல்லது பட்டுப்பூச்சிச் செடி (Mulberry tree) களில் இலைகளை ஆகாரமாகக்கொண்டு ஜீவித்து விருத்தியடை கின்றன. அநேகவிதப் பட்டுகளை உண்டாக்கும் இதரப்பூச்சிகள் ஆமணக்கு இலை, சவுக்கு இலை, தேக்கு இலை, வாதாம் இலை, இலந்தை இலைமுதலிய இலைகளைத் தின்று ஜீவித்து விருத்தி யடைகின்றன. முசுக்கட் டைச் செடியிலை (Mulberry leaves) களினால் விருத்தி யாகிற பட்டுப்பூச்சிகளின் பட்டு எல்லாவிதப் பட்டு களையும் பார்க்கிலும் நிரம்ப விலையுயர்ந்ததாகையால் இவைகளைப்பற்றித்தான் கீழ் விவகரிக்கப்படும்.






முகக்கட்டைச் செடி அல்லது பட்டுப்பூச்சிச் செடி.

சாதாரணப் பட்டுப்பூச்சி சீனா, பாகாரா, ஆப்கா  
னிஸ்தான், காஷ்மீரம், பெர்ஷியா, தென் ருஷியா,  
தருக்கி, இஜிப்டு, ஆஸ்திரியா, இடலி, பிரான்சு, ஸ்பெ  
யின் முதலிய இடங்களில் பழக்கப்பட்டிருக்கிறது.



லும், மைசூர் இராஜாங்கத்திலும் பழக்கப்படுத்தப்பட்டிருப்பதால் நமக்கு இதைப்பற்றி எழுதவேண்டுமென்ற கிற ஆவலுண்டாயிற்று. இந்தப் பட்டுப்பூச்சி வருஷம் ஒன்றுக்கு ஒரே ஒரு விளைச்சலைத்தான் கொடுக்கும். இப்பூச்சி நூல்நூற்கும் கூடோ மிகவும் பெரிது. இக்கூட்டின் பட்டுநூலோ மிகவும் உத்தமமானது. வெள்ளை நிறம் அல்லது தங்கதகையோலொத்த மஞ்சள் நிறத்தை உடைத்தாயிருக்கும்.



பட்டுப்பூச்சிப் புழுக்கள் இலைகளை ஆகாரமாக உட்கொள்ளும் தட்டுகள்.




சாதாரணப் பட்டுப்பூச்சியின் உறுமாறுதல்.—(Metamorphosis) பட்டுப்பூச்சியின் முட்டைகள் (Egg or ovum) சாம்பல் வர்ண முள்ளதாயிருக்கும். சீதோஷ்ணக்கருவிபால் 60 டிகிரி F. உஷ்ணத்தில் சுமார் 10 தினம் இம்முட்டைகள் வைக்கப்பட்டிருந்தால், இவைகள் வெளுத்து உடனே சிறுபுழுக்களாய் மாறிவிடுகின்றன (Larva). இப்புழுக்கள் பிறந்தவுடன் சுமார் ஒரு அங்குலத்தின் இருபதில் ஒருபாகம் நீளமுள்ளதாயிருக்கின்றன. இவைகளின் உடல் நீளமாயும், மிருதுவாயும், சாம்பல் வர்ணமுள்ளதாயுமிருக்கிறது. முன்பக்கத்தில் ஒரு தலை, இரண்டு கண்கள், ஒருவாய் இருக்கின்றன. தலைக்குப்பின் ஒன்றின்பின் ஒன்றாய் 3 வட்டங்கள் தோன்றும். இவைகள்தான் மார்பு அறை. ஒவ்வொரு வட்டத்திலும் ஒரு ஜதை சிறு பாதங்களைப் பார்க்கலாம். இக்க வட்டங்களுக்குப்பின் வயிறு இருக்கிறது. இவ்வயிற்றின் இறுதிப்பக்கத்தில் ஐந்து ஜதைச் சதைக்கணுக்கள் காணப்படும். இவைகளும் பாதங்கள் தான். ஆகையால் பட்டுப்புழுவுக்கு மார்பில் 3, வயிற்றில் 5, ஆக 8 ஜதைப்பாதங்களுண்டு. இப்புழுக்கள் முசுக்கட்டை இலைகளை (Mulberry leaves) மண்டும். இவைதான் அவைகளுக்கு ஆகாரம். பட்டுப்பூச்சி, புழுவாகவே சுமார் 34 நாள் இருக்கிறது. இந்தக் காலத்தில் நான்குதடவை தோல்உரிக்கின்றது. முதல்கருப்பாயிருக்கின்றதை வெள்ளையாகவும், வெள்ளையை மஞ்சள் நிறமாகவும், மஞ்சள் நிறமுள்ள தோல்போய் பச்சைநிறமுள்ள தோலாகவும் இப்படி நான்குதடவை



தோல்கள் மாறுபடுகின்றன. தோலுரிக்கு முன் கொஞ்சம் மந்தமாயும் இலைகளைக் கொஞ்சகாலம் தின்னாமலுமிருக்கும். சுமார் 31வது நாள் இலை புசிப்பதை நிறுத்தி வேறு உருவமடைய வேண்டியதற்குள்ள ஏற்பாடுகளைச் செய்ய ஆம்பிக்கிறது. அப்போது உடம்பு மிருதுவாய்ப்போய் வாயிலிருந்து பட்டு நூலை விட்டுத் தன்னைச் சுற்றி அங்கும் இங்குமாய் நூலை நூற்று ஒரு புழுக்கூட்டை உண்டாக்குகிறது. ஒரு பட்டு நூலின் நீளம் சுமார் 1,100 அடிக்குமேலிருக்கிறதாம். புழுக்கூடு எவ்வளவுக்கு எவ்வளவு நிறை ஜாஸ்தியாயிருக்கிறதோ அவ்வளவுக்கு அவ்வளவு நீளம் அதிகரிக்கும். பொதுவாக ஒரு புழுக்கூடு முடிவுபெற 4 தினம் செல்லுமாம். புழுக்கூடு முடிவடைந்தவுடன் திறந்து பாத்தால் முன்னிருந்த புழு காணப்படுகிறதில்லையாம். இப்போது (Chrysalis Stage) ஊதாநிறமாய் மாறிப்போய் முட்டை வடிவமாய்க் காணப்படுகிறதாம். தலை, தாடை என்கிற வித்தியாசம் தெரிகிறதில்லை. முன்பக்கத்தில் ஒருவளைந்த கட்டு (Band) காணப்படுகிறது. இந்தக் கட்டுத்தான் பிறகு இறகுகளாய் மாறிவிடுகின்றது. இப்படி இந்தப் புழு தன்கூட்டில் சுமார் 20 நாளிருக்கிறது. பிறகு தன்வாயில் ஊறும் நீரால் கூட்டின் ஒரு ஓரத்தில் களைத்து அதுவழியாய்த் துவாரம்செய்து கொண்டு வெளியில் பட்டுப்பூச்சியாய் (Perfect Insect) வருகின்றது. இப்போது கூட்டுப்புழு வெள்ளைச் சிறகுகளுடன் காணப்படுகிறது. புழுவாக இருக்கையில் வாயில் தாடைகளிருப்பதுபோல இப்போது கிடை





தட்டுகளுக்குச் சமீபத்தில் இப்பேர்ப்பட்ட கிளைகளை  
ஒரு அடி வித்தியாசத்தில் வைத்தால் அவைகளில்  
புழுக்கள் தங்களைச் சுற்றி நூல் நூற்று  
கூடுகள் உண்டாக்கும்.



யாது; ஆனால் வாய் உருண்டைவடிவமாயும் முறுக்குள்ளதாயும் நீண்டுவிடுகிறது. காலகளோ மெளிந்து நீண்டுவிடுகின்றன. உள் அவயவங்களும் முன்னிருந்த தற்கு வித்தியாசப்படுகின்றன. வெளித் தோற்றங்களும் அப்படியே. இப்படிப் பூச்சியாய் (Perfect Insect) வெளிவந்தவுடன், ஆணும் பெண்ணுமாய்க் கலந்து 24 மணி நேரம் சேர்ந்திருக்கின்றன. ஒரு நாள் கழிந்தவுடன் ஆண்பூச்சி பெண் பூச்சியின்மேல் செத்துக்கிடக்கிறது. பெண்பூச்சி ஆண்பூச்சியைவிட அதிக நாள் உயிருடன் இருக்கிறது. ஆண்பூச்சி காலமானவுடன் பெண்பூச்சி தன் முட்டையிடும் காரியத்தைப் பார்க்கிறது. ஒரு பெண்பூச்சி 500 முட்டைக்கு மேலிடும். பெண்பூச்சி தான் கூட்டிலிருந்து வெளிவந்தபிறகு 10, 20 நாள் வசித்து உயிரை இழந்துவிடுகிறது. இக்காலத்தில் ஆகாரம் ஒன்றும் உட்கொள்ளுகிறதில்லை. பட்டுப்பூச்சிக்கு இவ்விதம் நான்கு மாறுருவங்களுண்டு. முதல் முட்டைகாசாகப் பத்து தினமும், இரண்டாவது புழுவாக (Larval stage) 34 தினமும், பழுக்கூடுகட்ட 4 தினமும், கூட்டுப் புழுவாக (Chrysalis stage) 20 தினமும், பட்டுப்பூச்சியாக 15 தினமும், ஆக நான்கு மாறு உருவங்களிலேயும் சுமார் 83 நாளிருந்து நமக்கு முக்கியமான வஸ்துவாகிய பட்டையளிக்கும்படி சிருஷ்டித்திருக்கிற பகவானே இடைவிடாது துதிசெய்வோமாக.





பட்டுப்பூச்சியும், அதின் முட்டைகளும்.



பர்மா தேசத்துப் பட்டுப்புச்சியும்  
பட்டுப்புழுக்கூட்டிலிருந்து நூல்தூற்கும்  
கைத்தொழிலும்.

பர்மாதேசத்தில், மாக்லி (Maywe) என்கிறதாக ஒரு  
ஜில்லா இருக்கிறது; அந்த ஜில்லாவில் 15, 20 கிரா  
மத்தார்கள் பட்டுப்புச்சி+ளை வளர்த்து, அவைகளினை  
லுண்டாகும் பட்டைக்கொண்டு ஜீவனம்செய்து வரு  
கிறார்கள். அவர்களுடைய அனுபோகத்தைக் கீழ்  
உரைக்கப்படும்.

முதல்முதல் சீனாதேசத்திலிருந்து பர்மாவுக்குப் பட்  
டுப்புச்சி முட்டைகள் கொண்டுவரப்பட்டன. பட்டுப்  
பூச்சிக்கு நான்கு அவதாரங்களுண்டு. முட்டையாகவும்,  
பிறகு புழுவாகவும் அமித்தபடி கூட்டுப் புழுவாகவும்  
கடைசியில் இறகுடன் பூச்சியாகவும் ஆக இப்படி  
நான்கு மாறுபாடும் கொள்ளுகிறதைப் பார்க்கலாம்.  
பர்மா தேசத்துப் பட்டுப் பூச்சியின் முட்டைகள் புழு  
வாகிறதற்கு 8 தினங்கள் பிடிக்கின்றன. இப்புழுக்  
கள்தங்கள் வாழ்நாளாகிய 44 தினங்கட்குள் நான்கு  
தடவை தங்கள் தோல் அல்லது சட்டைகளை உரிக்  
கின்றன. புழுவான பிறகு 6-வது, 14-வது, 22-வது  
30-வது தினங்களில் அதன் தோல் உரிக்கப்படுகிறது.  
ஒவ்வொரு தடவையிலும் சட்டைகள் நிறம் மாறுகின்  
றன. புழுக்கள், ஒவ்வொரு சட்டை மாறுங்காலத்  
தில் இரண்டு தினம் மந்தமாயும் ஆகாரம் உட்கொள்ளா



மலு மிருக்கின்றன. கடைசிச் சட்டையை உரித்த  
வுடன் 12 தினம் முசுக்கட்டைச் செடி யிலேகளைப்  
(Mulberry leaves) புசித்து மஞ்சள் நிறமாய் மாறிப்  
பழுக்கடிகள் கட்ட ஆரம்பிக்கின்றன. பர்மா தேசத்  
தார்கள் முட்டைகளைப் புழுவாக வேண்டியதற்குள்ள  
சீதோஷ்ணத்தில் 8 தினம் சாக்கிரதையாய் வைத்துப்  
பிறகு 1 அங்குலமாமும், எங்கு பார்த்தாலும் 3 அடி  
5 அங்குலம் அகலமுள்ள தட்டிகளில் புழுக்களை எடு  
தலி வைத்து விடுகிறார்கள். இத்தட்டிகளில் தினம்  
நான்கு தடவை ஆகாமாக முசுக்கட்டை யிலேகளைப்  
புழுக்களுக்கு வைப்பார்கள். புழுக்கள் இவ்விலேகளைத்  
தின்மவிடும்.

புழுக்கள் பானியா யிருக்கையில் ஒருவித ஈ இவை  
களைக் கொட்டிக் கொண்டு விடுகிறதாம். இதைத்தடுக்  
கும் பொருட்டு தட்டிகளைத் துணியால் மூடிவைப்பது  
வழக்கம். புழுக்களுக்கு வயதானவுடன் தட்டிகளைத்  
துணியால் மூடுவதில்லை. வயதான புழுக்களை அந்த  
ஈ கொந்தரவு செய்கிறதில்லையாம். ஒரு தட்டி 800  
முதல 1000 புழுக்களைக் கொள்ளும். இந்தத் தட்டி  
களுக்குப் புழுத்தட்டிகள் என்று பெயர். புழுக்கள்  
மஞ்சள் நிறமாகும்போது இத்தட்டிகளிலிருந்து எடுத்  
து வேறு 1 அங்குலம் ஆழம், 5 அடி 5 அங்குலம் எங்கு  
பார்த்தாலும் அகலமுள்ள பெரியதட்டிகளில் வைப்  
பது வழக்கம். இத்தட்டிகளுக்குப் புழுக்கூடுத் தட்டிக  
ளென்று பெயர். இந்தப் பெரியதட்டியில் 30 அடி  
நீளம் 3 அங்குலம் அகலமுள்ள மூங்கில் பாய் ஒன்றை



மடக்கி மடக்கி 3 அங்குலத்துக் கொருதரம் கூடுகள் கட்டி வைத்திருக்கிறார்கள். பெரிய தட்டியில் புழுக்களை எடுத்துவைத்து மூன்று நாள் ஆனவுடன் அவைகளைச் சுற்றிச் சுற்றி கூடுகள் கட்டியாய்விடுகின்றன.

கூடுகள் முடிந்தவுடன் இவைகளை எடுத்துப் புழுத் தட்டி அல்லது சின்னத்தட்டிகளில் மாறுபடியும் வைக்கிறார்கள். கூடுகளின்ன ஆரம்பிக்கையில் பெரிய தட்டியில் வைக்கப்பட்டு, கூடுகள் முடிந்தவுடன் (அதாவது 3 நாளைக்கெல்லாம்) சின்னத்தட்டியில் மூன்று நாள் வைக்கப்படுகின்றன. இந்த ஆறுதினத்துக்குள் புழுக்களின் அங்குலட்சணங்கள் மாறுகின்றன (புழுக்களுக்கும் கூட்டிற்குள்ளிருக்கும் புழுக்களுக்கும் அவயவங்களில் வித்தியாசமிருக்கின்றது, இரண்டாவது அவதாரமான புழு இப்போது 3 வது அவதாரமாகிய கூட்டுப் புழுவாய் (Pupa) மாறிவிடுகின்றது. புழுக்கள் வாயிலிருந்து பட்டுநூல் வீட்டுத் தங்களைச் சுற்றிக்கூற்றிக் கூடுகள் கட்டுகின்றன.

மூன்றாவது அவதாரத்து புழுக்கூடுகள் வெந்நீர்ச் சட்டியில் ஜலத்துடன் போட்டு கொதிப்பிக்கப்படுகின்றன. இப்படிக் கொதிப்பிக்கையில் வீட்டுக் கிழவிகள் கொரடுகளால் புழுக்கூடுகளை எடுத்துச் சிலநூல்களைப் பிரித்து இராட்டினத்தில் சுற்றுகிறார்கள். ஒரு கிழவி ஒருதடவையில் 5 முதல் 7 கூடுகளைப் பொறுக்கி கையால் சில நூல்களைப் பிரித்துச் சட்டிமேல் வைக்கப் பட்டிருக்கும் இரண்டு மூங்கில் சட்டத்தின் வழியாக இந்நூல்களைவிட்டுப் பிறகு இதற்குமேல் வைக்கப்பட்



டிருக்கும் ஒரு மூங்கில் உருளைவழியாகக் கொண்டு போய் இத்துடன் பிணைக்கப்பட்டிருக்கிற ஒரு இராட்டினத்தில் மேற்கூறிய நூல்கள் சுற்றப்படுகின்றன. இவ்விதமாக எல்லாக் கூடுகளும் நூல்களாக நூற்கப்படுகின்றன. ஆறு சின்னத்தட்டி புழுக்கூடுகள் அதாவது சுமார் 4,000 புழுக்கூடுகள் ஒரு வீசை பட்டைக் கொடுக்கின்றனவாம். ஒரு வீசை சுமார் 3<sup>3</sup>/<sub>4</sub> பவுண்டு அவயிடங்களில் ஒரு வீசை பட்டு விலை சுமார் ரூபாய் 16 புழுக்கூடுகளின் ஓங்களிவிருந் துண்டாகும் கச்சாப்பட்டு (Refuse silk) வீசை 1க்கு ரூபாய் 10 ஆக விற்கப்படுகிறதாம்.

புழுக்கூடுகளெல்லாம் நூலானவுடன் சட்டியில் தங்கியிருப்பது பாக்கிப் புழுக்களும் வெந்நீர் ஜலமுந்தான். இப்புழுக்களை யெடுத்து நெய்யில் அல்லது எண்ணெய்யில் பொரித்து உண்ணப்படுகின்றனவாம். பர்மா தேசத்தார்களுக்கு உருசிகரமான பதார்த்தங்களில் இது ஒன்றும். இப்போது நாம் ஷை புழுக்களின் அவதாரக் கதைபைத் தொடருவோம். மூன்றாவதவதாரத்தில் அநேகமாய்க் கூடுகள் நூலாய் நூற்கப்படுகின்றன. சந்ததி விருத்திக்காக அதாவது முட்டைகளுக்காகச் சில புழுக்கூடுகள் தனியாய் எடுத்துவைக்கப்படுகின்றன. இந்தக்கூடுகளில் புழுக்களிருக்கின்றனவல்லவா? இந்தக்கூட்டுப்புழுவுக்கும் புழுவுக்கும் அவயவபேதமிருக்கின்றன வென்று முன் தெரிவித்திருக்கிறோமல்லவா? இந்தக்கூட்டுப்புழு கூடுகட்டி முடிந்தவுடன் எட்டாவது நாளில் கூட்டைவிட்டுப் பூச்



சியாக 'வெளிக்கிளம்புகிறது. ஆண் பூச்சியும் பெண் பூச்சியும் சேரும்படி ஒரு தட்டியில் பூச்சிகள் வைக்கப்படுகின்றன. புணர்ந்தவுடன் இரண்டும் பிரிகின்றன. இப்போது பெண் பூச்சிகளை பனை இலைகளால் செய்யப்பட்ட பத்தாயங்களில் (Bass) வைக்கிறார்கள். ஒரு பத்தாயம் 1 அங்குல ஆழம், எங்குபார்க்காலும் 3 1/2 அங்குல அகலமுள்ளது. ஒரு பத்தாயத்தில் 25 பெண் பூச்சிகள் வைக்கப்படுகின்றன. ஒன்றரை நாளைக்குள் இவைகள் முட்டைகள் இடுகின்றன. பிறகு பெண் பூச்சிகளை யெடுத்தெறிந்து விடுகிறார்கள். 10 பத்தாயங்களின் விலை ரூபா 1. எவர்களுக்குப் பட்டுப்பூச்சிகளை வாங்கித்தொழில் செய்யவேண்டுமென்று இஷ்டமிருக்கிறதோ அவர்கள் முட்டைகளை வாங்கித்தொழில் செய்கிறார்கள்.

முசுக்கட்டைச் செடித் (Mulberry gardens) தோட்டங்கள் ஆற்றங்கரைப் படுகைகளில்தான் விருத்தியாகின்றனவாம். குன்றுகள் பக்கங்களிலேயும் விருத்தியாகுமாம். பதியன்களால் (Cuttings) பயிராக்கப்படுகின்றனவாம். ஒரு தோட்டம் 2 வருஷம் முதல் 5 வருஷம் வரையில் மல்பரிச்செடிகளை உடைத்தாயிருக்கும். செடி பெரிதாகிவிட்டால் இலைகள் அதிகமிராது. பெரிதானவுடன் வெட்டித் துண்டங்களெடுத்துப்புதுத் தோட்டம் போடுவது வழக்கம். செடி இளமைபாயிருக்கையில் தான் அதிக இலைகளைக் கொடுக்கும்.





**சென்னை இராஜதானியிலுள்ள  
முக்கிய பயிர்களின் சாகுபடி விவரீரணம்.**



விவரீரணம்.

பயிர்கள்

(ஒரு வருஷத்தில் ஒரு  
பொகத்துக்கு போல் சாகு  
படி செய்யப்படும் விவரீர  
ணமும் அடங்கி உள்ளன.)

|                                             |     |     |                           |
|---------------------------------------------|-----|-----|---------------------------|
| நெல்                                        | ... | ... | சுமார். 70,00,000 ஏக்கர். |
| கோதுமை                                      | ... | ..  | 18,000 ..                 |
| சோளம்                                       | ... | ..  | 45,00,000 ..              |
| கம்பு                                       | ... | ..  | 30,00,000 ..              |
| கேழ்வாறு                                    | ... | ..  | 15,00,000 ..              |
| முத்துச்சோளம் அல்லது<br>மக்காச்சோளம்        | ... | ..  | 7,50,000 ..               |
| கொத்துக்கடலை                                | ... | ..  | 1,31,000 ..               |
| இதர தானியப் பயிர்களும்,<br>கோதுப்பயிர்களும் | ... | ..  | 55,00,000 ..              |
| ஆளிவிதை                                     | ... | ..  | 40,000 ..                 |
| எள்ளு                                       | ... | ..  | 7,50,000 ..               |
| இதர எண்ணெய் விதைப்<br>பயிர்கள்              | ... | ..  | 10,00,000 ..              |
| சுவை அதிகரிக்கச்செய்யும்<br>பயிர்கள்        | ... | ..  | 3,73,000 ..               |
| கரும்பு                                     | ... | ..  | 57,000 ..                 |
| இதர சர்க்கரை கொடுக்கும்<br>பயிர்கள்         | ... | ..  | 83,000 ..                 |
| பருத்தி                                     | ... | ..  | 17,50,000 ..              |
| இதர நார்கொடுக்கும் பயிர்<br>கள்             | ... | ..  | 44,000 ..                 |



|                             |     |            |                |
|-----------------------------|-----|------------|----------------|
| அவுரி                       | ... | ... சுமார் | 4,42,000 ஏகர். |
| இதர சாயம கொடுக்கும)         |     |            |                |
| பயிர்கள்                    | ... | ...        | 1,446 ,,       |
| கசகசா                       | ... | ...        | 17 ,,          |
| காப்பி                      | ..  | ...        | 59,000 ,,      |
| புகையிலை                    | ... | ...        | 1,25,000 ,,    |
| மாட்டுத்தீவனப் பயிர்கள்     | ... | ...        | 83,000 ,,      |
| தோப்புகள், பழத் தோட்டங்கள், |     |            |                |
| தோட்டக்கால்.                | ... | ...        | 6,50,000 ,,    |

ஆக மொத்த இராஜதானியில் ஒரு மோகத்துக்கு மேல் சாகுபடி செய்யப்படும் விஸ்தீரணத்தையும் சேர்த்து மொத்தம் சாகுபடி விஸ்தீரணம் சுமார் 2,75,00,000 ஏகர்.

மேற்கூறிய சாகுபடி விஸ்தீரணத்திற்கு சுமார் 25,00,000 கலப்பைகள் பிரயோசனப் படுத்தப்படுகின்றன.

### சென்னை இராஜதானியின் கால்நடைகளின் கணக்குகள்.

|                  |     |        |           |
|------------------|-----|--------|-----------|
| எருதுகள்         | ... | சுமார் | 45,00,000 |
| பசுக்கள்         | ... | ,,     | 37,50,000 |
| எருமைக்கடா       | ... | ,,     | 10,00,000 |
| எருமை            | ... | ,,     | 15,00,000 |
| செம்பரி ஆடு      | ... | ,,     | 85,00,000 |
| வெள்ளாடு         | ... | ,,     | 50,00,000 |
| எருமைக்கன்றும்   | }   | ,,     | 45,00,000 |
| பசுவின் கன்றும். |     |        |           |

